漢文

第六

叢書集成新編　第四六册目錄

應用科學類

內科

陰症略例一卷　元　王好古著　十萬　一

外科

外科精義二卷　元　齊德之纂集　醫統　二四

寶太師流注指要賦一卷　元　撰人未詳　濟生　四九

眼科

一草亭目科全書一卷　清　鄧苑纂　藝海　五二

喉科

尤氏喉科秘本一卷附方　清　錫山尤氏著　借月　五九

咽喉脈證通論一卷　宋　撰人不詳　咫進　六八

婦科

產育寶慶集二卷　宋　郭稽中纂　函海　七三

衞生家寶產科備要八卷　宋　朱端章編　十萬　八三

女科二卷　清　傅山著　海山　一一八

產後編二卷　清　傅山著　海山　一四〇

幼科

小兒藥證眞訣三卷　宋　錢乙撰　聚珍　一五四

顱顖經一卷　宋　撰人不詳　函海　一七三

海藏痘論萃英一卷　元　王好古著　濟生　一七八

田氏保嬰集一卷　元　撰人未詳　濟生　一八一

種痘

種痘心法一卷　清　朱奕梁撰　借月　一八七

種痘指掌一卷　清　撰人不詳

藥物學

神農本草經三卷　魏　吳普等述　問經　一九二

石藥爾雅二卷　清　孫星衍　孫馮翼輯　別下　二三二

本草衍義二十卷　唐　梅彪集　十萬　二三六

潔古老人珍珠囊一卷　宋　寇宗奭編撰　濟生　二七〇

湯液本草三卷　金　李杲著　醫統　二七三

參譜一卷　元　王好古集　借月　三一五

人參考一卷　清　黃叔燦輯　靈鵝　三二〇

醫方

劉涓子鬼遺方五卷　清　唐秉鈞纂

秘製大黃清寧丸方一卷　南北朝龔慶宣撰　讀畫　三二三

千金寶要六卷　唐　孫思邈撰　平津　三四三

蘇沈良方八卷拾遺二卷附四庫提要　唐　孫思邈集　平津　三四八

旅舍備要方一卷附四庫提要　宋　蘇軾　沈括撰　聚珍　三七九

宋　董汲撰　墨海　四〇九

增廣太平惠民和劑局方十卷　宋　陳師文等編　學津　四一五

用藥總論三卷附四庫提要　宋　王貺撰　墨海　五二一

全生指迷方四卷　宋　洪遵輯　士禮　五四〇

洪氏集驗方五卷　宋　王袞撰　珠叢　五六二

博濟方五卷附四庫提要、補正　宋　史堪撰　十萬　五九五

史載之方二卷　金　李杲撰　醫統　六一八

闕室祕藏三卷　金　劉守眞撰　醫統　六六六

黃帝素問宣明論方十五卷　元　王好古著　醫統　七一二

醫壘元戎一卷　元　羅天益著　惜陰　七二二

衞生寶鑑二十四卷附補遺

陰證略例

王好古著

陰證略例序

人生天地間而陰陽命之氣。其受病亦不外乎此。醫家言視證察脈。則必本諸陰與陽。自軒岐以來諸書可考也。至漢長沙張仲景著傷寒一書。其言備矣。其法皆出伊尹湯液。如易之於數。春秋之於法。蓋萬世不可易者。其論氣脈形聲。以測人之臟腑經絡之微。亦不過曰。如是爲陽。如是爲陰。如是爲寒。如是爲熱。如是爲有餘。如是爲不足。以決人之死生之變於朕兆之前。使夫學者可以按而知之。苟能詳辨而勿失。則思過半矣。然混茫乎疑似之中。懌轉乎毫釐之間。自非精思入神。冥合造化。則不能也。是以古者之言醫也。皆聰明有道之士。如孫思邈、陶隱居、葛稚川之徒。何如人也。迨夫叔世末流。多出於巫工庸人間裏衣冠。挾方寸之藥。自命爲醫工。然試讀其書。皆讀書且不知。況能索理於精微之地哉。如趙括之用兵。徒能誦其父之書。旋取覆敗之禍。如又不能誦其書。則其爲敗宜如何哉。夫陰陽二證也。寒與溫之味。從而用之亦二也。其主治嗜好。又有大不同者。甚者各主一偏。互相詆訾。殊不知桂枝承氣之一例證。則斃之患立見。異時承平。貴人挾朔方鞍馬勁悍之氣。加以膏粱肥濃之養。故藥以剛劑。往往而中。或者遂狃於此。以爲人之爲病。皆然熱鬱陰候不論。豈理也哉。且四方風土既殊。而人之稟受亦異。而一律按之。其可乎。蓋亦求其至當而已矣。嗚呼。中古以降。老毒少而天閼多。豈眞不幸與。蓋醫者心術之偏。其蔽必至於殺人。儒者心術之偏。其蔽必至於誤天下。如宋之王安石是也。偏之爲害之烈如此夫。竊嘗謂受天地中和之性。得聖人公恕之學。不以利欲一毫入於其心。而後可以爲儒爲醫矣。天地萬物一理也。聖人之道一中而已。中庸曰。致中和。天地位焉。萬物育焉。而況醫乎。海藏先生王君進之。家世趙人。早以通經舉進士。晚獨喜言醫。始從東垣李明之。蓋傳其所學。後乃精研極思軒岐以來諸家書。馳騁上下數千載間。如指諸掌。予在大梁時。聞其名。諸公間籍甚。獨以未識爲恨。今年秋來晉州。始得候先生於館舍。觀其氣和而凝。志一而定。有道者也。與之游甚閑暇。日出一編書授予。且謂予曰。傷寒、人之大疾也。其候最急。而陰證尤爲尤慘。陽則易辨而易治。陰則難辨而難治。若夫陽證。熱深而厥。不爲難辨。陰候寒盛。外熱反多。非若四逆脈沈細欲絕易辨也。至於脈鼓數有力。加陽脈數倍。內伏太陰。發煩躁欲坐井中。此世之所未喻也。予恐其誤。積思十餘年。蓋考自岐伯迄今。潔古老人。掇其精要。附以己說。蓋爲三十餘條。有證有藥。有論有辨。名之曰陰證略例。將鋟以傳。以詔後學。且與天下衛生之君子共之。予嘗爲我題其端。予退而伏讀之。善之曰。異乎哉。未有是書也。其於救物利生之念深矣。至其論陽證見陰脈者死。謂有外陽內陰。若與陽藥猶可生。若及陰陽易分寒熱。陰陽易隨。仲景三經用藥。皆出古人言意之表。學者又不深思而熟味之。嗚呼。世之著書立言者多矣。其甚高難行。泛言無實者亦有之。然則是書之出。其知者必以爲精思妙用。所傳證以古今不可誣也。其不知者則茫然無考。誣以爲怠怠。謂高難行也。予以爲獲一人賞者之知。不將益千百愚人之不知者。則是書可以傳信行世無疑矣。故內翰王君從之。嘗題曰。世所未聞。眞知言哉。比先生過上黨。主吾故人文之。療數陰疾尤奇中。皆書中所可槩見者。文之始亦駭。不敢用。及已試。歎曰。誤人多矣。昔太倉公所上治驗。太史氏列之傳末。近代錢仲陽嘗所治病。閻孝忠記於論證後。今從先生得所書。主治次第。謹編如左方。亦足以證後者之不知者。文之姓宋氏。諱廷圭。長平人。世亦號醫。云歲癸卯冬十一月中澣日。王官麻革信之題。

海藏老人陰證略例總目

伊尹　扁鵲　仲景　叔和　活人　許學士　韓祇和　成無己　潔古老人

岐伯陰陽脈例

問難附　又舉言外意

潔古老人內傷三陰例 治導此下

槟榔丸　煮黃丸　瓜蒂散　備急丸　金鐵丸　枳朮丸

海藏老人內傷三陰例

可溫色脈分三經并藥附

傷在厥陰

當歸四逆湯　當歸四逆加茱萸湯　吳茱萸湯

傷在少陰

通脈四逆湯加減四　四逆湯

陰證略例　例目　一

陰證略例　例目

傷在太陰

理中湯 品藥各從類生　甚三　夜一

問潔勝用丸 問難附

理中湯 加減八

仲景活人許學士改名三藥

伊尹湯液論例

扁鵲仲景例

霧露雨溼山嵐同爲清邪

仲景陰證論例

四逆湯一十一　吳茱萸湯二

當歸四逆湯　通脈四逆湯二

白通湯　白通加猪膽汁湯

真武湯二

小建中湯二

理中丸二　理中湯 藥證

附子湯　桂枝附子湯一

桂枝附子湯

朮附湯

茯苓四逆湯　霍附湯 品

霍亂吐瀉分六經 易老云

霍亂與少陰證寒熱同候

叔和陰脈例 治仲景陰證具藥

沈濇弱弦微　陰毒 六歌

活人陰證例

三陰論　陰毒三陰混說

陰證假陽

陰盛隔陽

陰陽易　分陰陽二　孫兆藥

陰毒甘艸湯 問難　舉仲景六七日不可治何也

附子散　正陽散 二藥無裏佐品

陰證略例　例目　二

霹靂散　陰盛隔陽
火筵散　論下面行藏府不可輕
舉仲景先溫後下不可輕
丹砂丸 品　係陰陽二毒相伏匿
肉桂散 品　回陽丹
返陰丹 品　天雄散
白朮散
諸藥寒佐品
許學士陰證例
陰毒三候
正元散　元陽丹
退陰散　五膠散
玉女散 下血　還陽散
辨少陰緊脈 仲景悉附
破陰丹 品　伏陽一證
仲景許辨二章脈歌
韓祇和溫中例
三陰總論
溫中湯 加減一　橘皮湯 加減二
七物理中丸 加減一　和解因時　寸口脈小
厚朴丸 加減一　白朮湯
橘皮湯 加減一　二苓湯
灰包熨法 品
霜露飲冷寸脈小同候
陽氣下陷躁
陽證下之成陰
熱藥冷服脈內有伏陽 品
海藏陰證例總論

神朮湯 三陰證加減　吹綿
六氣加減
霜露飲冷同爲濁邪　加蔻本木香湯
白朮湯 風溫證 加減四
黃耆湯 總敍陰證初病形狀　調中丸附
問三四日後漸重躁亂不寧何也　理中湯附論陰證躁不躁死生二脈
問下之而脈反大者何也
舉古人論陰證辨
元陽中脫有內外
論宜灸不宜灸
湯沐四肢外接法　臍下六穴
諸言妄語有陰陽
本神孫真人熱藥治血證 三
下血如豚肝
陰陽二絡　證語死脈
自汗分陰陽
手足自汗
四肢振搖
初病形狀附
陰證形狀雜舉 遍身青黑如花脈
傷寒發厥有陰陽
陰證發渴
陰證渴逆
陰證發熱
陰證大便不通
陰證小便不通 舉仲景治人例察來有外接法
得汗出餘氣而解
論狂言若有所失

問有汗而解無汗而解何也　附止陽丹
論脈次第
用附子法
論陰陽易分寒熱
扁鵲治陰陽方
仲景治陰陽方
論陰陽易分三經用藥
活人鰕鼠糞湯 計愼本傳或出久模
竹皮茹湯　　青竹茹湯
當歸白朮湯 治婦人
隨證用藥發明仲景活人
妙香丸 治新病陰陽易證
附 海藏治驗

陰證略例一册，元海藏老人王好古撰，以傷寒陰證較陽證尤難辨，故作專書以發明之，審證用藥，具有條理。前有麻革信之序，考四庫著錄，海藏醫書有醫壘元戎十二卷，此事難知二卷，湯液本草三卷，獨無此書，蓋當時尚未出也。而明人編東垣十書者，亦未見此書，知爲罕覯之秘笈矣。此本前有虞山錢谷遐王藏書一印，又有惠定宇手定本一印，又有孫慶增家藏一印，近爲吾友震澤吳君曉鈺所得，寶色鈔也。好古字進之，趙州人，以進士官本州教授，自金入元，少時與李杲東垣同游張元素潔古之門，而年齒較晚，其後復從學於東垣，故醫壘元戎稱先師潔古老人，又稱東垣李明之先生，而此書廠序但云海藏先生王君進之，家世趙人，早以通經舉進士，晚獨喜言醫，始從東垣李明之，遂傳其所學，册末自題亦云不知何日復得吾東垣李先生一問之，並不及潔古何歟。然書中首列岐伯陰陽脈例，即次以潔古老人內傷三陰例，乃次以海藏老人內傷三陰例，而伊尹、扁鵲、仲景諸例俱編於後，雖不稱先師，而尊師之意已隱然見於言外矣。或有訾其用藥過於溫熱者，不知專論陰證，何可雜入陽證治法，海藏著述具存，豈但能治陰證，不能治陽證者，安得以後人不辨陰陽，偏執詆誤，追咎古人哉。自序題壬辰歲，爲金哀宗天興元年，即蒙古太宗四年，册末自題稱丙申秋，乃蒙古太宗八年，金亡已三年矣，廠序題歲癸卯，則太宗后乃馬真氏稱制之二年也，醫壘元戎成於丁酉歲，在此書後一年，唯此事難知自序題至大元年，則上距金亡已七十餘年，豈海藏享上壽至武宗時猶存耶，抑至大當是至元，刊本之譌耶，并書以俟考。

同治三年歲在甲子秋七月，烏程汪曰楨書於上海寓舍。

陰證略例

元　王好古著

祭神應王文

竊以濟世須博，去疾先藥，論江方海，眩目駭心，人皆於此泥小技作當塗，視大經爲何物，及其臨胗，莫知所措，況夫病者虛實互見，寒熱交分，氣運加臨，脈候不應，苟或毫黍之差，已有雲淵之失，故有者甚而無者生，輕者危而重者斃，天橫殤郊，冤枉恥世，每憐子子之幽魂，誰聽啾啾之夜泣，痛矣如斯，心乎不已，耽嗜數年，真成此集，總前聖之嘉言，爲後學之法則，雖治傷寒，獨專陰例，列古于前，許今于后，區別餘三十條，收拾過二萬字，不必泛天風，徹海波，盡在乎耳目矣，優而柔之，使自得之，厭而飫之，使自趨之，深有望于好生之君子，於戲，欲廣當世，敬以先神，伏冀鑒輝，庶幾緣厥王好古惶恐頓首謹言。

聖賢所言陰證，如岐伯、阿衡、仲景、叔和，故已備矣，活人、許學士、韓祇和、成無己，又甚詳矣，後人尚有采擇未精，覽讀有闕，子所以從而次第之，然今之病者，得之有內外之異，或不與經符，合之有色脈之殊，或不與方契，形候相若，似是而非，衆所共疑，莫之能辨，取其如此者，又從而比類之，非能視螢聽蚋，毫髮未眞也，陰陽寒熱，如辨黑白矣，使醫者不勞聲色，獨去疾病，免橫夭以無辜，皆康寧而得壽，予所願也，每庶淺識，

或有所遺。敬俟來賢。幸爲改正。壬辰歲夏四月初十日。海藏老人古趙王好古序。

岐伯陰陽脈例

內經云。人迎一盛。病在少陽。二盛病在太陽。三盛病在陽明。四盛已上爲格陽。

啓玄子云。陽脈法也。少陽、膽脈也。太陽、膀胱脈也。陽明、胃脈也。靈樞經曰。一盛而躁在手少陽。二盛而躁在手太陽。三盛而躁在手陽明。手少陽、三焦脈。手太陽、小腸脈。手陽明、大腸脈。一盛者。謂人迎之脈大于寸口一倍也。餘盛同法。四倍已上。陽盛之極。故格拒而食不得入也。正理論曰。格則吐逆。

啓玄子云。陰脈法也。厥陰、肝脈也。少陰、腎脈也。太陰、脾脈也。靈樞經曰。一盛而躁在手厥陰。二盛而躁在手少陰。三盛而躁在手太陰。手厥陰、心包脈也。手少陰、心脈也。手太陰、肺脈也。盛法同陽。四倍已上。陰盛之極。故關閉而洩不得通也。正理論曰。關則不得溺。人迎與寸口俱盛四倍已上。爲關格之脈。羸不能極於天地之精氣。則死矣。

樞曰。陰陽俱盛。不得相營。故曰關格。非止吐逆。不得溺而已也。

海藏云。岐伯陰陽二脈。王注爲足經。卻舉靈樞手經何也。

答曰。正經既置五藏之本。又言脾胃、大小二腸、膀胱、三焦爲倉廩之本。營之所居。（論云。三焦者。水穀之道路。故云倉廩。）乃知手足經俱有。故言足經。而次舉靈樞手經也。若躁爲手經。不躁爲足經。此王注雖舉格陽爲吐逆。關陰爲不得溺。皆引正理爲證。以比之。大抵格陽關陰。亦豈止吐逆不得溺而已哉。至于上而不欲食。下而不得便。亦關格之病也。故易老有內傷之陰證。大意亦出于此。靈岐子別有關格一轉。

右此一條。舉古人言外之意。

潔古老人內傷三陰例

論曰。人之生也。由五穀之精氣所化。五味之備。故能生形。經曰。味歸形。若傷于味。亦能損形。今飲食反過其節。腸胃不能勝。氣不及化。故傷爲脾。論曰。飲食自倍。腸胃乃傷。或失四時之調養。故能爲人之病也。經曰。氣口曰坤。口乃脾之候。故脾胃傷。氣口緊盛而傷者。有多少有輕重焉。如氣口一盛。脈得六至。則傷于厥陰。乃傷之輕也。橘樞主之。氣口二盛。脈得七至。則傷于少陰。乃傷之重也。煮黃丸主之。氣口三盛。脈得八九至。則傷于太陰。乃傷之尤重也。故塡塞悶亂。心胸大痛。兀兀欲吐。得吐則已。俗呼爲食迷風是也。經曰。上部有脈。下部無脈。其人當吐。不吐則死。宜吐之以瓜蒂散。如不能。則無治也。經曰。其高者因而越之。其下者引而竭之。如傷之太甚。仲景三物備急丸下之。

海藏云。潔古所論內傷三經。蓋出于內經靈樞岐伯陰脈法。

橘樞丸　治飲食過多。心腹彭脹。

橘樞。一分。　木香。一分。　枳實。半兩。炒。

承牛。瓜蒂。半兩。　陳皮。去白。秤半兩。

右爲極細末。醋糊丸。桐子大。米飲生薑湯下二十丸。

煮黃丸　治前症甚。則兩脇脹脹。

雄黃。一兩。研。　巴豆。半兩。去皮心膜。研如泥。入雄黃再研勻。

右二味。入白麵二兩。同和研勻。滴水丸桐子大。漬漿內十二丸。煮熟。漉入冷漿令沈。每一時辰浸藥冷漿下一丸。凡盡十二時也。不必盡劑。以利爲度。否則再服。又治脇下痃癖痛如神。

瓜蒂散　治大實大滿。氣上衝。上部有脈。下部無脈。塡塞悶亂者。當吐之。

瓜蒂。一分。　赤小豆。一分。

右爲極細末。溫水少許。調一錢匕。以吐爲度。如傷之太重。備急丸下之。此急劑也。經云。其下者引而竭之。此之謂也。

備急丸

乾薑。一兩。生。　大黃。一兩。生。

巴豆。半兩。去心膜。研泥。慢漸瓦去油取霜。

右細末。煉蜜丸。桐子大。溫水下三二丸。無時。以利爲度。以意消息。漸加。

金液丸　治時疾內傷。心下痞。氣不降。米不化。

大黃。一兩。　枳實。半兩。炒。　桔梗。二兩。　牽牛。瓜末。一分。

右細末。蜜糊丸。錠餅亦得。桐子大。溫水下二三十丸。常服減半。內傷。戊火已衰。不能制物。藥太多。固非所宜。故以溫劑主之。

枳朮丸　本仲景湯也。易老改丸。

治老幼虛弱。食不消。藏府奠。

枳實。三分。麩炒黃色。　白朮。一兩。

右細末。荷葉裹燒飯爲丸。或蒸浸錠餅丸亦得。桐子大。米飲下三二十丸。食後。小兒丸小。

海藏云。潔古既有三陰可下之法也。必有三陰可補之法。予欲舉此內傷三陰可補之劑。未見仲景藥時。

人皆不言三陰。既聖仲景藥分而三之。人皆得知有三陰也。古人曷嘗不盡。今人但求之脈而求之知。而不能言耳。

海藏老人內傷三陰例

若飲冷內傷。雖先損胃。未知色脈。各在何經。若面青黑。脈浮沈不一。弦而弱者。傷在厥陰也。若面紅赤。脈浮沈不一。細而微者。傷在少陰也。若面黃潤。脈浮沈不一。緩而遲者。傷在太陰也。若面青或黑。或青黑。俱見脈浮沈不一。弦而弱。傷在厥陰。肝之經也。

當歸四逆湯

當歸。 桂。 芍藥。 細辛。各一兩 通艸。 甘艸。各六錢三字

右剉麻豆大。每秤三錢。水一盞半。棗一二枚。煎至七分。去滓。溫服。

若其人病內有久寒者。宜當歸四逆湯內加吳茱萸生薑湯主之。

當歸四逆湯加吳茱萸生薑湯

當歸。一兩。 桂。一兩。 芍藥。一兩。 細辛。一兩。 大棗。八箇。 甘艸。 通艸。各六錢三字

吳茱萸。七合。湯洗。 生薑。二兩半。

右剉如麻豆大。每服秤三錢。水一盞半。煮至八分。去滓。溫服。日三。仲景法。一劑分五服。酒煎

吳茱萸湯

吳茱萸。一兩半。湯洗三次。 人參。三分。 生薑。一兩半。 大棗。三箇。

右剉如麻豆大。以水二大盞半。煮取七分。去滓。分二服。若急者。陰毒甘艸湯、白朮散、附子散、正陽散、肉桂散、回陽丹、返陰丹、至于陰盛格陽。霹靂散。火餞散。隨經部分選用之。

傷在少陰

若面紅或赤。或紅赤。俱見脈浮沈不一。細而微者。傷在少陰。腎之經也。

通脈四逆湯 又方甘艸炙六錢二字半。

甘艸。二兩。炙。 附子。一兩。生用。去皮破八片。 乾薑。一兩。炮。

面赤者。加連鬚葱白九寸。腹中痛者。去葱白加白芍藥二兩。嘔者。加生薑二兩。咽痛者。去芍藥加桔梗一兩。利止脈不出者。去桔梗加人參二兩。右剉如麻豆大。每服秤三錢。水一盞半。煮至七分。去滓。溫服。未差。若急。更作一劑。其脈續續有力者愈。無力者不愈。

四逆湯 上三味是也。

傷在太陽。

若面黃或潔。或黃潔。俱見脈浮沈不一。緩而遲者。傷在太陰。脾之經也。

理中丸

人參。一兩。腹痛者倍之。 甘艸。炙。 白朮。

乾薑。各一兩。

右細末。煉蜜和丸。雞子黃大。以湯數合。和丸研碎。溫服之。日三夜二。腹中未熱。益至三四丸。煎熱粥飲投之。微溫覆。勿揭衣。丸不及湯。

海藏云。大便結者宜丸。大便溏者宜湯。仲景云。無陽、陰強、大便鞕者不可下。下之則滿穀腹滿。已上三經脈皆云浮沈不一者。以其皆假孤亡之體也。 又云。日三夜二。讀之極無味。然子細思之。利害非輕。恐人不識。故有陰陽寒熱。各從類生一條。

陰陽寒熱各從類生服藥同象

假令附子與大黃合而服之。畫服則陽藥成功多于陰藥。夜服則陰藥成功多于陽藥。是從其類也。況人之疾。獨不然乎。若病陽症。晝則增劇。夜則少寧。若病陰症。晝則少寧。夜則增劇。是人之陰陽寒熱。從天地之行陰行陽也。寒熱之化。以此隨之。故前人治陰證用陽藥。結于夜半之後者。所以却類化之陰。而接身與子所生之陽也。通玄類證云。小建中湯。後亦舉日三夜二。及尺脈不至者加黃耆。

予嘗云。大便溏者宜湯。大便結者宜丸。以丸蜜潤也。仲景治霍亂吐下。脾溏大勝。而用丸何也。答曰。以溏言之。豈有潤之之理。此正溏已太過。津液極亡。所以轉筋也。筋得血而養。故能屈伸下利。既多亡陰失血。反成枯燥。燥則所以不能屈伸也。故溏劑以潤之。只用丸也。與婦人血崩過極不止。而用四物湯潤劑同意。十劑之法。要當謹察。

理中湯

人參。一兩。 乾薑。炮。 甘艸。炙。 白朮。各二兩。

腹痛者。加人參一兩。寒者。加乾薑一兩半。渴欲得水者。加白朮一兩半。臍上築者。腎氣動也。去朮加桂四兩。吐多者。去朮加生薑三兩。下多者。還用朮。悸者。加伏苓二兩。或四肢拘急。腹痛者。或腹滿。下利。轉筋者。去朮加附子一枚。生用。

右剉如麻豆大。每秤三錢。水一盞半。煮至七分。去滓。溫服。日三。

海藏云。理中湯加減八法。並無寒藥。吐利後有裘者。表之。汗出厥者。溫之。既吐且利。小便復利。大汗出。內

寒外熱者亦溫之至于吐下後汗出不解厥逆脈欲絕者四逆主之以是知此候無陽證皆陰證也

仲景人參桂枝湯理中湯加桂枝太陽未除下之成協熱利心下痞裏虛不解者活人此理中湯內加青陳皮名治中湯治胸膈病許學士改活人方作補脾丸治勞則補子如子富而父不貧不特虛則補其母也

已上三證若有外感與內證飲冷極者宜五積散

伊尹湯液論例

海藏曰皇甫先生云仲景廣湯液爲十卷文潞公云仲景爲醫方之祖朱奉議云仲景寫心湯比古湯液則少黃芩後人脫落之許學士亦云伊尹湯液論大柴胡湯八味今監本無大黃只是七味亦爲脫落之也以是知仲景方皆湯液也

四順散、理中湯、四逆湯、通脈四逆湯、甘附湯、薑附湯、真武湯、白通、俱見仲景條下

其餘雜見諸方凡稱仲景者皆是

扁鵲仲景例

生氣通天霧露說在神甘六氣加減後

扁鵲云一呼四至一吸四至病欲甚洪大者煩滿沈細者腹中痛滑者傷熱濇者中霧露

仲景云從霜降以後至春分已前凡有觸冒霜露體中寒邪而病者皆謂之傷寒也

海藏云霜露霧露久雨清溼之氣山嵐障氣等皆謂之清邪也有單衣而感于外者有空腹而感于內者有單衣空腹而內外俱感者所稟輕重不一在人本氣虛實之所得耳豈特內寒飲冷誤服涼藥而獨得陰證哉重而不可治者以其虛人內已伏陰外又感寒內外俱病所以不可治也

仲景陰證例

仲景緊脈俱見許學士條下

又云寸口脈陰陽俱緊者法當清邪中于上焦濁邪中于下焦清邪中于上名曰潔也濁邪中于下名曰渾也陰中于邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中于陰也陽中于邪必發熱頭痛項強頸攣腰痛脛酸所謂中霧露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣爲慄足膝逆冷便溺妄出表氣微虛裏氣微急三焦相涸內外不通上焦怫鬱藏氣相熏口爛食飯也中焦不治胃氣上衝脾氣不轉胃中爲濁榮衛不通血凝不流若衛氣前通者小便赤大便赤黃與熱相搏因熱作使游于經絡出入藏府熱氣所過則爲癰若陰氣前通者陽氣厥微陰無所使客氣內入噦而出之咽嗌塞塞厥相逐爲熱所擁血自下狀如豚肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦不固清便下重令便數難胻腹滿痛命將難痊

吳茱萸湯

食穀欲嘔屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也治上焦 少陰吐利手足厥逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之 厥陰乾嘔吐涎沫者頭痛極甚吳茱萸湯主之

四逆湯

自利不渴者屬太陰以其藏寒故也宜服四逆輩太陰手足自溫脈浮者桂枝湯 脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之屬少陰 飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胃中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯主之 少陰病脈沈者急溫之宜四逆湯 大汗若下利而厥冷者四逆湯主之 大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之 下利腹脹滿身疼痛者先溫裏乃攻表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯 嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治宜四逆湯主之屬厥陰 吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷四逆湯主之 吐利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之 病發熱頭痛身體不疼痛當救裏宜四逆湯主之

通脈四逆湯

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出通脈四逆湯主之 下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之此屬厥陰

當歸四逆湯

手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯主之

白通湯

少陰病下利脈微者白通湯主之

白通加豬膽汁湯

少陰病下利脈微與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加豬膽汁湯主之服湯脈暴出者死微續者生

真武湯

太陽病發汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之 少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沈重疼痛自下利者爲有水氣其人或小便利或下利或嘔者真武湯主之

小建中湯

傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯服之 傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

理中湯

胸脾心下痞鬲氣結胸滿脅下逆氣搶心理中湯主之。 治脾胃不和中寒上衝胸脇逆滿心腹疞痛痰逆惡心或時嘔吐心下痞鬲隔寒不通飲食減少短氣羸瘦溫中逐水止汗去濕。 又治腸胃冷澀泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴及傷寒時氣及裏寒外熱霍亂吐利手足厥冷胸脾心痛逆氣並皆治之。 有寒者加附子胸脾脇下妨悶者加枳實半兩茯苓半兩。 此方自晉宋已後至唐名醫治心腹病者無有不用此湯或作丸隨證加減各有法。

理中丸

霍亂頭痛發熱熱多欲飲水五苓散主之寒多不用水者理中丸主之。 大病差後喜睡久不了了胸中有寒當以丸藥溫之宜理中丸。

桂枝附子湯

傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濇桂枝附子湯主之。

附子湯

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之。 少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沈者。

朮附湯主之。

朮附湯

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濇桂枝附子湯若其人大便堅小便自利朮附湯主之。

甘草附湯

若下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沈微身無大熱者甘草附湯主之。

海藏云若自汗者朮附湯若無汗甘草附湯。

茯苓四逆湯

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之。

易老法霍亂吐瀉 足陽明總攝六經

大抵仲景藥爲主理中湯理中丸五苓散建中湯平胃散四君子湯之類。

假令胃與太陽經併脈浮者于前所用藥內加。

自汗者加桂枝。 無汗者加麻黃以其有頭項肢節痛故也。

假令胃與少陽經併脈弦者于前所用藥內加柴胡乾木瓜以其脅下痛故也。

假令胃與陽明本併脈實者于前所用藥內加大黃以其吐瀉後大小便不通故也。

假令胃與太陰經併脈沈細者于前所用藥內加芍藥乾薑以其腹痛體重故也。

假令胃與少陰本併脈沈遲者于前所用藥內加薑附以其四肢拘攣身寒故也。

假令胃與厥陰本併脈微緩者于前所用藥內加薑附當歸吳茱萸以其四肢厥逆冷故也。 厥陰本藥吳茱萸湯當歸四逆湯皆是。

霍亂與少陰寒熱同候

海藏云霍亂頭痛發熱其邪自風寒而來中焦爲寒熱相半之分邪稍高者居陽分則爲熱熱多欲飲水者五苓散以散之邪稍下者居陰分則爲寒寒多不欲水者理中丸以溫之所以同少陰入裏與手經接爲熱大承氣湯下之與足經接爲寒四逆湯溫之。

叔和陰脈例

海藏云仲景陰脈皆叔和次之藥具見仲景本經條下。

按之似有舉遲無氣滿三焦藏府虛冷氣不調三部塞通腸建胃始能除。

濇脈關前胃氣并當關血散不能停尺部如所逢逆冷體寒臍下作雷鳴。

關前弱脈陽道虛關中有此氣多疏若在尺中陰氣絕痿痹引發上皮眉。

寸口脈緊一條弦胸中急痛狀繩牽關中有弦寒在胃下焦停水滿丹田。

微脈關前氣上侵當關鬱結氣排心尺部見之臍下積身寒飲水即呻吟。

陰毒伤寒身體重背強眼痛不堪任小腹痛急口青黑毒氣衝心轉不禁四肢逆冷唯思吐咽喉不利脈細沈若能速灸臍輪下六日看過見喜深。 臍下五穴並見宜灸條下。

右沈脈。

右濇脈。

右弱脈。

右弦脈。

右微脈。

活人陰脈例

太陰、少陰厥陰皆屬陰證也太陰者、脾也少陰者、腎也厥陰者、肝也。

何謂太陰證太陰脾之經主胸膈膜脈甲乙經云邪生于陽者得之風雨寒暑邪中于陰者得之飲食居處陰陽喜怒又曰賊風虛邪者陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入府陰受之則入藏入六府則身熱不時臥爲喘呼入五藏則膜滿閉塞下爲飧泄久爲腸澼。

何謂少陰證少陰腎之經主脈微細心煩但欲寐或自利而渴經云一二日少陰病者何也謂初中病時湊理塞使入陰經不經三陽也。

傷寒雖是三陰三陽大抵發于陽則太陽也發于陰則少陰也此二經爲表裏其受病最爲多陽明太陰受病頗稀至于少陽厥陰肝膽之經又加少焉凡病一日至十二三日太陽證不能者但治太陽有初得病便見少陰證者直攻少陰亦不必先自巨陽次傳而至。

蓋寒氣入太陽即發熱而惡寒入陰經只惡寒而不發熱也三陰中寒微則理中湯稍厥或中寒下利即乾薑甘草湯。

手足指頭微冷寒謂之濟。[音主聲] 此未消喫四逆蓋疾輕故也。只可服理中乾薑之類。大段重者用四逆湯。無脈者用通脈四逆湯也。

何謂厥陰。厥陰肝之經。主消渴。氣上衝心。中疼熱。飢不欲食。食則吐蚘。下之則利不止也。若陰氣獨盛。陽氣暴絕。則爲陰毒。其證四肢逆冷。臍腹築痛。身如被杖。脈沈緩。或吐利。當急救。可灸臍下。服以辛熱之藥。令陽氣復而大汗解矣。古人云。辛甘發散爲陽。謂桂枝、甘草、乾薑、附子之類。能復其陽氣也。微則用辛甘。甚則用辛苦熱。陰極發躁。陰證似陽也。學者當以脈別之。

問手足逆冷。臍腹築痛。咽喉疼。嘔吐下利。身體如被杖。或冷汗煩渴。脈細欲絕者。何也

此名陰毒也。陰毒之爲病。初得病手足冷。背強咽痛。麻痹不下。毒氣攻心。心腹痛。短氣。四肢厥逆。嘔吐下利。體如被杖。宜服陰毒甘草湯、白朮散、附子散、正陽散、肉桂散、回陽丹、返陰丹、天雄散、正元散、退陰散之類。可選用之。大抵陰毒本因腎氣虛寒。或因冷物傷脾。外傷風寒。內既伏陰。外又感寒。或先外寒而內伏陰。內外皆陰。則陽氣不守。遂發頭痛腰重。腹痛。眼睛疼。身體倦怠。四肢逆冷。額上手背冷汗不止。或多煩渴。精神恍惚。如有所失。三二日間或可起行。不甚劇重。診之則六脈俱沈細而疾。尺部短小。寸口或大。

陽證六脈俱浮大。或沈取之大而不甚疾者。非陰證也。大抵陽毒傷寒。其脈多弦而洪數。陰毒傷寒。其脈沈細而弦疾。不可不知也。

若誤服涼藥。則渴轉甚。躁轉急。有此病證者。更須急服辛熱之藥。一日或二日便安。若陰毒漸深。其候沈重。四肢逆冷。腹痛轉甚。或咽喉不利。心下脹滿結硬。躁渴盧汗不止。

右此一條服涼藥躁渴轉甚。當服熱藥可也。

陽盛則身熱而無汗。陰盛則身冷而有汗。岐伯云。陽勝則身熱。腠理閉。喘鳴。爲之俛仰。汗不出而熱。陰勝則身寒。汗出身常清數。躁而寒。寒則厥。[清即冷也。]

右此岐伯說陰躁之原。

或時鄭聲。指甲面色青黑。六脈沈細而疾。一息七至已來。有此證者。速于氣海或關元二穴。灸三二百壯。以手足溫和爲效。仍兼服正陽散、回陽丹、天雄散、白朮散。內外通。遂令陽氣復而大汗解矣。

陰毒盛而陽氣暴絕。則爲陰毒。若陽獨盛而陰氣暴絕。則爲陽毒。大凡陰陽離絕。非大汗不能復正氣也。

陰陽則夫婦也。各得中則和。若偏勝則各專以權。至于極。糾之以離矣。藥石以攻邪。邪去正復。是猶鞭捶以教而欲並生也。

若陰毒已深。疾勢困重。六脈附骨。取之方有。按之即無。一息八至已上。或不可數。至此則藥餌難爲攻矣。但于臍中用葱熨法。或灼艾三五百壯已來。手足不溫者。不可治也。如手足得溫。更服熱藥以助之。若陰

氣陽氣來。即漸減熱藥而調治之。

若陽氣乍復。往往却煩躁。慎不可投涼藥。煩躁甚者。再與返陰丹。即定。常須識此。勿令誤也。

問胸膈不快。膈滿閉塞。脣青手足冷。脈沈細。少情緒。或腹痛者。何也。

此名太陰也。近人多不識陰證。才見胸膈不快。便投食藥。非其治也。大抵陰證者。由冷物傷脾胃。陰經受之也。主胸膈脹滿。面色及脣皆無色澤。手足逆冷。脈沈細。少情緒。亦不因嗜欲。但內傷冷物。或損動胃氣。遂成陰證。復投巴豆之類。胸膈愈不快。或吐而利。經一二日遂致不救。蓋不知寒中太陰脾之經也。

右膈不快。不可用食藥下之。則成痞。

海藏云。陰證胸膈不快。此無病形也。若投巴豆之藥。即取有形病也。故輕則轉瘧。重則成勞。尤重則一二日遂成不救也。故活人本經云。丸子巴豆。乃攻食積耳。

問。萬一欲食不節。胸膈不快。寒中陰經。何法以治。

答曰。急則理中湯加青陳皮。剉如麻豆大。服一二劑。胸膈即快。枳實理中丸、五積散尤良。

五積散一句。是兼裏也。或元有裏證。或自內而之外。傳至極高之分。則宜是藥。若無裏則不宜用此也。用理中法足矣。

問。脈微細。欲吐不吐。心煩但欲寐。六七日自利而渴者。何也。

此名少陰也。少陰之爲病。欲吐不吐。心煩但欲寐。六七日自利而渴者。虛也。故引水自救。若小便色白者。少陰病形悉具矣。小便色白者。以下焦虛。有寒。不能制水。故令色白也。四逆湯主之。

舉陽證　少陰證口燥舌乾而渴者。須急下之。不可緩也。宜大承氣湯主之。若脈沈而遲者。須溫之。四逆湯主之。蓋以口燥舌乾而渴者。知其熱。脈沈而遲者。別其寒也。

少陰病屬腎。古人謂之腎傷寒也。腎傷寒口燥舌乾而渴。固常急下。大抵腎傷寒亦多裏裏無熱。但若煩悶默而極。不欲見光明。有時腹痛。其脈沈細。舊用四逆湯。古人恐其熱。不敢遽用。云腎病而體猶有熱者。可服黃連龍骨湯。若已十餘日。下利水止。手足微冷。乃無熱候。可服增損四順散。

右此一條。雖有腎病。而體猶有熱一句。亦當以久暫察之。不可乍見便以爲身熱也。

不用四逆用黃連。及手足冷却用四順。亦不甚的當。

舉陽證　少陰病。若惡寒而倦。時時自煩。不欲厚衣者。大柴胡下之。　少陰病始得之。反發熱。脈沈者。麻黃附子細辛湯微汗之。　少陰病得之二三日。常見少陰無陽證者。亦須微發汗。宜麻黃附子甘草湯。此學者不可不知也。

問。身微熱煩躁。面赤。脈沈而微者。何也。

此名陰證似陽也。陰發躁。熱發厥。物極則反也。大率以脈別之爲准。諸數爲熱。諸遲爲寒。無如此最爲驗

也。

右此一句可以爲世法。

假令身體微熱煩躁面赤其脈沈而微者皆陰證也身微熱者裏寒故也煩躁者陰盛故也面赤陽者下虛故也治者不看脈以虛陽煩躁誤以爲實熱反與涼藥則氣消成大病矣外臺秘要云陰盛發躁欲坐井中宜以熱藥治之仲景少陰證面赤者四逆加葱白主之。

右外熱內寒煩躁不可用涼藥。

問身冷脈細沈疾煩躁而不飲水者何也。

此名陰盛格陽也傷寒陰盛格陽者病人身冷脈細沈疾煩躁而不飲者是也若欲引飲者非也不欲飲水者宜服薤白散須臾躁止得睡汗出即差此藥通散寒氣然後熱氣上行汗出乃愈火焰散丹砂丸並主之。

問身體重少氣陰脚入裏腹內絞痛熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花婦人則裏急腰胯連腹內痛者何也。

此名陰陽易也傷寒病新差陰陽氣未和因合房室則令人陰脚入腹絞痛婦人則裏急腰胯連腹痛名爲陰陽易也其男子病新差未平復而婦人與之交接得病名曰陽易其婦人病新差未平復男子與之交接得病名曰陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽相感動甚毒疫着人如換易然其病狀身體熱衝胸頭重不能舉眼中生花四肢拘急小腹絞痛手足拳則背死其亦有不即死者病若小腹裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離經脈緩弱血氣虛背惱煩便翕翕氣力轉小著牀而不能搖動起止仰人或引歲月不死燒揮散、鼠糞湯、竹皮湯、乾薑湯、青竹茹湯、當歸白朮湯、可選用之。

孫兆口談治陰盛隔陽傷寒其人必躁熱不欲飲水者宜服薤白散。

附子一枚燒灰存性爲末蜜水調下爲一服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈。

陰毒甘艸湯

治傷寒時氣初得病一二日便結成陰毒或服藥後六七日已上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強氣短不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沈細而疾仲景云陰毒三候身如被杖咽喉痛五六日可治至七日不可治也。

甘艸炙　升麻　當歸各二分　雄黃一分　蜀椒一分去目　鱉甲一兩半醋炙　桂枝二分

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓服如人行地五里須臾進一服溫覆取汗毒當從汗出汗出即愈若未作再服。

右此一條舉仲景言至七日不可治有別說。

問活人陰毒甘艸湯舉仲景云陰毒三候五六日可治至七日不可治者何也。

答曰假令內傷冷物中焦不和或顯少陰或顯厥陰二脈無定內陰之極陽氣逆而上行至陽明則多錯語至太陽頭復微痛至少陽寒熱間作即非少陽外感正病也然此經雖有寒熱其脾先受之卯酉之間土居其中是通脾脚故如是也內陽之外至此欲竭所以至七日不可治也陰證舌縮者知心火絕也則神去矣又云矢神者亡者陽證舌縮者知少陰無水也外感傳六經當先表而後下內感傳三陰則止治三陰藥內增損加減不復再用涼藥也內陽之外不必次第傳徧三陽但至一經却便至極高之分所以七日不可治也總六經俱盡之意所以不必次第傳徧三陽也。

海藏云惟附子散明注陰毒脣青面黑正陽散明注陰毒面青舌黑二證別無伏陽故藥味皆溫熱辛甘而無苦寒也。

附子散　治陰毒傷寒脣青面黑身背強四肢冷。

附子三分炮裂去皮脚　桂心半兩　當歸半兩剉炒　半夏一分湯洗

乾薑一分炮　白朮半兩

右件爲細末每服二三錢水一中盞生薑半錢煎至六分去滓不計時候熱服衣覆取汗如人行地十里未汗再服。

正陽散　治陰毒傷寒面青張口氣出心下鞕身不熱只額上有汗煩渴不止舌黑多睡四肢俱冷

附子一枚生用去皮脚　皁莢一挺醋炙去皮弦子　乾薑一分

甘艸一分炙　麝香一錢別研

右細末每服一錢水一中盞煎至五分不計時候和滓熱服。

藜蘆散　治陰盛隔陽煩躁不飲水。

附子一枚半兩者炮熟取出用冷灰妨之細研入真龍腦茶一大錢和勻

分作二服水一盞煎至六分臨熟入蜜半匙放溫或冷服之須臾躁止得睡汗出即差。

火焰散　治傷寒惡候。

船上硫黃　附子去皮生用　新腦茶各一兩

右爲細末先將好酒一升調藥分大新椀口中于火上攪蕩令乾合于瓦上每一椀下燒艾熟一拳大以瓦揩起無令火著直至煙盡冷即刮取却細研入藥合器每服二錢酒一盞共煎七分有火焰起勿

餅。傷寒陰毒者。四肢冷。脈沈細。或吐或瀉。五心躁煩。胸中結鞕。或轉作伏陽在內。湯水不下。或無脈。先喫一服。如吐。却更進一服。服後心中熱。其病已差。下至藏府。中裡未解者。渾身壯熱。脈氣洪大。宜用發裏藥。或表解者。更不發熱。便得眠睡。渾身有汗。方可用下胸膈行藏府藥。漸用調和脾胃補治元氣湯散。如服此藥三二服不應者。不可治也。

海藏云。裏後既解。不發熱。得睡。身有汗。方可用下藏府藥。此一句利害非輕。若稍少有痞結。亦當求脈之虛實。而下膈行藏府。脈實則可。脈虛只宜和脾胃補元氣。下文云。二藥不應。猶不可治。可以妄下行藏府乎。用者宜詳。

仲景。傷寒脈浮。自汗出。小便數。心煩微寒。腳攣急。與桂枝湯。欲攻表。誤也。得之便厥。咽中乾。燥煩吐逆。作甘艸乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈足溫者。更作芍藥甘艸湯與之。其攣即伸。若胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。

右此一條。先溫後下。不可輕用。內別有消息。

丹砂丸　治傷寒陰陽二毒相伏危惡形證。

舶上硫黃。　水銀。　太陰石。　太陽石。　元精石。各一兩。　硝石。半兩。

右件藥末。先用無油銚子。以文武火炒。下諸藥末。令勻如灰色。研細如粉麪。生薑自然汁浸。作餅丸。菉豆大。每服五丸。龍腦、牛黃、生薑、蜜水下。壓躁也。若陽毒湯下。陰毒桂湯下。慎不得于屋底炒。

海藏云。此丸爲陰陽二毒相伏匿。故用腦子牛黃蜜水調下。若明見只是陰證。別無伏陽。不宜用此下之。若有伏陽。當以仲景翕奄沈脈法實之。在許學士破陰丹條下。　叔和云。短脈陰中有伏陽。

肉桂散　治傷寒服冷藥過度。心腹脹滿。四肢逆冷。居沈不識人。變爲陰毒惡證。

肉桂。三分。　赤芍藥。一兩。　陳皮。一兩。　前胡。一兩。

附子。一兩。炮。　當歸。一兩。　白朮。三分。　吳茱萸。半兩。洗。炒。

木香。三分。　厚朴。三分。製。　良薑。三分。　人參。一兩。

右麤末。每服五錢。水一中盞。棗三枚。煎至六分。去滓。不拘時候。稍熱服。

右此一條。以其先是陽證。爲服涼藥過多。變爲陰毒。故內有前胡一味。知少陽不止。乃用藥之過也。

與寫心湯加附子相似。

回陽丹　治陰毒傷寒。面青。手足逆冷。心腹氣脹。脈沈細。

硫黃。半兩。研。　木香。半兩。　蓽澄茄。半兩。　附子。半兩。製。

乾薑。一分。　乾蝎。半兩。炒。　吳茱萸。半兩。洗。炒。

右細末。酒煮糊爲丸。桐子大。每服三十丸。生薑湯下。頻服。復以熱酒一盞投之。以衣蓋取汗。

返陰丹　治陰毒傷寒。心神煩躁。頭痛。四肢逆冷。

硫黃。三兩。　太陰玄精石。　消石。各二兩。

附子。半兩。炮。　乾薑。半兩。　桂心。半兩。

右件藥。用生鐵銚鋪玄精石末一半。次鋪消石一半。中間下硫黃末。著消石蓋硫黃。都以玄精蓋上訖。用小盞合著。以三片紙來。燒令得所。勿令煙出。直俟冷取出。細研如粉。後三味搗羅爲末。與前藥同研令勻。煉蜜和丸。桐子大。每服十五丸。艾湯下。頻服。汗出爲度。重則加三十丸。此方甚驗。喘促吐逆者。入口便止。

右此一條。與丹砂丸中藥味相似。當從陰陽二毒相伏匿法用之。

天雄散　治陰毒傷寒。身重百強。腹中疞痛。咽喉不利。毒氣攻心。心下堅強。短氣嘔逆。脣背面黑。四肢厥逆。其脈沈細而疾。

天雄。一兩。炮。去皮臍。　麻黃。半兩。去根節。　當歸。半兩。　白朮。半兩。

肉桂。一兩。　川椒。一分。去目。炒。　生薑。三錢。　厚朴。一兩。去皮薑製。　半夏。半兩。洗。

陳皮。一錢。去白。

右麤末。每服五錢。水一盞。入生薑半錢。棗三枚。煎至五分。去滓。無時。稍熱服。如人行十里。未汗再服。

白朮散　治陰毒傷寒。心間煩躁。四肢逆冷。

川烏頭。一兩。丸。去皮臍。　桔梗。一兩。　附子。一兩。炮。　白朮。一兩。

細辛。一兩。去苗。　乾薑。半兩。炮。

右細末。每服一錢。水一中盞。煎至六分。稍熱服。和滓。無時。

海藏云。仲景白通湯、通脈四逆湯用猪膽汁苦寒。入鹹鹹寒。成無己云。所以去格拒之寒也。孫兆薛輩散用蜜水。活人薛輩散用火焰散用臘茶。返陰丹用消石。許學士正元散用大黃。此數法與白通湯、通脈四逆湯用猪膽汁、人溺同意。皆所以去格拒之寒氣也。已上諸熱藥。或用麻黃。或用升麻。或用前胡。皆所以隨經而用之也。明湯液善加減者。要當識此。

許學士陰脈例

始得陰毒候　陰毒本因腎氣虛寒。因慾事或食冷物。而後傷風。內既伏陰。外又傷寒。或先或外寒而後伏陰。內外皆陰。則陽氣不守。遂發頭痛腰重。眼睛疼。身惓惓怠而甚熱。四肢厥逆冷。額上及手背冷汗不止。或多煩渴。精神恍惚。如有所失。三二日間。或可起行。不甚勞重。診之則六脈沈細而疾。尺部短小。寸口或大。六脈似浮大。或沈取之大。間不甚疾者。非陰證也。若服涼藥。則渴轉甚。躁轉急。有此病證者。急服溫陽退陰之藥。即安。惟補虛和

氣而已。宜服正元散、退陰散、五勝散、陰證不宜發汗。如氣正脈大。身熱而未差。用藥發汗無妨。

陰毒漸深候　或寸口小而尺脈微大亦同。積陰感于下。則微陽消于上。故其候沈重。四肢逆冷。腹痛轉甚。或咽喉不利。或心下脹滿。結糞躁渴。虛汗不止。或時狂言。爪甲面色青黑。六脈沈細而一息七至以來。有此證者。速宜于氣海或關元二穴灸三二百壯。以手足和煖爲效。仍服金液丹、來復丹、玉女散、遊陽散、退陰散之類。隨證選用之。

陰毒沈困候　沈困之候。與前漸深之候皆同。而更加困重。六脈附骨取之方有。按之即無。一息八至以上。或不可數。至此則藥餌難爲功矣。但于臍中灼艾半壯大三二百壯以來。手足不和煖。不可治也。偶復和煖。則以硫黃及熱藥助之。若陰氣散。陽氣來。漸減熱藥而和治之。以取差也。

正元散　治傷寒始覺吹凍著四肢頭目。百節疼痛。急煎此服。如人行五里再服。或連三服。汗出立差。若患陰毒傷寒。入退陰散半錢同煎。或傷冷傷食。頭昏氣滿。及心腹諸疾。服之無有不效。

麻黃。　陳皮。　大黃。　甘艸。　乾薑。
肉桂。　白芍藥。　附子。　半夏。　吳茱萸。　已上皆可製者製之。各等分。

右麻黃加一半。茱萸減一半。同爲末。每服一大錢。水一盞。生薑五片。棗一枚。煎至七分。熱呷出汗。以衣被覆蓋。汗出候乾。解去衣。如是陰毒。不可用麻黃出汗。

元陽丹

烏頭乾薑等分。並生用。酒麵糊丸。桐子大。每用十丸。生薑湯下。食前。治氣痛。亦治陰毒。

退陰散　治陰毒傷寒。手足逆冷。脈沈細。頭痛腰重。連三服。小小傷冷。每服一字。入正元散同煎。入鹽一捻。陰毒證款逆。煎一服。細細熱呷之。便止。

川烏頭。　乾薑等分。

右爲麤末。炒令轉色。放冷。爲細末。每服一錢。水一盞。鹽一捻。煎半盞。去滓。溫服。

五勝散　治傷寒頭痛壯熱。骨節疼痛。昏沈困倦。欬嗽鼻塞。不思飲食。兼治傷寒夾冷氣。慢陰毒。

甘艸。　五味子。　石膏各一兩。　乾薑三兩半。　白朮一兩半。

右爲末。每服二錢。水一盞。入鹽少許。煎七分。通口服。如冷氣相夾。入薑棗煎。若治陰毒。入艾葉少許同煎。

玉女散　治陰毒。氣攻上腹痛。四肢逆冷惡候。

川烏頭。去皮臍。　冷水浸七日後。海切曝乾。紙袋盛。遇有患者。取爲細末一大錢。鹽一小錢。水一盞半。煎至七分。通口服。壓下陰毒。所便後如猪血相似。未已、良久再服之。

遊陽散　治陰毒面色青。四肢逆冷。心躁腹痛。

硫黃爲末。右用新汲水調二錢。良久。或寒一起。或熱一起。但看緊慢。汗出差。

辨少陰緊脈證

有人患傷寒六七日。心煩昏睡。多吐。小便白色。自汗。予診之。寸口尺中俱緊。予曰。寒中少陰之經。是以脈緊。仲景云。病人脈緊而汗出者。亡陽也。屬少陰。法當咽痛而復下利。蓋謂此也。或曰。脈緊屬七表。仲景緊脈屬少陰。緊脈屬陽邪屬陰邪。予曰。仲景脈寸口俱緊者。清邪中于上。濁邪中于下。焦。又云。陰陽俱緊者。口中氣出。唇口乾燥。倦臥足冷。鼻中涕出。舌上滑胎。勿妄治也。又云。緊則爲寒。又云。諸緊爲寒。又云。或難曰。緊脈從何而來。師曰。假令已汗。若吐。以肺裏寒。故令脈緊。假令欲平。飲冷水。故令脈緊。假令下利。胃虛。故令脈緊。又曰。寸口脈微。(尺脈微)尺脈緊。其人虛損多汗。由是觀之。則是寒邪之氣入人經絡所致。皆虛寒之脈也。其在陽經則浮而緊。在陰經則沈而緊。故仲景云。浮緊者、名爲傷寒。又曰。陽明脈浮而緊者。必潮熱。此在陽則浮而緊也。在陰則沈而緊。故仲景云。寸口脈微。尺脈緊。至七八日自下利。脈暴微。手足反溫。脈緊反出去者。此欲解也。此在陰則沈而緊也。仲景云。浮爲在表。沈爲在裏。數爲在府。遲爲在藏。欲知表裏藏府。先以浮沈遲數爲定。然後兼于脈而別陰陽也。故論傷寒。當以仲景脈法爲準。傷寒之必本仲景。猶兵家之必本孫吳也。舍是而之他者。是猶舍規矩而求方圓。舍律呂而正五音可乎。

活人丹砂丸　論陰陽二毒相伏。破陰只是伏陽一脈。陰中伏陽脈。即翕奄沈也。

破陰丹

硫黃。　水銀各一兩。　青皮。　陳皮各半兩。爲末。

右將硫黃銚子內鎔。次下水銀。用鐵杖打勻。令無星。傾入濃茶蜜內。研細。入末二味勻。研。用厚麪糊丸。桐子大。每服三十丸。如煩躁冷。鹽湯下。陰證冷。艾湯下。此一條與楊氏五神丹相若。

此證六脈沈不見。深按至骨。則弱緊有力。頭疼身濕。煩躁指不甚冷。中滿惡心。尋多不識。學士脈曰。此陰中伏陽也。脈之當考。學士却云。仲景無此證。非無此證也。用熱藥則陰邪隔絕。反生客熱。用寒藥則陽氣鎖鑰。愈益毒氣。必須散陰導火之劑。便火出水平。上下升降。大汗而解。或嘔煩不寧。勿驚可也。活人例後亦前賢諸去格拒之寒。大熱藥中。佐以人溺膽汁茶蜜鹽之類。雖各隨經。大抵與學士破陰導陽之意同。吾是以知仲景有此證也。但言簡而意有餘矣。明者當識。

有人初得病。四肢逆冷。臍下築痛。身疼如被杖。蓋陰證也。急服金液破陰等丹。其脈遂沈而滑。沈者陰也。滑者陽也。病雖陰而見陽脈。有可生之理。仲景所謂陰病見陽脈者生也。仍灸氣海丹田百壯。手足溫陽回。得汗而解。或問滑脈之狀。如何便有生理。予曰。仲景云。翕奄沈。曰何謂也。沈爲純陰。翕爲正陽。陰陽和合。故名曰滑。古人論滑脈。雖云往來前却。流利展轉。替替然與數相似。仲景三語而盡也。此三字極難曉會。然翕合也。言張而復合也。故曰翕爲正陽。沈言忽降而下也。故曰沈爲正陰。方翕而合。俄降而下。奄謂

46

疵忽之間。仲景論滑脈。可謂歸當矣。其言皆有法。故讀者極難曉會。

浮大數動滑陽脈。　陰病見陽生可得。
沈濇弦微弱屬陰。　陽病見陰終死厄。
陰陽交互最難明。　輕重攝提當別白。
輕手脈微爲在表。　表實浮而數有力。
但浮無力表中虛。　自汗惡風常淅淅。
重手脈沈爲在裏。　裏實脈沈爲亦實。
重手無力大而虛。　此是裏虛理審的。
風則虛浮寒牢堅。　水停水濇必沈潛。
動則爲痛數爲熱。　支飲應須脈急弦。
太過之脈爲可見。　不及之脈亦如然。
榮衛太甚名高章。　高章相搏名曰綱。
榮衛微時名卑慄。　卑慄相搏名指陽。
榮衛既和名緩遲。　緩遲名沈此最良。
九種脈中辨疾證。　長沙之脈妙難量。
陽結藹藹如車蓋。　陰結循竿亦象之。
陽盛則促來一止。　陰盛則結緩而遲。
縱橫逆順宜審察。　殘賊災怪要須知。
右手氣口當主氣。　主血人迎在其位。
氣口緊盛傷于食。　人迎緊盛風邪熾。
數爲在府遲爲藏。　浮爲在表沈爲裏。
脈浮而緩風傷榮。　浮堅濇堅寒傷衛。
脈微大忌令人吐。　欲下須防虛且細。
沈爲氣弱汗爲難。　三者須要當審記。
陽加于陰有汗證。　左手沈微卻應未。
趺陽胃脈定死生。　太谿腎脈爲根蔕。
脈來六至或七至。　邪氣漸深須用意。
浮大盡加病屬陽。　沈細夜加分陰位。

28

九至以上來短促。　狀若湧泉無入氣。
更加懸絕漸無根。　命絕天眞當死矣。
病人三部脈調勻。　大小浮沈遲速類。
此是陰陽氣已和。　勿藥自然應有喜。
學士脈歌一篇。卽仲景評辨二章也。要當識之。

韓祗和溫中例

夫傷寒病之說。始自黃帝。已開其端。至仲景方陳其條目。後世膚淺之學。莫知其數。立言者只云病在表可發汗。病在裏可下之。或云不可汗。或云不可下。卽未嘗有溫中之說。仲景傷寒例云。尺寸俱沈細。太陰受病也。尺寸俱沈。少陰受病也。尺寸俱微緩。厥陰受病也。又辨太陰證云。太陰病脈浮。可發汗。宜桂枝湯。又手足溫。自利不渴。宜四逆湯。又腹滿時痛。桂枝加芍藥湯。辨少陰證云。少陰證始得之。發熱脈沈。麻黃細辛附子湯。又少陰病二三日。麻黃附子甘艸湯。又少陰病身體疼痛。手足寒。骨節痛。脈沈。附子湯。又厥陰病吐利。手足逆冷。煩躁欲死。吳茱萸湯。又少陰病脈沈急。溫之宜四逆湯。今舉仲景論中數條。最是治三陰病之良法。今世之用。尚有未盡證者。恐嘗校自至和初歲。迄于今三十餘年。不以歲之太過不及爲則。每至夏至以前。有病傷寒人十中七八。兩手脈俱沈細數。多是胸膈滿悶。或嘔逆。或氣塞。或腹鳴。或腹痛。與仲景三陰病說。脈理同而證不同。因茲不敢妄投仲景三陰藥。才見脈沈及胸膈滿。便投下藥下之。往往不救。嘗斟酌仲景理中丸與服之。其病勢輕者。卽胸中便快。其病勢重者。半日許滿悶依然。或有病人脈沈細遲。投仲景四逆湯溫之。多藥力太熱。後必發煩躁。因校量此形證。今別立方以治之。得多對證之藥。不可不傳焉。

右此一條。非四逆熱而不當也。仲景當漢之末。韓氏當宋之隆。時世異也。

病人但兩手脈沈細數。或有力。或無力。或關脈短及力小。胸膈塞悶。氣短不能相接者。便可隨脈證投溫中藥以治之。　此一法甚活。

病人兩手脈沈遲。或緩或緊。皆是胃中寒也。若寸脈短及力小于關尺者。此陰盛陽虛也。或胸膈隔悶。腹中脹滿。身體拘急者。手足逆冷。急宜溫之。

若立春以後至清明以前。宜溫中湯主之。清明以後至芒種以前。宜橘皮湯主之。芒種以後至立秋以前。宜七物理中丸主之。此皆隨時也。

溫中湯

丁皮。一兩。　乾薑。三錢。　白朮。三錢。　陳皮。三錢。
丁香。三兩。　厚朴。一錢。要製。

右爲末。每服二錢。水一盞。葱白三寸。荊芥五穗。煎至七分。去滓。熱服。三服未快。手足尙逆。嘔吐。更加柏上丁皮三錢。乾薑三錢。炮用。

橘皮湯

陳皮一兩。　藿香三錢。　白朮三錢。　葛根三錢。　厚朴一兩。製

右爲末。每服二錢。水一盞。生薑一塊。拍大破。同煎至七分。去滓。熱服。三五服後。脈未有力。寸脈尙小。加半夏三錢。丁香枝杖半兩。每服加葱白三寸。煎服。

七物理中丸

白朮三錢。　乾生薑一錢。　人參三錢。　桔梗三錢。　葛根三錢。　藿香葉二錢。

右細末。煉蜜爲丸。彈子大。每服一丸。水一盞。煎至七分。和滓熱服。如三服未快。手足尙逆。嘔者。加半夏二錢。乾薑二錢。炮。

病人兩手脈沈細無力。雖三部脈力停。亦是陰氣盛也。更不須候寸脈短治之。或胸脅滿悶。身體拘急疼痛。手足逆冷。速宜溫中藥和之。

右此一條。不須候寸脈短一句。然當不若曰三部既沈。便是無寸口也。若立春以後至淸明以前。宜厚朴丸主之。淸明以後至芒種以前。宜白朮湯主之。芒種以後至立秋以前。宜橘皮湯主之。

右此一條。李思訓舉和解因時一說。與韓氏相似。然湯液仲景四時之法。固以備矣。以其後人不識。故韓李爲是丁寧也。此亦大槩耳。若應見逆時。只可隨應見而治之。

海藏云。仲景既言春爲溫病。夏爲熱病。長夏爲大熱病。隨經之藥。加減輕重。便爲因時和解也。正治應見。便是活法。韓李因時定藥。是則然矣。證復逆時。定藥難用。若用定藥。却是不因時也。假令立春淸明。芒種立秋。卽歲之主氣也。定時也。若歲之客氣。司天在泉。太過不及。勝復淫至。而不至。未至而至。豈可定時爲則邪。主氣爲病。則只論主氣。客氣爲病。則只論客氣。主客相勝。上下相召。有萬不同之變。人之稟受虛實。亦猶是也。以此言之。則仲景大經之言盡矣。但患世之醫者不知耳。此亞聖言簡而意有餘也。後之賢者。辭多而意少。務救一時之弊云。此韓李爲是因時一說也。是說也。又爲庸醫執方療病者設。非敢爲仲景別立一法也。噫。二公雖不足爲漢之仲景。亦足以爲今之仲景也。

厚朴丸

當歸半兩。　丁香枝杖半兩。　厚朴一兩。薑製。　細辛一錢。

人參三錢。　甘艸半兩。炙。　乾薑半兩。炮。

右爲末。煉蜜爲丸。彈子大。每服一丸。水一盞。煎至六分。和滓熱服。三服後。脈尙細。及寸脈尙細無力。每服加葱白三寸。同煎服。

此一條言寸脈小者。陽不及九天也。加葱以通經。

白朮湯

白朮。　半夏。　當歸。　厚朴。製。　乾生薑。以上各半兩。　丁香三錢。

右爲末。每服三錢。水一盞。生薑一棗大。打破。同煎至七分。去滓。熱服。三五服後。脈未有力。寸脈尙小。加細辛半兩。每服加葱白三寸。同煎服之。寸口小加細辛。散陰升陽。

橘皮湯

橘葉半兩。　藿香三錢。　葛根三錢。　半夏半兩。　厚朴一兩。薑製。

右爲末。每服三錢。水一盞。生薑一如棗大。同煎至七分。去滓熱服。三五服後。脈尙小。手足逆冷。加細辛三錢。

病人胸膈滿悶。時時嘔逆。肢節疼。兩脅下痛。腹中鳴。此是有停飲。宜二苓湯。

二苓湯

赤茯苓。　木猪苓。　白朮各半兩。　滑石一兩。　通艸一錢。

白豆蔻一錢。　丁皮三錢。　陳皮三錢。　桂枝半兩。

右爲末。每服三錢。水一盞。煎至七分。去滓熱服。小便未快。加燈心三錢。嘔未止。加半夏半兩。淅淅惡寒。甚。每服加葱白三寸。

右此一條。與李思訓調小便例同。

灰包熨法

病人服前藥。胸膈不滿悶者。此上焦有陽也。或藥力太過。上焦有熱。腹滿虛鳴。時時疼痛。此是被陽藥消逐。得上焦陰氣併入下焦也。雖是下焦積塞冷。上焦陽盛。更難投溫下焦藥也。當用灰包法。炭灰或桑柴灰二三升。許入好醋拌和。乾溼得所。銚內炒令灰熱。以帛包裹。置臍下熨之。頻換灰包。令常熱。以服不滿痛爲度。或初熨時。病人不受者。勿聽。但令極熨之。不住灰包可也。如灰包熨後。得下利一兩行。或小便二三升。或微似有汗。此是陰氣外出。或下泄也。勿疑之。病輕者乃得愈也。　後出餘氣而解。舉此爲例。

病人三部脈沈。寸脈力小于關尺。此爲陰盛。當投溫中藥以消陰氣。溫中藥者。厚朴湯、陳皮、人參、白朮、藿香、當歸、乾薑、細辛之類是也。

海藏云。霜露山嵐。雨溼霧露之氣。與飲冷。寸口脈小。同診一法。神朮湯後舉此。韓氏三部脈沈。寸口小于關尺。爲證一體。

病人若因服下藥太過。兩手脈沈細數。肢體逆冷。煩躁而渴者。此是陽氣下陷入丹田。陰氣厥逆滿上二

焦。故令人躁。此名下陰躁也。醫者見病人煩躁。又不詢其端由。亦不辨其脈理。便用涼藥治之。涼藥既下。病勢愈甚。至于困極。不救者多矣。

病人因下之太過。兩手脈沈遲細而無力。或傷身及四肢逆冷。煩躁而渴。或引飲不休。好泥水中臥者。須用性熱藥治之。凡投性熱藥。皆須冷服。何故如是。今謂病人腹中陰氣太盛。若投渴劑。即陰陽相擊。藥下即吐。須候湯劑極冷。即投之。投之不吐者。蓋腹中陰氣與冷飲相逢。即同氣相從爾。故藥下不吐也。藥雖冷。久則必熱。所謂始同而終異也。故醇酒冷飲。久即發熱。假令投仲景四逆湯之類。一依前說。若病人不煩躁。即熱藥可溫服之。下後躁渴。引飲不休。與傷冷只好飲冷同意。

右此一條。本是陽證下之成陰。非陽氣上行而躁。乃陽氣下陷而躁。即同伏陰脈也。叔和云。短脈陰中有伏陽。

海藏云。熱藥冷服。內有伏陽則可。若脈已虛。按之全無力。或病人素無所養。只可溫服。不然陰氣必不能釀回陽。利害非輕。

海藏老人陰證例總論

神朮湯　治內傷飲冷。外感寒邪無汗者。

蒼朮（三兩）　防風（三兩）　甘草（炙一兩）

右㕮咀。生薑水煎。加葱白三寸。治吹嚩如神。調六一三錢。

太陽證發熱惡寒。脈浮而緊者。加羌活。

太陽證脈浮緊中帶弦數者。是有少陽也。加柴胡。弦爲弦而有力。

太陽證脈浮緊中帶洪者。是有陽明也。加黃芩。已上三錢。約量每服加二錢七。不論三陽。婦人服者。加當歸尤佳。

神朮湯六氣加減例

太陽寒水司天。加　桂枝、　羌活。

陽明燥金司天。加　白芷、　升麻。

少陽相火司天。加　黃芩、　地黃。

太陰濕土司天。加　白朮、　藁本。

少陰君火司天。加　細辛、　獨活。

厥陰風木司天。加　川芎、　防風。

上神朮湯六氣加減法。非止爲司天之氣設也。至于歲之生氣。與月建日時。間前應見者。皆當隨所應見。依上例而加減之。

日華子云。滑石治乳難。利津液。生氣通天云。平旦人氣生。日中而陽氣隆。日西而陽氣已虛。氣門乃閉。是故萬而收拒。無擾筋骨。無見霧露。反此三時。形乃困薄。

王氏云。陽氣出則出。陽氣藏則藏。晚陽氣衰。內行陰分。故宜收斂以拒虛邪。勞筋骨則逆陽精耗。見霧露則寒溼交侵。順此三時。乃天眞久遠。

扁鵲云。脈一呼一吸皆四至。而濇者。邪中霧露之氣。仲景云。清邪中于上焦。又云霜降已後。春分已前。中霧露者。皆爲傷寒。

神朮加蒼本湯　每服內加二錢七。以意消息。

神朮加木香湯　每服內加二錢七。以意消息。

問病人中新霧山風雨溼之氣。頭項身體不甚痛。但四肢沈困。飲食減少。或食已痞悶。寸脈微小。與內傷飲冷相似何也。

答曰。此脣槳少有。貧素氣弱之人多有之。以其內陰已伏。或空腹晨行。或語言太過。口鼻氣消。陰氣復加。所以成病。經云。天之邪氣感則害人五藏。雖不飲冷。寸口亦小。又云。傷于溼者。下先受之。故從內感而求其類也。仲景云。濁氣中于下焦。以此。

論霧露飲冷同爲濁邪

經云。清邪中于上焦。濁邪中于下焦。均霧露也。故寸口小。內傷飲冷。寸口亦小。霧露入腹。雖不飲冷。與飲冷同。內傷飲冷。雖非霧露。與霧露同。何哉。脈皆陰而寸口小耳。此蓋岐子復斷濁邪中于下爲飲冷同傷也。韓氏言寸口脈微而小。即不可下。則陰盛陽氣不能升于九天可知矣。

白朮湯　治內傷冷物。外感風邪有汗者。

白朮（二兩）　防風（二兩）　甘草（炙一兩）

右㕮咀。每服秤三錢。水一盞。生薑三片。同煎至七分。去滓溫服。無時。一日止一二服。待二三日。漸漸汗少爲解。活人防風白朮牡蠣湯當在此下。

風溼證面赤自汗。嘿嘿不欲語。但欲寐。兩手脈浮而緩。或微弱。此證不宜發汗。若汗之。以令人筋惕肉瞤。或譫言獨語。或煩躁不眠。若下之。直視失溲。便若火之發狂似癲狂。一逆尚引日。再逆促命期。活人本方威蕤湯以有麻黃。故不敢用。宜用上白朮湯主之。

頭眩汗出。筋惕肉瞤者。加牡蠣。

腰背強直者加　羌活。

舌乾發渴者加　人參。

身灼熱甚者加　知母。　若內傷冷者不加。

體重多汗者加　黃耆。

黃耆湯　治傷寒內感拘急三焦氣虛自汗。及手足自汗。或手背偏多。或肢體振搖。腰腿沈重。面赤目紅。但欲眠睡。頭面壯熱。兩脅熱甚。手足自溫。兩手心熱。白利不渴。大便或難。或如常度。或口乾咽燥。或渴欲飲湯。不欲飲水。或少欲飲水。嘔噦間作。或心下滿悶。腹中疼痛。或時喜笑。或時悲哭。或時太息。去聲或語言錯亂失志。世疑作譫語狂言者非也。神不守室耳。始得病。寤寐之間。或恐或悸。頭項不甚痛。行步只如舊。陰氣盛。陽氣走也。兩手脈浮沈不一。或左右往來無定。便有沈濇弱弦微五類陰脈形狀。舉按全無力。浮之損小。沈之亦損小。皆陰脈也。宜先緩而後急。緩宜黃耆湯。

人參。　黃耆。炙甘者。　白茯苓。　白芍藥。已上各一兩。　甘艸。七錢半。炙

嘔吐者加藿香半兩。生薑半兩。如無乾者代之。

右㕮咀。生薑水煎。量證大小加減多少用之可也。如大便結者。宜調中丸主之。

調中丸

白朮。　白茯苓。去皮。　乾生薑。　人參。　甘艸。炙。

右等分爲極細末。煉蜜丸。每兩作十丸。或五丸。每服一二丸。水少許煎服之。

問三四日後漸重。必躁亂不寧者何也。

經云。陽盛則發厥。陰盛則發躁。物極則反也。外臺秘要云。陰盛發躁。名曰陰躁。欲坐井中。然陰躁一證。汗下後多有之。仲景云。汗下後仍不解煩躁者。茯苓四逆湯主之。內感陰證。飲冷胃寒而躁者。與汗下後煩躁同。厥陰熱上衝胸而發躁者。火獨炎上故也。

若病重急治者。宜黃耆湯內。每服加乾薑重一錢。與仲景理中湯同意。大便結者。理中丸主之。

理中丸

人參。　白朮。　甘艸。炙。　乾薑。炮。急熱。以乾生薑代之。

右等分。煉蜜丸。每兩作五丸。白湯化下。水煎服之亦得。　緩後失治。急也。

尤急者。若無汗宜附子乾薑甘草湯。若白汗者。宜附子白朮甘艸湯。量脈證可宜四逆湯。眞武湯。通脈四逆湯等。宜選用治之。至于用附子。不得已也。若身與四肢俱熱。不至于涼。或厥逆不宜用附子。故理中有四順。理中湯丸之名四順者。手足自溫。不厥逆是也。

急則失治。尤急也。

論陰躁不躁死生二脈。

陰證陽從內消。服溫熱藥。煩躁極甚。發渴欲飲。是將汗也。人不識此。反以爲熱證矣。熱上衝胸。服溫熱藥。煩躁少寧。反不欲飲。中得和也。人若識此。續湯不已愈矣。一則始病不躁。藥而躁。脈當浮之實大。陽氣充也。手足溫和則生。若浮之損小。陽氣走也。手足厥逆則死。一則始病躁。藥而不躁。脈沈之實大。陽氣回也。手足溫和則生。沈之損小。陽氣消也。手足厥逆則死。二證服溫熱藥。陽氣不能充與不能回者。經云實其無火也。

問下之。而其脈反大者。何也。

答云。下之而脈小者。理所當然。小猶可生。生之則易。仲景云。下之而脈反大者。虛也。陽將走而變。譬若不識而復下之。則氣消而成大陰矣。亦有陰躁發熱不止。大渴欲飲冷。熱上衝胸。火獨炎上。亦將盡也。以陰偏身皆寒。惟存胸中火。陰獨持權。不相管轄。迫而至此。與下之而脈大同意。下之脈大。別不見熱證。陰躁發熱。但脈小耳。一則見脈不見證。一則見證不見脈。又經云。下利脈大者虛也。以其強下之故也。設脈浮革固鹵腸鳴者。屬當歸四逆湯。革爲寒。寒虛相搏則腸鳴。

發汗病不解。反惡寒者。虛故也。芍藥甘艸附子湯主之。發汗若下之。病仍不解。反煩躁。茯苓四逆湯主之。汗下後。白日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脈沈微。身無大熱者。乾薑附子湯主之。

舉古人論陰證例

若病在少陰。則有面赤。默默不欲語。但欲寐。或四肢厥逆。或身表如冰石。脈沈細。

若病在厥陰。則四肢厥逆。爪甲青。面黧目黑色。或自汗不止。脈沈弦無力。

若病陰毒證。身表如冰石。四肢厥逆。體如被杖。脈沈細而微。或六至。以至八至九至十至而不可數。此等陰證。易爲明辨。

惟太陰一證。手足自溫。自利不渴。尺寸脈俱沈而弱。仲景云。宜溫之。重則四逆湯。若脈浮者桂枝湯。惟此一證與內感外陽內陰相似。外陽內陰者。卽前黃耆理中等湯。調中理中等丸所治者是也。此等陰證。非古人不言。仲景論脈。首言大浮數動滑。此名陽也。沈濇弱弦微。此名陰也。非止爲外感設。內感之理在其中矣。又云陽濇而陰弦。腹中急痛者。小建中湯主之。則內外所感明矣。至如所言。陰病見陽脈者生。陽病見陰脈者死。此一句卽聖人大槩之言也。以其陽病見陰脈。故有外陽內陰者。與陽藥俱得其生矣。藥當從溫。不可遽熱。黃耆湯之類是也。

右此一條。說古人不盡之意。

論元陽中脫有內外

或有人飲冷內傷。一身之陽便從內消。身表涼。四肢冷。脈沈細。是謂陰證。則易知之。若從外走。身表熱。四肢溫。頭重不欲舉。脈浮弦。按之全無力。醫者不察。便與表藥。雙解等。復使汗出。三焦之氣絕。以此殺人者

多矣。或自服蜜茶及沐浴薰蒸。強令汗出。以致變證不救。如此自殺者亦多矣。身冷脈沈。服調中藥。陽自內之外。身體溫和而愈。脈浮弦細者。服調中藥。陽從內生。喚入外熱。復得脈平溫和而愈。此證不可不察也。故仲景云。太陽病發熱惡寒。熱多寒少。脈微弱者。此無陽也。不可發汗。

右此一條。雙解蜜茶沐浴。陰證皆不可用。

又經云。脈濇而緊。濇則胃氣微。緊則榮中寒。陽微衛中風。發熱而惡寒。榮緊衛氣冷。微嘔心內煩。醫爲有大熱解肌。又發汗亡陽。虛煩躁。心下苦痞堅。表裏俱虛。渴卒起而頭眩。客熱在皮膚。悵快不得眠。不知胃氣冷緊。寒在關元。

右此仲景濇緊二脈。即外熱內寒證也。

論宜灸不宜灸并湯沐四肢法

古人謂少陰厥陰陰毒三證則宜灸。或用葱熨等法。皆爲身表涼故也。若陰氣在內。陽氣在外。身表壯熱。手足大溫或熱不等。則不宜灸之。若遇前三證。用熱醋炒麩注布袋中。臍下熏蒸熨極妙。又云。三陰證。陷骨歧骨間三三七壯。灸足溫生。

活人陰證薰藥不效。并湯水不下。身冷脈絕。氣息短。不知人。用葱熨法。本爲上熱下寒也。二法雖妙。莫若用上醋拌麩炒熱。注布袋中。臍下熏蒸。比上二法尤速。若更以葱白煎漿作湯。以沐四肢亦可。若病人服藥後。欲作汗時。用湯沐以接四肢陽氣尤佳。

外接法

乾薑二炮爲細末。石決明一。另研細。秤拌勻。每用二三錢。匕手心中。以津唾調如泥。以手奄其陰。至煖汗出爲度。以牡蠣代決明亦可。牡蠣燒粉用。

一法丁香、蓽撥、乾薑、牡蠣。

一法治水病偏大。上下不定。疼痛不止。牡蠣不以少多。鹽泥固濟。炭三斤。煅令火盡。冷取二兩。乾薑一兩。炮爲細末。二味和勻。冷水調得。所塗病處。小便大利即愈。

臍下六穴

神闕一穴。臍中。禁鍼刺之。令人出惡汁不止。

陰交一穴。臍下一寸。

氣海一穴。一名孝央。陰交下五分。

石門一穴。臍下二寸。三焦之募。女子禁灸。恐絕產也。

關元一穴。臍下三寸。小腸之募。爲下紀三陰任脈會。

中極一穴。臍下四寸。爲氣原。

論譫言妄語有陰陽

舉陽證活人云。發躁狂走妄言。面赤咽痛。身斑斑若錦文。或下利黃赤。爲陽毒者。以其脈洪大而實。或滑或促。故用酸苦之藥治之。

成無己云。有汗出譫語。有下利譫語。有下血譫語。有熱入血室譫語。有三陽合病而譫語。有過經不解而譫語。皆陽證也。惟有發汗過多。亡陽譫語者。不可下。柴胡桂枝湯主之。此外或汗多亡陽譫語也。

海藏云。有內感傷冷。語言錯亂。世疑作譫語者。神不守舍也。止是陰證。此特脈虛而不實耳。

內經云。譫妄悲笑。皆屬于熱。難經謂面赤喜笑煩心。亦屬于熱。大抵此等證脈皆洪實。按之有力。若此等證脈按之無力。即陰氣內充。陽氣外游于皮膚之間。是無根之火也。陽氣及心火入于皮膚之間。肺主皮毛。故有譫妄悲笑及面赤喜笑煩心之證。豈特是哉。所有胸背兩手斑出者。有唾血絲者。有鼻中微衄者。不當作陽證。當作陰證治之。故活人辨證。不取諸于他。而獨取諸脈。無如此最爲驗也。其言可謂盡美矣。可謂盡美矣。

本神云。乾薑止唾血。　硫黃治衄血。　孫真人用桂心治唾血。

論下血如豚肝

下血如豚肝者。飲冷太極。脾胃過寒。肺氣又寒。心包凝泣。其毒浸滲入于胃中。亦注腸下。所以便血如豚肝。非若熱極妄行。下血而爲鮮色也。此中氣分而下行。故令人便血。若中氣逆而上行。故令人嘔血吐血也。亦非若陽證上行而溢出鮮血也。大抵陰陽二證。上行者爲嘔爲吐爲溢。順行者爲下爲便爲瀉。其名雖異。其實則同。

論陰陽二格

甲乙經云。經者所不可見者也。絡者所可見者也。外之溝渠是已。然絡亦有不可見者乎。曰六府連及五藏。是爲所不可見之之絡也。陽絡泛溢。難經云。宜砭射之。陰絡爲病。何以知之。黃帝曰。邪熱入于陽絡。則爲鼻血。邪熱入于陰絡。則爲後血。以是知陰絡病也。鼻血者在上溺與後血者在下也。若吐嘔者是知在中也。至于傷寒上厥下竭之證。或從耳目。或從口鼻。血俱出于上。竅然各隨其藏與經也。

扁鵲云。病若譫言妄語。身常有熱。脈當洪大而反手足厥逆。脈沈細而微者。死也。

又云。假令心病。何以知傷寒得之。然當譫言妄語。何以言之。肺主聲。故知肺邪入心爲譫言妄語也。其病身熱洒洒惡寒。甚則唾血。其脈浮大而濇。

仲景云。譫言妄語。身微熱。脈浮大。手足溫者生。逆冷脈沈細者。不過一日死矣。

又云。譫言妄語。脈濇者死。已上皆陽證得陰脈也。

又云。發汗多。重發汗者。必亡其陽。譫語脈短者死。右此重發汗亡陽者變陰也。又得陰脈死也。

論自汗分陰陽

成無己云。傷風自汗。汗出惡風寒者。有表也。汗出不惡風寒者。表解裏未和也。有陽明發熱汗出。此爲熱越。有陽明發熱汗多者下之。

海藏云。內感傷冷。自汗大惡風寒。汗出身涼不熱者。陰證也。汗出身熱得陰脈者。亦陰證也。

論手足自汗

手少陽之脈。三焦之經。起于小指次指之端。上出兩指之間。循手表腕。出臂外兩骨之間。上貫肘云云。手背痛多者。三焦之氣脫也。 經云。手足濈然汗出。大便鞕而謝語。下之則愈。以其熱聚胃。津液旁達。故手足漐漐汗出也。 成無己云。寒聚于胃。有手足汗出者乎。 經云。陽明中寒者不能食。小便不利。手足濈然汗出。欲作癇狂。卽是中寒也。

海藏云。故內感陰證。有手足逆冷而自汗者。手足自溫而自汗者。厥陰太陰之異也。

右此一條。雖是三焦四逆溫和。關他二經。不可不知。

論四肢振搖

成氏責其爲虛寒。欲汗之。其人必虛蒸而振。下後復汗而振者。表裏俱虛也。亡血發汗。則寒慄而振。氣血俱虛也。有振振欲擗地者。有振振動搖。二者皆汗多亡陽。經虛不能自主持。故振也。非振慄之可比也。經曰。若吐下後。心下逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。發汗則動經。身爲振搖者。茯苓桂枝白朮甘艸湯主之。大陽病發汗不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩身瞤動。振振欲擗地者。眞武湯主之。二藥皆溫經益血助氣之劑。

海藏云。惟好飲房室之人。與元耗散。血氣俱虛。或因勞而振。或不因勞而振。或因內感陰盛。陽脫而振者。皆陰證也。

若因房室而得。便有陰陽易條中形狀。頭重不欲舉。目瞑生花。熱上衝胸。少氣。聲不出。少腹小腹痛引陰中。或陰入于裏。脛寒而痛。此等陰證。四肢故多振搖。始得此病時。脈雖舉按有力。不可作陽證治之。若與陰藥。變寒必矣。亦不可用太熱之藥。作陰極治之。熱過則轉生他證。當以補氣溫血之藥調之。元氣漸生。可得而愈。 若脈已微。面色眉間變黑。脣吻不收。爪甲微青。當用熱藥攻之。 若經汗下。熱藥不可熱服。當令似溫。則陰氣不拒。經云。熱因寒用。此之謂也。

右此一論。自爲頗有理。可以發明古人所不言處。

論陰證始終形狀雜舉例

若病人面赤者。下虛也。手足振搖者。爲元氣無主持也。腰腿沈重者。三陰經受寒溼也。或恐或悸者。知陰寒之邪在手足少陰也。喜笑則爲癡。悲怡則爲慘。手少陰太陰也。頸項不甚痛。行步只如舊。知寒邪之氣。

不在經而在裏也。若頭項痛者。內之外逆上行而至于經矣。或已有多伏寒邪。始得內感便發。頭項痛亦無定也。或時太息者。靈樞云。心不足則心系急。心系急故太息以舒之。是知手少陰心火不足也。前人云去聲是已。

已上初病時多有形狀如此等類。

身如被杖者。陽氣盡而血脈凝澁。不能榮于身也。色青黑。腎肝子母二色眞藏見也。手足倦而臥者。四肢之陽氣盡而陰氣貫收也。臥而面壁者。陰欲靜也。惡聞人與語者。陰欲默也。昏昏欲寐者。元氣雜絕。邪熱攻肺也。或欲寐以自養。及目白睛而赤者。肺受火邪也。三四日之間。或可行步。不甚覺重者。陽猶在外也。五六日陰盛。熱藥不能回者。陰主殺而暴絕。非若陽氣徘徊不已。而欲其生生也。初病面赤脹者。下虛故也。至于死先青而後赤者。陽氣不生。溫令不行。而就北方寒也。其逆行如此。經云。陽氣前絕。陰氣後竭者。其人死身色必青。陰氣前絕。陽氣後竭者。其人死身色必赤。若陰陽二毒相匿。或只伏陽。此等陰證。或身半以上經汗死。卽不青黑者亦有之。

厥陰有偏身青黑如花厥狀何也。

答曰。陽氣不能營運于四肢。身表經絡遇絕。氣欲行而不得行。及其得行而遽止之。故行處微紫色。不得行。而止處不青則黑也。所以身如被杖。有有處。有無處也。偏身俱黑。陽氣全無也。故經絡論云。寒多則凝泣。凝泣則青黑。熱多則淖澤。淖澤則黃赤。此之謂也。

傷寒發厥有陰陽

夫厥者。有陰有陽。初得病身熱。三四日後。熱氣漸深。大便鞕結。小便黃赤。或語言譫妄而反發熱者。陽厥也。 初得病身不熱。三四日後。陽氣漸消。大便溏利。小便清白。或語言低微而不發熱者。陰厥也。二證人多疑之。以脈皆沈故也。然陽厥而沈者。脈當有力。陰厥而沈者。脈當無力也。若陽厥爪指有時而溫。若陰厥爪指時時常冷也。仲景云。傷寒三二日四五日厥者。必發熱。前熱者後必厥。厥深者熱亦深。當下之。宜承氣湯。又云。傷寒脈滑而厥者。裏有熱也。白虎湯主之。仲景云。傷寒下利清穀。裏寒外熱。手足厥而脈微者。裏有寒也。汗出而厥者同。又云。陰病下利而脈微者。裏有寒也。白通湯主之。一法無脈利不止。白通加猪膽汁。以其咽乾而煩也。

已上病急或尤急。多有此形狀等類。

論陰證發渴

舉陽證。夫足少陰腎經。其直行者。上貫肝膈。入肺中。繫舌本。腎惡燥。故渴而引飲。經云。口燥舌乾而渴。尺寸脈俱沈。則知腎受熱邪。爲陽證也。當下之。

陰證口乾舌燥。非熱邪侵淩腎經也。乃嗜欲之人。耗散精氣。眞水涸竭。元氣陽中脫。坎內陽爻是也。飲食傷冷。變

爲枯陰陽從內消者、或不渴陽游于外者、必渴而欲飲也。然欲飲則飲湯而不飲水。或有飲水者。縱與不任。若不忍戒。誤多飲者。變由是而生矣。此等舌乾欲飲冷水。抑而與之湯。及得飲湯。胸中快然。其渴即解。若以渴爲熱。湯能解之乎。不惟不能解其渴。其熱從而益甚矣。以是知爲陰證也。夫何疑之有。

論陰證欬逆（一作吃逆。許學士退陰與正元同類。以治陰證欬逆。）

夫逆病欬逆。火炎上。使陰氣不內也。陰氣者。即吸入之陰氣也。陰證內寒。與吸入之陰同類。當氣順下而無欬逆也。今陰證欬逆。吸入之陰不得內者。何氣使然哉。（陽證）且陽證欬逆者。胃熱失下也。陰氣先絕。陽氣後亦將竭。火獨炎上。逆出陰氣而爲欬逆也。陰證者、內已伏陰。陰氣太甚。腎水搶權。肝氣不生。胃火已病。丁火又消。所有游行相火寒邪迫而萃集于胸中。亦欲盡也。故令人發躁。大渴引飲。并去蓋覆。病人獨覺熱。他人按執之。身體肌肉骨髓血脈皆寒。此火即無根之火也。故用丁香乾薑之類熱藥溫胃。其火自下。欬逆方止。非若涼膈瀉心。以治陽證。自上而下。瀉退其火。陰氣乃生。陰證欬逆從嘔噦而生。胃寒嘔噦不已。渴逆繼之。其聲快悵連續不已。聲末而作欬逆。古人云煩冤是也。煩冤者。有情不能訴。有懷不能吐。故爲快悵。唯陰證陽脫而欬逆者。其狀似之。陽證欬逆。內熱與上熱相接。渴逆止在喉中。陰證欬逆。嘔從內出。或先作去聲。或與去聲相並而至喉中。故用溫胃益肺之藥主之。中既溫。天五之氣與殘火自下。又與胃中溫藥相接。變而陽氣生也。殆無異喪家之人。遑遑無依。契昔挽留。故都是反。與相並立而幹成其事。陰氣始退。陽氣漸生。脈亦從之而得以獲生也。

薑苑治陰欬逆勻氣散

川烏頭（尖者三箇。炮製去皮臍。）

右爲細末。每服二錢。黑豆二十一粒。豉沙雞頭。入大水一盞。同煎至六分。承熱細細飲之。

本事治陰毒吃逆

川烏頭。　乾薑。　附子。（俱炮。）　肉桂。

芍藥。　甘艸。（炙。）　半夏。　吳茱萸。

陳皮。　大黃。

右各等分爲末。每服一錢。水一盞。生薑三五片。煎至七分。去濁滓。取清熱呷。

陰證發熱

活人云。發熱惡寒者。太陰也。　身熱汗出濈濈然者。陽明也。　脈細頭痛嘔而發熱者。少陽也。

問。陰證有發熱者。何也。

答曰。太陰厥陰皆不發熱。只少陰有發熱二條。仲景謂之反發熱也。少陰始得之。發熱脈沈者。麻黃附子細辛湯主之。少陰病下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脈不出者。通脈四逆湯主之。斷云。大抵陰證發熱。終

是不同。須脈沈細。或下利。手足厥。另有陰躁發熱。欲坐井中一條。　此例當在少陰條下。

仲景云。吐利汗出。發熱惡寒。四肢拘急。手足厥逆。四逆湯主之。　又云。吐利。小便復利。而大汗出。下利清穀。內寒外熱。脈微欲絕者。四逆湯主之。　病發熱頭痛。身體不痛疼。當救裏。四逆湯主之。　下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥者。通脈四逆湯主之。　大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼。又下利厥逆而惡寒者。四逆湯主之。

論陰證大便秘

陽陰二結。寒熱不同。爲躁一也。盛暑爍金。嚴冬凝海是也。

舉陽證。經云。其脈浮而數。能食不大便者。此爲實名陽結。其脈沈而遲。不能食。身體重。大便反鞕者。名曰陰結。又云。無陽陰強。大便鞕者。不可下。下之則清穀滿腹。宜理中丸主之。叔和云。弦冷腸中結。潔古云。脈沈弦。不能食而不大便。則爲陰冷結也。

論陰脈小便不通

舉陽證。假令陽病者。太陽之標不解。復入于本。發熱惡寒而渴。五苓散主之。是溼熱在下。故令秘而不通。餘證不通者。隨經而治之。　若陰證不通者。脈遲細浮。中沈不一。陰氣已盛。陽氣欲絕。小便當自利。而色白反不通者。陰無以化。疑泣枯澀。如水之結冰。津液不行。故閉而不通也。當用熱藥主之。陰得陽而化。津液乃行。所以便也。大不可用利小便之藥利之。四逆湯加茯苓是也。與仲陽硫黃丁香豆蔻散內有滑石同意。大抵非茯苓滑石二藥利小便也。蓋二味引熱藥下行。不入他經。爲效速也。經云。陽明中寒者不能食。小便不利。手足濈然汗出。欲作瘈瘲。即是中寒。與此同意。內經云。諸寒收引。皆腦腎水。引而下之者。小便自利。收而閉之者。小便不通也。又經曰。腎主大小二便。難。陰陽二證在其中矣。成無已云。陰陽相離爲之和。陰陽相離爲之結。火亦有下收字處。以其心虛也。

仲景與武湯加減例云。小便自利者。去茯苓一味。四逆散加減法。小便不利者。加茯苓。小柴胡加減法。小便不利者加茯苓。（活人云。陰證腹痛。小便不利者。與武湯也。）

活人云。若陰證加以小便不通。及陰囊縮入。小腹絞痛欲死者。更以臍下二寸石門穴。大段急灸之。仍須與返陰丹。當歸四逆加吳茱萸生薑湯。慎勿與尋常利小便藥也。尋常利小便藥。多用冷滑之劑。此是陰毒氣在小腹所致也。當知。

仲景風溼相搏。骨節疼煩。不得屈伸。近則痛轉劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身腫者。甘艸附子湯主之。　海藏云。加茯苓尤佳。　發汗病不解。反惡寒者。虛也。芍藥甘艸附子湯主之。

海藏云。加大黃者尤佳。若腹痛者尤宜此湯。仲景云。陽明中寒者不能食。小便不利。手足濈然汗出。欲作瘈瘲。即是中寒也。

論陰證小便赤

舉陽證。傷寒外感。四肢微厥。邪熱入裏。大便燥。小便赤而澀少。是謂熱也。惟陰證內感。陽走于外。虛熱在皮毛之間。肺氣受邪。下輸于膀胱。故令小便如灰汁。象胃虛不能食。戊與癸合。虛邪所化。赤如灰汁。色雖如此。但瀉時成劑。盞中不澄而快利也。

論後出餘氣而解

病人服溫熱之藥。時有下氣者。知陰氣出也。韓氏治下焦寒。用灰包煨法。得下利一兩行。小便一兩次。及少有汗。陰氣出而下泄。知其爲必解也。予以是知服調中理中及諸附子等藥後。時有下氣者。陰化而出。即爲解。若遇外陽內陰之證。身表四肢盡熱。語言錯亂。疑作譫語。陽證者當去蓋覆。令胸腹兩手微露。見風。以手按執之。久之肌肉骨間不熱者。即非陽證。眞陰證也。

右此一條。後辨譫語形狀。

論狂言若有所失

恍惚狂言。若有所遺。妄聞妄見。意有所期。及從而叩。或忘或知。神去而魂。命將何依。世人不識。反作熱疾。以脈別之。自然不疑。故經曰。數問其情。以從其意。得神者生。失神者亡。正謂是也。

周內或陰證。有汗而解。有無汗而解者。何也。

答曰。有汗而解者。或壯年津液尚全。或溫之早而得治。成傳不逆而順經。或素得養而強本。所以俱汗而解也。無汗而解者。或老年血氣俱衰。或溫之遲而失治。或經過期而不傳。或素無養而虧本。所以俱無汗而解也。有汗而解者。間有所遺。無汗而解者。邪豈能盡。故神癡而弱。不能復舊。須待飯食漸增。因食微潤。然後定其中外。各守其鄉。醫者不可不知。

衍義曰。　太陰元精石合他藥塗大風疾。別有法。陰證傷寒。指甲面色青黑。六脈沈細而疾。心下脹滿結輕。躁渴。虛汗不止。或時狂言。四肢逆冷。咽喉不利。腹疼痛。亦須佐他藥。象之閣經本神已有法。惟出解州者良。

古方不用。今活人傷寒其著者。治傷寒三日。頭痛壯熱。四肢不利。正陽丹。　太陰元精石、消石、硫黃、各二兩。硇砂一兩。四物都細研。入瓦瓶子固濟。以炭半斤。于瓶子周一寸燈之。約近半日。合藥青紫色。住火待冷。取出。用臘月雪水拌勻。溼入甕瓶子中。屋後北陰下陰乾。又入地埋二七日。取出細研。以麵糊爲丸。雞頭實大。先用熱水浴後。以艾湯研下一丸。以衣蓋取汗出爲差。

論脈次第

外感者。先太陽。次陽明。次少陽。次太陽。次少陽。次厥陰。內感者。先三陰而無定。次少陽。次陽明。次太陽。爲極高之分。

陽從內消。　從右手脈先陷。左手浮。右手沈。

陽從外走。　從左手脈先陷。右手浮。左手沈。

其脈或有不然者。陰陽之變易無定也。許學士云。陰陽交互最難明。正坐此耳。

陽脈沈而滑。　若浮者。欲升而汗也。

陰脈沈而細。　本體也。

若浮而有力者。陽氣生也。

若浮而無力者。陽氣走也。

若浮若沈。或有力或無力。陰陽交爭而未定也。惟外熱內寒者。多有此脈。

用附子法

古人用附子。不得已也。皆爲身涼脈沈細而用之。若裏寒身表大熱者。不宜用。以其附子味辛熱。能行諸經而不止。身尚熱。但用乾薑之類。以其味苦能止而不行。只是溫中一法。若身熱消而變涼。內外俱寒。薑附合而並進。溫中行經。陽氣俱生。內外而得可保康寧。此之謂也。若身熱便用附子。切恐轉生他證。香豆不止。可慎可慎。

論陰陽易分寒熱

陰陽各相易證。仲景止用燒裩散。言至簡而意至有餘也。故朱奉議立陰陽易證爲二條。後人始知有寒熱之別也。故熱者有上燒裩散。而又有竹皮茹湯。寒者有鰕鼠糞湯。而又有當歸白朮湯。至于枝正方。妙香丸條下。治雜病陰陽易藥中有牛黃腦麝之類。是知治熱證也。豈可一塗而取哉。學者詳之。

聖人立陰陽易條。雖不盡言。特舉其宏綱而已。是以後之述者。盡心焉爾矣可也。

海藏云。若陰陽易證。果得陰脈。當隨證用之。

若脈在厥陰。當歸四逆湯送下燒裩散。

若脈在少陰。通脈四逆湯送下燒裩散。

若脈在太陰。四順理中湯送下燒裩散。

所用之藥。各隨其經而效爲之速也。宜矣。

右此一條。隨經藥下燒裩散。所以補古人所不完處。

扁鵲云。治陰陽易傷寒。燒婦人月經衣。熱水服方寸匕。仲景云。傷寒陰陽之爲病。其人身體重。少氣。少腹裏急。或引陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生花。膝脛拘急者。燒裩散主之。

燒裩散

右取婦人中裩近隱處。剪燒灰。以水和服方寸匕。日三服。小便即利。陰頭微腫則愈。婦人病取男子裩

襍燒灰用之。

活人䑛鼠糞湯　療傷寒病後男子陰易。

韭白根一把。　䑛鼠糞一十四枚。

右二味。以水二升。煮取半升。去滓。再煎三沸。溫溫盡服。必有黏汗出爲效。未汗再服。亦理諸般勞復。鼠屎兩頭尖者是也。

海藏云。經不言䑛鼠糞。只言牡鼠糞兩頭尖。治勞復。文具鼷鼠條下。又分鼠也。並不見䑛鼠之名。䑛鼠大獸如猪。分鼠之形。以其肥亦如猪形。䑛之名想亦出此。牡即父也。雄也。在野難得。在人家諸物中遺下兩頭尖者。亦可用。䑛、牡豕也。子路佩䑛。

許慎云。菜一名久者。謂之韭。園人種之。歲三四割。其根不傷。冬培之。先春復生。信乎其久者也。

易稽覽圖云。政道得則陰物變陽。鄭康成云。若葱變韭是也。然則葱冷而韭溫。可驗。

活人治陰陽易證。䑛糞湯用韭白根。非獨取其性溫也。蓋亦取其陰物變陽之意。述類象形。古人以至于此。

竹皮湯　療交接勞復。卵腫。腹中絞痛。便絕。

竹皮青刮一升。

右一味。以水三升。煮一升半。絞去滓。分服立愈。

青竹茹湯

婦人病未平復。因有所動。致熱氣上衝胸。手足拘急。搐搦如中風狀。宜青竹茹湯。

瓜蔞根無黃者一兩。　青竹茹刮半斤。淡竹是也。

右以水二升半。煮取二合。去滓。分二三服。

當歸白朮湯

婦人未平復。因有所動。小腹急痛。腰胯疼。四肢不住舉動。無發熱者。宜當歸白朮湯。

白朮一分。　當歸一分。　桂枝一分。

附子一分生。　生薑半兩。　甘艸一分。

芎藭一分。　人參一分。　黃耆一分。

右剉如麻豆大。以水三升。煮取一升半。去滓。通口服一盞。食頃。再服。溫覆微汗差。

海藏云。四肢不住舉動振搖。卽反覆皆是。

發明仲景活人

燒裩散灰性。雖無寒熱。只是推出陰中外來著人邪氣。逃類象形之法。聖人以至于此。故成無己云。燒裩

散導出陰氣是也。若陽厥用竹皮青竹茹湯。若陰厥用䑛鼠糞當歸白朮等湯。此朱公出人意表。而後之述者之不可及也。

妙香丸

辰砂飛研九兩。　龍腦。　膩粉研。

麝香研各三分。　牛黃三錢。　金箔九十个研。

巴豆三百一十五箇。去皮心膜。炒熟研如麻。去油。

右合研勻。煉蜜出淨黃蠟六兩。入白沙蜜三分同煉。令勻爲丸。每兩作三十九。

若男子婦人因病傷寒時疾。陰陽氣交結。伏毒氣。胃中喘躁。眼赤。潮發不定。再經日數七八日已下。至半月日未安。醫所不明證候。脈息交亂者。可服一丸。或分作三丸亦可。並用龍腦膩粉米飲調半盞已來。下此一服。每丸上用針投一眼子。　如有餘說。請依局方法。

仲景活人舉陰陽易證。若脈果陰。當用燒裩散下之。入三經藥內調服。最爲的當。其餘雜陰證內。但有腰膝冷痛。宜各本經藥內加丁香、沈香二味。不惟腰膝得煖。抑亦沈墜峻下入于陰部。爲效速也。兼二藥本經所言。治腎氣壯陽。與諸藥桂鳥附茱萸等藥。佐使相助。爲效大倍。不可不知。

醫書辭藻比之儒書。甚不美于觀覽。非若嘲風弄月之篇之暢懷也。非若禮義廉恥之典之壯志也。又非若忠節孝行之傳之聳動人之奇稱也。故士宦惡其技之末而不之學焉。是以世人所重者鮮。一旦抱疾委命他人。豈其智邪。況傷寒古今爲一大病。陰證一節。害人爲尤速。予因暇日集此略例。庶幾有望于好生之君子者。或有人焉。讀是書也。當反覆披玩。前後貫通。但云此非空談。施于實用可也。若悟則康寧可期。昧則疾橫繼至。利害天壤。可不畏歟。知乎此則暢懷之樂。壯志之快。奇稱之美。悉備于我。味孰大焉。既足以卻疾活命。又足以保命延年。其樂事有涯涘哉。范文正公云。不爲名相。當爲名醫。意亦不出此耳。七月十三日再題。

予作陰證論一書。其本有三。有多寡之異焉。非固如是之不同也。大抵聖賢之言。非一讀而能盡。故每有所得。不敢以前說爲已定。爲已足。而不爲之增益也。故初本在河南。傳夢臣從所錄。則簡而少。次本在吾鄉。寄北京時。頗增三二論。自壬辰至丙申幾五載。而復增隨條并藥後斷例。前人所言本意。與其所從來。或爲之是。或爲之小異。或又有言外不盡之機。一一具陳之。欲質之明者。則求之諸都而不可得。但讀之既笑且嘻。長歎而已。不知何日復得吾東垣李先生一問之。吾之心始可以少安矣。吾之所以著此者。猶恐其未盡前人之意耳。丙申秋二十有一日再題。

海藏治驗錄

外陽內陰

牌印將軍完顏公之子小將軍，病傷寒六七日，寒熱間作，腕後有瘡三五點，鼻中微血出，醫以白虎湯柴胡等藥治之不愈，及余診之，兩手脈沈濇，胸膈間及四肢按執之，殊無大熱，此內寒也，問其故，因暑熱臥殿角之側，先傷寒，次大渴，飲冰酪水一大椀，外感者輕，內傷者重，外從內病，俱爲陰也，故先瘡衄，後顯內陰，寒熱間作，脾亦有之，非往來少陽之寒熱也，與調中湯，數服而愈。

陽狂

彰德張相公子，誼夫之妻許氏，乃狀元許先之女，紹明之妹也，病陽厥怒狂，發時飲食四五倍，罵詈不避親疏，服飾隨喪，或哭或歌，或以刃傷人，不言如啞，言即如狂，素不知書識字，便讀文選，人皆以爲鬼魅，待其靜診之，六脈舉按皆無，身表如冰石，其發也叫呼，聲聲愈高，余昔聞潞右老人云，本經言奪食則已，非不與之食而爲奪食也，嘗以藥大下之而使不能食，爲之奪食也，予用大承氣湯下之，得藏府數升，狂稍寧，待一二日復發，又下之，得便數升，其疾又寧，待一二日又發，三下之，寧如舊，但不能食，疾稍輕而不已，

下之又五七次，計大便數斗，疾緩身溫，脈生，至十四日其疾愈，脈如舊，困臥三四日後起蘇，飲食微進，又至十日後得安，始得病時，語言聲怒非常，一身諸陽盡伏于中，隱于胃，非大下之可乎，此易老奪食之意也。

右陽狂一條，本不當例陰證中，今暨陰狂證並列，其狂則一，其爲寒熱二也，差之毫釐，繆以千里，讀者至此，其三復之。

陰狂

寶豐阿磨堆侯君輔之縣丞，爲親軍時，飲食積寒，所傷久矣，一日病，其脈極沈細，易辨，卽陰證無疑，內寒外熱，故肩背胸脅瘡出十數點，語言狂亂，家人驚曰，發瘡譫語，莫非熱乎，余曰非也，陽爲陰逼，上入于肺，傳之皮毛，故瘡微出，神不守舍，故錯言如狂，非譫語也，肌表雖熱，以手按執，須臾冷透如冰，余與靈附等藥，嗣後數日，約二十餘兩後，中大汗而愈，及見庭中物色兒童雞犬，指之曰，此正我二三日間夢中境物也，然則神不守舍信矣，愈後起行，其狂又發，張目而言曰，今我受省劄爲御馬羣大使，如何不與我處，及診之，脈又沈退，三四日不大便，余與理中丸，三日內約半斤，其疾全愈，侯公之狂，非陽狂之狂，乃失神之狂，卽陰也，但脈陰爲驗，學者當審，獨取諸脈，不憑外證可也。

陰易

寶豐侯八郎，外感風，內傷冷，自服通聖散，大汗出，內外陽氣俱脫，不及治而死，其子國華又病傷寒四五日，身微瘡，渴飲水，及診之，沈弦欲絕，厥陰脈也，溫藥數日不已，又以靈附等藥，緩回脈生，因渴私飲水一盂，脈復退，但見頭不舉，目不開，問之，則犯陰易，若只與燒裩散，則寒而不濟矣，遂煎吳茱萸湯一大服，調燒裩散連進二服，作大汗，兩晝夜汗止，何以然，以其至陰，汗從脅髓中得溫而出，所以兩晝夜方止。

夜服

寶豐弋唐臣，時始冠，平日飲食嗜冷，久遂成陰證，脈遲七八至一止，二三日後脈值三至，余與進溫熱之劑數服，四五日不解，遂結夜半一服，晝三夜一，脈頗生，一夕誤飲其藥，明旦證遂增劇，復連進前藥，七日兼夜，脈生，大汗而解，人問其故，余曰，人與天地同一氣耳，陽病晝劇而夜寧，陰病夜劇而晝寧，各從其類而化也，今病陰極，至夜尤甚，故令夜半服藥，何以然，所以却類化之陰，而接子後所生之陽，則陰易退而陽易生矣，此一條具見前章。

陰血

潞州義井街北浴堂秦二母病太陰證，三日不解，後嘔逆惡心，而脈不浮，文之與半硫丸二三服不止，復與黃耆建中等藥，脈中得之極緊，無表寒，胸中大熱，發渴引飲，衆皆疑爲陽證，欲飲之水，余與文之爭不與，又一日與靈附等藥，緊脈反細沈，陽狀未生，以桂附蠶烏之類，酒丸，每百丸接之，二日中丸十餘服，渴

止。脈尚沈細。以其病人身熱。躁煩不寧。欲作汗。不發其熱。去其衣被。蓋覆。體之眞陽營運未全。而又見風寒。汗不能出。神憒不醒。家人衣之。裝束甚厚。以待其斃。但能嘘物。又以前丸接之。陽脈方出而作大汗。蓋其人久好三生茶。積寒之所致也。愈後。元龄大小始得通利。翌日再下瘀血一盆。如豚肝然。文之疑不能判。余教以用胃風湯加桂、附。三服血止。其寒甚如此。亦世之所未嘗見也。治宜詳之。大抵前後證變之不同。以脈別之。最爲有準。不必求諸外證也。

鼓擊脈

子秦二又病。太陽證悉具。其脈浮數。初爲陽證。經所受邪也。神朮湯解之。末三日變爲陰證。何以然。旺火投盛水也。以其素服三生茶及好食諸冷物。數年來藏府積而爲痼疾。一身之經皆疑寒浸淫。醞釀而成太陰。脈亦從此而變其狀。非浮非沈。上下內外舉按極有力。堅而不柔。非若陽脈來之有源。尺以下至宛中全無。惟三部中獨見鼓擊。按之觸指。突出厲表。異常緊爲甚。所稟元陽無一身游行之火。獨萃于胸中。寒氣逼之。故搏而大。有加數倍。往來不可以至數名。縱橫不可以巨細狀。五日後文之與蓋附等劑而復振搖。又與眞武四逆等湯。煩躁大渴不止。若更接蓋附。其汗必作。其人自疑爲熱而盛飲水。及得水稍蘇。斯須。脈陷沈而緊。厥逆神憒。至六日晡前後。大便秘結。小便赤色而少。強漱得涓滴。時手冷至肘。足冷至膝。脈將絕而不可救。欲復與四逆等湯。恐煩躁私飲而生變。文之請曰。何法以治。余教以烏、附、薑、桂、良薑等。佐以芍藥茴香之類。酒糊丸。引而下之。而使不僭。急服之百丸。晝夜相接。八九陽氣從下復生。胸膈不煩躁。不思水。與溫劑則微嘘。大便瀉。屢下。氣陰得以出。小便通快。成劑如灰汁。脈微生。服丸至千半。陽氣復。作汗而愈。後神又不全。少氣乏力。又與溫中等藥數服。然後良愈。非平昔飲冷。腸胃積寒之久者。脈不如此之鼓擊也。鼓擊者何。雖可謂大。非大也。忽忽也。宜詳審辨認。世罕有之。大抵此脈屬緊。比緊爲尤甚。故名鼓擊也。仲景云。諸緊爲寒。又云。脈浮而緊。寒在表也。脈沈而緊。寒在裏也。緊似弦而非。有如牽繩之狀。卽爲緊也。非滑洪而有源也。成無己云。緊緊如循長竿。運運而強直也。通眞子歌云。緊若牽繩轉索初。海藏云。牽繩之緊。循竿之直。二者皆近于鼓擊。鼓擊者。尤甚于二脈數倍。啓玄子云。盛脈同陽。四倍已上。陰之極也。

腹痛

潞州提領姬世英。平昔好冷物涼藥。自謂膏粱充肥。必多熱。因眼疾。又併服寒劑。數日遂得陰病。脈緊而無力。自胸至臍腹下。大痛劇甚。凡痛則幾至于斃。去歲已嘗有此證。求治于宋文之得愈。今復病。尤甚于去年。又函命文之。文之與薑附等劑。雖稍蘇。痛不已。遂以文之所用方內。倍芍藥令服之。予謂病者曰。良久痛當自胸中下。節次至腹。或大便得利。或後出餘氣。則寒毒得以出矣。後果如其言。翌日愈。後令常服神應丸。以斷其積寒之根。

外科精義

齊德之集注

外科精義目錄

卷上

論瘡腫診候入式法
論榮衛色脉參應之法
論持手訣消息法
論三部所主臟腑病證
論脉證名狀二十六種所主病證
論三部脉所主證候
論三部脉所主雜病法訣
論診候肺疽肺痿法
論將護忌慎法
論瘡疽腫虛實法
辯瘡腫淺深法
辯膿法
辯瘡疽癤腫證候法
辯瘡疽善惡法
貼熨法
針烙瘡腫法
內消法
托裏法
砭鍼法
湯清瘡腫法
灸療瘡腫法
追蝕瘡疽腫法
止痛法
用藥增損法
療瘡腫權變通類法
論五發疽
論附骨疽
論時毒
論丁瘡腫
辯丁腫十三種形色禁忌
論瘰癧治法

卷下

漏蘆湯
內消丸
內消升麻湯
牡礪大黃湯
地黃煎丸
皂角煎丸
苦參丸
連翹散
枳殼丸
托裏黃芪湯
托裏當歸湯
托裏玄參散
內補散
香粉散
黃芪茯苓湯
伏梁丸
木香湯腫湯
湯腫升麻湯
甘草大豆湯
洗毒湯
何首烏散
化毒丹
五利大黃湯
五香連翹湯
和血通氣丸
槐角煎丸
苦參散
肺風丸
竹葉黃芪湯
五香湯
托裏茯苓湯
托裏散
內托散
內塞散
止痛當歸湯
內補防風散
溫經丸
升麻湯腫湯
猪蹄湯
湯腫湯
洗毒湯
消毒湯
應痛丸
梔子仁湯
通氣散
金銀花散
十香膏
乳香膏
消毒膏
天麻膏
靈應膏
追毒散
射膿丸
治瘰癧 介馬老鼠瘡
拔膿散
乳香散
截痂散
青金錠子
挑紅散
金黃散
水澄膏
金露散
大槐柳散
決効散
平肌散
博金散
完肌散
鼎霞錠子
玉粉散
紫金散
菖蒲錠子
熨風散
黃芪丸
葛根牛蒡子湯
白丁香散
皂蛤散
犀角膏
白龍膏
磨風膏
善應膏
翠玉膏
迴瘡錠子
蠚鍼丸
翠霞散
引膿散
釣蓉散
抵聖散
白龍散
橫柳散
生肌散
拔毒散
消赤散
天麻散
水銀膏
神黃散
金傷散
定血散
漏蘆湯
香蓉散
通耳丹
寸金錠子

薰痔散
通靈丸
三神丸
玉芝飲子
平和飲子
玄參丸
犀角散
防風散
烏金散
劉守真瘡論
沒藥膏
必効散
烏金散
抵聖散
應効散
白金散
如聖散
天蛾散
必効散
蛤粉散
治小兒丹瘤
治小兒痖口瘡
治破傷風并洗頭風藥
烏龍丸
紫參丸
萬靈丸
治眼
治吹奶
治痔瘡
洗痔
寸金丹
牙痛藥
迴瘡膏酥錠子
乳香托裏散
四聖旋丁散
天丁散
萬應膏
治小兒面塗瘡
治赤白口瘡
治乾濕疥癬
治湯火燒燙瘡
治破傷風
治風狗咬破傷風
治破傷
論炮製諸藥及單方主療瘡腫法

外科精義卷上

醫學傳心錄 欽定御藥院外科太醫齊德之纂集
明 新安 後學 吳勉學校正

論瘡腫診候入式法

夫醫者人之司命也脉者醫之大業也蓋醫家苟不明脉則如冥行索途動致顛覆矣夫大方脉婦人小兒風科必先診脉後對證處藥獨瘡科之流多有不診其脉候專攻治外或有證候疑難別召方脉診察於瘡科之輩甘嘗淺陋之名噫其小哉如是原夫瘡腫之生皆由陰陽不和氣血凝滯若不診候何以知陰陽勇怯血氣聚散耶由是觀之則須信療瘡腫於診候之道不可闕也歷觀古今治療瘡腫方書甚多其間診候之法畧而未詳比夫諸科甚有滅裂愚雖不才輒取黃帝素問難經靈樞甲乙及叔和仲景扁鵲華陀千金外臺聖惠總錄古今名醫諸家方論之中診候瘡腫之說簡編類次貫成篇帙首載診候入式之法次論血氣色脉參應之源後明脉之名狀所主證候及瘡腫逆從之方庶使為瘡腫科者覽此則判然可曉了無凝滯於胷次一朝臨疾診候至此則察逆從決成敗若黑白之易分耳

論榮衛色脉參應之法

夫天地之道曰陰與陽陰陽在人曰血與氣氣血者榮也氣者衛也榮者榮於中衛者衛於外所以榮行脉中衛行脉外脉者血氣之先也血非脉則焉能榮於中氣非脉則焉能衛於外二者相資而行內則通於五臟六腑十二經絡外則濡於九竅四肢百節萬毛晝夜循行如環無端以成其度會於寸口變見於脉故曰氣血者人之神也脉者氣血之神也所以治病之始五決為紀蓋五決者五臟之色脉也脉應於內色應於外其色之與脉當相參應故曰能合色脉

可以萬全也凡為醫先須調明色脉況為瘡科若於此不精雖聰惠辯博亦不足委也

論持手訣消息法

夫診候之脉法常以平旦為紀陰氣未散陽氣未動飲食未進血氣未亂經脉未隧絡脉調勻故乃可診有疾之脉若遇倉卒病患不拘此論內經所謂持脉有道以虛靜為保但可澄神靜慮調息凝心視精明察五色聽音聲問所苦方始按寸尺別浮沉以此參照決死生之分矣復觀患人身形長短肥瘦老少男女性情緩急例各不同故曰形氣相得者生三五下調者病謂如室女足冤脉當濡而弱嬰兒孩子之脉細而疾三四歲者呼吸之間脉當七八至為平此夫常人特不同耳大抵男子先診左手女子先診右手男子左脉大則順女子右脉大則順大凡診脉先以中指揣按掌後高骨骨下為關得其關位然後齊下兩左右二指若臂長人踈排其指若臂短人密排其指三指停穩先診上指曰寸口浮按消息之中按消息之重按消息之上竟消息之下竟消息之推而外之消息之然後先關後尺消息之推而內之消息之一類此若診得三部之中浮沉滑澀遲疾不調何病所主外觀形色內察脉候參詳處治以患告之不可輕言談笑亂說是非左右瞻望舉止忽畧此庸醫也

論三部所主臟腑病論

夫診候之道醫者之難精也若非燈下苦辛勤於記誦參師訪友晝夜不退造次顛沛寢寐俯仰存心於此安能知神聖之妙哉古人曰按其脉知其疾命曰神以悟其探賾索隱之妙也又曰切其脉治其病謂之巧以明其指別之功也蓋三指相去毫釐之近主病若千里之遠觀夫指別之功世人固以為難命曰神豈容易可至哉常考於經脉有三部寸關尺也從

魚際至高骨却行一寸曰寸從寸上一分曰魚際從寸至尺曰尺澤寸後尺前爲關關前爲陽部寸口也關後爲陰卽尺脉也陽出陰入以關爲界寸主上焦頭手皮毛關主中焦腹及腰尺主下焦小腹及足此三部所主大畧也又有左右兩手三部爲之六脉也又有人迎氣口神門所主又各不同蓋左手關前曰人迎右手關前曰氣口兩關之後一分卽曰神門故脉法讀曰肝心出左肺脾出右腎爲命門俱出尺部寬鬼穀神皆見寸口所謂左手關前心之部也其經手少陰與手太陽爲表裏小腸合爲府左手關上肝之部也其經足厥陰與足少陽爲表裏膽合爲府左手關後腎之部也其經足少陰與足太陽爲表裏膀胱合爲府右手關前肺之部也其經手太陰與手陽明爲表裏大腸合爲府右手關上脾之部也其經足太陰與足陽明爲表裏胃合爲府右手關後命門之部也其經手厥陰與手少陽爲表裏三焦合爲府此謂六部所主臟腑十二經之義也又脉要精微論曰尺內兩旁則季脇也尺外以候腎尺裏以候腹中附上左外以候肝內以候膈右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候胷中左外以候心內以候鼎中前以候前後以候後上竟上者胷喉中事也下竟下者小腹腰股膝脛足中事也麤大者陰不足陽有餘爲熱中也來疾去徐上實下虛爲厥顛疾來徐去疾上虛下實爲惡風也故中風者陽氣受也有脉俱沉細數者少陰厥也沉細數散者寒熱也浮而散者爲恢仆諸浮而數者皆在陽爲熱其有躁者在手諸細而沉者皆在陰則爲骨痛其有靜者在足數動一代者病在陽之脉也洩及便膿血諸過者切之濇者陽氣有餘也滑者陰氣有餘也陽氣有餘爲身熱無汗陰氣有餘爲多汗身寒陰陽有餘則無汗身

寒推而外之內而不外者有心腹積也推而內之外而不內者身有熱也推而上之上而不下者腰足清也推而下之下而不上者頭項痛也按之至骨脉氣少者腰脊痛而身有痺也已上諸疾若非指明心了烏可得而妙也又平人氣象論曰一呼脉再動一吸脉亦再動呼吸定息脉行五動爲以大息不大不小不長不短不滑不澀不浮不沉不遲不數命曰平人平人者不病也蓋平人之常氣稟乎胃胃氣者平人之常氣也所以人常稟氣於胃故脉以胃氣爲本也正理論曰穀入於胃脉道乃行合靈樞經云胃爲水穀之海也又曰脉應四時曰平信夫四時之脉皆以胃氣爲本謂春弦夏洪秋毛冬石春之胃脉微弦曰平餘皆倣此逆四時則病矣若診婦人之脉妊身則有子也又曰陰搏陽則有子也又曰身汗而無脉者卽有妊也蓋重身者問其月事觀其體貌然後主治不可忽也又經曰察色按脉先別陰陽蓋陰陽者天地之道也是以治病者必求其本本於陰陽寒暑四時五臟之根也以脉言之則浮沉也以部言之則尺寸也故經云脉者陰陽之法以應五臟是謂呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味其脉在中也以浮沉論之則曰浮者陽也沉者陰也應在臟腑則浮而大散者心也浮而短濇者肺也浮而牢而長者肝也按之而大舉指來實者腎也所以肝腎俱沉也遲緩而長者脾也脾爲中州所以脉在中也仲景曰大浮數動滑皆陽也沉濇弱弦微皆陰也陽者熱也陰者寒也所以寒則脉來沉而遲熱則脉來浮而數故曰諸數爲熱諸遲爲寒無如此驗也脉經曰諸浮爲風諸緊爲痛諸伏爲聚諸弦爲飲芤者失血長則氣治短則氣病濇則煩心大則病進浮爲

在表沉爲在裏遲爲在臟數爲在腑又形壯脉細少氣不足以息者危形瘦脉大胷中氣多者斃形氣相得者生三五不調者病三部九候皆相失者死此先聖診脉之大法也故曰凡治病則察其形氣色澤治之無候其時也所以形氣相得者生色澤以浮者病易已脉從四時者可治脉弱似滑者是有胃氣此皆易治也若形氣相失或色夭不澤及脉逆四時或脉實益堅皆不可治經所謂必察四難而明告之又若病熱脉靜泄而脉大脫血脉實汗後脉躁此皆難治也若瘡疽之人膿血大泄脉滑數者難治也凡瘦膿多或如清泔脉滑大散寒熱發渴者治之無功也若患肺瘡者咳嗽膿血脉見洪滑治之難痊矣大凡診脉見浮數應當發熱而反惡寒雖頭項拘急四肢煩痛或復戰慄渴甚者但有痛處欲發瘡腫也

論脉證名狀二十六種所主病證

夫脉之大體二十六種此診脉之紀綱也細而論之毫釐少差舉治必遠總而言之逆從虛實陰陽而已兩者議之以要其中謹於諸家脉法中撮其機要翦去繁蕪載其精義

浮脉之診浮於指下按之不足舉之有餘再再尋之狀如太過瞥瞥然見於皮毛間其主表證或爲風或爲虛浮而大散者心也浮而短濇者肺也浮而數者熱也浮數之脉應發熱其不發熱而反惡寒者瘡疽之謂也

洪脉之診似浮而大按舉之則泛泛然滿三部其狀如水之洪流波之湧起其主血實積熱瘡腫論曰脉洪大者瘡疽之病進也如瘡疽結膿未成者宜下之膿潰之後脉見洪大則難治若自利者不可救治也

滑脉之診實大相兼往來流利如珠按之則累累然

滑也其主或爲熱或爲虛此陽脉也瘡疽之病膿未潰者宜內消也膿潰之後宜托裏也所謂始爲熱而爲虛也

數脉之診按之則呼吸之間動及六至其狀似滑而數也若浮而數則表熱也沉而數則裏熱也又曰諸數爲熱仲景曰脉數不時見則生惡瘡也又曰肺脉洪數則生瘡也診諸瘡洪數者裏欲有膿結也

散脉之診似浮而散按之則散而欲去舉之則大而無力其主氣實而血虛有表無裏瘡腫膿潰之後而煩痛尚未痊退者診其脉洪滑濕散難治也以其正氣虛而邪氣實也又曰肢體沉重肺脉大則斃謂浮散者也

芤脉之診似浮而輭按之中央空兩邊實其主血虛或爲失血瘡腫之病診得芤脉膿潰後易治以其脉病相應也

長脉之診按之則洪大而長出於本位其主陽氣有餘也傷寒得之欲汗出自解也長而緩者胃脉也百病皆愈謂之長則氣治也

牢脉之診按之則實大而弦且沉且浮而有牢堅之意若瘰癧結膿診得牢脉者不可內消也

實脉之診按舉有力而類結曰實經曰邪氣勝則實久病則虛人得此最忌瘡疽之人得此宜急下之以其邪氣與臟腑俱實故也

弦脉之診按之則緊而弦其似緊者爲弦如按弦而不移緊如內繩而轉動以此爲異春脉浮弦而平不時見則爲飲爲痛主寒主虛瘡疽論曰弦洪相搏外緊內熱欲發瘡疽也

緊脉之診似弦而緊按之如切繩而轉動其主切痛積癖也瘡腫得之氣血沉濇也亦主痛也

濇脉之診按之則散而復來舉之則細而不足脉濇則氣濇也亦主血虛瘡腫潰後得之無妨也

短脉之診按舉則不及本位內經曰短則氣病以其無胃氣也諸病脉短皆難治也瘡腫脉短真氣短也

細脉之診按之則縈縈如蜘蛛之絲而欲絕舉之如無而似有細而微其主亡陽衰也瘡腫之病脉來細而沉時直者裏虛而欲變證也

微脉之診按之則輭小而極微其主虛也真氣復者生邪氣勝者危瘡腫之病潰後脉微而勻舉自差也

遲脉之診按舉來遲呼吸定息方得三至其狀似緩而稍遲痼疾得之則善新疾得之則正氣虛憊瘡腫得之潰後自痊

緩脉之診按舉似遲而稍駛於遲仲景曰陽脉浮大而濇陰脉浮大而濇陰陽同等謂之緩脉見長緩百疾自瘳凡諸瘡腫潰後其脉濇遲緩者皆易愈以其脉候相應是有胃氣也

沉脉之診舉之不足按之方見如爛綿其主邪氣在臟也水氣得之則逆比陰脉也瘡腫得之邪氣深也

伏脉之診比沉而伏舉之則無按之至骨方得與沉相類而邪氣益深矣

虛脉之診按之不足遲大而輭輕舉指下豁然而空經曰脉虛則血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫脉虛宜托裏和氣養血也

輭脉之診按之則如帛在水中極輭而沈細亦謂之濡其主胃氣弱瘡腫得之補虛排膿托裏

弱脉之診似輭而極微來遲而似有仲景曰微弱之脉綿綿如瀉漆之絕其主血氣俱虛形羸不足大

抵瘡家沉遲濇弱皆宜托裏

促脉之診按之則去數來時一止而復來仲景曰陽盛則促主熱蓄於裏也下之則和瘡腫脉促亦急下之

結脉之診按之則往來遲緩時一止而復來仲景曰陰盛則結經曰促結則生代則死

代脉之診按之則往來動則中止不能自還因而復動者曰代脉也代者氣衰也諸病見之不祥大凡瘡腫之病脉促結者難治而況見代脉乎

動脉之診見於關上無頭尾如豆大厥厥然而動搖者是也脉經曰陰陽相搏故謂之動動於陽則陽氣虛而發厥動於陰則陰氣虛而發熱是陽生於尺而動於寸陰生於寸而動於尺不可不辯也

論三部脉所主證候

夫寸關尺者脉之位也浮沉滑濇者脉之體也奠位分體指文語證者診脉之要道也脉經曰大凡診候兩手三部脉滑而遲不浮不沉不長不短去來齊等者無病也

寸口脉浮者傷風也緊者傷寒也弦者傷食也浮而緩者中風也浮而數者頭痛也浮而緊者膈上寒膈下冷飲也沉而緊者心下寒而積痛沉而弱者虛損也緩而遲者虛寒也微弱者血氣俱虛也弦者頭痛心下有水也雙弦者兩脇下痛也偏絕者不遂也俱絕者不治也澈澈如羹上肥者陽氣微也連連如蜘蛛絲者陽氣衰也

關上中焦胃腹中事去來徐而緩者無病也浮者腹滿而不欲食胃虛脹也滑者客熱在胃也數者熱結中焦也沉伏者中焦水氣或嘔逆而吞酸也弱者胃氣虛也雖有虛熱不可大攻須防熱去則生寒也牢而實者腹滿鬱鬱嗜塞而不通或復大痛

澀者氣逆也芤則瀉血濇堅大實按之不減而有力者中焦實有結伏在胃也微浮者積熱不消蚘動心悸也

尺主下焦腰腎膝脛足中事也尺脉浮者風熱小便難也沉者腰背痛而腎氣不足數者臍下熱痛小便赤色而惡寒也遲者下焦寒而陰虛也緊者臍下小腹急痛也緩者脚弱下腫而痿痺也弱者下冷而腎氣衰也輭者脚不收而風痺小便難也伏者小腹痛而疝瘕教不化也細者溏泄而下冷也芤者小便澀血而下虛也牢而小者足膝寒痺脚下隱隱疼痛也細而急者筋攣不能行也來而斷絕者男子小腹有滯氣也婦人月水不利也

論三部脉所主雜病法訣

夫三部之中俱見一脉所主雜病累而言之脉經曰陽邪來見浮洪陰邪來見微細水穀之邪來見實堅寒癖之邪來見弦小又曰浮而滑者宿食也短而滑者酒病也遲而滑者脹滿也洪而大者傷寒也浮而數者傷風也浮而急者飲食不消脾不磨也沉而弦者寒氣結而陰痛也浮而緩者皮膚不仁也滑而散者癱瘓也遲而緩者寒瘧也浮而濇者霍亂也弱而濇者反胃也緊而滑者吐逆也短而數者心痛也弦而數者爲瘧也緊而急者尸遁也實小而堅者病在內而冷也浮滑而緊者病在外而熱也短而急者病在上也長而緩者病在下也長而弦者病在肝也滑而洪者病在心也微而輭者病在脾也浮而濇者病在肺也沉而緊者病在腎也又訣曰諸浮爲風或爲虛也諸緊爲痛或爲積也諸濇爲痺諸弦爲飲諸數爲熱諸遲爲寒芤則爲失血輭則爲虛若脉沉沉澤澤四肢不仁者亡祟也或大而懈懈者社祟也若脉來乍大乍小乍短乍長者鬼祟也

論診候肺疽肺痿法

夫肺者五臟之華蓋也處於胸中主於氣候於皮毛勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內感於肺也則汗出惡風咳嗽短氣鼻塞項強胸脇脹滿久久不瘥已成肺痿也風中於衛呼氣不入熱至於榮則吸而不出所以風傷皮毛熱傷血脉風熱相搏氣血稽留蘊結於肺變成瘡疽診其脉候寸口脉數而虛者肺痿也數而實者肺疽也肺痿之候久嗽不已汗出過度重亡津液便如爛瓜下如豕脂小便數而不渴渴者自愈欲飲者欲瘥此由肺多唾涎沫而無膿者肺痿也其肺瘡之候口乾喘滿咽燥而渴甚則四肢微腫咳唾膿血或腥臭濁沫胸中隱隱微痛者肺疽也又聖惠口中痛隱隱而微痛者肺疽也上肉微起者肺瘡也中府者穴也在雲門下一寸六分乳肋間動脉應手陷中也是以候始萌則可救膿成則多死若欲知有膿者但診其脉若微緊而數者未有膿也緊甚而數者已有膿也又內經曰血熱則肉敗榮衛不行必將爲膿大凡肺瘡當咳嗽短氣胸滿時唾膿血久久如粳米粥者難治若唾膿而不止者亦不可治也其嘔膿而自止者自愈其脉短而濇者自瘥浮大者難治其面色當白而反面赤者此火之剋金皆不可治

論將護忌慎法

大凡有瘡疽生皆只如黍粟粒許大其狀至微人多不以爲急此蘊大患宜速辯之不可自忽若能防之於未形理之於未成或朝覺而夕治求治於良醫則必無危困矣若因循慢忽詢於庸醫致令膿血結聚委之於命束手待斃不以去道遠乎以致筋骨敗遺穿通臟腑死者十有八九矣可不慎歟蓋患瘡疽之人托命庸醫任意措置危殆立至若用良醫則可保痊愈用醫之際不可不擇辯之何難若能飽讀經書久諳證候湯藥熟閑洞明色脉性情仁善孝義忠信臨事不惑處治有決方爲良醫委用勿疑然後要在病人自克不可恚怒悲憂叫呼忿根驕恣情性信任口腹馳騁勞役惟宜清靜恬澹耐煩爲宜於患人左右止息煩雜切忌打觸雜物諸惡音聲爭辯是非呪罵鬬毆及產婦婦男體氣不潔帶酒腥羶雞犬乳兒孝畜禽獸並須遠離設或親友重意問疾者可以預囑徐行低聲欵曲伺候禮畢躬退勿令嗟呀驚怪詰舊引其遠賞宴樂遠別親戚牽惹情懷但恐病人心緒凄愴尤不可亂舉方藥徒論虛實惑亂患人凝滯不決祇合方便省問不可久坐多言勞倦病人深不長便夫侍患者宜須壽近中年情性沉厚勤謹耐煩仁慈智惠全在調以粥藥無失時節勿令於患人左右弹指嗟咨掩淚竊言感激病人甚不利便飲食之間忌慎非細不可不載畜中勿食驢馬駝騾猪狗牛羊等肉雜魚龜鼈蝦蟹及淹浥臭陳自死病倒之類慎勿嘗啖飛禽之中忌食鵝鴨鴻鴈雀鶴鴛鴦鷺鷀鳩鴿鴉鷄雉及能學人言者慎勿食之野獸之中忌食獐鹿狐兎虎豹熊豺及爪牙害人有毒蟲獸并父母自本命生屬忌慎勿嘗啖菜蔬之中忌食黃瓜茄子蘭香芸薹胡荽生菜蓼芥菌蒜韭蒜葱薤慎勿食之果木之中忌食桃杏棗栗李柰梨梅輭棗紅柿櫻桃胡桃榛松林檎及諸蟲蚍未熟之果慎勿食之若其瘡疽膿潰腫消氣血虛弱則可食羊肉鵪鶉蔓菁蔓薔瓜蕣蘿蔔及黃白糧米細米稀粥輭飯若至肌肉漸生思想滋味則宜食白熟酥餅蜜粥羹湯熟輭溫和稀稠得中製造如法勿令太飽此時猶忌饅頭蒸餅餺飥餛飩肉角煎餅及炙煿煎炒鹹酸油膩脂肥魚肉若至肌膚欲平惡肉去盡瘡口收斂之際尚忌起立行步揖待賓客房酒宴會嗔怒沐浴

登陟臺榭運動肢體寒暑勞倦正宜調節飲食保攝以待瘡瘢平復精神如故氣力完全萬無所忌百日內慎勿觸犯之

論瘡疽腫虛實法

夫瘡疽膿潰腫毒浸展證候危惡者須辯虛實況夫虛者難補實者易瀉補瀉之法不可輕用若或少差利害甚大然而虛實證多端不可不辯有瘡之虛實有臟腑氣血上下真邪各有虛實故不同也分而言之則腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下輭慢膿稀者瘡疽之虛也瀉痢腸鳴飲食不入嘔吐無時手足並冷脉弱皮寒小便目利或小便時難大便滑利聲音不出精神不爽者悉臟腑之虛也大便硬小便澀飲食如故腸滿膨脹胷腦痞悶肢節疼痛口苦咽乾煩躁多渴身熱脉大精神昏塞者悉臟腑之實也凡諸瘡疽膿水清稀瘡口不合聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者氣血之虛也腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠粘頭目昏重者氣血之實也頭疼鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷腫語咬牙者上實也精滑不濕大便自利腰脚沉重腫肿而不寧者下虛也肩項不便四肢沉重目視不正睛不了了食不知味音嘶色敗四肢浮腫者真氣之虛也腫焮尤甚痛不可近積日不潰寒熱往來大便秘澀小便如淋心神煩悶恍惚不寧者邪氣之實也又曰真氣奪則虛邪氣勝則實又曰諸痛爲實痒爲虛也又曰診其脉洪大而數者實也微細而輭者虛也虛則補之和其氣托裏也實則瀉之疎利而自導其氣內經謂血實則決之氣虛則掣引之

辯瘡腫淺深法

夫瘡候多端欲辯淺深直須得法若不素知方論而妄生穿鑿者如大匠捨其繩墨以意度量安能中於規矩哉嘗聞古人有言曰多則惑少則得簡而論之則瘡疽槩舉有三種高而輭者發於血脉腫下而堅者發於筋骨肉皮色不相辯者發於骨髓又曰凡瘡瘡疽以手按搖瘡腫根牢而大者深也根小而浮者淺也又驗其人初生瘡之時便覺壯熱惡寒拘急頭痛精神不寧煩躁飲冷者其患瘡疽必深也若人雖患瘡疽起居平和飲食如故其疾浮淺也惡瘡初生其頭如米粟微似有痛痒誤觸破之即焮展覺有深意速服犀角湯及漏蘆湯通氣丸等取通利踈暢無用溶毒湯溻潰之類若浮淺者紙貼膏末差以此推之淺深之辯始終之次者也

辯膿法

夫瘡腫之疾毒氣已結者不可論內消之法即當辯膿生熟淺深不可妄開視其可否不至於危殆矣凡瘡疽腫大按之乃痛者膿深也小按之便痛者膿淺也按之不甚痛者未成膿也若按之即復者有膿也不復者無膿也非也必是水也若發腫都輭而不痛者血瘤也發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤也氣結微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所爲皆由熱毒蘊於內明乎三者腫毒丹瘮可以類推矣蓋皮膚微高起而肌厚或痛或痒移走無常者謂之腫有因風而得之者有因風熱相搏而得之者腫硬色白因熱而得之者腫焮色赤因風熱相搏而得之者久久而不消熱勝於風若不即治血不流通與氣乘之以成膿也又曰風多則痒熱多則痛此爲驗也又有丹毒者謂人身忽然變赤如塗丹之狀故謂之丹毒世俗有云赤瘤或因有瘡誤而相觸四畔焮赤謂之瘡瘤凡丹毒之疾皆遊走不定狀如雲氣者是也小兒得之最忌百日之內謂之胎瘤以其氣血嫩弱臟腑柔脆難任鍼針所以忌也又頸腋之間而生結核初如豆粒或如梅李核累累相連歷歷三五枚

血也宜急治之不爾則邪毒內攻腐爛腸胃不可救也又肺癰論曰始萌則可救膿成即死不可不慎也又久咳膿如粳米粥者不治嘔膿而止者自愈也又腸癰論曰或遠臍生瘡膿從瘡出者有出臍中者惟大便下膿血者自愈也

辯瘡疽癤腫證候法

夫瘡疽癤腫其名甚多載之紛紜方書百緒及至臨疾治之無據不知所以內經曰知其要者一言而終不知其要者流散無窮愚雖不才姑揣其要而言之熱發於皮膚之間是以浮腫根小至大不過三三寸者癤也六腑積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚腫皮光輭侵展廣大者癰也五臟風積熱攻焮於肌骨風毒猛暴初生一頭如瘡癤白焦枯觸之應心者疽也夫癰疽發於六腑若瘡原之火外潰膚肉疽生五臟沉澀難療若陶室之燧內消骨髓癤則易療惟難將息而遲瘡疽則難療易得瘥復夫癤與瘡初生並宜灸之謂其氣本浮達以導其熱令速暢也疽則烙不宜灸謂其氣本深沉須達其原也凡瘡疽生於外皆由熱毒蘊於內明乎三者腫毒丹瘮可以類推矣蓋皮膚微高起而肌厚或痛或痒移走無常者謂之腫有因風而得之者有因風熱相搏而得之者腫色白因熱而得之者腫焮色赤因風熱相搏而得之者久久而不消熱勝於風若不即治血不流通與氣乘之以成膿也又曰風多則痒熱多則痛此爲驗也又有丹毒者謂人身忽然變赤如塗丹之狀故謂之丹毒世俗有云赤癤或因有瘡誤而相觸四畔焮赤謂之瘡癤凡丹毒之疾皆遊走不定狀如雲氣者是也小兒得之最忌百日之內謂之胎癤以其氣血嫩弱臟腑柔脆難任鍼針所以忌也又頸腋之間而生結核初如豆粒或如梅李核累累相連歷歷三五枚

久久不消以漸長大或發寒熱者謂之瘰癧有風毒者得於風熱毒者得之於熱氣毒者得之於氣悉由風熱邪氣蘊經所成證候不同治之者亦各異矣

辯瘡疽善惡法

夫瘡疽證候善惡逆從不可不辯從來醫瘡集衆五善七惡殊不知此特謂腸胃之內臟腑瘡疽所論之證也發背腦疽別有善惡之證載之于後蓋七惡者煩躁時嗽股痛渴甚或泄痢無度或小便如淋者一惡也膿血既洩腫脹尤甚膿色敗臭痛不可近二惡也目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上看三惡也喘粗短氣恍惚昏眩四惡也肩背不便四肢沉重五惡也不能下食服藥而嘔食不知味六惡也聲嘶色敗唇鼻青赤面目四肢浮腫者七惡也動息自等飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消水鮮不臭三善也神彩精明語聲清亮四善也體氣平和五善也病有證合七惡皮急緊而如善者病有證合五善而皮緩虛如惡者夫如是者豈淺識之所知哉只知五善併至則善無以加矣七惡併至則惡之極矣愚意裁之凡患瘡疽之時五善之中乍見一二善證瘡亦回也七惡之內忽見一二惡證宜深懼之大抵證候瘡疽之發虛中見惡證者不可救也實證無惡候者自愈大凡膿潰之後而煩疼尚未除者診其脉洪滑麤散者難療微濇遲緩者易除此善惡之證於診候之中亦可知也發背腦疽及諸惡瘡別有五逆之證者白睛青黑而眼小服藥而嘔傷痛渴甚脾項中不便音嘶色敗者是為五逆其餘熱渴痢嘔蓋毒氣入裏臟腑之傷也當隨證以治之

砭鑱法

夫上古制砭石大小者隨病所宜也內經謂針石砭石鑱針其實一也今時用鑱者從聖濟總錄丹毒論曰法用鑱割出血明不可緩也合篇鵲云病在血脉者治之以砭石此舉素問血實宜決之又氣血形志論曰形樂志樂病生於內治之砭石蓋砭石者亦東方來為其東方之民其病多瘡瘍其法宜砭石砭石之用自有證候非止丹瘡也但見腫起色赤遊走不定宜急鑱之先以生油塗赤上以鑱鑱之要在決洩其毒然而此法不可輕用忌其太深內經所謂刺皮無傷肉以其九鍼之用而各有所宜也砭鑱之法雖治瘡疽不可輕用也

貼熨法

夫瘡腫之生於外者由熱毒之氣蘊結于內也蓋腫於外有生頭者有浸腫者有皮厚者有皮薄者有毒氣深者有毒氣淺者有宜用溫藥貼熨者有宜用涼藥貼熨者有可以乾換其藥者有可以濕換其藥者深淺不同用藥亦異是以不可不辯也若瘡腫初生似有頭者即當貼溫熱藥引出其熱毒火就燥之義也於四畔赤焮處揭生寒藥貼熨之折伏其熱勢驅逐其邪惡撲火之義也夫生寒藥勢氣力精全性味雄健或有療者不本物理皆通用藥草膏之類有勢力徹欲波瀾者不亦難乎又有粗工不審逆從便用寒藥敷貼遂逐邪毒復入于內歸于肝心十死八九矣大抵敷貼之法欲消散腫毒血脉疎通寒熱逆從斷其去就焉慎不可批方無權安能散于鬱結不成膿乎其腫皮厚者以故帛布或以紙花膏藥貼之常令滋潤勿令燥也夫瘡疽既作毒熱聚于塗藥貼熨之待其藥乾換腫皮薄者即用疎紗或薄紙塗藥貼熨之其藥未乾即當換之若至膿潰之後即貼溫肌生肉膏藥要在逐其腐排惡汁取死肌生良肉全藉溫熱膏劑之力也切勿用寒涼之藥水調貼之夫血脉喜溫而惡寒若著冷氣過理即血滯難療矣

湯潰瘡腫法

夫湯潰瘡腫之法宜通行表發散邪氣使瘡內消也蓋湯水有蕩滌之功古人有論瘡腫初生經一二日不退即須用湯水淋射之其在四肢者湯潰之其在腰腹背者淋射之其在下部委曲者浴潰之此謂跡導脉理通調血脉使無凝滯也且如藥二兩用水二升為則煎取一升半以淨帛或新綿蘸藥水稍熱淋其患處漸漸喜湯淋浴之稍涼則急令換慎勿冷用夫血氣得熱則凝澀得熱則淳澤日用五七次病甚者日夜不住或十數次腫消痛止為驗此治瘡腫神良之法也

鍼烙瘡腫法

夫瘡疽之疾證候不一鍼烙之法實非小端蓋有淺有深有遲有速宜與不宜不可不辯蓋疽腫皮厚口小腫多膿水出不快者宜用鍼烙癤皮薄脆用鍼以決其膿血不可烙也如有未成膿已前不可以諸藥貼熨潰潰救療以待自消久久不消內潰成膿即當弃藥從其針烙當用火鍼如似火筋磨令頭尖如棗核樣圓滿用燈焰燒須臾作炬數搨油燒令赤於瘡頭近下烙之一烙不透即須再烙令透要在膿水易出不假按抑近代良醫倉卒之際但以金銀鐵鋌其樣如鍼者可通用之實在洩其毒也或只以木炭熱火猛燒通赤蘸油烙之尤妙烙後實者撚髮為紙虛者以紙為紙於紙上蘸藥紙之上以帛攤溫熱輿粘膏藥貼之常令滋潤勿令燥也夫瘡疽既作毒熱聚攻蝕其膏膜肌肉腐爛若不鍼烙毒氣無從而解膿於無從而泄過時不烙反攻其內內既消敗欲望其生豈可得乎嗟乎此疾針烙取差實為當理然忌太早亦忌稍遲當見膿丁不審其證淺深妄施針烙之法或瘡深針淺烙毒氣不得泄以致內潰或瘡淺烙

深誤傷良肉筋骨腐爛或抑擦掀動加益煩痛或針之不當別處作頭或即時無膿經久方潰遂使痛中加痛真氣轉傷詳其所由不遇良醫也以此推之凡用醫者不可不擇縱常醫療之得瘥者幸矣

灸瘡潰腫法

夫疽則宜灸不宜烙癰則宜烙不宜灸丹瘡腫毒宜瀉潰之腫皮光輭則鍼開之以洩其毒治瘡之手法迨不過此而各有所宜故聖惠方論曰認是疽瘡便宜灸之一二百壯如菉豆許大灸後覺似煩痛經一宿乃是火氣下徹腫內熱氣被火導之隨火而出所以然也若其瘡痒宜隔豉餅子灸之其餅須以椒薑鹽葱相和爛搗捏作餅子厚薄如折三錢以來當瘡頭豉餅子上灸之若覺太熱即擡起又安其上餅子若乾更換新者尤佳若其瘡痛即須急灸壯數多爲妙若其膿已成者慎不可灸即便針開之即得瘥也若諸瘡經久不瘥變成瘻者宜用硫黃灸法灸之其法硫黃一塊可瘡口大小安之別取少許硫黃於火上燒用釵尖挑起點硫黃令著三五遍取膿水乾差爲度若其發背初生即宜上餅灸法灸之初覺背上有瘡痒痒頗異認是發背即取淨土水和捻作餅子徑一寸厚二分貼著瘡上以艾作炷灸之一炷一易餅子其瘡粟米大時可灸七七炷其瘡如錢許大日夜不住灸以瘥爲度已上數法並依本方一一親驗所以載之愚謂瘡醫自幼至老凡所經驗必須寫之寄記痘瘻惡瘡諸醫不驗者取蟒蟮剪去兩頭安瘡口上以艾灸之七壯一易不過七枚無不効者又法用乞火婆乭灸之同前法累驗之神効人皆秘之往往父子不傳又法赤皮蒜搗爛焊作餅子一如豆豉餅子灸法灸之彌佳

內消法

夫瘡疽丹腫之生皆由陰陽不調榮衛凝澀氣血不流之所生也古人有言曰陽滯於陰則生瘡陰滯於陽則生疽瘡疽之生有內有外內生於臟腑胃腹之中外則生於膚肉筋骨之表發無定處夫鬱滯之本則因氣血不流蒸氣不能外達留滯而成內熱瘡疽所生焉若初覺氣血鬱滯皮肉結聚腫而未潰特可疎滌風熱通利腸腑一二行徐次諸湯潰潰即得內消矣不然則治之稍慢毒熱不散反攻其內致令膿血之聚也內經謂治病必求於本蓋瘡疽本乎中熱之鬱結不通也其風邪寒氣所聚也治之宜溫熱之劑和血令內消也辯之有法須認風寒則腫硬色白熱毒則漲腫色赤以爲異也如有氣已結聚不可論內消之法宜用排膿托裏之藥此皆先後之次也

追蝕瘡疽腫法

夫瘡瘍生於外皆由積熱蘊於內內經謂血熱肉敗榮衛不行必將爲膿留於節膝必將爲敗蓋瘡疽膿潰爛之時頭小未破瘡口未闢或毒氣不出疼痛難任者所以立追蝕膿之方法使毒外泄而不內攻惡肉易去好肉易生也若其瘡紝其血出不止者則未可紝於瘡上摻追蝕之藥待其熱可紝方紝若其瘡紝之痛應心根者亦不可以強紝之恐觸其瘡其漲痛必倍變證不無不可不慎也若瘡痛膿成未破於上薄皮剥起者即當用破頭代鍼之劑安其上以膏貼之膿出之後用搜膿化毒之藥取効如神矣若膿血未盡便用生肌斂瘡之劑務其早愈殊不知惡肉不盡其瘡早合後必再發不可不慎也

托裏法

夫瘡疽丹腫結核瘰癧初覺有之即用內消之法經久不除氣血漸衰肌肉不膿汁清稀毒不出瘡口不合成聚腫不赤結核無膿外證不明者並宜托裏

膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣虛者托裏補之陰陽不和托裏調之大抵托裏之法使瘡無變壞之證凡爲瘡醫不可一日無托裏之藥然而寒熱溫涼煩渴利嘔臨證宜審其緩急耳

止痛法

夫瘡疽之證候不同寒熱虛實皆能爲痛止痛之法殊非一端世人皆謂乳沒珍貴之藥可住疼痛殊不知臨病制宜自有方法蓋熱毒之痛者以寒涼之劑折其熱則痛自止也寒邪之痛以溫熱之藥熨其寒則痛自除矣因風而有痛者除其風因濕而痛者導其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之因膿鬱而閉者開之惡肉侵潰者引之陰陽不和者調之經絡祕澀者利之臨機應變方爲上醫不可執方而無權也

用藥增損法

古人用藥因病制宜治不執方隨病增損療積聚補益可用丸藥以從舊不改方增損蓋瘡疽危要之際證候多種安有執方之論固可臨時加減以從其法只如發背腦疽惡丁腫膿潰前後虛而頭痛者於托裏藥內加五味子恍惚不寧加人參茯苓虛而發熱者加地黃栝蔞根往來寒熱者并潮熱者加柴胡地骨皮渴不止者加知母赤小豆大便不通者加大黃芒硝小便不通者加木通燈草虛煩者加枸杞子天門冬自利者加厚朴四肢厥逆者加附子生薑嘔逆者加丁香藿香多痰者加半夏并陳皮膿多者加當歸川芎痛甚者加芍藥乳香肌肉遲生者加白歛官桂有風邪者加獨活防風心驚怯者加丹砂口目瞤動者加羌活細辛愚雖不才自幼及老凡治瘡疽常依此法加減用藥取効如神後之學者宜細詳焉

療瘡腫權變通類法

夫瘡疽之病治療多方總而論之各有所宜砭淋漓及敷掃貼熨鍼鑱灸烙用之不同蓋知其道也舉治必効昧於理者利害不無嘗見以寒療熱以熱療寒古今之通論也又有檢方療病妄製加減以意裁之自以爲可殊不知病有逆從治有緩急法有正權方有奇偶用有輕重夫醫者意也得其意然後能變通也達其變通者悟其道而省其理也則左右逢其源矣愚雖不才畧陳萬一嘗見治寒以熱而寒彌甚治熱以寒而熱彌熾者何也蓋不知五臟有陰陽之性其可因其類而取之也假如心實生熱者當益其腎腎水滋熱將自除腎水虛生寒當補心心火既降寒將自除此所謂寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽也又寒因熱用熱因寒用要在通其理類而已又聞微者逆之甚者從之何謂也蓋治寒以熱必涼而行之治熱以寒必溫而行之此亦欲其調和也其間有正有權者何也蓋病有微有甚微者逆治理之正也甚者從治理之權也然爲瘡科於補瀉汗下標本逆從正權之理烏可闕而不知也大凡治療瘡疽之要法曰初覺熱毒發熱鬱結而作瘡疽一二日宜先服五利湯蕩滌邪氣疎通臟腑令內消也古今湯法謂切刮吹咀如麻豆大以猛火急煎無令過熟欲其速利也次有丸散宣導血脉漸次消磨令緩散也助以沐浴調和榮衛行經絡也更當膏潤溫養熏磨傅四畔貼熨之藥順其陰陽也追蝕托裏汗下調補臨時製宜淺深緩急自有等差男女貴賤亦當別論晉尚書楷澄曰寡婦尼僧異於妻妾雖無房室之勞而有憂思之苦此深達其情者也又仲景云物性剛柔發居亦異治亦不同也所以黃帝與四方之問岐伯舉四治之能況病之新舊形志樂苦豈可執方無權以求其愈疾哉亦有瘡疽腫痛初生一二日便覺脉沉細而煩悶臟腑弱而皮寒邪毒猛暴恍惚不寧外證深沉者亦宜即當用托裏散或增損茯苓湯反溫熱之劑以從治之

論五發疽

夫五發者謂癰疽生於腦背骨髓是也大槩論之分爲三等一者疽也二者癰也三者瘤也夫疽初生如黍米大痒痛有異悞觸破之即燃展四畔赤腫沉悶牽引脇肋疼痛數日之後漸覺肌膚壯熱惡寒煩渴腫暈侵展爛漿汁出積日不潰抑之則流血者謂之發背疽也其發於腦者爲腦疽也其發於脊眉間者以類呼也又有初生其狀無頭腫闊三四寸始覺注悶疼痛因循數日皮光微輭者甚則亦令人發熱惡寒頭痛煩渴者謂之發背癰也又有初生一頭色如浮赤而無根腫見於皮膚之間大小一二寸者瘤也三者之候惟疽最重此疾初生皆曰滋味與厚衣衣服厚暖則表易招寒滋味過多則五臟生熱臟腑積熱則血脉不流而毒氣凝滯邪氣伏留熱搏於血血聚則肉潰成瘡瘡則爲癰實則爲癰深則爲疽矣亦有因服金石發動而患此疾者亦有平生不服金石藥而亦患此疾者蓋由上祖曾服餌者其毒氣流傳子孫此病初生認是疽則宜速療之若氣實之人急服五香連翹湯漏蘆湯若年幾未五十少壯實者可服五利大黃湯化毒丸取通利臟腑一二行瘡頭上用追毒散之類貼溫熱膏劑更潰腫湯潰毒湯淋潰之如此調治以待膿成已前不可以諸藥救療以安患人之心慎勿惱爾著至膿成敗潰宜服五香湯及內托裏散茯苓湯當歸托裏散之類渴不止者服竹葉黃芪湯乳香散勿爲大熱服大黃朴硝苦寒之藥若因服利藥而利不止者死矣若瘡中惡肉未退臟水不快者即用追蝕之藥或鉛子紐之上用鹿角散以醋熬爲糊貼之惡肉退去好肉漸生即用搜膿散翠霞散之類紐之若瘡中毒氣未盡慎勿早斂忌早上生肌之藥縱得平復必再發其間調理次第臨時制宜將護忌慎之法耳

論癰疽

夫瘡腫之患莫大乎癰疽然而癰疽何以別之經所謂榮衛稽留於經脉之中則溫不行血脉不行則陽氣鬱遏而不通故生寒熱穢毒之氣騰出於外畜結爲癰久而不散熱氣乘之腐化爲膿然而骨髓不焦枯腑臟不傷敗可治而愈也何爲疽五臟風毒積熱毒熱熾甚下陷肌膚骨髓皆枯血氣涸竭其腫色天堅如牛領之皮故命曰疽癰者其腫皮薄以澤此其候也癰疽之生有內有外內生胃腹臟腑之中外生膚肉筋骨之表凡此二毒發無定處而有常名夫鬱滯之本始於喜怒憂樂不時飲食居處不節或金石草藥之發動寒暑燥濕之不調使陰陽之不平而蘊結外使榮衛凝澀而腐潰輕者起於六腑浮淺而爲癰氣行經絡而浮也重者發於五臟沉澀而爲疽氣行經絡而沉也明乎二者腫毒丹疹可以類推矣

論附骨疽

夫附骨疽者以其毒氣深沉附著於骨也此疾與風相類而不同人不能辯治之悞矣蓋附骨疽者由秋夏當時爲冷折之風熱伏結附骨成疽賊風之候由風邪之氣搏於骨節故其痛深徹骨髓遇寒則痛甚附骨疽痛而不能轉初按之應骨皮肉微急洪洪如肥狀者是也其賊風皮骨不甚熱而索索惡寒時復汗出常欲熱熨痛處即得少寬其附骨疽初時但痛無時乍寒乍熱而無汗者經久不消極陰生陽寒化爲熱而潰也賊風不治久而變爲彎曲偏枯所以不同也認是賊風則服引越脾治風之劑即得差矣

認是附骨疽急宜服漏蘆湯或五香連翹散疎下之次用內消升麻湯及潰膏貼之類縱不能消亦得浮淺及有緩疽石疽與附骨疽亦相類矣異者蓋緩疽石疽皆寒氣所作深伏於骨髓之間有腫與皮肉相似若疼而堅硬如石故謂之石疽緩疽其熱緩慢積日不潰久乃亦紫黯色皮肉俱爛故名曰緩疽此二者其治初覺便宜補虛托裏溫熱之劑以取消矣其次調治臨疾制宜故不復具載矣

論陰瘡

夫陰瘡者大槩有三等一者妬精瘡三者陰蝕瘡又曰下疳瘡蓋濕瘡者由腎經虛弱風濕相搏邪氣乘之瘙痒成瘡浸淫汗出狀如疥癬者是也妬精者由壯年精氣盈滿久曠房室陰上生瘡赤腫作害妨悶痒痛者是也陰蝕瘡者由腎臟虛邪熱結下焦經絡瘡濕氣血不行或房勞洗浴不潔以致生瘡隱忍不醫瘍腫尤甚由瘡在裏措手無方疼痛注悶或小便如淋陰丸腫痛是也或經十數日潰爛血膿肌肉侵蝕或血出不止以成下疳若身體壯熱煩渴惡寒宜急治之以大豆甘草湯漬之漬毒湯者洗浴之服五香連翹湯漏蘆湯等疎之更以截疳抵聖散乾糝之四畔用磨風膏溫潤之後以將護忌慎之渴不止者服竹葉黃芪湯大便輭者宜服托裏茯苓調治之夫如是則無不差矣

論時毒

夫時毒者為四時邪毒之氣而感之於人也其候發於鼻面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根令人增寒發熱頭痛肢體痛甚者恍惚不寧咽喉閉塞人不識者將為傷寒便服解藥一二日腫氣增益方悞始召瘡醫原夫此疾古無方論世俗通為丹瘡病家惡言時毒切恐傳染考之於經曰人身忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡毒所為謂之丹瘤與夫時毒特不同耳蓋時毒者感四時不正之氣初發狀如傷寒五七日之間乃能殺人治之宜精辯之先診其脉滑數浮洪沉緊弦濇皆其候也蓋浮數者邪氣在表也沉濇者邪氣深也認是時毒氣實之人急服化毒丹以攻之熱實以五利大黃湯下之其有表證者解毒升麻湯以發之或年高氣輭者五香連翹湯主之又於鼻內嚏通氣散取十餘嚏作効若嚏藥不嚏者不可治之如嚏出膿血者治之必愈如左右看病之人日日用嚏藥嚏之必不傳染切須忌之其病人每日用嚏藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經三四日不解者不可大下猶宜和解之服犀角散連翹散之類至七八日大小便通利頭面腫起高赤者可服托裏散黃耆散宜針鏃砭割出血泄其毒氣十日外不治自愈也此病若五日已前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面不腫食不知味者必死之候治之無功矣然而此疾有陰有陽有可汗有可下嘗見驢工但云熱毒只有寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣

論諸瘡

夫諸瘡之生其類甚多種大小方書載之紛紛以要而論槩舉四等一者因於氣血積留而結於內者謂腸胃之中癰疽是也二者因於氣血積留而結於外者謂丁丁九瘻五痔之類是也三者不因氣血而為瘡謂堕仆并金刃湯火炙烙而傷皮肉之類是也四者不因氣血而骨肉損傷者謂蟲獸瓜牙所害之類是也然而四等皆不難損於肌膚害於筋骨不必見載今於隨方條下該說治證以法附之為治之者臨疾制宜適事為故耳

論丁瘡腫

夫丁瘡者以其瘡形如丁蓋之狀者是也古方論之凡有十種華元化載之五色丁千金方說丁瘡有十三種以至外臺必要神巧萬全其論頗同然皆不離於氣客於經絡五臟內蘊毒熱初生一頭凹腫痛青黃赤黑無復定色便令煩躁悶亂或增寒頭痛或嘔吐心逆以針刺瘡不痛無血是其候也其候本因甘肥過度不慎房酒以致邪毒留結遂生丁瘡內經曰膏粱之實足生丁瘡此之謂也其治之法急灸艾炷灸之若不覺痛者針丁四邊皆令血出以迴瘡鋌子從針孔紐之上用膏藥貼之仍服五香連翹湯漏蘆湯等疎下之為効若或針之不痛無血者以猛火燒錢針通赤於瘡上烙之令如焦炭取痛為効亦紐前鋌子用膏藥貼之經一二日膿潰根出服托裏湯散依常療之以取平復如針不痛其人眼黑或見火光者不可治也此邪毒之氣入臟腑故也養生方云人汗入食肉食之則生丁瘡不可不慎也

辯丁腫十三種形色禁忌

凡療丁腫皆刺瘡心至痛處又刺四邊十餘下令血出去血傳藥藥力得入針孔中則佳若不達裏藥力不到又看口中頰邊舌上有赤黑如珠子者是也瘡上按之磣痛應心者是秋冬寒毒久結皮膚中變作此瘡不急療之日夜根長流入諸脉數道如箭入身顫掉不已若不慎口味房室死不旋踵經五六日不差眼中見火光心神昏昧口乾心煩嘔吐不定宜速治之

一曰麻子丁其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子油衣布衣并入麻田中行

二曰石丁其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉微痛忌瓦礫塼石之屬

三曰雄丁其狀皰頭黑靨四畔仰皰漿起有水出色

黃大如錢孔形高者忌房室

四曰雌丁其狀瘡稍黃向裏靨亦似灸瘡四面皰漫起心凹色赤如錢孔者忌房室

五曰火丁其狀如湯火燒灼瘡頭黑靨四邊有煙漿又如赤粟米者忌火燒烙

六曰爛丁其狀色稍黑有白班瘡中潰有膿水流出瘡形大小如匙面者忌沸熱食爛物

七曰三十六丁其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今日生一明日生二及至十若滿三十六漿所不能治未滿三十六可治忌嗔怒蓄積愁恨

八曰蛇眼丁其狀瘡頭黑皮浮生形如小豆狀似蛇眼大體硬忌惡眼人看并嫉妬人見忌毒藥

九曰鹽膚丁其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起食鹽大忌

十曰水洗丁其狀大如錢形如錢孔瘡頭白裏黑靨汁出中硬忌飲漿水水洗渡河

十一曰刀鐮丁其狀濶狹如薤葉大長一寸左側肉黑如燒烙忌刺及刀鐮切割鐵刃所傷可以藥治不可亂攻

十二曰浮漚丁其狀瘡體曲圓少許不合長而狹如薤葉大內黃外黑黑處刺之不痛黃處刺之痛

十三曰牛拘丁其狀肉色皰起指不破

右十三種丁瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子丁一種始末惟痒初錄忌者不得觸犯觸犯者發作難治療其浮漚丁牛拘丁兩種無所禁忌縱不療亦不能殺人其狀寒熱與諸丁不同皆宜將護依法治療禁忌勿得觸犯若或觸犯春強瘡痛極甚不可忍者是也又云丁腫初發時突起如丁蓋故謂之丁令人惡心惡寒四肢強痛一二日瘡變爲焦黑色腫大光起根硬刺之不覺痛皆其候也在手足頭面胸背骨節間最急其餘處則可毒入腹則煩悶恍惚似醉如此者三二日死矣皆不可不速治也

論瘰癧治法

夫瘰癧之病其名甚多巢氏病源載之三十六種千金聖惠所論瘰癧九漏總論說有風毒熱毒氣毒之異瘰癧結核寒熱之殊其本皆由恚怒氣逆憂思過甚風熱邪氣內搏於肝蓋怒傷肝肝主筋故令筋脈結而腫其候多生於頸腋之間結聚成核初如豆粒後若梅李核累累相連大小無定初覺增寒壯熱咽項強痛腫結不消者當便服五香連翹湯或牡礪大黃湯疎下三兩行於上貼十香膏烏犀膏及用淋漏腫湯潰毒湯時復淋漏如此救療即得消散若未消散可服內消丸或皂角丸之類漸以末差若腫結深硬荏苒月日不能內消者久必成膿若腫高而稍軟其人面色萎黃皮膚壯熱上蒸膿已成也可以針決核中令其潰散則易愈也治法如瘡法于瘡口中用追毒蝕肉鈇子紐之於上用烏犀十香膏等貼之及托裏之劑和之經久不差或愈而復發或別處自穴膿水透出流津不止肌體羸瘦者變成九瘻內經曰陷脉爲瘻留連內腋即此病也可用蒜餅子灸之然後瘡口上用紫金散翠霞散等於上紐貼膏藥求差其將護忌慎治療用法無逆次焉

論痔瘻

夫痔瘻之候其名有五一曰牝痔二曰牡痔三曰氣痔四曰血痔五曰酒痔又曰腸風痔脉痔雌雄痔皆五痔之別名也其狀初生悉在肛邊或如鼠乳或結小核痒痛注悶甚者身熱惡寒諸方論之皆由房酒過度久嗜甘肥不慎醉飽以合陰陽勞擾血脉腸癖滲漏衝注下部肛邊生瘡變爲痔疾治法始覺痔作便服通氣丸槐角丸熱實者服諸利湯疎利臟腑及洛洗薰熨以取內消切忌酒麪辛熱房室肥膩稍縱嗜欲腐滑膿血或逗流淫汁歲月已深旁穿竅穴即變痔漏即須用寸金鋌子三五次搽愈若能味無味之味正味足矣事無事之事百事備矣其次服餌調節謹慎合宜未有不差者也

翰林院侍讀學士選充御藥院外科太醫劉禮之纂集
明　新安　後學　吳勉學校正

漏蘆湯

治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧丁腫血瘖瘡疽

初覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱大便秘澁小便赤黃並宜服之如身莫服

漏蘆　白斂　黃芩去黑心　麻黃去節　枳實麩炒去穰　升麻　芍藥　甘草炙　硝硝已上各壹兩　大黃貳兩

右除硝外餘㕮咀與硝同和勻每服三錢氣實人五錢水一盞半文武火煎七沸去柤空心熱服

化毒丹

治百種惡瘡毒腫初覺一二日咳逆煩悶或喘喉閉塞發熱惡寒

沒藥　乳香已上各壹兩研別研　草烏頭醋浸炮裂　浮石已上各壹兩煅赤醋淬漿次研除醋別貯　巴豆肆拾枚面去皮用別研

右五味為細末用浮石烏頭餘醋打麵糊為丸如豌豆大每服五七丸食後冷酒送下忌飲取快利三二行或吐出惡為効

內消丸

治瘡腫初生及瘰癧結核熱毒毒鬱滯服之內消矣大効

青皮　陳皮已上各貳兩　牽牛糊裹取頭末壹兩　薄荷葉　皂角已上各捌兩不刮者去柱皮搥碎二味水一斗煮令極軟揉汁去柱用慈喊膏

右將青皮陳皮末并牽牛末和勻用前膏子和丸如菉豆大每服三十丸食後荊芥茶清溫水皆可下之

五利大黃湯

治人年四十已前氣血盛多若患瘡疽大小便秘

大黃根　黃芩去腐　升麻已上各貳兩　芒硝　梔子已上各壹兩貳錢

右㕮咀每服五錢水一盞半煎五七沸去柤空心稍熱服

內消升麻湯

治證同前

大黃　升麻　當歸　黃芩去腐　枳實麩炒去穰　芍藥已上各貳兩伍錢　甘草炙壹兩伍錢

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分去柤食前稍熱服

五香連翹湯如不用五香曰七味連翹湯

治證同前

沉香　藿香葉　木香　丁香已上各壹兩　麝香一字五味為粗末另研　連翹　射干　獨活　升麻　甘草炙　寄生草已上各壹兩　大黃壹兩伍錢

右七味㕮咀與前五味和勻每服五錢水一盞半煎至一盞去柤溫服取利為效未利則再服食前

牡礪大黃湯

治證同前

牡礪　木香　大黃炒已上各等分

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分春夏露溺一宿於雞鳴時空心服之冬月於暖處放一宿婦人重身者勿服此藥快利三兩行便勿服已上五方對證選用

和血通氣丸

治證同前

人參壹兩　麥門冬去心貳兩　大黃　黃芩去腐　黃藥已上各肆兩　牽牛壹兩炒香取頭末壹兩　黃連伍兩　大黃已上各貳兩伍錢　芍藥已上各貳兩

右六味為細末煉蜜為丸如豌豆大每服二三十丸食後溫水送下尋常積熱之人隔三二日服此藥微利潤動未不生瘡腫如已早覺者服之亦得內消矣

地黃煎丸

治臟腑有熱胸膈痰實血氣不和經絡秘澁多生瘡腫已患惡瘡毒腫大小便結澁

生地黃新者搗兩汁水浸研如泥　黃芩去腐炒兩　黃連伍兩　枳殼麩炒去穰　大黃已上各貳兩伍錢　人參貳兩

右除地黃煎外並為細末再和地黃煎和搗入煉蜜丸如豌豆大每服五七十丸食後溫水下素有熱之人日服百餘丸不發瘡瘍年高氣弱之人亦宜常服清利胸膈明目

槐角煎丸

治瘡瘍痤癰疔癰赤腫守瘡

天麻　川芎　甘草炙　黃藥子　甘菊花　何首烏　防風已上各貳兩　苦參已上各壹兩　人參已上各壹兩　皂角不蛀者去皮弦子並酥炙用　槐角升仁別研　荊穗炒

右除皂角外槐仁與諸藥為細末入膏內溲和煉蜜為丸如豌豆大每服五十丸食後竹葉湯下

治風毒瘙癢

皂角不蛀者去皮弦子並酥炙用　何首烏　玄參　薄荷葉已上各壹兩

右為細末與前膏子同煉蜜為丸如豌豆大每服

一方四十丸食後溫水送下
若散出野人多法方

治遍身瘡疥經年不効

苦參　蔓荊子　何首烏
荊芥穗　蔵靈仙已上各等分

右為細末每服二錢食前酒調下日進二服忌發
風物

苦參丸

治證同前

山梔子仁　苦參　防風
玄參　獨活　枳實
甘菊花　黃連去鬚　黃芩去心
大黃已上各等分

右為細末煉蜜為丸如豌豆大每服五十丸茶酒
任下食後服

肺風丸全體治肺方

治面鼻風瘡及皰皯

細辛　旋覆花　羌活已上各壹兩
硇砂蝕去翅足　苦參已上各貳兩

右為細末輭飯和丸如梧桐子大每服五十丸茶
酒任下不拘時

連翹散

治瘡瘍癰腫一切惡瘡疼痛煩渴大便溏泄虛熱
不寧

連翹　山梔子　甘草
防風已上各等分

右為麤末每服三錢水一盞煎至七分去柤溫服
不拘時候

竹葉黃芪湯出總錄一百二十

治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發大渴者

淡竹葉貳兩　黃芪　當歸
川芎　甘草　黃芩去心
芍藥　人參　麥門冬去心
半夏湯洗　石膏已上各貳兩　小地黃焙兩

右為麤末每服五錢水一盞半竹葉五片生薑五
片煎至一盞去柤溫服

枳殼丸出總錄

治瘡疽熱癰腫瘰癧

枳殼麩炒去穰　牽牛炒取頭末　木香
青皮已上各壹兩　甘草　大黃

右為細末用皂角長一尺許者三條約三兩搗焦
搥碎以好酒煮輭接取汁熬膏糊和前藥末為
丸如梧桐子大每服三五十丸食後茶下日進
二服

五香湯出總錄

治諸瘡毒壅氣入腹托裏

丁香　木香　沉香
乳香已上各壹兩　麝香次錢研者入　霍香湯加
人參已上各壹兩

右為細末每服三錢水一盞煎至六分去柤空心
稍熱服總錄聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載
此方大同小異大抵專治毒氣入腹煩悶氣不通
者其餘熱渴昏昧口燥唇乾大便硬小便澀者未
可與服

托裏黃芪湯出總錄

治諸瘡潰後膿多內虛

茯苓去皮　人參　官桂去粗皮
遠志去心　麥門冬去心　五味子炮
黃芪　當歸已上各等分

右為麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去柤溫
服食前

托裏茯苓湯

防風　桔梗　芍藥
五味子　川芎　甘草
麥門冬去心　桂去皮　熟地黃
當歸　黃芪　茯苓已上各壹兩

右為末每服五錢水一盞半煎至一盞去柤溫服

托裏當歸湯大醫癤科何當王方

當歸　黃芪　人參
熟地黃　川芎　芍藥
甘草炙　柴胡已上各等分

右為麤末每服五錢水一盞煎至六分去柤食前
溫服

托裏散出太醫癤科成子王方

川烏頭炮　茯苓已上各叁兩　乾薑炮
麻黃去節　甘草炙已上各壹兩伍錢　杏仁炒去皮尖
五味子　桂心已上各壹兩

右為麤末每服五六錢水一盞半煎至一盞去柤
食前溫服

托裏玄參散出總錄

主托裏止渴解熱煩渴

玄參　人參　甘草炙
甘菊花已上各等分

右為細末每服二錢菉豆湯調下亦名內托散

內托散洪氏方有芍藥總得無芍藥亦名牛肉湯總錄

治癰疽潰後虛者或氣弱人初覺生瘡痛亦可
服內消宜詳細用之

當歸　芎藭　當芪
厚朴去皮　桔梗　防風
甘草炙　官桂　人參

白芷　芍藥 已上各壹兩

右爲細末每服三錢溫酒調下或木香湯亦可

內補散 聖惠方 總錄一百二十八無川芎

黃芪　麥門冬 去心　川芎

當歸　茯苓 去皮　人參

五味子 已上各壹兩　遠志 去心　甘草 炙

桂心 已上各伍錢

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑三片棗三枚煎八分溫服無時

內塞散 總惠二百二十三載金方中去附子用天雄

治疳瘦不差諸瘡

附子 底箇炮　官桂 去皮　赤小豆

甘草 炙　黃芪　當歸

茯苓　防風　白芷

桔梗　川芎　人參

遠志 去心　厚朴 已上各壹兩

右爲末每服二錢溫酒調下空心日進一服

香粉散

主托裏止痛解煩渴退虛熱

真菉豆粉 叁兩　南乳香 壹兩

右爲細末每服三錢新水調下

止痛當歸湯 出總錄一百三十

治腦疽發背穿潰疼痛

當歸　黃芪　人參

官桂　芍藥　甘草 炙

生地黃 已上各壹兩

右爲麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去柤溫服日進三服

黃芪茯苓湯 出總錄一百三十

治諸瘡潰後托裏除虛熱

黃芪　白茯苓　官桂 去皮

麥門冬　五味子　川芎 已上各壹兩

右爲麤末每服五錢生薑三片棗一枚水一盞半煎至一盞去柤溫服食前日進三服

內補防風散

附子 底箇炮 去皮臍　防風　茯苓

白芷　桔梗　川芎

當歸　人參　甘草 炙

遠志　官桂 去皮

厚朴 底兩生薑汁製　赤小豆 半升酒浸一宿　黃芪 已上各壹兩

右爲細末每服三錢溫酒調服

伏梁丸 出養生必用方

治環臍腫痛腸胃瘡疽

厚朴 生薑汁製　茯苓　枳殼 麩炒去穰

白朮　荊三稜 煨　半夏 湯洗七次

人參 已上各壹兩

右爲細末麵糊爲丸如小豆大每服三十丸食前米飲湯下

溫經丸 出前方

治陷脉瘻

厚朴　官桂 去皮　白朮

甘草　乾薑 炮　木香 已上各壹兩

附子 底兩醋浸炮淬七次去皮臍

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後飲湯下

木香湯腫湯

治諸瘡疽始發腫焮增長熱痛

木香　犀角　大黃

梔子仁　升麻　黃芩

黃連　射干

白斂　甘草 炙　硇砂

紫檀　羚羊角 已上各壹兩

右㕮咀入生地黃汁五合如無只用生乾地黃五兩剉碎和勻每用藥五兩水一斗煎至七升入麝香五錢淨帛濾藥熱搨腫上日兩三度冷即再換

升麻湯腫湯

升麻　黃芪　防風

川芎　生地黃　細辛 已上各等分

右㕮咀用藥二兩水二升煎十沸稍熱淋湯內消如神

湯腫升麻湯 出總錄淋湯條下

升麻　芒硝　黃芩

漏蘆　梔子仁　萆薢

右㕮咀每用藥二兩水三升煎十沸帛濾藥湯潰腫處

猪蹄湯 出聖惠方

升麻　甘草　芍藥

萆薢 已上各等分

右㕮咀每用藥四兩水一斗猪蹄一對煮蹄軟取出次下藥再煎十沸帛濾淋湯之

甘草大豆湯 出聖惠方

治外陰蝕下疳瘡腫痛

甘草 炙剉　赤皮葱 炙熟　大豆 黃色

右用水三升煮豆熟爲度用棗條一握同煮取清汁熱淋洛冷即再溫浸三時爲度大効

湯腫湯

芍藥　丹參　黃芩 去黑心

白斂 已上各等分

右㕮咀用藥五錢水一升煎十沸帛濾頻淋之

洗毒湯

黄參　防風　甘草炙
露蜂房 已上各等分　白芷

右㕮咀水煎濃汁洗瘡腫

浴毒湯 出拾遺備生方

治小腸風陰瘡痒痛

木通　藁本　枳殼
管仲　白芷　荆芥
甘松　薄荷 已上各等分

右㕮咀用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至三升熱洗浴瘡

何首烏散 出秘寶生方

治遍身瘡腫痒痛

防風　苦參　何首烏
薄荷 已上各等分

右爲麤末每用藥半兩水酒各一半共用一斗六升煎十沸熱洗便於避風處睡一覺其痛甚者三日瘥愈

八仙散 出衛生方

治遊風腫痒瘡癬或因洗頭遊風瘙痒生瘡

細辛　荆芥　白芷
川芎　黄芩　防風
甘草　地骨皮 已上各等分

右爲麤末每用藥二兩水二碗煎十沸去柤熱淋漬患處

消毒湯

治百雜瘡腫悉能內消

獨活　防風　細辛
藁本　川芎　枸杞子
荆芥　漏蘆　大黄
黄芩 去腐　官桂　苦參

葳靈仙　丹參　黄芪
當歸　芍藥　茯苓
黄連　無心草　黄蘗
麻黄　葛根　蒲黄
菊花　杜仲　地骨皮
秦皮　藺草　甘草
甘松　藿香　白芷
露蜂房　升麻　雲陵香 已上各壹兩
蒼朮 叁兩　升硝 叁兩　菖蒲 捌兩

右爲麤末每用藥半兩水二升葱三莖槐柳枝各一握同煎十餘沸去柤熱淋洗浴此藥用之如神

發風散 出玉手子中藥方

羌活　防風　白芷
當歸　芍藥　細辛
芫花　吳茱萸　官桂 已上各等分

右爲麤末作二劑赤皮葱連鬚細切半斤同醋拌勻炒令極熱當裹於瘡上熨之稍冷即換藥熨之上下痛止而已

應痛丸

治走注疼痛疑是附骨疽者

蒼朮 去皮　當歸　草烏頭 炮
黑牽牛 已上各壹兩

右爲細末用醋糊爲丸如小豆大每服二十丸空心醋湯送下

黄芪丸

治腎臟風虛攻注手足頭面麻痺痛痒或生瘡癬腫痛

黄芪　烏藥　茴香 炒
地龍 去土　川椒 去目　防風
川練子 炒　赤小豆　白疾藜 去刺

海桐皮　葳靈仙　陳皮 已上各等分

右爲細末酒糊爲丸梧桐子大每服三十丸空心溫酒送下

梔子仁湯 出普濟生靈方

治時氣頭面赤腫

鬱金　枳殼 去穰　升麻
梔子仁　牛蒡子　大黄 已上各壹兩

右爲細末每服三錢蜜水調下

葛根牛蒡子湯

治時毒大頭病是也

葛根　管仲　甘草
牛蒡子 已上各壹兩

蘆豉

右爲細末每服三錢用水調下此疾近代患者傳染多致夭枉治之者少得方法只云太熱變然殊不知亦有虛實表裏治之者詳其汗下吐不同大抵與傷寒頗類其中亦有可針鑱處刺出血者亦有久而敗痂出膿者其間變異百端不可不慎所宜時疾也

通氣散

治時氣頭面赤腫或咽喉閉塞不通用之取嚏噴七八遍洩出其毒則吉若有病之人用此藥必不傳染

玄明 壹兩伍錢　猪牙皂角　川芎 已上各壹兩
藜蘆 伍錢　鄧蝎 壹兩伍錢分

右爲細末每用紙撚子蘸一米許納於鼻中取嚏爲効

白丁香散

治婦人吹奶初覺身熱頭痛實熱及胷乳腫痛是其候也服之能令下其乳汁通其血脉立能消矣

白丁香 自者

右為細末每服二錢酒調服腫硬立消甚者不過三服

金銀花散

治發背惡瘡托裏止痛排膿

金銀花 甘草 各壹兩

右為麤末分為三服酒水各一盞同煎至一盞去粗溫服無時

皂蛤散

治婦人因露風邪氣外客於乳內始為吹奶積久不消以為妬癰此藥導其汁散其風邪汗出其病自然痊愈矣

皂角 不封者燒存性 真蛤粉 已上各等分

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候

十香膏

治五發惡瘡結核瘰癧痔瘻疽痔

沉香 麝香 已上各一錢 木香 丁香 乳香 甘松 白芷 安息香 藿香 零陵香 各伍錢同為細末 當歸 川芎 黃芪 木通 芍藥 細辛 升麻 白歛 獨活 川椒 葉本 菖蒲 厚朴 木鼈子 官桂 商陸根 各貳兩剉 桃仁 杏仁 栢子仁 各貳錢 松子仁 桃枝 桑枝 柳枝 松枝 各貳兩剉 沒藥 輕粉 雄黃 硃砂 雲母石 生犀角 亂髮灰 白礬灰 各二兩另研如粉

真酥 猪脂 羊腎脂 各八兩 黃丹 壹斤 清芝麻油 三斤

右先於木炭火煉油香熟下一十六味剉碎藥并四枝四仁熬至紫黑色出火濾去粗入脂酥煎十餘沸再以新絹濾過油澄清拭鍋令淨再入火上煎油沸下丹川濕柳枝作單子不住攪熬一日滴在水中成珠不散則成也離火入十味藥末攪勻再上火入雲母等粉八味輕煎令沸出火不住攪食時於磁盒內密封收每用量瘡口大小緋帛上攤貼之腸胃癰疽可作丸梧桐子大每服七丸空心溫酒送下

犀角膏

當歸 川芎 黃芪 白芷 白歛 杏仁 木鼈子 官桂 乳香 沒藥 已上各壹兩 亂髮灰 伍錢 黃丹 清油 伍斤

右前八味細剉於油內先浸一宿於木炭火上熬至白芷杏仁焦濾去粗澄清再煎油沸下丹以濕柳木單子不住攪旋滴藥在水中如珠不散出火候一時辰下乳香沒藥并髮灰攪勻於磁盒內收依常法攤用之

乳香膏

治一切惡瘡打撲走注疼痛

乳香 研 珠子瀝青 白蠟 已上各伍兩 白膠香 貳兩 杏仁油 壹斤

右將瀝青於木炭火上先溶開下白膠香黃蠟化開入油攪勻以綿濾去粗於井花水中持拔白色如銀再溶入乳香在內拔白色收磁盒內依常法攤用之

白龍膏

治頭面五發惡瘡及燒湯烫破潰爛止痛生肌清血脉消毒敗腫通氣脉如神至可無瘢痕

輕粉 伍錢另研 白薇 白芷 白歛 黃芪 商陸根 柳白皮 桑白皮 已上各壹兩 乳香 貳兩另研 定粉 另研 黃蠟 已上各捌兩 杏子油 一斤如無用芝麻油

右七味剉油內採浸三日於木炭火上煎令白芷黃色濾去粗於油中下黃蠟乳香後溶開出火再濾候微冷下輕粉定粉急攪至冷磁盒內收貯每用緋絹上攤用之

消毒膏

當歸 黃芪 川芎 白歛 白芷 杏仁 白歛 零陵香 槐白皮 木鼈子 用仁 甘松 已上各貳錢 乳香 沒藥 已上各壹兩 輕粉 伍錢 硃砂 朱紅 已上各伍分 麝香 少許 黃丹 炒紫色 黃蠟 已上各捌兩 芝麻油 壹斤

右將剉藥酒浸七日木炭火上煎杏仁焦色濾去粗下黃蠟候溶開出火下丹等攪百十轉下乳香麝香硃砂等六味不住手攪至凝磁盒內收貯白光絹上攤之治證如白龍膏之類點面目毛髮最宜用之

麝風膏

治頭面五發瘡腫疥癬等疾及湯火破傷麝風止痛滅瘢痕

白附子 白芍藥 白茯苓 白蒺藜 零陵香 白歛 白芷 藿香

升麻　細辛　黃芪
甘草　杏仁 去皮尖炒研 伍錢　腦子 壹分
栝蔞根 壹兩　大栝蔞 貳兩去皮　黃蠟 陸兩
芝麻油 壹斤

右先藥十四味剉油內浸百日於臘日慢火炭火上銀石器內煎至白芷微黃色離火入栝蔞二味著內煮百沸重綿濾去柤再慢火上煉油香下削淨黃蠟溶開爲度傾在磁器內收貯上糝腦子密封旋用磨風塗之

天麻膏

治疥癬赤禿手足癬皮剥起瘡疼痒瘡侵蝕痛臘汁浸淫滋蔓經久不差者

草烏頭　鈎芩根　木鼈子
天麻　梨蘆　川芎
狼毒 已上各五錢　輕粉
臘猪脂 貳兩　黃蠟 陸兩

右前七味細剉如麻豆大於油內煎至焦紫色令冷濾去柤上火入黃蠟猪脂溶開再用重綿濾過入輕粉粉霜攪凝磁盒內收貯用以塗摩之大効

善應膏 出衛生寶鑑明昌六年開進方

當歸　白芨　官桂
白斂　白芷　杏仁 去皮尖
木鼈子仁 已上各壹兩剉碎　乳香
沒藥 已上各五錢　黃丹 貳斤
芝麻油 伍斤

右先將油煎剉藥令白芷焦黃濾去柤再煎油沸下丹用濕桃箭子不住手攪滴在水中成珠子住火入乳香沒藥攪勻以磁盒內收貯依常法用之

靈應膏 出總錄

治五發惡瘡瘰癧結核乳癰

白麥飯石 燒醋淬十次　白斂 已上各伍兩

鹿角 拾兩燒存性

右爲細末每用醋調中熬如膏厚塗於上中心留一竅以出其毒以故舊帛摊之貼未成膿者貼即自消已成膿者便潰惡肉疾出新肉早生効不必具陳用之如神

翠玉膏

治輭癰膿水迅流愈後復發

明瀝青 壹兩　銅綠 二兩　芝麻油 三錢
猪膽 三箇

右先於炭火上溶開瀝青入油令沸下膽汁攪勻入水中用手搏搦磁盒內收貯用於紬光絹上量瘡大小攤貼之不須再換一上便痊可自落爲度

追毒散 大腎成子方

治一切惡瘡膿水不快者

五靈脂　川烏頭 炮　白乾薑 炮已各一兩　全蝎 五錢

右爲細末用少許糝瘡中深者紙撚蘸藥紙於瘡口內以膏貼之或浸蒸餅令浸透擣去水和藥合勻撚作錠子每用紙入瘡中亦名追毒錠子

經瘡錠子　治疔瘡大効

草烏頭 兩　蟾酥 七錢　巴豆 七分 去皮　麝香 一字

右爲細末麵糊和撚作錠子如有惡瘡透丁不痛無血者用針深刺到痛處有血用此錠子紙之上用膏貼之于瘡四畔紙之其丁三日自然拔出此藥最當緊用

射膿丸　治諸瘡癰膿水已成即當針開決出陳楚惡瘀則其治也若惡瘀不出欲鍼已須當開發用此藥以射出其膿也

白礬灰 一錢　砒霜 五分　黃丹 一字

右爲末麵糊爲丸撚作錠子每用粘瘡頭欲出處以膏貼之自潰

替鍼丸 出保生信効方

治證同前

陳壞米末 一錢　硇砂 伍分　雄雀糞 有者三二箇

右爲細末粳米粥丸如粳米樣每用一丸指尖挑頭上以膏貼之

治瘰癧并馬尾鼠瘡

銅綠　班猫　砒霜 已上各伍分

右爲細末醋糊爲丸如鼠糞大每用時一錠子作三丸納於瘡口上以膏貼之如無瘡口乾糝之妙

翠霞散

治百雜惡瘡去毒生肌

滑石 一兩　銅綠 伍錢　輕粉 三錢
片腦　麝香 已上各三分　粉霜 一字

右爲細末每醋藥紙於瘡口上以膏貼之或滑石二兩名二聖散量其淺深輕重用之

搜膿散

治年深不効惡瘡

白芷 一兩　芎藭 貳兩　白芍藥 叁兩
輕粉 三錢

右爲細末每用乾糝瘡口上瘡中深者紙捻之

引膿散

治證同前

狼毒　鈎芩根　無心草根
白丁香 已上各一兩　麝香 一字
右爲細末如前法用治之

乳香散

治證同前

白乾薑　苦丁香　草烏頭 已上各一錢
鈎芩根　狼毒　乳香 已上各一兩

右爲細末每用乾糝之或唾調作錠子紙入瘡內

鈎芩散 陳言經驗方

治證同前

井鹽 一兩　無心草　乾薑 已上各二兩

釣苓根 三兩

右為細末每用乾糝之或唾調少許塗在背上就貼之

截痂散

治年深痂瘻瘡大効

蜜陀僧 白歛 白芨

黃丹 已上各一兩 黃連 伍錢 輕粉 一錢

腦子 麝香 已上各伍分

右前四味為細末後四味另研極細和勻為散每用或糝或紙瘡口中以膏貼之

抵聖散

治耳中膿經年不愈及驢涎馬汗攻瘡瘡骨痛瘡瘻等瘡

白礬灰 一兩 烏魚骨 三錢 乳香 就錢

乾胭脂 輕粉 已上各一錢 麝香 五分

右為細末或糝或紙以膏貼之如有耳膿者用一字紙耳中

青金錠子

治諸惡瘡膿出不快者及多年痂瘻瘡愈而復發

白丁香 銅青 硇砂

粉霜 輕粉 已上各伍分 麝香

龍腦 已上粉重壹分

右為細末麵糊為丸撚作錠子每用紙入瘡口中膿水出快

白龍散

主生肌止痛及耳中卒然大痛

寒水石 四兩燒 烏賊魚骨 研 滑石 已上各壹兩研

鵝砂 叁錢 輕粉 貳錢

右為細末每用乾糝耳中痛者油調如糊滴紙於耳中痛立止

桃紅散

主歛瘡生肌肉定血辟風邪

滑石 四兩 寒水石 燒 小豆粉 壹兩

乳香 輕粉 已上各壹錢

右為細末每用乾糝血不止者和燈草貼瘡口上以帛封之

槟榔散

治久患惡瘡肌肉遲生

木香 黃連 槟榔 已上各等分

右為細末每用乾糝之

金黃散 出丹溪治瘡方

主消腫散毒生肌止痛

黃連 大黃 黃芪

黃芩 黃蘗 鬱金 已上各壹兩

甘草 伍錢 龍腦 伍分另研

右為細末入龍腦研勻若治濕毒丹腫新水調掃赤上或蜜水調如稀糊用小紙花子貼之或小油調掃如久不差熱瘡毒赤乾糝或水調塗亦佳

生肌散

主歛瘡大効

寒水石 燒 滑石 已上各貳兩 龍骨

烏魚骨 已上各 蜜陀僧 枯白礬

乾胭脂 定粉 已上各伍錢

右為細末用蜜乾糝瘡口上

水澄膏

治熱毒腫痛大効

大黃 黃蘗 鬱金

天南星 白芨 硇砂

黃蜀葵花 已上各壹兩

右為細末每用新水一盞半蜜水二錢攪調勻候澄底者去浮水以紙花子攤於腫歛處貼之如急燥津唾潤之此藥治熱毒赤腫神効如皮膚白色者勿用之

拔毒散

治熱毒丹腫遊走不定

寒水石 生用 石膏 生用已上各 黃蘗

甘草 已上各壹兩

右為細末每用新水調掃之或油調塗之或紙花子小貼亦妙涼水潤之

金露散 出普濟生靈方

治時氣熱毒

寒水石 生用壹兩 黃蘗 壹兩

白歛 雄黃 已上各貳錢伍分 白芨

右為細末無根水調以紙花子貼或掃亦妙

消毒散

治諸惡瘡生肌止痛消毒散腫

滑石 壹兩 黃蘗 貳兩 黃丹 壹兩

乳香 伍錢 輕粉 貳錢

右為細末每用乾糝或燒湯及下注膿瘡風濕疥癬等瘡油調塗之

大槟榔散 成子玉方

治乾濕疥癬

硫黃 黑狗香 已上各伍錢 輕粉 壹錢

紅娘子 大槟榔 已上各壹兩

右為細末每用藥半錢於手掌中臨卧時油調如糊兩手搓摩極熱鼻內聞之及摩擦疥上隔日再用甚者不過三上必驗

天麻散

治白禿癬瘡及風毒疥癬

藜蘆 天麻 狼毒

白芷　茵草　鈎苓根
草烏頭　管仲　細辛（已上各伍錢）
雄黃（壹錢）　輕粉（壹錢）

右為細末每用藥半兩紙一重綿裹油三兩浸三日外蘸拈擦患處如稍乾添油一兩添至三兩換藥其効如神

決効散

治風痒頭瘡

管仲（叁兩）　白芷（壹兩）

右為細末油調塗之

水銀膏

治漏瘡疥癬無名惡瘡但是手足瘡疥浸淫多汁久而出生塗之神効

茵茹（剉）　黃蠟（已上各壹兩）　黃連（剉）
蛇牀（微炒）　白礬枯　水銀（已上各貳兩）

右用臘猪脂七兩熬開下三件剉藥煮至焦紫色去柤再入黃蠟溶開出火稍凝下水銀礬石攪至勻每用塗摩

平肌散

治諸瘡久不歛者

密陀僧　花蕊石（二味同煅）　白龍骨（已上各壹兩）
黃丹　乳香　黃連（已上各貳錢伍分）
輕粉（壹錢）

右為細末入乳香輕粉黃丹同研令勻每用乾糝

神黃散

治一切熱腫攻觸疼痛

黃蘗末（壹兩）　黃丹（貳兩炒紫色）　雄黃（壹兩另研）

右同研勻每用新水調如糊敷掃以小紙花貼稍乾以蜜水潤之

楊金散

治下疳蝕臭爛腫痛

白礬（與密陀僧同為末相和於沙鍋內大上炮汁盡）　密陀僧（已上各伍錢）
白蠟（貳錢）　黃丹　輕粉（已上各壹錢）
乳香（伍分）　麝香（壹字）

右為細末先須另用槐枝葱白鹽甘草熬湯淋漬洗一二時淹乾糝上項藥每用藥先須洗浴然後糝藥甚者三五次差

金傷散

治刀鏹斧傷解風止痛生肌

白芨（叁兩）　陳石灰（風化）　桑白皮
黃丹（已上各貳兩）　白附子　天南星
龍骨（已上各壹兩）

右為細末每用乾貼之

完肌散

治證同前

密陀僧　桑白皮（新者）　龍骨（已上各壹兩）
陳石灰（貳兩）　黃丹（伍錢）　麝香（壹錢另研）

右為細末乾糝之

定血散

治證同前

黃丹（壹兩）　烏魚骨　白礬灰
龍骨（已上各貳兩）　密陀僧（壹兩）　桑白皮

右為細末每用乾糝定血如神

碧霞錠子（太醫陳宜甫方）

治惡瘡透不覺疼痛

銅綠（壹兩）　硇砂（貳錢）　蟾酥（壹錢）

右為細末輭米飯一處擦勻搓作錠子粳米樣每用針刺之不覺痛者但有血出紙一錠子在內以膏貼之或作散以紙撚蘸紙之亦可臨證看如何宜合用度

漏蘆湯

治婦人吹妳初覺

漏蘆　練實　大黃
黃芩　芍藥　甘草（已上各等分）

右為麤末每用三錢水一盞半燈草三十莖同煎至一盞去柤溫服無時

玉粉散（出鮮于浦方）

治陰瘡浸淫不止

白礬灰　定粉（已上各等分）

右研細末先洗浴淨淹乾敷糝之

香礬散

治小兒斷臍之後不乾及膿出耳中

枯礬（伍錢）　龍骨
麝香（少許研）　黃丹（已上各壹錢）

右為細末每用乾糝之

紫金散

治瘰癧久不差者

枯礬（伍錢）　砒霜（壹錢）　石膽（伍分）

右為細末入黃丹二錢每用紙入瘡口內以膏貼之如未破者灸一兩炷用津唾旋調一豆許安瘡上以膏貼之去根自平復

通耳丹（盧全實傳）

治耳聾

桑螵蛸　安息香
硃砂（別研）　阿魏（已上各壹錢）
芭豆仁（已上各柒箇）　草麻子仁　大蒜

右為細末入二仁與蒜同研爛為丸如棗核樣每用一丸綿裹內耳中如覺微痛即取出視驗方

菖蒲錠子（一名昌蒲散）

治耳中卒生痛

真蒲　附子 炮去皮臍已上各陸兩

右爲細末每用油調滴耳內立効

寸金錠子 太醫陳子實方

治療痔疾

藤黃　雄黃　雌黃

硫黃　輕粉　粉霜

黃丹 已上各壹錢　麝香　砒霜

牡礪粉　紅藤根　乾漆 已上各伍錢

右爲細末研勻燒陳米飯和搗爲丸如棗核大每用一丸內肛門中深二寸許放令定用新磚毬子二箇炭火燒赤醯醋中蘸過綿裹一箇於肛門上熨之冷即換上下次之來日大便下臭敗惡物除根也

薰痔散

威靈仙 叁兩

右用水一斗半煎至七八沸去火就盆上坐令氣薰之候通手淋漓冷即再暖

通靈丸

治耳聾

松脂 伍錢　巴豆 貳拾肆箇去皮研

右先將松脂溶開入巴豆末熬成膏丸如白豆大綿裹一丸塞耳中覺痛取出赤水爲効

三神丸

治僧道痔疾因讀養生必効方見乾義傳僧梵海少年患痔疾其行業比氷霜緣此飽食久坐知痔疾者不必酒色過度矣故素問云因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔治之故不同也

枳殼 炒去穰　皂角 燒存性　五倍子 已上各等分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三三十丸溫水食前服養生必効方中三味皆單方一味爲方今增爲一方其効如神

玉芝飲子

治腦熱口舌生瘡咽喉腫痛

甘草 炙貳兩　藿香葉　石膏 水飛

山梔子仁 已上各壹兩

右爲細末每用一錢新水調下

平和飲子 出御藥院方中

治小兒瘡疹

人參　白朮　茯苓

甘草　升麻 已上各等分

右爲細末每服一二錢水煎去滓溫細細飲之甚歲大小虛實以意詳之此藥治諸瘡疹頻用不寧者皆可服之惟小兒瘡疹尤佳

玄參丸 出僧居素傳

治口瘡連年不愈者

天門冬 去心　麥門冬 去心　玄參 已上各等分

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸噙化

牛角散

治口舌生瘡咽喉腫痛熱毒時氣

升麻　桔梗　甘草 炙四兩

牛蒡子 炒研碎

右爲細末每服三錢水一盞入竹葉五七片煎至七分去柤細細熱漱溫即嚥之其柤熱掃項腫上

防風散

治破傷瘡瘍風邪或身體疼痛風邪攻注牽急及皮膚瘙痒麻木不仁頭昏目闇紊欲成破傷風

防風 去蘆　羌活

地骨皮　荊芥穗 已上各伍錢　藁本

右爲細末每服三錢溫酒調下

烏金散

治一切癰疽發背瘡癤傷折蹉跌墜墮生肌止痛

麝香　蟾酥 已上各壹字　枯矾

硇砂　輕粉 已上各壹錢　銅綠

砒霜　白乾薑　草烏頭

天南星　鮑上硫黃 已上各伍錢

右爲細末紙撚紐之或湯浸蒸餅和爲錠子紐瘡口內上以骨鼎之

劉守真瘡論

素問云痛痒瘡瘍腫疽疹瘤氣結核拂鬱甚者皆熱五臟不和九竅不通六腑不和留結爲癰近於火氣微甚則痒熱甚則痛附近則灼而爲瘡皆火之用也人之瘡肿內熱外虛所生也爲風濕之所乘則生瘡肿然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則肉脫閉爲風濕所乘脾氣濕而內熱即生瘡也腫者因寒熱毒氣客於經絡使血濇而不通壅結成腫風邪不作即無頭無根寒血相搏作者即有頭有根壅盛則爲膿赤根腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則爲實痒則爲虛非虛爲寒也正謂熱之微甚也痒則美疾也故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也炙之以火漬之以湯而其痒轉甚者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚纖緩腠理開通陽氣得泄熱散而去或反熱皮膚痒而以冷水沃之其痒不去謂寒能收斂腠理閉塞陽氣鬱結不能散越沸熱內作故也瘡瘍皆爲火熱而反腐出膿水者猶穀肉果菜熱極則腐爛而潰爲污水也潰而腐爛者水之化也癰淺而大疽深而惡熱勝血則爲癰膿也瘍有頭小瘡也疹浮而小癮疹也瘡氣赤瘡丹熛熱勝氣火之色也

沒藥膏

又貼灸瘡極妙

雌麟竭　明乳香　沒藥（已上各等分研）

當歸（去蘆）　木鱉子仁（研）　杏仁（已上各伍錢）

油頭髮（貳兩）　黃丹（陸兩）

右先用油一斤石器內或沙鍋內露天底鍊油令熟先下木鱉子當歸杏仁頭髮慢火熬黃焦油耗五分離火用絹濾租不用丹入鍋下黃丹以新柳篦子十條旋換攪不住手候黑色滴在水中成珠子硬輭得所取下火入三味研藥再攪勻磁盒內盛放地上以盆合一宿出火毒用時或帛上或紙上攤一日一換

必効散

治久患瘰癧不効服此藥取効如神

南鵬砂（貳錢伍分）　輕粉（壹錢）　麝香（伍分）

班猫（肆拾箇去翅足）　巴豆（伍箇去皮心膜）　白檳榔（壹箇）

右同研極細取雞子清二箇去黃調藥勻却傾在○雞子殼內濕紙數重糊定無令透氣坐飯甑內與飯一處蒸飯熟取藥曝乾研極細末用時相度虛實虛人每服半錢實人每服一錢並用炒生薑酒下五更初服藥至平明取下惡物如覺小腹內疼痛便用糜麻子燒灰入沒藥等分同研細用茶調下一錢便入大腸其取下惡物如爛肉老鼠兒及新成卵內雀兒是藥之効婦人有胎不可服

烏金散

治癰癤硬無頭不變色者

米粉（肆兩）　葱白（壹兩細切）

右同炒黑色杵為細末每用看多少醋調攤紙上貼病處一伏時換一次以消為度

抵聖丸

治男子婦人頭面手足虛腫

苦葶藶（不以多少於火上隔紙炙過）

右杵為細末棗肉為丸如小豆大每服十丸前麻子湯下食前日進二服五七日小便多腫消為効如喘嗽煎桑白皮湯下忌生冷酸滑物及鹽須另丸一等小丸兒與小兒服看大小加減與服前藥肉湯下

應効散

治氣瘻痔瘡多年不効者

地骨皮（不以多少冬月取根皮陰乾）

右杵為細末每用紙撚蘸紙瘡口內頻用自然生肉更用米飲調二錢無時日進三服又名托裏散

白金散

治風攻注毒遍身及手足生熱瘡疼痛有黃水出

桂府滑石

右為細末先用虎杖甘草豌豆各等分約半兩許二椀水煎上項三味至一椀去柤微熱淋洗瘡水冷拭乾上糝滑石末令通便腫至明決愈

如聖散

治渾身瘙痒抓之成瘡及癮疹之類

鹽沙（壹升）

右用水二斗煎至一斗濾去柤夜卧避風處淋洗水冷即拭乾便腫

大蛾散

治刀斧傷止血定痛生肌

晚蠶蛾（不以多少）

右為細末每用藥貼於瘡口上用絹裹不須再動一上便可

必効散

治蜘蛛咬著疼痛

鹽豉（炒乾）

右為細末棗肉為丸如梧桐子大每服三五丸一等小丸兒與小兒服看大小加減與服前藥肉湯下

蛤蟆散

治湯火燒燙瘡

蛤蟆（炙赤放冷）

右研如粉每用油調塗之日三次

治小兒丹瘤

水鱉子（剜者去殼）

右研如泥淡醋調傅之一日三五次便効

治小兒疳口瘡

天南星（壹箇去皮）

右為末好醋調攤在紙上男左女右貼在脚心底以帛繫定三日外取了以溫水洗盡脚下藥

治破傷風（并洗刷風藥）

麻黃（壹錢去節）　蝎稍（貳錢伍分）　蠶蛹

草烏頭　黑附子（炮去皮）　白附子

天麻　烏稍蛇（好酒浸二宿去骨火上炙黃色）

川芎（已上各伍錢）

右為細末每服一錢熱酒調下日進三五服重者三五日必効此證只宜早治但邪氣入臟則難治治有四死證不可治一頭面青黑色二額上有汗珠不流三眼小目瞪四身上有汗出如油

烏龍丸

治遍身風瘡瘙痒癬癩之消風散熱利膈化痰唾治肺氣不和此藥推陳致新去腸垢治證甚多要能用度

皂角（肥者不以多少炙紙去皮弦槌碎浸水揉取濃汁去柤銀石器內熬成膏另放之）

黑牽牛（不以多少微炒令香熟淨取頭末）

右將藥末與皂角膏杵丸如梧桐子大每服三五十丸氣虛者一二十丸食後溫水送下無病氣實人一兩箇月頭一服取利三五行不傷正氣身體

輕健肌膚光澤永無風疥癬癩之疾

紫參丸

治熱毒瘰癧腫毒未成者內消已潰者行膿止痛散腫毒

麝香另研　膩粉已上各壹錢　紫參

苦參炒已上各壹兩　丹參壹兩伍錢　連翹貳兩

滑石貳兩伍錢

右為末別用玄參一斤搗碎以酒三椀浸三日揉取汁去粗用皂角子三百箇煨熟為末用玄參酒熬皂角子末成膏和前藥丸如梧桐子大每服一丸以黃芪湯下一日加一丸至患人歲數即住如四十則二十每日減一丸其瘡自乾已結者內消也服此藥大有神效

萬靈丸

治腦背疽并一切惡瘡初覺一二日

硃砂　血竭　蓮蕊已上各等分

麝香少許

右為細末酒糊為丸如黃米大每服七丸溫酒送下瘡在上食後在下食前不過二服即效

治眼

治昏澀退翳膜

椒肆兩去子合者下用　甘菊花焦山伍錢

熟乾地黃貳兩酒浸九蒸九曝

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後細嚼新折米十餘粒送下

治吹妳方用仰乳方

治吹妳及一切惡瘡初覺一二日立効

生薑壹兩去皮　大黃　甘草已上各伍錢

萆薢壹兩去皮

右共搗作一塊以水半椀同煎至七分濾去粗入

沒藥乳香末共二錢半通作一服

治痔瘡

雄黃伍分細研　五靈脂壹兩去石淋過去塵　五倍子炮過已上各壹錢

沒藥貳錢伍分明淨者　白礬半兩半生

右為細末研令極細用紙花子貼瘡口上洗痔

防風　當歸　川芎已上各等分

右三味對細煎水去粗令熱溫淋洗瘡用輭帛印乾傅前藥

寸金丹

二名返魂丹三名再生丸四名追命丹五名延壽丸六名來甦丸七名知命丸八名得道丸非人勿示此方若有人患瘡身未爛者與三丸服之嚥下便活如口噤但斡開牙關研下三丸灌下喉中立生此方治發背腦疽癰腫遍身附骨腫痛死覺時飲水口中煩渴發熱四肢沉重身體壯熱

麝香貳分　南乳香　烏金石

輕粉　雄黃　狗寶

沒藥已上各壹錢　蟾酥貳錢　粉霜

黃蠟已上各壹錢　硇砂伍錢　鯉魚膽藍用

狗膽已上各等用　金頭蜈蚣去爪足酥炙黃色

頭首兒孩兒乳各等

右件為末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同和丸如菉豆大小兒丸如芥子人每服一丸病重者加三丸白丁香七箇研爛新汲水調送下用木服蓋之睡勿令透風汗出為度大段疼痛如無頭瘡腫不過三服立効服藥後食白粥或蒸就服大妙

牙痛藥此藥是官醫院方用藥方

治大人小兒

揀信　青黛　輕粉已上各宜量

麝香伍分

右同為細末用小油調薄攤紙上用木鍵鍵實收起每用臨用以漿水洗淨甲乾可瘡口大小以藥紙封之至曉去藥紙嚼淨勿令嚥下大者不過三上必効

迴瘡螫酥鍼子陝西路提舉馬蕃卿傳授方

治丁瘡毒氣攻心欲死以針刺其瘡回心行處但覺痛有血處下鍼子若累刺至心側通皆不痛無血者急針百會穴痛有血者下鍼子若無血以親人熱血代之猶活三四況瘡初發無有不効大抵丁瘡生於四肢及胸背頭項骨節間唯胸背頭項最急初生痛非不當中脘如丁盞臟之有根泄熱惡心是也

天南星　欵冬花　巴豆仁

黃丹　白信已上各壹錢　獨活

班猫去頭足翅

右為極細末用新蟾酥和藥如黍米大撚作鍼子每遇丁瘡先以針刺其瘡必不知痛有血出者下鍼子如覺痛不須再用若更不知痛再隨瘡所行處迴針刺之至有血知痛即止其元瘡亦覺疼痛以新藥傅之服出自左

用鍼子法度以銀作細筒子一箇約長三寸許隨針下至瘡痛處復以細銀絲子內藥於筒內推至痛處

乳香托裏散同刺瘡傳

治一切瘡腫疼痛不可忍如少壯氣實者先疎利後服之大効

御米殼去瓤蜜炙黃炒令黃兩　當歸

芍藥　川芎已上各壹錢　乳香

沒藥已上各等分

右為細末每服五錢水一盞半煎至七分去粗滓服內在上者食後在下者食前若未止即再服

四聖散丁散 各方出證經驗方

治丁瘡生於四肢其勢微者先以好醋調藥塗上以紙封之次服內托裏之藥其丁自旋出根

巴豆仁 白殭蠶 輕粉 銅砂 已上各成人兩分

右為細末醋調用之

天丁散 同前方傳經驗方

治一切丁瘡及諸惡瘡初生以藥塗之令腐脫托裏內消

山丹花葉 香白芷 已上各成錢 牛蒡子根 去皮 已上各半錢 天丁 乃是蟲蝕 蒼耳芽 大力子 已上各半錢 雄黃 半兩

右五月五日受氣修合為細末每用好醋塗紙封之丁瘡上有黑甲者必須胡桃油浸次塗之自可萬應膏 已前所傳

治一切瘡瘍初生腫焮甚者無問大小以膏可腫痕貼之前葱白水熱淋兩焮時良久再淋腫消為度如瘡老不能差者亦收斂膿決然早差

黃蘗 芍藥 白芷

黃芪 木鱉仁 杏仁

當歸 白芨 生地黃

官桂 玄參 去蘆剉碎 沒藥

乳香 已上各伍錢研 白斂 黃蠟 已上各壹兩

黃芩 大黃 已上各貳兩 黃丹 壹分

芝麻油 貳斤剉碎

右件十四味入油內浸一宿絕早入沙鍋慢火熬用生柳條攪至申時以焦褐色出火去粗粗又以重絹濾過入丹再熬旋滴水中成珠子不散者出火毒絕煙入乳香沒藥黃蠟攪勻用磁罐收貯於土內埋七日取出攤用

治小兒面漫瘡

俗云鍊銀瘡者是母受胎之日食酸辣及邪味過度多生此瘡

百藥煎 伍錢 生白礬 二錢

右為細末小油調旋搽之神効

治赤白口瘡

大人飢渴不時小兒失驚即生口瘡

生白礬 一錢

右研嚥之從瀝頑涎立効

治乾濕脚癬

此是肺受邪毒連於四肢久而不散以生肉蠹

硫黃 明 生白礬 八錢

右為細末油調次炙抓破塗之立効

治湯火燒燙

無問新舊

青槐枝 一兩半 菉豆粉 一兩炒黃色 輕粉 一錢

右同為細末油調塗之止痛滅毒

治破傷風

手足顫掉不已者

硃砂 別研 南星 去皮

獨活 去蘆已剉式錢 人手足指甲 燒紙灰 伍錢

右為細末分作三服酒調服之立効

治破傷

無問新舊

石灰

右用一味驗瘡口大小儘乾塗之不須封裹神効

治風狗咬破傷風

此病非為小可及九死一生之病可急用之

好班猫 去翅去頭足

右為細末酒調服之於小便盆內見表汗似狗形者為効如無再服七次雖無狗形亦不再發也此方累試經驗今附於此

論炮製諸藥及單方主療瘡腫法

夫藥者治病之物蓋流變在乎病上治在乎藥製用在乎人三者不可闕一也凡用一味炮炙修製及單方主療該引方書出處不必隨方標寫

硃砂

須研細水飛澄乾若入膏中者待膏成相凝冷即下急攪勿令沉聚大凡石類皆如此

雲母

即須用鍊成熟粉曾經婦人手指者不効重患方

治湯火瘡羊髓和膏塗之神良于金方如治金瘡及諸惡瘡休上塗傅大効

礬石 押口礬

凡用須水炭火上指汁盡主陰極惡瘡上身中惡肉生合臨津治急喉閉肝後方治耳中卒腫痛或有膿水者以白炭一字於耳中以綿裹之立効人治諸毒蟲惡咬傷傅之則差千金方以醋煮沸潰蝎螫立差王氏博濟治驢馬汗毒傷人瘡腫痛和黃丹傅之聖死方治傷折瘡腫以沸湯投粘紙清浴之御藥院方治陰汗以枯礬投沸湯中浴之

水銀

主疥搔痂傷白禿入膏令膏冷凝下之攪令勻散如星勿令沉聚

水銀粉 即輕粉

主瘙癢殺疥癬蟲酒髓風以羊髓和如膏塗及貼膿瘡一上可

石灰

主疥癬骨疽金瘡風化者良外臺秘要方治風疹以漿水調熱搽之隨手差孫真人治疥淋石灰水溫洗之千年者尤佳

白礬飯石 即礬石

曾磨刀者佳凡用須用醋淬之令骨落醋中者良亦單用治發背神良本草白大凡石類多主癰疽

花蕊石

主金瘡止血合硫黃木炭火炒良或只刮花蕊石末効

黃芪

主癰疽久敗瘡排膿止痛兼五痔鼠瘻止渴聖惠千金外臺秘要方治發背腦疽托裏止渴用黃芪六兩甘草一兩剉細水煎溫服無時大効

桑耳 即蕈耳

千金翼方丁腫用根莖葉炒灰存性爲末醋泔淀和如泥塗之一日三易之三日腫消根丁自拔出亦治諸腫掃之尋差

麻黃

凡用根節煮三沸掠去沫曝乾剉

黃芩

凡用去腐蘆擣細實者佳梅師方治諸丹作末水調掃之亦治湯火瘡

烏頭附子

凡用須炮裂去皮臍

半夏

凡用湯洗七次去滑

羊蹄根

主乾癬疥頭禿取根醬塗之効簡要濟衆方治癬瘡久不差取新者絞汁和臘粉爲膏塗之千金聖惠外臺等方皆治癬和醋或白礬或硫黃塗之愈

狼毒

主癰疽惡瘡鼠瘻聖惠方治癬瘡積年搔之黃汁出痒痛以末傅之或猪膏和塗差

芭蕉根

主瘡腫搗根汁塗之良百一方治發背根汁塗之

土青木香 即馬蹄香根

治頭風搔痒禿瘡

連翹

主寒熱鼠瘻癰疽惡瘡瘻瘡同甘草服食

蒲公草

主乳癰煮汁飲之自消梅師方傅之亦消

滑石

本草不言療瘡腫本體較治諸瘡久不愈消熱毒腫及金瘡血不止湯火炒瘡用之尤良

白石英

主肺癰吐膿咳嗽及膈上風熱痰肺痿消渴陰痿補五臟

赤石脂

治瘡疽痔瘻瀉痢加芎末等分粥飲調服一錢匕神効寒者加乾薑服

白石脂

治癰疽排膿生肌新生兒臍濕

雄黃

主寒熱鼠瘻惡瘡疽疥死肌疥癬

硫黃

主女人陰蝕疽痔惡瘡疥癬殺蟲

雌黃

主惡瘡疥頭禿下部惡瘡殺蟲

磁石

消癰腫主鼠瘻頸核疼痛

密陀僧

主金瘡止血口瘡痔瘻面上癜黑

伏龍肝

摻主惡瘡水調掃丹腫消調甘發背令內消

蛤石

主寒熱鼠瘻惡瘡蝕肌死

黃丹石

搗末雞子清調敷丁腫丹瘤乳癰

麤理黃石 即自然礬破者四邊多粗石

醋馬嚼研治楊遵彥發背取此石猛火煅赤投醋中固有屑落取爲末醋熬如糊厚塗立愈大凡石頭多主癰疽

爐甘石

主愈瘡止血治目赤瘡

燈心

主破傷血出每用貼破上封之立差

槐根皮

主痔及白皮煎湯薰浴良入荆芥尤妙

地骨皮

主粗瘡經年以粗皮煎湯洗之細末白穆別碾摻之即差

黃蘗

主瘡腫神良每用去粗皮塗炙判諸方用作湯

漬除瘡良瘍末篆水調敷腫

枳殼

凡用須麸炒去穰剉枳實亦同

厚朴

凡用須去粗皮生薑塗裹炙微焦剉

皂角

凡用須不蛀者去黑皮弦子酥炙黃色剉

木鼈子

凡用去殼主惡瘡毒腫孫用和方治痔用仁三五枚研如泥以沸湯浸用汗先薰但通手即洗日三度

狼樹白皮

單用熬膏貼癰疽惡瘡痔瘻痔疾川其白馬牙燒灰治發背初生用糝瘡頭上以膏封之

兎頭

連皮骨臘月細剉瓶中封之百日塗發膏疽發背惡瘡出瘡方

兎腹下白毛

治湯火瘡已破者先用膠水掃之後用兎白毛貼之毛落平復勝金方治痔用玩月砂即兎糞也和乳香末酒調三錢溫服日三服即差

蛇退皮

諸方用治丁雜惡瘡十年不愈者全用炒存性豬膏和塗之其驗神効

蜘蛛

聖惠治瘰癧不問新舊或成瘻者瞥乾爲末酥和如糊貼之日三度大効千金治發背瘡亦治鼠瘻神良譚氏治瘰癧瘡日以綿絲作線際根繫之一宿自落

蜣蜋

聖惠治一切惡瘡端午日收乾爲末者油調傅之神効子母秘錄治忽得惡瘡未辨識者取新者絞汁傅其上大効古今諸方治丁瘡欲死者取蜣蜋心腹下度取之稍白者是以針刺丁瘡當心及四畔以心塗貼之百苦立已經宿其丁自拔出大忌食羊肉多不効

陳橘皮

凡用溫水浸去白青橘皮亦然

枇杷葉

主嘔逆下氣凡用去毛刺甘草湯洗三葉重一兩

桃杏仁

凡用須湯浸去皮尖雙仁炒剉或研

無心草

凡用去蘆苗煎洗甲瘡疽神効

防風

凡用去叉蘆

藜蘆

凡用去苗

犀角

凡用生不曾見火者即鎊銷爲末

茯苓

凡用去粗皮白者佳

芍藥

亦用白者佳

牽牛子

凡用黑成熟者微炒假如一斤取頭末四兩

外科精義卷下

寶太師流注指要賦

撰人未詳

寶太師流注指要賦

引云望聞問切推明得病之源補瀉迎隨指示用鍼之要予於學始迄於今雖常罪思以研精竟未鉤玄而順陰俄經傳之暇日承外舅之訓言云乃世紛孰非兵擾其人也神無依而心無定或病之精必奪而氣必衰乘寓國因乱而隔殊醫物絕而而那得設方有効所希無求不若砭功立排疾勢乃以受教遂鍼求師前後僅十七年一二無有簡單後遊屯於秦邑方獲訣於李君斯人以鍼道救疾也除疼痛於目前愈疾病於指下信所謂伏如彈響應若發機落璺百中者也加之以好生之念素無竊利之心嘗謂予曰天寶不泄於非人聖道須傳於賢者僕不揆淺陋有求之懇獲成無吝之誠授究之秘者四十有三療疾而步疼者萬無一失遂銘諸心而著之髓務極其困而扶其危而後除疼痛迅若手拯破結聚涙如冰釋夫鍼也者果神矣哉然念茲穴腧而或忘借其聲律則易記輙裁八韻賦就一篇詎敢匿於己私庶或傳於同志

必欲治病莫如用鍼巧運神機之妙工開聖理之深外賛砭金能蠲邪而扶正中含水火善迴陽而倒陰原夫絡別支殊經交錯綜會溝池谿谷以岐異或山海丘陵而隙共斯流派以難拯在條綱而有統理繁而昧綱補瀉以何功法捷而明自迎隨而得用行步艱移太衝最奇人中除脊膂之強痛神門去心性之呆癡風傷項急使求於風府頭掌目眩要見於風池耳閉須聽會而治也眼疼必合谷以推之胃腸身黃取湧泉而即可腦昏目赤瀉蠻竹以偏宜但見若兩肘之拘攣杖曲池而平掃牙齒痛臣細堪會頸項強承漿可保太白宣導於氣衝陰陵開通於水道腹脹而脹奪內庭以休運筋轉而疼瀉承山之在早大抵脚腕疼崑崙解愈股膝痛陰市能醫癇發顛狂芍懸後谿而料理瘧生寒熱丘墟使以扶持期門能治胃痛血脹而可以勞宮退胃翻心痛以何疑指夫大敦去七疝之偏疼王公謂此三里却五勞之羸瘦華老言斯因知臂臂扶蕾然骨蒸腎虧目疾尺澤去肘疼筋緊目昏不見二間宜取鼻塞無聞迎香可引肩并除兩胛痛難任絲竹空療偏頭疼不忍彩雲寒痰列缺堪通瞎瞳瞍冷淚臨泣尤准寬胸將腿疼以扶殘腎腧把腰疼而瀉盡以見越人治尸厥於維會隨手而甦文伯瀉胎死於三陰交應鍼而隕足表諸痛為貫但麻曰虛實則自外而入也虛則從內而出於以故濟母而裨其不足奪子而平其有餘觀二十七之經絡一　二明辨據四百四之疾證件　三皆除從此天柱都無濟斯民於壽域幾微已判彰往古之賢書抑又聞心胷病求掌後之大陵有臂患貫肘前之三里冷痺腎餘取足陽明之土連膝腹痛瀉足少陰之水脊間心後者鍼中渚而立座脇下肋邊者刺陽陵而即止頭項擬後谿以安然腰脚在委中而已矣夫用鍼之士於此苟明者焉收却邪之功而在於撚指

離合真邪說

古有離合真邪云者蓋聖人欲使其邪相離而勿合之謂也若邪入於真則真受其盡而不遂其純一之真其之不遂則其所謂真也雖言有不可言者真被乎邪猶其柄而肆其橫逆之邪邪之所橫則其邪為患後可勝言哉嗚呼真邪之不可合也如此胡為真胡為邪真之為言也天理流行付與萬物萬物得以為生者皆真也聖人保之如持盈邪之為言也天地間非四時五行之正氣而差謬迭至者皆邪也聖人避之猶矢石其防微杜漸之機如此淵有旨哉蓋真立其邪遠邪滅則真殘邪固可除真方宜養養真之道無須異求但飲食男女節之以限風寒暑濕禦之以時復能實慈恕以愛人虛中襟而應物令廉必為之防舉止必為之敬如斯內外交養居備則吾之生不求生而生無期壽而壽矣不然攝養少或不嚴則六邪乘隙虛入諸疾交生衆害並作則吾生之真所與存者幾希故聖人憂之發度推衡機宜所在示之以剋邪之方使所之如雪汚按判而無遺者以此古人有云植德務海除惡務本以此意也然去邪之方綱所俱存再拜遺詮敬為節錄

帝問邪氣在經其病何如取之奈何對曰邪之在經如水得風波濤隴起其行脉中循循然其中手也時大時小動無常處在陰與陽不可為度卒然逢之早遏其路叉則納鍼無令氣忤靜以久留無令邪布吸則轉鍼以得氣為故候呼引鍼呼盡乃去大氣皆出故命曰瀉

帝曰不足者補之奈何先以指按其腧而散之推而按之彈而弩之爪而下之通而取之外引其門以閉其神呼盡納鍼靜以久留以氣至為故如待所貴不知日暮其氣以至適而自護候吸引鍼氣不得出名在其處惟闔其門令神氣存大氣留止故命曰補

諸穴治證

太衝肝經腧穴也在足大指本節後三寸或一寸半動脉中治證已具在前

人中一穴在鼻柱下一名水溝督脉手陽明之會治消渴飲水無度水氣偏身腫失笑無時癲癇語不識尊卑喜怒哭牙關不開面腫脣動狀如蟲行卒中惡鍼入四分留五呼得氣即瀉又亦得神門心經腧穴也在掌後兌骨之端治證在前

風府一穴督脉陽維之會一名舌本在項髮際上一寸大筋內死死中疾言其肉立起言休立下禁不可灸不幸使人失瘖治頭痛頸項急不得迴顧目眩鼻衄喉痺狂走目妄視鍼入三分風池二穴在翻顱後髮際陷中足少陽陽維之會治洒淅寒熱溫病汗不出目眩苦頭痛項痛不得迴顧目淚出欠氣多鼻鼽衄目內眥赤痛氣發耳聾目不明腰偃僂引項筋無力不收鍼入七分留七呼灸七壯

聽會二穴在耳前陷中上關下一寸動脉宛宛中張口得之手少陽脉氣所發治耳聾中狀如蟬聲通耳食牙車脫日相離二寸其穴側卧張口取之鍼入七分留三呼得氣即瀉不須補久亦良日可灸五壯至二七壯止十日後依前復灸之即愈忌食動風之物

合谷一名虎口大腸經原穴也在大指次指骨間治證在前

承漿腎經并穴也一名地衝在足心陷中治證在前

攢竹二穴一名始光光明眉柱在兩眉頭陷中足太陽脉氣所發治目眩眩視物不明眼中赤痛及臉瞤動鍼入一分留三呼瀉二吸徐徐而出鍼不宜灸宜以細三棱鍼刺之宜淺熱氣三度則目大明忌如前

曲池大腸經合穴也在肘治證在前

呂細公子陰陽脈經

承漿一穴一名懸漿在頤前唇下兩邊中足陽明任脉之會療口眼㖞斜面腫消渴口齒疳蝕生瘡灸亦佳日可灸七壯至七七壯止灸即血脉通宣其風邪時立愈其艾炷不用大一依小竹筋頭作炷脉麤細狀如細線艾炷破肉但令當脉灸亦能愈疾凡灸脚下久冷痃癖羸瘦虛羸宜灸炷大如指背宜五百壯四肢則但去風邪不宜多灸七壯至七七壯止不得過隨年數如巨關鳩尾雖是胷腹之穴灸不過七七壯艾炷不須大以竹筋頭作炷正當脉上灸之若灸胷腹艾炷大灸多令人血衰無心力如頭項穴若灸多令人失精神臂脚穴灸多令人血脉枯竭四肢細瘦無力既復失精神又加於細瘦即脫人真氣鍼入三分得氣即瀉

太白穴足太陰脾經腦穴也在足側核骨下陷中治證在前

陰陵泉脾經合穴也在膝下內側輔骨下陷中治證在前

內庭胃經滎穴也在足大指次指外間陷中治證在前

承山膀胱經一名魚腸傷出肉付在穴腨腸下分肉間治腰背痛脚氣膝下腫轉筋鍼入七分可灸五壯

崑崙膀胱經經穴也在外踝後跟骨上陷中治證在前

陰市胃經在膝上三寸伏兎下治寒疝小腹痛脹滿腰已下伏兎上寒如水鍼入三分忌灸

後溪小腸經腦穴也在小指外側歧節後陷中治證在前

間使包絡經經穴也在掌後三寸兩筋間陷中治證在前

期門肝之募在兩乳第二肋端足太陰厥陰維之會治胸中煩熱貪飲上下目青而嘔霍亂洩利腹堅硬大喘不得安卧小便下積氣女子產餘疾食飲不下胷脇支滿心中切痛善噫若傷寒過經不解當鍼期門使經不傳鍼入四分可灸五壯

勞宮包絡經滎穴也在掌中屈指取之治證在前

大敦肝經井穴也在大指端爪甲如韭葉治證在前

內側為陰白外側為大敦

三里胃經合穴也在膝下三寸筋骨外廉內宛宛中治證在前

臂骨小腸原穴也在手外側腕骨前起骨下陷中治證在前

然骨腎經滎穴也在足內踝前大骨下陷中同前

行間肝經滎穴也在大指間動脉應手同前

尺澤肺經合穴也在肘約橫紋中同前

二間大腸經滎穴也在大指次指本節前陷中同前

迎香在禾髎上一寸鼻孔傍五分手足陽明之會治鼻有瘜肉不聞香臭動血偏風口喎面腫浮腫風動葉狀如虫行或唇腫痛鍼入三分留三呼不宜灸忌如常法

宥井在肩上陷缺盆上大骨前一寸半以三指按取之當中指下陷中者是一名髃井手足少陽陽維之會治五勞七傷頸項不得迴顧骨髓酸痛兩手不得向頭或因撲傷腰髖疼脚氣上攻甲乙經云秘可鍼入五分此髃井足陽明之會乃連入五藏氣若刺深則令人悶倒不識人即連須三里下氣先補不瀉須臾平復如故凡鍼宥井時以三里下其氣若婦人墮胎後手足厥逆鍼宥井立愈若灸更勝鍼可灸七壯

綠竹穴一名目髓在宥後陷中手足少陽脉氣所發禁不可灸不宜淺入目小又令人目無所見治目眩頭痛目赤視物眩眩直視目瞤二穴不鍼入眼睫毛倒發狂吐涎沫發即無時鍼入三分得氣即瀉不宜滿

列缺去腕側上一寸五分以手交叉頭指末筋骨罅中手太陰絡別走陽明經偏風口喎手腕無力半身不遂欬嗽掌中熱口噤不開寒瘧嘔沫喜笑縱唇口健忘鍼入二分留三呼得氣即可灸七壯慎如前

臨泣足少陽腦穴也在足小指次指本節後間陷中治證在前

髓骨膀胱經

腎腧在十四椎下兩傍相去各一寸五分與脊平治虛勞羸瘦耳聾腎虛水藏久冷心腹膨脹兩脇滿引少腹急痛目視脏脏少氣咳血小便濁赤精除中疼五勞七傷虛備脚膝拘急足寒如冰頭重身熱搖懷腰中四肢酸緩洞洩食不化身腫如水鍼入三分留七呼可灸以年為壯

臨泣在目上直入髮際五分陷中足大陽少陽之會治卒中風不識人目眩鼻塞目生白翳多淚鍼入三分留七呼得氣即瀉

維會督脉

三陰交在內踝上三寸骨下陷中足太陰厥陰少陰之交會治痃癖腹中寒膝股內痛氣逆小便不利脾病身重四肢不舉腹脹腸鳴溏洩食不化女子漏下不止可灸三壯鍼入三分

太陵心包絡腧穴也在掌後兩筋間陷中治證在前

手三里在曲池下二寸按之肉起穴肉之端治手臂不仁肘攣不伸齒痛頰腫瘰癧可灸三壯鍼入二分

委中膀胱經合穴也在腘中央約紋中動脉治證在前

中渚三焦經腧穴也在手小指次指本節後間同前

瀉法先以左手揣按得穴以右手置鍼於穴下令病人吸氣一口鍼至六分覺鍼穴滿復退至三四分再覺穴滿更退鍼一豆許仰手轉鍼頭向病所以手循經絡循捫至病所以合手以迎鍼引氣過鍼三寸應呼除徐出鍼勿閉其穴命之曰瀉

補法先以左手端揣按得穴以右手置鍼於穴下令病人欬嗽一聲撚鍼入腠理得穴令病人呼氣一口將盡納鍼至八分氣鍼穴緊復退一分許如更覺穴緊仰手轉鍼頭向病所依前循捫其病所氣至病已隨吸而走出鍼速按其穴命之曰補

春夏秋冬深淺補瀉法春夏者皆先深而後淺秋冬者皆先淺而後深凡補瀉皆然

寒熱補瀉法

其補瀉皆如前法若病人患熱者若覺鍼氣至病所即退鍼三二分令病人口吸氣鼻出氣依經生成數足覺鍼下陰氣隆至依前法出鍼若病人患寒病者覺鍼氣至病所即進鍼至二三分令病人盡吸口呼依本經生數足覺鍼下陽氣隆至依前法出鍼

灸法補瀉

氣盛則瀉之虛則補之以火補者毋吹其火須自滅也以火瀉者疾吹其火傳其及其火滅也

取寸法

取病人男左女右手中指第二節為內度兩橫紋相去為一寸

刺心痛諸穴

心痛引腰脊強喘刺足少陰

心痛腹脹不喜然大便不利取足太陰

心痛引小腹上下無常處便弱難刺足厥陰

心痛但短氣不足以息刺手太陰

太谿穴可灸三壯或五七壯此瀉熱厥心痛

鳩尾穴可灸三壯或五七壯瀉熱厥心痛

接經決

心痛與背相接若如從後觸其心偃偃者腎心痛也先刺京骨崑崙不已刺合骨

心痛腹脹胷滿心尤痛者胃心痛也刺大都太白二穴

心痛如錐刺乃心痛也刺然骨太谿

心痛卒然如死狀終日不得休息乃肝心痛取行間太衝

心痛卧若徒居聞動作痛益甚其色不變此肺心痛也刺魚際太淵宣其氣行無所壅滯則病愈也

假令膽病善潔面青善怒得弦脉又病心下滿當刺膽井如見善潔面青善怒脉又弦又病身熱當刺膽滎如依前色脉又病体重節痛當刺膽俞如見善潔面青善怒脉又弦又病喘咳寒熱當刺膽經如依前色脉又病逆氣而泄當刺膽合餘經例皆倣此

假令肝病淋溲難轉筋兼又病或心下滿或身熱或体重節痛或喘欬或逆氣而泄依前刺之謂刺肝經諸穴也脉沉而弦

假令小腸經病面赤口乾善笑或心下滿刺井或身熱刺滎或体重節痛刺俞或喘欬寒熱刺經或逆氣而泄刺合脉浮而洪

假令心經病煩心心痛掌中熱而噦脉沉而洪或心下滿刺井或身熱刺滎或体重節痛刺俞或喘欬寒熱刺經或逆而泄刺合

假令胃經病面黃善噫善思善味脉浮而緩　依上法刺之

鄧苑 纂

一草亭目科全書

鄧苑 字博望江西清江人明醫士

南滙 吳省蘭 泉之輯
南滙 金沐德 培之校

子部醫家類

目論

經曰五臟六腑之精華皆上注於目骨之精爲瞳子屬腎筋之精爲黑珠屬肝脈之精爲絡屬心氣之精爲白珠屬肺肉之精爲約束屬脾血氣之精脈所係上屬於腦後出於項中故六淫外感七情內傷飲食失節勞役過度皆能損目夫目通肝竅腎藏其精一有怫鬱則相火挾肝木而上行遂致傳變多端有七十二症之名總不越內外二障而已華元化云目類九形瞳神居中而前如日月之麗東南而勝西北也有神有神水神光真血真氣真精此滋目之源液也神舊者目內涵真神衰則有損神水者出三焦而發源先天真一之氣所化目上潤澤之水也水衰則有火勝燥暴之患水竭則有目輪大小之疾耗澁則有昏眩之危略者多盤者少是以世無全精之目神光者原於命門通於腦髓於心火之用事也火衰則有昏暗之患火炎則有焚燥之殃夫心君主也通於大背故大背赤者實火也命門爲小心小心相火也代君行令通於小背故小背赤者虛火也若君主拱默則相火自然清寧奏真血者即肝中升運滋目注絡之血也此血非比肌肉間易行之血即天一所生之水故謂之真也氣者即目之經絡中往來生運之氣乃先天真一發生之元陽也真精者乃先後二天元氣所化之精汁起於腎施於脈而後及睛神也凡此數者一有所損目則病矣無間于目夫目者先天之氣所生後天之氣所成陰陽之妙蘊水火之精華血養水養肝傳護瞳神氣爲運用神即維持輸以日月理實同之人身至寶所當重也

目

瞤

目議

黑珠屬肝肝爲本也　東方屬木本生風在臟爲肝應目中緊緊不常生內蘊動因風致腎侵瞳其症目瞤怒不常勞役過度外感風寒內傷色慾以致頭目眩暈視不常勞役過度外感風寒內傷色慾以致頭目眩暈視物不明日久不治遂成昏瞶等症　心居包絡名君主血逐火奔眼內凝眥頭大小分處實遠視還同是火星其症因憂愁煩勞悲苦思慮內傷於心外攻於目赤脈瀰睛目久不治漸至失明等症

上下瞤屬脾脾爲土也　太陰屬土主脾元積熱相干病有源上下胞瞼腫又赤挑針瞤發帶依存其症因多食熱物炙煿辛酸壅熱在內瘀血腫痛翳沙隱澁日久不治以致爛弦倒睫瘡痍不已等症

白珠屬肺肺爲金也　肺臟停留心熱攻雙睛微見絳紗氣但宜閉目幸涼劑方解昏昏似火紅其症因凌霜冒雪饑飽失常風邪外受內熱上攻日久不治以致視物不明變成白膜蓋睛疼病難開衝風出淚等症

瞳人屬腎腎爲水也又通腦髓此水木有相生之義肝腎有同治之方　腎膽同源精白華陰虛火旺便生花上神瞳水還成絲急義化源不用嗟其症因嗜慾無厭勞勞過度大驚傷神大悲傷志水火既虧陰陽漸損冷淚流於臉上飛花起於目前緣水薄瞳青盲內障等症

外障

疼痛難開　時眼傳染　羞明怕日
眵生蓋　胞瞼腫爛　拳毛倒睫
赤筋貫瞳　翳膜遮睛　垂簾翳障
衝風出淚　漏睛膿出　烏珠下陷
烏珠突出　偷針時發　胞內生膠　風熱喝斜
雀目凝睛　撞破生翳　血灌瞳神　飛塵傷目
時發有根　瞼硬腫脹　瞳神脹痛　時發難澁
小背赤澁　大背赤澁　水輪翳　梅花翳
旋螺翳　浮翳　釘頭翳　濕翳
乾翳　青翳　黃翳　白翳　紅翳
裏急外邪　時撲損傷　黑翳　時發時散翳

外障

世謂眼病屬火然非外受風邪眼必不病因腑理爲風邪所束內火不得外洩挾肝木而上奔眼致血隨火行故患赤眼及時調治日久不治及治而無效爲粗工所悞遂成外障等症外障者風凝熱積血滯也法當除風散熱活血明目須用加減金液湯主之外顯玉華丹自愈如患翳膜遮睛者用仙傳紫金膏點之此實能開障成武當人范此君亦妙

金液湯治外障等症

軟前胡一錢　白桔梗八分　直防風一錢　肥知母五分　蔓荊子七分炒研
川獨活三分　京芍藥一錢　蘇薄荷六分
荊芥穗五分　北柴胡炒一錢　片黃芩炒五分

咀片水煎熱服

如受風寒重者初一劑加羌活五分小川芎二分
白芷梢二分後服仍去

如淚多者加北細辛二分　家菊五分

如腫脹者加蠶蛻三分

如痛甚者加厚黃柏三分

如紅甚者加連翹三分桑白皮四分牡丹皮六分
紅花三分

如翳膜者加木賊四分　白蒺藜八分

如翳障等肉者加石決明殼一錢

如昏暗者加密蒙花八分　家白菊五分

如大眥紅者加梔子仁炒黑七分

如小眥紅者加酸棗仁炒一錢　遠志肉甘草煎水浸軟去骨炒一錢
麥門冬去心一錢　家白菊三分　生地黃一錢
當歸尾三分　熟地黃一錢

如初發赤眼服藥六七劑可愈且無後患外點藥

如屢發者風邪積熱人在經絡遇寒即發服金液湯
廿餘劑後或作散或作丸服調理三四十日外用
玉華丹日點一次即愈

如體虛者須用加減地黃丸空心服飯後用金液散
此法最妙

如服金液湯須飯後熱服每日止服一劑不可驟進
恐傷胃氣服至六七日自愈

如外障等症多是有餘不可妄投補劑恐助邪為害

如內熱甚者大便閉結兼以體旺年少之人加大黃

二錢通後除去此症北京最多湯用五龍

五龍湯　治暴赤腫痛如北地慣旺者宜服
陳蔴黃　荊芥穗　白桔梗
牛蒡子　甘大黃
咀片各一錢三分作一劑生薑五錢葱頭二兩為
引服後腫消紅退仍用金液湯三四劑外點玉華
丹

玉華丹　治眼患外障紅腫羞澀昏暗翳膜等症
盧甘石二兩取白而輕者如川黃連一兩去鹽切碎
硼砂片及羊脂腦各一錢取男十歲無病
煮汁童便者同連汁和作一碗

將甘石置頂銀罐內炭火煅成碧色取起以連汁童
便淬之如此煅淬七次加硃砂三錢同研為末水飛
去脚候乾又研極細如點收貯瓷甲名曰丹頭另製
珍珠將珠錢許置豆腐內碗蒸一時久研極細收
貯聽用

丹頭　錢加珠末一分旋研水片三分和勻入磁罐
封固凡一切外障眼以銀簪或象牙簪沾藥點兩眥
內閉一飯久仍以簪撥出藥將每日早飯後點一次
或夜點亦可

仙傳紫金膏

真青丹　研細水飛候乾用厚紙盛鍋內煅熟取起地上陳久又炒又淬如此九次去鹽堝
金又研如川黃連去蘆淨二兩切碎　石燕一雌一雄大者如鹿驢用
搗末水飛用石蟹不拘一個二個與石燕同研如膏用三錢或五錢多則效速試法蟹殼
肥乘許滴水上如蓮分開方真此眼藥神品冬白蜜
八兩

先將迦訶用井水三碗煎至碗半以細燕為細末水
飛過調和藥汁同蜜銀鍋慢火煎三五沸後入丹再
煎取棚條或枝稍條不作手頓攪用水一盆在旁如
沸起即搖鍋放水盆內待藥有絲為度入熊膽再旋
百餘旋勿令雜大生人婦人兒之此方專治男婦一

切眼疾雙目不見十餘年者竟能還明但用藥給許
每日點五七九次不用雙點初點七日停三五日又
點七日用蟾蜍搗其醫膜眼自明矣如重者不過三
七日神效

七寶膏　去諸醫障
珍珠三錢　琥珀三錢　水晶三錢　龍齒一錢　石決明熊
膽各三錢　龍腦旋加五分
右搗碎研細水五升砂鍋內煎至一升去粗用銀鍋
熬至一盞入淨白蜜五錢和為膏每夜臥後點之早
不可點

武當秘授仙方

武當山上一仙方洩漏天機不可當巴豆蕤仁和製
石礞砂龍骨白丁香不論遠年醫膜障管教一點便
開光

製石二錢　巴豆去殼一錢　蕤仁一錢二味仁煎水去淨用水入
製石內條乾聽用

礞砂用田螺一個漂二日泥淨開口時以礞砂三四
分入內候其化水以銀銚煎乾收貯每用二釐

龍骨火煅為極細末一分　白丁香取兩頭尖者煨午取用甘草湯浸一宿晒乾研細收貯旋
加少許點醫膜障內

人龍散　治紅腫醫膜

人龍一條取壯大色白者以線繫首尾入長流水洗
淨將磁尖破開滴白漿入製石內點目亦效

一去舊肉用杏仁百粒搗爛取汁調漿礞砂點或又用
白丁香亦可

此君丹　治醫

淡竹殼不拘多少用布拭去毛燒灰存性每藥一錢
加麝香三五釐同搗細末點在醫上亦妙

凡治外障眼切不可用刀針鈎割恐傷眼血後成痼疾
可治療經曰眼得血而能視則血何可損也但用金

沙玉華方白龍

一丸飛絲入眼用鹽一粒化開點入或用香子一粒入眼其子在眼走動攝絲擲出即愈

一丸點眼歪斜服去風藥數劑服平又服溫神外用鱔血磨白芡塗面一邊立見其貌端正矣

劉禹錫方 治一切患眼

用黃連末 ■ 杏仁去皮研各等分 棗二枚開頭少許去核以藥填滿仍將棗頭合上綿裹用銀鍋煎水一碗至小半遠起待冷洗眼立效 藥用大而端正者

瞳神紅色 治一切外障等症如開鍋蓋法方使那毒不開令有出路然力少而銳猛之藥效宜當嚼以聚其力

鴛不食草二錢 青黛一錢 川芎一錢

右為細末先嚼水滿口每用如米許嚼入鼻內以淚出為度

內障

綠水濃堂 蠅影飛越 瞳神濁大 抱輪紅 瞳神焦小 亡血過多昏暗 瞳神缺陷 瞳神返背 能遠視不能近視 能近視不能遠視 瞳神破損 婦人崇風 瞳神空散 創經血出 坐起生花 小兒疳傷 小兒痘醫 眩暈暗睛 青盲醫障 冷淚時出 黑霧蔽空 雀目夜盲 烏風時發

內障治法

內障要病多因瞳神不經不順人不經意日久不治便成痼疾瞳神屬肝又通腎脾人身最靈者惟此瞳神而人身最重者惟此腎經所謂乙癸同源也夫人有陰虛者有陽虛者陰虛則水不滋木少火挾肝木而上炎肝通眼竅眼斯病矣蓋腎經如太極圖也水火具焉右腎屬陽水左腎屬陰水命門少火居中少火者陽也以一陽陷於二陰之中成乎坎之象故易謂天一生水也水火和平百骸通暢然脾土非少火不生肝木非腎水不養脾氣足自生肺金肝氣充自培心火則腎為五臟之源所謂先天真氣生身立命正在此也故無水者壯水之主以鎮陽光無火者益火之源以消陰翳非獨治目疾症可例推矣此水火乃無形之水火即先天真陰真陽也陰虛補陰陽虛補陽脈候參之庶幾勿失若水火有餘瞳神受疾遂為內障等症內障者血少神勞腎虛也法當養血補陰安神明目須用加減地黃丸主之

兼進五寶丹 補後服 白蒺藜 酒炒 故或千金密失丹與石斛夜光丸連服及後方隨用

六味地黃丸 壯水之主 左尺微弱補水以配火

懷地黃 酒洗蒸晒九次又酒煮焙乾八兩 懷山藥 四兩 山萸肉 去核四兩洗蒸 澤瀉 去毛三兩 牡丹皮 去骨三兩光澤瀉 白茯苓 去皮周淨蒸乾三兩

俱為末同地黃搗勻加煉蜜為丸如梧子大每日空心用滾水春三錢即以美膳壓下直至腎經且無記憶之事

加當歸五味生地黃柴胡石菖蒲益腎氣丸 等分

加枸杞白菊

八味地黃丸 益火之源 右尺火衰補火以固本六味加製附子一兩 肉桂二兩

腎氣附桂性烈用邊少用代之尤妙

還少丹 滋補腎水溫養少火諸虛百損男婦咸宜久服却病延年

懷地黃 四兩酒浸蒸晒九次 甘枸杞 四兩入乳蒸二次 肉蓯蓉 二兩酒浸去浮甲 川巴戟 二兩去心 川杜仲 二兩炒斷絲 川牛膝 二兩酒浸 山萸肉 去核 石菖蒲 少而佳者去毛 遠志肉 二兩洗去骨心 茯苓 二兩去皮木 白茯苓 去皮木 白茯苓 去皮木 白茯苓 去皮木

二兩炒 楮實子 二兩炒 小茴香 二兩炒 白茯苓 去皮木 白茯苓 去皮木 白茯苓 去皮木

栢子仁 炒　酸棗仁 炒　遠志肉 甘草湯浸一宿炒
白茯神 去皮木　當歸身 酒洗焙各二兩　白梧桐 炒五錢
生地黃 酒洗蒸炒研忌鐵器

右為末煉蜜為丸如椒目大白湯吞服三錢臥時

五寶丹　主開瞽復明瞳神缺者能起突者能平眞至寶也

夜明砂 炒研如塵　蛤蟆 去上子
晚蠶砂 極淨酒炒
鳳皇退 殼內白衣洗淨微火焙乾如焦則不用
右為末用水泡切片新瓦[illegible]忌鐵器

嫩雄雞肝 製如前

各為極細末各等分和勻每日早晚用酒調服三錢服至七日長久如重者再服一料自愈

千金磁硃丹　治神水寬大漸散昏如霧中行漸覩空中飛花又漸覩物成二體久則光不收及內障神水淡綠色漸白色者

磁石 吸針者二兩　辰砂 一兩 研細西京

共一味先以磁石置巨火中煅赤淬七次晒乾另研極細水飛候乾二兩辰砂另研極細水飛候乾一兩生神麯末三兩與前藥和勻更以神麯末一兩水和作餅煮浮為度搗入前藥內煉蜜為丸如梧子大每服二十丸加至三十丸飯湯送下空心服

右方以磁石辛鹹寒鎮腎經為君令神水不外移也辰砂微甘寒鎮心經為臣研其母此子能令母實也研實則目明神麯辛溫甘化脾胃中宿食為佐生用者發其生氣熟用者斂其暴氣也服藥後俯視不見仰視漸視星月者此其效也亦治心火乘金水衰反制之病久病累效者服之則永不更作空心服午前更以石斛夜光丸主之

石斛夜光丸　治症上同

天門冬 去心焙　揀人參各二兩　兔絲子 酒蒸研七錄五分
五味子 炒五錄　麥門冬 去心焙一兩　杏子仁 泡去皮尖七錢五分
白茯苓 去皮二兩　枸杞子 七錢五分　川牛膝 七錄五分
生地黃 一兩　熟地黃 一兩五分　家白菊 七錄五分
白蒺藜 五錄　金石斛 五錄　肉蓯蓉 五錄酒洗去浮甲
真川芎 五錄　中甘草 炒五錄　陳枳殼 去穰麩炒五錄
懷山藥 七錄五分　青稻子 五錄　直防風 五錄
川黃連 炒五錄　草決明 七錄五分　羊角 鎮末五錄
烏犀角 鎮五錄

右二十五味製末煉蜜為丸如梧子大每服三五十丸溫鹽湯任下

不方諸補藥也補上治下利以緩利以久不利以速也故君以天冬人參兔絲之適腎安神強陰填精也臣以五味麥冬杏仁茯苓枸杞牛膝地黃之斂氣除濕涼血補血也佐以菊花蒺藜石斛蓯蓉川芎甘草枳殼山藥青稻之療風治虛益氣祛毒也使以防風黃連草明羚角烏犀之散滯瀉熱解結明目也陰弱不能配陽之病並宜服之此從則順之治法也

觀青治眼方載藏經一人患目暗憶遮睛能膽丸　一人父沒奉母遊四方中得盡孝淳熙中諸醫不效自念惟佛可救於是禮佛甚謹夜夢皇天人告曰汝要目明當服熊膽丸具在藏經後依方修製服之仍目日明瞭子瞭然即治人目疾多驗

真熊膽 一分　川羌活　川黃連　密蒙花
蛇蛻 二兩　漢防風 各一兩五錄　龍膽草 一兩
仙靈脾 一兩　地骨皮 一兩　木賊草 一兩
白菊花 五錄　刷蹄 五錄　旋覆花 五錄
蒺藜子 一合　蕤仁 三錄五分　麒麟竭 一錄

俱為細末以羯羊肝一具煮其半焙乾入藥取其半生者去筋膜研爛入藥杵而丸之　每來飲下三十丸諸品修製唯木賊去節蕤仁用肉蒺藜子淘蛇蛻炙云

烏龍丸　呂仙翁治眼方一人性嗇雲水見必邀款小留供純陽像奉事甚謹一日有客方巾布袍入語曰汝目昏乏源當服烏龍丸可愈於是依方治藥服之月餘目復明矣夜能視物年至九旬耳目聰明精神如壯

生地黃　熟地黃 惟出懷慶者佳
川花椒 出四川閬州者勿用
三味各等分為末煉蜜為丸如梧子大空心鹽米湯吞五十丸漸可常服

報恩丸　一官治罪因出活之後因病死官虛日疾為內障所苦喪明年餘適夜半獨坐聽息間指不悉窣聲官問為誰者曰是昔蒙活因今來報恩乃告一方

川黃連 一兩　白羊肝 一具去筋膜研

以連末和肝於沙盆內研令極細為丸如梧子大每服以滾水下三十丸連作五劑言訖忽不見於是修服數日復明矣凡目疾皆可治無猪肉冷水雜難

老鹹丸　一人父沒奉母遊四方中得盡孝淳熙中寓公川因患赤眼食鹽蒸成內障諸醫無效素解塘諸般若經出弓市里所得錢持歸本鄉凡遇有長途忽夜夢一僧長眉大鼻托一鉢鉢中有水令掬以洗眼復告之曰汝此去當服羊肝丸也意其為佛拜乞其方翌日送以方授之

夜明沙 淨洗　當歸 酒洗　木賊 去節　蟬退 去足
各一兩共研為末用羊肝四兩水煮爛搗如泥入藥拌和丸如梧子大食後滾水下五十丸服之百日復明矣其母遂鄉母亡棄家遂入道終身不仙去

三奇丸　治內障等症

熟地黃 九蒸　麥門冬 去心　車前子 去殼

各等分為末炼蜜為丸如梧子大食前服用滚水下五十丸

一子丹　葛仙翁冷赤眼醫膜等症

大詞子一枚以蜜磨點日中

三百花草膏　蜂採百花羊食百草

用羯羊膽灌入好蜜攪勻線紮縛蒸過爆風處候乾入瓶點日

入虛目服黃柏知母之類更加便血何也曰此脾虛不能統血肝虛不能藏血也當用補中益氣湯吞六味地黃丸果愈

補中益氣湯　治勞倦傷脾中氣不足等症

黃芪一錢五分　人參去蘆一錢　甘草一錢炙　歸身酒洗一錢　白术土炒一錢　陳皮去白五分　升麻三分

右咀片薑棗水煎服

一富家子忽病視正物皆以為斜凡物必更移令斜自以為正其父求醫一醫留其子盛設暢飲至醉乃扶坐轎中使人擡之高下其手常令傾側展轉久之方令登榻而臥迨旦酒醒遣之歸家前日斜視之物皆理正矣父毋躍然而喜往謝問方何神效如此也醫曰令郎無病是醉中常閃倒肝一臠搭于肺上不能下故視正為斜今復飲之醉則肺脹展轉之間肝亦隨下矣藥安能治之哉

一孕婦忽然視物不明曰昏作疼此因胎熱傷肝毒氣上沖或外傷風熱內食炙煿性熱之物以菊連湯主之或金液湯治之無不效也

菊連湯　治婦人胎風服

防風一錢　荆芥穗五分　家白菊五分　蟬退五分　連翹六分　枯黃芩炒七分　川黃連酒炒三分　梔仁炒黑六分　牛蒡炒研五分　大當歸酒洗八分　真川芎五分　白芍酒炒六分

懷生地一兩後

右咀片生薑一片燈心一九為引熱服

一乳婦因怒而病既愈自張不得瞑醫曰為郁李酒飲之使醉即愈所以然者曰絲內連肝膽恐則氣結膽衝不下郁李能去結隨酒入膽結去膽下目能明矣以一醉飲主之

一醉飲

郁李仁酒去皮三錢

酒一瓶煮熱飲之果驗

一婦人年四十餘兩目昏昧咳嗽頭痛粗工罔效一醫診脈皆細弱脾部尤近弦弱曰脾虛也東垣云五臟六腑皆稟受脾土上供於目脾虛則五臟精氣皆失所司不能歸明於目矣邪逢其身之虛隨眼絲入於腦則腦鳴而痛心者君火也宜靜相火代行其令勞役運動則妄行侮其所勝故咳嗽也不理脾養血而以苦寒治眼是謂治標不治本也症脈既詳方從意立醫者意也因故曰如意飲

如意飲

人參一錢五分　黃芪一錢五分　麥冬去心一錢　貝母一錢　歸身八分　陳皮五分　川芎五分　黃芩四分　家菊五分　客茶四分　甘草二分

右煎服二劑前症悉除

一婦人患爛弦風眼用覆盆子藥施搽以手探吞口中咀嚼而留汁滓於小竹筒內熏用取阜紗蒙眼用筆蘸點於紗上然後滴藥汁漬服下弦轉盼間蟲出紗外有數十計其狀如絲色赤而長復用前法滴上弦又得蟲數下兼服消風清熱活血之劑遂獲全愈矣

覆盆子　能去眼翳明目覆盆子能治目昏不見物冷淚流淚及青盲等症多取晒乾用時搗分極細綿裹之以人乳浸之如人行久丸中用以點目中即仰覆盆子草

而臥不過三四日視物如童但忌芳麻油醬油等品也

一人患赤目腫痛脾胃虛弱飲食難進診其脈肝盛脾弱如服涼藥以治肝則損脾飲食愈難進服溫藥以益脾則肝愈盛而加病何以治之乃於溫平藥中倍加肉桂不得用茶常發恐傷脾也著肉桂殺肝而益脾故一治而兩得之傳曰未得桂而槁也

一人久患目宵有白翳遮睛服藥罔效蓋此眼緣熱藥過多乃生外障視物不明彼醫以為肝損醫虛補其肝醫則眼愈宣治以救苦丹一月目明

救苦丹

公猪膽一個微火用銀銚內煎成膏候冷入冰片末二三釐點入眼中漸覺輕又將猪膽白膜皮晒乾合作小繩如釵大燒灰存性點醫甚者亦能治之

小兒瘡毒眼治法

瘡毒入眼有赤腫而痛不能開者有醫障遮蔽而不能視者自古方書所論及俗說所傳皆以為疳瘡入眼而不知此非有形之瘡乃無形之毒也其遮睛之醫有似瘡而實非也蓋有形之瘡發于咽喉者有之發于口舌者有之然皆外瘡起脹時內瘡亦盛外瘡收斂時內瘡亦消惟入眼之毒必作於收斂之時或還元之後與咽喉口舌之瘡迥異此以知其非有形之瘡也蓋眼者五臟氣血之精華也瘡毒之鬱滯於肌膚者為癰為癤而其留滯於精華者則發于眼虛矣毒已留於氣血精華之分則其受病也深故患此者當乘時調治收功于數十劑之後切不可鹵莽躁率責效於數劑之間何也瘡後之人元氣已弱受毒又深而其毒火發露在表又在至高之位若驟用寒涼峻攻其藥而疏利其下則既傷其元氣又拂逆其病勢未有不至於喪明者且或生他症而為大患者多矣須用清　擴醫陽從容調治使其毒氣漸退而元氣不損此萬不失一之術也切戒薰

洗若日久不治亦致失明患此症甚多彼不知治法又何怪乎

清毒撥醫湯

防風五分　荆芥穗四分　蘇薄荷四分
前胡七分　蔓荊子四分　京芎藭太分
桔梗五分　北柴胡炒七分　片黄芩炒五分
連翹四分　肥知母炒五分　牛蒡子炒研五分
白菊三分　密蒙花四分　白蒺藜炒去刺七分
木賊三分　丹皮四分　水煎熱服

如紅甚加紅花三分　桑白皮蜜水炒四分　如醫膜遮睛加石決明煅研八分　如淚多加北細辛二分　如內熱甚加黄連炒三分

如甚者可兼用後敷方

紫龍丹　治小兒痘毒眼外用吹耳

黄丹五分　真輕粉五分

俱為末研勻如左眼患吹右耳右眼患吹左耳每日吹二次每用蓋許

密蒙花散　治症前同

密蒙花酒浸晒乾五錢　蟬退去足土五錢
穀精草五錢　望月沙洗淨晒乾一兩

俱為末每用猪肝一兩以竹刀披開將藥一錢和在內用碗盛蒸熟服亦效

穀精草散　治症同

穀精草一兩　生蛤粉二兩

俱為極細末每用猪肝一兩去淨筋膜以竹刀切片和藥一錢蒸熟服效　上二方用母雞肝亦可

小兒疳積服治法

小兒腸胃柔脆早不可饑晚不可飽衣服適時自不生病因飲食失宜過饑過飽食後便睡日晚加飡寒熱不調外感或少內傷實多元氣阻滯漸致虛弱遂難運化

釀而成疳又食飲食肌肉愈瘦腹脹下利日久不治疳蠱傷肝目則病矣或閉或瞀而變生諸症從而夭折可不悲哉醫不及時治非良法始如不覺久則變明須用祕授玉龍丹主之

玉龍丹　治小兒疳積傷眼

蘇雄赤為末水飛乾三錢　寒水石煅為末九錢

右二味和勻每日用雞肝一具竹刀切片去淨筋膜將藥一錢入酒一盞碗盛蒸食五日見效覺能開瞀

治小兒雀目法

此傷雀目者何也目每至日晚一目不見又　雞肝眼經割門得血而能視肝血有虧熱入血室故也血主陰晚夜屬陰以類相從治不得法亦能為害須用照月飲主之或決明夜靈散更妙

照月飲　治雀目立效

白雄黄為末水飛乾

用生雞割取熱肝蘸極爛和黄五錢溫酒調服

決明夜靈散　治雀目大人亦有此症并治

石決明洗煅為末　夜明沙洗淨為末　公豬肝每用一兩羊肝更妙以竹刀切開肝作二片將藥各二錢鋪在肝上合定用線縛之入沙鍋內米泔水煮熟臨睡時連肝藥汁俱服

附刻薛氏選方

明目地黄丸　治男婦肝腎俱虛風邪所乘熱氣上攻目昏遮睛羞澀多淚

牛膝酒浸三兩　石斛四兩　枳殼炒四兩　杏仁去皮尖四兩
防風四兩　生熟地黄各一觔

右為末蜜丸如梧子大每服三五十丸食前鹽湯下接此方可治內外二障鶻虛及年老者甚宜

加減駐景丸　治肝腎氣虛兩目昏暗視物不明

熟地黄八兩　歸身五兩　枸杞子五兩　川椒一兩　五味一兩　枸杞三兩　俱是酒蒸
菟絲子八兩前二　俱是酒蒸

各製末蜜丸梧子大每服三五十丸食前溫酒下接此方治內障益養神水自明矣

地芝丸　治目能遠視不能近視漸至近亦昏蒙

生地黄焙乾　天門冬去心各四兩　枳殼二兩炒　甘菊花二兩

右為末蜜丸如梧子大茶清送下百丸

按陰虛不能近視此方補陰藥也故主之

定志丸　治目能近視不能遠視者

白茯苓　人參各三兩　遠志肉　石菖蒲各二兩

右為末蜜丸如梧子大以硃砂為衣每服七丸至二三十丸溫冰湯下食後日三服

按陽之不能遠視此方補陽藥也故主之但此症年老有之空心當服還少丹及補腎陽之藥

菊睛丸　治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多淚

枸杞子酒蒸　茺蔚子酒蒸各二兩　巴戟天一兩　甘菊花四兩

右為末蜜丸如梧子大以硃砂為衣每服五十丸鹽湯溫酒任服

按此方專補命門少火此火中之火不足藉水滋肝木肝通眼竅是目神水足而神藏神光自發瞭神可保無恙矣明目何疑可加熟地八兩

五秀丸明丸　治腎膜遮睛瘡澁昏花常服清利頭目

甘菊問蒸五百象　荆芥穗五百兩　楮實子五百粒
木賊去節五百　蕁川花椒五百粒去子

為末蜜丸如梧子大每服一丸細嚼徐徐嚥下

按此方俱輕清上行之品治標可也宜暫用之

瑞竹四神丸　治腎經虛損眼目昏花

甘枸杞一觔取色赤滋潤者作四分用酒一杯浸之一分川椒二兩同炒一分小茴一兩同炒一分芝麻二合同炒一分獨炒去　加熟地黄四兩　白茯苓三兩炒過將椒等篩揀去

甘菊花二兩共爲末蜜丸如梧子大每服五七十丸空心溫酒送下

按此方中年以後每日當服不獨可保目明而却病廣嗣其功甚大

天麻丸　治小兒肝風眼痛

青黛　黃連　天麻　川芎　蘆薈　五靈脂　夜明沙炒各一錢　龍膽草酒拌炒焦　蝎防風頭者　蟬蛻各錢半　全蝎　麝香少許　乾蟾頭二錢炙焦

俱爲末公猪膽汁浸糕丸如麻子大每服十丸薄荷湯下

按此方所傷五臟各有現形唯傷肝者木因風動遂爲目患品味週至誠良劑也然余全書內玉龍丹效甚

淨生桑白皮散　治肺氣壅塞毒氣上攻眼目白睛腫脹目夜疼痛

元參　桑白皮　枳殼炒　杏仁炒　旋復花　防風　京芎　黃芩　甘菊　甘草　甜葶藶炒　柴胡炒

右各一兩爲細末滚水調一錢飯後服

按此方治風熱之劑凡外障睛珠腫脹疼痛宜服

蜜蒙花散　治風毒攻目昏暗眵淚并暴赤腫

羌活　白蒺藜炒去刺　蜜蒙花　石決明煅各一兩　甘菊家園者二兩

右爲末每服二錢茶清食後調下

按此方治風毒凡外障眼宜服

蟬花散　治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚羞明一切風熱昏暗

殼精草　甘菊去蟬退五分　羌活五分　甘草三分　蒺藜炒一錢　草決明一錢　防風七分　山梔炒七分　川芎三分　蒙花七分　木賊五分　荊芥穗二分　黃芩五分　蔓荊子炒五分

右爲末每服一錢食後茶清調下

按蟬花散治外障蘊熱等症固宜但症有不同或新起久患或氣血虛實量人加減詳在全書

洗心散　治風壅壯熱頭目昏痛熱氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛心神煩躁多渴五心煩熱小便赤澁大便祕滯

大黃煨　甘草　當歸　芍藥　麻黃　荆芥各六錢　白朮五錢

右爲末每服二三錢生薑薄荷煎服

洗肝散　治風毒上攻暴作赤目腫痛難開眵淚

薄荷　當歸　羌活　防風　山梔　甘草　大黃煨　川芎

右各二兩爲末每服二錢食後煎水調下

按前二方人多用之故存備參考或問曰洗心洗肝二散治目何如若曰方以洗名其効役可知蓋爲體壯氣實者感目風寒外來熱理內火不得消散實熱上炎奔入眼竅暴赤疼腫大便澀澁姑以此暫用解散否則不敢濫試老人體不同又烏可執泥乎

尤氏喉科秘本

錫山尤氏著

錫山尤氏喉科秘本目錄

辨症總論 計共三段一篇
辨症細條 計共三十三段
治症秘法 計共二十六條
用藥秘法 計共二十五條
製藥秘法 計共十條
配藥秘法 計共二條
煎劑秘方 計共八條
丸散秘方 計共七條
吹藥秘方 計共二十二條
附方 計共七條

錫山 尤氏 著

辨症總論

咽在喉之前所以嚥物經云咽主地氣地氣通於脾喉在咽之後所以噓氣經云喉主天氣天氣通於肺喉納氣天也咽納食地也肺主氣脾主食納氣者從金化納食者從土化金性燥土性濕至於病也金化變動爲燥燥則澁澁則閉塞而不仁故在喉謂之痺土化變動爲濕濕則泥泥則壅脹而不通故在咽謂之膈病雖少異其爲火症也則一

天氣閉塞則爲喉痺地氣閉塞則爲咽嗌痛天地之氣俱閉塞則喉咽俱病蓋病喉痺者必兼咽嗌痛病咽嗌痛者未必兼喉痺也

十二經脈皆上循咽喉蓋得以病之然統其所屬在君相二火喉嚨者脾胃之候也然經有云肝者中之將也取決于膽咽爲之使故咽喉病雖在脾土亦由肝膽之所爲也咽嗌痛者喉嚨與食則痛是也經云形苦志苦病生于咽嗌治之以甘藥蓋陰氣太虛陽氣飛越虛火遊行無制客于咽喉痰結在上而爲咽痛也

咽喉爲人身呼吸飲食之門戶方寸之地受病易于危險其症雖繁大要總歸於火蓋少陰少陽君相二火其脈並絡于咽喉故往往爲火症之所結聚君火勢緩則熱結而爲腫爲痛相火勢速則腫甚不仁而爲痺痺甚不通則痰塞以死故經云一陰一陽結謂之喉痺火者痰之本痰者火之標故言火則痰在其中言咽喉則牙舌亦包羅于內矣火有虛實實火者因過食煎炒炙煿蘊熱積毒其症煩渴二便閉塞風痰上壅則發喉痺必

三日先胸脇不利脈弦而數治宜先去風痰後解熱毒虛火者或因飲酒太過或因忿怒或因色慾火炎上攻咽喉乾燥必二便如常少陰脈微治宜補虛降火凡用藥總不宜純用寒涼之劑取效目前上熱未除中寒復起毒氣乘虛入腹胸前高腫上喘下瀉手足指甲青黑七日以後全不進食口如魚口者死且治喉症最忌發汗誤人不淺或鍼砭出血即汗之之義若寒傷於腎及帝中脈者尤不宜針至如內傷虛損喉癬失音無法可療喉症初發一寒戰即止者發後身涼口不碎必無專吉或二候俱利不可認作熱症皆由陰氣虛寒而發其痰不可弔蓋此痰乃身中之精液所化與熱症乳蛾擁舌之痰毒腫一處以流盡毒而愈者不同若亦流盡則精神竭而必死先以藥吹或用水噀之法使喉一通即便服藥第一劑發散和解第二劑即施溫補滋養之藥設三四日後再發寒戰或心痛骨疼脇痛等症皆爲難治發時牙關緊急喉舌俱脹口碎而與或有重舌及上有黃屑者發後下午再發寒熱二便閉澁者即作熱症用石羔敗毒散主之此亦爲易愈之症如漸起三四日後而寒熱者雖極凶亦不爲害惟有症未減而牙關反不緊急腫不腫而紋如好人者不治舌腫滿口不治色如李桃如茄子如砂紙不治或達旦舌發寒熱猶可治也舌以筋挾之其色雪白起筋即紫紅色身內血已死然口與者猶或可生尤忌口渴氣急痰多胸如桃膠者死期已速一項俱紅腫甚者亦極危也面帶紅紫而青帶白神氣少者俱不救不語者死昏能語者尚有可生之機面色少神喜坐低處者亦難治喉花爲帝中性命所關舌下紫筋爲舌紫下通于腎白腫不治傷之即死

關喉者不可不知

辨症細條

喉痺　此症屬痰屬風屬熱皆因鬱火而兼熱毒乃喉症之總名辨云喉甚不仁爲喉痺乃咽喉之重症非總名也

乳蛾　此症有單有雙有連珠者多因酒色鬱結而生初起一日痛三日紅腫三日有形如細白星發寒熱者凶四日勢宗治之四五日可愈其症生於喉旁一邊生者爲單蛾兩邊生者爲雙蛾白星上下相連狀如纏袋者爲連珠蛾單蛾輕雙蛾重連珠蛾尤爲重者也

喉癰　此症因過食辛辣炙煿厚味醇酒感熱而發屬肺喉間無形狀但紅腫而痛重者亦寒熱而頭疼四五日可愈

揑舌喉癰　肥人性躁感熱者多生此症凡舌下生如小舌狀者爲揑舌如連喉腫痛爲喉癰不痛者非癰大抵揑舌兼喉癰者其勢凶先用貫青後用貫禁即愈

喉菌　此屬鬱血熱氣滯而生婦人多生狀如浮萍略高而厚紫色生於喉旁輕則半月重則經月月餘在治者得法患者守戒忌口

纏喉風　此症因心中躁急而發先兩日胸膈氣緊急出氣短促忽然咽喉痛痛手足冰冷頸如絞轉熱結於內腫擁于外且麻且痛喉內紅絲纏緊手指甲白色手心肚熱喉腫而風火痰湧盛如拽鋸聲是其候也最爲急症初起一日即治可治若過一日夜發後目直視喉中如雷鳴者不治探以燈火近患人口鼻即吹滅者不治若喘急額汗命在旦夕又云纏者白

頤纏繞赤色寒熱

喉閉　傷寒後發者爲難治氣閉不通無形無聲

喉癬　虛火上炎肺金太旺致攻喉間生紅絲如蚵窩紋樣又如秋海棠葉背紅絲一般飲食甜碗如食鹽醬等物則嚥痛雖不喪命亦難速愈久則喉啞失音而不救矣痧症多生此症

喉剝　此多由先患痧病重症既久虛火自升榮血已竭其喉上腭有紅點密密如蚊蟲咬斑樣此係危險將殂慎勿治之以取誘

酸槽風　初起先齒痛不已後即牙龈肉浮腫紫黑色或出血久則腐爛而臭蓋屬腎虛也

牙漏　即前症久而不愈齒縫中出白膿極難調治甚則齒落如上左邊門牙落者不治亦屬胃火腎虛也

牙癰　一名牙蛀風初起有小塊生于牙龈肉上或上或下或內或外其狀高硬

牙敝　生于牙盡又中牙關緊閉此症初起緊盛至夜尤盛然不難愈亦不害命

牙推　症屬胃火形如豆大或內或外生無定處

牙宣　齒縫中出血上屬脾下屬胃經實火上攻所致亦有胃虛火動腐爛牙龈淡血常出時時滲漏不已

牙菌　生於牙龈其狀紫黑色高起如菌狀此係血熱火盛兼氣滯亦有鬱極而生亦有好飲燒酒而生者

穿牙疔　先二日牙痛發寒後痛不可忍牙龈上發一塊紫色者是也

穿牙毒　即前症初起未破者爲疔已破者爲毒其色紅者可治青者不可治

走馬牙疳　此症或因胎毒或因痘發毒攻齒牙龈腐

爛成疳殺人甚速鼻梁發紅點如珠者不治其色如乾漿一日爛一分三日爛一寸故名走馬以喻捷也有齒者落盡而死　小兒走馬牙疳及大人骨槽風俱要防齒落上牙門牙左邊者爲牙中之主此牙一落則餘盡落矣最爲難治若此牙不落餘牙雖落猶可治

崩砂疳口風　自舌下牙龈上腫赤口內作臀如熱湯牙龈漸爛亦能脫齒骨音鼎痛腫起也

連珠疳口風　自舌上起小泡初起一箇又起一箇甚者三五七八九個連珠生起

舌癰　其症舌紅而腫大屬心經火盛地角亦紅腫

舌黃　舌上腫痛黃色亦屬心火

木舌　舌腫大如煮熟猪肝不能轉動又有一種生舌根下狀如白棗上有青紫筋不能速愈初起不疼不發寒熱漸漸腫大初起即治可愈遲則難愈此亦鬱鬱所致

鵝口　一名雪口初生月內小兒滿口并舌上生白屑如鵝口樣者故名之

馬牙　係初生小兒胎內已受熱毒見風即生但看牙龈上有白色如脆骨者即是此欲發出胎毒即打噴嚏含乳或吞或吐或吞而不吮其病已深若不急治入腹即死切勿認作黃疸之類出胎便當看視日日要挑若過三四日尚即成矣五六日堅硬難治甚有發而復發大約百日外不患此症

熱癰　生於上腭發紫泡如豆大者是也

紫舌脹　屬心火內必煩躁悶亂

舌菌　屬心經多因氣滯而生生舌上或如木耳或如

菌狀其色紅紫

頸癰　此症胸前紅腫形在外亦欲內攻甚則喉閉出膿

面癰　形色紅腫屬陽或白色屬陰與前症相倣

托腮癰　生腮下因過食厚味多飲醇酒熱毒結聚而生也

鬲臂　此是陽明胃經之症因炙煿所致或兼忿慮鬱怒痰隨火行流注于臂初結如豆大若蠶蘭突腫堅硬甚則作痛飲食妨碍或破流血久則變爲消渴治

中癰治之症

治症秘法

凡喉症至五日即重三日前症雖重尚未成膿藥能消散若至五六日患處成膿縫使穿破後必關成竅爲難愈爛處須多用八味口瘡藥藥內須多加龍骨珍珠爲要

凡傷寒後忽連珠蛾及喉閉者不治其症喉項強硬目睛上視故多不治

凡患喉症非急症者一二日或未自發寒熱病尚輕緩若至第三日發寒熱症必加重須問其大小便通利否如二便利症必減此不過浮游之火攻于咽喉宜內服消風清熱降火解毒之劑若二便不利乃內有實火非用降火解毒直劑反用通利二便之藥火從何泄病從何解亦要問其頭痛不頭痛如頭痛則發傷寒爲難治之症

凡喉症必俟大便去後方可望愈如大便閉結不可輕許其愈

凡喉症初起大便閉結宜大黃元明粉下之則火自降而易痊若至五六日久不愈而大便閉結用之立斃蓋因病久胃氣已虛元氣已弱故忌用硝黃雖大便閉甚只宜用蜜導等法此秘法也凡喉症無痰者不治

凡喉須吹藥四五管方可出痰必出痰三次可以全愈其出痰初管必用金丹多爲要必直對喉中重吹吹過即提出管恐痰乘藥嘔出也

凡喉症先碎須先用長肉藥吹之後用碧丹

凡喉症初起一二日用碧丹漸漸多加金丹勢凶者金丹爲君或單用金丹方能弔出頑痰

凡喉連胸紅腫此係肺癰必用蜜調藥加百藥煎爲要一云百草煎是爲要

凡喉中無形便紅痛者疊草灰多用

凡婦人喉症腫痛有因經閉致火上升而患者宜內服通經藥經通而喉症自愈

凡喉症凶者面黃睛白亮無光彩脈沉微無力是神氣外泄無陽之症決不治若面發紅勝脈來洪大有力症雖重是有元氣治之可救

凡腮口內腐爛用箸纏絲綿蘸水輕攪患處痛者用藥必愈不知痛者即係死肉多難愈

凡舌腫脹滿口吐出在外難以納藥者用蓋牙皁俱製過爲極細末等分和勻用少許吹人鼻中牙關自開痰涎自出然後用箸捲綿蘸甘草湯潤其唇舌後用四味口瘡藥多加上好冰片頻吹自愈

凡吹喉藥非惟腫硬患處要吹并四圍好處亦可吹取其沿開易愈也

凡舌上乾而難吹藥者或用蜜潤或用湯照之方可吹

凡口舌等症吹藥後如舌無涎或如乾橘囊者不治

凡遇口舌腐爛無血出者不治

凡吹喉內藥須用氣和平用管周遍爲妙

凡治口瘡用絲綿輕攪切不可用青布恐傷處致腫

凡舌脹大用生黃柏加冰片敷之若出血用炒黃柏加冰片敷之

凡患搖舌喉癰如大便閉塞煎藥內用元明粉大黃如小便不利前藥內加調六一散服之此心法也

凡用碧丹看症凶水片多於甘草將愈甘草多於冰片

凡患牙齦牙龈紅腫但牙關不開口能開合若患牙齦則牙齦腫脹肉突出牙關緊閉口不能開先用碧金二丹吹入牙齦外用黃蜡香削成鑿子樣漸漸插進牙門則牙漸開即將金丹吹入患處

凡藥貯磁瓶須擦實然後塞緊至用時用管撥鬆用過仍前法

凡吹喉症欲出痰涎加皁角末少許

用藥秘法

一治鼠雙蛾及連珠蛾吹碧丹五分金丹一分後用金二碧三同吹出痰涎服前劑左加黃連川芎扁角右加赤芍柴胡雙蛾則兼用之大便不通加枳殼元明粉候大便去則症自愈矣如至三日看喉內但紅腫而無細皁即喉癰症

附方治單雙蛾　凡生乳喉危在頃刻將病人左右大指紮住用艾圓灸大指向內處即少商穴即指甲角非葉許向內針一分灸一壯

治單雙左右蛾　巴豆不去油研細辛焙乾烏末與巴豆粗等分末用一粒將綿紙撚前藥于內作紙條剪去一頭露藥入鼻孔

中毒卒死少頃便腦痰吐盡絞之以血即愈

又方將青魚腦用糯米入腦內陰乾研細吹入喉間亦有痰吐出可愈

又方芒硝一錢五分脆碧八分雄黃八分共為末吹入喉中

一治喉癬碧丹加金丹少許內服青子藥及煎劑自愈

一治喉癬用碧丹頻吹青子藥不時嚥嚥再服煎劑內加土貝母下氣須忌憂思憤怒酒色豆腐雞肉魚蝦蟹辛熱猪頭肝腸茄子及一切辛辣炙煿動氣動火之物一月可愈

附方治喉癬 葫蘆一個必黑色者方用 白礬三錢納入葫蘆腹中嘴脚俱紮住外用鹽泥封固火煅直至烟盡為度再用鹽內阜莢燒灰存性量用多少加入冰片少許共為末吹入患處即愈

治喉蔷初起用碧丹五分金丹一分後用金二碧三和吹亦須頻吹青子藥兼用煎劑不可間斷久之自愈

一云將茨菇汁搽上然後吹藥喉癬亦用此法不然吹藥效遲

一治撞舌喉癬煎藥用犀角地黃湯加減其撞舌用金丹吹至舌根及舌下兩旁時刻不可間斷方能速產喉間用金一碧十亦須頻吹

一治緩喉風最為急症初起即用金碧二丹頻吹內服煎劑可救稍遲不救藥中須加牛黃吹之

附方 明礬三錢 巴豆七粒去殼 銅綠入巴豆燒至發枯共巴豆研細吹入喉中流出熱涎立開內服通關散

又方 用虎脚跡草即水蓼草加輕粉五分和根葉搗爛絞汁以酒漿一碗沖服之如牙關咬定以筯頭撬開灌下嚥出硬痰如雞子樣者立效一云輕粉不宜服服之恐有害此方姑存其法姑存之

一治痰厥痰嗽痰喘痰吼有聲取桃根下載毛窠以針挑開頭將梅花冰片一粒耳許納之封固瓦上煅脆研每服用一匙許淡姜湯下一云取榆樹上出過戴毛窠一箇剪病人指甲脚爪如左邊乳蛾剪其右邊者如右乳蛾剪其左者若雙蛾左右皆剪用食鹽少許入窠內煅過為末吹入患處以手指拍其後項即時破潰痰血即出

一治喉閉 生白礬雄黃等分為末吹入喉中 又蠅蛸濃入即甦 又單雄黃新汲水磨下效 又巴豆二粒紙裹緊切數兩頭數子以針刺孔納鼻中久即發內服通關散 又牛膝根以醋同搗汁去渣灌喉中如無藥處單用醋灌滿出痰涎亦效

治喉痺 遠年蘆頭屋上作辮者剪寸許長約一升煎湯飲之立瘥此方傳自走方人一次目覩伊治此症即愈此理未可解

一治牙槽風用口疳藥加牛黃倍珍珠孩兒茶頻吹初治五日紫色退至白色再五日長肉再五日方可望痊若成牙漏齒縫出膿血極難調治須戒酒色一切毒物及辛辣炙煿內服滋陰降火之劑外用前藥頻吹耐心治之可以漸愈

一治牙疼即用口疳藥吹之自愈

一治牙齦先用碧金二丹吹入牙齦外用黃熟香法牙間再進金丹吹至牙齦腫塊自消方止

一治牙撬先用金丹後用口疳藥多加薄荷冰片煎藥內多加石羔連翹

一治牙宣內服扶脾清火湯外用珍珠散止之一云宜服涼血清胃之劑外用珍珠散此指實火言也若因虛火動腐爛牙跟外用長肉藥內服扶胃清火之劑此虛火實火較為清楚

一治牙齒用口疳藥兼服煎劑

一治牙疔毒用金丹碧加碧丹吹之內服涼血解毒降火之劑已破者用口疳藥加牛黃倍珍珠孩兒茶治之服煎劑如犀角消毒飲之類

一治舌癰用金碧各半吹在舌根方愈煎藥內多加黃連山梔犀角

一治木舌重舌初起用金碧二丹後單用金丹吹之內服煎劑雖凶不害命

一治紫舌脹塞用碧丹內服犀角地黃湯加減一二日可愈

一治上腭癰銀針挑破用口疳藥吹之碧丹亦可

一治面癰頸癰托腦等症防內攻須用碧丹內吹兼服煎劑外急用三黃散敷之

一治小兒走馬牙疳初生胎毒口疳及大人腐口疳重者俱用口疳藥加牛黃珍珠看輕重加減無不奏效

一治小兒雪口用絲綿捲筯頭蘸水攪去白醬用口疳藥吹頻攪頻吹內服犀角汁或犀角解毒丸

一治小兒馬牙先用濕水青布絞淨以竹筯撬開牙關用銀針脚漸漸挑出血膿淨用口疳藥吹之立效不吹亦不妨

一治口舌喉內結毒口能開合者但用禁藥吹之即妙

一治酒齄若初起無內症用麻子大艾圓灸三壯貼膏藥日久漸愈若有內症作渴早服加減八味丸午

服清涼甘露飲日久流血不止形體瘦弱虛熱痰生面色黧黑腮頰紅現口乾渴甚者難治

製藥秘法

製硇砂法 一名玉丹又名雪霜先用生礬打碎如指頭大入銅銀罐內用浮炭火入爐煅煆以食飯剔入罐內攪之無塊爲度次將上好硇打碎塊投下約十分之三再次將白硼砂打碎塊投下亦十分之三少頃再將生礬逐漸投下候烊盡照前投硼砂少許如是逐層漸次投完直待鍋起罐口高發如饅頭樣爲止方架起炭火燒至乾枯然後擇潔淨瓦一大片蓋罐口一時取起將牛黃少許爲細末用水五六匙和調以筯超起滴丹上將罐仍入火內煅乾即取起連罐覆置淨地上地用紙襯罐上再用瓦覆之過七日收貯聽用輕鬆無紋者佳如堅實有堅紋者能殺人即不可用或留作蜜調藥用煅時火候初宜緩然亦不可太緩恐致礬僵不易鎔化後必堅實豎紋中間及後須用武火又如礬未鎔盡即投硇硼不能盡鎔化以致堅實有堅紋矣罐須煅透不令爆碎不用鍋過銀者恐有銹毒 此丹多製預備愈久愈妙製時不可用爆炭爆炭臨症用時要和冰片吹之

取百草霜法 須燒芋柴者方爲百草霜須取其近鍋底者刮去浮面一層取中間一層不宜刮著底著底不可用若鍋口邊亦不可用

製黃柏法 揀黃柏之厚者切片用荆芥爲君甘草爲臣煎濃汁浸片候柏軟即取起離瓦上慢火炙至金黃色如焦色者去之再入白蜜湯漉一次晒乾聽用

製梅礬法 取青梅大而圓者嫩而脆者先用竹刀披不圓蓋留好輕縱去核將研碎生白礬非前製過者揀實在內仍以圓蓋覆上以竹釘扦好過夜明晨用炭火煅之其青梅灰燼則無用其梅內煅過之礬輕白如膩粉味極平酸收貯磁瓶中聽用此爲生梅丹

製人中白法 取多年溺器一個用水灌滿置于火爐上滾則傾出如是者五六次須去盡傾出之穢氣然後將鹽泥封固文火煅之半日取起俟其冷定去泥殺取溺器內淡紅者收貯磁瓶中置地內出火毒再將後藥製之

製人中白藥方 黃連 黃芩 黃柏 山梔 連翹 右五味等分煎濃汁將人中白火內煅紅即淬入內如此七次方止收貯聽用

製牙皁法 取牙皁之堅小不蛀者爲佳炙至色光明而脆爲度去其兩頭爲細末

製燈草灰法 一名元丹先揀白淨者黃色不可用鋪于淨桌上以清水噴濕候至心內漸濕爲度將筆蘸之完固不碎者兩頭厚薄相等者用水浸濕以濕紅紙團裹緊一頭即將燈草捺成團塞入套內以竹著揀實候出水如此逐漸塞滿再用濕紙塞套口入浮炭中煅之視其烟絕及套內通紅即取起放淨磚地上須先以水噴濕地上用碗合之待冷取起剔去外面套灰及紙團灰藥灰須黑色成團者佳煅時勿令筆管爆碎不可煅過過則灰少無用不可煅生生則不成灰亦不堪用此藥最輕煅時尤難得法須平日多製以備急用

製煙霜法 揀殼之細直腹小爲雄粗而大腹者爲雌雌不可用將牙刷蘸水刷去石灰置瓦上慢火炙至蕾色爲度必要折斷中間無絲筋連者爲佳去頭足研細收貯聽用

製鉛硇法 須擇其明淨紋理鉛鉛者佳必須長白如牙厚大者名爲牙硇先以溫湯離過絹搥乾仍用紙包放罐上椒料洞內五六日收其濕氣自乾如雪霜者收貯

配藥秘法

碧丹配法 每玉丹三分配百草霜半藥匙入乳鉢研細次入燈草灰一厘研勻配成瓦灰色再加甘草末三藥匙薄荷末三分研極細然後加上好冰片五厘多加尤妙再研勻入小磁瓶塞口極緊勿令泄氣然此藥須當時配合若配過五六日則無效設配過週陰雨一日亦不效凡春夏宜薄荷多玉丹少藥配成青色秋冬宜玉丹多薄荷少藥配成白色此要法也又云再加月石少許如欲出痰加牙皁少許薄荷須極細末去粗褐色者共研細如淡鵝黃色

金丹配法 每提過鉛硇一錢八分配蒲黃四分蒲黃生用用羅絹細篩篩出細末去粗褐色者共研細次下殭蠶末一分牙皁末一分五厘香白芷末一分共研細如淡鵝黃色加冰片一分再研極細此藥可以久留雖經年亦可用惟冰片臨症時加入此藥書能消腫出痰若遇牙齦腫舌穿牙疔毒專用此治之若咽喉等則藥用碧丹看症輕重如症重者再加牛黃于本方內如喉重症及喉風加殭蠶牙皁二味輕症則用牙硇蒲黃蕊碧丹消痰化熱解毒驅風固爲良劑尚屬平緩若金丹消腫毒除風熱開喉開出痰涎最爲神效但喉症初起金丹不宜多用以其能直透入內且善走散若初

起即多用之恐症輕不勝藥與病人反扞格不相入也若喉癰及單蛾單用碧丹若其他重病碧金兼用須知先後多寡最爲要訣初起用碧丹九分配金丹一分吹過五管次用碧八金二再次用碧七金三如症重碧金各半用至三五次後痰涎必上湧然後用金六碧四將管直對喉中重吹一次隨即收管即吊出痰此要訣也若症重極用金八碧二尤妙凡初起吹一次須令患者低頭流出痰涎

煎劑秘方

扶脾清火湯　治牙宣

生地三錢　丹皮一錢　山梔一錢　荊芥八分　白芍一錢　石膏三錢　歸身一錢　知母一錢　麥冬一錢五分　赤茯苓一錢

右共爲一劑水二盞煎八分食後服

如小便赤澁加木通　如大便閉加元明粉

如牙齦腐爛用八味口疳長肉藥吹之

清涼甘露飲　治齒唇

犀角一錢　茵陳一錢　石斛二錢　枳殼一錢　麥冬一錢　生地二錢　黃芩一錢　知母一錢　柴胡一錢　甘草一錢　枇杷葉刷淨去毛一錢

右共爲一劑加燈心淡竹葉煎服

喉症煎藥主方

前胡　連翹　山梔炒　花粉　荊芥　參　薄荷　大力子　桔梗　甘草

一云加金銀花　右共爲一劑水煎服

如頭痛加石膏　如渴加麥冬知母

如胸膈飽滿加枳殼　如發寒熱加柴胡

如鬱熱而發加芍藥貝母去心

舌症煎藥主方

黃連　木通　連翹　犀角　生地　丹皮　赤芍　麥冬　山梔仁炒　甘草

加燈心煎服

如有鬱熱有痰加貝母

如大便閉加大黃枳殼　如乘口唇必用石膏

牙症煎藥主方

腎主骨齒乃腎之標骨之餘足陽明胃經之脈貫絡于齒上牙龈手陽明大腸之脈貫絡于齒下牙龈屬腎實亦有腎虛亦有風寒

元參　丹皮　生地　知母　地骨皮　山梔炒　白芍　黃柏　車前子　甘草稍

右共爲一劑水煎服　如虛加熟地枸杞去山梔

如有風加荊芥　如欲解毒加連翹黃連

如熱甚加石膏爲君炒黑升麻爲佐

如穿牙疔毒加甘菊及紫花地丁草兼用消腫解毒之藥

蘇子降氣湯　虛陽上攻者用之隨症加減

蘇子五分　前胡一錢　當歸一錢　肉桂三分　厚朴一錢　廣皮三分　半夏麴五分　甘草一錢

右共爲一劑加姜棗煎服

清咽消毒湯

元參　薄荷　黃連　山梔　連翹　防風　荊芥　桔梗　石膏　銀花　牛蒡子　甘草　右共爲一劑水煎服

喉痛口卒喎噤湯

牡蠣煅研粉　以陳米醋一盞入牡蠣粉三四匙調和砂鍋內煎熬數沸待冷不時嚥嚥入口痛可止腫可

丸散秘方

犀角解毒丸

犀角一錢　梧桐一兩　生地五錢　朴硝錢　大力子五錢　連翹六錢　元參六錢　赤芍五錢　青黛二錢　粉甘草二錢

右共爲末煉蜜爲丸如龍眼大每服一丸薄荷湯下

若兼驚則硃砂爲衣通治小兒諸痘丹毒及痧症後餘毒並妙

玉液上清丸

吳暘谷醫武帝喉痺製此丸一丸即愈治風熱上壅頭目不清咽喉腫痛口舌生瘡服之生津液化痰涎

薄荷十四兩　柿霜五兩　梧桐四兩五錢　青黛三錢　元明粉二錢

川芎一兩入錢　硼砂二錢　甘草三兩五錢　冰片二錢　百藥煎五錢

右共爲細末煉蜜爲丸如芡實大每服一丸不拘時嚥化　一方有防風一兩入錢　砂仁四錢五分

四七嚥化丸　治喉內有如梅核氣痰咽不下吐不出服之如神

紫蘇二兩　厚朴三兩　茯苓四兩　半夏五兩薑製　陳皮二兩　香附二兩　甘草一兩炙　以上共爲末煉蜜爲丸如芡實大用大棗二枚生姜五片煎湯化一丸

烏梅嚥化丸方

柿霜一兩　百藥煎六錢　麥冬四錢　川貝母四錢　犀角二錢　沉香二錢　孩兒茶四錢　辰砂四錢　牛黃二分　薄荷葉一錢二分

共爲極細末用烏梅肉丸如芡實大每日不拘時嚥化之

膏子藥　治喉癰喉痺喉菌

薄荷君　玉丹臣　貝母佐　元丹　甘草　冰

片硝 百草霜 先將玉丹百草霜研和勻後入元
斤再研和再入薄荷甘草貝母研極細方入冰片再
研和白蜜調服凡喉蘇喉菌須時時頻咽之症重藥
服煎劑及用吹藥

吹藥秘方

珍珠散 治牙宣

龍骨一錢煅 珍珠一錢 象皮炙脆五分 烏賊骨去殼一錢 兒
茶五分 三七一錢 乳香五分 降香節忌鐵一錢 沒藥五
硃砂五分 冰片一分 石共爲末將新棉花捻成團如
指頭大蘸水再捻成扁團藥塞患處以指抵之勿動
一二次即止

治口舌喉內結毒散

薄荷一錢 兒茶八分 硃砂一錢 牛黃一分 珍珠二分
冰片一分 甘草一分 宜加天靈蓋一錢
右共爲末吹之如腐瘡結毒加入輕粉少許
三黃散 治鵝口瘡面糜如膩硬不消氣血凝滯或
痰塊結而不散則兼陰症矣加姜葱汁爲要此藥兼
治小兒丹毒

大黃君 蒲黃臣 牛黃佐 冰片使
共爲末用芭蕉根汁調敷患處或用扁柏葉搗汁和
蜜調敷 或用姜黃一錢生大黃一錢生蒲黃五分冰片五厘
麝香二厘白蜜調加葱姜汁二三匙或芭蕉汁或側柏
汁和蜜同前法亦可

玉鑰匙 治牙關緊閉

用巴豆壓油紙上取油紙撚成條點火吹滅以烟熏入
鼻孔一時口鼻流涎牙關自開

治咽喉腫痛乳蛾牙齦散

梅鞭一兩 甘草五錢 白蔻霜錄 訶子肉煅熟三錢 片腦
研極輕飛不拘多少 共爲末吹之

治癌喉風蠍喉風一切急症

梅鞭一兩 甘草三錢 兒茶五錢 雄黃二錢 琥珀六分 薄
荷一兩 麝香少許 製硼砂四分
共爲末吹之或有時加蒲黃去雄黃
製硼丹 秘方此藥不宜多用凡腐口香口可暫
用之

硼砂二錢 五倍子炒黑研末二錢 爲末吹之

藍袍散

銅青一錢水飛 香芷一錢 生甘草五錢
共爲末吹患處
黃袍散 治口碎口疳走馬疳胎疳疳後疳
重症加辰砂少許滴乳石少許入兒茶內研極細
共爲末吹患部爛牙疳要用藍袍散同吹

薄荷一兩 甘草三錢 黃柏三錢 黃連三錢 冰片不拘
共爲末吹之

真青 治擂舌喉癰

玉丹三分 元丹一厘 甘草一分 薄荷二分 牙硝三分 冰
片一分 硼砂一分五厘 白蔻霜一分 共爲末吹之
但禁 治症同前

蒲黃二分 牙硝三分 硼砂二分 冰片一分 薄荷葉一分
右共爲細末吹患處

八寶丹 治喉癰喉蠍喉痺出血腫雙乳蛾舌癰
舌癰齒癰牙齒牙齦擂舌擂唇牙疳癰喉風腐毒生
于喉間

牛黃一分 膽礬二分 珍珠五分 琥珀三分 乳香三分 沒
藥三分 冰片三分 麝香一分 一云用滴乳石五分火
煅六七次 右共爲末吹患處

四味口疳丹

薄荷 香芷 甘草 冰片
各等分爲末吹患處如凶關加前製硼砂各少許
入味口疳丹即藥長肉

薄荷三錢 甘草五分 冰片三分 珍珠五分 兒茶一錢五分
白龍骨三分煅 細香芷二分五厘如腫加之
右共爲一料將每味各研細如飛麵密羅篩過然後
配合一處再加製就黃柏末一分入瓶瓶中勿泄氣
凡遇口碎各症口疳用少許吹之 如初起腫而熱
甚者多用薄荷取其辛涼能散也 如患處不腫
熱不甚且痛久宜長肉爲主本方多加兒茶珍珠龍
骨配成紫色凡一切喉症碎者亦用此長肉 如口
疳重症加辰砂少許滴乳石少許入兒茶內研極細
用之 如治走馬牙疳穿牙齒及重舌口疳初生小
兒胎毒口疳本方加牛黃珍珠無不奏效若黑而臭
腐者不治小兒黃色胎疳如乾橘囊者不治 如疹
痘後口疳加牛黃珍珠去龍骨大都遇極凶症難效
者或欲速愈見奇多加牛黃珍珠更多尤妙痘後疳
非此不靈餘症加之無不神驗此口疳之妙藥也

五寶昇丹藥

白礬一兩煅 膽礬一兩 磁石一兩水 辰砂一兩 雄
黃一兩 水銀一兩 右共和勻研至無星爲度入陽
城罐內照常法昇之收貯用

喉內結毒吹藥

牛黃一錢 冰片五分 製過人中白一兩 五寶昇丹八分
共爲極細末吹入喉中

專命丹 與前八寶丹同功

梅鞭 硼砂 膽礬 黃連 薄荷 冰片

右共為末吹之

冰蕊散　通用方

冰片一錢　青黛五分　蒲黃一錢　黃柏一錢　川連一錢五分
甘草五分　朴硝五分　枯礬少許　硼砂五分　薄荷一錢五分
人中白一錢　右為末內吹外敷俱妙亦治丹毒

十寶丹

薄荷二兩　甘草五錢　兒茶一兩　香芷一兩　血竭三錢　珍珠三錢　琥珀三錢　冰片四錢　雪丹一兩　滴乳石四錢

共為末冰片另加其毒丹出涎甚捷前藥方俱可加亦可單用此亦秘法一云無香芷加牛黃一錢輕症不必加如口喉不碎去珍珠琥珀

沈慕溪常用方

一治牙齦七日可愈
一治重舌七日愈
一治舌根雞五日愈
一治喉蛾三四日愈
一治喉蔷半月愈

青黛　蒲黃　薄荷葉　鹿角尖　雞內金　香芷
冰片　甘草　掛金燈子

已上共末吹之　如消腫用金玉二丹

如碎用碧丹世傳青藥黃藥白藥是也

奪命仙丹　治纏喉牙關緊閉明礬淡淨者二三兩　人乳一飯碗

右二味入銅杓內用浮炭不可用生炭火任其煎成不可用扇搧火亦不可動藥須至紫霞色極鬆者為佳若黑色者不用凡遇纏喉牙關緊閉者塞調少許匙挑牙縫間苟有流至喉間者口即開痰自化下及一切口中難愈之症配入八寶丹內用煎時忌婦人雞犬見煙此藥宜多備風爐三四枚預生火候用如所用爐內火將滅即移杓于別一爐上乘盛火鈔也

治咽喉十八症痰涎壅塞

陳大麥揀淨炒至黃色放地上去火氣再炒再退火氣如法宜炒至黑色為細末備用凡遇喉症痰壅欲死者配入碧丹吹至喉間痰自流出

附方

驅風散　治咽喉腫痛及纏喉風雙單乳蛾鍋喉飛絲入喉重舌木舌風痰上壅緊急喉風並效

鴨嘴磨礬一錢　碧雪一錢　硼砂一錢　煎黃一錢硼拈礬拌收　蟬肚鬱金一錢　雄黃五分　酒蠟一錢炒　明丹一錢即黃丹月取

右為末先將水漱口乾淨然後吹之

清咽散　治咽喉一切熱毒等症

青黛五分　兒茶三分　冰片五分　膽礬二分　薄荷葉五分
月石一分　元明粉五厘　燈草灰

為末吹之

碧雪丹　治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝　朴硝　馬牙硝　滑石　石燕煅　青黛

先將生甘草煎湯入諸藥再煎用柳木棍不住手攪令消鎔化入青黛和勻傾入砂盆內候冷凝結成霜研為末每用少許含化津咽不能咽者以管吹之

保生丹　治時氣痰涎壅盛纏喉風牙關緊急咽喉腫脹水穀不通或痰迷不省人事

雄黃一錢　雄黃一錢　藜蘆去皮心一錢　牙皂去皮炒黃一錢

右共為末入豬膽內塞口臨用蘆管吹鼻孔中一方有全蝎梢一錢五分

紫雪

青礞煅　冰片　麝香　月石　元明粉

冰連膏　專治喉痛口內或生肉球

真麝香二錢　冰片三分　川連末一錢

五色神功散　專治牙宣牙齦穿腐等症

冰片二分　麝香二分　大紅絨灰一錢　川連末一錢五分　硼砂一錢　珍珠一錢　鹿角尖灰一錢　五倍子三分　牛黃一錢
雄黃五分　人中白一錢　元明粉一錢　旋花一錢　柏末一錢　雞內金一錢　百草霜五分

喉症壽亦多矣惟錫山尤氏所著不蔓不支不偏不漏其議論洋括包舉其治法纖晰條分惜未有梓而廣其傳者余於無意中獲此抄本抑何幸也乾隆己酉仲春琴川山爽閣主人吳炳紊識

喉主天氣通于肺為呼吸之門咽主地氣通于脾為飲食之戶陰地也而危病求治可不急急乎治當治火而火分虛實則疏之清之下之鹿則理之滋之尋之總貴醫者之隨時用法耳尤氏為喉科專家多秘方施之盡資無不宜世寶其書余先人曾以青蚨二萬易得之會若雲張君鐫刊因舉舊本校勘一過而質之並識數語于卷末云嘉慶十三年歲次戊辰孟春靜殿陳耕道識于思誠廬

嘉慶戊辰迎六月
吾友張溥鵬校閱

常熟 吳氏 輯

冰片散 治一切口疳

冰片一錢 硼砂五錢 雄黃二錢 鈔三張燒灰 鹿角霜一兩

枯礬一錢 龍花二錢 粉草末一錢 元明粉二錢 雞內金一錢 蜜炙側柏二錢 如口中氣臭加人中白三錢銅

一方 青少許共爲末收貯敷用

珍珠散 專治骨槽風一名穿珠一名附骨一名穿喉一名穿腮一名牙槽風

珍珠一錢 枯礬二錢 真麝香二分 大紅絨灰一錢 冰片五分 銅青一錢 孩兒茶一錢 人中白一錢 旋花一錢 川連一錢 細芽茶一錢 雞內金一錢

驅風破毒 治症同前

明礬 巴霜 草烏尖 牙皂 薄荷 紅內硝

清肝流氣飲 治走腮

枳殼 桔梗 前胡 羌活 甘草 石羔 防風

荊芥 薄荷 河水煎服之

疎風桔梗湯

蝟尾 枳殼 黃芩 桔梗 山梔 荊芥 元參

防風 甘草 連翹 花粉 廣皮 粉葛 水煎服

蘇子降氣湯

蘇子 半夏 桔梗 前胡 廣皮 厚朴 甘草

防風 枳殼 黃芩 河水煎服

八正順氣散 治喉腫及喉閉

厚朴 沙仁 半夏 廣皮 茯苓 青皮 桔梗

枳殼 木香 元參 牛蒡 山梔仁 水煎服

防風通聖散 治口緊

防風 大黃 朴硝 川芎 甘草 當歸 茯苓

石羔 薄荷 滑石 山梔 麻黃 荊芥 桔梗

連翹 芍藥

清火降氣湯 治雙單蛾

前胡 蘇子 厚朴 甘草 廣皮 半夏 花粉

元參 桔梗 羌活 河水煎服之

蝟牙滌神方

胆礬研碎白雞蛋同拌搗乾爲末每錢加麝香二分和

勻吹之

降藥方

汞一兩 鹽一兩 白礬一兩 火硝一兩 皂礬一兩

同研如法降之

一點金

降君硃臣硼巴佐 蟾酥爲使同研和

煉蜜爲丸粟米大 癰疽發背點成破

降藥三錢 硃砂一錢五分 硼砂一錢 巴豆一錢 蟾酥一錢

同研勻磁瓶收貯

治喉刺喉蠅方

川貝母一錢 百草霜一分 燈草灰一分 冰片半分 桔

梗八分 玉露霜一錢 爲末蜜湯調服一錢

治牙宣

馬鞭頭搗汁敷之 燒懷灰 冰片 青黛 吹之效

偏正頭風方 此方能治半邊頭痛左痛瞎左目

右痛瞎右目雖痛至日夜號哭淚汁奎流目不識人

者亟效

乳香三錢去油 沒藥三錢去油 白芥子三錢炒研 北細辛三錢酒炒

白芷三錢土炒 麝香四分別用

共研末將冬夜酒糟和藥作餅三箇如茶鍾大次將

麝香四分勻三箇藥餅上面以指捺入餅放鍋中稍

柴把上隔水蒸熟以扎大陽穴上蒸進熱氣冷即換

再蒸每餅一箇約換十次風寒隨藥而出眼目即明

頭痛立止屢試屢驗真良方也

先指蘸燒酒磨香摩太陽穴然後用餅蒸之方爲合

法若頭風痛雙眼將瞎只用丁香五十粒麝香一錢

搗和陳黃酒糟內分作三箇餅以丁香嵌餅一面如

前方蒸熨更妙驗過

余前患喉症甚險用計醫藥咽下即疼勢如銳師

陷陣震霆湯藥不知其何方也今春真君奏上以與

君心共勸余刊尤氏喉科書曰此卷二十年前祕

不得傳惟李醫曾獲其一鱗半甲因假別本于陳

君繼先查知其尊人石泉先生曾以二萬錢抄

易者也顧字句已多後人增改再考沈氏尊生書

所錄又非全本決擇頗難幸沅楚吳君以珍本相

贈遂得據以付梓後有附錄一卷係吳氏所輯經

驗良方非尤氏著以其相類并附刻之張海鵬識

咽喉脈證通論

撰人不詳

重刻咽喉脈證通論敘

咽喉昔人方之與地固險要之區也扼之抗之並制人之命第其事有相背戾者於地爭得之以制勝至夫疾證則隘於此者危矣然亦未嘗不合人居險地以策勝之疾得險地以藥療之客主之形不同攻擊者之情一也夫治兵無常勢而用奇者勝姜維守劍閣鍾會攻之未能克鄧艾由邪徑趨涪吳人於江險積鐵鏁橫截壬午火燒液之並發亡鐵錐咽喉之用甘桔湯竭人之劍閣吳人之鏁錐也此脈證通論一書相傳出宋時杭干佛寺僧靈中其十八篇皆精要無類吾友許子樾齋氣之生人不可計世固不知其用藥禁忌一篇昔人皆昧之所謂吳人竭人之敵者也亦猶七國之韓欲援之而欲以折之固必有道在矣因綴投之梓而記之

道光二十有一年歲在辛丑閏三月吳興姚晏芳林北堂書

咽喉脈證通論敘

醫家十三科咽喉居其一誠以氣之出入生死之關事醫者不可不審求也內經曰喉主天氣咽主地氣玄論篇曰心玄肤玄則心痛喉中介介如梗肤甚則咽腫喉痺厥論篇曰手陽明少陽厥逆發喉痺嗌腫痓脈解篇曰厥陰所謂甚則嗌乾熱中者除陽相薄而熱故嗌乾骨空論篇曰督脈生病治督脈治在骨上甚者在齊下營其上氣有苦者治其喉中央在缺盆中者其病上衝喉者治其漸漸者上俠頤也謬刺論篇曰邪客於手少陽之絡令人喉痺邪客於足少陰之絡令人嗌痛不可內食又曰嗌中腫不能內唾時不能出唾考內經所言喉證者凡謂嗌腫之氣萃著於其地而已無所謂十八證也推靈樞癰疽篇岐伯曰癰發於嗌中名曰猛疽疽猛疽不治化為膿膿不寫塞喉半日死則類喉科之乳蛾而屬之癰疽仲景去先聖未遠其金匱玉函所載雜病並無喉證正與內經相合李東垣劉河間為金源巨手所著諸書亦不載是證獨朱丹溪有喉痺一門第以飲膏為主分經藥治則亦內經之支也海甯許珊林樾得喉科書一冊於其鄉之世業是醫者題為宋異僧所遺以其篇第攷之即所謂十八證也先總論病態而繫以藥後詳方證復列用藥禁忌且以甘桔湯為喉證所忌一歸俗醫誤執成方之謬是能獨具手目者以其喉證為火毒上升用藥降氣瀉火為主即靈樞猛疽之意也其以病起何經用何藥主治即內經丹溪之法也夫善讀新岐書者固可隔垣洞見何待檢閱之煩然則此書之作蓋為俗醫設也且為無醫設也俗醫與無醫則此書之功偉矣珊林因舊刻之訛重勘而精梓之家兄聖常惜其傳之不廣也郵寄本重鋟因括其大凡於左道光辛丑閏月之望吳興姚晏芳林北堂館

校刻咽喉脈證通論序

或曰宋有異僧者寓杭之干佛寺遺一囊去寺僧啓之得是書秘不欲傳今尚有能世其術者余曰唯唯否否夫方技之書類多託於畸人異士隱僻怪誕者流神其說以炫人耳目是書苟宋人作也不應有棉花箱云云此疾元時始入中國何先數百年已能言之鑿鑿如此邪第綜其方論凡夫喉證之虛實緩急辨析詳徵多所依據則知非近人所能苟非宋亦不出元明間一巨手耳余先後獲四五寫本率為庸妄人竄改塗乙故各各不同及見永中採本益紕繆滋甚因創數本中排比參校窮數月之力如理亂絲不啻數芬之而數析之也今年夏手錄定本友人楊子星臬見而躍之星臬今俞附也殆不至阿私所好以貽誤後人者還授之梓以永厥傳簡莫仍署曰宋僧原本亦疑以傳疑意爾夫豈敢神其說以炫人耳目哉是為序

道光五年乙酉六月海昌許樾譔

咽喉脈證通論
總論
通治用藥
用藥禁忌
丸散方藥
牛黃解毒丸 紅肉消散 仙命丹 鈴子 膽水消毒散
水硼散 玉屑散
鎖喉第一 加減防風解毒散 加減柴胡雙解散
重舌第二
氣癰第三
乳蛾第四
弄舌第五
纏喉第六
啞癰第七
骨槽第八 加減當歸連翹散
懸蛾第九 加減千金內托散
爛喉癰第十 犀羚貝母散 酒黃丹
熱風喉癰第十一 除血風黃芩
腦證喉癰第十二
喉閉第十三 四順理中湯 四逆湯 通脈湯
噎食第十四 當歸通脈湯 加桂散
發頤第十五 南星膏
懸癰第十六
喉菌第十七
牙癰第十八

總論

夫喉者吾生氣機出入之門戶瞬息存亡之際性命係焉偶一受病危在須臾迫不及待所貴醫者能識受病之原與夫虛實痰火風寒熱毒之異更於望聞問中參究脈理尤爲先務之急自來業喉科者全不講脈所以治之鮮効今試論之假如其脈洪大而實其人氣粗而躁此有餘之證用藥則以散風下氣清火消痰散之者荊芥防風羌活獨活紫蘇是也下之者枳殼枳實青皮厚樸山查前胡是也清之者山梔黃芩黃柏甚則犀角黃連消痰則以膽星樓仁杏仁爲主若脈洪大而浮軟無力或絃緩而濇其人氣委而靜此不足之證用藥則以涼血生血滋潤消痰涼之者丹皮白芍是也生之者生地當歸是也潤之者茲仁知母花粉是也消痰則以貝母樓仁杏仁兼用山梔黃芩黃柏犀角黃連或有純是陰脈者或有純是陽脈者當以病治病脈不與焉即以荊芥防風牛蒡射干黃芩枳殼銀花獨活生地丹皮花粉爲治再以保命丹或紅肉消同服日用吹藥夜用噙藥無不見效更有一種熱病而脈熱藥火毒熾甚而發於喉閉大寒大熱疼痛不止或舌脹而木伸縮不能飲食難進其脈洪實有力大便不行宜急下之若脈洪弦而浮無力宜涼血行血爲主若過用疎風散火之劑恐變別證最稱難治又有一種出外急走途路脫力而傷肺氣喘息難舒以致喉痛舌脹地閣下垂突如鎖喉之狀內觀之非重舌外視之非痰毒寒熱大作痰涎湧湧六脈洪大中空面色發黃而浮初以防風通聖散探之或效一二即以涼血生血順氣之藥治之又有假喉證非喉證者其喉亦痛牙關緊閉腳膝疼痛或腹脹痞悶脈學應作痛此因受有重傷或用力太過致瘀血凝滯當以行血破瘀爲要初起可救過五六日不治又如弱證喉癰雖是肺經之病亦有兼他經而起者何以知之假如喉閉紅腫作痛是肺經火風之故若頸項之筋有時或左或右作脹而梗氣悶不快此怒氣傷肝左關脈必洪大而弦當清肝火以舒筋涼血爲主用藥則以當歸牛膝佐以柴胡黃芩羚羊若兼右關微弱而緩乃脾胃有虧須兼用白芍茯苓此肝脾與肺共病也喉間紅腫作痛其舌紫色或生刺作痛或作木乾枯是心經受虧無血榮養以致虛火熾盛且兼思慮過度鬱氣所成左寸脈必浮洪當以犀角黃連爲主佐以當歸白芍此心與肺共病也喉間紅腫作痛滿脣焦裂口熱如燒或作乾嘔是胃經虛火熾盛右關脈必洪弦且緊當以山梔黃芩爲主佐以當歸白芍山藥此胃與肺共病也喉間紅腫作痛夜間舌乾口苦湯水不進或有嗽而無痰更兼滑精者是腎水枯竭虛火上炎兩尺脈必洪數無力當以山藥知母黃柏爲主佐以花粉澤瀉白芍茯苓此腎與肺共病也若夫肺經獨病或吐血而成或嗜酒而發或脾爲而生氣血消散嗽重聲啞喘急痰多聲如曳鋸睡臥不得六脈洪大而浮肺部更甚當以荊芥仁山藥貝母黃芩樓仁牛蒡爲主佐以當歸白芍熟地茯苓丹皮犀角黃柏知母服之喉痛雖止然不過待日而已更有六脈沈陰神脫氣敗飲食不進步履不前盜汗自汗如雨脾氣虛泄死無疑矣若年老人喉閉紅腫作痛或古上生刺或破爛或木脹言語不清六脈微洪五至有餘飲食動靜形色神氣如常此血少火盛當以黃芩丹皮茯苓熟地當歸白芍爲主佐以元參牛蒡枳殼銀花花粉山藥荊仁甚則加犀角黃連不同前論若小兒痘後或疳後患此當以犀角黃連脈其熱毒更以涼血補血健脾之藥佐之甘草參芪斷不可用此外用藥與大人相同若女人胎前患此者先以安胎爲主次以涼血爲佐紅肉消保命丹忌用餘藥無妨產後一月未滿者當以熟地當歸補血枳殼青皮下氣元參射干牛蒡元胡索銀花消腫少加黃芩花粉以清熱紅肉消保命丹可用但不宜多吹藥噙藥忌之如經期適來當以破血下氣之藥爲主涼血者少用紅肉消保命丹噙藥服之亦無忌茲論其大畧如此餘詳各條

通治用藥

夫喉證向有三十六法今余列十八證名目雖簡而治法已備要之十八證中又可以風與痰與火概之凡遇此證不論緩急只以下氣消痰爲主次則清火涼血若不分先後混亂用藥貽害匪淺今開用藥大概於左惟高明者臨時參用可耳

藥用防風荊芥胡丹皮獨活各一錢杏仁樓仁山查各三錢車前木通各八分兩劑後加山梔膽星各一錢生地二錢如火未息加黃芩一錢以保命丹紅肉消同服

誤用黃連牛夏生薑桔梗之類難以收功照前方加羌活獨活服幾劑自愈

牙關難開須加真北細辛一分

單蛾雙蛾至八九日後方可用鍼刺出毒血未滿十日萬不可刺

或有疔瘡根腳紅肉消不可用用之反凶煎藥中加地丁草七八錢自愈保命丹可服

頭腦痰毒須加象貝母草河車若日久難愈以蝦蟇一箇研好硃砂五分灌於中泥裹煨研末服之自消

用藥禁忌

古有甘桔湯乃清喉之要劑今人見有患喉證者即用之而無疑嗟乎此猶抱薪救火非能愈疾而更增其疾矣何以言之夫喉證乃火毒上升所致須以降氣瀉火爲要甘草補中而不瀉火既受其補則火愈熾病愈重矣桔梗引諸藥上行藥既上行則痰與火亦引之而上行勢必喉閉壅塞於病更加重矣故小兒驚痰大人痰火桔梗是最忌者本草云升麻引胃中清氣上升又可代犀角似乎可用不知一用其痰火與氣一齊上湧於咽喉之間四肢逆冷喘急異常爲害匪淺若在他證猶或可用如鎖喉腫之則不治矣半夏雖消痰若喉證痰重者誤用之爾不旋踵蓋此乃治脾家淫滯之痰至於喉證有痰總不外肺中熱火

何可以半夏之燥烈治之乎老薑辛辣發散雖喉證亦以發散爲主然適用辛辣之味則以火益火大非所宜此五者與喉證關係甚重故特表而出之至別藥之中亦多禁忌惟業醫者審擇用之茲不多贅

丸散方藥

牛黃解毒丸 即醫藥

治一切喉風痹閉咳嗽喘急痰涎壅塞頭腦迷悶並口舌等處無不見效

牛黃五分　青黛一兩 飛淨　冰片五分　雄黃五錢
兒茶三錢　官硼五錢　沙尚二兩 明淨　脑星四兩

研細末生蜜和丸如芡實大每嚥一丸待其自化嚥下一日夜須嚥四丸小兒減半

紅內消散

治咽喉一切諸證並無名腫毒已潰未潰均可使用厥效如神

大蜈蚣 去頭足炙脆同米炒以米熟爲度　乳香 去油盡
血竭 研　雄黃　象貝母　川山甲 炒
麝香 揀去毛皮乾研

右藥等分惟麝香少許研細末每服七分小兒減半和煎藥同服酒下亦可

保命丹錠子

治咽喉口齒新久腫痛並解諸毒磨服神效

麝香 揀去毛皮乾研三錢　辰砂 明透者水飛淨三錢　冰片 梅花大塊一錢
珍珠 研細末一錢　琥珀一錢　山豆根 汁見補　文蛤 洗淨晒一兩
山茨菇 去毛皮淨焙二兩　雄黃 研淨三錢　于金子 白者去油一兩
紅毛大戟 浙江紫大戟爲上北方雖有大戟不堪用去蘆根洗淨焙乾爲末一兩五錢

右藥研末以糯米粥和山豆根汁打糊爲錠每重一錢病輕者一錠重者連服二錠

膽冰消毒散 初起吹藥

血竭一錢　膽礬一錢　雄黃一錢　乳香 去油三錢
冰片一錢　白占一錢　燈心灰不拘

冰硼散 敗毒吹藥

冰片一錢　硼砂一錢　山豆根 二錢五分
玉屑散 一名五馬破毒

治咽喉口舌頸項破爛諸痛皆效

薄荷 三兩 焙乾　官硼 三錢五分　雄黃 三錢　兒茶 一錢
冰片 三分

右藥研極末貯瓷罐內臨用挑少許置舌上咀含片刻嚥下日用八丸次如鎖喉風口內乾枯牙關緊閉不能咀含者以無根水灌下自能開關生津惟脾虛胃弱者不宜多用

鎖喉第一

此證因風熱積於胸膈或酒色及憤怒所致其狀喉上下左右紅紫腫痛或帝丁焦黑腐爛頸項浮腫痰涎壅塞聲響如鼾氣急發喘眼目直視額上有汗如珠身汗如雨或泄瀉清水四肢厥冷或腰腹疼痛肚腹脹痛往在不治若脈六七至不論大小至數分明雖甚危險十中可救一二或脈洪大或沉細惟三部混亂即形色神氣如常終爲難治初起用吹藥嚥藥痰多以萬年青根搗汁和醋攪去痰涎或土牛膝汁或青魚膽汁俱可

加減荊防敗毒散 脈洪大七八至用之

荊芥防風牛蒡連翹膽星獨活前胡枳殼蘇子樓仁杏仁生地黃琴黃柏山梔元參加原枝燈心二十莖長流水煎和保命丹同服大便不行去

荊芥防風加枳實青皮大黃

加減柴胡雙解散 脈沉隱或二三至用之

柴胡前胡羌活獨活枳殼枳實川芎青皮樓仁杏仁膽星蘇子長流水煎和保命丹同服冬月加麻黃

脈七八至而浮洪頭面皮肉浮腫色微紅鼻涕交流語言蹇澀或以防風蘇子銀花牛蒡杏仁樓仁枳殼枳實膽星青皮黃柏黃芩山梔元參和保命丹同服亦有獲效者

服荊防敗毒散後肺管服塞兼咳嗽者即加生地當歸白芍

服敗毒散一劑喉痛減惟胸膈脹痛牽引脊背再服之即除

服三黃湯亦有全愈者

蜈蚣同白梅搗爛和丸彈之每見有效

誤用大黃巴豆瀉利不止喉證雖愈而胸膈脹悶飲食不進醫復誤作他證治者死

重舌第二

此證因平日喜食炙煿熱毒之物積熱攻於心脾二經所致其狀舌下腫突生一小舌久之大舌反縮短或脹而紫言語不清飲食不下微作寒熱口中清涎極多即用銅匙將舌捺定用三棱針刺大舌兩旁及舌下金津玉液兩穴各一針可五分許再刺小舌兩旁或出紫血或待清涎流盡方進吹藥嚥藥次服煎劑自安

藥用荊芥防風連翹獨活前胡射干膽星枳殼元參生地黃芩黃柏銀花花粉長流水煎如刺破清涎出盡亦有弗藥而愈者

緘口第三

此證因憤怒傷肝肝血不和以致肝氣壅塞火熾上升發於喉閉其狀帝丁之上紅腫作痛或有連及兩邊者寒熱大作初起不宜刺破待六七日後方可針刺或有誤服升提之藥竟不能愈者或有服保命丹紅內消其毒自出者如痰多則以醋攪之強進飲食爲妙否則悉變難爲重

藥用荊芥防風射干牛蒡前胡枳殼生地元參黃芩銀花長流水煎痰多加樓仁氣重加枳實青皮大便不行加黃連甚則加大黃

乳蛾第四

此證因嗜酒肉熱物過多熱毒積於血分兼之房事太過腎水虧竭致有此發其狀或左或右或紅或白形如乳頭故名乳蛾一邊腫曰單蛾兩邊腫曰雙蛾或前後皆腫白腐作爛曰爛頸乳蛾初起必發寒熱用保命丹紅內消兼煎劑治之

藥用荊芥防風射干牛蒡前胡枳殼膽星連翹生地丹皮元參黃柏黃芩銀花長流水煎如火盛加犀角黃連大便閉結加大黃寒熱不止加羌活獨活體虛痰多加樓仁杏仁貝母

有一種名根腳喉風其證日行一穴至七日行七穴喉間發泡時欲嘔吐或一年一發或半年一發或一二月數發根留於中不能盡去一時難愈或云先從腳跟發起至於喉間亦名腳跟喉風發時在左則左足酸軟陰痛有似筋觸牽入喉間在右亦如之治法同乳蛾證亦相似

今人每見發有紫泡以爲毒物即用刀鍼開之豈知病之初起毒氣熾盛發之於泡若刺之出血非但不能愈疾加之破傷則病益重矣

或問曰亦有用刀鍼而得愈者何故答曰彼病勢淺火毒不重刺出血少則愈者其偶然耳倘病勢已深火毒極盛設以刀鍼刺之其誤事也可勝言哉

或以寒熱大作誤認感寒即用生薑半夏喉痛益甚萬萬更喉證所大忌也 詳前用藥禁忌

弄舌第五

此證因風痰久積於內或勞役過度而生其狀舌出過唇不能言語患者以手時弄其舌故名初起用青魚膽汁攪去其痰急宜以小布鍼刺少商穴 在手大指內側之端去甲角如韭葉許白肉際乃肺經穴也 出血者易治出黃水者難治

藥用荊殼枳實牛蒡連翹射干青皮蘇子膽星防風生地

犀角黃芩山梔銀花長流水煎

舌捲縮而不能言因乎風寒也舌長寸許而不能收因乎房勞也舌腫滿而不能消因乎七情也舌根腫脹者謂之重舌腫而不柔軟者謂之木舌初起急宜醫治遲則不救舌脹滿口裹延極多亦木舌之一種蘭方重加大黃芒硝下後自愈

纏喉第六

此證因風痰壅熱久積於內或食炙煿厚味太多或房勞及抑鬱所致其狀耳下紅腫漸趨項下及結喉之間一邊者輕兩邊者重喉內帝丁左右兩傷如蛇盤之狀有黃白二色黃爲黃纏白爲白纏急宜刺少商穴出血注見弄舌次用吹藥膏藥男子延至結核下不治女子延至胸膈不治喉中聲響如雷者不治額鼻有青黑氣頭低痰如膠者不治藥用荊芥防風羌活獨活枳殼連翹瞿星樓仁車前紅花丹皮黃芩元參前胡牛蒡銀花長流水煎和紅肉消同服再下保命丹服藥至四五日加當歸白芍生地黃柏土貝母其效甚速

啞瘖第七

此證因風痰壅滯於咽喉之間其狀口不能言牙關緊閉卻用蝟酥化水滴鼻內卻開仍以玉屑散吹之再將蟾酥探入喉中擺去風痰即能言矣先進牛黃解毒丸次服剝防敗毒散連進二三劑自愈如面紫舌青唇黑鼻流清涕目赤多淚爪甲俱青者不治

骨槽第八

此證因憂思鬱慮邪毒交乘結聚於太陽經絡或則惱怒傷肝致筋骨緊急思慮傷脾致風內結腫膏粱厚味致腫多與其狀始於耳項皮膚間隱隱有核漸如李太僕覺腫痛初則堅硬不消久則延爛難愈甚至齒牙隨落牙齦腐穢俱在不治初起先用鵝翎探吐風痰次以陳艾灸耳垂下五分七壯再服煎藥加減當歸連翹積殼生地銀花射干牛蒡元參牛蒡元胡索黃芩丹皮長流水煎

懸蠱第九

此證因上焦熱毒蘊積風痰壅塞而生其狀上腭垂形如蛙腹或如雞卵咽喉閉塞痰涎滿舌初治用鵝翎探吐風痰次以吹藥噙藥及荊芥防風散毒散加減日久服千金內托散

加減千金內托散厚朴荊芥防風連翹羌活獨活白芷牛蒡元參赤芍大力子杏仁殼仁蔻白

爛喉痧第十

此證因棉花瘡毒未盡而結於咽喉其狀周圍紫色漸至腐爛腐爛上則鼻平腐爛下則飲食難進多致不救初起不覺或十日半月始知當以清熱涼血補脾爲主佐吞百寶丹二三十服若體弱痰多喉重聲啞者不治

藥用生地花粉黃芩白芍黃柏丹皮銀花元參牛蒡射干防風角刺體弱者加茯苓喉重加山藥玄仁知母桔仁杏仁熱甚加犀角黃連十劑後服犀羚貝母膏

膏用犀角羚羊角丹皮各八錢當歸元參各五錢黃連黃芩黃柏防風射干荊芥各三錢牛蒡八錢枳殼連翹各六錢上貝一兩茯苓玄仁花粉各五錢蘇汁約四大碗濃渣將汁再熬如稀糊納煉蜜半觔收貯瓷罐日服四次在卯巳未亥四時每次半錢以燈心湯攪和送下忌生冷發氣之物體弱者去黃連花粉加白芍陳皮石斛惡心砂仁湯送下如合丸藥去黃連羚羊角荊芥防風日進二次每次二錢

百寶丹牙皂一兩銀花三兩硃砂五錢研細末每服六分以冷飯塊三兩水三盞煎至盞半分作二服服在巳午亟時須二十餘服方能見效食時多服豬油麻油以潤服膚

蘸脂忌茶酒牛羊麪食葱蒜等物

熱風喉痧第十一

此證因勞心過度血衰火盛而致其狀喉間紅筋紅瘰或帝丁兩旁微有疼痛一起即覺非弱證喉痧可比時作寒熱若食熱毒之物而起不作寒熱於此爲別

涼血地黃湯生地黃芩丹皮牛蒡元參防風荊芥黃柏花粉赤芍火甚加山梔或犀角黃連

弱證喉痧第十二

此證因酒色過度或勞碌憂鬱所成其狀喉間紅筋紅瘰萎延而生津嚥痛夜間發熱口燥舌乾六脈洪數當以清熱補血爲主若動靜飲食如常形色精神不脫無喉痧乃血分有熱須涼血破血不宜用補如喉重聲啞痰多及盜汗不止者不治

藥用白芍丹皮黃芩當歸元參生地黃柏銀花花粉大力子初起亦加荊芥防風連翹枳殼病久去之喉重加知母前胡土貝樓仁杏仁熱甚加柴胡黃連心火盛加犀角黃連肝火盛加羚羊角潞參白朮茯苓腎水枯竭加山藥澤瀉枸杞五味知母停酸作嘔加砂仁虛甚加玄仁山藥茯苓當歸倍以白芍

喉閉第十三

此證乃寒邪直中下焦逼其無根失守之火發揚於上以致咽痛卒然喉閉四肢厥冷六脈沈微但必下利清穀口腐爛腐





產育寶慶集

郭稽中 纂

產育寶慶集卷上

宋 郭稽中 纂

第一論曰。熱疾胎死腹中者何。答曰。因母患熱疾。至六七月以後。臟腑極熱。薰灼其胎。是以致死。緣兒身死。冷不能自出。但服黑神散煖其胎。須臾胎氣溫煖。即自出。何以知其胎之已死。但看產婦舌色青者是其驗。

黑神散

柱心 當歸 芍藥 甘草炙 乾薑炮 生地各一兩 黑豆炒去皮二兩 附子炮去皮臍半兩

右爲末。每服二錢。空心溫酒調下。一法無附子。有茴香。

陳言評曰。夫妊娠謂之重身。二命係焉。將理失宜。皆能損胎。不特病蒸灼所致。或因傾仆驚恐。出入觸冒。及素有癥瘕積聚。壞胎最多。候其舌青。即知子死。養胎論云。面青舌赤。母死子生。唇吐涎。子母俱死。又有雙懷二胎。或一死一生。其候尤難知。是非臨期觀變。未易預述。不可不備述也。然以黑神散溫胎。未若補助產母。使其氣正。免致虛乏困頓。胎自下矣。催生丹殊勝黑神散。

催生丹 治胎死腹中。或產母氣乏委頓。產道乾澁。

蒼朮米泔浸二兩 桔梗一兩 陳皮六錢 白芷 柱心 甘草炙各三錢 當歸 川烏頭炮去皮尖 乾薑炮 厚朴製

序

妊娠之理。內經定以十月爲正產者。尙以間有過期者。蓋古之賢聖之生如此。然聞其語。未見其人也。比年以來。妊之過產者。遠者不得而知。近在燕趙間。時復有之。方妊之初也。信其爲妊。及其過產。則反疑其非妊也。問之產媼。則曰未之見也。問之名醫。則曰出月出月者貴。問之方士。則曰妖也。以妖治之。問之庸醫。則曰病也。以病治之。二者俱失。至有母子俱不救者。既而方知其妊也。雖悔其可追耶。余聞之甚可悼矣。恨無可考之方以破其惑也。一日過醫公李寧之家。示一書曰產育寶慶集。披讀一二。蓋宋儒李師聖、郭稽中、楊子建輩之所編集。至生產篇云。婦人懷胎有七月八月九月十月而產者。亦有經一年至二年四年五年而後產者。蓋人之生。陰注陽定。自有時日。不可改移。今獨限以十月。似爲未審。讀不終篇。不覺嘆嘆。惜乎此書在世希有。若能廣傳。使天下共知。則人生安得罹殤夭之禍乎。意謂婦人方經雖多。而產書難其全者。若是一或廢失。世間必不復有也。因問誰氏之書。公曰。外郎楊士表所秘藏也。輒親往謁。告以情實。求之。忻然見許。遂得原書印本。方議刊行。公曰。此止一產書也。若更將御藥院雜病方論并入月產圖、體元子借地法、安產藏衣方位、附之。合爲一集。可爲完書矣。余寧從之。猶恐有錯謬未盡者。更命諸名醫復加校正。余謂公曰。書則完矣。當如之何矣。參謀周德甫聞之。毅然贊成。遂命工刊行。自今以始。庶令妊婦得安。產媼無失。家自可以修藥。人自可以爲醫。來者可知而傳之意廣矣。冀致君序。

南星炮附子炮去皮臍・半夏湯洗七次・茯苓各二兩・杏仁炒去皮尖・阿膠麩炒各二錢五分・川芎錢半・枳殼麩炒四錢・

南木香一錢

右爲末。每服一二錢。溫酒下。覺熱悶。用新汲水調白蜜服。

第二論曰。難產者何。答曰。胎側有成形塊。呼爲兒枕。子欲生時。枕破。與敗血裹其子。故難產。但服勝金散逐其敗血。即自生。若逆生橫生。並皆治之。

勝金散

麝香一錢　鹿茸一兩・用紙筒布裹了燒令通紅・急以乳鉢細研爲末・

右共爲末。取秤槌燒紅。以酒淬之。調下藥一錢七。

陳言評曰。產難不只胎側有兒枕破裹凝隨其胎息因緣。自有難易。其遇橫逆。多因坐草太早。努力過多。兒轉未逮。或已破水。其血必乾。致胎難轉。若先露脚。謂之逆。先露手謂之橫。法當以微針刺之。使自縮入。即服神應黑散以固其血。必自轉生。蓋生方云。倉皇之間。兩命所係。不可不廣傳。蓋贊黑散之功也。或以鹿搽兒脚底。抓搔之。

神應黑散　治橫生、逆生、難產。

百草霜　香白芷各等分

右爲末。每服二錢。童子小便、好醋各一茶脚許。調勻。更以沸湯浸四五分服。止一服見功。甚者再服。即分娩矣。一名烏金散。

第三論曰。胎衣不下者何。答曰。母生子。訖。血流入衣中。衣爲血所服。是故不得下。治之稍緩。服滿腹中。以次上衝心胸。疼痛喘急者難治。但服奪命丹。以逐去衣中之血。血散消服。胎衣自下而無所患。

奪命丹

附子半兩・炮去皮臍・　牡丹皮一兩・　乾漆一分・搗碎炒煙盡・

右爲末。醋糊一升。大黃末一兩。同熬成膏。和藥丸如桐子大。溫酒下五七丸。不以時。

牛膝湯　治產兒已出。胞衣不下。臍腹堅脹急痛甚。及子死腹中不得出。

牛膝酒浸・　瞿麥各四兩・　滑石八兩・　當歸酒浸・　木通各六兩・　葵子五兩・

按陳言第三論評闕。

第四論曰。產後血暈悶者何。答曰。產後氣血虛。未得安靜。血隨氣上。迷亂心神。故眼前生花。極甚者令人悶絕不知人。口噤神昏氣冷。醫者不識。呼爲暗風。若作此治之。病必難愈。但服清魂散即愈。

清魂散

澤蘭葉　人參各一分・　荊芥穗一兩・　川芎半兩・

右爲末。溫酒、熱湯各半盞。調一錢。急灌之。下咽即開眼。氣定省人事。

陳言評曰。產後暈頃刻害人。須量虛實爲治。若胸中宿有痰飲阻病不除。產後多致眩暈。又血暈氣

弱。氣不使血。逆而上攻。此等皆非清魂可療。仍用半夏茯苓湯。血塞須用牡丹皮散。但缺藥尤難輒用。當識輕重。所謂撥乎可撥。撥亦無撥。若氣血平人。同去血多致暈者。芎藭湯尤佳。

半夏茯苓湯

半夏湯洗七兩・　茯苓　熟地各一兩・　陳皮　細辛　蘇葉　川芎　人參　芎藭　桔梗　甘草錢六・

右㕮咀。每服四大錢。水二盞。煎七分。去滓。空心服。下有客熱煩渴。口生瘡者。去陳皮、細辛。加前胡。知母。腹冷下利者。去地黃。入桂心炒。胃中虛熱。大便祕。小便澁。加大黃一兩八錢。去地黃。加黃芩六錢。

牡丹皮散　治產後血暈悶絕。狼狽。若口噤。則拗開灌之。必效。

牡丹皮　大黃蒸・　芒硝各一兩・　冬瓜子半合・　桃仁三十七粒・去皮尖・

右㕮咀。每服五錢。水三盞。煎至一盞半。去滓。入芒硝。再煎分二服。欲產、先煎下。以備緩急。金匱以此治腸癰。但分兩少異。

芎藭湯方在第十三論・

第五論曰。產後口乾痞悶者何。答曰。產後榮衛大虛。血氣未定。食麵太早。胃不能消化。麵毒結聚於胃脘。上薰胸中。是以口乾煩渴。心下痞悶。醫者不識。認爲胸膈壅滯。以藥下之。萬不得一。但服見睍丸。

見睍丸

鹽黃　京三稜　蓬莪茂　陳皮去白・　高良薑　人參　蓬莪茂

右七味。等分爲末。用細切蘿蔔。漫火煮令爛。研細。將汁煮糊丸桐子大。蘿蔔湯下三十丸。不以時。

陳言評曰。產後口乾痞悶者何。答曰。產後榮衛大虛。血氣未定。食麵太早。胃不能消化。麵毒結聚於胃脘。所因調之可也。煩心宜四物湯去地黃。加人參、烏梅煎。若外傷燥熱。若病何經。當隨經爲治。難以偏舉。飲食所傷。見睍丸卻能作效。四物湯方見第六論・

第六論曰。產後乍寒乍熱者何。答曰。陰陽不和。敗血不散。皆令乍寒乍熱。產後血氣虛損。陰陽不和。陰勝則乍寒。陽勝則乍熱。陰陽相乘。則或寒或熱。若因產勞傷藏府。血病不得宣越。故令敗血不散。入於肺則熱。入於脾則寒。醫若人誤作瘧疾治之。則繆矣。陰陽不和。宜增損四物湯。敗血不散。宜奪命丹。又問二者以何別之。答曰。時有刺痛者。敗血也。但寒熱無他證者。陰陽不和也。增損四物湯不一。皆隨病加減。

增損四物湯

當歸　人參　芎藭　川芎　炮薑各一兩・　甘草炙四錢・

右㕮咀。每服四錢。水一盞。薑三片。煎六分。去滓。熱服。

奪命丹方見第三論・

陳言評曰。乍寒乍熱。榮衛不和。難以輕議。若其敗血不散。豈止入脾肺二藏耶。大抵一陰閉一陽。即作寒熱。陰勝故寒。陽勝故熱。只可云敗血循經流入。閉諸陰能寒。閉諸陽則熱。血氣與衛氣解則休。遇再

會而復作。大調經散、五積散。入醋煎佳。

大調經散　治產後血虛惡露未消。氣爲風濁凝滯。榮衛不調。陰陽相乘。憎寒發熱。或自汗。或腫滿。皆氣血未平之故也。

大豆（炒去皮、一兩半）　茯神（一兩）　琥珀（一錢）

右爲末。用濃煎烏頭紫蘇湯下。

五積散　治感寒濕。興脾胃氣閉。腰腹痛。及有積聚。

蒼朮（米泔浸一宿、二十兩）　桔梗（十兩）　陳皮（六兩）　白芷　甘草（炙）　當歸（各二兩）　川芎（一兩半）　芍藥

白茯苓　半夏（湯去滑、各一兩）　麻黃（去節、春夏二兩、秋冬三兩）　乾薑（春夏三兩、秋冬四兩）　厚朴（薑製炒）　枳殼　桂（分兩原闕）

右先將前十二味㕮咀。微炒令香。取出當風涼之。入後枳殼、桂、朴三味。同爲細末。每服三錢。水一盞。薑三片。棗二枚。煎七分。食前溫服。產婦陳疎。難產。經二三日不生。胎死腹中。或產母氣乏委頓。產道乾澁。加順元散。水七分。酒三分。煎。相繼兩服。氣血內和。即產。胎死者不過三服。當下。其順元散。益產母虛實加減。

順元散

烏頭（炮去皮尖、二兩）　附子（炮去皮尖）　天南星（炮、各一兩）　木香（半兩）

右爲末。同前法煎此藥。治內外感寒。脈沉伏遲細。手足冷。毛髮恂慄。傷寒陰症。大腹一二杯。氣和汗出即愈。

鎔七論曰。產後四肢浮腫者何。答曰。產後敗血乘虛停積于五臟。循經流入于四肢。流注日深。卻還不得。腐壞如水。故令四肢面目浮腫。醫人不識。便作水氣治之。凡治水腫。多用導水藥。極能虛人。夫產後既虛。又以藥虛之。是爲重虛。往往多致夭枉。但服調經散。血行腫消即愈。

調經散

沒藥（另研）　琥珀（另研）　桂心　赤芍藥　當歸（各一錢）　細辛　麝香（另研、各半錢）

右爲末。每服半錢。用生薑汁溫酒各少許。調勻服。

陳言評曰。產後浮腫多端。有自懷孕腫至產後不退者。有產後失於將理。外感風寒暑濕。內作喜怒憂。血與氣搏。留滯經絡。氣分血分。不可不辨。要當隨所因脈證治之。宜得其情。調經散治血分固效。但力淺難撼。不若吳茱萸湯、枳實湯、奪魄散、大調經散。皆要藥也。

加減吳茱萸湯　治婦人臟氣本虛。風挾風冷。胸膈滿痞。腰脇絞刺。嘔吐惡心。飲食減少。身面虛浮。惡寒戰慄。或泄利不止。少氣羸困。及因生產臟氣暴虛。邪冷內勝。宿疾轉甚。

吳茱萸（湯洗七次炒、一兩半）　茯苓　丹皮　桂心（各半兩）　桔梗　甘草（炙）　乾薑（炮）　麥冬（去心）　防風　細辛　當歸（酒洗炒）　半夏（湯洗七次）

右㕮咀。每服四錢。水盞半。煎七分。去渣。空心熱服。

枳實湯　治心下堅大如盤。邊如旋盤。水飲所作。名曰氣分。

枳實（麩炒去穰、一兩五錢）　白朮（一兩）

右㕮咀。每服四錢。水盞半。煎七分。去渣。溫服。腹中軟即散。

奪魄散　治婦人產後虛羸喘促。利便即愈。

生薑（取汁）　白麵（各三兩）　半夏（七遍、湯洗去滑）

右以生薑汁溲麵。裹半夏。爲七餅子。炙焦熟。爲末。熱水調一錢。小便利爲效。

大調經散　最治產後腫滿。喘急煩渴。小便不利。（方見第六論）

第八論曰。產後乍見鬼神者何。答曰。心主身之血脈。因產傷耗血脈。心氣則虛。敗血停積。上干于心。心不受觸。遂致心中煩懊。起臥不安。乍見鬼神。言語顛倒。醫工不識。呼爲風邪。如此治之。必不得愈。但服調經散。每服加生龍腦一捻。得睡即安。

調經散（方見第七論）

按陳言第八論評闕。

第九論曰。產後不語者何。答曰。人心有七孔三毛。產後血氣弱。多致停積。敗血閉于心竅。神志不能明了。又心氣通于舌。心氣閉塞。則舌亦強矣。故令不語。如此但服七珍散。

七珍散

人參　石菖蒲　川芎　熟乾地黃（各一兩）　細辛（一錢）　防風　硃砂（研、各半兩）

右爲末。每服一錢。薄荷湯調下。不以時。

按陳言第九論評闕。

第十論曰。產後腹痛又瀉利者何。答曰。產後腹胃虛怯。寒邪易侵。若未滿月。飲冷當風。乘虛入流于肓膜。散于腸脇。故腹痛作陣。或如錐刀所刺。流入大腸。水穀不化。洞泄腸鳴。或下赤白。腹脇脹脹。或走痛不定。急服調中湯立愈。若醫者以爲積滯攻之。則禍不旋踵。謹之。

調中湯

良薑　當歸　桂心　芍藥　附子（炮）　川芎（各一兩）　甘草（炙、五錢）

右㕮咀。每服三錢。七水三盞。煎一盞。去渣。熱服。

陳言評曰。產後下利。非止一證。當隨所因而調之。既云飲冷當風。何所不至。寒熱風濕。本屬外因。喜怒憂思。還從自性。況勞逸飢飽。皆能致病。若其洞泄可服調中。赤白帶下。非此能愈。各臨門數。別有正方。今錄桃膠散白頭翁湯以備用。餘從瀉下門中選用之。

沉香桃膠散　治產後利下赤白。裹結後重。疼刺疼痛等證。

桃膠（瓦上焙乾）　沉香　蒲黃（紙隔炒、各等分）

右爲末。每服二錢。陳米飲調下。空心服。

白頭翁湯　治產後下利虛極。

白頭翁　甘草　阿膠各二兩　黃連　蘗皮去粗皮　秦皮去粗皮各三兩

右㕮咀。每服四錢。水一盞半。煎七分。去滓。空心服。

第十一論曰。產後遍身疼痛者何。答曰。產後百節開張。血脉流走。遇氣弱則經絡分肉之間。血多留滯。累日不散。則骨節不利。筋脉引急。故腰背不得轉側。手脚不能動搖。身熱頭痛也。若醫以爲傷寒治之。則汗出而筋脉動搖。手足厥冷。變生他病。但服趁痛散以默除之。

趁痛散

牛膝　當歸　桂去皮　白朮　黃耆　獨活　生薑各五錢　薤白　甘草炙各一分

右爲粗末。每服半兩。水五盞。煎至二盞。去滓。熱服。

陳言評曰。趁痛散不特治產後氣弱血滯。兼能治太陽經感風。頭疼腰背痛。自汗發熱。若其感寒傷食。憂恐驚怒。皆致身體發熱頭痛。況有薟勞諸證尤甚。趁痛散皆不能療。不若五積散入醋煎用。卻不妨。

第十二論曰。產後大便祕澀者何。答曰。產婦臥水血俱下。腸胃虛竭。津液不足。是以大便祕澀不通也。若過五六日。腹中悶脹者。此有燥糞在臟腑。以其乾澀。未能出耳。宜服麻仁丸以津潤之。若誤以爲有熱。而投之以寒藥。則陽消陰長。變動百出。性命危也。

麻仁丸

麻仁研　枳殼麩　人參　大黃各半兩

右爲末。鍊蜜丸梧桐子大。空心溫湯下二十丸。未通。加丸數。

陳言評曰。產後不得利。利者百無一生。去血過多。藏燥大便祕澀。則固當滑之。大黃似難輕用。惟葱涎調蠟茶爲丸。復以葱茶下之。必通。

阿膠枳殼湯　治產後虛羸。大便祕澀。

阿膠　枳殼麩炒去穰各半分

右爲末。蜜丸如桐梧子大。別研滑石爲衣。溫酒下二十丸。半日來未通。再服。

第十三論曰。產後血崩者何。答曰。產後傷耗經絡未得平復。而勞役損動。致血暴崩下。淋漓不止。或因鹹酸不節。傷益榮衞。氣衰血弱。亦變崩中。若小腹滿痛。肝經已壞。爲難治。急服固經丸以止之。

固經丸

艾葉　赤石脂煅　補骨脂炒　木賊各半兩　附子一枚。炮去皮臍

右爲末。陳米飲和丸梧子大。食前溫酒下二十丸。米飲亦得。

陳言評曰。血崩不是輕病。況產後有此。是謂重傷。恐不止鹹酸不節而能致之。多因憂驚恐悲。臟氣不平。或產後服斷血藥早。致惡血不散。變滿作堅。亦成崩中。固經丸似難責效。不若大料煮芎藭當歸加芎藭散。治產後去血過多。暈悶不省。及傷胎去血多不止。懸虛心煩。眩暈頭重。目昏耳聾。舉頭欲倒諸證。

芎藭散　治產後去血過多。暈悶不省。及傷胎去血多不止。懸虛心煩。眩暈頭重。目昏耳聾。舉頭欲倒諸證。

芎藭　當歸洗去土。焙乾。各等分

右剉爲散。每四錢。水一盞半。煎七分。去滓。熱服。

第十四論曰。產後腹脹悶滿。嘔吐不定者何。答曰。血散於脾胃。脾受之不能運化。積微而成脹。胃受之則不得受納水穀而生吐逆。醫者不識。若以尋常治脹止吐藥療之。病與藥不相干。轉更傷動正氣。疾愈難治。但服抵勝湯必瘥。

抵勝湯

赤芍藥　半夏湯洗七次。　澤蘭葉　人參　陳皮各二錢　甘草炙一錢

右㕮咀。作一劑。水三碗。盞半兩。煎至兩盞。去滓服。

按陳言第十四論評闕。

第十五論曰。產後口鼻黑氣起及鼻衄者何。答曰。陽明者。經脉之海。起于鼻。交額中。還出挾口。交人中左之右。右之左。產後氣消血散。榮衞不理。散亂入于諸經。卻還不得。故令口鼻黑起。及變黑衄。此緣產後虛熱。變生此疾。其疾不可治。名曰胃絕肺敗。不出方。

按陳言第十五論評闕。

第十六論曰。產後喉中氣急喘者何。答曰。榮者、血也。衞者、氣也。榮行脉中。衞行脉外。相隨上下。謂之榮衞。因產所下過多。榮血暴竭。衞氣無主。獨聚于肺中。故令喘也。此名孤陽絕陰。爲難治。若惡露不快。敗血停凝。上薰于肺。亦令喘急。如此但服奪命丹。血出喘息自定。

奪命丹方見第三論。

陳言評曰。產後喘急固可畏。若是敗血上薰于肺。猶可責效奪命丹。若感風寒。或因憂怒飲食鹹冷等。奪命丹未可均濟。況孤陽絕陰乎。若榮血暴絕。宜大料煮芎藭湯。亦自可救。傷風寒宜旋覆花湯。性情鬱發。宜小調經散。用桑白皮、杏仁煮湯調下。傷食宜見脫丸、五積散。見脫丸見第五論。五積散見第六論。芎藭湯見第十三論。小調經散見第七論中調經散。或即第七論中調經散。

旋覆花湯　治產後傷感風寒。暑濕。咳嗽喘滿。痰涎壅塞。坐臥不安寧。

旋覆花　赤芍藥　半夏麴　前胡　麻黃去根節　荊芥穗　五味子　甘草炙　茯苓　杏仁各等分

右㕮咀。每服四錢。水一盞半。薑五片。棗一個。煮七分。去滓。空心服。

第十七論曰。產後中風者何。答曰。產後五七日內。強力下牀。或一月之內。傷于房室。或懷憂發怒。榮衞和。或因著炙。傷動藏府。得病之初。眼澀口噤。肌肉瞤搐。以漸腰脊筋急強直者不可治。此人作。非偶爾中風所得也。

陳言評曰。問產後中風。風是外邪。血虛則或有中之者。直答以人作不可治。問答不相領解。如何開示

後人立論之難有如此者若是中風當以脈辨看在何經依經調之強力下牀月內房室憂愁若爽非中風類辭勞性氣火邪治各有法非產後病不暇繁引學者識之

第十八論曰產後心痛者何答曰心者血之主人有伏宿寒因產大虛寒搏于血血凝不得消散其氣遂上衝擊於心之絡脉故心痛俱以大嚴蜜湯治之寒去則血脉溫而經絡通心痛自止若誤以爲所傷療之則虛極寒益甚矣心絡寒甚傳之正經則變爲真心痛朝發夕死夕發朝死藥不可輕用如此

大嚴蜜湯

熟地　當歸　獨活　吳茱萸湯泡　乾薑炮　芍藥　桂心　甘草炙　小草各一兩半　細辛半兩

右剉爲散每服半兩水三大盞煎至一盞去渣微熱服

陳言評曰產後心痛雖非產蹻常痛尚或有之凡痛未必便是血痛設是嚴蜜湯豈可用熟地黃等藥泥血安能去痛此方本出千金用生乾地黃吳茱萸一升合准五兩乾薑三兩細辛治陳寒在下焦方本一兩卻減作半兩制奇制偶量病淺深自有品數不可妄意加減然以嚴蜜湯治血痛不若失笑散用之更效

失笑散　治心腹痛欲死百藥不效服此頓愈

五靈脂　蒲黃各炒等分

右爲細末先用醋調二錢熬成膏入水一盞煎七分食前熱服

第十九論曰產後熱悶氣上轉爲脚氣者何答曰產後血虛生熱復因春夏取涼過多地之蒸濕因足履之所以著而爲脚氣其狀熱悶煩擾驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也服小續命湯兩三劑必愈若醫者誤以逐敗血藥攻之則血去而疾益增劇

小續命湯

麻黃去節湯泡　防己　人參　黃芩　桂心　甘草炙　白芍　川芎各一兩　杏仁一兩湯泡去皮尖炒　附子一枚湯泡去皮臍　防風半兩

右剉爲散每服四大錢水一盞半薑七片棗二個煮七分去渣不拘時服

陳言評曰脚氣固是常病未聞產後能轉爲者往往讀千金見產婦多此疾之語便出是證文辭害意可概見矣是熱悶氣上如何令服續命湯此藥本主少陽經中風非均治諸經脚氣須要依脚氣方論陰陽經絡調之此涉專門未易輕論既非產後要病更不繁引

第二十論曰產後汗出多而變痙風者何答曰產後血虛腠理不密故多汗因遇風邪搏之則變痙風也痙者口噤不開背強而直或發痼狀搖頭馬鳴身反折須臾復發氣息如絲宜速幹口灌小續命湯稍緩卽汗出如雨手拭不及者不可治

小續命湯見第十九論

陳言評曰產後汗出多變痙痓亦令服續命湯此又難信既汗多如何更服麻黃官桂防己黃芩耶不

若大豆紫湯爲佳大醫局方大聖散亦良藥也

大豆紫湯　治中風頭眩惡風治汗吐冷水及產後有病中風痱瘛背強口噤直視煩熱

獨活半兩　大豆半升　酒三升

右先浸獨活煎一二沸別炒大豆極焦煙出急投酒密封候冷去豆每服一二合許得少汗則愈日數十服此湯能去風消血結如妊娠折傷胎死腹中服此得差

大聖散方闕

第二十一論曰產後所下過多虛極生風者何答曰婦人以榮血爲主因產血下太多氣無所主唇青肉冷汗出目眩神昏命在須臾此但虛極生風也如此急服濟危上丹神良若以風藥治之則誤矣

濟危上丹

乳香研　五靈脂研　硫黃研　大陰元精石研　陳皮去白　桑寄生　真阿膠炙碎　卷柏生分等

右將上四味同研勻石器內微火上炒勿令焦再研極細後入餘藥末用地黃汁糊丸梧桐子大產後溫酒下二十丸當歸酒亦得

陳言評曰所下過多傷損虛竭少氣唇青肉冷汗出神昏此皆虛脫證何以謂之生風風是外淫必自臟腑中傷經絡然後發動臟腑豈能自生風也風虛之說蓋因脉經云浮爲風爲虛此乃南病合說在人迎則爲風在氣口則爲虛後學無識便謂風虛是一病謬濫之甚學者當知

產育寶慶集卷下

宋　郭稽中　纂

產乳備要

娩乳大故方術浩博自非素習誰能適從危殆之間頗艱應用今採摭諸方論中將護要法及預備經效要用湯藥名曰產乳備要務從簡易以救倉卒

凡產婦合要備急湯藥並須預先修合題號恐臨時倉卒難致臨月愼勿多飲酒卽依產圖方位擇深靜房室入月一日卽貼借地法于房內北壁薰令香潔

安產藏衣方位此與太平聖惠方同但彼以支配而此以干配故兩存之

正月丙位安產吉　壬位藏衣吉　丁天德藏衣吉

二月甲位安產吉　庚位藏衣吉　坤天德藏衣吉

三月壬位安產吉　丙位藏衣吉　壬天德藏衣吉

四月庚位安產吉　甲位藏衣吉　辛天德藏衣吉

五月丙位安產吉　壬位藏衣吉　乾天德藏衣吉

六月甲位安產吉　庚位藏衣吉　甲天德藏衣吉

七月壬位安產吉。丙位藏衣吉。癸天德藏衣吉。
八月庚位安產吉。甲位藏衣吉。艮天德藏衣吉。
九月丙位安產吉。壬位藏衣吉。丙天德藏衣吉。
十月甲位安產吉。庚位藏衣吉。乙天德藏衣吉。
十一月壬位安產吉。丙位藏衣吉。巽天德藏衣吉。
十二月庚位安產吉。甲位藏衣吉。庚天德藏衣吉。

凡欲生產，切不得喧鬧。產婦房門，常須關閉。選一年高性和善產婆，又選穩審謹慎家人一兩人扶持，切不用揮霍，致令產婦憂恐。又忌閑雜外人，喪孝穢濁之人，瞻視。若不慎之，定是難產。小兒若于腹中痛來，但令扶行，或行不得且立，候行得便行，或痛作陣，服中如火生。此是兒回轉，即進琥珀散一服，直至行不得，即扶上席草，務要產婦借力，或心中熱悶，取白蜜一匙，新汲水調下，或未解，即香生雞子一枚。

琥珀散　治產後惡露不盡，結聚小腹疼痛。

琥珀半兩。　當歸三分，銼微炒。　沒藥半兩。　青橘皮中兩，湯浸去白瓤，焙。　赤芍藥半兩。　木香半兩。　桂心半兩。　香附子一兩。

右藥擣細，為散，不計時候，以豆淋酒調下一錢。若產後心空，但時與琥珀散一服，或煎芍藥湯進之，更不用他治。當進溫粥，慎勿與熱食。食熱則滯血，或三五日內但覺腹中搐痛，兒枕未定，即進定痛散二服。

芍藥湯　治產後因血不快利，氣上攻，心腹疼痛。

芍藥二兩。　黃芪剉。　白芷　人參　芎藭切炒。　生乾地黃焙　甘草炙，各一兩。　白茯苓去黑皮，一兩半。

右為粗末，每服三錢，七水一盞，煎取七分，去滓，入酒少許，溫服，不拘時候。

芍藥湯　治產後虛乏，不思飲食，四肢昏倦，心腹陣痛，補虛治氣。

當歸一兩半，切焙。　人參　肉桂　生薑後入。　甘草炙，各一兩。　芍藥一兩。

右為末，每服三錢，水二盞，入薑二枚，煎至一盞，去滓，溫服，日三次。

定痛散　治產後惡血不止，腹內熱痛不可忍，及兒枕未定。

當歸切，焙。　芎藭各二兩。　桂心一兩，或以川芎代之。

右為末，每服二錢，水酒共一盞，生薑一塊彈子大，拍破，同煎至六分，去滓，溫服。

夫人生產，自有時候，痛不甚者，名曰試痛，宜須強行，忍宜食軟飯，若食飯不得，即宜食粥，及飲蜜漿，勿令飢渴。恐產婦無力困乏，若經時不產，進通靈散一服，若生畢，暖少許醋，熨至呻，以童子小便調七寶散一服，心中自然開爽，不住燒磚石，以醋沃之，直至七日，要令產婦鼻中常聞醋氣，宜燒茅香、白芷、皂莢等物，慎勿令見穢惡。若產訖，忽覺心中昏悶，或眼花，如在舟車中，即是血虛，急須服牡丹飲子、黑神散。

通靈散　催生。

用蛇蛻皮一條全者，緊捲，以蚯蚓泥裹，燒黃，近藥處泥些少用不妨，細研為末，每服一錢，溫酒調下。

又方　治產後惡血不下，兒枕不散，小腹疼痛。

細墨濃研半盞。　好醋半盞。　沒藥一分。

右用童子小便少許，同煎五七沸，溫服，不拘時候。

七寶散　治初產後勻血和氣，補虛壓驚悸。

硃砂研如粉。　桂心　乾薑炮。　當歸切焙。　川芎　人參　羚羊角灰　茯苓各等分。

右各杵為細末，若產婦平和，三朕以前，直至滿月，每日各取一小匙，以羌活豆淋酒調者，空心服。若覺心胸煩熱，即減薑、桂，冷即加之。腹痛加當歸。心悶加羚羊角。心中虛氣加桂。不下食或惡心，加人參。虛戰加茯苓。以意斟酌，日二夜一服。不飲酒者以童便溫調下。

牡丹飲子方缺。

黑神散　防暈備急。

驢譴肝不拘多少，以桑柴火燒，以刀刮取黑煤，更刮令盡，研細，入真麝香少許，如暈產了，及氣血上衝心暈悶，取一錢，以熱酒和童子小便調下。

藕粉散　穢產服此藥，盡盡兒枕，除百病源。

當歸　官桂不得見火。　人參　茯苓　甘草　芍藥　知母　川芎　大黃炮炒。　黃耆　木香　草豆蔻　白朮　訶子　高良薑　青橘皮去瓤。　熟地黃各一兩半。

右除地黃外各等分，焙乾，次用附子一箇中樣半兩者炮製，入眾藥，生薑一片，研取自然汁，於碗器中停留一食久，傾去清汁，取下面粉，脚，攤在藕葉中，入焙籠焙乾，共合地黃，搗羅為末，綿產後用末三錢，水一盞，薑三片，棗子一個擘開，同煎至七分，乘熱喫，喫後自然產母睡著，半日以來睡覺，再服，全除卻腹痛，一日只可三服至九服，不可多服，肚中冷也。

當歸血竭丸　治婦人產後惡物不下，結聚成塊，心胸痞悶，臍下堅痛。

當歸炒。　血竭　蓬莪茂炮　芍藥各二兩。　五靈脂四兩。

右為細末，醋麵糊丸桐子大，每服四十丸，溫酒下，或溫粥飲下，空心食前服。

烏金散　治產後諸疾。

紅芍藥　川當歸　乾薑　蒲黃　甘草　熟乾地黃各一兩。

右各為末，別用黑豆一合，炒令香熟去皮，除蒲黃，與餘藥共杵為細末，於銀器中慢火炒紫色，後入蒲黃，如產後別無疾，每日服一盞，豆淋酒調下，更不生諸疾。若稍有不安，服即愈。如產後血逆，心悶腹搐痛，一兩服立止。

血竭散　治產後百疾。

血竭　沒藥各等分。

右等分，輕手研細，頻篩，再研，取盡爲度。每服二錢，用小便合陳酒半大盞，煎一沸，溫調下。產下一服，上床良久再服。其惡血自循下行，更不衝上，免生百病。

保安丸　治產前產後三十六種冷血氣，半身不遂，手脚疼諸疾，並宜服之。

赤茯苓（去皮）　牡丹皮　白芍藥（各三分）　吳茱萸　沉香（各一分）　人參（去蘆）　當歸（洗切焙）　桂（去皮）　牛膝（酒浸）　香白芷　木香　藁本（去蘆）　麻黃（去根節）　川芎　附子（炮去皮臍）　細辛（揀淨）　蘭香葉　甘草（炙）　寒水石（燒）　防風（去蘆）　桔梗（去蘆）　蟬殼（去足翅各半兩）　馬鳴退（一兩炙）　生乾地黃（一兩）

右爲細末，揉蜜爲丸，如小彈子大，每日空心用溫酒化下一丸，療八風、十二痺、痎瘧、乳房中風、淋血積聚，并治胎不安，子死腹中，不過三丸，可下死胎，生衣不出，一丸便效。產前產後痢，并赤白帶下，及嘔逆，塡心，疾氣煩滿，一丸瘥。產後或產前，腹中疼痛，遶臍下如刀刺相似，一丸便止。產難月可日一服，至產不覺疼痛。產前傷寒中風，體如板，煎麻黃湯化下一丸，立效。經脉不通，或頻併，或赤白，喫食無味，瘦惡，乍寒乍熱，面赤唇焦，手足煩疼，遍身黑點血斑，一切病，服此藥悉愈。每一丸細嚼，宜空心溫湯送下。

二聖散　治產前安胎，產後惡血不盡，及胎衣不下。

羌活　川芎（各等分）

右爲細末，每服二大錢，酒少許，水七分，沸，調溫服。

方　治產後血痛如刀刺。

熟乾地黃　橘皮（各等分）

右爲末，每服一錢，粥飲調下，辛常痛發可常服。

方　治產後頭痛（大全良方作奇效）。

大川芎爲末，每服二錢，水一盞，煎至七分，溫服，立瘥。

方　治產後咳逆。

石蓮（十箇炒）　丁香（十箇）

右爲末，用米三合，煎十沸，溫服。

方　治產後咳逆不止。

狗膽（一箇）　硇砂　丁香　五靈脂（各少許）

右爲末，以狗膽丸如白豆大，每服一丸，生蜜水磨下。

方　治產後小便不通。

右用葱爛搗，蜜調，以紙花貼臍下。

若三日後，發壯熱，頭痛，此是乳脉行，卽進玉露散二服，或大小便澁，或發寒熱、頭痛、四肢如碎，此是產勞，或產後大渴，胎損、吹奶、咳嗽，別生他疾，及帶起宿患，亦宜檢尋別方治之。月內不宜多語笑，強起離床行，或作針線運動，恣食生硬，不避風脫衣洗浴，當時雖無大損，滿月後或成羸勞，手脚及腰膝酸重冷痛，骨髓間蹷蹷如風吹，縱有名醫，卒不能療，大都產婦將息，須是百日，方可平復。大愼犯觸，因此多致身體強直，如角弓反張，名曰瘛風，遂至不救。小有虛羸，失於將補，便成大患，終身悔不及矣。愼之愼之。

玉露散　治產後乳脉行，煩熱，或大腸澁澀，肌體疼痛，涼膈壓熱下乳。

茯苓　人參　甘草（炙，各半兩）　桔梗　白芷　川芎（各一兩）　川大黃　當歸（炒，各一分）　芍藥（三分）

右爲末，每服二三錢，水一盞，煎至七分，溫服，日三。若臟腑洩瀉，卽除大黃。

湧泉散　下奶。

川山甲（半兩，醋浸炒令輕空）　脂麻（退皮一合）　胡桃（二個，去殼）　肉豆蔻（麵裹煨，去麵不用）

增損四物湯　與一便良方同。云治產後乍寒乍熱，無他痛處者，陰陽不和，只無人參。

當歸　芍藥　人參　川芎　乾薑（各一兩）　甘草（四錢，炙）

右爲末，每服二錢，水一盞，生薑五片，同煎至六分，去滓，微熱服，不以時。

若產後四肢安和，亦不用多喫酒藥，緣氣虛禁持未得，卻多昏眩，唯飲童子小便無妨，且勿平身側臥，夜常須一人看承，令堅起兩膝臥，臥卽須頻喚覺，虛羸困乏無力，卽空心進理中丸、七寶散。七日外恐喫粥無味，或虛乏無力，卽爛煮羊肉汁、黃雌雞汁作粥，未可喫肉，亦不可喫生冷及硬物，便成積滯之患。常以淨黑豆一升，炒令煙出，以酒五升澆淋，入羌活一兩，槌碎同浸，常用此酒下藥。或時欲一盞，大辟風邪，令諸疾不生。

理中丸方缺。

七寶散見前。

方　治小兒傷食，吐不止。

丁香（十粒）　巴豆（一箇，不出油，只用殼）　縮砂仁（五箇）　大烏梅（一箇）

右爲細末，丸如黍米大，每服二三丸，煎藿香湯下，乳後服。

經氣調治法

論曰：經候者，經脉之常候，血氣運行，恆久之度也。陰陽愆伏，則月候失常，以致太過不及，乍多乍少，或前或後，陰氣乘陽，胞寒氣冷，血不運行，故乍少。陽氣乘陰，血熱流散，故乍多。陰過於陽，則期前來；陽過於陰，則期後至。久則或崩漏不止，斷絕不行，至使面色不澤，臍腹時痛，久不治之，漸致虛損，令人斷產，變生他疾。皆由衝任虛弱，榮衛不調之所致也。婦人賦柔弱之質，易感易傷，氣以榮養之，血以滋潤之，氣行則血隨而行，氣滯則血凝而窒。當調其陰陽，順其血氣，一有偏勝，則經候不調，百病生矣，可不愼哉。

滋陰丹　養血和氣，理治榮衛，充盛肌膚，活血注顏，久服大補衝任，調順月經。

熟乾地黃　生乾地黃　人參　白茯苓（各二兩）　黃耆　甘菊花　枸杞子　丹參　柏子仁（炒）　白芍藥（各一兩）

右爲細末，煉蜜丸如桐子大，每服五十丸，米飲下，空心食前，日進二三服。

沒藥丸　治婦人水經不調，肌瘦發熱，飲食減少。

沒藥　茺蔚子　乾薑　苦芍　川芎　熟乾地黃　白芍藥　當歸各一兩　血竭半兩

右除血竭、沒藥外，㕮咀，先炒茺蔚子焦黃色，次下乾薑炒令黃，次下苦芍微黃色，次下川芎等藥，並令微黃色，與血竭、沒藥等同爲細末，醋煮麵糊爲丸，桐子大，每服五六十丸，漸加至八九十丸，空心食前，溫酒或醋湯亦得，日進二服。

地黃膏子　治婦人本藏血氣衰乏，困倦無力，或發虛熱，飲食減少，並宜服之。

熟地黃八兩　淨蜜十八兩

右將熟地黃爲末，同蜜熬成膏子，丸桐子大，空心食前，每服四五十丸，溫酒下，米飲亦得，或作膏子，酒化服，不飲酒白湯亦得。

八珍散　調和榮衛，理順陰陽，滋血養氣，進美飲食。

當歸　川芎　白芍藥　熟地黃　人參　茯苓　甘草炙　縮砂仁各等分

右爲粗末，每服三錢，水一大盞，生薑七片，棗三枚，去核，同煎三五沸，去渣，放溫，空心，日進二服。

萬病丸　治婦人久虛，血氣衰少，怠惰嗜臥，飲食不進，肌體瘦悴，精神不足，十便良方名滋陰萬病丸，鄭汝明產經名內補丸。

熟乾地黃　當歸各四兩

右爲細末，麵糊爲丸，桐子大，空心食前，每服五十丸，溫粥飲下。

大保生丸　調和本氣，治療諸疾，滋補榮衛，久服之大有功效。

人參　薯本　白茯苓　當歸　赤石脂　生乾地黃　白芷　延胡索　肉桂去皮　白芍藥　白

微　川芎　白芷　甘草炙　沒藥　牡丹皮半兩

右爲細末，煉蜜和丸彈子大，空心食前，每服一丸，溫酒化下。

六神散　治脾氣不和，榮衛不足，怠惰困倦，不嗜飲食，服之補真發氣，進食充肌。

當歸　熟地黃　川芎　地骨皮　黃耆　白芍藥各一兩

右爲粗末，每服五錢，水一盞半，煎至八分，去渣，空心溫服。

當歸沒藥丸　治婦人眞氣虛憊，血氣極少，不能榮養，致使經氣不來，或發寒熱，飲食減少，怠惰嗜臥，以致勞虛。

當歸炒　沒藥　天仙子炒黑色　乾薑炮　蒼朮炒黃色　芍藥　熟乾地黃　川芎各等分

右爲細末，麵糊爲丸，桐子大，每服五十丸，溫粥飲下，食前服。

活血散　治衝任氣虛，經事不調，或多或少，或前或後，並宜治之。

當歸　川芎　白芍藥　柴胡各四兩　肉桂去粗皮二兩

右爲粗末，每服五六錢，水一盞半，煎至七分，去渣，稍熱，食後服。

銑銑丸　治衝任不和，子藏怯弱，或經墮胎後，元氣不復，此藥常服，調和衝任氣血。

當歸　熟地黃各一兩　延胡索　澤蘭葉各一兩半　川芎　赤芍藥　白薇　人參　金鈆石斛各一兩　牡丹皮一兩

右爲細末，醋麵糊爲丸，桐子大，每服五十丸，空心溫酒下，或粥飲亦得。

加味四物湯　治婦人衝任不調，臍腹疼痛，月事入時不來，及衝任太過，致使陰陽不和，或發寒熱，減食和飲，欲成勞病。

當歸　地黃　芍藥　川芎各一兩　柴胡半兩　黃芩二錢半

右㕮咀，服食依前法。

地髓煎丸　治婦人經氣不調，虛煩發熱，肌體瘦悴，形羸弱困，飲食不進，欲成勞病。

熟乾地黃不計多少

右爲末，煉蜜爲丸，桐子大，每服五十丸，空心食前，溫粥飲下。

當歸地黃丸　治婦人血氣不和，月事不勻，腰腿疼痛。

當歸　熟地黃　川芎　白芍藥各二兩　牡丹皮　延胡索各一兩　人參　黃耆各半兩

右爲末，煉蜜和丸，桐子大，每服三十丸，米飲下，食前，日二服，平養氣血。

滋血湯　治婦人皮聚毛落，心肺俱損，血脉虛弱，月水愆期，益氣養血，調進飲食。

人參　白茯苓去皮　熟乾地黃　川芎　當歸　白芍藥　黃耆　乾山藥各一兩

右爲粗末，每服五錢，水一盞半，煎至一盞，去渣，溫服下。

滋榮丸　治婦人本經衰弱，愆期不來，及有血結成塊，臍下堅硬，疼痛不消，並宜治之。

熟乾地黃　人參　五味子　赤芍藥　當歸　遠志去苗　白茯苓去皮　牡丹皮　桂心　薯本各一兩　防風　卷柏　細辛　山藥各半兩　白朮三錢

右爲細末，煉蜜和丸，桐子大，每服三十丸，食前空心溫酒下，日進三服。

當歸良薑散　補養血氣，去心腹疼悶，脇肋脹滿，經絡不調，或赤白帶下，腰脚疼痛，一切癖疾。

高良薑五兩　厚朴二兩，去皮，薑製　當歸二兩　桂去皮二兩

右爲粗末，每服二錢，水一盞，艾十葉，同煎至七分，去滓，食前熱服。

抽刀散　治婦人心腹脇肋疼痛不忍，產前後亦用。

川烏頭炮去皮脐　牡丹皮　芍藥　乾薑炮　桂心　沒藥　當歸各等分

右爲細末，每服二錢，熱酒調下，不過三服，輕可一服，產後加紅花。

禹餘糧散　治氣血傷，衝任虛損，崩傷帶漏，久而不止，或下如豆汁，或成片如肝，或五色相雜，或赤白相兼，臍腹冷痛，面體羸黃，心悸怔忡，發熱多汗，四肢困倦，飲食減少。

禹餘糧醋淬　伏龍肝　赤石脂　白龍骨　牡蠣　烏魚骨　桂去皮　浮石各等分

右爲末，每服三錢，煎烏梅湯調下，食前服。白多加牡蠣、龍骨、烏魚骨，赤多加赤石脂、禹餘糧，黃多加伏龍

肝、桂心、隨病加治。

禹餘糧丸　治婦人諸病方。

桂（去皮）、禹餘糧（燒醋淬）、龍骨、人參、紫石英、川烏頭、桑寄生、杜仲（去皮炒）、五味子、遠志（去心）、澤瀉、當歸（洗切焙）、石斛（去根）、萆薢、乾薑（各二兩）、川椒（去目炒出汗）、牡蠣（燒）、甘草（炙）。

右爲末，煉蜜爲丸桐子大，每服二十丸，米飲下，漸加至三十丸，日三服。

五聖散　調益榮衛，滋養氣血，治衝任虛損，月水不調，臍腹疼痛，崩中漏下，血瘕塊硬，發歇俱疼，姙娠宿冷，將理失宜，胎動不安，血下不止，及產後乘虛，風寒內搏，惡露不下，結生瘕聚，小腹堅疼，卽作寒熱。

當歸、熟乾地黃、川芎、白芍藥（各一兩）、生乾地黃（三兩）。

右爲末，酒煮麵糊爲丸桐子大，每服六七十丸，食前溫酒送下。

延齡續寶丸　治婦人血竭虛損，經候過多，每行時暴下不可禁止，因成崩中，連日不斷，致五臟空虛，失色黃瘦，崩竭暫止，日少復發，不耐勞搖，小勞輒極劇，此藥但空心服，大有效。

禹餘糧石（二兩，燒醋淬七遍）、龍骨、人參、桂、赤石脂、紫石英（研）、熟地黃、杜仲（去粗皮剉碎）、桑寄生、續斷、香白芷、芎藭、當歸（剉炒）、遠志（去心）、金鈆石斛（去根剉炒）、白茯苓（去皮）、阿膠（炒）、牡蠣、五味子、艾葉（各一兩）。

右爲細末，每服二錢，食前溫酒調下。

方　治內損吐血。

飛過麵不計多少，微炒過，濃磨陳墨一茶脚，調下二錢，立效。

方　治非時吐血。

荊芥連根洗淨，擣汁半盞，飲之。

又方

生地黃自然汁一盞，槐花揀淨一兩，用地黃汁炒槐花，候地黃汁盡花乾，每用三五十粒，細嚼之。

又方

新綿半兩，燒令存性，分二服，濃煎人參湯調下。

靈寶散　治血氣刺痛，引兩肋疼痛，及痃癖刺氣。

丁香（一錢半）、木香（一錢半）、乳香（一錢半）、當歸、延胡索、白芍藥（各半兩）。

右爲末，每服一錢，溫酒調下，食前服。

烏金散　治血崩漏下，最治產後血崩，并小產血崩漏下。

慢櫚皮、烏梅、乾薑（燒灰存性，各等分）。

右爲末，每服二大錢，煎烏梅湯調溫服，不以時。

旋覆花丸　治停痰積飲在脇下，久而不愈，漸成大癖，心腹脹滿，羸瘦不能食，食不消化，喜嗽乾嘔，大小便或澀或利，在腸中搖動有水聲，或口乾好飲水漿，兩脇疼痛，服之必安，久服根除。

旋覆花（去莖）、桂（去皮）、枳實（麩炒去瓤）、人參（各一兩）、乾薑（炮）、芎藭、白朮（各一兩）、赤茯苓（各一錢半）、狼毒（炮去皮肌）、川烏頭（炮去皮肌）、礬石（燒赤，各一兩七錢半）、芫花（醋浸炒乾）、吳茱萸（湯浸去滓炒黃色）、大黃（微炒）、黃芩（去黑心）、厚朴（去皮生薑製）、葶藶（隔紙炒，各七錢半）、甘遂（炒，半兩）、橘皮、細辛（去苗葉）。

右爲細末，煉蜜和丸桐子大，每服一十丸至二十丸，日二服，不拘時候。

姙娠調養法

鑑斯丸　治婦人無子術，金城太守范羅護上，臣驗此術，若服藥四十日無子，請戮臣一家以令天下。醫人又名賜子丸（陳藏器三國方作名桂丸，廣聞編效方作白微丸）。

附子（生，去皮脐）、白茯苓（去黑皮）、白微、半夏（湯洗七次）、杜仲（去粗皮）、桂心、秦艽、厚朴（去麄皮，各三錢）、防風、乾薑（生）、牛膝、沙參（各二錢）、細辛（去苗，半兩）、人參（四錢）。

右爲細末，煉蜜丸如小豆大，日服五十丸，空心任下。如覺無益，稍加丸數爲度。如服七日後，陰陽覺有娠，三日後不可更服。臣妻年二十七歲無子，服此藥有娠，又殘藥與前太子中舍宇文婁李氏，年四十歲無子，服此藥十三日有娠。此藥名鑑斯丸，屢用屢驗，此方不可不廣與人。如夫不在家，不可服。

凡女人姙娠，若素虛羸，血氣不足，體中有風氣，心下多痰水者，欲有胎喜病阻，其狀顏色如常，脉理和順，但覺肢體沉重，頭目昏眩，不思飲食，惡聞食氣，多嗽鹹酸，心中懵懂，不知患之所在，以至三四月以後，則大劇吐逆，不能勝舉，如此有證，則宜服瘵阻病竹茹湯、人參散、地黃丸。

竹茹湯方闕。

人參散　治初娠惡食嘔逆。

人參（一兩）、枳殼（三分，麩炒去穰）、厚朴（薑汁塗炙）、甘草（炙，各半兩）。

右爲粗末，每服四錢，水一盞半，入生薑彈子大一塊，拍破，同煎至七分，去滓，溫服，不拘時候。

地黃丸方闕。

夫姙娠藏氣皆壅，關節不利，切不宜多睡，食粘硬難化之物，亦不須亂服湯藥，大愼鍼灸，惟須靜安心神，不得悲憂驚恐，負重振動，若覺胎藏不安，腹中微痛，心意煩悶，四體昏倦，宜服安胎順氣阿膠散，近難月卽服順胎保安散、千金丸。

阿膠散　治娠姙不問月數深淺，因頓仆胎動不安，腰腹痛，或有所下，或胎奔上刺心短氣。

熟乾地黃（二兩，細切）、艾葉（切，焙黃）、當歸（切，焙）、甘草（炙）、芎藭、川芎、阿膠（炙令燥色，各一兩）、黃耆（若虛羸）。

右爲末。每服四錢。水一盞半。煎至八分。溫服。若胸中冷逆氣。加生薑五片。棗五枚。同煎服。

保安散　治妊娠胎氣不安。心腹痛。

當歸一兩半切焙。　人參一兩。　阿膠炙令黃。　甘草炙各半兩

右爲末。每服三大錢。水一盞半。入葱白一莖。拍破。煎至八分。去滓。食前溫服。未定再服。

千金丸　治產前後一切風冷血氣等候。產前胎氣不安。腰腹疼痛。四肢昏倦。妊娠臨月預合下。每日空心一服。臨產五臟不痛。易產。產中不生諸疾。兼治產後惡血不盡。及胎衣不下。增寒壯熱。吐逆煩悶。皮膚虛腫。或血暈狂迷。服見神鬼。能調勻血氣。

金釵石斛別搗爲末。　秦艽　川椒去子。微炒。　細辛　防風　貝母微炒黃。　熟乾地黃切焙。　糯米

甘草炙令黃。　當歸切焙。　大麻仁　黃芩　乾薑炮。　大豆蘖以黑豆生芽。長二寸。焙乾。用。各三分。　石膏半分。

右精研爲末。以煉蜜成劑。入臼中。杵一千下。分爲七十二丸。擇除破、天德、月德日合。每服一合。溫酒調下。產後產前赤白帶下。溫酒調下。產前後血風。薄荷湯調下。月信不通。當歸酒下。臨產艱難。或三五日難產。及胎衣不下。子死腹中。橫生倒產。死絕不語。但心頭有熱氣。用藥一丸。姜煎湯研化灌之。下喉立瘥。產後惡血不盡。臍腹疼痛。嘔吐。壯熱。增寒。煩悶。月候不調。或少。肢體虛怠。皮膚浮腫。產血不止。虛勞中風。口噤不語。半身不遂。產前後赤白痢。大小便祕澀。血暈狂語。頭痛。面色萎黃。漸成勞瘵。飲食無味。並溫酒研下一丸。產前臨月。每日一丸。至臨產。用當歸酒下一兩丸。催生。五臟不痛易生。

救生散　安胎益氣。易產。

人參半兩。　訶子湯煮爛。焙乾。去核。　白朮細切。炒黃。　陳橘皮去白炒。　大麥蘖炒黃。　神麯細切。炒黃。各半兩。

右爲末。每服二錢。水一盞。煎至六分。空心溫服。入月加一倍。水二盞。煎一盞。溫服。能令兒緊小。乳母無患。

十月厥陰行令。地氣不收。冬氣不藏。萬物反生。時有濃霧。人病關閉不禁。心痛。陽氣不收。氣喘。孕婦多暴死及墮胎之病。宜服暖肝藥以治之。治婦人胎動不安方。無問太歲。但寅、申年十月。頻有濃霧淒清之化。孕婦有胎動不安之病。宜進後方。

方

人參一分。　防風一分。　當歸一分。　五味子一分。　白朮一分。　續斷一分。　川芎半兩。　桑寄生三分。　甘草三條。　細辛三條。

右爲末。每服一錢。水一大盞。煎至七分。空心去滓服。

方　治妊娠忠時疾。

黃芩大如雞卵。　鬱金各一兩。

右爲末。每服一錢。板藍根、地黃水下。汗出效。未得汗。再服。即瘥。夏子益方內有白朮一錢。

石脂散　治妊娠寫痢。

赤石脂六錢。　乾薑四錢。　糯米一合。炒黃。

右爲末。分爲二服。水二盞。煎至一盞。食前溫服。

巳丑丸　治泄瀉水穀不分。謂之殞濕。方缺。

衛生家寶產科備要

朱端章編

重雕宋本衛生家寶產科備要敘

產科之有專書，始于唐楊師厚之產乳集驗方，太和中，翟殷產寶雜之，北宋則有李師聖之產育寶慶集、沈度卿之衛生產科方，南宋則有虞流之備產濟用方，陸子正之胎產集驗方，今皆不傳。寶慶集雖著錄四庫全書，從永樂大典錄出，經陳言等增刪，亦非原本。醫書之鮮善本久矣，產科其尤甚者也。衛生家寶產科備要八卷，宋朱端章編，宋史藝文志著于錄，明文淵閣書目亦有其書，四庫全書未收，阮文達亦未見。錢遵王讀書敏求記載有宋本，于端章仕歷則未詳也。案端章，福建長樂縣人，淳熙中知江西南康軍，寬以愛民，廉以律己，撥設官田于白鹿洞學，以贍四方來學者，著有衛生家寶方六卷、衛生小兒方一卷、衛生家寶湯方二卷，及此書。見宋史藝文志，乾隆江西通志，查南宋良吏，有心于濟世救民者，非醫士也。卷一入月安產法、體元子借地法、逐月藏衣遊神法、本之外台秘要、禁草、禁水、催生符法，出聖濟總錄，卷二、卷三皆採之孫真人千金方，卷四全錄產育寶慶集，張世臣累用經効方，卷五則采之庞江助教劉寶經驗名方者居多，卷六則全錄備產濟用方及許叔微本事方中胎產諸方，卷七則全錄胎產經驗方，卷八則雜採萬氏肘後、吳氏病源、千金、外台、聖惠、萬全、小兒集驗、嬰童寶鑑、錢乙、張渙諸書保育小兒諸法。李時珍所集賴此以存，虞張之方尤為自來著錄所罕見，洵乎產科之奇萃，醫家之指南也。予少多疾病，喜讀方書，每書衆論刑棘之時，略試其技，亦嘗奏效，婦人、小兒皆罰書寫，尤難製劑，丙子之歲，細君臨蓐，胎

死腹中，三日不下，諸醫束手，甲申九月，家婦將蹶而瘞作，瘞發之際，心痛欲死，醫亦無策，余細心診問，博考方書，幸賴此書，轉危為安，細君慫慂付梓，爰雕印以廣其傳，嗟乎，秦漢以來，醫書經林億、孫兆校定，未必盡合于古，然猶無大失也，明人一再重刊，無不妄刪、妄改，謬承譌，固已失之毫釐，繆以千里，而況庸人以醫為市，目不知書，迂儒食古不化，刻舟求劍乎，以此治疾，是益之危而速之死也，婦科為醫家九科之一，產又婦科之一端，自來皆鮮專書，即有亦鮮善本，是編採摭宏富，持擇精詳，所願家藏一編，而深求之于保產全嬰之道，其庶幾乎。

光緒十三年歲在強梧大淵獻，壯月既死霸，諮授榮祿大夫三品頂戴前水利太平關監督加四級歸安陸心源書于穆梨館

衛生家寶產科備要目錄

卷一

產圖　體玄子借地法
入月安產圖　禁水法
禁草法　產後將護法
產前將護法　催生符
逐月安產藏衣并十三神行遊法　保生圓
符貼式　當歸建中湯
當歸圓

卷二

孫真人養胎論　補胎湯
徐之才逐月養胎方　黃連湯
烏雌雞湯
艾葉湯

雄雞湯　菊花湯　阿膠湯　麥門冬湯　葱白湯　芍藥湯　半夏湯　丹參膏　千金圓　滑胎令易產方
茯神湯　調中湯　安中湯　柴胡湯　杏仁湯　葵子湯　豬石湯　甘草散　蓽大黃圓
人參散　阿膠散　神妙千金圓
催生通鑒散　牡丹飲子　芍藥湯　四順理中圓
滿黃黑神散　勝金散　見現圓　調經散　調中湯　麻仁圓　固經圓

卷三

論初姙娠　竹茹湯　地黃圓　保安散
論欲產幷產後　琥珀散　七寶散　單方黑神散　定痛散　玉露散

卷四

二十一論幷增入十八論（郭稽中附方）　黑神散　奪命丹　清魂散　增損四物湯　七珍散　趁痛散　黑神圓

巨勝湯　小續命湯
論臨月將息
論新生小兒（幷小兒方四道）　注唇膏　蝸梢散
累用經効方　大聖澤蘭散　地榆降血飲子　臭白朮散　催生幷死胎方　橫生逆生方四道　姙娠傷墜胎動方　胎動下血心腹脹方　產後中風方　產前傷寒方
卷五
產科雜方　催生如聖散　還胎散　羌活散　蜜粉散　地黃散　血竭散
十八論中治產前產後諸疾黑神散功効
續添產前產後十八論烏金散功効　宣經圓
產前所忌藥物
卷六
虞氏備產濟用方
大麻蜜湯　濟危上丹
豆蔻散　治嘔噦
奪命褐散子　大安胎飲子　滑胎榆白皮方　難產方　姙娠煩悶胎熱方　胎動口噤唇青方　產後血暈方四道　產後發狂方
救生散　二聖散　黃金散　香連散　香脂散
烏金散

妊娠
臨產
產後諸證用藥例
胎衣不下
入月借地法
產前諸方
川芎散
蟹爪湯
又方
保生圓
又方
催生神効聖功散
神効催生丹
產後諸方
勝金湯
又方
燒鹽法
又方
烏金散
麒麟竭散
地黃散
桃仁散
金花散
人參散
香桂散
柿湯
陳梅散
難產方十二道
逆產方八道
橫產方六道

入月
產後
難產逆產橫產
妊娠食忌
十二月產臥藏衣吉凶圖
枳殼湯
又方
人參圓
五積散
順元散
催生安胎救命散
催生如聖圓
又方
清小便方
百草霜散
黑散子
金黃散
千金散
牡蠣散
川芎散
當歸散
四神散
當歸散
荊芥散

胎衣不下方七道
治產前產後痢疾方
許學士產科方
滑胎枳殼散
木香圓
紫蘇飲
琥珀散
愈風散
蒲黃散
又方
鹿屑湯
卷七
胎孕方
人參白朮散
枳殼散
槐柳散
治妊娠墜傷胎動方
千金蟹爪湯
葱白湯
治妊娠傷寒大熱胎不安方
治妊娠小便卒不通方
產前方
榆皮滑胎散
催生桂散
治難產胎衣不下方
又方
小琥珀散
下鬼胎方
產後方
牛膝湯
內補圓
白朮散
下死胎方
佛手散
交加散
體胎方
麻仁蘇子粥
治婦人死胎不下方
千金半夏茯苓湯
陳道遙水酒散
治胎不穩方
治胎動已死未死方
又方
白朮散
治妊娠傷寒大熱令胎不落方
又方
黑神散
治難產或橫倒胎死方
又方
易產方
下死胎方
治草蓐或產後血暈五絕中風方
當歸建中湯

聖功川芎湯
通宣圓
烏金散
當歸一味散
秤槌酒
產婦忽患寒熱方
偽寒產後惡露爲熱搏不行宜服抵當湯
桃仁承氣湯
桂心牡蠣湯
增損柴胡湯
人參散
治產後惡露不絕方
治產後溺濇惡物方
產後傷食宜服食藥瞰應圓
治產後下痢赤白膿血方
治吹㚡或兒絕㚡後乳脹疼方
治吹㚡脹硬方
通用四物湯
萬金散
追命散

卷八

形初保育

小兒初生將護法
擇乳母法
乳兒法
乳母難忌法
哺兒法
浴兒法
斷臍法
扶兒口法
裹臍法
灸臍法
黃連法
甘草法
藏衣法
豬乳法
覆謝法
剃頭法
初生不啼㚡
初生不作聲
初生有緊癡病
初生吐不止
初生有重舌
葛氏肘後治卒重舌方
初生着嚏

衛生家寶產科備要卷第一

產圖

◉入月安產圖

凡產於入月一日，貼在臥閣內正北壁上。

凡安產藏衣方位，並於臥閣內分布，凡逐月安產藏衣，避忌神煞方位，並隨節氣更換，候交得次月節，即換次月產圖。

凡產訖藥瀉穢汚不淨之水，並隨藏衣之方所向，不拘遠近藥之，切忌向閉肚之方也

◉體玄子借地法

東借十步，　西借十步，
南借十步，　北借十步，
上借十步，　下借十步，

壁方之中四十餘步，安產借地，恐有穢汚，或有東海神王，或有西海神王，或有南海神王，或有北海神王，或有日遊將軍、白虎夫人，遠去十丈，軒轅招搖，舉高十丈，天符地軸，入地十丈，令此地空閑，產婦某氏，安居無所妨礙，無所畏忌，諸神擁護，百邪遠去，急急如律令勑。

●禁草法。鋪草及氈褥訖。即呪曰。

鐵鐵湯湯。非公所當。是王一言得之銅。一言得之鐵。母子相生俱篋鐵。急急如律令。

●禁水法。欲產時貯水呪曰。

南無三寶水。
水在河中爲河水。
水在井中爲井水。
水在法中爲眞水。
水在器中爲淨水。
自知非眞。莫當眞水。
以淨持濁。
以正治邪。
日遊、月殺。
五士、將軍。
青龍、白虎。
朱雀、玄武。
招搖、天狗。
軒轅、女妖。
天吞地吞。
魍尸閉肚。
六甲禁諱。
十二神王。
土符伏神。
各安所在。
不得動靜。
不得忌干。
若有動靜。
若有忌干。
施以神呪。
雷攝汝形。
阿佉尼阿毗羅、莫多梨、迦地梨、沙訶。

●產前將護法

按諸家產論云。凡婦人姙娠入月。不可沐頭。濕冷流于足太陽之經。多令子橫逆不順。誠之誡之。又切忌飲酒。恐產時心神昏亂。臨產之時。不可令傍人喧擾。大小倉忙。慮致驚動產母。稳可令熟事產婆、及穩審護卓老成親密三兩人。扶侍產母。初覺腹痛。且宜任意坐臥。勉強飲食。恐致臨產氣力虛羸。若腹痛漸甚。唯且熟忍。仍可按節次漸服滑胎榆白皮散一二服。服藥之法。切勿太早。須得其時。又傍人不得逼迫。且須令人扶策。徐徐而行。若行步稍難。即凭物而立。須臾扶策再行。直至腹痛連腰相引。作陣痛頻時。即服催生丹一服。更且勉強扶行。陣痛轉甚。難以行立。認是產時將至。即服催生符畢。然後安詳上草。上草之時。切勿傷早。若太早則子在腹中。難以轉側。又須子細體驗。直待兒逼欲生。然後令抱腰也。抱腰之人。不得傾斜。則兒得順其理。自然易產也。又有臥產者。亦待臥定。背平着蓆。體不偃曲。則子不失其道。苟或不能依此節適。必致產難。縱或幸免。必須變生諸疾。

●產後將護法

按經云。婦人非止臨產須愛。至於產後。大須將護。勿以產時無他。乃縱心恣意。無所不犯。犯時微若秋毫。感病重於嵩岱。且才得分娩。切忌問是男是女。看血下多少。隨證服藥。血運藥。良久喫粥。服四順理中圓。方見第二卷末。便令人從心下按至臍腹。日五七次。若有疾證。即隨證服藥。粥藥相間。頻頻服餌。且閉目而坐。背後倚物。左右看承。常令直立兩膝。雖時眠睡。頻令換覺。過一伏時方得上牀。亦須立膝高槽。牀頭厚鋪褥。遮圍四向。窒塞孔隙。以禦風。一腸之內。常用醋煙。以防逆悶。一腸之後。漸加滋味。或以羊肉及雌鷄。煮取澄汁。作糜粥。直至百晬。常服當歸、當歸建中湯、四順理中圓。日各一兩服。以發藏氣。補血脈。兩腸之後。方得食糜爛肉食。滿月之內。尤忌任意飲食。觸冒風寒。恣情嗔怒。梳頭用力。高聲作勞。工巧之類。及上廁便溺。如此節餐將攝。以至百晬。始得氣血和調。將藏平復。設不依此。即致產後餘疾。

●逐月安產藏衣。并十三神行遊法。



















甘草炙微赤、剉、　貝母剉、　乾薑炮、剉、　秦椒去目及閉口者、微炒出汗、　桂去粗皮不見火、　黃芩剉尖如雄者、

石斛去根、　石膏細研如粉、　粳米　大豆黃卷各一分　當歸半兩去蘆頭、酒浸一宿、剉碎、微炒、　麻子仁二兩半、

右十二味爲末、煉蜜爲圓如彈子大、每服一圓、溫酒或煎湯化下、嚼亦得、空心食前。

◉當歸圓、治產後虛羸及傷血過多、虛竭少氣、臍腹俱急痛、引腰背、面白脫色、嗜臥不眠、唇口乾燥、心悸煩倦、手足寒熱、頭重目眩、不思飲食、或勞傷衝任、內積風冷、崩中漏下、淋瀝不斷、及月水將行、腰腿重疼、臍腹急痛、及治男子、婦人從高墜下、內有瘀血、吐血、下血等病。

當歸去蘆頭、酒浸一宿、剉碎、微炒、　芎藭洗、剉、　續斷洗、去根、　乾薑炮、　阿膠剉碎、蛤粉炒令黃、剉、師去蛤粉用、　甘草微炙、剉、各四兩、　白朮切、焙、　白芷去梢、剉、　附子炮裂、去皮臍、　桂去粗皮、剉、各三兩、

白芍藥各二兩、　熟乾地黃十兩酒浸一宿、焙乾、剉焙、　眞蒲黃三兩半隔紙微炒、　吳茱萸三兩湯浸七遍、焙乾、微炒、

右一十四味、搗羅爲末、煉蜜爲圓如梧桐子大、每服二十圓、食前以溫酒下、漸加至五十圓。

◉當歸建中湯、治婦人一切血氣虛損、及產後勞傷、羸瘦不足、腹中疞痛、吸吸少氣、小腹虛急、痛引腰背、時自汗出、不思飲食。

當歸四兩去蘆頭、酒浸一宿、切焙、　桂三兩去粗皮、剉、　白芍藥六兩剉、　甘草二兩炙、

右爲麤散、每服三錢、水一盞半、加生薑五片、棗一枚、擘破、同煎至一盞、濾去滓、熱服、空心食前、產訖直至滿月、每日三服、令人丁壯如頭痛、眼目眩、加川芎二兩、防風一兩。

衞生家寶產科備要卷第二

孫眞人養胎論

論曰、衞說凡受胎三月、逐物變化、真質未定、故姙娠三月、欲得觀星、象、猛獸、珠、玉、寶物、欲得見賢人、君子、盛德大師、觀禮樂、鐘鼓、俎豆、軍旅、陳殷、焚燒名香、口誦詩書、古今箴誡、居處簡靜、割不正不食、席不正不坐、彈琴瑟、調心神、和情性、節嗜慾、庶使清淨、生子皆良、長壽、忠、孝、仁、義、聰、惠、無疾、斯蓋文王胎教者也。

姙娠食羊肝、令子多厄。

姙娠食山羊肉、令子多病。

姙娠食驢馬肉、延月。

姙娠食麋肉、產難。

姙娠食兎肉、犬肉、令子無音聲、并缺唇。

姙娠食雞子及乾鯉魚、令子多瘡。

姙娠食糯米、令子多寸白蟲。

姙娠食椹、并鴨子、令子倒出、心寒。

妊娠食雀肉并豆醬。令子滿面多皯斑、黑子。
妊娠食雀肉、飲酒。令子心經悄亂。不畏羞恥。
妊娠食鼈。令子項短。
妊娠食冰漿。絕胎。
妊娠勿向非常地大小便。必半產殺人。

徐之才逐月養胎方

妊娠一月名始胚。飲食精熟酸美。受御宜食大麥。無食腥辛。是謂才正。
妊娠一月。足厥陰脈養。不可針灸其經。足厥陰內屬於肝。肝主筋及血。一月之時。血行痞澀。不爲力事。寢必安靜。無令恐畏。妊娠一月。陰陽新合爲胎。寒多爲痛。熱多卒驚。舉重腰痛。腹滿。胞急。卒有所下。當預安之。宜服烏雌雞湯。

◉烏雌雞湯

烏雌雞一隻。治如食法。　茯苓去皮。　阿膠剉碎。各二兩。　芍藥白者。　白朮去蘆。　人參去蘆。各三兩。
甘草炙、剉。　生薑洗去皮、切。各一兩。　吳茱萸一升。揀去枝梗。　麥門冬五合。湯浸、去心、焙乾。

右十味㕮咀。以水一斗二升。煮雞取汁六升。去雞下藥。煎取三升。內酒三升。并膠烊薄。取三升。放溫。每服一升。日三次服。

若曾傷一月胎者。當預服補胎湯。

◉補胎湯

細辛一兩。高遠者。去葉。　生薑四兩。洗、擣去皮、切碎。　烏梅一升。搗碎。　防風二兩。去蘆。　乾地黃洗、焙、剉、焙乾。
白朮去蘆。各三兩。　大麥炒。　吳茱萸揀淨。各五合。

右八味㕮咀。以水七升。煮取二升半。分三服。食前服。寒多者倍細辛、茱萸。若熱多渴者。去細辛、茱萸。加栝樓根二兩。若有所思。去大麥。加栢子仁三合。一方有人參一兩。

◉妊娠二月名始膏。無食辛臊。居必靜處。男子勿勞。百節皆痛。是爲胎始結。
妊娠二月。足少陽脈養。不可針灸其經。足少陽內屬於膽。主精。二月之時。兒精成於胞裏。當謹護驚動也。
妊娠二月。始陰湧脈經。有寒多懷不成。有熱卽萎悴。中風寒。有所動搖。心滿。臍下緊急。腰背強痛。卒有所下。乍寒乍熱。艾葉湯主之。

◉艾葉湯

艾葉去極。　丹參洗。　當歸洗去蘆頭。切片焙。　麻黃不去節。各二兩。　人參去蘆頭。切。　阿膠剉碎。各三兩。
甘草一兩。炙。　生薑六兩。洗、擣去皮、切。　大棗十二枚。去核。

右九味㕮咀。以酒三升。水一斗。煮減半。去滓。內膠。煎取三升。分三服。一方用烏雌雞一隻宿肥者。治如食法。割頭取血。內三升酒中。相和。雞以水一斗二升。先煮取汁。去雞內藥。煎取三升。內血酒并膠。煎取三升。分作三服。

若曾傷二月胎者。當預服黃連湯。

◉黃連湯

黃連去鬚。　人參去蘆、切。各一兩。　吳茱萸五合。揀淨。　生薑三兩。洗、擣去皮、切。　生地黃五兩。一方用阿膠。

右五味㕮咀。以醋漿七升。煮取三升。分四服。日三夜一。十日一作。若頗覺不安。加烏梅一升。加烏梅者不用漿。只用水耳。一方用當歸半兩。

妊娠三月名始胞。當此之時。未有定儀。見物而化。欲生男者。操弓矢。欲生女者。弄珠璣。欲子美好。數視璧玉。欲子賢良。端坐清虛。是謂外象而內感者也。
妊娠三月。手心主脈養。不可針灸其經。手心主內屬於心。無悲哀思慮驚動。
妊娠三月爲定形。有寒大便利。有熱小便難。不赤卽黃。卒驚恐憂愁、喘怒、寢頓仆。動於經脈。腹滿。繞臍苦痛。或腰痛。卒有所下。雄雞湯。

◉雄雞湯

雄雞一隻。治如食法。　甘草炙、剉。　人參去蘆、切片。　茯苓聲白者。去皮。　阿膠剉碎。各二兩。　黃芩去如雞者。
白朮去蘆。各一兩。　麥門冬五合。湯浸去心、焙乾。　芍藥四兩。洗。　大棗十二枚。去核。
生薑一兩。洗、擣去皮。

右十一味㕮咀。以水一斗五升。煮雞減半。出雞內藥。煮取半。內清酒三升并膠。煎取三升。分三服。一日盡之。當溫臥。一方用當歸、芎各二兩。不用黃芩、生薑。

若曾傷三月胎者。當預服茯神湯。

◉茯神湯

茯神去木。　丹參洗。　龍骨五色緊者。各一兩。　阿膠剉碎、蛤粉炒泡起、去粉用。　當歸洗去蘆頭。切焙。　甘草炙、剉。
人參去蘆。各二兩。　赤小豆二十一粒。　大棗二十一枚。去核。

右九味㕮咀。以醋漿一斗。煮取三升。分四服。先食服。七日後服一劑。腰痛者。加桑寄生二兩。深師有亞白二兩。麻子一升。

妊娠四月。始受水精。以成血脈。食宜稻粳、薤、宜魚、脯。是謂盛血氣。以通耳目而行經絡。
妊娠四月。手少陽脈養。不可針灸其經。手少陽內輸三焦。四月之時。兒六腑順成。當靜形體。和心志。節飲食。
妊娠四月。有寒心下慍慍。欲嘔。胸脇滿。不欲食。有熱小便難。數數如淋狀。臍下苦急。卒風寒。頸項強痛。寒熱。或驚動身體。腰背腹痛。往來有時。胎上迫胸。心煩不得安。卒有所下。菊花湯。

◉菊花湯

菊花一握。如雞子大。　麥門冬一升。湯浸、去心、焙乾。　麻黃不去節。　阿膠剉碎。各三兩。　甘草炙、剉。

當歸（洗、去蘆頭、切焙）、各二兩　人參（一兩半、去蘆頭、切）　生薑五兩（洗、擦去皮、切碎）　半夏四兩（湯浸七次、薑汁一宿）

大棗十二枚（去核）

右十味㕮咀，以水八升，煮減半，內清酒三升，并阿膠，煎取三升，分三服，溫臥當汗，以粉粉之，護風寒四五日，一方用烏雌雞一隻，煮水煎藥。

若曾傷四月胎者，當預服調中湯。

◉調中湯

續斷（去根、焙乾）、　芎藭（洗、剉）、甘草（炙）、各一兩　白朮（去蘆、切、焙）　柴胡（去蘆、洗）　厚朴（削去皮、生薑汁炙令熟、一宿、次日焙乾）

枳實（去穰、麩炒）　生李根白皮（洗）　各三兩　白芍藥（雪白者）　生薑（洗、去皮、切）　各四兩

當歸（一兩半、洗、去蘆）　烏梅（一升、細碎）

右十二味㕮咀，以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一，八日後復服一劑。

妊娠五月，始受火精以成其氣，臥必晏起，沐浴浣衣，深其居處，厚其衣裳，朝吸天光，以避寒殃，其食稻、麥、黃牛、羊、和以菜萸，調以五味，是謂養氣，以定五臟。

妊娠五月，足太陰脈養，不可針灸其經，足太陰內輸於脾，五月之時，兒四肢皆成，無大飢，無甚飽，無食乾燥，無自炙熱，無大勞倦。

妊娠五月，有熱苦頭眩、心亂、嘔吐，有寒苦腹滿痛，小便數，卒有恐怖，四肢痿痺，寒熱，胎動無常處，腹痛悶絕，狀如產，卒有所下，阿膠湯主之。

◉阿膠湯

旋復花二合（去枝根）　阿膠四兩（剉碎）　人參一兩（去蘆頭、切）　生薑六兩（洗、擦去皮、切）

吳茱萸七合（揀淨、湯洗三次、焙）　當歸（洗去蘆頭、片子、焙、切）　芍藥（雪白者、剉）　甘草（炙）　各二兩

右十味㕮咀，以水九升，煮藥減半，內清酒三升，并膠，微火煎取三升半，分四服，日三夜一，先食服便愈，不差再服，一方用烏雌雞一隻，割取咽血，內酒中，以水煮雞，以煎藥，減半，內酒并膠，煎取三升半，分四服。

曾傷五月胎者，當預服安中湯。

◉安中湯

黃芩一兩（尖如錐者）　當歸（洗去蘆頭、切片、焙）　芎藭（洗、剉）　人參（去蘆頭、切）　乾地黃（洗淨、焙乾用）　各二兩

甘草（炙、剉）　芍藥（雪白者）　各三兩　生薑六兩（洗、擦去皮、切碎）　麥門冬一升（湯浸、去心、焙）　大麻仁五合（去殼）

五味子五合（揀去枝梗）　大棗三十五枚（去核）

右十二味㕮咀，以水七升，清酒五升，煮取三升半，分四服，日三夜一，七日復服一劑。

妊娠六月，始受金精以成其筋，身欲微勞，無得靜處，出遊於野，數觀走犬及觀走馬，食宜鶩鳥、猛獸之肉，是謂變腠理，叔筋以養其力，以堅背膂。

妊娠六月，足陽明脈養，不可針灸其經，足陽明內屬於胃，主其口、目，六月之時，兒口目皆成，調五味，食甘美，無太飽。

妊娠六月，卒有所動不安，寒熱往來，腹痛脹滿，身體腫，驚怖，忽有所下，腹痛如欲產，手足煩疼，宜服麥門冬湯。

◉麥門冬湯

麥門冬一升（湯浸、去心）　人參（去蘆、切片）　甘草（炙、剉）　黃芩各二兩　乾地黃三兩（洗、焙）　阿膠四兩（剉碎）

生薑六兩（洗、擦去皮）　大棗十五枚（去核）

右八味㕮咀，以水七升，煮減半，內清酒二升，并膠，煎取三升，分三服，中間進糜粥，一方用烏雌雞一隻，煮水以煎藥。

若曾傷六月胎者，當預服柴胡湯。

◉柴胡湯

柴胡四兩（去蘆、焙）　芍藥（雪白者、一方作紫菀）　白朮（去蘆、切、焙乾）　甘草（炙）

麥門冬（湯浸、去心、焙）　芎藭（洗）　各二兩　乾地黃五兩（洗淨、焙）　生薑六兩（洗、擦去皮、切片）　大棗三十枚（去核）

右十味㕮咀，以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一，中間進糜粥，勿食生冷及堅硬之物，七日更服一劑。

妊娠七月，始受木精以成其骨，勞身搖肢，無使定止，動作屈伸，以運血氣，居處必燥，飲食避寒，常食稻粳，以密腠理，是謂養骨而堅齒。

妊娠七月，手太陰脈養，不可針灸其經，手太陰內屬於肺，主皮毛，七月之時，兒皮毛已成，無大言，無號哭，無薄衣，無洗浴，無寒飲。

妊娠七月，忽驚恐搖動，腹痛，卒有所下，手足厥冷，脈若傷寒，煩熱，腹滿，短氣，常苦頸項及腰背強，葱白湯主之。

◉葱白湯

葱白十四莖（長三四寸）　麥門冬一升（湯浸、去心、焙）　生薑八兩（洗、擦去皮、切片）　甘草（炙、剉）　當歸（洗、去蘆頭、切片子、焙）

黃芪（蜜炙）　各三兩　人參一兩半（去蘆、切片）　阿膠四兩（剉碎）　黃芩一兩（尖如錐者）　旋復花一合（去枝梗）　半夏一升（湯泡七次、用生薑汁一宿、焙乾）

右十一味㕮咀，以水八升，煮減半，內清酒三升及膠，煎取四升，服一升，日三夜一，溫臥當汗出，若不出者，加麻黃（去節）二兩，煮服如前法，若秋後勿強責汗，一方以黃雌雞一隻，割咽取血，內酒中，煮雞取汁以煎藥。

若曾傷七月胎者，當預服杏仁湯。

◉杏仁湯

杏仁（湯浸，去皮尖，乳，）　甘草（炙，）各二兩。　麥門冬（湯浸，去心，焙，）　吳茱萸（慢火焙，各一升，）　鍾乳（使煉成者，別光研生用）　乾薑（炮裂，）各二兩。　粳米五合。　紫菀一兩（使草，）　五味子三合（去梗，）

右九味㕮咀，以水八升，煮取三升半，分四服，日三夜一。中間進食，七日服一劑。一方用白雞一隻，煮汁煎藥。

娠姙八月，始受土精以成腑革，和心靜息，無使氣極，是謂密腠理而光澤顏色。

娠姙八月，手陽明脈養，不可針灸其經。手陽明內屬於大腸，主九竅，八月之時，兒九竅皆成，無食穢物，無輙失食，無忍大便。

姙娠八月中風寒，有所犯觸，身體盡痛，乍寒乍熱，胎動不安，常苦頭眩痛，純臍下寒，時時小便白如米汁，或膏，或黃，或使寒慄，腰背苦冷而痛，目眩眩。芍藥湯主之。

◉芍藥湯

芍藥（白者，剉，）　生薑（洗淨，去皮，）各四兩。　甘草（炙，剉，）　當歸（去蘆頭，洗，切片子，焙，）　白朮（去蘆，焙，）　人參（去蘆，切片，）各三兩。　薤白一升（切，洗，）　厚朴二兩（去皮，生薑搗碎，剉一宿，焙，）

右八味㕮咀，以水五升，清酒四升，合煮取三升，分三服，日再夜一。一方用烏雌雞煮汁以煎藥。

若曾傷八月胎者，當預服葵子湯。

◉葵子湯

葵子二升（揀，淨，）　生薑六兩（洗淨，擣碎，皮，切片，）　芍藥四兩（剉，）　白朮（去蘆，焙乾，）　柴胡（去蘆，洗焙，）各三兩。　大棗二十枚（擘，）　甘草二兩（炙，剉，）　厚朴二兩（去皮，生薑搗碎，剉一宿，焙，）

右八味㕮咀，以水九升，煮取三升，分三服，日三。十日一劑，一方用烏雌雞一隻，煮水以煎藥。

姙娠九月，始受石精以成皮毛六腑百節，莫不畢備，飲酸食甘，緩帶自持而待之，是謂養毛髮致才力。

姙娠九月，足少陰脈養，不可針灸其經，足少陰內屬於腰，腰主續續，九月之時，兒脈續續皆成，無處濕冷，無著炙衣。

姙娠九月，若卒得下痢，腹滿，驚急，胎上衝心，腰背痛不可轉側，短氣，半夏湯。

◉半夏湯

半夏（湯泡七次，以生薑二兩搗一宿，）　麥門冬（湯浸，去心，焙，）各五兩。　當歸（去蘆頭，洗，切片子，焙，）　吳茱萸（慢火焙，三兩次，焙，）　阿膠（用蛤粉炒，）各三兩。　乾薑一兩（炮裂，）　大棗十二枚（去核，）

右七味㕮咀，以水九升，煮取三升，去滓，內白蜜八合，微火上溫，分四服，痛即止。一方用烏雌雞一隻，煮汁煎藥。

若曾傷九月胎者，當預服豬石湯。

◉豬石湯

豬石一具（剝去筋膜，洗淨，）　白虎四兩（去蘆，切，焙，）　茯苓（去黑皮，）　桑寄生（揀淨，）　乾薑（炮裂，）　乾地黃（洗淨，焙，）

芎藭（洗，焙，）各三兩。　麥門冬一升（湯浸，去心，焙，）　大豆三合（炒，）　附子一枚（中者，炮裂，皮脐，切，）

右十味㕮咀，以水一斗，煮石令熱，去石內諸藥，煎取三升半，分四服，日三夜一。十日更一劑。

姙娠十月，五臟俱備，六腑齊通，納天地氣於丹田，故使關節人神皆備，但俟時而生。

姙娠一月始胚，二月始胎，三月始胞，四月形體成，五月能動，六月筋骨立，七月毛髮生，八月臟腑具，九月穀氣入胃，十月諸神備，日滿即產矣。宜服滑胎藥，入月即服。

養胎臨月服，令滑易產丹參膏。

◉丹參膏

丹參半斤（洗，剉，）　芎藭（洗，焙，）　當歸（洗，去蘆頭，切，焙，）各二兩。　蜀椒五合（炒少時，以繩合定，出汗，若有熱者，以大麻仁五合代，）

右四味㕮咀，以清酒漬，須臾一宿，以成煎猪膏四升，微火煎膏，色赤如血膏成，新布絞去滓，每日取如棗許，內酒中服之，不可過服，至臨月乃可服，膏用常驗。

◉甘草散，令易生，母無疾病，未生一月日預服，過三十日行步動作如故，兒生墮地皆不自覺。

甘草二兩（炙，剉，）　大豆黃卷（微炒，）　乾薑（炮裂，研碎，）　黃芩（尖如鍼者，）　桂心（不見火，剉，）　大麥蘖（炒，一方用糯米，）

吳茱萸（慢火去梗，湯洗三次，焙，）　麻子仁各三兩。

右八味為細末，每服二錢，酒調服，日三服，白湯調亦得。

◉千金圓，主養胎及產難顛倒，胞不出，服一圓，傷毀不下，產餘病汗不出，煩滿不止，氣逆滿，以酒服一圓良。一名保生圓。

甘草（炙，剉，）　貝母（去心，）　秦椒（炒出汗，）　乾薑（炮裂，研碎，）　桂心（去皮，不見火，）　黃芩（尖如鍼者，）　石斛（去根，剉，）

石膏（碎者不煅，軟者火煅，）　粳米　大豆黃卷（炒，）各六銖。　當歸十二銖（洗去蘆頭，切片子，焙，）　麻子三合。

右十二味為末，煉蜜和圓如彈子大，每服一圓，日三服，用漿湯化下，一方用蒲黃一兩。

◉蒸大黃圓，治姙娠養胎，令易產。

大黃三十銖（蒸，剉，）　枳實（剉，麩炒，）　芎藭（剉，）　芎藭（洗，剉，焙，）　白朮（去蘆，切，焙乾，）　杏仁（湯泡，去皮，）各十八銖。

芍藥（白者，剉，）　厚朴（削去皮，生薑搗碎，剉一宿，）　乾薑（炮裂，剉，）各十二銖。　吳茱萸一兩（碾去梗，湯泡洗三兩次，焙，）

右九味為末，煉蜜圓如梧桐子大，空腹酒下二十圓，日三服，未効加圓數。

◉滑胎令易產方。

車前子一升（水淘洗令淨，焙乾，隔紙炒，）　阿膠八兩（蛤粉炒，烊化，去粉用，）　滑石三兩。

右三味為細末，飲湯調服一錢，日再服，如生月可服之藥利九竅，未產不得先服。

衛生家寶產科備要卷第三

免乳大故。方書浩博。自非素習。誰能適從。危殆之間。頗難應用。今採摭諸方論中將護要法。及預備、經効、要用湯藥。名曰產科備要。務從簡易。以救倉卒。

論初妊娠

凡女人妊娠。若素來虛羸。血氣不足。體中有風氣、心下多痰水者。欲有胎。喜病阻。其狀顏色如常。脈理和順。但覺肢體沉重。頭目昏眩。不思飲食。惡聞食氣。多嗽鹹酸。心中憒懵。不知患之所在。以至三四月已後。則大劇。吐逆不能勝舉。如有此證。則宜服療阻病竹茹湯、人參散、地黃圓。

◉竹茹湯。治初有妊。擇食。嘔逆。頭痛顛倒。寒熱。四肢不和。煩悶。

橘皮去白洗、　人參去蘆、切片、　白朮切碎、焙、　麥門冬去心、各一兩。　厚朴去皮、以薑汁浸、炙、　茯苓去皮、各半兩。　甘草一分炙、剉、　淡竹茹先刮下、臨煎旋入、

右爲麤末。每服四錢。水一盞半。入生薑、淡竹茹各一塊。如栗子大。拍破。煎取八分。去滓。微溫服。

◉人參散。治初妊娠。惡食、嘔逆。

人參一兩。去蘆、切片、　枳殼三分。去穰、麩炒微黃、搗碎、　厚朴制去皮、薑汁炙、　甘草炙、各半兩。

右爲麤散。每服四錢。水一盞半。入生薑彈子大一塊。拍破。同煎至七分。去滓。溫服。不拘時候。

◉地黃圓。治初懷妊。酷心、嘔吐。腹痛不能食。或吐清水。

人參去蘆、切片、　乾薑炮、剉、各一兩。

右爲末。用生地黃汁和圓。如桐子大。每服五圓。米飲下。日再服。

又妊娠臟氣皆羸。關節不利。切不宜多睡。食粘硬難化之物。亦不須亂服湯藥。大忌針灸。惟須數行步。定心神。不得悲憂驚恐。負重震動。若覺胎臟不安。腹中微痛。心意煩悶。四體昏倦。宜服安胎順氣阿膠散。近難月。即服順胎保安散、千金圓。

◉阿膠散。治妊娠不問月數深淺。因頓仆胎動不安。腰腹痛。或有所下。或胎弄上刺心。短氣、安胎。

熟乾地黃二兩。洗、細切、酒浸、焙、　艾葉切、炒黃、　當歸洗、切、焙、去蘆須、　甘草炙、剉、　芎藭洗、剉、　阿膠蛤粉炒、以蛤粉拌和、挑內炒泡起、候冷、篩去蛤粉用、　川芎洗、剉、各一兩。　黃芪一兩。若虛羸加此一味、蜜炙、

右爲麤散。每服四錢。水一盞半。煎至八分。去滓。溫服。若胸中冷逆氣加生薑五片。棗五枚。同煎。

◉保安散。治妊娠胎氣不安。心腹疼痛。胎動。安胎極妙。

當歸一兩半。洗、切、焙、去蘆須、　人參一兩。去蘆、切片、　甘草半兩。炙、剉、　阿膠半兩。蛤粉炒泡、研碎、別蛤粉炒泡、研碎、去粉用之、

右爲麤散。每服三大錢。水一盞半。入葱白一莖。拍破。煎八分。去滓。食前溫服。未定再服。

◉神妙千金圓。治產前產後一切風冷血氣等疾。產前胎氣不安。腰腹多疼。四肢疲倦。妊娠臨月預合下。每日空心一服。臨產五臟不痛。易產。產中不生諸疾。兼治產後惡血不盡。及胎衣不下。增寒壯熱。吐逆、煩悶。皮膚虛腫。或血暈狂迷。眼見神鬼。能補勻血氣。

金鈒石斛一分。別擣爲細末、　秦艽去蘆、洗、剉、焙、　川椒去子、微炒、　細辛去葉、剉、　防風去苗、剉、　貝母蒸、焙、　熟乾地黃切、酒浸、焙、　糯米炒微黃、　甘草炙、各一兩。　當歸去蘆須、洗、焙、　大麻仁去殼取仁、　黃芩去黑者、　乾薑炮、剉、　大豆蘖旋以熟豆生芽、長二寸、焙乾用、各三分。　石膏半分。帙者、炙碎、

右精研爲末。以煉蜜成劑。入木臼中杵一千下。分爲七十二圓。擇除破、天德、月德、月合、日合。每服一圓。溫酒化下。產前、產後赤白帶下。溫酒嚼下。產前後或心痛血氣。用薄荷湯嚼下。月信不通。當歸酒下。臨產艱難。或三五日難產。及胎衣不下。子死腹中。橫生倒產。死絕不語。但心胸有熱氣。川藥一圓。荏葉湯研化灌之。下咽立產。產後惡血不盡。臍腹疼痛。嘔吐。壯熱。增寒。煩悶。月候不調。或多或少。肢體倦怠。皮膚浮腫。產血不止。虛勞中風。口噤不語。半身不遂。產前後赤白痢。大小便秘澁。血暈、狂語。頭痛。而色瘦黃。漸成勞瘦。飲食無味。並溫酒化下一圓。產前臨月。每日一圓。至臨產用當歸酒下一兩圓。催生。五臟不痛。子易生。

論欲產并產後

凡欲生產。切不得喧鬧。產婦房門。常須關閉。選一年高性和善產婆。又選穩審恭謹家人一兩人扶持。切不用揮霍。致令產婦驚恐。又忌閑雜外人、喪孝、穢濁之人瞻視。若不謹之。定是難產。產後傷小兒。若腹中痛來。但令扶行。或行不得。且立候行得更行。或痛作陣。眼中如火生。此是兒迴轉。節進琥珀散一服。直至行

不得，即扶上蓐草，務要產婦惜力，或心中熱悶，取白蜜一匙，新汲水調下，或未解，即喫生雞子一枚。

◉琥珀散，臨月縮胎催生，兼治產後諸疾。

川芎一兩（剉、略燥）　當歸一兩半（去蘆須、切、焙）

右爲末，每服三錢，水二盞，酒半盞，煎八分，去滓，不計時候服。

大凡生產自有時候，痛不甚者，名曰弄痛，宜須強行熟忍，宜食軟飯，若食飯不得，即宜食粥，及飲蜜漿，勿令飢渴，恐產婦無力困乏，若經時不產，進通靈散一服，若生畢，煖少許醋、墨與呷，以盡子小便調七寶散一服，心中自然開爽，不住燒磚石，以醋沃之，直至七日，要令產婦鼻中常聞醋氣，宜燒茅香、白芷、皂莢等物，切勿令見穢惡，若產訖，忽覺心中昏悶，或眼花，如在舟車中，即是血暈，急須服牡丹飲子、黑神散。

◉催生通靈散（又一方在下卷產科雜方門）

蛇脫皮一條全者，緊卷，以蚯蚓泥裹，燒黑，近藥處泥些小用不妨。

右爲末，每服一錢，溫酒調下。

◉七寶散，初產後勻血和氣，補虛緊驚悸。

朱砂（研如粉）　桂心（去皮、不見火、剉）　乾薑（炮、去瓤）

羚羊角屑　茯苓（剉）

右件等分，杵研爲末，若產婦平和，三膈以前直至滿月，每日各取一字，以羌活豆淋酒調下，空心服，若覺心胸煩熱，即減薑、桂，冷即加之，腹痛加當歸，心悶加羚羊角，心胸虛氣加桂，不下食或惡心加人參，虛減加茯苓，以意斟酌，日二夜一服，不飲酒者，以盞子小便調卻，煖過服之。

◉牡丹飲子，療產後血暈悶亂，神昏，若口噤，即斡開口灌，必效。

牡丹皮（洗、剉）　大黃（生用、剉碎）　芒硝（別研、後入）　各一兩　冬瓜子半合　桃仁三七個（湯浸、去皮尖）

右爲麄散，每服五大錢，水三盞，煎至一盞半，去滓，入芒硝服之，凡欲產先煎下，以備緩急。

◉單方黑神散，防暈備急。

驗證，肝不計多少，以桑柴火燒，以刀刮取黑煤，更燒更刮，令盡，研爲末，入真麝香少許，如難產了，及覺血衝心暈悶，取一錢末，以熱酒和盞子小便調下。

若產後心空，但時興琥珀散一服，或煎芎藭湯進之，更不用它治，常進溫粥，勿與熱食，如食熱，則滯血，或三五日內，但覺腹中痞痛，兒枕未定，即進定痛散一服，琥珀散依第三項。

◉芎藭湯，治產後虛乏，不思飲食，四肢疲倦，心腹陣痛，補虛治氣。

當歸一兩半（去蘆須、洗、焙乾用）　芎藭（洗、剉）　人參（去蘆、切片）　肉桂（去皮、不見火、剉）　生薑（後入）　甘草（炙）　各一兩　生乾地黃二兩（洗、浸、焙）

右到杵，爲麄散，每服三大錢，水二盞，入棗二枚，煎至一盞，去滓，放溫服，日三服。

◉定痛散，治產後惡血不止，腹內熱痛不可忍，及兒枕未定。

當歸（洗、去蘆須、切、焙）　芎藭（洗）　各二兩　桂心一兩（或體熱，以川芎代之）

右爲末，每服二錢，水酒共一盞，生薑一塊彈子大，擘破，同煎至六分，去滓，溫服之。

若產後四肢安和，亦不用多喫酒藥，緣氣虛禁持未得，卻多昏眩，唯飲盞子小便無妨，勿平身且側臥，夜常須一人看承，令屈起兩膝臥，睡即須頻喚覺，虛羸困乏，即空心進理中圓、七寶散，七日外恐喫粥無味，或虛乏無力，即爛煮羊肉汁、黃雌雞汁作粥，未可喫肉，亦不可喫生冷硬物，便成積滯之患，常以淨黑豆一升，炒令煙出，以酒五升浸淋，入羌活一兩，搗碎同浸，常用此酒下藥，或時飲一盞，大辟風邪，令諸疾不生。

◉四順理中圓，治新產後臟腑虛，不思飲食，補養五臟。

甘草三兩（炙、剉）　人參（去蘆、切片）　白芷（剉、焙）　乾薑（炮、去瓤）　各二兩

右爲末，煉蜜圓梧桐子大，每服十五圓至二十圓，空心溫酒下。

七寶散依前項。

若三日後覺壯熱頭痛，此是乳脈行，即進玉露散二服，或大小便秘澁，或發寒熱、頭痛、四肢如碎，此是辟勞，或產後大渴、胎損、吹妳、咳嗽，別生他疾，及帶起宿患，亦宜檢尋別方治之，月內不宜多語笑，強起離牀行，或作針線運動，恣食生硬，不避風脫衣洗浴，當時雖未覺大損，滿月後或成辟勞，手脚及腰腿酸重冷痛，骨節間蹶蹶如風吹，縱有名醫，卒不能療，大都產婦將息，須是百日，方可平復，大忌犯觸，因此多致身體強直，如角弓反張，名曰辟風，遂至不救，小可虛羸，失於將補，便成大患，終身悔不及矣，戒之戒之。

◉玉露散，治產後乳脈行，煩熱，或大腸澁澀，肢體疼痛，涼膈壓熱，下乳。

茯苓（剉）　人參（去蘆、切片）　甘草（炙）　各半兩　桔梗（去蘆、切、焙）　白芷（洗、剉）

川大黃（湯浸、微煨熟、剉）　當歸（去蘆須、切）　各一分　芎藭三分（洗、剉）　川芎（洗、剉）　各一兩。

右爲末，每服二平錢，水一盞，煎至七分，溫服，日三服，若臟腑泄瀉，即除川大黃。

衛生家寶產科備要卷第四

產育保慶集方。余收產論二十一篇。議論精確。無所不究。蓋國醫博極方書所得之妙。惜乎有其說而無其方。郭君稽中爲時良醫。尤長於治產。故其切脈用藥。歷取奇功。一日顧以所收家方。附於諸論之末。遂編爲一集。其濟衆之異術也。古人謂爲人子而不學醫者爲不孝。則有方論而不傳於世者。其可謂之仁哉。大觀三年九月五日濮陽李師聖述。

二十一論。幷增入十八論。

李師聖編論。郭稽中附方。

第一論曰。熱疾胎死腹中者何。

答曰。因母患熱疾。至六七日以後。臟腑熱極。薰蒸其胎。是以致死。縱兒死身冷。不能自出。但服黑神散煖其胎。須臾胎氣溫煖。卽自出。何以知其胎之已死。但看產婦舌色青者是其驗。黑神散方。

◉黑神散

桂去麤皮、不見火、剉碎、　當歸洗去蘆頭、切、焙、　芍藥洗、剉、　甘草炙、剉、　生乾地黃溫湯洗淨、焙、忌冷水、　乾薑炮、用　炒生薑代之、各一兩。　附子半兩、炮去皮臍、　雄黑豆二兩、小者是、炒焦去皮、

右爲末。每服一錢匕。空心溫酒調下。

◉蒲黃黑神散 此方十八論云、產前產後一切疾、皆治之。

雄黑豆二兩、小者是、炒去皮、秤、　當歸洗去蘆并須、切、焙、　芍藥洗、剉、　甘草炙、剉、　乾薑炮、剉、　肉桂去皮、剉、不見火、　生乾地黃溫湯洗、剉、焙、忌冷水、　蒲黃銀石器內微炒令赤、或以紙濾銚子內、炒紙黃爲度、各一兩、

右爲末。每服二錢。空心溫酒調下。若三十已下及生產少婦人。不用桂、乾薑。入炒生薑、紅花代之。生薑、紅花各用二兩。經洗者。並焙乾。

第二論曰。胎衣不下者何。

答曰。母生子訖。血流入衣中。衣爲血所脹。是故不得下。治之稍緩。脹滿腹中。漸次上衝。心胷疼痛。喘急者難治。但服奪命丹。以速去衣中之血。血散脹消。胎衣自下。而無所患。

◉奪命丹

附子半兩、炮去皮臍、切、　牡丹皮一兩、洗、剉、　乾漆一分、搗碎、炒、煙盡、

右爲末。醋一升。大黃末一兩。同熬成膏。和藥如桐子大。溫酒下五七圓。不以時候。

又十論云。但服蒲黃黑神散。逐去衣中血。卽胎下。或帶斷亦同。

第三論曰。難產者何。

答曰。胎側有成形塊。呼爲兒枕。子欲生時。枕破。與敗血裹其子。故難產。但服勝金散。逐其敗血。卽自生成。若逆生、橫生。並皆主之。

◉勝金散

麝香一錢、先研爲細末、　鹿茸一兩、用醋酒布裹了、燒令通紅、急以乳鉢研爲末、

右爲末。取秤鎚燒紅。以酒淬之。調下藥一錢匕。

又十八論云。但服蒲黃黑神散。解其敗血。卽自生也。或橫生、逆生。胎衣不下。此藥悉治。

第四論曰。產後血運者何。

答曰。產後氣血羸虛。未得安靜。血隨氣上。迷亂心神。故眼前生花。極甚者令人悶絕不知人。口噤、神昏、氣冷。醫者不識。呼爲暗風。若作此治之。病必難愈。但服清魂散自瘥。

◉清魂散

澤蘭葉洗、　人參去蘆、各一分。　荊芥穗一兩、焙、　芎藭一兩、洗、剉、　甘草二錢、炙、剉、

右爲細末。每服一錢匕。熱湯溫酒各小半盞調勻。急灌之。下咽喉。卽開眼、氣定。省人事。

又十八論云。但服蒲黃黑神散自瘥。

第五論曰。產後口乾煩悶者何。

答曰。產後宮胃大虛。血氣未定。食麵太早。胃不能消化。麵毒結聚於胃脘。上蒸胷中。是以口乾、煩渴、心下煩悶。醫者不識。認爲胷膈壅滯。以藥下之。萬不得一。但服見眼圓自瘥。

◉見眼圓

薑黃（片子者、剉）　荊三稜（煨、乘熱趁碎、焙乾用）　蓬莪蒁（煨、乘熱趁剉、焙乾用）　華澄茄（不得用火炒）　陳皮（去白）　高良薑（剉碎、炒）　人參（去蘆、切片）

右七味，等分爲末，用細切蘿蔔，慢火煮令爛，研細，將汁煮糊，圓梧桐子大，每服三十圓，蘿蔔湯下，不以時候。

又十八論云，但服蒲黃黑神散自安。

第六論曰，產後乍寒乍熱者何。

答曰，陰陽不和，敗血不散，皆令乍寒乍熱，產後血氣虛損，陰陽不和，陰勝則乍寒，陽勝則乍熱，陰陽相乘，則或寒或熱，若因產勞傷臟腑，血弱不得實起，故令血敗不散，入於肺則熱，入於脾則寒，醫人若誤作瘧疾治之，則繆矣，陰陽不和，宜增損四物湯，敗血不散，宜奪命丹。

又問二者何以別之。

答曰，時有刺痛者，敗血也，但寒熱無它證者，陰陽不和也。

◉增損四物湯

當歸（洗去土并蘆須、切、焙）　芍藥（洗、剉）　人參（去蘆、切片）　川芎（洗、剉）　各一兩　甘草四錢（炙）　乾薑一兩（實用生薑代之）

右爲末，每服二錢匕，水一盞，生薑五片，同煎六分，去滓，微熱服，不以時候。

奪命丹，見第二論。

又十八論云，但服蒲黃黑神散自瘥。

第七論曰，產後四肢虛腫者何。

答曰，產後敗血乘虛停積於五臟，循經流入於四肢，留淫日深，卻還不得，腐壞如水，故令四肢面目浮腫，醫人不識，便作水氣治之，血氣與水氣不同，凡治水氣，多用導水藥，極虛之，夫產後既虛，又以藥虛之，是謂重虛，往往因致夭枉，但服調經散，血行，腫消即愈。

◉調經散

澄茄（另研）　琥珀（研）　各一錢　桂（去麤皮、不見火、剉）　芍藥（赤者、洗、剉）　當歸（去蘆須、切）　各一錢　細辛（去葉、剉）　麝香（研）　各半錢

右爲末，每服半錢匕，生薑汁、溫酒各少許，調勻服之。

又十八論云，但服蒲黃黑神散後服轉藥，瀉下惡物自瘥，轉藥是黑神圖，在第十二論後。

第八論曰，產後乍見鬼神者何。

答曰，心主身之血脈，因產傷耗血脈，心氣則虛，敗血停積，上干於心，心不受觸，遂致心中煩躁，臥起不安，乍見鬼神，言語顛倒，醫工不識，呼爲風邪，如此治之，必不得愈，但服調經散，每服加生龍腦一錢，得睡即安，方見第七論。

又十八論云，但服蒲黃黑神散自安。

第九論曰，產後月內不語者何。

答曰，人心有七孔三毛，產後血虛氣弱，多致停積，敗血閉於心竅，神志不能明了，又心氣通於舌，心氣閉塞，則舌亦強矣，故令不語，如此但服七珍散即瘥。

◉七珍散

人參（去蘆、切片）　石菖蒲（節密者、剉）　川芎（洗、剉、焙）　熟乾地黃　各一兩　細辛一錢（去葉）　防風（去苗、剉）　朱砂（研）　各半兩

右爲末，每服一錢，薄荷湯調下，不以時候。

又十八論云，但服蒲黃黑神散便安。

第十論曰，產後腹痛，又瀉痢者何。

答曰，產後腸胃虛怯，寒邪易侵，若未滿月，飲冷、當風，則寒邪乘虛進襲，留於胞膜，散於腹脇，故腹痛作陣，或如錐刀所刺，流入大腸，水穀不化，洞泄腸鳴，或下赤白，腹脇脹，或走痛不定，急服調中湯立愈，若醫者以爲積滯，取之，則禍不旋踵，謹之謹之。

◉調中湯

高良薑（剉、炒、油）　當歸（洗去蘆須、切、焙）　桂（去皮、不見火、剉）　白芍藥（洗、剉）　附子（炮去皮臍）　川芎（洗）　各一兩　甘草半兩（炙、剉）

右爲麄末，每服三錢，用水三盞，煎至一盞，去滓熱服。

又十八論云，急服蒲黃黑神散，後服調中湯。

第十一論曰，產後遍身疼痛者何。

答曰，產後百節開張，血脈流走，過氣弱則經絡分肉之間，血多留滯，累日不散，則骨節不利，筋脈引急，故腰背不得轉側，手脚不能動搖，身熱頭痛，若醫以爲傷寒治之，則汗出而筋脈動踢，手足厥冷，變生他病，但服趁痛散，以除之。

◉趁痛散

牛膝（切、酒浸一宿、控乾、慢火炒、焙乾、去蘆、剉、川巴戟、巾者尤佳）　當歸（去蘆須、先切、焙）　白朮（剉碎、焙乾）　黃耆（蜜炙、剉）　桂（去皮、不見火、剉）　獨活　生薑（切）　各半兩　雞白（洗、切）　甘草（炙、剉）　各一分

右爲麄末，每服半兩，水五盞，煎至兩盞，去滓熱服一盞，次一盞，續後再煖服，不拘時候。

又十八論云，但服蒲黃黑神散即愈。

第十二論曰，產後大便祕澁者何。

答曰，產後水血俱下，腸胃虛竭，津液不足，是以大便祕澁不通也，若過五六日，腹中悶脹者，此有燥糞在腸胃，以其乾澁，未能出耳，宜服麻仁圓以津潤之，若誤以爲有熱而投之以寒藥，則陽消陰長，變動百出。

性命危矣。

◉麻仁圓

麻仁研碎、　枳殼去穰、麩炒微黃、　人參去蘆、切片、　大黃煨、剉、各半兩。

右爲末、煉蜜圓桐子大、空心溫湯下二十圓、未通加圓數。

又十八論云、產後小便出血、大便澁痛者何。

答曰、敗血流入大小腸、大小腸澁滯、致小便澁塞、大便艱難、人多不識、作五淋治之、不愈、但服蒲黃黑神散、後服黑神圓、取下惡物卽安。

◉黑神圓

巴豆去皮、以水二椀、煮乾爲度、去心膜、細研、去油、　黑附子炮去皮臍、切片、　肉桂去皮、不見火、剉、　白乾薑炮、剉、各半兩。

右爲末、麵糊圓如羅蔔子大、每服三圓至五圓、熱茶下、卄以熱茶投之、卽行、前第七論中云轉藥者、卽是此方、切不可服尋常取積藥。

第十三論曰、產後血崩者何。

答曰、產後傷耗經脈、未得平復、而勞役損動、致血暴崩下、淋漓不止、或因鹹酸不節、傷蠱榮衞、氣衰血弱、亦變崩中、若小腹滿痛、肝經已壞、爲難治、急服固經圓以止。

◉固經圓

艾葉煉淨、剉碎、炒黃、　赤石脂　補骨脂略炒香、　木賊去根節、各半兩、　附子一枚、炮、去皮臍、切片、

右爲末、陳米飲和圓桐子大、食前溫酒下二十圓、米飲亦得、如陳米飲難圓、卽入雲糕少許搜和、卽易圓也。

又十八論云、但服蒲黃黑神散及黑神圓立瘥。

第十四論曰、產後腹脹悶滿、嘔吐不定者何。

答曰、敗血散於脾胃、脾受之、不能運化精微、而成腹脹、胃受之、則不得受納水穀、而生吐逆、醫者不識、若以尋常治脹止吐藥療之、病與藥不相干、轉更傷動正氣、疾愈難治、但服巨勝湯必瘥。

◉巨勝湯

赤芍藥洗、剉、　半夏湯洗七次、切碎、　澤蘭葉洗、曬、　人參去蘆、切片、　陳皮去白、　甘草炙、剉、各一錢、

生薑半兩、

右爲麄末、用水一椀、同煎至兩盞、去滓、微熱、分三服。

又十八論云、急服蒲黃黑神散、次服黑神圓、吐出惡物卽安。

第十五論曰、產後口鼻黑氣起及鼻衄者何。

答曰、陽明者、經脈之海、起於鼻、交頞中、還出俠口、交人中左之右、右之左、產後氣消、血散、榮衞不理、散亂入於諸經、卻還不得、故令口鼻黑起、及變鼻衄、此緣產後虛熱、變生此疾、其疾不可治、名曰胃絕肺敗、遇

有此疾、急取絳線一條、拴產婦頂心髮兩條、緊兩中指上節卽止、無藥可療、亦厭禳之一端也。

又十八論曰、產後口鼻黑氣起者何。

答曰、產後敗血入臟腑、既滿衝於頭目、卻還不得、口乾、舌焦、鼻衄、黑氣、是產後熱變作此候、不可治也、名曰敗肺。

第十六論曰、產後喉中氣急喘者何。

答曰、榮者血也、衞者氣也、榮行脈中、衞行脈外、相隨上下、謂之榮衞、因產所下過多、榮血暴竭、衞氣無所主、獨聚於肺中、故令喘也、此名孤陽絕陰、爲難治、若惡露不快、敗血停凝、上薰於肺、亦令喘急、如此但服奪命丹、血去喘息自止、奪命丹方見第二論。

又十八論曰、產後喉中氣急喘者何。

答曰、產後敗血過於心、轉於喉中、此不可治也。

第十七論曰、產後中風者何。

答曰、產後五七日內、強力下牀、或一月之內、百日之中、傷於房室、或憂怒、搖蕩冲和、或因灼艾、傷動臟腑、得病之初、眼澁口噤、肌肉瞤搐、以漸腰脊筋急強直者、不可治、此乃人作、非偶爾中風所得也。

第十八論曰、產後心痛者何。

答曰、心者血之主、人有伏宿寒、因產大虛、寒搏於血、血凝不得消散、其氣逆上衝擊於心之絡脈、故心痛、但以大嚴蜜湯治之、寒去則血脈溫而經絡通、心痛自止、若誤以爲有所傷、療之、則虛極寒益甚矣、心絡寒甚、傳心之正經、則變爲眞心痛、眞心痛者、朝發夕死、夕發朝死、藥不可輕用如此。

◉大嚴蜜湯方

熟乾地黃洗、酒浸一宿、焙、剉用、　當歸洗、去蘆、切、焙、　吳茱萸煨、去核、　獨活洗、留中者尤佳、　芍藥洗、剉、

乾薑炮、剉、　甘草炙、剉、　桂去皮、不見火、剉、　小草遠志葉、各一兩、　細辛半兩、去葉、勿用馬蹄香、

右爲麄末、每服半兩、用水三大盞、煎一盞、去滓、再入蜜一匙、又同煎三兩沸、微熱服、食前。

第十九論曰、產後熱悶、氣上轉爲脚氣者何。

答曰、產後血虛生熱、復因春夏取涼過多、地之蒸濕、因足履之、所以着而爲脚氣之疾、其狀熱悶壅擁、驚悸、心煩、嘔吐、氣上、皆其候也、服小續命湯兩三劑、必愈、若醫者誤以逐敗血藥攻之、則血去而疾益坩劇。

◉小續命湯

人參去蘆、切片、　黃芪炙、知雞者、　桂去麄皮、不見火、　麻黃去節、　防己剉碎、

甘草炙、　白朮剉、各一兩、　附子一箇、去皮臍、　防風一兩半、去叢、　川芎洗、剉、　芍藥洗、

右爲麄散、每服半兩、用水三大盞、煎至一盞、去滓、溫服。　生薑五兩、洗去皮、切、

第二十論、產後汗出多而變痙風者何。

答曰、產後血虛、肉理不密、故多汗、因遇風邪搏之、則變痙風也、痙者、口噤不開、背強而直、如發癇狀、搖頭

馬鳴、身反折、須臾復發、氣息如絕、宜速斡口、灌小續命湯、稍緩卽汗出如雨、手拭不及者不可治、此方不特治產婦、凡男女倩中此疾、急以此藥灌之、無不愈也、或服它藥則不及矣、

第二十一論曰、產後所下過多、虛極生風者何、

答曰、婦人以榮血爲主、因產血下太多、氣無所主、唇青肉冷、汗出目瞑神昏、命在須臾、此但虛極生風也、如此急服濟危上丹神良、若以風藥治之則謬矣、

◉濟危上丹

乳香（以竹瀝磨、又以竹瀝煮上、製斗時髮湯、卽研成末、）　五苓脂（不夾石者、研、）　硫黃（研如粉、）　太陰玄精石（研）　陳皮（去穰、剉碎、）

桑寄生（剉、）　阿膠（剉碎、同蛤粉炒炮起、篩去蛤粉用、）　卷柏（生用、）　各一兩、

右將上四味同研勻、石器內微用火炒動、勿令焦、炒了再研極細、後入餘藥末、用地黃汁打糊、圓桐子大、產後溫酒下二十圓、當歸酒亦得、

又十八論曰、產後血氣逼肺、上氣咳嗽多縱睡者何、

答曰、產後滿月、血脈未通、好食熱麵、壅結成痰、或有氣塊、發時衝心、心痛氣急咳嗽、四肢寒熱、心悶、口乾、背膊痠疼、睡夢驚狂、體虛無力、時有汗出、心痛、月候不來、名曰敗癥、腹痛遶臍、面色微赤、因此不瘥、縱然得較、三兩日又發、急服黑神散立愈、

論臨月將息

凡產婦合要備急湯藥、並須預先修合題號、恐臨時倉卒難致、臨月忌勿多飲酒、卽依產圖方位、擇深靜房室、八月一日卽用借地法、於房內北壁、薰令香潔、

論新生小兒

凡新生小兒、急以綿裹指頭、拭兒口中惡物、不爾流入腹中、後生諸疾、斷臍可長三寸、臍中若有血、急壓去、恐入腹內、綳了取生甘草寸餘、搗碎、水一合、煎濃汁、以綿包子、點兒口中、當吐出惡汁、盡半合無妨、又取細研朱砂末一字許、以熟蜜調、塗兒口中、令嘔之、去惡邪、三日湯煎虎頭骨少許、豬膽汁少許、和湯浴兒、少撫摩、令無惡疾、每日頻就無風明處、看兒上脣、若有一點白泡如竹膜起處、速以指甲刮破、更生更去之、除灸臍帶外、則勿加火艾、恐成瘡癤、若有冷熱夜啼、臍瘡不乾、變蒸諸疾、自別有方治之、今錄藍江劉寶助教授効小兒名方四道、

◉注唇膏、治初生孩兒衆疾、療胎風病、

朱砂（研細、）　坯子臙脂各一錢、　白殭蠶七箇、（炒去絲、）　牛黃半錢、（研、）　蝎梢半箇、

右白殭蠶、蝎梢、用薄荷汁一合、重湯煮、汁盡爲度、焙乾爲細末、研入坯子朱砂等、生蜜和爲膏、逐日頻與孩兒注唇、令自吮嚥取効、

◉豆蔻散、治小兒夏月滑瀉、冷痢不已、腹痛、瘦瘁、食下卽嘔、

肉豆蔻一箇、用餬餅麵一塊、如杏大、裹豆蔻、灰火中煨、不住攪轉、候色赤透熟、取出、剉、焙乾、

右爲細末、每服半大錢、七八歲至十歲者一錢、用溫米飲調下、日三服、一兩日間愈、

◉蝎梢散、治小兒胎風、及百晬後兒臍風撮口、無能救療者、先用生腦子一字、塡入臍心、上用艾炷灸一七壯、如不覺、灸二七壯、再添腦子大妙、候定、服蝎梢散、

蝎梢四十九箇、用薄荷葉逐箇捲、以絲扎定、於砂銚中滾轉、炒令薄荷乾、蘇爲度、

白殭蠶四十九箇、生薑汁浸、炒乾、去觜、

右二味爲末、入生腦子抄半錢、麝香少許、研勻、用紫色雄雞肝煎湯調下、末半錢許、併三兩服愈、

◉治小兒諸般鵝口疾、

烏雞卵一箇、　輕粉少許、

右將雞卵於尖小一頭打小穴子、入輕粉在內、用杖子攪轉令勻、坐雞卵於飯上蒸熟、乾、將與患者小兒喫、只一枚取効、

累用經効方　盛興府學諭張世臣方、

◉大聖澤蘭散、治婦人血海虛冷、久無子息、及產後敗血衝心、中風口噤、子死腹中、難開口灌藥、須臾生下、便得無恙、并治胎墮、腹中攻刺疼痛、橫生逆產、胎衣不下、血運、血癖、血漬、血崩、血入四肢、應血臟有患及諸種風氣、或傷寒吐噦、咳嗽、寒熱往來、遍身生瘡、頭痛、惡心、經脈不調、赤白帶下、乳生惡氣、胎臟虛冷、數曾墮胎、崩中不止、因此成疾、及室女經脈不通、並宜服之、常服駿子宮、和血氣、悅顏色、退風冷、消除萬病、兼療五勞、七傷、虛損等病、

澤蘭葉（去根、曬乾、）　石斛（研、）　各二兩、　生乾地黃一兩半（剉、用溫湯浴過、焙乾、）　桂肉一兩一分（剉、不見火、用、）

吳茱萸（湯洗七次、炒、）　厚朴（去麤皮、剉碎、用薑製一宿、炒乾、）　白茯苓（去皮、剉焙、）　細辛（去苗并葉、焙、）

柏子仁（揀去殼、別研細、）　防風（去苗、剉、）　桔梗（剉去蘆、焙、）　白蘞（去蘆、）　白芷（去梢、焙、）

丹參（洗、剉、）　乾薑（炮烈、剉、焙、）　五味子（去枝梗、剉、）　澤瀉（去蘆頭、）　人參（去蘆頭、切、）

川椒（去目及閉口者、微炒出汗、）　黃耆（剉、去蘆頭、）　各三分、　阿膠（剉碎、蛤粉炒炮起、去粉用、）　白薇（剉、焙、）

當歸（去蘆須、洗、切片子、焙乾、）　白芍藥（剉、）　甘草（炙、剉、）　川芎　各一兩三分、　川蔓頭（炮去皮臍、）　各半兩、

右爲細末、每服二錢、空心臨臥熱酒調下、若急疾有患、不拘時候、

◉奪命褐散子、姙娠四五月已上、忽然仆地、手足抽搐、喉中涎聲、褒褒、口眼不開、如小兒痰搐之狀、名曰胎癇、

甜葶藶（紙上盦炒、）　芫花（醋煮乾、焙燥、）　各半兩、　郁李仁（湯浸去皮、）　地榆（剉、）　各一分、

右爲細末、每服一字、煎沉香人參鈎藤鈎子防風湯調下、如牙噤者、用物斡開灌下、調藥汁不過一匙、不拘時候、沉香但磨藥汁尤妙、如醒時只用防風煎湯調四君子湯、服蘇合香圓及大聖澤蘭散半月餘、其病脫然、恐日昏不能視物、不必疑慮、氣血凝靜、自然光明、謹勿服服藥、有三四婦人皆患此證、寸口脈伏、自關而下脈弦、蓋伏者氣不上升、弦者有飲在內、此必因胎肥流飲不化、注入胎宮、與血相搏、

子不安靜，故氣不上升，乃胎觸心絡，遂有胎漏之證，先是醫者用安胎養血之藥未効，遂以此藥，緣此證雖是產前之疾，卻當作產後治療，迺是血不循經，氣不升降，氣閉血壅，其狀如崩，當導氣而逐其飲，氣通飲消，則血循經入養胎，安氣則子安靜矣，累用經驗。

◉地榆降血飲子，治妊娠入月臨草之時，血出三日而子未下，手足不收，昏昏如醉，不省人事，此迺漏血過多，血不養胎，心氣逆上，胎氣留連，此名胎乾，此藥治之，神効甚速。

蘇子降氣湯一貼（乃調味者是）只作一服，加地榆一錢半，洗淨麥門冬十粒，去心，水一盞半，生薑二片，煎七分，去滓，入乳香少許，透明者，銘開，溫服，不能自飲者，扶起灌之。

◉大安胎飲子，治妊娠胎氣不安，腹脇刺痛，經脈適來，氣急上喘等疾。

當歸（洗去蘆頭，切片，焙乾）　乾地黃（剉，洗，溫乾，再焙用）　川芎（洗，剉）　阿膠（剉碎，蛤粉炒泡起，去粉用）　熟艾各半兩　黃芩一兩（剉）　赤芍藥（剉）　地榆（剉）各一兩

右為麄末，分作十五服，每服水二盞，煎至六分，去滓，通口服，不拘時候。

◉吳白朮散，安胎養氣，常服，十月中胎氣安定，無諸疾苦。

白朮（去蘆，切片子，焙）　人參（去蘆，切片子，焙）　白茯苓（去黑皮，剉，焙）　甘草（炙，剉）　阿膠（剉碎，蛤粉炒泡起，去粉用）已上各等分。

右為㕮咀，每服三大錢，水一盞半，煎至七分，去滓，溫服，不拘時候。

一滑胎，榆白皮為細末，每服一錢，空心白湯調下，自入月每日三服，令易產，兒生下，藥皆塗身上。

一催生，并死胎不下，草麻子三箇，巴豆四箇，研細，入麝香少許，貼臍心上，須臾間便下。

一難產三兩日不生，以蠶繭紙半張，燒灰，熟水調下。（銘已出蠶繭紙，亦名馬明紙。）

一治橫生、逆生、炙產婦右脚小指尖頭，如麥大三壯，立產。

又方，蛇退皮燒灰，酒調二錢，面東服。

又方，麝塗兒足底，急去之。

又方，車前子末，酒服二錢。

一妊娠煩悶，胎熱，睡臥不得，并腹中痛，又難產，知母新白者，焙乾為末，煉蜜圓如小彈子大，每服一圓，溫酒化下。

一妊娠偶因所觸，或墜高傷折，致胎動不安，腹中痛不可忍者，縮砂不以多少，和皮炒令熟透，去皮為細末，每服二錢，熱酒調下，胎即安，神効。

一胎動，日夜叫呼，口噤，唇青，及下痢不止者，熟艾一兩，酒五盞，煮四盞，去滓，再煎至二盞，服，口閉者灌之，亦治腰痛下血。

一胎動，及下血，心腹脹者，當歸二兩、川芎一兩為麄末，水四盞，酒五盞，煎至五盞，分三服，若胎未死，即安，已死，即便下。

一產後血暈，五靈脂炒令煙盡為細末，溫酒調下一錢，童子小便尤佳。

又方，乾荷葉為細末，每服一錢，溫酒調下。

又方，生半夏為末一大豆許，吹鼻中。

又方，紅花或蘇枋木，酒水濃煮汁飲。

一產後中風，眼上視，四肢搐搦，荊芥穗為末，每服二錢，溫酒調下，如不飲酒，只濃煎湯服。

一產後發狂，每用大香附子去鬚皮毛，為細末，每用二錢，入研極細好辰砂末一錢，以燒通紅秤槌，浸好酒調服。

一產前傷寒，不問陰陽，身熱頭疼，白朮二錢、黃芩一錢，麄末，水一盞，煎六分，去滓，熱服，不計時候。

衛生家寶產科備要卷第五

產科雜方

◉催生如聖散，此一方廬江劉寶助教經効名方。

黃蜀葵花不拘多少。

右一味，焙乾為細末，每服二錢，熟湯放溫調下，神妙，或有漏血，胎臟乾澁難產，痛劇者，併進三服，良久腹中氣寬，胎滑，即時產下，如無花，只用黃蜀葵子爛研小半合，以酒調，濾去滓，溫飲尤佳。

◉救生散，安胎益氣，易產。

人參（去蘆，切片）　訶子（紙裹，煨熟，去核）　白朮（剉，炒黃）　陳橘皮（去白，炒）　大麥蘖（炒黃）　神麯（糊切，炒黃色）各半兩。

右為細末，每服二錢，水一盞，煎六分，溫服，入月加一倍，用水二盞，煎一盞，溫溫空心服之，能令兒緊小，乳母無患。

◉罩胎散，治婦人妊娠傷寒，遍身大熱，悶亂，躁渴，痰甚，則蒸損胎臟，廬江劉寶助教名方。

捲荷葉一兩（嫩者，焙乾，秤）　蚌粉花半兩（好細白者，秤）

右為細末，入粉研勻，每服二錢，以新汲水用蜜調下，日進兩服。

◉二聖散，產前安胎，產後治惡血不盡及胎衣不下。

羌活（洗去苗蜜炒）　川芎（洗、蜜炒）

右等分爲細末。每服二大錢。酒少許。水七分。煎七沸。溫服。

◉羌活散。治妊娠患時疾。

羌活（去苗蜜研）　荊芥穗（不見火）　赤茯苓（去皮蜜研）　川芎（洗、蜜炒）　宣州乾葛（蜜炙）　陳皮（去穰蜜炒）　甘草（炙、蜜炒）　川升麻（蜜炒）　各一兩

右爲細末。每服三錢。水一盞半。入生薑五片。薄荷十葉。同煎至一盞。稍熱服。不以時候。

◉黃金散。治妊娠患時疾。

黃芩（尖如鏡者）　鬱金（蜜炒）　各一兩

右爲末。每服一錢。板藍根、地黃水調下。汗出効。未得汗再服。卽瘥。又用鷄卵墜井至泥。隔宿取出呑之。必無虞矣。

◉蓋粉散。續產服此藥。蕩盡兒枕。除百病源。

當歸（洗、去蘆鬚、焙）　官桂（去皮、不見火）　人參（去蘆切片）　茯苓（白者、去黑皮）　甘草（炙）　芍藥（洗淨）　知母（去毛者、炒）　川芎（洗）　大黃（略炒）　黃耆（蜜炙）　木香（不見火）　草豆蔻（去殼）　白朮（蜜炒、焙）　阿子（煨熟去核）　高良薑（蜜炒）　青橘皮（去穰）　熟乾地黃（洗、酒浸、焙）

右除地黃外。各等分。剉。焙乾。次用附子一箇。結實半兩者。炮裂。去皮臍。切生薑一斤。研取自然汁。於椀器中停留一食久。傾去清汁。取下面粉脚。攤在蒻葉中。入焙籠焙乾。同衆藥擣羅爲末。續產後用藥末三錢。水一盞。薑三片。棗子一箇。擘開。同煎至七分。乘熱服。如喫藥之後。自然產母睡着。半日以來睡覺。再服全除。卻腹痛。一日只可三服。至九服。不可多服。恐肚中冷也。

◉香蓮散。治產後咳嗽。

石蓮十箇（炒熟）　丁香十箇。

右爲末。用水三合。煎十沸。溫服。

◉地黃散。治產後血痛如刀刺。

熟乾地黃（洗、酒浸、焙）　橘皮（去白蜜、焙）

右件等分爲末。每服一錢。粥飲調下。尋常痛發可常服。

◉香脂散。治產後吐噦不止。

狗膽一箇　硇砂　丁香　五靈脂各少許。

右爲末。以狗膽圓如白豆大。每服一圓。生薑水磨下。

●血竭散。治產後百疾。廬江劉寶助教名方。

血竭（研）　沒藥（研）

右等分。輕手研細。頻羅再研。取盡爲度。每服二錢。用小便合和細。酒半大盞。煎一二沸。溫調下。續產下

一服。上牀良久再服。其惡血自循下行。更不衝上。免生百疾。

產後發熱。名曰褥勞。用猪腰子作粥。治之。猪腰子一隻。去白膜。薄切作柳葉片子。少鹽、酒拌之。先用粳米一合。入葱、椒煮粥。鹽醋調和。將腰子鋪椀底。用熱粥蓋之。如作盦生粥狀。喫之。每日空心做喫。極妙。

十八論中。治產前後患蒲黃黑神散功効。

第一。產因熱疾。胎死腹中。胎死身卽冷。口角沫出。爪甲青黑色。四肢逆冷。但服此藥。發其死胎。須臾自出。

第二。難產或橫生。逆生。胎衣不下。此藥並治。

第三。產後衣不下。但服此藥。逐出衣中血。遂自出。如衣帶斷亦同。

第四。血暈。醫人不識。呼爲暗風。但服此藥立瘥。

第五。口乾、心悶。醫人呼爲胸膈不利。此名血結。但服此藥立瘥。

第六。乍寒乍熱。醫人不識。呼爲瘧疾。但服此藥立瘥。

第七。產後四肢虛腫。醫人不識。呼爲水氣。蓋血氣隔。四肢寒。但先服此藥立瘥。後服轉藥。瀉了惡物。轉藥謂之黑神圓。

第八。產後乍見神鬼。醫人不識。呼爲風邪。但服此藥卽瘥。

第九。產後月內不語。但服此藥卽瘥。

第十。產後腹痛。兼瀉痢。急服此藥。後服調中湯。（調中湯。是止瀉石灰散。出產乳經中。）

第十一。產後遍身疼痛。但服此藥瘥。

第十二。產後小便出血。大便祕澁。人多作五淋治。不愈。但服此藥瘥。

第十三。產後血崩。謂惡露未盡。久不治之。及食鹹酸所致。若腹似痛時稍難治。肝家熱。背筋急。急服此藥。後服黑神圓瘥。

第十四。產後血氣不通。上氣喘嗽。多唾。謂滿月後月脉未通。食熱麵塑結成疾。或有氣塊。發時衝心。心痛。氣急。咳嗽。四肢無力。乍汗出。心痛。月候不來。名曰敗瘀。腹痛遶臍。面赤。宜服此藥卽瘥。

第十五。產後心腹脹滿。嘔逆不定。醫呼爲癲冒。不愈。急服此藥。吐出胃中惡物卽瘥。

第十六。產後口鼻黑色。氣起。及鼻衄。不治。

第十七。產後喉中氣急喘。不治。

第十八。產後中風。爲無故下牀。百日之內。傷房室。或因著炙。有驚風。脚中風之時。眼澁。腰背筋急。角弓反張。牙關閉。定不可治也。

蒲黃黑神散方。已見第一論末。

黑神圓方。已見第十二論末。

產前後十八論烏金散

婦人萬病。皆因血氣而生。就中產後乖違。誠難救療。百日之內。變證尤多。或坐卽運絕。臥卽口乾。經日多

胃逆應心悶或傷熱食變作崩中飲冷服涼便成腰痛敗血入腹則脅脹虛鳴惡露上衝乃或嘔噦脾之受血發則傷寒肝氣有邪即多嗔怒肺之被擾氣悶喘鳴胃臟未安多爲腹脹敗血流走百節酸疼留滯四肢皮膚俱腫失音不語還因敗血入心散爲淋漓亦是血之入腹大抵虛弱積血所爲三焦不調衆疾皆起世尋方卷多不會解就中產前產後之間難全眞訣當貧困之家或居村中念其急難方當思慮魂勞神悶不知所裁忽見一人形貌非常乃言曰余有秘術子其知乎不覺惕然瞻敬之際復曰子請存於誠信心欲救人事當甚喜吾有產後一術名曰烏金方受於子宜保惜之余即跪受要旨頓覺精神爽易事理照覺在寤中神授乃依方修合普諸神願遂成產後十八方如後

第一論問胎死腹中者何

答曰緣母患染熱疾經六七日間臟腑梅熱蒸薰其胎是以子死何以知之身死便冷不居子宮乃墜臍下冷痛口角沫出腹冷爪甲青四肢逆冷命在須臾但以此三服令胎熱須臾自下

第二論問產難者何

答曰兒已成形每食母之血候十月當足月血有餘乃結成塊俗呼爲兒枕子欲生時兒枕先破爲敗血散裹子身上固當難產但服此散三服敗血即散須臾自產或逆產其體不同悉皆治之

第三論問胎衣不下者何

答曰產訖敗血流入胞衣中被血服固當難下但服此散衣中血散須臾自出若胞衣帶斷亦宜服此散即下

第四論問血盆產後三日起止不得眼前自見鬼神或悶絕不識人者何

答曰產後三日血氣未安逐走五臟奔於肺上時人不識呼爲暗風以此治之萬無一瘥但服此藥立可安瘥

第五論問口乾心悶及煩渴者何

答曰產後七日以來血氣未定蓋爲食於熱麵與血結在心即渴時人呼爲胸膈壅悶若以此治萬無一瘥但服此散立瘥

第六論問產後乍寒乍熱及渴者何

答曰產後虛風敗血入於肺則熱入於脾則寒乃渴時人不識呼爲瘧疾若以此治萬無一瘥服此散立瘥

第七論問產後四肢浮腫及寒熱者何

答曰敗血流入五臟將滿即四肢停留日久卻還不得乃欲爲腫時人不識呼爲水腫且如水腫與血腫不同何以明之水氣喘而小便澁血氣渴而四肢寒先服此散次服宣元瀉下惡物自瘥宣元是黑神圓

第八論問言語頗狂無度若見鬼神或寒熱及渴者何

答曰產後敗血衝心心不受邪觸被敗血蒸薰心悶蒸熱煩渴至躁言語頗狂時人不識以爲風及神邪所致若以此治之萬無一瘥但服此散愈

第九論問產後不語者何

答曰夫人心有七孔三毛產後敗血上行流入心孔之中被血閉之即使不語時人不先去心孔敗血其病不除但服此藥當漸語也

第十論問產後腹痛及痢者何

答曰產後未滿月間誤飲冷水水與血相和流入大腸大腸受之血遂成病水穀不化或泄或脹膿血不定急服此散次服調中湯立効

第十一論問產後遍身疼痛者何

答曰產後百節開張敗血流入四肢留滯日久不散結聚虛脹是致疼痛但服此散遂去百節間敗血須臾自定

第十二論問產後痰血及小便赤澁大腸痛者何

答曰敗血流入小腸閉卻水道即小便艱澁流入大腸閉卻肛門是致大小便俱難醫人不識呼爲五淋治之萬無一瘥但服此散次服黑神圓即安

第十三論問產後崩中者何

答曰敗血惡露未止日久或食鹹酸之物遂變崩中血結變黑狀似雞肝或時寒熱背膊拘急煩悶名曰崩中宜先服此散次服黑神圓即安

第十四論問產後血氣不調遍路閉塞兼咳嗽多驚者何

答曰產後滿月後月經未還不能謹忌好食熱麵遂即成疾積聚結塊發即氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾背膊拘急煩躁夜夢驚悸體全無力多汗心疼月經不來名爲血癥腹痛多睡面色多赤因茲不療遂成骨蒸治須子細看此疾狀或服別藥十無一應終不得瘥只服此藥其患自退

第十五論問腹肚脹滿吐噦者何

答曰產後敗血停於脾胃之間氣逐相衝不定即留滯嘔噦胸脇俱脹時人不識呼爲蠱胃以此治之萬無一存急服此藥吐出胃中惡物即便喫粥

第十六論曰產後口鼻黑色及鼻衄者何

答曰敗血傳入臟腑臟腑既滿衝於頭面卻還不得焦乾白黑見於面色衝於鼻即鼻衄黑起緣產後虛熱甚變成此狀若別治之萬不得一此名心肺敗血宜服此藥

第十七論問產後喘急喉中如貓兒聲者何

答曰敗血衝入心肺氣與血併遂結爲塊入於喉中如有此狀急服此藥

第十八論問產後中風兼有黑血點者何

答曰。產後七日內。下床衝風。百日內傷房勞。或有灸瘡中風。取性慢易。即中風也。初中之狀。氣滯腰疼。煩急如角弓反張。牙關緊急。若有此狀。即是風邪所入。或面色黑。遍身赤黑。敗血流入腦腑。腦腑皆滿。流入皮膚。退反不得。變成血點。或得此變。急服此藥。無有不瘥。

●宣經圓

巴豆十五粒（去皮、心膜、用生絹袋子盛、以灰汁煮十餘沸、取出研、紙壓油了、重研）

右件先用烏金散三錢。以無灰酒調似糊。入瓷瓶中。於重湯內熬成膏。入巴豆末同和爲圓。如綠豆大。熟水下十五圓。宜了冷粥補之。忌毒物。

●烏金散

頭髮灰（男子者、不犯洗、燒灰）　鯉魚鱗（燒灰）　當歸（焙、去蘆須）　延胡索（生用）　好墨（燒過）　肉桂（不見火、去麤皮）

麒麟竭　赤芍藥（剉）　百草霜（是鍋底刮下者煤）

右件九味等分。杵羅爲末。每服二錢。溫酒調下。又用童子小便半盞。生薑一塊。同煎調下。入麝香少許。更妙。

產前所忌藥物。盧醫周鼎。集以爲歌。

蚖、斑、水蛭、地膽蟲。　烏頭、附子配天雄。
蹶蹶、野葛、蟾蜍類。　烏喙、側子及虻蟲。
牛黃、水銀并巴豆。　大戟、蛇退共蜈蚣。
牛膝、藜蘆加薏苡。　金石、錫粉對雌雄。
牙、朴、芒硝、牡丹、桂。　蜥蜴、飛生並蠟蟲。
代赭、蚱蟬、胡粉、麝。　茺花、薇銜草、三稜。
槐子、牽牛并皂角。　桃子、蠐螬和茅根。
樵根、硇砂與乾漆。　亭長、溲疏、茵草中。
巴豆、蘭茹、蟹爪甲。　蝟皮、鬼箭、赤頭紅。
馬刀、石蠶、衣魚等。　半夏、天南、通草同。
乾薑、蒜、鷄及鳴子。　驢、馬、兎肉不須供。
切忌婦人產前用。　此歌宜記在心胸。

衛生家寶產科備要卷第六

備產濟用方序

婦人產褥之事。一有蹉跌。爲害不細。若因而受疾。又非尋常疾病之比。氣血既虛。更難攻治。是宜昔人所留意而不敢忽者也。予性喜方藥。偶得產方甚多。蓋嘗用以取効焉。今錄其所得之方。及平時所聞之說。與夫疾證用藥次第。共爲一書。以濟人之急難。初虞世嘗謂婦人生產。須使之自能通曉。方爲盡善。斯乃至論。然間有素無產難之家。不知出於偶然。心常易之。不以介意。故緩急之際。至於產婦已困而家人未悟。往往有之。此幸其無事則可。非萬全之道也。紹興庚申重陽日。三吳外士餘杭虞沅書。

虞氏備產濟用方

妊娠

婦人妊娠之後。或觸冒風冷。或飲食不節。或居處失宜。或勞動過當。少有不和。則令胎動不安。重者遂致傷墮。臨產之際。爲患不小。豈可不戒也。

妊娠三箇月後。或疑非胎。宜服川芎散。妊娠五箇月後。宜服滑胎枳殼湯。

入月

入月第一日清旦。先書借地法。貼產婦房內北壁上。須清心志誠書之。更須避日遊、月支諸神等。

入月後每日進保生圓一服。臨產五臟不痛。其子易生。

凡產閣及臟衣之地。並須依方位所利鋪設。產閣務要清虛。仍須遮塞孔隙。無令賊風遊氣可得而入。及窗壁仰泥之類。並須一一經心照管。恐有類種。種種非意。爲害不小。入月後須便擇好日爲之。倉卒之際。無緣周備也。

凡合用湯藥。須於未產前一月內修合足備。不可倉卒。或市諸藥肆。或求之醫館。產後五臟皆虛。藥貴精當。恐有雜僞。反致他疾。產婦服食。貴在誠潔。老娘須擇溫善安詳慣熟之人。其妄誕揮霍無常者。去之。又有甚慧動人而收己功者。爲害尤甚。不可不知也。大抵有孕婦之家。選擇老娘。最爲先務。既得之。則令與產婦游處情熟。入月則令守月。不可臨時倉卒呼喚。卻致誤事。又老娘收生。風俗多有不同。隨時宜先令詳說次第。或有未便。款曲與之商量。不可一切任之。此若選擇得人。則上下安心。產婦亦免疑。省力萬倍。縱生只用家中慣熟妮子爲佳。若用外人。亦須先審問次第。然後用之。亦能爲害。不可不謹也。

臨產

產婦覺腹痛。他人切不得驚忙及亂報人知。只可令一兩人老成親熟人。安慰相伴。亦不得用人多。不然。則令產婦憂怕。氣血錯亂。生理不和而起百疾。

產婦腹痛時。須低心忍耐。不可急性躁怒。起動揮霍。皆能令子失道。遂致難產。產婦若只腹痛者未產。若連腰痛甚者。卽產候也。

產婦覺腹痛雖甚。且須令人扶持。徐徐不住行動。若倦亦且扶立。時時令行。先脫產婦常著衣服一件。覆竈頭上。待子還生。方得蹲坐。切不可蹲坐太早。太早則子在腹中轉動不得。遂致難產。產婦臨產。須避太歲所在。不得面對太歲蹲坐。恐致憂禍。深戒深戒。產婦蹲坐時。須要四體平正。不得稍有偏曲及強嚏氣用力。亦能令子失道。致難產也。

產婦未蹲坐時。先須用五積散四錢。加順元散二錢同煎。分作兩服。用湯煖。卻不得令冷。候蹲坐時。令產婦先進一服。如稍覺產進。卽再進一服。若一服後便產。卽不須再服。此藥助氣催生。他藥所不及。吾鄉所謂沈家五積散者是也。方出沈存中內翰宅。昔有貨者。三百一服。號爲神藥。余家每用之取効。但性稍熱。產婦素協熱者服之。產後臟腑須微覺燥澁。甚者三兩日不通。切不可用利性藥。但調和粥食。如後說調養。津液生則自然流利也。（說在產後諸證用藥門。）

產後

纔分娩。便須急與產婦童子小便一盞溫服。次進勝金湯一服。不可飲酒過量。緣酒能引血入四肢作病。

衆新產後。臟腑虛。熱酒入腹中。必致昏亂。又嘗有人用醋罨。此雖破血有功。然亦傷肺。服多則因而成嗽。

余見蜀醫張宗說。說有用醋罨者。下咽疾作。此是氣血方虛。酸勝而生痰。不可不戒。才分娩。便須燒塼石或炭投醋中。三日內嘗令聞猛醋煙氣。以防血暈。又不得令熟睡。須頻頻喚醒。緣氣血全虛。恐生昏亂。分娩後不得便睡。且須扶坐移時。方可以軟物自腰以上漸漸搭起。及高枕起頭項。仍須令仰臥。立起膝時。

復令人從心上用手按到臍下。如此一日已來方可止。恐惡血上行而致暈也。兼須加意遮避賊風。不可不謹。

產後所進粥藥。不得犯生水。以至椀器之類。並須用沸湯洗。火炙乾。方可用。產後七日內。唯須頻進童子小便。及時進白粥。如小便難喫。則依法煮之。自然易喫也。七日後方可進少醇酒。并些小燒鹽。不可用生鹽。二七日後漸進些小淡煮極爛薄肉。三七日後。漸食滋味。一月後漸進麵食。一百日後。方可食果實生冷等物。產後五臟百脉。率皆傷動。一百日後。方始如舊。常人不自愛惜。才到滿月。便稱平復。或不謹飲食。或觸冒風冷。或喜怒高聲。或勞動用力。氣血未定。情慾不常。此皆致病之由也。婦人稟受虛質。皆緣生產而能移易。若能一一如法將息補養。則有平生盛實無病者。若不能如法將息補養。則有平生羸實無病。而遂致虛損瘦羸。成經綿不可起之疾者。當時不覺。意謂不然。及歲月成疾。又不能推究其由。乃謂偶爾。故婦人產後。往往不能加意將攝。噫。臨產之際。死生所繫。及產難既過。漸向平復。而又不能將息以自保攝。遂取困厄。豈不至哉。世之任意輕動不能調養者多。故詳言之。

產後諸證用藥例

產後惡露。或多或少。皆能令人暈悶。心煩。滿急。

產後惡血攻心。則能令人眼生黑花。心悶欲絕。產後才覺惡心、頭旋、頭昏。多涕唾。身如在舟車中。此是血暈之候也。便以猛醋煙熏。及服保生圓、勝金湯、百草霜散等。治血藥則如熟乾地黃生、薑、芸薹子、當歸、蒲黃、沒藥、桂心、延胡索、赤芍藥、牡丹皮、牛膝、川芎、麒麟竭之類。

產後惡血攻心。則荒言亂語。驚怕。或啼或笑。宜服金黃散、麒麟竭散等。破惡血。養好血藥則如琥珀、熟乾地黃、當歸、蒲黃、赤芍藥之類。安心氣則如遠志、茯神、朱砂、麝香之類。

產後惡血不絕。爲自來經血虛損。或產時惡血出不盡。留滯腹中。先有宿冷。遂成淋瀝不止。宜服保生圓等。如牡蠣、當歸、熟乾地黃、艾葉、阿膠、厚朴、乾薑之類。性冷藥不可服之。

產後因惡物不下。或下不盡。心腹疼痛。煩悶。宜服千金散、地黃散、桃仁散、川芎散、勝金湯、保生圓等。又宜服桂心、當歸、牛膝、牡丹皮、虎杖、蓬莪茂、延胡索、赤芍藥之類。產後須常體問產婦。如所下惡物多。卽不須再三進逐惡血藥。恐氣血益虛。煩悶暈亂及生疾病。如覺比尋常少或不行。則須急攻之。緣血隨氣上行。掩於心。故令煩悶而心滿急。二者得失甚大。切在詳審。產後大腸祕澁。此是產時走津液多。腸胃未和。乃常事也。切不可亂服通利藥。但只依尋常服調氣血藥。及調粥食。常令溫煖細軟。依時漸進。不得失飢。亦勿傷飽。氣血調和。則腸胃自然平復矣。

產後體虛。切不可妄進湯藥。如別無證候。但只與保生圓、及調養氣血等藥。

產後三日。起坐不得。服見黑花。目或暈絕。全不見物者。是血氣未安。逆走五臟。奔注於肝故也。有不識者。呼爲暗風。悞矣。宜服黑散子。

產後乍寒乍熱。及渴者。是產後虛羸。敗血入心肺則熱。入脾則寒。不識者呼爲瘧疾。悞矣。宜服黑散子。

產後四肢浮腫及寒熱者。是產後敗血流入五臟、五臟將滿、流入四肢、停留日久、卻還不得、乃化爲水、有不識者、呼爲水氣、悞矣。血與水氣狀候不同、何以明之、水氣喘而小便澁、血氣渴而四肢沉、當細辯之、宜服黑散子。產後言語顚狂、乍見神鬼、時復寒熱及渴者、是產後敗血衝心、心不受觸、既被蒸燻、心臟熱極、遂生此疾、不識者呼爲風邪神祟、悞矣、宜服黑散子。

產後一臟非時不語者、是敗血上衝、陷入心孔中、既被蔽之、便致不語、宜服黑散子。

產後遍身疼痛者、是百節開張、血疰結處、停留不散、結聚脹脹、是以疼痛、宜服黑散子、骨間敗血卽去。

產後雖滿月、血氣不通、上氣咳嗽、痰涎多者、經脈未還、便不忌謹、多食熱麵、壅結成疾、聚卽成塊、散卽上衝、氣急、咳嗽、四肢虛熱、心悶、口乾、睡夢多驚、四肢無力、盜汗、心痛、月候不調、或成血癥、環遶臍下、或卽面赤、因變骨蒸、但多服黑散子卽瘥、須急服之、此疾難理故也。

產後敗血停在脾胃、食衝於胃、胃衝於氣、氣衝卽不安、便當吐噦、胸脇俱脹、有不識者、呼爲臟胃、但服黑散子、吐出惡物卽瘥。

產後中風者、是未經七日、下床、兼百日內傷房事、或灸瘡內中風也、初中之狀、眼澁腰強、筋急如角弓反張、牙關緊急、若此之狀、非中風也、有此疾者、安能救療、婦人傷犯之後、其疾甚多、不可不戒。

產後面色黑及遍身生黑醫子、由敗血入皮膚、欲出流走、熱結便住、卻還不得、遂成黑醫、中此者百無一瘥。

難產逆產橫產

難產、逆產、橫產三者、皆能立致不測之禍、然所得多端、或先因漏胎、血去臟燥、或子臟宿挾疹疾、或觸犯禁忌、或產時驚動、穢露下早、子道乾澁、產婦疲困、或坐臥未安、身體斜曲不正、轉動忽遲、強喝氣暴衝擊、或腹有兒枕、產時先破、遂爲敗血、散裹其子、胎中伏熱、故致難產也、產時未至、驚動太早、子轉未覺、便用力產之、故致逆產、橫產也、產婦面赤舌青者、子死母活、面青、舌赤、沫出者、母死子活、唇口青、兩邊沫出者、子母俱死、身更重而熱、舌下脉青黑、及胎上冷者、子已先死、並有方治之在後。

胎衣不下

產婦初時用力產子、而體已疲憊、不能更用力、產胎經停之間、外冷乘之、則血道乾澁、胎衣不下也、子臍帶與胞系相連、若不下、卽須急治之、不然、則斷臍稽遲、子傷冷氣而成病矣、舊方胞衣不下、恐損子者、須依法截臍、胎衣不下者、腹痛滿則殺人、若倉卒無藥、卽多食猪脂亦佳。

妊娠食忌

食兎肉令子缺唇。　食雀肉令子盲。　食羊肝令子多患。　食鴨子令子倒生。

食鼈肉令子項短。　食驢肉令子過月。　食乾薑蒜令胎不安。已上並妊娠五六月之後、剛須忌食。

入月借地法

東借十步、西借十步、南借十步、北借十步、上借十步、下借十步、此中產婦安居、無所妨礙、無所畏忌、諸神

擁護、百鬼遠去、急急如律令。



產前諸方

◉川芎散 三箇月後、疑非胎卽服。

川芎一兩生用。

右爲細末、空心澁煎艾湯調下二錢、腹內微動者、當有子也。

◉枳殼湯 五箇月後服、滑胎易生。

商州枳殼二兩麩炒去穰。　石州甘草一兩炙。

右爲細末、每服二錢、白沸湯點、空心食前、一日三服、或四服、唐胡湯公主每產、用經旬痛楚、萬法不効、服此藥、遂驗、自服藥後、忌登高厠、色方漸變白、此方神妙、滑胎易產、他藥所不及、但其胎緊小、微帶黑色、百日後內服、綠槙殺性寒、恐難多服也。

◉蟹爪湯 妊娠偶作失勢、胎動轉上搶心、甚者血從口出、逆不得息、或注下血、胎不出則寒、緊人脚中、急如產狀、虛乏少氣、困頓欲死、煩悶反覆、服藥母卽得氣、下血亦止、其當產立生、神効。

蟹爪一升約五兩。　阿膠二兩剉碎、勿炒。　甘草炙、剉。　桂心不見火。各二尺。

右以東流水一升、煮取三分、去滓、內膠烊盡、能一服佳、不能一服者、食頃再服、若因急不能飲者、灌之、藥下子母俱活、子死則母活、若不經佛仆下血、服此湯卽止。

◉又方 妊娠偶有所觸、或墜高傷打、致胎動不安、腹中痛不可忍者、可服。

縮砂一兩（和皮，用淨蜜拌於慢火上炒令熟透，去皮，只用仁。）

右爲細末，每服二錢，熱酒調下，動處熱，即已安矣。

●又方（胎不穩，坐臥不安，可服。）

木賊草（去節。）　川芎（剉。）　各一兩。

右爲細末，每服一錢，水一大盞，入金銀物同煎至六分，去滓，空腹食前，日三服。

●人參圓（婦人姙娠，嘔吐不止，名爲胎病，或以時常治嘔吐藥治之，非也，宜服此藥。）

乾薑（炮烈。）　半夏（麴炒。）　人參（去蘆，切。）　各一兩。

右爲細末，薄糊圓如雞頭大，每服一圓，米飲下，可加至三圓，此方出仲景金匱，極妙。

●保生圓（入月後服，產前產後一切諸疾悉治。）

金鈆石斛一分（別杵。）　秦椒（去目，炒。）　官桂（去皮、不見火，剉。）　貝母（去心，剉。）　乾地黃（洗，焙乾。）　防風（去蘆，剉。）　橘米　甘草（炒。）　大麻仁（去殼。）　大豆卷（黑豆芽是，不乾，曬之。）　黃芩（剉。）　各二分。　石膏（明淨硬者。）　麒麟竭（沒藥去石。）　龍腦　各一錢半。

右件藥並須用州土上等好者，擣爲細末，以熟蜜六兩，入水一分，同煉，令水盡，和藥了，卻入臼內杵五百下，取出平分七十二圓，每服一圓，產前產後血風頭旋身戰，薄荷酒下，月信不通，當歸酒下，赤白帶下，溫酒下，臨產難產，胎衣不下，子死腹中，橫產倒生，死絕不語，但看心頭熱氣在，取一圓，京墨湯化開，灌入喉中，立甦。產後惡血不盡，臍腹疼痛，嘔吐發熱，增寒煩悶，月候不調，或多或少，皮膚虛腫，惡露不止，虛勞中風，口噤不語，半身不遂，產前產後赤白痢，大便秘澁，血渴血暈，狂語見鬼，頭痛，面色萎黃，漸成勞瘦，飲食無味，並用溫酒研下。催生當歸酒下，產後中風血暈，生地黃汁同煎十沸，研藥灌口中，須臾風，但五日一服，空心熟酒嚼下，浴後溫酒嚼下，中風不語，身急如板，用消梨、蘇、薄荷同研藥灌口中，候汗出了，相次揭衣被，當風坐臥，立產，其餘一切諸疾，並用當歸、薄荷酒研下，薄酒亦得，小兒天弔、驚風，用藥一圓，分作三服，薄荷酒下。

●五積散（臨產時服，助氣館生。）

蒼朮二十兩（去蘆。）　桔梗十兩（去蘆須，洗、焙。）　陳橘皮六兩（去穰。）　白芷（去面。）　甘草（炙。）　各三兩。　當歸二兩。　芎一兩半（洗、剉。）　芍藥（白者。）　半夏（湯洗。）　各一兩。　麻黃（春夏二兩，秋冬三兩。）　枳殼四兩（麩炒去穰，別杵。）　肉桂（春夏三兩，秋冬四兩，別杵。）　白茯苓（去皮。）　厚朴二兩（薑汁炙，別杵。）　乾薑（春夏一兩半，秋冬二兩。）

右十五味爲麤末，分作六分，大鍋內煖火炒令微赤，香熟即止，不可過焦，取出，以淨紙板攤上，攤令冷，入枳殼、肉桂、厚朴三物和之，若產婦難產，經三兩日不生，胎死腹中，或產母氣乏委頓，產道乾澁，用藥末二錢，加順元散一錢，水七分，酒三分，煎至七分，相攤兩服，氣血內和，即產，胎死者不過三服，當下，其順元散亦須量產婦虛實用之。

●又方

只用五積散二錢，入附子末一錢，水一盞，同煎至七分，無順元散則用此。

●順元散

烏頭二兩（炮烈，切片。）　附子（炮，去皮臍，切片。）　天南星（炮。）　各一兩。　木香半兩（煨乾，剉。）

右爲末，入前五積散同煎服。

●催生神効聖功散（此藥極易生，其藥煎出，婦人多不愛喫，切須令強服，催生果得効。）

榆白皮（取深大根，刮去赤皮，取粉紅色者，去心，薄切，焙乾，秤。）　滑石各一兩。　沒藥半錢（別研。）　當歸一分（去蘆，洗，切。）　朱砂半錢（別研。）

右件爲細末，次入朱砂，再研和勻，每服二大錢，水七分，盞，煎三兩沸，及九箇月以來方可服，如臨產覺陣痛，亦依前服，自服此藥，忌登高厠。

●催生安胎救命散

烏藥四兩（別用醋炒黃色。）　前胡半兩（洗淨。）　菊花一兩（去梗。）　蓬莪茂二兩（炮，乘熱搗碎。）　當歸半兩（去蘆須。）

右剉碎，用好米醋炒乾爲度，同爲末，如死胎在腹，用炒黃豆淋酒調藥三錢，連進三服，立下，死血衝心，炒黃豆淋酒下二錢，入童子小便半盞，安胎用熱酒下一錢，血山崩，熱酒下一錢，產後一切血疾皆可服，尋常催生用炒黃豆淋酒調三錢，只一兩服立生，藥須用新磁罐收，勿令失氣味。

●神効催生丹

臘月兎腦髓一枚（支核大者佳，不可用陳者。）　麝一錢（別研。）　乳香末一分（須黃明者，乳鉢內研細末，外以冷水浸鉢，輕研。）　母丁香一錢（爲末，須辛辣如蓽茇。）

右一處研細，用兎腦髓爲圓，如○此大，慢火焙乾，磁合收封，糊合口，不要出氣，候產婦陣痛，頻以溫丁香湯吞下一圓，產婦不痛，其子順生，男左女右，手把藥出，急洗藥，焙令乾，凡一粒可用三次，合時勿令鷄、犬、婦人、孝子見，服時婦人閉目取藥，產婦閉目吞之，神効。

●催生如聖圓

乳香（好明淨者，研如粉。）

右以生猪心血和圓，如梧桐子大，覺腹痛時，濃煎茅香湯下三十圓，嚼破服，端午日合，切忌婦人、鷄、犬見，橫倒生只一服，此方絕妙。

產後諸方

●勝金湯（才產了便服，去惡血，止血暈。）

地黃汁二分（生。）　生薑汁一分（生。）

右用童子小便一分，同煎十餘沸，溫服，地黃、生薑須是淨潔沙盆內研取自然汁，切不可犯生水。

●又方（治血暈惡急。）

生地黃三兩，切碎。　生薑三兩，切碎，不去皮。

右二物相和，同炒乾，候爲末，每服二錢，研木香酒一盞，同煎三兩沸，通口服，壓下血立愈。

◉又方 產後血暈欲死，及餘血不盡，被風吹即變成寒熱。

生地黃四兩　生薑四兩。

右並薄切，新瓦乾之爲細末，溫酒調下二錢，此二方俱妙。

◉潰小便方 小便難喫，用此法潰之。

烏梅五個，湯內洗淨。　炙了甘草末二錢。　炮了乾薑末一錢。

右三味，先於椀內用沸湯少許浸少時，候烏梅軟，即以熱小便一盞許，就椀內浸，令產婦閉氣作一服服之，如欲再服，即別用烏梅等一依前法重浸，方可服，不可更用浸了藥也。若產婦才分娩了，即須以盡子小便依尋常與之，未可用此法，第三次方可用此法。

◉燒鹽法 初食鹽，用此法燒之。

好淨鹽不拘多少。

右以葫蘆裏作粽子樣，於炭火內燒，候鹽通紅如火，即取出，放淨地上一伏時，候火氣盡，研用。

◉百草霜散 產後血暈可服。

百草霜一錢，秤，即鍋底上黑煤也。　生薑二錢，秤、去皮切，炒乾。　蕤黃半錢。

右爲末，以生地黃黃濃汁調下二錢。

◉又方

劉寄奴一握，剉。　甘草半兩，炙、剉。

右以水一椀半，煎七分，去滓服，才覺血暈，喫一服，甚者再服，無事。覺腹痛，即先煎下，恐緩急煎不成也。

◉黑散子 治產後產用藥門。

琥珀別研細。　朱砂別研。　京墨燒通赤，放冷用。　血苗灰即鯉魚鱗灰也。　黑衣即鍋煙上煤也，倒掛者亦得，又謂之烏龍尾，蓋黃灰亦得。　新羅白附子炮烈。　百草霜乃鍋底上黑煤也。　麝別研極細。　白殭蠶剉、炒去絲蹟。　川當歸洗去蘆頭，切、焙。　各半兩。　各一分。

右爲末，每服二錢，炒薑湯調下。

◉烏金散 產後血暈，或氣盡不蘇，死胎不下，並可服。

失豆　生薑各四兩。　蓬莪茂剉。　當歸去蘆頭，洗、切、焙。　黃芪去頭，各一兩。　櫻皮二兩。

右先下生薑、大豆，炒候薑乾，即下當歸、莪、黃連、炒香豆紫色透心，即以櫻皮點火，入藥銚中，櫻皮盡成黑灰，即傾地上，以紙襯出火毒，爲末，每服二錢，童子小便調下。產後雖無事，服之亦佳。

◉金黃散 產後黑血攻心，發燥，可服。

蕤黃半兩，隔紙炒。　延胡索一兩，剉。　桂心一分，不見火。

右爲細末，每服一錢，用烏梅湯放冷調下。

◉麒麟竭散 產後惡血攻心，漸次煩悶，可通服。

麒麟竭一兩，爲末。　生薑半兩，切碎。

右用酒一盞，同煎至八分，去滓，帶熱通口分兩服，立驗。

◉千金散 產後惡物不下，取不盡，腹痛，可服。

桂心去皮，不見火，剉。　蔵鑑仙鐵脚者，去根，剉。　白芷去蘆，剉。　當歸去蘆頭，洗、切、焙。　牡丹皮剉。　各一兩。

右同杵爲細末，每服二錢，煎神麯湯調下。

◉地黃散 產後惡物不盡，腹痛，可服。

熟乾地黃一兩，略炒。　生薑四兩，細切如蠅翅大，於銅器、或鐵器、或新瓦上，炒令黑焦煙起爲度，半兩。　當歸一兩，洗去蘆頭、切、焙。

右同杵爲細末，每服一大錢，用生薑炒浸小便調下。

◉牡礪散 產後惡露不絕，可服。

牡礪半兩，燒。　龜甲半兩，用好醋炙黃。

右爲細末，每服溫酒調下二錢，食後服。

◉桃仁散 產後心腹痛，可服。

桃仁二錢，去皮尖并雙仁，剉、焙、秤用。　蓬莪茂一錢半，秤，用慢火煨，取出，乘熱細碎。　桂心二錢，不見火，剉。　當歸四錢，去蘆頭。

右爲細末，熱酒調下一錢，如不喫酒，只用水一中盞，藥末二錢，煎七分，帶熱服。

◉川芎散 產後心腹痛，可服。

川芎洗、剉。　桂心不見火，剉。　木香剉、細乾。　當歸去蘆頭，剉、焙。　桃仁去皮尖并雙仁，炒黃。　各一兩。

右爲細末，每服一錢，熱酒調下，如不欲飲酒，即用水一盞，藥末二錢，煎至七分，帶熱服，不拘時候。

◉金花散 產後血暈，一切腹臟疼痛，不以虛實，可服。

蕤黃片子者。　熟乾地黃炒。　各二兩。　肉桂去蘆皮，不見火。　牛膝去根，剉碎，酒浸一宿，焙乾用。　虎杖洗、剉。　芎藭洗、剉。　赤芍藥剉碎。　蒲黃隔紙炒。　乾薑紅多用色黑者。　各一兩。　劉寄奴剉。

右爲細末，每服二錢，如疾勢輕者，即以水或酒用一盞，煎至七分，和滓溫服，重急者以豆淋酒同煎服。

◉當歸散 產後刺可服。

當歸一分，去蘆頭，洗、切、焙。

右爲細末，每服二錢，米飲調下，未止再服。

◉人參散 產後虛汗，發熱，可服。

人參切，去蘆，作片子，焙。　當歸淨洗，去蘆，切、焙。　各半兩。

右分作兩服，每用猪石子一隻，切作八片，以灰去血水，用水二盞，苦二莖，糯米一合，生薑三片，煎一盞，去石子等溫服，早晚各一服。

●四神散產後血氣心腹痛，可服。

當歸去蘆須、蚓、洗、焙乾用，　芍藥白者，蚓，　川芎蚓，各一兩，　乾薑半兩炮烈，蚓。

右爲細末，每服二錢，熱酒調下。

●香桂散產後臍下疼痛不止，可服。

當歸去蘆須，洗，焙，　川芎蚓，各一分，　官桂半兩去皮，不見火，蚓。

右爲末，分作三服，每服酒一盞，煎三五沸，更入小便少許，同煎至七分，溫服。甚者再服，必効。如不欲入酒，卽以水代之。

●當歸散婦人產後血氣、血劇、血暈、血崩，暴腫不止，或嘔、或噦、或見神鬼、或如中風、或瀉、或痢，或如諸疾者，其功効如神，兼治產後一十八病，唯忌酒喝，本方不治。

肉桂去粗皮，不見火，　當歸去蘆須，洗，焙，　芍藥白者，蚓，　乾薑炮烈，蚓，　乾地黃湯洗，蚓，焙乾，　蒲黃隔紙上炒，

甘草炙，蚓，各一兩，　黑豆二兩炒熟，去皮，

右爲細末，溫酒調下二錢，日進三服，不拘時候，甚者三服愈。常服日兩服或一服。

●柿湯產後嘔逆氣氣心煩，可服。

乾柿一箇切碎，水一大盞，煮熟，熱呷甚妙。溫卽再煖，令熱呷喫。

●荊芥散治產後一切難治之疾。

荊芥不以多少。

右爲細末，每服一錢或二錢，溫酒調下，立効。有急疾及風候，宜速爲之。此方絕妙，家中常用之。產婦雖無病，每日進一服，只用童子小便調下，有急疾用小便酒各半調之，尤佳。

●陳梅散產後痢，可服。

多年白梅，不以多少，

右燒成灰，存性，研爲細末，陳米飲調下一大錢，甚妙。

難產諸方

●治產難，子死腹中，又難兩兒，一生腹中，一死腹中，死者出，生者安，此方神驗，萬不失一。

蟹爪一升，約五兩，　甘草四兩炙，蚓，　阿膠三兩用蛤粉炒，

右以東流水一斗，先煮二味至三升，卽內膠，膠烊，頓服之，不能一頓服者，食頃再服，若至困，灌之卽活。作東向竈草薪煮之，此方與前蟹爪湯相犯，唯不用桂心。

●治難產

榆白皮一升，切，　罌麥擣淨，　木通蚓，　各三分，　牛膝去苗根，酒浸一宿，蚓，焙乾用，　大麻仁去殼，　各一兩，

右爲麤散，每服四錢，水一中盞，煎至六分，去滓，溫服，頻服佳。

●又方

當歸二兩去蘆須，洗，切，焙，　芎一兩，蚓，

右爲細末，每服四錢，水酒各半中盞，煎至六分，去滓，溫服，頻服佳。若盧胎在腹已死者，服此藥胎死卽下，胎活卽安，神効。

●又方

赤小豆一合略炒，　黃明膠一兩，蚓，

右以水一盞，煮豆令熟，去滓，內膠令消，溫溫頓服。

●又方

取馬嚼一枚，燒痛，卽令產婦左手把之，甚効。

●又方

取東引槐枝手執之。

●又方

取桃仁分破，書一片作可字，一片作出字，依前逗合，令母吞之卽產，此天眞法也，神効。

●又方

子母草生，　子母草死，

右收五方氣，飲氣書二道，用茅香湯吞之。

●又方

取菹麻子四粒，去殼，水研，取汁少許，塗產婦脚心中，才產便洗卻，并貼臍中亦良。

●又方

取皂角末少許，吹母鼻中，令嚏，其子便下。

●又方

取大豆一顆，擘破，書其夫姓名於上，以酒吞之。

●又方

雄虵蛻一條大者，以頭按產婦臍中，自腰後左繞轉，卻以尾按臍中，才匝便下，此法極驗，虵蛻在高處者爲雄，在地者爲雌，須頭尾全者。

逆產諸方

●治逆產

半夏湯洗七遍，去滑，焙乾，　白斂各一兩，

右爲細末，每服二錢，生薑酒調下，難產一服，橫產二服，倒產三服，兒死四服，若胎衣不下，母氣欲絕，亦宜服之，每一服如人行一里，再進，加罌麥二兩尤妙，小產只一服愈。

●又方

急以鹽和輕粉，塗子脚底，又急以小針刺子脚底，卽轉，覺痛，驚擊入，卽順出。

◉又方

以鹽摩母腹。卽順出。

◉又方

當歸不以多少。微炒。去蘆頭、洗、剉、焙。

右爲細末。溫酒調下二錢。

◉又方

艾葉一兩。炒。

右以酒一大盞。煎至六分。去滓。分作兩次溫服。立效。水煎亦得。

◉又方

車前子不以多少。

右爲細末。溫酒調下二錢。

◉又方

兎絲子不以多少。

右爲細末。溫酒調下一錢。

◉又方

以手中指取釜下墨。交叉足。卽順生。

橫產諸方

葵子二合。　黃明膠剉。　滑石末各一兩。

右爲細末。以水一大盞半。煎至一盞。去滓。分作三服。溫服。

◉又方 逆產、橫產、難產、胎漏、難產前後虛損、月候不調、崩中、皆可服。

百草霜　香白芷各一兩。

右件爲細末。每服二錢。童子小便一茶脚許。調勻。以沸湯四五分化開服。止一服。甚者再服愈。

◉又方 橫產、逆產、胎死腹中、及胎衣不出、母欲絕、皆可服。

半夏 熱湯浸洗七遍、去滑、嚼乾。　白歛剉碎。　瞿麥頭子各半兩。

右爲細末。每服二錢。炒生薑酒調下。

◉又方

瞿麥一兩。

右以水一大盞。煎至六分。去滓。分作兩服。溫服。

◉又方

牛尿不以多少。

右塗母腹上。卽順出。

◉又方

蛇蛻皮不以多少。

右用炭火燒作灰。研令極細。溫酒下二錢。若子死腹中。服之立下。

胎衣不下諸方

◉產婦臨產。先脫常著衣裳一件。覆蓋頭。卽無胎衣不下之厄。此法極驗。不可不信也。

◉治胎衣不下

大牛膝一兩。去苗。　葵子一合。

右搗碎。以水一大盞。煎至半盞。去滓兩服。溫服。

◉又方

紫背帚燒灰。酒半升調下。

◉又方

飲洗兒水一口。立下。

◉又方

草麻子三粒。　鼠粘子一分。卽牛蒡子。

右爲細末。若子死腹中。無藥可下。卽以醋糊調藥。塗在口上。以紙貼之。立下。

◉又方

當歸一兩。洗去蘆頭、切、焙乾。　瞿麥炒。　芎藭洗、剉。各三分。

右爲麤散。以水及米醋各一中盞。煎至一盞。分作三服。溫服。

◉又方

當歸洗、後蘆頭、切、焙乾。　麝香別研。各三分。

右爲細末。先取產多婦人髮半兩。燒爲灰。細研。入當歸末。以水一大盞半。煎取八分。然後下藥。攪令末。煎五七沸。分爲三服。若數日不產。子死腹中者。皆可服。服後如人行四五里。再服。

◉又方

水銀一彈子大。

右斡開產婦口灌之。扶起令坐。不令眞。扶起令倚立。其子卽下。唯臨產面青舌赤。沫出欲死。子猶不出。幷產婦已死而欲令子出者。可服。

◉治產前產後痢疾

蛇蛻端午日收。聳乾。

右產前痢用前兩脚。產後痢用後兩脚。燒灰存性。爲末。米飲調下。食前服。此藥家中累曾經驗。神效。

許學士產科方　名叔微，字知可。

◉滑胎枳殼散

商州枳殼二兩（去穰，剉作小塊，麩炒）　甘草一兩（炙，剉）

右爲末，每服二錢，白沸湯點服，空心食前，日三服。凡懷孕六七月以上，即服，令兒易生，初生胎小微黑，百日以後肉漸變白，此雖孫眞人滑胎易產方，然抑陽降氣，爲衆方之冠。

◉內補圓，治姙娠衝任脈虛，補血安胎。

熟乾地黃二兩（剉，焙）　當歸一兩（去蘆頭，洗，焙乾）

右細末，煉蜜和圓如桐子大，每服三四十圓，溫酒下，無時。

上三方諸集皆載之，在人用之如何爾。大率婦人姙娠，唯在抑陽助陰，素問云，陰搏陽別，爲之有子，蓋關前爲陽，關後爲陰，尺中之脈，按之搏手而不絕者，姙子也。婦人平居，陽氣微盛，無害，及其姙子，則方閉經隧以養胎，若陽盛搏之，則經脈妄行，胎乃不固，素問所謂陰虛陽搏謂之崩也。抑陽助陰之方甚多，然胎前藥唯惡峯隊，若陰陽交雜，別生它病，唯是枳殼散所以抑陽，四物湯所以助陰，故爾。枳殼散差寒，若單服之，恐有胎寒腹痛之疾，以內補圓佐之，則陽不至強，陰不至弱，陰陽調勻，有益胎嗣，此前人未嘗論及也。

◉木香圓，治婦人有孕傷食。

木香二錢（剉）　京三稜（慢火煨，令熟，剉作片子）　人參（去蘆，切片，焙）　白茯苓各三錢。

右細末，麵糊圓菉豆大，每服三十圓，熟水下。

◉白芷散，治姙娠氣不和，調飲食。

白芷（切作片子，焙乾）　乾紫蘇各一兩　白芷（微炒）　人參（去蘆）　各三分　川芎（洗，剉）　訶子皮

青皮（去白）　各半兩　甘草一分（炙，剉）

右細末，每服二錢，水一盞，薑三片，煎七分，不拘時，溫服之。

經云，飲食自倍，腸胃乃傷，又云，陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味，若姙子飲食不節，生冷毒物，恣性食噉，致脾胃之疾，故姙娠傷食難得藥，唯此二方最穩。

◉紫蘇飲，治姙娠胎氣不和，懷胎近上脹滿，痞痛，謂之子懸，養治臨產驚恐氣結，連日不下。

紫蘇葉一兩　大腹皮（剪碎）　人參（去蘆，切片）　川芎（剉）　陳橘皮（去白）　白芍藥各半兩

當歸三分（去蘆頭，切）　甘草一分（炙）

右細剉，分作三服，每服用水一盞半，生薑四片，葱白七寸，煎至七分，去滓，空心服之。

昔有婦人累日產不下，服逼催生藥不驗，予曰，此必坐草太早，心懷下一濁氣結而然，非順不順也，素問云，恐則氣下，蓋恐則精卻，卻則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，氣乃不行矣，得此藥一服便產，及婦人六七月子懸者，予用此數數有驗，不拾服，胎便近下也。

◉下死胎方

桂末二錢、麝香當門子一個，同研，煖酒服，須臾，如手推下，比之用水銀等，此藥不損血氣。

◉琥珀散，治婦人月經壅滯，每發心腹臍痞痛不可忍，及治產後惡露不快，血上惱心，迷悶不省，氣絕欲死。

荆三稜　蓬莪茂　赤芍藥　劉寄奴　牡丹皮　官桂（別去皮，不見火，令碾爲末，後入）

菊花（揀去枝梗）　眞蒲黃　當歸（去蘆頭，焙乾，秤）　各一兩　熟乾地黃（剉，焙）

右前五味，用烏豆一升，生薑半斤切片，米醋四升，同煮豆爛爲度，焙乾，入後五味同爲末，每服二錢，溫酒調下，空心食前服，一方不用菊花、蒲黃，用烏藥、玄胡索亦佳，予家之祕方也，若是尋常血氣痛，只一服，產後血衝心，二服便下，常服尤佳，予前後救人急切不少，此藥易合，宜多合以救人。

◉佛手散，治婦人姙孕五七月，因事藥磣著胎，或子死腹中，惡露下，疼痛不已，口噤欲絕，用此藥探之，若不損，則痛止，子母俱安，若胎損，立便逐下，此藥催生神妙。

當歸六兩（洗去蘆，切片，焙）　川芎四兩（剉，焙）

右施末，每服三錢，水一小盞，煎候和次欲乾，投酒一大盞，止一沸，去滓，溫服，口噤灌之，如人行五七里再進，不過三兩服便生，有一方云，此藥治傷胎去血多，崩中去血多，金瘡去血多，拔齒去血多，昏暈欲倒者，水煎服。

◉愈風散，治產後中風口噤，牙關緊急，手足瘈瘲。

荆芥穗輕焙過一兩

右爲細末，每服二錢，溫酒調下。

經驗產寶皆有之，陳選方中用舉卿古拜二味，蓋切脚隱語以祕之也，此藥委有奇效，神聖之功，大抵產室但無風爲佳，不可衣被帳褥太暖，太暖即汗出，汗出則腠理開，易於中風，便昏冒，記有一婦人產後，遮護太密，閣內更生火，睡久及醒，則昏昏如醉，不省人事，其家驚惶，醫用此藥，佐以交加散，祝云，服之必睡，睡中必以左手搔頭，覺必醒，果如其言。

◉交加散，治婦人藥衝不通，經脈不調，腹中撮痛，氣多血少，結聚爲瘕，產後中風。

生地黃五兩（研取汁）　生薑五兩（研取汁）

右交互用汁浸滓一夕，各炒黃，治汁盡爲度，末之，尋常腹痛，酒調下三錢，產後尤不可闕。

◉蒲黃散，治產後出血太多，虛煩發渴。

眞蒲黃末，每用二錢，以水調飲下，渴躁甚者，新汲水調下。

◉護胎方，治姙娠時氣身大熱，令子不落。

伏龍肝爲末，水調塗臍下二寸，乾則易，瘥即止，又取井中泥塗心下，乾則易。

◉又方

浮萍乾者、川朴消、蛤粉、大黃剉碎、微炒、藍根各一兩剉碎、

右爲末、水調封臍上、安胎解煩熱、

◉麻仁蘇子粥、治婦人產後有三種疾、鬱冒則多汗、汗則大便祕、故難於用藥、唯此粥最佳且穩、

◉鹿脣湯、治妊娠熱病、胎死腹中、

鹿角屑一兩、一碗、愆曰五莖豆豉半合、同煎至六分、去滓、溫分二服、極妙、

◉治婦人生產數日而下、及胞衣死胎不下者方、

用草麻七粒、去殼、研如泥、塗足心、繼下、便急洗去、此崔元亮海上方、人但未知爾、政和中、一鄉人內子產二日不下、予令謾試之、一塗俄頃便下、自後常用極驗、

衛生家寶產科備要卷第七

胎孕方

◉人參白朮散、治婦人經候不來、身如病而無病、脈滑大而六部俱勻、必有孕也、精神如故、惡聞食臭、或但嗜一物、或大吐、或時吐清水、此名惡阻、切勿作他疾治之、

白朮一兩去蘆切、焙、　人參半兩去蘆切、焙、　丁香淨者、剉碎、慢乾、　甘草炙、剉、各一分、

右爲末、每服三錢、水一盞、生薑三片、同煎七分、盞去滓、溫服、食前、嘗驗之、清晨意味佳、自午後漸惡者、是有孕無疑也、

◉千金半夏茯苓湯、治妊娠惡阻病、其證心中憤悶、虛煩、吐唾、惡聞食氣、頭眩、四肢百節煩疼、沉重、多臥少起、惡寒、汗出、疲極瘦悴、

半夏湯泡七遍、　茯苓去皮、剉碎、　熟乾地黃水略洗、剉碎、慢火焙、　各一兩二錢、　橘皮去白、　細辛去葉、

人參去蘆、切片、焙、　白芍藥剉、　旋覆花淨、　芎藭洗、剉、　桔梗去蘆、剉、　甘草炙、剉、各八錢、

右十一味爲麤末、每服四大錢、水一盞半、生薑五片、煎至七分、盞去滓、微熱服、方有重病加減、及相順合服法、著圖、並見千金本方、

◉枳殼散、妊娠至五月以後、能順氣、瘦胎易產、

枳殼八兩去穰、麩炒、秤、　甘草四兩炙、秤、剉碎、

右爲細末、湯點二錢、空心晚食前、日兩服、入月三服、

◉蠲逆飲、酒散、能治妊娠百疾、安養胎氣、自五六個月以後、常服至產時、草藥之間、痛當減半、

當歸洗去蘆、須、切片子、焙、　槐角擇淨、炒香、　枳殼去穰、麩炒、　川芎洗、剉、　貝母去心、薑汁製一宿、焙乾、

右五味、等分爲細末、每服二錢、水酒各半盞、同煎至七分、盞、食空時服、臨月日進兩三服、

◉槐榔散、治妊娠常若胸腹脹滿、兩脇妨悶、飲食不下、四肢無力、頻服能滑胎益氣、

槐榔剉碎、　赤茯苓去皮、剉、　前胡去蘆、　各一兩、　人參去蘆、切片子、焙、　白朮去蘆、切片子、焙、　芎各半兩、

陳皮去白、　枳殼去穰、麩炒、　各三分、　甘草一分炙、剉、

右九味、爲細末、每服二錢、水一盞、薑三片、棗子二個、煎至七分、盞、溫服、日兩服、

◉治胎不穩、坐臥不得安方、

木賊去節、剉、　川芎洗、剉、

右二味、等分爲細末、每服四錢、水一盞、入金銀同煎至六分、盞、去滓、空腹溫服、日三服取效、

◉治妊娠偶因所觸、或墜高傷打、致胎動不安、腹中痛不可忍方、

縮砂不以多少、炙與中煨火炒令熱透、去皮取仁、

右爲細末、每服二錢、熱酒調下、須臾腹中胎動處覺極熱、即胎已安、

◉治胎動、若胎已死、即下、未死、即安、及治血下心腹滿者、如湯沃雪方、即用聖功川芎湯、用大劑、酒水各半煎、連三服取效、本方在後、

◉千金蟹爪湯、治妊娠閃撲、僵仆、失據、胎動轉上搶心、甚者血從口出、逆不得息、或注下血一斛、胎死不出、母氣欲絕、服此母即安、血亦止、當產者立下、未產者胎再安、

蟹爪半盞以多爲佳、　甘草炙、剉、　桂去皮、剉、不見火、各一兩、　阿膠一兩剉碎、用蛤粉炒、起珠、去蛤粉用、

右以東流水十盞、煮前三味至五盞、去滓、入阿膠再煮至膠烊盡、頓服、爲佳、不能者、分減服、一時辰間取盡、爾已不能飲者、斡開口灌之、

◉又方、治胎動及難產、子死腹中、若妊二子、一子已死、一子尚生、服之能令死者出、生者安、與前千金蟹爪湯方同、唯不用桂耳、

◉愈白湯、治妊娠傷寒、頭疼、發熱、不可同常法治之、用此藥最穩、

大葱白十莖去青、連鬚用、或小者加至二三十莖、切碎、　生薑二兩切碎、

右用水二椀、煮至一椀、去滓、分二三服、熱服之、取效快、

◉白朮散、治妊娠傷寒、

白朮去蘆、切片子、焙、　黃芩剉碎、

右等分、剉、用新瓦上炒香、爲細末、每服三錢、水一盞、生薑三片、棗子一枚、同煎至六分、盞、熱服、唯四肢逆冷、陰證見者、宜可服、

●治妊娠傷寒大熱甚胎不安者方

阿膠一兩（洗、剉碎、以蛤粉末同炒泡、趁熱、去粉、候冷入碾）

右爲細末每服二錢竹瀝調下卒無竹瀝用小麥、竹葉同煎湯調亦可

●治妊娠傷寒大熱令胎不落方

竈底黃土爲末

右用新水調塗臍下周迴五六寸乾卽復塗頻頻爲之熱退乃止方或用酒及泔淅調皆可

●治妊娠小便卒不通方

裹茶蒻葉一兩（燒灰、研）　滑石半兩（研細）

右同研勻每服一二錢用臘茶清調入生油二三點服只沸湯調亦得

●又方

赤蓮珠甘遂

右爲末每服一字至半錢湯調下（如喫了藥、且不得喫有甘草藥半日或一日、緣二藥相反故也）

產前方

●榆皮滑胎散妊娠入月宜服之多往往坐蓐不覺胎下如未入月不可先服

榆白皮二兩（切、焙）

右爲細末每服二錢煎糯米飲調下空心食前服

●墨神散催生及治橫逆生服之卽順

百草霜

右爲細末每服二錢用米醋、薑子小便各少許調成稀膏沸湯浸至六分盞溫服

●催生桂散有三五日不能產者只一服再服神驗

官桂（去皮、曬乾、不得見火）

右爲細末每服二平錢沸湯或薑子小便調下

●治難產或橫倒生或胎死不出母氣欲絕方

半夏（湯泡七遍、焙乾）　白歛

右等分爲細末每服二錢酒調下不能酒者湯調小難一服橫生二服倒生三服胎死四服加麝香一倍尤良

●又方治應于難產胎衣不下只三服

以蛇皮燒過或以銚子炒微黑

右研細入麝香少許用熟湯調通口服之每服一錢

●又方

車前子（不以多少）

右爲細末用熟湯或小便調服二錢

●又方

雲母粉半兩

右以酒調二錢卽產不順者卽順下

●易產方

當歸一兩半（去蘆頭、切片、焙）　桑寄生半兩（擣碎）　川芎一兩（剉碎）

右爲麤末每服四錢水酒各半盞煎至六分去滓通口服不計時

●小琥珀散安胎氣調血脈應是產前產後血氣諸疾俱能療治神效

川芎六兩（擣顆如核桃肉者、生用）　川當歸去尖梢蘆頭淨四兩（好酒浸一宿、慢火炙令黃色、不得焦、候冷切細）　桑寄生二兩

右焙乾搗羅爲末每服二錢水八分盞煎至六分卻入好酒二分更煎三兩沸溫服孕婦臨月空心一服至臥蓐時胎滑易生惡物亦少新血便生臟腑自然不痛

●下死胎方

朴消一兩

右爲末每服二錢溫童子小便調下菁因產試之極驗

●下鬼胎方婦人稱孕坐產乃不下有經三五日者乃鬼胎也

鴉椒二兩（去目、微炒）　葱二握　桃頭枝十四枚

右用水一斗煮熟乘熱傾盆器中令婦人坐上蒸蒸之當自散

●治草蓐或產後血暈悶絕兼治蹶死、卒死、溺死、縊死等罰之五絕卒中風牙關緊氣不通用之亦驗

生半夏一兩

右爲細末用一豆許蘆管吹入鼻竅中卽甦

產後方

●牛膝湯治胞衣不出令胞自爛

牛膝（酒浸一宿、控乾、切碎、焙乾）　瞿麥（剉）　各一兩　滑石二兩（擣碎）　當歸三分（去蘆頭、切片、焙）　通草一兩半（切）　葵子二合半

右六味用水九盞煎取三盞分作三四服

●當歸建中湯治產後虛羸不足腹中疞痛呼吸短氣或小腹拘急痛引腰背不能飲食凡產後一月內服三四劑爲善令人丁壯古方云產前安胎四物湯產後補益建中湯者謂此也

當歸二兩（剉去蘆、焙）　官桂一兩半（剉去皮、研）　白芍藥三兩　甘草一兩（炙）

右爲麤末每服四錢水一盞半生薑五片棗二個同煎七分盞去滓入餳少許再煎微熱服空心食前

日三服。如喜嘔人不用入餌。

◉聖功川芎湯。治產後血虛迷悶。旋運、耳鳴。不省人事。胸膈不快。惡心嘔噦。化惡血。生好血。尤治血崩、血暈亦治頭疼發熱如傷寒證者。治病甚多。此產家之要藥也。

大芎半兩。　當歸一分。去蘆。

右二味細剉。作一劑。用水一盞半。好酒一盞。同煎至一盞半。分二服。如新產血未定。及平常飲酒少人。但只用水二盞。煎兩個六分盞。卻將童子小便添成二個八分盞服之。

◉琥珀黑神散。治產婦十八惡證。凡臨產宜進一二服。能安神順胎。產後雖無疾。七日內亦日進一二服。能去諸疾。嚇驚。若偶被驚恐。或變證。當連服取效。

琥珀別研如細末。　辰砂別研。　各二錢。　麝香別研。　好墨燒過研。　白殭蠶炒。　各一錢。　當歸末　鯉魚鱗灰　百草霜　白附子末　黑衣無即以鍋上倒過黑處衣燒灰代。　各三錢。

右十味研勻。每服二平錢。炒生薑酒和童子小便調湯。溫服。如產後崩中。狀似雞肝。寒熱閉悶。或產後四肢浮腫及寒熱。當先服此散。次服通宣圓。

◉通宣圓

巴豆一十五粒。去心膜。生絹袋盛於醋灰汁中。煮十沸。取出。用紙厚裹。壓於重物下出油。研成霜。卻取黑神散三錢匕。無灰酒調成稀膏。入瓷器中。於鐺內重湯煮令稠。入巴豆霜和令可圓。

右圓如菉豆大。每服五圓。熟水下。有村婦用赤蜀落胎不能下。子蜀於腹中臍穿。時出小腎。病極。朱子東遂用此圓下枯竹一具而愈。此圓頗難用。須審之。

◉八味黑神散。治產後百疾。唯瀉而加喘者。本方不治。凡產後雖無疾。日進二服。能調血順氣。去諸疾。服七日止。

當歸去蘆頭。酒浸。焙乾。　白芍藥剉。　乾薑炮裂剉。　甘草炙、剉。　各半兩。　黑豆一兩。炒。　桂去皮、不見火。剉。　熟乾地黃剉、焙。　蒲黃紙襯鐵炒香用。

右爲細末。每服二錢。溫酒、米飲、童子小便。任意調服之。

◉烏金散。治產後胞衣不下。或惡露不快。敗血衝心。血逆狂語。不省人事。心煩躁渴。臍腹疼痛。嘔吐、發熱。增寒胞滿。或攻皮膚刺痛。凡產後半月內。雖無疾。宜日服之。有疾加進。

黑豆四兩。淨揀。　黃連半兩。去須。剉碎。　生薑四兩。切作片子。　當歸去蘆頭。薄切。　蓬莪茂剉。　各一兩。　櫻皮二兩。擣碎。

右先下生薑、黑豆炒。直候薑將乾。次下黃連、當歸同炒。更候豆心透紫色。即以櫻皮點火。入藥鐺中與所炒藥同燃。至櫻皮成燼。即傾淨地上。鉢覆之。少頃。取爲細末。每服二錢。童子小便調下。

◉劉寄奴飲。治產後惡露不快。敗血上攻。心胸煩躁。大渴悶亂。服黑旋運。或見鬼神。臍腹疼痛。嘔噦惡心。不進飲食。

劉寄奴二兩。擣去梗草、紙。　當歸一兩。去蘆頭、切、焙。　甘草二錢。炙、剉。

右爲麄末。每服二錢。水一盞半。生薑七片。煎至七分盞。去滓熱服。凡治血暈藥。須乘閑煎下。以備急用。

◉當歸一味散。治產後諸疾。調養血氣。王子亨擅迷論。言產後不必服補藥。唯此一散足矣。

當歸三兩。去蘆頭。切片。焙。

右爲細末。每服二錢。童子小便或酒調下。日三服。從產下便服之。

◉荊芥一味散。治血禁、中風等疾。取効爲快。無疾服之。能順氣、益血、清神。

荊芥穗曬乾。不見火。

右爲細末。每服二錢。童子小便調下。七日後沸湯調。以當飲茶甚佳。

◉秤槌酒。治產後疾最多。尤治兒枕不散作痛。

鐵秤槌燒通赤。

右淬一升醇酒中。候酒再溫。可飲之。調當歸末服尤効。

◉豆淋紫酒。治產後中風。身瘛直。或如角弓反張。

黑豆揀緊小者。淨篩一升。炒令煙出。以好酒三升浸。卻漉出豆不用。

右每服一小盞。能飲者加之。

◉產婦忽患寒熱。如傷寒、時氣狀。切不可用麻黃藥發其汗。以亡津液多故也。宜服四物湯加桂服之。

四物湯方在後。

◉治產後傷寒惡露不行。腹脹煩悶欲死方。

朴消生。　大黃生。

右等分爲細末。每服二錢。取桃仁去皮尖及雙仁者碎之。濃煎湯調下。以通爲度。樊逢取妻熱病小產後。惡露爲熱所搏不行。苦腹脹、煩悶、枯竭。舌上如生針刺。醫以朴消煎湯令漱口。得稍潤。用大黃煮醋調服一大錢。得通快而愈。與此略同。

◉傷寒產後。惡露爲熱搏不行。煩悶、脹喘狂言。宜服抵當湯、及桃仁承氣湯。鼎安常用之驗。指迷論亦云。胞論云、若服之十病十瘥。

◉桂心牡礪湯。產後頭疼。身體壯熱。兼治腹內急痛。

桂心一兩半。略去皮。不見火。　牡礪燒通赤。　白芍藥剉碎。　熟乾地黃切、焙。　各二兩半。　黃芩一兩。剉碎。

右件剉如麻豆。每服抄四五大錢。水一盞半。煎至七分盞。去滓。溫服。

◉增損柴胡湯。治產後虛羸發熱。飲食不進。少腹脹等疾。

柴胡去苗、水洗過。焙乾。剉焙。　人參去蘆、切片子。焙。　半夏湯泡七遍。切片子。　甘草炙。　白芍藥剉。　陳皮去白。　芎洗、剉。

右七味。等分爲麄末。每服四五錢。水一盞半。生薑五片。棗二個。煎至七分盞。去滓。溫服。日二三服。不拘時。

◉人參散。治產後虛羸。脾胃怯弱。四肢無力。不思飲食。心腹氣脹。

人參（去蘆、切片子、焙）　黃芪（蜜炙、用漿水拌蒸內、慢火炒、次焙）　草豆蔻（略煨、去皮、剉）　附子（炮、裂、去皮臍、切片子）　厚朴（削去粗皮、益智（洗去鹽、切片子、焙）　木香（剉、微煨）　川芎（洗、剉）　陳橘皮（去白）

剉一宿、次日取出曬、焙乾）

白芍藥（剉）　桂（去粗皮、不見火）　白茯苓（去黑皮、剉）　甘草（炙、剉）　各一兩。　訶子皮

高良薑（剉碎、用油少許炒透）　各一分半。

右十六味為麤末。每服四錢。水一盞。生薑五片。棗子二枚。煎至六分。盞去滓。溫服。

◉治產後惡露不絕。

牡蠣（煅通赤）　龜甲（好醋浸、炙黃）

右等分為細末。每服二錢。酒調下。

◉治產後洞泄不禁。下青黑惡物。神驗方。（灌腸者。惡露必不行。產血盡入大腸為腫也。分過則愈。）

荊芥四五穗大者。烘乾。

右於乾蓋中燒成灰。（不得見火。）入研了麝香一米粒許。用沸湯一兩呷調下。藥微而能愈大病。奇効不可言。

◉治產後下痢。亦白膿血方。

白芍藥（剉）　熟乾地黃（切、焙）　各二兩。　阿膠（剉、用蛤粉炒同炒起。臨去粉）　艾葉（揀淨、剉碎）　當歸（去蘆頭、切片子）

甘草（炙、剉）　各一兩。

右為麤末。每服六錢。水二盞。煎至八分。盞去滓。溫服。

◉若產後大便頻。腹疼如痢狀者。傷於食也。宜服食藥。或應圓為佳。他亦可用。（疏前飲食不著。未久而產。產後亦成痢狀。不必推求產後食故多少也。）

◉治吹奶腫硬。須急用手忍疼捱揉之可散。不爾。當成乳癰。宜服此藥。

皂莢（燒存性、研細）　蛤粉

右等分研勻。溫酒調下半錢。未散稍加。服藥次仍以手揉之。

◉治吹奶。或兒絕奶後腫痛不可忍方。

栝蔞一個（去皮、先取子研破殼、次同搗剉研）

右以酒漬。同熬數沸。去滓。浸冷酒。和令可飲。隨量飲之。令微醉。睡醒痛當頓除去。

◉萬金散。治奶癰已破。兼治發背、臁瘡。

瓜蔞一個（去皮、細剉）　生甘草半兩。　沒藥一分（研令）

右同研。用酒九盞。石器中熬至三盞。分三服。疾輕者只一服効。本注云。已救活數百人。

◉通用四物湯。治婦人女子月事。或多或少。或前或後。姙娠腹痛。胎氣不安。產後血塊不散。或亡血過多。或惡露不行。凡婦人之疾。無不主治。本方及加減法如後。

當歸（去蘆頭、切片、焙）　川芎（洗、剉）　熟乾地黃（切、焙）　雪白芍藥（剉）

右等分為麤末。每服四錢。水一盞半。煎至八分。盞澄取六分。清汁。帶熱服。平常產乳服至三腸。虛弱人服至一月。○姙娠下血。加艾五七葉。阿膠末抄一錢。（此每服也。）若疾勢重大。小料未効。當以四味各半兩。細剉不搗。以水四盞。煎取二盞半。去滓。分四服。一日之中令盡。為度。未効再服。隨疾加減用藥。○因虛致熱。熱與血搏。口舌乾渴。加栝蔞一兩、麥門冬三分。○腹中刺痛。惡物不下。加當歸、芍藥各一分。○血崩。加地黃、蒲黃各一兩。○因熱生風。加芎一分、柴胡去苗半兩。○身熱脈燥。頭昏項強。加柴胡去苗、桔梗各半兩。○祕澁。加大黃半兩、桃仁一分。（去皮尖、炒）○泄瀉。加桂、附子一分。○嘔。加白芨、人參各半兩。○腹脹。加厚朴、枳實各一分。○發寒熱。加乾薑、牡丹皮、芍藥各一分。○虛煩不得眠。加竹葉、人參各一分。○煩躁大渴。加知母、石膏各半兩。○水停心下。微吐噦。加豬苓、茯苓、防己各一分。○虛寒狀類傷寒。加人參、柴胡、防風各三分。

此活人書加減法也。大抵四物湯為婦女要藥。無所不治。稍知藥性者。皆可隨病加減。治血方。未有不本此湯。因而增損以成者。近時名醫有加香附子。功用殊勝。又有加蓬莪茂、官桂各半兩。名六合湯。治經血凝滯。潮熱。腹中癖塊疼痛。尤快。皆以意加之也。

◉追命散。治婦女血癥。積聚疼痛。漸致經候隔絕。稍失醫治。便成勞瘵。又治產婦危惡變證。胎死上衝。悶運欲絕。及產後血運。他藥所不能救者。又治打撲傷損。筋斷、骨折。及破傷風。凡此等疾。證候危惡。醫工縮手。無藥可治。此能治之。有起死返魂之功。雖其人氣已死。但心頭尚暖者。灌之。藥下咽可以再生。（先用前半夏吹鼻法。然後下藥。神功奧効。不可具述。）

半兩錢四五十文。多尤佳。（乃古文錢中。上作半兩字者。錢有大小。皆可用。錢中常有之。）　火煅通赤。淬醋。醋中不計次數。於醋底淘取淬下碎銅末研之。篩凝乳鏟者去之。別以水淘澄。取如粉者。紙上滲乾。秤二錢一字。（煅錢之法。取小鐵鍋盛。坐炭爐之。候通赤。以二錢手鉗。用一鉗出火。一鉗夾鍋塩。倒錢。入醋中。鍋物勿著醋。恐淬下錢屑也。再取錢。水洗過。上鍋塩。再煅之。如是數次。錢色如銀。即無可煅矣。本方用銅線穿煅。入火便斷。徧設力。不可用。）

巴豆去皮殼心膜。秤三錢半。（用醋煮水一盞。煮至水欲盡。焙乾。研如泥。）

大黃錦紋緊實者。取八錢。（用小便浸七日。每日一換。日足。濾紙裹。煨熱。剉切。焙乾為末。秤取三錢半。）

羊腰炭。即炭中圓細緊實如羊腰骨者。取三四寸。卻作十餘段。別以醬炭同燒通紅。淬入醇酒中。如是七遍。烘乾為末。秤取半兩。

右四味合和。搗數千杵。乾蕘罐子實築。膈紙密封。收高燥處。每一服一字至半錢。濃煎當歸酒和小便調下。消息之。傷折即全用酒。多飲不妨。若產婦血未定。及素飲酒少人。即姑少借酒力行藥。多以童子小便下之可也。此藥最立奇効。治者數人。皆垂死而復活。已折而復續。轉以與人。所濟又不知數。難產悶絕而復蘇者。余今要是也。故知此藥為最審。傳者幸勿疑其服眩。蓋不如此則不足以當奔敗之血。且疾勢既危。固非平劑之所能愈也。服藥後或如藿亂狀。勿怪。少選當自定。下利甚者。用前燒荊芥法止之。此皆手試而親驗者。故併錄以傳。（大抵此藥性緊。非大危急。不可妄服。）　此藥難成。非素備不可得也。每遇有姙娠

將產。必合一料以備用。往往常有餘劑。藥成或轉以與親識之喜蓄藥者。故此藥所濟爲多。陸子正國。婦人娩蓐。命如垂縷。臨時濟急。全藉藥石之功。方書所載。雖已詳備。倉猝之際。非唯泛濫難於檢尋。且莫知其孰爲効驗者。妄投一藥。則不可復療。余得此本。皆撮諸家精要之方。累試累驗。乃屬倅陸子正手抄之書也。唯親傍間可以傳之。他人不可得而見。余雖不欲祕藏。而傳本未免訛繆。其爲害豈淺耶。今重校證。庶幾危急之時。閱此方如指諸掌也。嘉禾寓菴周澂題。

衛生家寶產科備要卷第八

形初保育

小兒初生將護法

巢氏病源。小兒始生。肌膚未成。不可暖衣。暖衣則令筋骨緩弱。宜時見風日。若都不見風日。則令肌膚脆軟。便易損傷。皆當以故絮著衣。莫用新綿也。天和暖無風之時。令母將抱日中嬉戲。數見風日。則血凝氣剛。肌肉硬密。堪耐風寒。不致疾病。若常藏在幃帳之內。重衣溫暖。譬如陰地之草木。不見風日。軟脆不任風寒。又當薄衣薄衣之法。當從秋習之。不可以春夏卒減其衣。不則令中風寒。從秋習之。以漸稍寒。如此則必耐寒。冬月但當著兩薄襦一複裳耳。令不忍見其寒。適當佳耳。愛而暖之。適所以害也。又當消息。無令汗出。汗出則致虛損。便受風寒。晝夜寤寐。皆當護之。其飲乳、食哺。不能無痰癖。常當節適乳哺。若微不進。切當將護之。凡不能進乳哺。則宜下之。如此則終不致寒熱也。又小兒始生。生氣尚盛。無有虛損。微惡則須下之。所損不足言。及其愈病。則致深益。若不時下。則成大疾。疾成則難治矣。其冬月下之難將護。然有疾者不可不下。夏月下之後。腹中常當小脹滿。故當節哺乳。將護之。數日間又哺。哺之當令多少有常劑。兒稍大食哺亦當稍增。若減少者。此是腹中已有小不調也。便當微將藥。勿復哺之。但當乳之。甚者十許日。輕者五六日。自當如常。若都不肯食哺。而但飲乳者。此是有癖。爲疾重。要當下之。不可不下。不下則

致寒熱。或吐而發癇。或致下利。此皆病重不早下之所爲也。則難治。先治其輕時。兒不耗損而病速除矣。小兒所以少病癇者。其母懷娠時時勞役。運動骨血。則氣強胎養盛故也。若侍御多。血氣微。胎養弱。則兒軟脆易傷。故多病癇。兒背須著帽項衣。取燥菊花爲枕。枕之。兒母乳兒三時。摸兒項風池。若壯熱者。即須熨使微汗。微汗不差。便灸兩風池及背第三椎、第五椎、第七椎、第九椎兩邊各二壯。與風池凡爲十壯。一歲兒七壯。兒大者以意節度增壯數。可至三十壯。唯風池特令多。十歲已上可百壯。小兒常須護護風池。趙云。戒養小兒。謹護風池。風池在頸項筋兩輪之邊。有病乃治之。疾微謹不欲妄針灸。亦不用輒吐下。惡藥乃云、立夏後疾篤不欲妄針灸、亦不欲輒吐下。所以然者。針灸傷經絡。吐下動腑藏故也。但當以除熱湯浴之。除熱散粉之。除熱亦膏摩之。又以膏中膏塗之。令兒在涼處。勿禁水漿。常以新水洗。新生無疾。謹不可逆針灸。逆針灸則忍痛。動其玉脈。喜因成癇。河洛間土地多寒。兒喜病痙。其俗生兒三日。喜逆灸以妨之。又灸頰以防噤。有噤者。舌下脈急。牙車解急。其土地寒。皆決舌下去血。灸頰以治噤。江東地溫無此疾。古方既傳有逆針灸之法。今人不詳南北之殊。便按方用之。多害於小兒。是以田舍小兒任自然。皆得無此天。又云。春夏決定不得下小兒。所以爾者。小兒腑藏之氣軟弱。易虛易實。下則下焦必虛。益上焦生熱。熱則增痰。痰則成病。自非當病不可下也。

千金論。生兒宜用其父故衣裹之。生女宜以其母故衣。皆勿用新帛爲善。不可令衣過厚。令兒傷皮膚。害血脈。發雜瘡而黃。兒衣綿帛。特忌厚熱。謹之謹之。

聖惠論。凡小兒一非之內。造兒衣裳。皆須用故綿及故帛爲之。不得以綿衣蓋於頭面。冬天可以袷衣蓋頭。夏月宜用單衣。皆不得著面。及乳母口鼻吹著兒顏。凡綿衣不得太厚。及用新綿。令兒壯熱。或即發癇。特宜謹之也。

聖惠論。凡兒初匐已後。逢物即喫。姊母雖至細意。必亦不能盡覺。春夏必飲潛冰冷物。至秋初便皆疾作。初則多啼不食。或好伏地。面色青黃。或時腹痛。既不解說。唯反拗多啼。或逢水漿便喫。不可制止。或嚥中驚啼。或大便祕澀。常人唯知與紅雞、鈎藤飲子。此二藥終日在口。然自不見其效。況腹中滯結已多。冷熱衝擊頗久。二藥何能排去。所以得秋氣風吹著背心。即心便成癇。菊、甫腎與冷藥。則傷滑不禁。與澀藥則氣壅不行。傷損藏腑。益令不食。遂使虛熱衝上。面黃髮焦。滯惡在內。手足如火。自然風次橫溢。四肢便脆。如此將養十無一存。但每經春夏。不問有病無病。便須與四味飲子。多不三四劑。即康強也。

張渙論。嬰兒生後兩滿月。即目曉子成。能笑識人。乳母不得令生人抱之。及不令見非常之物。百晬任脈生。能反復。乳母當存節喜怒。適其寒溫。半晬尻骨已成。乳母當教兒學坐。二百日外。掌骨成。乳母當教兒地上匍匐。三百日腦骨成。乳母當教兒獨立。周晬膝骨已成。乳母當教兒行步。上件並是定法。蓋世之人不能如法存節。往往抱兒過時。損傷筋骨。切宜識之爲吉。

張渙論。嬰兒冬月但當著夾衣及衲衣之類。極寒即漸加以舊綿。人家多愛子。乃以綿衣過厚。適所以爲

審也。

張渙論嬰兒須看窠受南北之殊用藥蓋地土寒溫不同此古人之最爲謹也。嬰童寶鑑論孩子春勿覆頂、蓋足致陽氣亡出故多發熱衣物夜露多生天鬱三歲之中勿太飽勿太飢臥須覆肚食須飲水漿若能如此者則子少患而無夭傷矣。

萬全方論田舍婦人產育皆不知小兒初生將護之法所養有絕無他疾者。蓋之凡草、凡木生於深山、大澤之中容易合抱至於奇材異果縱加培擁間有不秀實者此豈貴賤之理有異哉蓋天之於物出於自然古人亦云小兒始生肌肉未成不可暖衣卽令筋骨緩弱宜見風日若都不見風日卽令肌膚脆收便易傷損皆以絮著衣內勿用新綿天氣和暖無風之時令乳母抱兒日中嬉戲數見風日卽血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒以田舍小兒較之此說尤長。

擇乳母法

千金論乳母者其血氣爲乳汁也五情善惡悉是血氣所生也其乳兒者皆宜識於喜怒夫乳母形色所宜其候甚多不可求備但取不胡臭、瘦、羸、氣、嗽、鵝疥、癡癲、白禿、癰瘡、瘙唇、耳聾、齆鼻、癲癇、具此等疾者便可飲兒也但見其故灸瘢便知其先疾之源也。

乳兒法

聖惠論凡爲乳母皆有節度如不禁忌卽令孩子百病並生如是自嗜鹹酸可致孩子無疾長壽是以春夏切不得衝熱哺孩子必發熱痟并嘔逆秋冬勿以冷乳哺孩子必令腹脹羸瘦乳母嗔怒亦不得哺孩子必患狂邪乳母醉後不得哺孩子必患驚癇天鬱急風等病乳母有娠不得哺孩子必患胎黃及脊疳乳母有疾不得哺孩子必患癲癇風病乳母吐後不得哺孩子必令嘔逆羸瘦乳母傷飽不得哺孩子必致多熱喘急。

乳母雜忌法

聖惠論乳母忌食諸豆及醬、熱麵、韭、蒜、蘿蔔等可與宿煮羊肉、鹿肉、野雞、鴈、鴨、鯽魚、葱、雞、蔓菁、蒿苣、菠薐、青麥、荊蕁、冬瓜等食若兒患疳卽不得食羊肉及魚又不得油膩手裹及抱兒又不得以火炙襁褓熱時便與兒著令孩子染熱病始終須謹大抵冬中切宜戒之若天大寒以火炙衣被且拋向地上良久熟按之冷暖得所卽與孩子裹之無妨如乳母有夫不能謹卓者切須防備儻新有過犯氣息未定便卽乳兒者必能殺兒未滿月內所驅使人亦不得令有所犯到於兒前惡氣觸兒兒若得疾必難救療也。

哺兒法

堯和衆云小孩初生七日助穀神以導達腸胃研粟米煮粥飲厚薄如乳每日研與半粟穀。

錢乙云小兒多因愛惜過當往往三兩歲猶未與飲食致脾胃虛弱平生多病自半年以後宜煎陳米稀粥取粥面時時與之十月以後漸與稠粥爛飯以助中氣自然易養少病惟忌生冷、油膩、甜物之類。

浴兒法

千金論凡浴小兒湯極須令冷熱調和冷熱失所令兒驚亦致五臟疾也凡兒冬不可久浴浴久則傷寒夏不可久浴浴久則傷熱數浴背冷則發癇若不浴又令兒毛落新生浴兒者以豬膽一枚取汁投湯中以浴兒終身不患疥疥勿以雜水浴之兒生三日宜用桃根湯浴桃根、李根、梅根各三兩枝亦得咬咀之以水三斗煮二十沸去滓浴兒兒去不祥令兒終身無疥疥治小兒驚辟惡氣以金虎湯浴金一斤、虎頭骨一枚以水三斗煮爲湯浴但須浴卽煮用之。

拭兒口法

千金論曰小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上胥泥惡血此謂之玉衡若不急拭啼聲一發卽入腹成百病矣千金翼云成痞病死。

聖惠論凡兒初飲乳後以髮纏指沾清水點拭了沿齒根上有黃筋兩條便以薤刀子割斷點豬乳便差如兒口難開但先點豬乳自開。

小兒集驗方云小兒初生每日以井華水或微溫水將潔靜裹帕子裹乳母手指蘸水揩拭小兒口中因而揩舌及兩頰令稍寬舒卽不生口噤積熱風疾等病京畿與山東人多能之謂之揩兒口拭畢仍用少研細入麝香乾坯子煙脂塗口中令兒美乳食。

小兒集驗方云凡平有一老嫗善與小兒拭口使不生鵝鵝銀云小兒上下脣與齒齦相連處背有一筋牽引若上脣筋緊卽生上鵝下脣筋緊卽生下鵝上鵝生齒滿頭或生眉間如有癬狀瘙痒不已時復流出黃汁汁至處又生瘡若下鵝則起腰背漸至四肢亦如癬狀亦瘙痒黃汁不已若疾纏不治或頭面上下相通累年不效又咬折或成大疾惟是每日早晨取溫水一盞令其乳母以故帙潔靜帕子包手第二指蘸溫水拭兒口水中渲下又拭又揩使兒口中淨及揩上下筋令寬舒卽小兒自美乳食諸疾不生亦永無鵝銀惟使筋寬舒是法京畿見小兒失揩變爲口噤不喫妳或不解揩而生鵝銀者不可勝數。

斷臍法

千金論曰凡斷臍不得以刀子割之須令人隔單衣物咬斷兼以暖氣呵七遍然後纏結所留臍帶令至兒足趺上短則中寒令兒腹中不調常下痢若先斷臍然後浴者則臍中水臍中水則發腹痛其臍斷訖連臍帶中多有蟲宜急剔撥去之不爾入兒腹成疾斷兒臍者當令長陸寸長則傷肌短則傷藏若不以時斷及揩汁不盡則令暖氣漸微卽自生寒令兒臍風。

嬰童寶鑑論小兒斷臍云凡小兒生下可先浴而後斷臍及可以衣裹而口齧之不然則刀斷如刀斷者則以剪刀先於懷中煖令暖方用又斷之則臍帶不可令長只如子足長短短卽中寒而傷藏長卽傷腸先斷而後洗卽令水入臍中孩子多夭病痛苦啼叫面青黑爲中水患也臍若短卽腹中不調常下痢有中寒之患其臍不可傷動傷動卽令久不乾如不乾卽傷外風傷外風卽口噤小兒不可救也。

鄒要指迷論曰嬰兒初生剪去臍帶切令剪刀煖不可傷冷及外風所侵。

灸臍法

聖惠云。小兒生一宿。抱近明無風處。看臍上有赤脈直上者。當時於脈盡頭灸三壯。亦散無患矣。

裹臍法

千金論。凡裹臍法。椎治白練令柔軟。方四寸。新綿厚半寸。與帛等合之。調其緩急。急則令兒吐哽。兒生二十日。乃解視臍。若干許甘兒怒啼。似衣中有刺者。此或臍燥還刺其腹。當解之。易衣更裹。裹臍時閉戶下帳。燃火令帳中溫暖。換衣亦然。仍以溫粉粉之。此謂冬時寒也。若臍不愈。燒絳帛末粉之。若過一月。臍有汁不愈。燒蝦蟆灰粉之。日三四度。千金翼云。燒蝦蟆灰。治末粉臍中。又云。若臍未愈。乳兒太飽。令兒風臍也。若臍中水及中冷。則令兒腹絞痛。夭紐啼呼。面目青黑。此是中水之過。當炙粉絮以熨之。不時治療。臍至頗者。當隨輕重。重者便灸之。乃可至八九十壯。輕者臍不大腫。但出汁時時啼呼者。擣薑歸末和胡粉傅之。炙絮日熨之。至百日愈。以啼呼止爲候。若兒糞青者。冷也。與臍中水同。

甘草法

葛氏肘後方。小兒新產出。未可與朱蜜。取甘草如中指節。炙碎。以水二合。煮取一合。以綿點兒口中。可得一蚬殼止。兒當便吐胸中惡汁。此後待兒飢渴更與之。若兩服並不吐。盡一合止。若得吐惡汁。兒智慧無病。

黃連法

小兒集驗方云。凡小兒初生。必有惡汁留於胸次。若不消去。即胸膈壅塞。易生蘊熱。煩躁癍癤。皆由此也。故小兒纔生。一臘之內。用好肥黃連數塊。槌碎。每少許厚。以綿包裹。如妳頭狀。湯內煑成黃汁。時復拈撫一二點。在小兒口內。即惡汁自下。乳食便美。其後或間以朱蜜與之。若見惡汁已下。即已有只用空綿包。別浸黃連蘸苦汁與之者。

豬乳法

千金論曰。凡新生小兒。一月內常飲豬乳大佳。

聖惠法。凡取豬乳。須令豬兒飲母次。便提豬兒後脚起。雖乳急搖之即得。空搖無由得汁。

張渙論。嬰兒初生滿月內。常時時旋取豬乳滴口中。最爲佳矣。

藏衣法

外臺崔氏。凡藏兒衣法。兒衣先以清水洗之。勿令沙土草汚。又以清酒洗之。仍內錢一文。在衣中。盛於新瓶內。以青帛裹其瓶口上。仍密蓋頭。且假便宜處。待滿三日。然後依月吉地。向陽高燥之處。入地三尺埋之。瓶上土厚一尺七寸。唯須牢築。令兒長壽有智惠。若藏衣不謹。爲豬狗所食者。令兒顛狂。蟲蟻食者令兒病惡瘡。犬鳥食者令兒兵死。近社廟傍者令兒兒鬼。近深水湾池。令兒溺死。近故窟傍令兒驚惕。近井傍者令兒病聾盲。弃道路街巷者。令兒絕嗣無子。當門戶者令兒聲不出。耳聾。著水流下者令兒背盲。弃於火裏者令兒生爛瘡。著林木頭者令兒自絞死。如此之忌。皆須一謹之。

外臺崔氏又安產埋及藏衣天德月空法。

正月、天德在丁。月空在丙壬。
二月、天德在坤。月空在甲庚。
三月、天德在壬。月空在丙壬。
四月、天德在辛。月空在甲庚。
五月、天德在乾。月空在丙壬。
六月、天德在甲。月空在甲庚。
七月、天德在癸。月空在丙壬。
八月、天德在艮。月空在甲庚。
九月、天德在丙。月空在丙壬。
十月、天德在乙。月空在甲庚。
十一月、天德在巽。月空在丙壬。
十二月、天德在庚。月空在甲庚。

凡藏兒衣。皆依此法。天德、月空處埋之。若有遇反支者。宜以衣內新瓶盛。密封塞口。掛於宅外福德之上。向陽高燥之處。待過月然後依法埋藏之。大吉。

外臺崔氏又法。甲寅旬日。十日不得藏埋兒衣。以瓶盛密封。安置空處。度十日即藏埋之。

外臺崔氏又法。甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申。此五日亦不藏兒衣。須盛瓶中。密塞勿令氣通。掛著兒生處。過此五日即埋之。亦不得更過此日。

外臺崔氏又法。甲乙日生兒。丙丁日藏衣吉。丙丁日生兒。戊己日藏衣吉。戊己日生兒。庚辛日藏衣吉。庚辛日生兒。壬癸日藏衣吉。

子母秘錄。藏衣法。先用一罐盛兒衣。先以清水洗。次以清酒洗。次入大豆一合。次小豆一合。次城門土、市門土、獄門土、葱園中土、韭園中土各一合。重重覆之。上用五色帛各一尺五寸。重重繫罐口。上用鐵劵朱書云。大豆某胡去無摹。小豆歷歷去子癖。城門土見公卿。市門土足人行。獄門土辟盜兵。葱韭園土剪復生。與兒背。令兒壽命得長生。與兒赤。令兒身命皆清吉。與兒白。令兒壽祿皆千百。與兒皂。令兒長壽不衰老。與兒黃。令兒潔淨去百殃。急急如律令。將此令於一尺二寸鐵葉上。先用淨墨塗遍。上以朱砂寫此語令在上。置在罐口上。且放便處。待滿三日。然後於月吉向陽高燥之處。入地三尺埋之。罐上令土厚一尺七寸。唯須牢築。使兒長壽有智慧。

剃頭法

外臺崔氏初剃兒頭良日。

寅丑日吉。　丁未日凶。

集驗方。京畿初剃小兒頭。不擇日。皆於滿月日剃頭。蓋風俗所尚。前此產婦未得出房。滿月即與兒俱出。

以解胎髮穢惡。多觸神穢。小兒不安。故此日必剃頭而出。剃頭於溫煖避風處剃之。剃後須以生油、杏仁、鼠粉頭上擦之。以辟風邪。其後小兒剃頭亦宜用此。

禳謝法

外臺崔氏禳謝法。

軒轅者乾神。天丞相使者。風伯。犯之令兒驚吐。可取梨枝六寸。埋生處。大吉。

雷公者震神。太陰使者。天馬。犯之令兒煩悶腹滿。解之以三屠家肉爲餅。於產處謝之。大吉。

咸池者坎神。天之雨師使者。犯之令兒嗜不止。用羊脯酒於生處謝之。

豐隆者艮神。天之東明使者。天僕也。害氣。犯之令兒乍寒乍熱。大腹。以白魚二枚於生處謝之。又大豆一升。投井中。亦大吉。

招搖者坤神。天上使者。犯之令兒驚。空喝不止。以酒餅生處謝之。卽愈。

天候者巽神。天一執法使者。犯之令兒腹脹、張服。以白魚二枚於生處謝之。吉。

吳時者離神。天一將軍遊擊使者。犯之令兒驚、腹痛。用馬脯五寸。於生處謝之。吉。又以白魚五枚。并衆餅埋其生處。吉。

大時吉兌神。小時北斗使者。犯之令兒腹脹下痢。解之以酒脯。於生處謝之。又以大豆一升。投井中。吉。

犯月殺者。令兒驚啼。用丹雄雞血於生處謝之。吉。

犯白虎者。用稻米一升。雞子三枚。於生處謝之。吉。黍米亦得。

犯大夫者。用羊肝三枚。及稻米一升。於生處謝之。吉。又用雞、羯羊脾。黍米亦得。

犯日遊者。令兒口噤、色變欲死者。用三屠家肉麥飯。於生處謝之。吉。

初生不作聲

千金論云。兒生落地不作聲者。取暖水一器灌之。須臾當啼。又云。兒生不作聲者。此由難產少氣故也。可取兒臍向身卻捋之。令氣入腹。仍呵之至百度。啼聲自發。亦可以葱白徐徐鞭之。卽啼。兒始生卽當舉之。遲晚則令中寒。腹內雷鳴。乃先浴之。然後斷臍。

初生不喫奶

巢氏病源。小兒難乳候。凡小兒初生。看產人見兒出。急以手料拭兒口。無令惡血得入兒口。則兒腹內調和。無有病疾。若料拭不及時。則惡血穢露。兒咽入腹。令心腹痞滿。短氣。兒不能飲乳。謂之難乳。又兒在胎之時。母取冷過度。冷氣入胞。令兒着冷。至兒生出。則喜腹痛。不肯飲乳。此則胎寒。亦名難乳也。

初生吐不止

錢乙論。初生下拭掠兒口中穢惡不盡。咽入喉中。故吐。凡初生急須拭掠口中令淨。若啼聲一發。則咽下多生諸病。

初生有縣癰病

千金論曰。小兒出腹六七日後。其血氣收斂成肉。則口舌喉頰裏清淨也。若喉裏舌上有物。如蹙蹙狀者。名縣癰。有脹起者可以綿纏長針。留刃處如粟米許大。以刺決之。令氣泄。去青黃赤血汁也。一刺之止。消息一日。未消者來日又刺之。不過三刺。自消盡。餘小小未消。三刺亦止。自然得消也。有若舌下如此者。名重舌。有着頰裏及上齶如此者。名重齶。有着齒斷上者。名重斷。皆刺去血也。

初生有重舌

巢氏病源。小兒重舌候。小兒重舌者。心脾熱故也。心候於舌而主於血。脾之絡脈。又出舌下。心火、脾土。二藏母子也。有熱卽血氣俱盛。其狀附舌下近舌根生。形如舌而短。故謂之重舌。

◉葛氏肘後治卒重舌方

用燒蛇蛻皮爲末。唾和塗舌上。卽差。又用釜下土。苦酒和塗舌上。

初生有噤

巢氏病源。小兒噤候。小兒初生。口裏忽結聚。生於舌上。如黍粟大。令兒不能取乳。名之曰噤。此由在胎時熱入兒藏。心氣偏受熱故也。

長樂朱端章以所藏諸家產科經驗方編成八卷。刻版南康郡齋。淳熙甲辰歲十二月初十日

女科

傅山著

序

執成方而治病。古今之大患也。昔人云。用古方治今病。如拆舊屋蓋新房。不經大匠之手經營。如何得宜。誠哉是言。昔張仲景先生作傷寒論。立一百一十三方。言後世必有執其方以誤人者。甚矣成方之不可執也。然則今之女科一書。何爲而刻乎。此書爲傅青主徵君手著。其居心與仲景同。而立方與仲景異。何言之。仲景傷寒論雜症也。有五運六氣之殊。有中表傳裏之異。或太陽太陰。不一其源。或內傷外感。不一其原。或陽極似陰。陰極似陽。不一其狀。非精心辨症。因病製方。斷不能易危就安。應手卽愈。此書則不然。其方專爲女科而設。其症則爲婦女所同。帶下血崩。調經種子。以及胎前產後。人雖有虛實寒熱之分。而方則極平易精詳之至。故用之當時而效。傳之後世而無不效。非若傷寒雜病。必待臨症詳審。化裁通變。始無貽誤也。嘗慨後世方書。汗牛充棟。然或偏攻偏補。專於一家。主熱主寒。堅執謬論。炫一己之才華。失古人之精奧。仲景而後。求其間微鑒素。能收十全之效者。不數數覯。蓋微君此書。談症不落古人窠臼。制方不失古人準繩。用藥純和。無一峻品。辨症詳明。一目了然。病正者十劑奏功。病淺者數服立愈。較仲景之傷寒論。方雖不同。而濟世之功則一也。此書晉省

鈔本甚夥。然多祕而不傳。間有減去藥味。錯亂分量者。彼此參證。多不相符。茲不揣冒昧。詳校而重刊之。藉願家置一編。遇症翻檢。照方煎服。必能立起沉疴。並登壽域。或亦濟人利世之一端也夫。

道光十一年新正上元。同里後學鄒爾誠謹序。

序

青主先生。於明季時以諸生伏闕上書。詔袁臨侯冤事。尋得白。當時義聲動天下。馬文雨義士傳。比之裴瑜魏勏。國變後。隱居嵐嶋山中。四方仰望丰采。己未鴻詞之薦。先生堅臥不赴。有司敦促就道。先生卒守介節。聖祖仁皇帝旌其誠。降旨。傅山文學素著。念其年邁。從優加銜。以示恩榮。遂授內閣中書。聽其回籍。蓋其高尚之志。已久爲聖天子所心重矣。而世之稱者。乃盛傳其字學與醫術。不已細哉。字爲六藝之一。先生固皆究心。若醫者。先生所以晦迹而逃名者也。而名卽隨之。抑可奇矣。且夫醫亦何可易言。自後漢張仲景瓶立方書以來。幾二千年。專門名家。罕有窮其奧者。先生以餘事及之。遂通乎神。余讀兼濟堂文集。並觚賸諸書。記先生軼事。其診疾也微而臧。其用方也奇而法。有非東垣丹溪諸人所能及者。昔人稱張仲景有神思而乏高韻。故以方術名。先生既擅高韻。又饒精思。賢者不可測如是耶。向聞先生有手著女科並產後書二冊。未之見也。近得鈔本於友人處。乙酉、適世兄玉奎章來省試。具道李子耕中賢。至丙戌冬。果寄貲命付剞劂。甚盛德事也。故樂爲序而行之。並述先生生平大節。及聖朝廣大之典。不禁爲之掩卷而三歎也。道光丁亥夏五月。丹徒張鳳翔題。

女科上卷目錄 共三十八條三百九十四方

帶下
白帶 完帶湯
青帶 加減逍遙散
黃帶 易黃湯
黑帶 利大湯
赤帶 清肝止淋湯
血崩
昏暗 固本止崩湯
年老血崩 加減當歸補血湯
少婦血崩 固氣散
交感血出 引精止血湯
鬱結血崩 平肝開鬱止血湯

閃跌血崩 運脾止血湯
血海太熱血崩 清海丸
鬼胎
婦人鬼胎 逐鬼湯 紅花鮮藕散
室女鬼胎 逐邪散 調正湯
調經
經水先期 水大太旺 清經散 大旺水衝 開增湯
經水後期 溫經補血湯
經水前後無定期 定經湯
經水數月一行 助仙丹
年老經水復行 安宅湯
經水忽來忽斷時疼時止 加味四物湯
經水未來腹先疼 宣鬱通經湯
行經後小腹疼痛 調肝湯
經前腹疼吐血 順經湯
經水將來腰下先疼痛 溫肾化瘀湯
經水過多 加減四物湯
經前先洩水 鎮固湯
經前大便血 順經開安湯
年未老經水斷 奪經湯
種子
身瘦不孕 養精種玉湯
胸滿不思食不孕 開胃湯
下部冰冷不受孕 溫腎飲
胸滿少食不受孕 溫土暖胞湯
少腹急迫不受孕 寬帶湯
嫉妬不孕 開鬱種玉湯
肥胖不受孕 加味補中益氣湯

骨蒸夜熱不受孕清骨滋腎湯
腰酸腹脹不受孕升帶湯
便溏腹脹足浮腫不受孕化水種子湯

下卷 共三十九條四十一症四十二方二法

好娠

惡阻順脾益氣湯
浮腫加減補中益氣湯
少腹疼安胞二天湯
口乾咽疼潤燥安胎湯
吐瀉腹疼溫土固胎湯
子懸脅疼解鬱湯
跌損欲墮安胎湯
胎漏崩氣補漏湯
子鳴扶氣止啼湯
腰腹疼渴汗燥狂卽子狂血熱安胎湯
中惡滑墮安胎湯
多怒墮胎利氣洩火湯

小產

行房不愼因氣塡精湯
跌閃理氣散瘀湯
大便乾結加減四物湯
長寒腹疼黃芪補氣湯
大怒引氣歸血湯

難產

血虛送子丹
交骨不開珠子湯
腳手先下轉天湯

氣逆舒氣湯
子死產門救母湯
子死腹中瘀兒散

正產

胞衣不下逐胞湯 補中益氣湯
氣虛血虛補氣解鬱湯
血虛不語刺眉心穴法 補參湯 當歸補血湯
敗血攻心益母心湯
腸下補氣升麻湯 蓖麻仁提法

產後

少腹疼血瘀散結定痛湯 血虛腦痛湯
氣喘救脫活母湯
惡寒身體十全大補湯
惡心嘔吐溫胃止嘔湯
血崩救脫來生湯
手傷胞胎淋漓不止完璧湯
四肢浮腫轉氣湯
肉線出兩收湯
肝痿收脫湯
氣血兩虛乳汁不下通乳丹
鬱結乳汁不通通肝生乳湯

女科上卷

白帶下一

婦科一門最易誤治。不誤於用方。誤於辨症也。

五帶症辨之極明。立方極善。倘用之不效者。必其人經水不調。致於調經種子二門。參酌治之。無不見效。即如白帶症。倘服藥不效。其人必經

夫帶下俱是淫症。而以帶名者。因帶脈不能約束。而有此病。故以名之。蓋帶脈通於任督。任督病而帶脈始病。帶脈者。所以約束胞胎之系也。帶脈無力則難以提緊。必然胎胞不固。故曰。帶弱則胎易墜。帶傷則胎不牢。然而帶脈之傷。非獨跌閃挫氣已也。或行房而放縱。或飲酒而頻狂。雖無疼痛之苦。而有暗耗之害。則氣不能化經水。而反變爲帶病矣。故病帶者。惟尼僧寡婦出嫁之女多有之。而在室女則少也。況加以脾氣之虛。肝氣之鬱。淫氣之侵。熱氣之逼。安得不成帶下之病哉。故婦人有終年累月。下流白物。如涕如唾。不能禁止。甚則臭穢者。所謂白帶也。夫白帶乃淫盛而火衰。肝鬱而氣弱。則脾土受傷。淫土之氣下陷。是以脾精不守。不能化榮血以爲經水。反變成白滑之物。由陰門直下。欲自禁而不可得也。治法宜大補脾胃之氣。稍佐以舒肝之品。使風木不閉塞於地中。則地氣自升騰於天上。脾氣健而淫氣消。自無白帶之患矣。方用完帶湯。

本經謂。少氣溺濁。宜單寬帶湯。餘宜類參。方見三十三。

白朮。一兩。土炒。山藥。炒。一兩。人參。二錢。白芍。五錢。酒炒。車前子。三錢。酒炒。芡實。三錢。甘草。一錢。陳皮。五分。黑芥穗。五分。柴胡。六分。

水煎服。二劑輕。四劑止。六劑則白帶全愈。此方脾胃肝三經同治之法。寓補於散之中。寄消於升之內。開提肝木之氣。則肝血不燥。何至下尅脾土。補益脾土之元。則脾氣不淫。何難分消水氣。至於補脾而兼以補腎者。由裏以及表也。脾非腎氣之強。則脾之弱不能旺。是補腎正所以補脾耳。

青帶下二

婦人有帶下而色青者。甚則綠如菉豆汁。稠粘不斷。其氣腥臭。所謂青帶也。夫青帶乃肝經之淫熱。肝屬木。木色屬青。帶下流如菉豆汁。明明是肝木之病矣。但肝木最喜水潤。淫亦永以淫爲土之氣故也。以所惡者。合之所喜。必有逆者矣。肝之性既逆。則肝之氣必逆。氣欲上升。而淫欲下降。兩相乘犯。以停住於中焦之間。而走於帶脈。遂從陰器而出。其色青綠者。正以其乘肝木之氣化也。逆輕者。熱必輕而色青。逆重者。熱必重而色綠。似乎治青易而治綠難。然而均無所難也。解肝木之火。利膀胱之水。則青綠之帶病均去矣。方用加減逍遙散。

脾土宜燥而惡濕。土病濕則木乘之。木又爲淫土之氣所侮。故肝亦病。逍遙散減去當歸。妙極。

茯苓。五錢。白芍。酒炒。五錢。甘草。生用。五錢。柴胡。一錢。陳皮。一錢。茵陳。三錢。梔子。三錢。炒。

水煎服。二劑而色淡。四劑而青綠之帶絕。不必過劑矣。夫逍遙散之立法也。乃解肝鬱之藥耳。何以治青帶若斯其神與。蓋淫熱留於肝經。因肝氣之鬱也。鬱則必逆。逍遙散最能解肝之鬱與逆。鬱逆之氣既解。則淫熱難留。而又益之以茵陳之利濕。梔子之清熱。肝氣得清。而青綠之帶又何自來。此方之所以奇而效捷也。倘能以利濕清熱治青帶。而益肝氣於不問。安有止帶之日哉。

黃帶下三

婦人有帶下而色黃者。宛如黃茶濃汁。其氣腥穢。所謂黃帶是也。夫黃帶乃任脈之濕熱也。任脈本不能容水。濕氣安得而入。而化爲黃帶乎。不知帶脈橫生。通於任脈。任脈直上。走於脣齒。脣齒之間。原有不斷之泉。下貫於任脈。以化精。使任脈無熱氣之繞。則口中之津液蓋化爲精。以入於腎矣。惟有熱邪存於下焦之間。則津液不能化精。而反化濕也。夫濕者。土之氣。實水之侵。熱者。火之氣。實木之生。水色本黑。火色本紅。今濕與熱合。欲化紅而不能。欲返黑而不得。煎熬成汁。因變爲黃色矣。此乃不從水火之化。而從濕化也。所以世之人。有以黃帶爲脾之濕熱。單去治脾而不得痊者。是不知其水與火合成丹邪元邪。繞於任脈。胞胎之

丹邪元邪四字未斷。疑易以眞水眞火。爲濕熱之氣所侵。繞於任脈云云。較無

陰病。給以寒藥。必不可無故。姑仍之。

凡初產多傷脾。證初病無熱。但補脾土。兼理衝任之氣。其病自愈。若證久生熱。無得清腎火。而遂始有去路。方用黃柏車前子。

間。而化此黯色也。單治脾何能產乎。法宜補任脈之虛。而清腎火之炎。則庶幾矣。方用昌黃湯。

山藥。一兩。芡實。一兩。黃柏。二錢。鹽水炒。車前子。一錢。酒炒。白果。十枚。

水煎。連服四劑。無不全愈。此不特治黃帶方也。凡有帶病者。均可治之。而治帶之黃者功更奇也。蓋山藥芡實專補任脈之虛。又能利水。加白果引入任脈之中。更爲便捷。所以奏功之速也。至於用黃柏。清腎中之火也。腎與任脈相通。以相濟。解腎中之火。即解任脈之熱矣。

黑帶下四

婦人有帶下而色黑者。甚則如黑豆汁。其氣亦腥。所謂黑帶也。夫黑帶者。乃火熱之極也。或疑火色本紅。何以成黑。謂爲下寒之極或有之。殊不知火極似水。乃假象也。其症必腹中疼痛。小便時如刀刺。陰門必發脫。面色必發紅。日久必黃瘦。飲食必兼人。口中必熱渴。飲以涼水。少覺寬快。此胃火太旺。與命門膀胱三焦之火。合而熬煎。所以熬乾而變爲炭色。斷是火熱之極之變。而非少有寒氣也。此等之症。不至發狂者。全賴腎水與肺金無病。其生生不息之氣。潤心濟胃以救之耳。所以但成黑帶之症。是火結於下。而不炎於上也。治法惟以洩火爲主。火熱退而溼自除矣。方用利火湯。

大黃。三錢。白芷。五錢。土炒。茯苓。三錢。車前子。三錢。酒炒。王不留行。三錢。黃連。三錢。梔子。三錢。炒。知母。二錢。石膏。五錢。

水煎。服一劑。小便疼止而通利。二劑。黑帶變爲白。三劑。白亦少減。再三劑全愈矣。或謂此方過於迅利。殊不知火盛之時。用不得依遲之法。譬如救火之焚。而少爲遲緩。則火勢延燃。不盡不止。今用黃連石膏。梔子。知母。一派寒涼之品。入於大黃之中。則迅速掃除。而又得王不留行。與劉寄奴之利溼甚急。則溼與熱。俱無停住之機。佐白芷以輔土。茯苓以滲溼。車前以利水。則火退水進。便成既濟之卦矣。

赤帶下五

婦人有帶下而色紅者。似血非血。淋漓不斷。所謂赤帶也。夫赤帶亦溼病。溼是土之氣。宜見黃白之色。今不見黃白而見赤者。火熱故也。火色赤。故帶下亦赤耳。惟是帶脈繫於腰臍之間。近乎至陰之地。不宜有火。而今見火症。豈其路通於命門。而命門之火。出而燒之耶。不知帶脈通於腎。而腎氣通於肝。婦人憂思傷脾。又加鬱怒傷肝。於是肝經之鬱火內燒。下克脾土。脾土不能運化。致溼熱之氣。蘊於帶脈之間。而肝不藏血。亦滲於帶脈之內。皆由脾氣受

病愈後當節飲食。減辛鹹之味。調養脾土。若恃有此方。病發即服。亦傷元氣矣。慎之。

傷。運化無力。溼熱之氣。隨氣下陷。同血俱下。所以似血非血之形象現於其色也。其實血與溼不能兩分。世人以赤帶屬之心火誤矣。治法須清肝火而扶脾氣。則庶幾可愈。方用清肝止淋湯。

白芍。一兩。酒炒。當歸。一兩。酒洗。生地。五錢。酒炒。阿膠。三錢。蛤粉炒。丹皮。三錢。黃柏。二錢。牛膝。二錢。香附。一錢。酒炒。紅棗。十個。

水煎。服一劑少止。二劑又少止。四劑全愈。十劑不再發。此方但主補肝之血。全不利脾之溼者。以赤帶之爲病。火盛而溼輕也。夫火之所以旺者。由於血之衰。補血即足以制火。且水與血合而成赤帶之症。竟不能辨其是溼非溼。則溼亦盡化而爲血矣。所以治血則溼亦除。又何必利溼之多事哉。此方之妙。妙在純於治血。少加清火之味。故奏功獨奇。倘一利其溼。反引火下行。轉難遽效矣。或問曰。先生前言助其脾土之氣。今但補其肝木之血。何也。不知用芍藥以平肝。則肝氣得舒。肝氣舒自不克土。脾不受尅。則脾土自旺。是平肝正所以扶脾耳。又何必加人參白朮之品。以致累事哉。

血崩昏暗六

婦人有一時血崩。兩目黑暗。昏暈在地。不省人事者。人莫不謂火盛動血也。然此火非實火。乃虛火耳。世人一見血崩。往往用止澀之品。雖亦能取效於一時。但不用補陰之藥。則虛火易於沖擊。恐隨止隨發。以致經年累月。不能全愈者有之。是止崩之藥。不可獨用。必須於補陰之中。行止崩之法。方用固本止崩湯。

大熟地。一兩。九蒸。白朮。一兩。土炒。黃芪。三錢。生用。當歸。五錢。酒洗。黑豆。二錢。人參。三錢。

水煎服。一劑崩止。十劑不再發。倘畏藥味之苦而減半。則力薄而不能止。方妙在全不去血。而惟補血。又不止補血。而更補氣。非惟補氣。而更補火。蓋血崩而至於黑暗昏暈。則血已盡去。僅存一線之氣。以資護持。若不急補其氣以生血。而先補其血而遺氣。則有形之血。恐不能遽生。而無形之氣。必且至盡散。此所以不先補血而先補氣也。然單補氣。則血又不易生。單補血而不補火。則血又必疑滯。而不能隨氣而速生。況黑豆引血歸經。是補中又有收斂之妙。所以同補氣補血之藥並用之耳。

年老血崩七

婦人有年老血崩者。其症亦與前血崩昏暗者同。人以爲老婦之虛耳。誰知是不慎房幃之故乎。夫婦人至五十歲之外。天癸匱乏。原宜閉關守寨。不宜出陣戰爭。苟或適興。不過草草了事。倘不至腎火大動。倘興酣浪戰。亦如少年之好合。鮮不血室大開。崩決而整矣。方用加

不用參朮等極補。此症若誤認爲血崩。恐其久則成崩。用參朮等藥以固之。多不見效。亦變反甚。若年逾四九。癸水將止。或經見血。此崩症也。宜分別治之。

五帶症方極多。然有專有不專者。總因未得病源。此書指透病源。故用無不效。

下敗斗。六脈俱無。鼻中微微有息。不可遽服此方。仍加黃炭炭末一錢。無不見效。病力者用無灰黃酒冲黃炭炭末三錢服之。待其氣接神清。始可服此方。人參只宜參代之。臨服亦加黃炭炭末一錢冲入。

亦有經閉年老血崩者，必保氣沖血室，原方加續斷炭三錢，實效。

減當歸補血湯，

當歸（一兩，酒洗）黃芪（一兩，生用）三七根末（三錢）桑葉（十四片）

水煎服，二劑而血少止，四劑不再發，然必須斷慾始除根，若再犯色慾，未有不重病者也。

夫補血湯乃氣血兩補之神劑，三七根乃止血之聖藥，加入桑葉者，所以滋腎之陰，又有收斂之妙耳，但老婦陰精既虧，用此方以止其暫時之漏，實有奇功，而不可責其永遠之續者，以補精之味尚少也，服此四劑後，再增入白芍（五錢，熟地（一兩，山藥（四錢，麥冬（三錢，北五味（一錢，服百劑，則崩漏之根可盡除矣。

少婦血崩八

有少婦甫娠三月，即便血崩，而胎亦隨墮，人以爲挫閃受傷而致，誰知是行房不慎之過哉，夫少婦行房，亦事之常耳，何便血崩，蓋因元氣衰弱，事難兩顧，一經行房洩精，則妊娠無所依凭，遂致崩而且墮，凡婦人之氣衰，即不耐久戰，若貪歡久戰，則必洩精太甚，氣每不能攝夫血矣，況氣弱而又娠，再加以久戰，內外之氣皆動，而血又何能固哉，其崩而墮也，亦無怪其然也，治法自當以補氣爲主，而少佐以補血之品，斯爲得之，方用固氣湯。

人參（一錢，白朮（五錢，土炒，大熟地（五錢，九蒸，當歸（三錢，酒洗，白茯苓（二錢，甘草（一錢，杜仲（三錢，炒絲，山萸肉（二錢，遠志（一錢，去心，五味子（十粒，炒，

水煎服，一劑而血止，連服十劑全愈，此方固氣而兼補血，已去之血可以速生，將脫之血可以盡攝，凡氣虛而崩漏者，此方最可通治，非僅治小產之崩，其最妙者，不去止血，而止血之味，含於補氣之中也。

交感血出九

婦人有一交合則流血不止者，雖不至於血崩之甚，而終年累月不得愈，未免血氣兩傷，久則恐有血枯經閉之憂，此等之病，成於經水正來之時，貪歡交合，精沖血管也，夫精沖血管，不過一時之傷，精出宜愈，何以久而流紅，不知血管最嬌嫩，斷不可以精傷，凡婦人受孕，必於血管已淨之時，方保無虞，倘經水正旺，彼欲湧出，而精射之，則欲出之血，反退而縮入，既不能受精而成胎，勢必至集精而化血，交感之際，陰氣觸動其舊日之精，則兩相感召，舊精欲出，而血亦隨之而出，治法須通其胞胎之氣，引舊日之集精外出，而益之以補氣補精之藥，則血管之傷，可以補完矣，方用引精止血湯。

人參（五錢，白朮（一兩，土炒，茯苓（三錢，去皮，熟地（一兩，九蒸，山萸肉（五錢，黑豆（一錢，黃柏（五分，芡穗（三錢，車前子（三錢，酒炒，

水煎，連服四劑愈，十劑不再發，此方用參朮以補氣，用地萸以補精，精氣既旺，則血管流

欲補子者，必待落紅後，即三十時辰兩日半也，經來之時，計足三十時辰，便可入房，一日男，二日女，三日舞，四月女，五日男，六日女，七日男，過七日即不能受孕矣。

通，加入茯苓車前以利水與竅，水利則血管亦利，又加黃柏爲引，直入血管之中，而引夙精出於血管之外，芥穗引敗血出於血管之內，黑豆以止血管之口，一方之中，實有調停曲折之妙，故能祛舊病而除陳痾，然必須慎房幃三月，破者始不至重傷，而補者始不至重損，否則不過取目前之效耳，其慎之哉，宜寡慾。

鬱結血崩十

婦人有懷抱甚鬱，口乾舌渴，嘔吐吞酸，而血下崩者，人皆以火治之，時而效，時而不效，其故何也，是不識爲肝氣之鬱結也，夫肝主藏血，氣結而血亦結，何以反至崩漏，蓋肝之性急，氣結則其急更甚，更急則血不能藏，故崩不免也，治法宜以開鬱爲主，若徒開其鬱，而不知平肝，則肝氣大開，肝火更熾，而血亦不能止矣，方用平肝開鬱止血湯。

白芍（一兩，酒炒，白朮（一兩，土炒，當歸（一兩，酒洗，丹皮（三錢，三七根（三錢，研末，生地（三錢，酒炒，甘草（二錢，黑茶穗（二錢，柴胡（一錢，

水煎服，一劑嘔吐止，二劑乾渴除，四劑血崩愈，方中妙在白芍之平肝，柴胡之開鬱，白朮利腰臍，則血無積住之處，荊芥通經絡，則血有歸還之樂，丹皮又清骨髓之熱，生地復補臟腑之委，當歸三七於補血之中，以行止血之法，自然鬱結散，而血崩止矣。

閃跌血崩十一

婦人有升高墜落，或閃挫受傷，以致惡血下流，有如血崩之狀者，若以崩治，非徒無益，而家害之也，蓋此症之狀，必手按之而疼痛，久之則面色萎黃，形容枯槁，乃是瘀血作祟，並非血崩可比，倘不知解瘀，而用補澀，則瘀血內攻，瘀無止時，反致新血不得生，舊血無由化，死不能活，豈不可傷哉，治法須行血以去瘀，活血以止瘀，則血自止而愈矣，方用逐瘀止血湯。

生地（一兩，酒炒，大黃（三錢，赤芍（三錢，丹皮（一錢，當歸尾（五錢，枳殼（五錢，炒，龜版（三錢，醋炙，桃仁（十粒，泡，研，

水煎服，一劑瘀輕，二劑瘀止，三劑血亦全止，不必再服矣，此方之妙，妙於活血之中，佐以下瀉之品，故逐瘀如掃，而止血如神，或疑跌閃升墜，是由外而傷內，雖不比內傷之重，而既已血崩，則內之所傷，亦不爲輕，何以只治其瘀，而不顧氣也，殊不知跌閃升墜，非由內傷以及外傷者可比，蓋本實不撥，去其標病可寧，故曰急則治其標。

血海太熱血崩十二

婦人有每行人道，經水即來，一如血崩，人以爲胞胎有傷，觸之以動其血也，誰知是子宮血海，因太熱而不固乎，夫子宮即在胞胎之下，而血海又在胞胎之上，血海者，衝脈也，衝脈太來而血即崩，衝脈太熱而血即沸，血崩之爲病，正衝脈之太熱也，然既由衝脈之熱，則應當崩而無有止時，何以行人道而始來，果與肝木無恙耶，夫脾健則能攝血，肝平則能藏血，人

凡跌打損傷致嘔血咯血，皆宜如此治法，若血衄胃中，宜加川芎厚朴一錢半，姜汁炒。

凡血崩症最宜絕欲遠房，無奈少年人發興難不效，若三月後崩止病愈，而房

宋人房之時。君相二火寂然不動。雖衝脈獨熱。而血亦不至外溢。及有人道之感。則子宮大開。君相火動。以熱招熱。同氣相求。翕然奔動。以鼓其精房。血海泛溢。有不能止遏之勢。肝欲藏之而不能。脾欲攝之而不得。故經水隨交感而至。若有聲應之捷。是惟火之爲病也。治法必須滋陰降火。以清血海而和子宮。則終身之病可半載而除矣。然必絕慾三月而後可。方用清海丸。

大熟地九蒸。一斤　山萸肉。十兩　山藥炒。十兩　丹皮。十兩　北五味炒。二兩　麥冬肉。十兩　白朮土炒。一斤　白芍酒炒。一斤　龜骨。二兩　地骨皮。十兩　乾桑葉。一斤　元參。一斤　沙參。十兩　石斛。十兩

右十四味。各爲細末。合一處。煉蜜丸桐子大。早晚每服五錢。白滾水送下。半載全愈。此方補陰而無浮動之虛。縮血而無寒涼之苦。日計不足。月計有餘。潛移默奪。子宮清涼。而血海自固。倘不揣其本。而齊其末。徒以髮灰、白礬、黃連炭、五倍子等藥末。以外治其血歷之處。山恐愈澀而愈流。終必至於敗亡也。可不慎與。

鬼胎

婦人有腹似懷妊。終年不產。甚至二三年不生者。此鬼胎也。其人必面色黃瘦。肌膚消削。腹大如斗。厥所由來。必素與鬼交。或入神廟而與祟雨之思。或遊山林而起交感之念。皆能召祟成胎。幸其人不至淫蕩。見祟而有驚惕。遇合而生愧惡。則鬼祟不能久戀。一交媾即遠去。然淫妖之氣。已結於腹。遂成鬼胎。其先尚未覺。迨後漸漸腹大。經水不行。內外相包。一如懷胎之狀。有似血臌之形。其實是鬼胎。而非臌也。治法必須以逐穢爲主。然入至懷胎數年不產。即非鬼胎。亦必氣血衰微。況此非與妊。則邪氣必旺。正不敵邪。其虛弱之狀。必有可掬。烏可純用迅利之藥。以祛蕩乎。必於補中逐之爲的也。方用蕩鬼湯。

鬼祟之來。固有勢運。然城市鄉曲。往往有是症。不可不察。故知以此言爲是也。

人參。一兩　當歸。一兩　大黃。一兩　雷丸。三錢　川牛膝。三錢　紅花。三錢　丹皮。三錢　枳殼。一錢　厚朴。一錢　小桃仁。三十粒

水煎服。一劑腹必大鳴。可瀉惡物半桶。再服一劑。又瀉惡物而愈矣。斷不可復用三劑也。蓋雖補中用逐。未免迅利。多用恐傷損元氣。此方用雷丸以祛穢。又得大黃之攻除。且佐以厚朴、紅花、桃仁等味。皆善行善攻之品。何邪之尚能留腹中。而不盡逐下也哉。尤妙在用參歸以補氣血。則邪去而正不傷。若單用雷丸大黃以迅下之。必有氣脫血崩之患矣。倘或知是鬼胎。如室女姦婦輩。邪氣雖盛。而真氣未衰。可用岐天師新傳紅花露歷散。紅花。半斤。大黃。五兩。雷丸。三兩。水煎服。亦能下胎。然未免太於迅利。過傷氣血。不若蕩鬼湯之有益無損爲愈也。在人臨症時。斟酌而善用之耳。

室女鬼胎十四

此方除雷大黃。見者因此病產慎。而顯於神命。善者因要於妙年。深爲可觀。若服此方不驗。宜服桂香平胃散。無不見效。急後宜調養氣血。節飲食。

肉桂去粗皮一錢。

藿香一錢。

以上二味。共研末。調水爲丸。如桐子大。空心調水下服。後半日時煎平胃散一劑服之。

當歸。米酒炒。三錢。厚朴。二錢。姜汁炒。陳皮一錢。枳實。二錢。土炒。桃仁。三錢。酒洗。川芎。一錢。酒洗。服後必下惡物。若不見下惡物。次日再服平胃散。不用桂香。

婦科調經尤難。蓋經病則諸病不調。則百病叢生。治法宜詳察其病源。調養其所以不調之故。然後用藥。始能見效。此書雖有先期、後期、先後無定期之分。然無種子者下女子有在家未嫁。月經忽斷。腹大如妊。面色乍赤乍白。六脈乍大乍小。人以爲血結經閉也。誰知是鬼祟身乎。夫人之身正。則諸邪不敢侵。其身不正。則諸邪自來犯。或精神恍惚。而夢寐求覆。或眼目昏花。面對面相犯。或假托親屬。而暗處貪歡。或明言仙人。而靜地取樂。其始則驚疑爲奇遇。而不肯告人。其後則羞赧爲淫褻。而不敢告人。日久年深。腹大如斗。有如懷妊之狀。一身之精血僅足以供腹中之邪。則邪日旺。而正日衰。勢必至經閉而血枯。後雖欲導其經而邪據其腹。則經亦難通。欲生其血而邪食其精。則血實難長。醫以爲胎。而實非真胎。又以爲癥。而亦非癥病。往往因循等待。非因差慎而亡其生。即成勞瘵而終不起。至死不悟。不直可悲哉。治法似宜補正以祛邪。然邪不先去。補正亦無益也。必須先祛邪而後補正。斯爲得之。方用蕩邪散。

雷丸。六錢　桃仁。六十粒　當歸。一兩　丹皮。一兩　甘草。四錢

水煎。服一劑必下惡物半桶。再服調正湯治之。

白朮。五錢　茯苓。五錢　陳皮。一錢　貝母。一錢　蓋米。五錢

水煎。連服四劑。則脾胃之氣轉。而經水漸行矣。前方蕩邪。後方補正。實有次第。或疑身懷鬼胎。必大傷其血。所以經閉。今既墜其鬼胎矣。自當大補其血。乃不補血。而反補胃氣。何故。蓋鬼胎中人。其正氣大虛可知。氣虛則血必不能驟生。欲補血必先補氣。是補氣而血自然生也。用二朮以補胃陽。陽氣旺則陰氣難犯。尤善後之妙法也。倘重用補陰之品。則以陰招陰。吾恐鬼胎雖下。而鬼氣未必不再侵。故必以補陽爲上策。而血自隨氣而生也。

調經經水先期十五

婦人有先期經來者。其經甚多。人以爲血熱之極也。誰知是腎中水火太旺乎。夫火太旺則血熱。水太旺則血多。此有餘之病。非不足之症也。似宜不藥有喜。但過於有餘。則子宮太熱。亦難受孕。更恐有爍乾男精之虛。過者損之。謂非既濟之道乎。然而火不可任其有餘。而水斷不可使之不足。治之法但少濟其熱。不必洩其水也。方用清經散。

丹皮。三錢　地骨皮。五錢　白芍。三錢　酒炒　大熟地。三錢　九蒸　青蒿。二錢　白茯苓。一錢　黃柏。五分　鹽水炒

水煎。服二劑而火自平。此方雖是清火之品。然仍是滋水之味。火洩而水不與俱洩。損而益也。

又有先期經來。只一二點者。人以爲血熱之極也。誰知腎中火旺而陰水虧乎。夫同是先期之來。何以分虛實之異。蓋婦人之經最難調。苟不分別細微。用藥鮮克有效。先期者。火氣之冲多孤者。水氣之驗。故先期而來多者。火熱而水有餘也。先期而來少者。火熱而水不足也。

門參看，臨產時與有證見。

倘一見先期之來，俱以爲有餘之熱，但洩火而不補水，或水火兩洩之，有不更增其病者乎。治之法不必洩火，只專補水，水既足，而火自消矣，亦既濟之道也。方用兩地湯。

大生地一兩，酒炒，元參一兩，白芍藥五錢，酒炒，麥冬肉五錢，地骨皮三錢，阿膠三錢。

水煎服四劑而經調矣。此方之用地骨生地，能清骨中之熱，骨中之熱由於腎經之熱，清其骨髓則腎氣自清，而又不損傷胃氣，此治之巧也。況所用諸藥，又純是補水之味，水盛而火自平理也。此條與上條參觀，斷無誤治先期之病矣。

經水後期十六

婦人有經水後期而來多者，人以爲血虛之病也，誰知非血虛乎。蓋後期之多少，實有不同，不可執一而論。蓋後期而來少，血塞而不足，後期而來多，血塞而有餘，夫經本於腎，而其流五臟六腑之血皆歸之，故經來而諸經之血盡來附，益以經水行，而門戶不迫迅，諸經之血乘其隙而皆出也，但血既出矣，則成不足，治法宜於補中溫散之，不得曰後期者俱不足也，方用溫經攝血湯。

大熟地一兩，九蒸，白芍一兩，酒炒，川芎五錢，酒洗，白朮五錢，土炒，柴胡五分，五味子三分，肉桂五分，去粗研，一錢斷。

水煎服三劑而經調矣。此方大補肝腎脾之精與血，加肉桂以祛其寒，柴胡以解其鬱，是補中有散，而散不耗氣，補中有洩，而洩不損陰，所以補之有益，而溫之收功，此調經之妙藥也，而攝血之仙丹也，凡經來後期者，俱可用，倘元氣不足，加人參一二錢亦可。

經水先後無定期十七

婦人有經來斷續，或前或後無定期，人以爲氣血之虛也，誰知是肝氣之鬱結乎，夫經水出諸腎，而肝爲腎之子，肝鬱則腎亦鬱矣，腎鬱而氣必不宣，前後之或斷或續，正腎之或通或閉耳，或曰肝氣鬱而腎氣不應，未必至於如此，殊不知子母關切，子病而母必有顧復之情，肝鬱而腎不無牽掣之誼，肝氣之或開或閉，即腎氣之或去或留，相因而致，又何疑焉，治法宜舒肝之鬱，即開腎之鬱也，肝腎之鬱既開，而經水自有一定之期矣，方用定經湯。

菟絲子一兩，酒炒，白芍一兩，酒炒，當歸一兩，酒洗，大熟地五錢，九蒸，山藥五錢，炒，白茯苓三錢，芡苡仁二錢，炒黑，柴胡五分。

水煎服二劑而經水淨，四劑而經期定矣。此方舒肝腎之氣，非通經之藥也，補肝腎之精，非利水之品也，肝腎之氣舒而精通，肝腎之精旺而水利，不治之治，正妙於治也。

以上調經三條，辨論明晰，立方極妙，但恐臨時或有外感內傷，不能見效，有外感者，宜加藿香一錢，有內傷者，宜加神曲二錢，炒，有因內食積滯者，再加麥芽，查肉二錢，炒，無虛損的用之者，肝氣鬱結，又宜以通達散爲主，有鬱加綿茯苓皮，即加味逍遙散。

經水數月一行十八

婦人有數月一行經者，每以爲常，亦無或先或後之異，亦無或多或少之殊，人莫不以爲異，而不知非異也，蓋無病之人，氣血兩不虧損耳，夫氣血既不虧損，何以數月而一行經也，婦

人之中，亦有天生仙骨者，經水必一季一行，蓋以季爲數，而不以月爲盈虛也，其氣內藏，則故中之真陽不損，倘加以煉形之法，一年之內，便易飛騰，無如世人不知，見經水不應月來，誤認爲病，妄用藥餌，本無病而治之成病，是治反不如其不治也，山間異人之教，特爲闡揚，使世人見此等行經，不必妄行治療，萬勿疑爲氣血之不足，而輕一試也，雖然，天生仙骨之婦人，世固不少，而嗜慾損天之人，亦復甚多，又不可不立一療教之方，以補之，方名助仙丹。

白茯苓五錢，陳皮五錢，白朮三錢，土炒，白芍三錢，酒炒，山藥三錢，炒，兎絲子二錢，酒炒，杜仲一錢，炒黑，甘草一錢。

河水煎服四劑而仍如其舊，不可再服也，此方平補之中，實有妙理，健脾益腎而不澀，解鬱清痰而不洩，不損天然之氣血，便是調經之大法，何得用他藥以窒通經哉。

曾見婦人一年一行經，自健無誤，迨懷孕，反月月俱行經，減至五月至七月經止，不等，齊男皆成人，試以爲異，或亦仙骨之所致乎，抑造化令人不測耶。

年老經水復行十九

婦人有年五十外，或六七十歲，忽然行經者，或下紫血塊，或如紅血淋，人或謂老婦行經，是還少之象，誰知是血崩之漸乎，夫婦人至七七之外，天癸已竭，又不服濟陰補陽之藥，如何能精滿化經，一如少婦，然經不宜行而行者，乃肝不藏，脾不統之故也，非精過洩而動命門之火，即氣鬱甚而發雷霆之炎，二火交發而血乃奔矣，有似行經而實非經也，此等之症，非大補肝脾之氣與血，而血安能驟止，方用安老湯。

人參一兩，黃芪一兩，生用，大熟地一兩，九蒸，白朮五錢，土炒，當歸五錢，酒洗，山萸五錢，肉，阿膠一錢，蛤粉炒，黑芥穗一錢，甘草一錢，香附五分，酒炒，木耳炭一錢。

水煎服一劑減，二劑尤減，四劑全減，十劑愈，此方補益肝脾之氣，氣足自能生血而攝血，尤妙大補腎水，水足而肝氣自舒，肝舒而脾自得養，肝藏之而脾統之，又安有洩漏者，又何慮其血崩哉。

經水忽來忽斷時疼時止二十

婦人有經水忽來忽斷，時疼時止，寒熱往來者，人以爲血之凝也，誰知是肝氣不舒乎，夫肝屬木而藏血，最惡風寒，婦人當行經之際，腠理大開，適逢風之吹，寒之襲，則肝氣爲之閉塞，而經水之道路亦隨之而俱閉，由是腠理經絡，各皆不宜，而寒熱之作，由是而起，其氣行於陽分，則生熱，其氣行於陰分，則生寒，然此猶或之輕者也，倘外感之風寒更甚，則內應之熱氣益深，往往有熱入血室，而變爲如狂之症，一似遇鬼之狀者，若但往來寒熱，是風寒未甚，而熱未深耳，治法宜補肝中之血，通其鬱而散其風，則病隨手而效，所謂治風先治血，血和風自滅，此其一也，方用加味四物湯。

大熟地一兩，九蒸，白芍五錢，酒炒，當歸五錢，酒洗，川芎三錢，酒洗，白朮五錢，土炒，粉丹皮三錢，元胡一錢，酒炒，甘草一錢，柴胡一錢，尤妙，加荊芥穗炒黑一錢，尤妙。

胡。一錢。

水煎服。此方用四物以滋脾胃之陰血。用柴胡白芍丹皮。以宣肝經之風鬱。用甘草白芍元胡。以利腰臍而和腹疼。入於表裏之間。通乎經絡之內。用之得宜。自奏功如響也。

經水未來腹先疼二十一

婦人有經前腹疼。數日而後經水行者。其經來多是紫黑塊。人以爲寒極而然也。誰知是熱極而火不化乎。夫肝屬木。其中有火。舒則通暢。鬱則不揚。經欲行而肝不應。則抑拂其氣而疼生。然經滯則不能內藏。而肝中之鬱火焚燒。內逼經出。則其火亦因之而怒洩。其紫黑者。水火兩戰之象也。其成塊者。火煎成形之狀也。經失其爲經者。正鬱火內奪其權耳。治法似宜大洩肝中之火。然洩肝之火。而不解肝之鬱。則熱之標可去。而熱之本未除也。其何能益。方用宣鬱通經湯。

白芍。五錢。酒炒。當歸。五錢。酒炒。丹皮。五錢。山梔子。三錢。炒。白芥子。二錢。炒研。柴胡。一錢。香附。一錢。酒炒。川鬱金。一錢。炒。黃芩。一錢。酒炒。生甘草。一錢。

水煎。連服四劑。下月斷不先腹疼而後行經矣。此方補肝之血而解肝之鬱。利肝之氣而降肝之火。所以奏功之速。

行經後少腹疼痛二十二

婦人有少腹疼於行經之後者。人以爲氣血之虛也。誰知是腎氣之澀乎。夫經水者。乃天一之眞水也。滿則溢。而虛則閉。亦其常耳。何以虛能作疼哉。蓋腎水一虛。則水不能生木。而肝木必尅脾土。木土相爭。則氣必逆。故爾作疼。治法必須以舒肝氣爲主。而益之以補腎之味。則水足而肝氣益安。肝氣安而逆氣自順。又何疼痛之有哉。方用調肝湯。

山藥。五錢。炒。阿膠。三錢。蛤粉炒。白當歸。三錢。酒洗。白芍。三錢。酒炒。山萸肉。三錢。蒸熟。巴戟。一錢。鹽水浸。甘草。一錢。

水煎服。此方平調肝氣。既能轉逆氣。又善止鬱疼。經後之症。以此方調理最佳。不特治經後腹疼之症也。

經前腹痛吐血二十三

婦人有經未行之前一二日。忽然腹疼而吐血。人以爲火熱之極也。誰知是肝氣之逆乎。夫肝之性最急。宜順而不宜逆。順則氣安。逆則氣勃。血隨氣爲行止。氣安則血安。氣勃則血勃。亦勿怪其然也。或謂經逆在腎。不在肝。何以隨血妄行。竟至從口上出也。是肝不藏血之故乎。抑腎不納氣而然乎。殊不知少陰之火。急如奔馬。得肝火直冲而上。其勢最捷。反經而爲血。亦至便也。正不必肝不藏血。始成吐血之症。但此等吐血。與各經之吐血有不同者。蓋各

經前腹後腹痛二方橋梓。不可加減。若有別症。亦宜由方爲主。另加藥味治之。原方不可減去一味。

婦人平壯吐血。經之吐血。由內傷而成。經逆而吐血。乃內淫而激之使然也。其症有經異。而其氣逆則一也。治法似宜平肝以順氣。而不必專精以補腎矣。雖然。經逆而吐血。雖不大損失血。而反覆顛倒。未免太傷腎氣。必須於補腎之中。用順氣之法。始爲得當。方用順經湯。

當歸。五錢。酒洗。大熟地。五錢。九蒸。白芍。二錢。酒炒。丹皮。五錢。白茯苓。三錢。沙參。三錢。黑芥穗。三錢。

水煎。服一劑而吐血止。二劑而經順。十劑不再發。此方於補腎調經之中。而用引血歸經之品。是和血之法實寓順氣之法也。肝不逆而腎氣自順。腎氣既順。又何經逆之有哉。

經水將來臍下先疼痛二十四

婦人有經水將來三五日前。而臍下作疼。狀如刀刺者。或寒熱交作。所下如黑豆汁。人莫不以爲血熱之極。誰知是下焦寒溼相爭之故乎。夫寒溼乃邪氣也。婦人有衝任之脈。居於下焦。衝爲血海。任主胞胎。爲血室。均喜正氣相通。最惡邪氣相犯。經水由二經而外出。而寒溼滿二經而內亂。兩相爭而作疼痛。邪愈盛而正氣日衰。寒氣生濁。而下如豆汁之黑者。見北方寒水之象也。治法利其溼而溫其寒。使衝任無邪氣之亂。臍下自無疼痛之災矣。方用溫臍化溼湯。

白朮。一兩。土炒。白茯苓。三錢。山藥。五錢。炒。巴戟肉。五錢。鹽水浸。扁豆。炒。三錢。白蔻。十枚。研碎。建蓮子。三十枚。不去心。

水煎服。然必須經未來前十日服之。四劑而邪氣去。經水調。變可種子。此方君白朮。以利臍臍之氣。用巴戟白果。以通任脈。扁豆山藥蓮子。以衝衝脈。所以寒溼排除。而經水自調。可受妊矣。倘疑腹疼爲熱疾。妄用寒涼。則衝虛任冷。血海變爲冰海。血室反成冰室。無論難於生育。而疼痛之止。又安有日哉。

經水過多二十五

婦人有經水過多。行後復行。而色萎黃。身體倦怠而困乏。甚者人以爲血熱有餘之故。誰知是血虛而不歸經乎。夫血旺始經多。血虛當經縮。今曰血虛而反經多。是何言與。殊不知血歸於經。雖旺而經亦不多。血不歸經。雖衰而經亦不少。世之人見經水過多。謂是血之旺也。此治之所以多錯耳。倘經多果是血旺。自是健壯之體。須當一行即止。精力如常。何至一行後而再行。而困乏無力耶。惟經多是血之虛。故再行而不勝其困乏。血損精散。骨中髓空。所以不能色華於面也。治法宜大補血而引之歸經。又安有行後復行之病哉。方用加減四物湯。

大熟地。一兩。九蒸。白芍。三錢。酒炒。當歸。五錢。酒洗。川芎。二錢。酒洗。白朮。五錢。土炒。黑芥穗。三錢。山萸肉。三錢。蒸。續斷。一錢。甘草。一錢。

測芥穗炭。能引血歸經。方炒極。不可輕易加減。

水煎。服四劑而血歸經矣。十劑之後。加人參三錢。再服十劑。下月行經。適可而止矣。夫四物湯乃補血之神品。加白朮、荊芥。補中有利。加山萸、續斷。止中有行。加甘草以調和諸品。使之各得其宜。所以血足而歸經。歸經而血自靜矣。

經前洩水二十六

婦人有經來之前。洩水三日。而後行經者。人以爲血旺之故。誰知是脾氣之虛乎。夫脾統血。脾虛則不能攝血矣。且脾屬濕土。脾虛則土不實。土不實而濕更甚。所以經水將動。而脾先不固。脾經所統之血。欲流注於血海。而濕氣乘之。所以先洩水而後行經也。調經之法不在先治其水。而在先治其血。抑不在先治其血。而在先補其氣。蓋氣旺而血自能生。抑氣旺而濕自能除。且氣旺而經自能調矣。方用健脾湯。

人參。五錢。白茯苓。三錢。白朮。一兩。土炒。芡實。五錢。水浸。薏苡仁。三錢。炒。

水煎。連服十劑。經前不洩水矣。此方補脾氣以固脾血。則血攝於氣之中。脾氣日盛。自能運化其濕。濕既化爲烏有。自然經水調和。又何至經前洩水哉。

經前大便下血二十七

婦人有行經之前一日。大便先出血者。人以爲血崩之症。誰知是經流於大腸乎。夫大腸與行經之路。各有分別。何以能入乎其中。不知胞胎之系。上通心而下通腎。心腎不交。則胞胎之血。兩無所歸。而心腎二經之氣。不來照攝。聽其自便。所以血不走小腸而走大腸也。治法若單止大腸之血。則愈止而愈多。若擊動三焦之氣。則更拂亂而不可止。蓋經水之妄行。原因心腎之不交。今不使水火之既濟。而徒治其胞胎。則胞胎之氣無所歸。而血安有歸經之日。故必大補其心與腎。使心腎之氣交。而胞胎之氣自不散。則大腸之血自不妄行。而經自順矣。方用順經兩安湯。

當歸。五錢。酒洗。白芍。五錢。酒炒。大熟地。五錢。九蒸。山萸肉。二錢。人參。三錢。白朮。五錢。土炒。麥冬。五錢。去心。黑芥穗。二錢。巴戟肉。一錢。鹽水浸。升麻。四分。

水煎。服二劑大腸血止。而經從前陰出矣。三劑經止。而兼可受妊矣。此方乃大補心肝腎三經之藥。全不去顧胞胎。而胞胎有所歸者。以心腎之氣交也。蓋心腎虛則其氣兩分。心腎足則其氣兩合。心與腎不離。而胞胎之氣。聽命於二經之攝。又安有妄動之形哉。然則心腎不交。補心腎可也。又何兼補夫肝木耶。不知肝乃腎之子。心之母也。補肝則肝氣往來於心腎之間。自然上引心而下入於腎。下引腎而上入於心。不曾介紹之助也。此使心腎相交之一大法門。不特調經而然也。學者其深思諸。

年未老經水斷二十八

經云。女子七七而天癸絕。有年未至七七而經水先斷者。人以爲血枯經閉也。誰知是心肝脾之氣鬱乎。使其血枯。安能久延於人世。醫見其經水不行。妄謂之血枯耳。其實非血之枯。乃經之閉也。且經原非血也。乃天一之水。出自腎中。是至陰之精。而有至陽之氣。故其色赤紅似血。而實非血。所以謂之天癸。世人以經爲血。此千古之誤。牢不可破。倘果是血。何不名之曰血水。而曰經水乎。古昔聖賢創呼經水之名者。原以水出於腎。乃癸干之化。故以名之。無如世人沿襲。而不深思其旨。皆以血視之。然則經水早斷。似乎腎水衰涸。吾以爲心肝脾氣之鬱著。蓋以腎水之生。原不由於心肝脾。而腎水之化。實有關於心肝脾。使水位之下。無土氣以承之。則水濫滅火。腎氣不能化。火位之下。無水氣以承之。則火炎鑠金。腎氣無所生。木位之下。無金氣以承之。則木妄破土。腎氣無以成。倘心肝脾有一經之鬱。則其氣不能入於腎中。腎之氣即鬱而不宣矣。況心肝脾俱鬱。即腎氣真足而無虧。尚有茹而難吐之勢。矧腎氣本虛。又何能盈滿而化經水外洩耶。經曰。亢則害。此之謂也。此經之所以閉塞。有似乎血枯。而實非血枯耳。治法必須散心肝脾之鬱。而大補其腎水。仍大補其心肝脾之氣。則精滋而經水自通矣。方用益經湯。

大熟地。一兩。九蒸。白朮。一兩。土炒。山藥。五錢。炒。當歸。五錢。酒洗。白芍。三錢。酒炒。生薏仁。三錢。碎。丹皮。二錢。沙參。三錢。柴胡。一錢。杜仲。一錢。炒黑。人參。二錢。

水煎。連服八劑。而經通矣。服三十劑而經不再閉。兼可受孕。此方心肝脾腎四經同治藥也。妙在補以通之。散以開之。倘徒補則鬱不開。而生火。徒散則氣益衰。而耗精。設或用攻堅之劑。辛熱之品。則非徒無益。而又害之矣。

身瘦不孕二十九

婦人有瘦怯身軀。久不孕育。一交男子。即臥病終朝。人以爲氣虛之故。誰知是血虛之故乎。或謂血藏於肝。精涵於腎。交感乃洩腎之精。與血虛何與。殊不知肝氣不開。則精不能洩。腎精既洩。則肝氣亦不能舒。以腎爲肝之母。母既洩精。不能分潤以養其子。則木燥之水。而火且暗動以鑠精。則腎愈虛矣。況瘦人多火。而又洩其精。則水益少。而火益熾。水雖制火。而腎精空乏。無力以濟。成火在水上之卦。所以倦怠而臥也。此等之婦。偏易動火。然此火因貪慾而出於肝木之中。又是虛燥之火。絕非真火也。且不交合則已。交合又偏易走洩。此陰虛火旺。不能受孕。即偶爾受孕。必致逼乾男子之精。隨種而隨消者有之。治法必須大補腎水。而平肝木。水旺則血旺。血旺則火消。使成水在火上之卦。方用養精種玉湯。

服藥三月後不受孕，仍服原方如杜仲三錢，炒斷絲，續斷二錢，白朮五錢，土炒，黨參三錢，服數劑後必受孕。

大熟地一兩，九蒸，當歸五錢，酒洗，白芍五錢，酒炒，山萸肉五錢，蒸熟。水煎，服三月便可身健受孕，斷可種子，此方之用，不特補血，而純於填精，精滿則子宮易於攝精，血足則子宮易於容物，皆有子之道也，惟是貪慾者多，節慾者少，往往不驗，服此者果能節慾三月，心靜神清，自無不孕之理，否則不過身體壯健而已，勿咎方之不靈也。

胸滿不思食不孕三十

婦人有飲食少思，胸膈滿悶，終日倦怠思睡，一經房事，呻吟不已，人以爲脾胃之氣虛也，誰知是腎氣不足乎，夫氣宜升騰，不宜消降，升騰於上焦，則脾胃易於分運，降陷於下焦，則脾胃難於運化，人之水穀之養，則精神自爾倦怠，脾胃之氣可升而不可降也明甚，然則脾胃之氣，雖充於脾胃之中，實生於兩腎之內，無腎中之水氣，則胃之氣不能騰，無腎中之火氣，則脾之氣不能化，惟有腎之水火二氣，而脾胃之氣始能升騰而不降也，然則補脾胃之氣，可不急補腎中水火之氣乎，治法必以補腎氣爲主，但補腎而不兼補脾胃之品，則腎之水火二氣不能提於至陽之上也，方用并提湯。

大熟地一兩，九蒸，巴戟一兩，水浸，蜜炙，白朮一兩，土炒，人參五錢，黃芪五錢，生用，山萸肉三錢，枸杞二錢，柴胡五分。

水煎，服三月而腎氣大旺，再服一月未有不能受孕者，此方補氣之藥，多於補精，似乎以補脾胃爲主矣，孰知脾胃健，而生精自易，是補脾胃之氣與血，正所以補腎之精與水也，又益以補精之味，則陰氣自足，陽氣易升，自爾騰越於上焦矣，陽氣不下陷，則無非大地陽春，隨遇皆是化生之機，安有不受孕之理與。

下部冰冷不受孕三十一

婦人有下身冰冷，非火不暖，交感之際，陰中絕無溫熱之氣，人以爲天分之薄也，誰知是胞胎寒之極乎，夫寒冰之地，不生草木，重陰之淵，不長魚龍，今胞胎既寒，何能受孕，雖男子鼓勇力戰，其精甚熱，直射於子宮之內，而寒冰之氣相逼，亦不過茹之於暫，而不能不吐之於久也，夫猶是人也，此婦之胞胎，何以寒涼至此，豈非天分之薄乎，非也，蓋胞胎居於心腎之間，上繫於心，而下繫於腎，胞胎之寒涼，乃心腎二火之衰微也，故治胞胎者，必須補心腎二火，而後可，方用溫胞飲。

白朮一兩，土炒，巴戟一兩，水浸，蜜炙，人參三錢，杜仲三錢，炒黑，菟絲子三錢，酒炒，山藥三錢，炒，芡實三錢，炒，肉桂二錢，去粗，附子三分，製，補骨脂二錢，鹽炒，

水煎，服一月而胞胎熱，此方之妙，補心而即補腎，溫腎而即溫心，心腎之氣旺，則心腎之火自生，心腎之火生，則胞胎之寒自散，原因胞胎之寒，以至茹而即吐，而今胞胎既熱矣，

不用補附等藥，但專補腎氣，使脾胃之氣不復下陷，則帶脈氣充，胞胎氣暖，自然受孕無疑矣。

今之種子者，多喜服熱藥，不知此方特爲胞胎寒者設，若胞胎有熱，則不宜服，審之。

倘有施面不受者乎，若改湯爲丸，朝夕吞服，尤能攝精，斷不至有伯道無兒之歎也。

胸滿少食不孕三十二

婦人有素性恬淡，飲食少則平和，多則難受，或作嘔洩，胸膈脹滿，久不受孕，人以爲賦稟之薄也，誰知是脾胃虛寒乎，夫脾胃之虛寒，原因心腎之虛寒耳，蓋胃土非心火不能生，脾土非腎火不能化，心腎之火衰，則脾胃失生化之權，即不能消水穀以化精微矣，既不能化水穀之精微，自無津液以灌溉於胞胎之中，欲胞胎有溫煖之氣，以發胚胎，必不可得，總然受胎，而帶脈無力，亦必墮落，此脾胃虛寒之咎，故無平麟之祥也，治法可不急溫補其脾胃乎，然脾之母，原在腎之命門，胃之母，原在心之包絡，欲溫補脾胃，必須補二經之火，蓋母旺子必不弱，母熱子必不寒，此子病治母之義也，方用溫土鎮麟湯。

巴戟一兩，去心，酒浸，覆盆子一兩，酒浸，蒸，白朮五錢，土炒，人參三錢，懷山藥五錢，炒，神麯一錢，炒，

水煎，服一月可以種子矣，此方之妙，溫補脾胃，而又兼補命門，與心包絡之火，藥味不多，而四經並治，命門心包之火旺，則脾與胃無寒冷之虞，子母相顧，一家和合，自然飲食多而滋化，氣血旺而能任，帶脈有力，不虞落胎，安有不玉麟之育哉。

少腹急迫不孕三十三

婦人有少腹之間，自覺有緊迫之狀，急而不舒，不能生育，此人人之所不識也，誰知是帶脈之拘急乎，夫帶脈繫於腰臍之間，宜弛而不宜急，今帶脈之急者，由於腰臍之氣不利也，而腰臍之氣不利者，由於脾胃之氣不足也，脾胃氣虛，則腰臍之氣閉，腰臍之氣閉，則帶脈拘急，遂致牽動胞胎，精即直射於胞胎，胞胎亦暫能茹納，而力難負載，必不能免小產之虞，況人多不能節慾，安得保其不墜乎，此帶脈之急，所以不能生子也，治法宜寬其帶脈之急，而帶脈之急不能遽寬也，宜利其腰臍之氣，而腰臍之氣不能遽利也，必須大補其脾胃之氣與血，而腰臍可利，帶脈可寬，自不難於孕育矣，方用寬帶湯。

白朮一兩，土炒，巴戟肉五錢，酒浸，補骨脂一錢，鹽炒，人參三錢，麥冬三錢，去心，杜仲三錢，炒黑，大熟地五錢，九蒸，肉蓯蓉三錢，洗淨，白芍三錢，酒炒，當歸二錢，酒洗，五味三分，炒，建蓮子二十粒，不去心，

水煎，服四劑少腹無緊迫之狀，服一月即受胎，此方之妙，脾胃兩補，而又利其腰臍之氣，自然帶脈寬舒，可以載物而勝任矣，或疑方中用五味白芍之酸收，不增帶脈之急，而反得帶脈之寬，殊不可解，豈知帶脈之急，由於氣血之虛，蓋血虛則縮而不伸，氣虛則蜷而不達，用芍藥之酸，以平肝木，則肝不尅脾，用五味之酸，以生腎水，則腎能益帶，似相反而實相濟也，何疑之有。

凡種子治法，不出帶脈胞胎二經，數言已洩造化之秘矣。

方似平平無奇。然御能解結種子。不可輕視。若膠漆而仍然無結。必致血瘀經脈。即牽不孕胎生子者不能成。方加解結飲合服之。可保無虞。必須變其性情始效。

解結飲。

桑螵蛸各九十枚。麥冬生用。小茴香各四十九粒。豆炒熟。高麗五十五粒。

嫉妬不孕三十四

婦人有懷抱素惡。不能生子者。人以爲天心厭之也。誰知是肝氣鬱結乎。夫婦人之有子也。必然心脈流利而滑。脾脈舒徐而和。腎脈旺大而鼓指。始稱喜脈。未有三部脈鬱。而能生子者也。若三部脈鬱。肝氣必因之而更鬱。肝不鬱則心腎之脈。必致鬱之極而莫解。蓋子母相依。鬱必不喜。喜必不鬱也。其鬱而不能成胎者。以肝木不舒。必下尅脾土。而致塞脾土之氣。塞則腰臍之氣必不利。腰臍之氣不利。必不能通任脈而達帶脈。則帶脈之氣亦塞矣。帶脈之氣既塞。則胞胎之門必閉。精即到門。亦不得其門而入矣。其奈之何哉。治法必解四經之鬱。以開胞胎之門。則幾矣。方用開鬱種玉湯。

白芍一兩酒炒。香附三錢酒炒。當歸五錢酒洗。白朮五錢土炒。丹皮三錢酒洗。茯苓三錢去皮。花粉二錢。

水煎。服一月則鬱結之氣開。鬱開則無非喜氣之益腹。而嫉妬之心。亦可以一易。自然兩相合好。給胎於頃刻之間矣。此方之妙。解肝氣之鬱。宣脾氣之困。而心腎之氣亦因之俱舒。所以腰臍利而任帶通達。不必啓胞胎之門。而胞胎自啟。不特治嫉妬者也。

肥胖不孕三十五

婦人有身體肥胖。痰涎甚多。不能受孕者。人以爲氣虛之故。誰知是溼盛之故乎。夫溼從下受。乃言外邪之溼也。而肥胖之溼。實非外邪。乃脾土之內病也。然脾土既病。不能分化水穀。以養四肢。宜其身軀瘦弱。何以能肥胖乎。不知溼盛者多肥胖。肥胖者多氣虛。氣虛者多痰涎。外似健壯。而內實虛損也。內虛則氣必衰。氣衰則不能行水。而溼停於腸胃之間。不能化精而化涎矣。夫脾本溼土。又因痰多。愈加其溼。脾不能受熱。必津潤於胞胎。日積月累。則胞胎竟變爲汪洋之水窟矣。且肥胖之婦。內肉必滿。遮隔子宮。不能受精。此必然之勢也。況又加以水溼之盛。即男子甚健。陽精直達子宮。而其水勢滔滔。泛濫可畏。亦遂化精成水矣。又何能成妊哉。治法必須以洩水化痰爲主。然徒洩水化痰。而不急補脾胃之氣。則陽氣不旺。溼痰不去。人先病矣。烏望其茹而不吐乎。方用加味補中益氣湯。

人參三錢。黃芪三錢生用。柴胡一錢。甘草一錢。當歸三錢酒洗。白朮一兩土炒。升麻四分。陳皮五分。茯苓五錢。半夏三錢製。

水煎。服八劑。痰涎盡消。再十劑。水溼利。子宮洞出。易於受精而成孕矣。其在於昔。則如望洋觀海。而至於今。則是馬到成功也。快哉。此方之妙。妙在提脾氣而升於上。作雲作雨。則水溼反利於下行。助胃氣而消於下。爲注爲液。則痰涎轉易於上化。不必用消化之品以損其肥。而肥自無礙。不必用滲決之味以開其竅。而竅自能通。陽氣充足。自能蒸精。溼邪散餘。自可受孕。何肥胖不孕之足慮乎。

再十劑後。方加杜仲一錢半。炒斷絲。續斷一錢半。炒。必受孕矣。

骨蒸夜熱不孕三十六

婦人有骨蒸夜熱。遍體火焦。口乾舌燥。咳嗽吐沫。難於生子者。人以爲陰虛火動也。誰知是骨髓內熱乎。夫寒陰之地。固不生物。而乾旱之用。豈能長養。然而骨髓與胞胎。何相關切。而骨髓之熱。即能使人不嗣。此前賢所未言者也。由一旦創言之。不幾爲世俗所駭乎。而要知不必駭也。此中實有其理焉。蓋胞胎爲五臟外之一臟耳。以其不陰不陽。所以不列於五臟之中。所謂不陰不陽者。以胞胎上繫於心包。下繫於命門。繫心包者。通於心。心者陽也。繫命門者。通於腎。腎者陰也。是陰之中有陽。陽之中有陰。所以通於變化。或生男。或生女。俱從此出。然必陰陽協和。不偏不枯。始能變化生人。否則否矣。況胞胎既通於腎。而骨髓亦腎之所化也。骨髓熱由於腎之熱。腎熱而胞胎亦不能不熱。且胞胎非骨髓之養。則嬰兒無以生骨。骨髓過熱。則骨中空虛。惟存火烈之氣。又何能成胎。治法必須清骨中之熱。然骨熱由於水虧。必補腎之陰。則骨熱除。珠露有滴瀝之喜矣。壯水之主。以制陽光。此之謂也。方用清骨滋腎湯。

地骨皮一兩酒洗。丹皮五錢。沙參五錢。麥冬五錢去心。元參五錢酒洗。五味子五分炒研。白朮三錢土炒。石斛二錢。

水煎。連服三十劑。而骨熱解。再服六十劑。自受孕。此方之妙。補腎中之精。涼骨中之熱。不清胞胎。而胞胎自無太熱之患。然陰虛內熱之人。原易受妊。今因骨髓過熱。所以受精而變燥。以致難於育子。本非胞胎之不能受精。所以稍補其腎。以殺其火之有餘。而益其水之不足。使易種子耳。

腰酸腹脹不孕三十七

婦人有腰酸背楚。胸滿腹脹。倦怠欲臥。百計求嗣。不能如願。人以爲腰腎之虛也。誰知是任督之困乎。夫任脈行於前。督脈行於後。然皆從帶脈之上下而行也。故任脈虛則帶脈鬆於前。督脈虛則帶脈鬆於後。雖胞胎受精。亦必小產。況任督之脈既虛。而疝瘕之症必起。疝瘕礙胞胎而外障。則胞胎縮於疝瘕之內。往往精施而不能受。雖餌以玉燕。亦何益哉。治法必須先去其疝瘕之病。而補其任督之脈。則提挈天地。把握陰陽。呼吸精氣。包裹成形。力足以勝任而無虞矣。外無所障。內有所容。安有不能生育之理。方用升帶湯。

白朮一兩土炒。人參三錢。沙參五錢。肉桂一錢去粗。茯苓粉三錢。鱉甲三錢炒。茯苓三錢。半夏一錢製。神麯一錢炒。

水煎。連服三十劑。而任督之氣旺。再服三十劑。而疝瘕之症除。此方利腰臍之氣。正升補任督之氣也。任督之氣升。而疝瘕自有難容之勢。況方中有肉桂以散寒。學齊以祛積。鱉甲之攻堅。茯苓之利溼。有形自化於無形。滿腹皆升騰之氣矣。何至受精而再墜乎哉。

此方爲有疝瘕而設。故用沙參。華齊粉。鱉甲。以破堅理氣。若無疝瘕。去上三味。加杜仲一錢半。炒黑。澤瀉一錢半。炒。甘杞杞二錢。三味服之。腰酸腹脹自除矣。鱉甲破氣。不可與氣虛。惟有疝瘕與肝鬱者宜之。

便溺腹脹足浮腫不孕三十八

婦人有小水癃澀。腹脹脚腫。不能受孕者。人以爲小腸之熱也。誰知是膀胱之氣不化乎。夫膀胱原與胞胎相近。膀胱病而胞胎亦病矣。蓋水溼之氣。必走膀胱。而膀胱不能自化。必得腎氣相通。始能化水。以出陰器。倘膀胱無腎氣之通。則膀胱之氣化不行。水溼之氣。必且滲入胞胎之中。而成汪洋之勢。汪洋之田。又何能生物也哉。治法必須壯腎氣以分消胞胎之溼。益腎火以達化膀胱之水。使先天之本壯。則膀胱之氣化。胞胎之溼除。而汪洋之田。化成南畝之壤矣。水化則膀胱利。火旺則胞胎煖。安有布種而不發生者哉。方用化水種子湯。

巴戟。一兩。酒　白朮。一兩。土炒　茯苓。五錢　人參。三錢　菟絲子。五錢。酒炒　芡實。五錢。炒　車前。二錢。酒炒　肉桂。一錢。去粗研

水煎服二劑。膀胱之氣化。四劑腹脚腫之症除。又十劑扶脾服六十劑。腎氣大旺。胞胎溫煖。易於受胎而生育矣。此方利膀胱之水。全在補腎中之氣。煖胞胎之氣。全在壯腎中之火。至於補腎之藥。多是濕潤之品。不以溼而益助其溼乎。然方中之藥。妙於補腎之火。而非補腎之水。尤妙於補火而無燥烈之炎。利水而非滂滂之猛。所以膀胱氣化。胞胎不溼。而發榮長養無窮與。

（便溺腹脹足浮腫。膀胱氣化。補腎火。利水。不能受孕。用化水種子湯。）

女科下卷

妊娠惡阻三十九

婦人懷娠之後。惡心嘔吐。思酸解渴。見食憎惡。困倦欲臥。人皆曰妊娠惡阻也。誰知肝血太操乎。夫婦人受妊。本於腎氣之旺也。腎旺是以攝精。然腎一受精而成娠。則腎水生胎。不暇化潤於五臟。而肝爲腎之子。日食母氣以養。一日無津液之養。則肝氣迫索。而腎水不能應。則肝益急。肝急則火動而逆也。肝氣既逆。是以嘔吐惡心之症生焉。嘔吐縱不至太甚。而其傷氣則一也。氣既受傷。則肝血愈耗。世人用四物湯。治胎前諸症者。正以其能生肝之血也。然補肝以生血。未爲不佳。但生血而不知生氣。則脾胃衰微。不勝頻嘔。由恐氣虛則血不易生也。故於平肝補血之中。加以健脾開胃之品。以生陽氣。則氣能生血。尤益胎氣耳。或疑氣逆而用補氣之藥。不益助其逆乎。不知妊娠惡阻。其逆不甚。且逆是因虛而逆。非因邪而逆也。因邪而逆者。勦其氣則逆增。因虛而逆者。補其氣則逆愈。況補氣於補血之中。則陰足以制陽。又何虛其增逆乎。宜用順肝益氣湯。

人參。一兩。酒洗　當歸。一兩　蘇子。一兩。炒研　白朮。三錢。土炒　茯苓。二錢　熟地。五錢。九蒸　白芍。三錢。酒炒　麥冬。三錢。去心　陳皮。三分。炒

（亦有肝鬱氣滯。胸膈膨悶。見食不進。不能多食。此乃別治之法。另有方。）

方略效。但蘇子一兩。難進一錢之服。然調胃上先生人氣賦。最壯。減非用一兩不效。今當下元。用一錢可也。真不可用一兩。

仁。一錢。研碎　神麯。一錢。炒

水煎服一劑輕。二劑平。三劑全愈。此方平肝則肝逆除。補腎則肝燥息。補氣則血易生。凡胎病而少帶惡阻者。俱以此方投之無不安。最有益於胎婦。其功更勝於四物焉。

妊娠浮腫四十

妊婦有至五個月。肢體倦怠。飲食無味。先兩足腫。漸至遍身頭面俱腫。人以爲溼氣使然也。誰知是脾肺氣虛乎。夫妊娠雖有按月發胎之分。其實不可拘於月數。總以健脾補肺爲大綱。蓋脾統血。肺主氣。胎非血不養。非氣不生。脾健則血旺而養胎。肺清則氣旺而生子。苟肺虛。脾無氣。則氣餒。氣餒則不能運氣於皮膚矣。脾虛則血少。血少則不能運血於肢體矣。氣與血兩虛。脾與肺失職。所以飲食難消。精微不化。勢必至氣血下陷。不能升舉。而溼邪即乘其所虛之處。積而成浮腫症。非由脾肺之氣血虛而然耶。治法當補其脾之血。與肺之氣。不必祛溼。而溼自無不去之理。方用加減補中益氣湯。

人參。五錢　黃芪。三錢。生用　柴胡。一錢　甘草。一分　當歸。三錢。酒洗　白芍。五錢。土炒　茯苓。一兩　升麻。三分　陳皮。三分

水煎。服四劑即愈。十劑不再犯。夫補中益氣湯之立法也。原是升提脾肺之氣。似乎益氣而不補血。然而血非氣不生。是補氣即所以生血。觀當歸補血湯。用黃芪爲君。則較著彰明矣。況溼氣乘脾肺之虛而相犯。未便大補其血。恐陰太盛而招陰也。只補氣而助以利溼之品。則氣升而水尤易散。血亦隨之而生矣。然則何以重用茯苓。而至一兩不幾以利溼爲君乎。嗟嗟。溼症而不以此藥爲君。將以何者爲君乎。況重用茯苓於補氣之中。雖曰滲溼。而仍是健脾清肺之意。且凡利水之品。多是耗氣之藥。而茯苓與參芪合。實補多於利。所以重用之。以分溼邪。即以補氣血耳。

（疏肝化滯湯。全當歸酒洗六錢。杭芍酒炒三錢。黨參去蘆三錢。白扁豆去皮四錢。雲苓二錢。香附炒焦二錢。砂仁炒研。錢半。陳皮八分。甘草五分。水煎服。）

妊娠小腹作疼四十一

妊娠小腹作疼。胎動不安。如有下墜之狀。人只知帶脈無力也。誰知是脾腎之虧乎。夫胞胎繫於帶脈。而帶脈實關於脾腎。脾腎虧損。則帶脈無力。胞胎即無以勝任矣。況人之脾腎虧損者。非飲食之過傷。即色慾之太甚。脾腎虧則帶脈急。胞胎所以有下墜之狀也。然則胞胎之系。通於心與腎。而不通於脾。補腎可也。何故補脾。然脾爲後天。腎爲先天。脾非先天之氣不能化。腎非後天之氣不能生。補腎而不補脾。則腎之精何以遽生也。是補後天之脾。正所以補先天之腎也。補先後二天之脾與腎。正所以固胞胎之氣與血。脾腎可不均補乎。方用安奠二天湯。

人參。一兩　當歸。一兩。酒洗　熟地。九蒸。一兩　白朮。一兩。土炒　山藥。五錢。炒　山茱。五錢。去核。蒸　炙草。一錢　杜仲。三錢。炒絲　枸杞。二錢　扁豆。五錢

（人參一兩。無力者以黨參代之。無上黨參者以黃芪代之。）

炒、去皮、水煎、服一劑而疼止、二劑而胎安矣、夫胎動乃脾腎雙虧之症、非大用參朮熟地補陰補陽之品、斷不能挽回於頃刻、世人往往畏用參朮、或少用以冀建功、所以寡效、此方正妙在多用也、

妊娠口乾咽痛四十二

妊婦至三四個月、自覺口乾舌燥、咽喉微痛、無津以潤、以至胎動不安、甚則血流如經水、人以爲火動之極也、誰知是水虧之甚乎、夫胎也者、本精與血之相結而成、逐月養胎、古人每分經絡、其實均不離腎水之養、故腎水足而胎安、腎水虧而胎動、雖然、腎水又何能動胎、必腎經之火動、而胎始不安耳、然而火之有餘、仍是水之不足、所以火炎而胎必動、補水則胎自安、亦既濟之義也、惟是腎水不能遽生、必須滋補肺金、金潤則能生水、而水有逢源之樂矣、水既有本、則源泉混混矣、而火又何難制乎、再少加以清熱之品、則胎自無不安矣、方用潤燥安胎湯、

方極妙、用之立應、真不可因咽痛而加豆根射干等藥、亦不可因過溺而加滑石、

熟地、一兩、生地、三錢、酒炒、山萸肉、五錢、麥冬、五錢、去心、五味、二錢、炒、阿膠、二錢、蛤粉炒、黃芩、一錢、酒炒、益母、二錢、

水煎、服二劑而燥息、再二劑而胎安、連服十劑而胎不再動矣、此方專填腎中之精、而兼補肺、然補肺仍是補腎之意、故腎經不乾燥、則火不能灼、胎焉有不安之理乎、

妊娠吐瀉腹疼四十三

妊婦上吐下瀉、胎動欲墮、腹疼難忍、急不可緩、此脾胃虛極而然也、夫脾胃之氣虛、則胞胎無力、必有崩墜之虞、況又上吐下瀉、則脾與胃之氣、因吐瀉而愈虛、欲胞胎之無恙也得乎、然胞胎疼痛、而究不至下墜者何也、全賴腎氣之固也、胞胎繫於腎而連於心、腎氣固則交於心、其氣通於胞胎、此胞胎之所以欲墜而不得也、且腎氣能固、則陰火必來生脾、心氣能通、則心火必來援胃、脾胃雖虛而未絕、則胞胎雖動而不墜、可不急救其脾胃乎、然脾胃當將絕而未絕之時、只救脾胃而難遽生、更宜補其心腎之火、使之生土、則兩相接續、胎自固而安矣、方用援土固胎湯、

白朮多餌、肉桂更無佳者、用者若有真識、固妙、如無真識、白朮以白扁豆代之、肉桂以藕故減代之、

人參、一兩、白朮、二兩、土炒、山藥、炒、一兩、肉桂、二錢、去粗研、製附子、五分、續斷、三錢、杜仲、三錢、炒黑、山萸、一兩、去核、枸杞、三錢、菟絲子、三錢、酒炒、砂仁、三錢、研、炙草、一錢、

水煎、服一劑而洩止、二劑而諸病盡愈矣、此方救脾胃之土十之八、救心腎之火十之二也、救火輕於救土者、豈以土欲絕而火未甚衰乎、非也、蓋土崩非重劑不能援、火衰雖小劑而可助、熱藥多用、必有太燥之虞、不比溫甘之品也、況胎動係土衰而非火弱、何用太

熱、妊娠忌桂附、是恐傷胎、豈可多用、小熱之品、計之以錢、大熱之品、計之以分者、不過用以引火、而非用以壯火也、其深思哉、

妊娠子懸脅疼四十四

妊婦有懷抱憂鬱、以致胎動不安、兩脅悶而疼痛、如弓上弦、人止知是子懸之病也、誰知是肝氣不通乎、夫養胎半係於腎水、然非肝血相助、則腎水實有獨力難支之勢、故保胎必滋腎水、而肝血斷不可不顧、使肝氣不鬱、則肝之氣不閉、而肝之血必旺、自然灌溉胞胎、合腎水而並協養胎之力、今肝氣因憂鬱而閉塞、則胎無血蔭、腎難獨任、而胎安得不上升以覓食、此乃鬱氣使然也、莫認爲子之欲自懸而妄用泄子之品、則得矣、治法宜開肝氣之鬱結、補肝血之燥乾、則子懸自定矣、方用解鬱湯、

方如蓋亡米三回錢尤妙、

人參、一錢、白朮、五錢、土炒、白茯苓、三錢、當歸、一兩、酒洗、白芍、一兩、酒炒、枳殼、五分、炒、砂仁、三錢、研、山梔子、三錢、炒、薄荷、二錢、

水煎、服一劑而悶痛除、二劑而子懸定、至三劑而全安、去梔子、再多服數劑不復發、此乃平肝解鬱之聖藥、鬱開則木不尅土、肝平則火不妄動、方中又有健脾開胃之品、自然水穀四布、而肝與腎有潤澤之機、則胞胎自無乾燥之患、又何慮上懸之不愈哉、

妊娠跌損四十五

妊婦有失足跌損、致傷胎元、腹中疼痛、勢如將墮者、人只知是外傷之爲病也、誰知有內傷之故乎、凡人內無他症、胎元堅固、即或跌撲閃挫、依然無恙、惟內之氣血素虧、故略有閃挫、胎便不安、若止作閃挫外傷治、斷難奏功、且恐有因治而反墮者、可不慎與、必須大補氣血、而少加以行瘀之品、則瘀散胎安矣、倶大補氣血之中、又宜補血之品多於補氣之藥、則無不得之、方用救損安胎湯、

當歸、一兩、酒洗、白芍、三錢、酒炒、生地、一兩、酒炒、白朮、五錢、土炒、炙草、一錢、人參、一錢、蘇木、三錢、搗碎、乳香、一錢、去油、沒藥、一錢、去油、

水煎、服一劑而疼痛止、二劑而勢不下墜矣、不必三劑也、此方之妙、妙在既能去瘀、而不傷胎、又能補氣補血、而不凝滯、因無通利之害、亦無閉塞之患、有益無損、大建奇功、即此方與、然不特治懷孕之閃挫也、即無振閃挫亦可用之、

妊娠小便下血病名胎漏四十六

妊婦有胎不動、腹不疼、而小便中、時常有血流出者、人以爲血虛胎漏也、誰知氣虛不能攝血乎、夫血只能蔭胎、而胎中之蔭血、必賴氣以衛之、氣虛下陷、則蔭胎之血亦隨氣而陷矣、然則氣虛下陷、而血未嘗虛、似不應與氣同陷也、不知氣乃血之衛、血賴氣以固、氣虛則血

如用炒常白朮、土炒無益、炒以其能理氣行血也、於白朮味過甘、不能理氣行血、用者知之、

無濕依。無濕依必燥急。燥急必生邪熱。血寒則靜。血熱則動。動則外出而莫能遏。又安得不下流乎。倘氣不虛而血熱。則必大崩。而不止些微之漏矣。治法宜補其氣之不足。而洩其火之有餘。則血不必止。而自無不止矣。方用助氣補漏湯。

補血不用當歸炒。

人參一兩　白芍五錢酒炒　黃芩三錢酒炒黑　生地三錢酒炒黑　益母草一錢　續斷二錢　甘草一錢

水煎。服一劑而血止。二劑再不漏矣。此方用人參以補陽氣。用黃芩以洩陰火。火洩則血不熱。而無欲動之機。氣旺則血有依。而無可漏之竅。氣血俱旺而和協。自然歸經。而各安其所矣。又安有漏洩之患哉。

妊娠子鳴四十七

妊婦懷胎。至七八個月。忽然兒啼腹中。腰間隱隱作痛。人以爲胎熱之過也。誰知是氣虛之故乎。夫兒之在胞胎也。全憑母氣以化成。母呼兒亦呼。母吸兒亦吸。未嘗有一刻之間斷。至七八個月則母氣必虛矣。兒不能隨母之氣以爲呼吸。必有迫不及待之勢。母子原相依爲命。子失母之氣。則拂子之意。而啼於腹中。似可異而究不必異。病名子鳴。氣虛甚也。治宜大補其氣。使母之氣與子氣和合。則子之意安。而啼亦息矣。方用扶氣止啼湯。

黃芪用嫩黃芪不可用箭黃芪

人參一兩　黃芪一兩生用　麥冬一兩去心　當歸五錢酒洗　橘紅五分　甘草一錢　花粉一錢

水煎。服一劑而啼即止。二劑不再啼。此方用人參、黃芪、麥冬以補肺氣。使肺氣旺。則胞胎之氣亦旺。胞胎之氣旺。則胞中之子氣。有不隨母之氣以爲呼吸者。未之有也。

妊娠腰腹疼渴汗燥狂四十八

婦人懷妊。有口渴汗出。大飲冷水。而煩燥發狂。腰腹疼痛。以致胎欲墮者。人莫不謂火盛之極也。抑知是何經之火盛乎。此乃胃火炎燒。熬煎胞胎之水。以致胞胎之水涸。胎失所養。故動而不安耳。夫胃爲水穀之海。多氣多血之經。所以養五臟六腑者。蓋萬物皆生於土。土氣厚而物始生。土氣薄而物必死。然土氣之所以能厚者。全賴火氣之來生也。胃之能化水穀者。亦賴火氣之能化也。今胃中有火。宜乎生土。何以火盛而反致害乎。不知無火難以生土。而火多又能燥水。雖土中有火土不死。然亦必有水方不燥。使胃火太旺。必致燥乾腎水。土中無水。則自潤不足。又何以分潤胞胎。土燥之極。火勢炎蒸。犯心越神。兒胎受逼。安得不下墜乎。經所謂二陽之病發心脾者。正此義也。治法必須洩火滋水。使水氣得旺。則火氣自衰。火衰而胎狂燥渴自定矣。方用息焚安胎湯。

原方不可加減。孀妊燥狂。每誤有別症。不曰鼠毒。即云時疾傳經。而認妊娠於不知。誤服多藥。數月不愈。甚有

生地一兩酒炒　青蒿五錢　白芍五錢土炒　茯苓三錢　人參三錢　知母二錢　花粉二錢

水煎。服一劑而狂少平。二劑而狂大定。三劑而火藥解。胎亦安矣。此方藥料頗重。恐人畏

不勝而不敢全用。又不得不再爲囑之。懷胎而火勝若此。非大劑何以能遏。火不息則狂不止。而胎能安耶。況藥料雖多。均是滋水之味。益而無損。勿過慮也。

打去胎而以顯大人性命爲名者。更屬糊塗之極。

妊娠中惡四十九

婦人懷子在身。痰多吐涎。偶遇鬼神祟惡。忽然腹中疼痛。胎向上頂。人疑爲子懸之病也。誰知是中惡而胎不安乎。大凡不正之氣。最易傷胎。故有孕之婦。斷不宜入廟燒香。與避靜陰寒之地。如古洞幽巖。皆不可登。蓋邪祟多在神宇潛蹤。幽陰巖洞。亦其往來遊戲之所。觸之最易相犯。不可不深戒也。況孕婦又多痰涎。眼目易眩。目一眩如有妄見。此招祟之因。痰而起也。人云怪病每起於痰。其信然與。治法似宜以治痰爲主。然治痰必至耗氣。氣虛而痰難消化。胎必動搖。必須補氣以生血。補血以活痰。再加以清痰之品。則氣血不虧。痰亦易化矣。

輔正逐邪。方極平正。如此可知用金石之藥以化痰者。皆矜奇立異。欲速取效。不知增耗人之真氣。戒之。

方用消惡安胎湯。

當歸一兩酒洗　白芍一兩酒炒　白朮五錢土炒　茯苓五錢　人參三錢　甘草一錢　陳皮五分　花粉三錢　蘇葉一錢　沈香一錢研末

此方大補氣血。輔正邪自除之義也。

妊娠多怒墮胎五十

婦人有懷妊之後。未至成形。或已成形。其胎必墮。人皆曰氣血衰微。不能固胎也。誰知是性急怒多。肝火大動而不靜乎。夫肝本藏血。肝怒則不藏。不藏則血難固。蓋肝雖屬木。而木中實寄龍雷之火。所謂相火是也。相火宜靜。而不宜動。靜則安。動則燒。況木中之火。又易動而難靜者也。人生在世。無日非動靜之時。即無日非動火之時。尤加大怒。則火益動矣。火動而不可止。遏則火勢飛揚。不能生氣化胎。而反食氣傷精矣。精傷則胎無所養。勢必不墜而不已。經所謂少火生氣。壯火食氣。正此義也。治法宜平其肝中之火。利其腰腎之氣。使氣生夫血而血清其火。則庶幾矣。方用利氣洩火湯。

性急怒多。而不用舒肝藥者。以其有胎孕故也。經云。胎病則母病。胎安則母自愈。所以妊娠一門。總以補氣養血安胎爲主。則萬病自除矣。

人參三錢　白朮一兩土炒　甘草一錢　熟地五錢九蒸　當歸三錢酒洗　白芍五錢酒炒　麥冬三錢炒　黃芩二錢炒

水煎。服六十劑而胎不墜矣。此方名雖利氣。而實補氣也。然補氣而不加以洩火之品。則氣旺而火不能平。必反害其氣也。故加黃芩於補氣之中以洩火。又有熟地歸芍以滋肝。而壯水之主。則血不燥而氣得利。怒氣息而火自平。不必利氣。而氣無不利。即無往而不利矣。

行房小產五十一

妊婦因行房頻狂。遂致小產血崩不止。人以爲火動之極也。誰知是氣脫之故乎。大凡婦人之懷妊也。賴腎水以蔭胎。水源不足。則火易沸騰。加以久戰不已。則火必大動。再至與酣鬬

狂。精必大洩。精大洩則腎水益涸。而龍雷相火益熾。水火兩病。胎不能固而墮矣。胎墮而火猶未息。故血隨火而崩下。有不可止遏之勢。人謂火動之極。亦未爲大誤也。但血崩本於氣虛。火盛本於水虧。腎水既虧。則氣之生源涸矣。氣源既涸。而氣有不脫者乎。此火動是標。而氣脫是本也。經云。治病必求其本。本固而標自立矣。若只以止血爲主。而不急固其氣。則氣散不能遽回。而血何由止。不大補其精。則水涸不能遽長。而火且益熾。不揣其本。而齊其末。意在本也。

小產血崩。多由行湯面致。若年逾四十。黃芪宜倍用。熟地宜減半。蓋以其氣虛火盛也。否則每令氣脫不救。凡有妊娠者。須絕鹽鹽湯等。勿自陷危途。慎之。

跌閃小產五十二

妊婦有跌仆閃挫。遂致小產。血流紫塊。昏暈欲絕者。人皆曰瘀血作祟也。誰知是血室損傷乎。夫血室與胞胎相連。如脣齒之相依。胞胎有傷。則血室亦損。脣亡齒寒。理有必然也。然胞胎傷損而流血者。其傷淺。血室傷損而流血者。其傷深。傷之淺者。孩在腹。傷之深者。孩在心。同一跌仆損傷。而未小產。與已小產。治各不同。未小產而胎不安者。宜顧其胎。而不可輕去其血。已小產而血大崩。宜散其瘀。而不可重傷其氣。蓋胎已墮。血既脫。而血室空虛。惟氣存耳。倘或再傷其氣。安保無氣脫之殘乎。經云。血爲營。氣爲衛。使衛有不固。則營無依而安矣。故必補氣以生血。新血生而瘀血自散矣。方用理氣散瘀湯。

人參。一兩。黃芪。一兩。生用。當歸。五錢。酒洗。伏苓。二錢。紅花。一錢。丹皮。三錢。荳炭。五錢。

水煎。服一劑而流血止。二劑而昏暈除。三劑而全安矣。此方用人參黃芪以補氣。氣旺則血可攝也。用當歸丹皮以生血。血生則瘀難留也。用紅花黑荳以活血。血活則瘀可除也。用茯苓以利水。水利則血易歸經也。

胎未墮。宜加杜仲炒炭一錢。續斷炒黑一錢。若胎已墮。服原方。血崩不止。加貫衆炭三錢。若血閉心煩。加元胡炭一錢。

大便乾結小產五十三

妊婦有口渴煩燥。舌上生芒。兩脣龜裂。大便乾結。數日不得通。以致腹疼小產者。人皆曰大腸之火熱也。誰知是血熱燥胎乎。夫血所以養胎也。溫和則胎受其益。太熱則胎受其損。如其熱以燥之。則兒在胞胎之中。若有探湯之苦。難以存活。則必外越下奔。以避炎氣之逼迫。欲其胎之不墜也得乎。然則血陰乎胎。則血必虛耗。血者陰也。虛則陽亢。亢則害矣。且血乃陰水所化。血日陰胎。取給刻不容緩。而火燥。陰水不能速生以化血。所以陰虛火動。陰中無

非火氣。血中亦無非火氣矣。兩火相合。焚逼兒胎。此胎之所以下墜也。治法宜清胞中之火。補腎中之精。則可已矣。或疑兒已下墜。何故再顧其胞。血不蔭胎。何必大補其水。殊不知火動之極。以致胎墜。則胞中純是一團火氣。此火乃虛火也。實火可洩。而虛火宜於補中清之。則虛火易散。而真火可生。倘一味清涼以降火。全不顧胞胎之虛實。勢必至寒氣逼人。胃中生氣蕩索矣。胃乃二陽資養五臟者也。胃陽不生。何以化精微以生陰水乎。有不變爲勞瘵者幾希矣。方用加減四物湯。

此方加減年一錢尤妙。

熟地。五錢。九蒸。白芍。三錢。生用。當歸。一兩。酒洗。川芎。一錢。山梔子。一錢。炒。山萸。二錢。蒸。去核。山藥。三錢。炒。丹皮。三錢。

水煎。服四五劑而全愈矣。

畏寒腹疼小產五十四

妊婦有畏寒腹疼。因而墮胎者。人只知下部太寒也。誰知是氣虛。不能攝胎乎。夫人生於火。亦養於火。非氣不充。氣旺則火旺。氣衰則火衰。人之所以坐胎者。受父母先天之真火也。先天之真火。即先天之真氣以成之。故胎成於氣。亦攝於氣。氣旺則胎牢。氣衰則胎墮。胎日加長。而氣日加衰。安得不墮哉。況又遇寒氣外侵。則內之火氣更微。火氣微則長養無資。此胎之不能不墮也。使當其腹疼之時。即用人參乾薑之類。補氣祛寒。則可以疼止而胎安。無如人拘於妊娠之藥。禁而不敢用。因致墮胎。而傷存幾微之氣。不急救氣。尚有何法。方用黃芪補氣湯。

黃芪。二兩。生用。當歸。一兩。酒洗。肉桂。五分。去粗皮研。

水煎。服五劑愈矣。倘認定是寒。大用辛熱。全不補氣與血。恐過於燥熱。反致亡陽而變危矣。

肉桂須用好的。如無佳者。用炮姜代之。減一錢二錢。皆可。不可減用五分。

大怒小產五十五

妊婦有大怒之後。忽然腹疼吐血。因而墮胎。及墮胎之後。腹疼仍未止者。人以爲肝之怒火未退也。誰知是血不歸經而然乎。夫肝所以藏血者也。大怒則血不能藏。實失血而不當墮胎。何爲失血而胎亦隨墮乎。不知肝性最急。血鬥不閉。其血直搗於胞胎。胞胎之系。通於心腎之間。肝血來沖。必斷絕心腎之路。胎因心腎之路斷。胞胎失水火之養。所以墮也。胎既墮矣。而腹疼如故者。蓋因心腎未援。欲結無計。彼此痛傷。肝氣欲歸於心。而心不受。欲歸於腎。而腎不納。故血猶未靜。而疼無已也。治法宜引肝之血。而不平肝之氣。則氣逆而不易轉。即血逆而不易歸也。方用引氣歸血湯。

白芍。五錢。酒炒。當歸。五錢。酒洗。白朮。三錢。土炒。甘草。一錢。黑芥穗。三錢。丹皮。三錢。荳炭。五分。香附。五分。酒炒。麥冬。三錢。去心。

蓮鬚。加用白芍。因其能斂也。胎墮後。用白芍五錢。惟上元生人可。若下元生人。萬不可用。必不

將已而用之精白芍炒黃用三錢可也餘劑如法製

金。一錢炒。

水煎服。此方名爲引氣。其實仍是引血也。引血亦所以引氣。氣歸於肝之中。血亦歸於肝之內。氣血兩歸。而腹疼自止矣。

血虛難產五十六

妊娠有腹疼證。曰不能生產。人皆曰氣虛力弱。不能送子出產門。誰知是血虛膠滯。胞中無血。兒難轉身乎。夫胎之成。成於腎臟之精。而胎之養。養於五臟六腑之血。故血旺則子易生。血衰則子難產。所以臨產之前。宜用補血之藥。補血而血不能遽生。必更兼補氣以生之。然不可純補其氣也。恐陽過於旺。則血仍不足。偏勝之害。必有升而無降。亦難產之漸也。防微杜漸。其惟氣血兼補乎。使氣血並旺。則氣能推送而血足以濟之。是汪洋之中。自不難轉身也。又何有膠滯之患乎。方用送子丹。

生黃芪。一兩。當歸。一兩。酒洗。麥冬。一兩。去心。熟地。五錢。川芎。三錢。

水煎。服二劑而生矣。且無橫生倒產之患。此補血補氣之藥也。二者相較。補血之味。多於補氣之品。蓋補氣止用黃芪一味。其餘無非補血之品。血旺。氣得所養。氣生。血得所依。胞胎潤澤。自然易產。譬如舟遇水淺之處。雖大用人力。終難推行。忽逢春水泛溢。舟自躍躍欲行。再得順風以送之。有不揚帆而迅行者乎。

方診者臨產交骨不開。加炭盒板尾三錢。生過子給人頂心髮三錢。洗淨。用新瓦一個。置火上燒紅。醋成灰。入瓶內。蓋。服下即效。

交骨不開難產五十七

妊婦有兒到產門。竟不能下。此危急存亡之時也。人以爲胞胎先破。水乾不能滑利也。誰知是交骨不開之故乎。蓋產門之上。原有骨二塊。兩相關合。名曰交骨。未產之前。其骨自合。若天衣之無縫。臨產之際。其骨自開。如開門之見山。婦人兒門之肉。原自斜生。皮亦橫長。實可寬可窄。可大可小者也。苟非交骨連絡。則兒門必然大開。可以手入探取胞胎矣。此交骨爲兒門之下關。實婦人鎖鑰之鍵。此骨不閉。則腸可直下。此骨不開。則兒難降生。然而交骨之能開能合者。氣血主之也。血旺而氣衰。則兒雖向下。而兒門不開。氣旺而血衰。則兒門可開。而兒難向下。是氣所以開交骨。血所以轉兒身也。欲生產之順利。非大補氣血不可。然交骨之閉甚易。而交骨之開甚難。臨產交骨不開者。多由於產前貪慾洩精大甚。精洩則氣血失生化之本而大虧矣。氣血虧則無以運潤於兒門。而交骨粘滯不開矣。故欲交骨之開。必須於補氣補血之中。而加開骨之品。兩相合治。自無不開之患。不必催生。而兒自迅下。母子俱無恙矣。方用降子湯。

當歸。一兩。人參。五錢。川芎。五錢。紅花。一錢。川牛膝。三錢。柞木枝。一兩。

故參面殿。若子未臨門。血虛難產。宜服前送子丹。不可連服此方。

水煎。服一劑。兒門必響亮一聲。交骨開解。而兒乃降生矣。此方用人參以補氣。芎歸以補血。紅花以活血。牛膝以降下。柞木枝以開關解骨。君臣佐使。同心協力。所以取效如神。在用開於補之中也。然單用柞木枝。亦能開骨。但不補氣與血。恐開而難合。未免有下部中風之患。不若此方之能開能合之爲神妙也。至於兒未臨門之時。萬不可先用柞木以開其門。然用降子湯。亦正無妨。以其能補氣血耳。若欲單用柞木。必須候到門而後可。

腳手先下難產五十八

妊婦生產之際。有腳先下而兒不得下者。有手先下而兒不得下者。人以爲橫生倒產。至危之症也。誰知是氣血兩虛之故乎。夫兒在胞胎之中。兒身正坐。男面向後。女面向前。及至生時。頭必旋轉而向下生。此天地造化之奇。非人力所能勉強者。雖然。先天與後天。原並行而不悖。天機之動。必得人力以濟之。所謂人力者。非產母用力之謂也。謂產母之氣與血耳。產母之氣血足。則胎必順。產母之氣血虧。則胎必逆。順則易生。逆則難產。氣血既虧。母身必弱。子在胞中亦必弱。胎弱無力。欲轉頭向下而不能。此胎之所以有腳手先下者也。當是之時。急用針刺兒之手足。則兒必痛而縮入。急用轉天湯以救順之。

人參。二兩。當歸。二兩。酒洗。川芎。一兩。川牛膝。三錢。升麻。四分。附子。一分。

若服三劑後。以針刺兒手足。仍不轉頭。以針刺產婦合骨穴。兒即下。萬不可使穩婆用手探取。以救子母俱危。

水煎。服一劑。兒轉身矣。再二劑自然順生。此方之妙。用人參以補氣之虧。用芎歸以補血之虧。人人皆知其義。若用升麻。又用牛膝。附子。恐人未識其妙也。蓋兒已身斜。非用提挈。則頭不易轉。然轉其身非用下行。則身不易降。升麻牛膝並用。而又用附子者。欲其撫經。不逆。使氣血迅速以催生也。

氣逆難產五十九

婦人有生產數日。而胎不下者。服催生之藥。皆不見效。人以爲交骨之難開也。誰知是氣逆不行而然乎。夫交骨不開。固是難產。然兒頭到產門而不能下者。方是交骨不開之故。自當用開骨之劑。若兒頭尚未到產門。乃氣逆不行。兒身難轉耳。非交骨不開之故也。若開其交骨。則兒門大開。兒頭未轉而向下。必致變症非常。是兒門萬萬不可輕開也。大凡生產之時。切忌坐草太早。若兒未轉頭。原難驟生。乃早於坐草。產婦見兒許久不下。未免心懷恐懼。恐則神怯。怯則氣下而不能升。氣既不升。則上焦閉塞。而氣乃逆矣。上氣既逆。而上焦必服滿而氣益難行。氣沮滯於上下之間。不利氣而徒催生。則氣愈逆。而胎愈閉矣。治法但利其氣。兒自轉身而下矣。方用舒氣散。

人參。一兩。當歸。一兩。酒洗。川芎。五錢。白芍。五錢。炒。紫蘇梗。三錢。牛膝。三錢。陳皮。一錢。柴胡。八分。

凡臨產三日前。必先腹痛一小次。名曰試痛。此時萬勿坐草。臨盆但將包兒溺物預備現成。不可早坐。穩婆來。過三日後。腹若大痛。方坐穩婆來。不可令產婦見面。恐怕穩婆。不可妄言。緩待。不可妄言。產婦聚名曰收

生。從其兩手操。不欲兒墮地。受傷。非標奇別有妙法也。若種樹來之。即令產婦見面。彼必胡言亂語。用力太早。必致難產。百變生。救之慎之。

穀白七寸。水煎。服一劑而逆氣轉。兒即下矣。此方利氣而實補氣。蓋氣逆由於氣虛。氣虛易於恐懼。補其氣而恐懼自定。恐懼定而氣逆者。將莫知其何以定也。何必開交骨之多事乎哉。

子死產門難產六十

婦人有生產三四日。兒已到產門。交骨不開。兒不得下。子死而母未亡者。服開骨之藥不驗。蓋有死亡之危。今幸而不死者。正因其子死。而胞胎下墜。子母雖開。母氣已收。未至同子氣俱絕也。治但救其母。而不必顧其子矣。然死子在產門。塞其下口。亦有致母死亡之道。宜用推送之法。補血以生水。補氣以生血。使氣血兩旺。死子可出。而存母命也。倘徒用降子之劑以墜之。則死子未必下。而母氣先脫矣。非救援之善者也。山親見此等之症。常用救母丹。活人頗多。故誌之。

人參。一兩。當歸。二兩。酒洗。川芎。一兩。益母草。一兩。赤石脂。一錢。芥穗。三錢。炒黑。

水煎。服一劑而死子下矣。此方用芎歸以補血。人參以補氣。氣旺血旺。則上能升。而下能降。氣能推而血能送。況益母又善下死胎。石脂能下瘀血。自然一湧而出。無少阻滯矣。

子死腹中難產六十一

婦人有生產六七日。胎衣已破。而子不見下。人以為難產之故也。誰知是子已死於腹中乎。夫兒死於兒門之邊易辨。而死於腹中難識。蓋兒已到產門之邊未死者。頭必能伸能縮。已死者必然不動。即以手推之。亦必不動如故。若係未死。用手少拔其兒之髮。兒必退入。故曰易辨。若兒死在腹中。何從而知之。然實有可辨而知之者。凡子死腹中。而母可救者。產母之面。必無煤黑之氣。是子死而母無死氣也。子死腹中。而母難救。產母之面必有烟燻之氣。是子死而母亦無生機也。以此辨死生。斷斷不爽也。既知兒死腹中。不能用藥以降之。危道也。若用黾道以洩之。亦危道也。蓋生產至六七日。其母之氣必甚困乏。烏能勝黾道之治。如用黾道以強逐其死子。恐死子下而母亦立亡矣。必須仍補其母。使母之氣血旺。而死子自下也。方用療兒散。

人參。一兩。當歸。二兩。酒洗。川牛膝。五錢。鬼臼。三錢。研。乳香。二錢。去油。

水煎。服一劑。死子下。而母生矣。凡兒之降生。必先轉其頭。原因其母氣血之虛。以致兒不能轉頭以向下。世人用催生之藥。以耗兒之氣血。則兒之氣不能通達。反致閉悶而死於腹中。此實庸醫殺之也。所以難產之疾。斷斷不可用催生之藥。只宜補氣補血以壯其母。而全活嬰兒之命。正無窮也。此方救兒死之母。仍大補氣血。所以救其本也。誰知救本即下死胎。不用厚朴。妙。曾有產婦面黑舌青。用補氣養血活血之藥。而子母復得皆全者。亦萬中之一幸也。

方妙。不可加減。

所以催生哉。

正產胞衣不下六十二

產婦有兒已下地。而胞衣留滯於腹中二三日不下。心煩意燥。時欲昏暈。人以為胞衣之蒂未斷也。誰知是血少乾枯。粘連於腹中乎。世人見胞衣不下。未免心懷疑懼。恐其冲之於心。而有死亡之兆。然而胞衣究何能上冲於心也。但胞衣不下。瘀血未免難行。恐有血並之虞耳。治法仍宜大補其氣血。使生血以送胞衣。則胎衣自然潤滑。潤滑則易下。生氣以助生血。則血生自然迅速。尤易催墮也。方用送胞湯。

當歸。二兩。酒洗。川芎。五錢。益母草。一兩。乳香。一兩。不去油。沒藥。一兩。不去油。芥穗。三錢。炒黑。麝香。五錢。研另冲。

水煎服立下。此方以芎歸補其氣血。以荊芥引血歸經。用益母乳香等藥。逐瘀而下胞衣。新血既生。則舊血難存。氣旺上升。而瘀濁自降。倘有留滯之苦哉。夫胞衣是包兒之一物。非依於子。即依於母。子生而不隨子俱下。以子之不可依也。故留滯於腹。若有回順其母之心。母胞雖已生子。而其蒂間之氣。原未遽絕。所以留連欲脫而未脫。往往有存腹六七日不下。而竟不腐爛者。正以其尚有生氣也。可見胞衣留腹不能殺人。補之而自降耳。或謂胞衣既有生氣。補氣補血。則胞衣亦宜堅牢。何以補之而反降也。不知子未下。補則益於子。子已下。補則益於母。益子而胞衣之氣連。益母而胞衣之氣脫。此胞胎之氣關通則兩合。閉則兩開矣。故大補氣血。而胞衣反降也。

有婦人子下地五六日。而胞衣留於腹中。百計治之。竟不能下。而又絕無昏暈煩燥之狀。人以為瘀血之粘連也。雖知是氣虛不能推送乎。夫瘀血在腹。斷無不作祟之理。有則必然發暈。今安然無恙。是血已淨矣。血淨宜清氣升。而濁氣降。今胞衣不下。是清氣下降而難升。遂至濁氣上浮而難降。然濁氣上升。又必有煩燥之病。今亦安然者。是清濁之氣兩不能升也。然則補其氣不無濁氣之上升乎。不知清升而濁降者。一定之理。未有清升而濁亦升者也。苟能於補氣之中。仍分其清濁之氣。則升清正所以降濁也。方用補中益氣湯。

人參。三錢。生黃芪。一兩。柴胡。三分。炙甘草。一錢。當歸。五錢。白朮。五分。七炒。升麻。三分。陳皮。二分。棗瓶子。五分。炒研。

水煎。服一劑而胞衣自下矣。夫補中益氣湯。乃提氣之藥也。並非推送之劑。何以能降胞衣如此之速也。然而濁氣之不降者。由於清氣之不升也。提其氣則清升而濁降。濁氣降則腹中所存之物。即無不隨濁氣而並降。正不必再用推送之法也。況又加棗瓶子數分。能理濁氣。不至兩相扞格。所以奏功之奇也。

正產氣虛血暈六十三

婦人甫產兒後。忽然眼目昏花。嘔惡欲吐。中心無主。或神魂外越。恍若天上行雲。人以爲惡血沖心之患也。誰知是氣虛欲脫而然乎。蓋新產之婦。血必盡傾。血室空虛。止存幾微之氣。倘其人陽氣素虛。不能生血。心中之血。前已隨胎。胎墮而心中之血亦隨胎而俱墮。心無血養。所賴者。幾微之氣以固之耳。今氣又虛而欲脫。而君心無護。所剩殘血。欲奔回救主。而血非正血。不能歸經。內庭變亂。而成血暈之症矣。治法必須大補氣血。斷不可單治血暈也。或疑血暈是熱血上沖。而更補其血。不愈助其上沖之勢乎。不知新血不生。舊血不散。補血以生新血。正活血以逐舊血也。然血有形之物。難以速生。氣乃無形之物。易於迅發。補氣以生血。尤易於補血。以生血耳。方用補氣解暈湯。

人參。一兩。生黃芪。一兩。當歸。酒洗。一兩。不黑茶穗。三錢。薑炭。一錢。

水煎。服一劑而暈止。二劑而心定。三劑而血生。四劑而血旺。再不暈矣。此乃解暈之聖藥。用參芪以補氣。使氣壯而生血也。用當歸以補血。使血旺而發氣也。氣血兩旺。而心自定矣。用荊芥炭引血歸經。用薑炭以行瘀引陽。瘀血去而正血歸。不必解暈。而暈自解矣。一方之中。藥止五味。而其奏功之奇而大如此。其神矣乎。

原方極效。不可加減。

正產血暈不語六十四

產婦有子方下地。即昏暈不語。此氣血兩脫也。本在不救。然救之得法。亦有能生者。山得岐天師秘訣。何敢隱而不宣乎。當斯之時。急用銀針刺其眉心。得血出則語矣。然後以人參一兩。煎湯灌之。無不生者。即用黃芪二兩。當歸一兩。名當歸補血湯。煎湯一碗灌之。亦得生。萬不可於二方之中。輕加附子。蓋附子無經不達。反引氣血之藥。走而不守。不能專注於胞胎。不若人參歸芪。直救其氣血之絕。聚而不散也。蓋產婦昏暈。全是血室空虛。無以養心。以致昏暈。否爲心之苗。心既無主。而舌又安能出聲耶。夫眉心之穴。上通於腦。下通於舌。而其系則連於心。刺其眉心。則腦與舌俱通。而心之清氣上升。則瘀血自然下降矣。然後以參芪當歸之能補氣生血者。煎湯灌之。則氣與血接續。又何至於死亡乎。雖單用參芪當歸。亦有能生者。然終不若先刺眉心之爲更妙。世人但知灸眉心之法。不知刺更勝於灸。蓋灸法緩而刺法急。緩則難於救絕。急則易於回生。所謂急則治其標。緩則治其本者此也。

正產敗血攻心暈狂六十五

婦人有產後二三日。發熱惡露不行。敗血攻心。狂言呼叫。甚欲奔走。舉捉不定。人以爲邪熱在胃之過。誰知是血虛。心不得養而然乎。夫產後之血。盡隨胞胎而外越。則血室空虛。臟腑皆無血養。只有心中之血。尚存幾微。以護心君。而臟腑失其所養。皆欲取給於心。心包爲心

君之宰相。攔絕各臟腑之氣。不許入心。始得心神安靜。是護心者。全藉心包之力也。使心包亦虛。不能蔽心。而各臟腑之氣。遂直入於心。以分取乎心血。心包情急。既不能內顧其君。又不能外禦乎衆。於是大聲疾呼。號鳴勤王。而其迹象反近於狂悖。有無可如何之勢。故病狀似熱而實非熱也。治法須大補心中之血。使各臟腑分取以自養。不得再擾乎心君。則心君泰然。而心包亦安矣。方用安心湯。

當歸。二兩。川芎。一兩。生地。五錢。炒。丹皮。五錢。生蒲黃。二錢。乾荷葉一片。引水煎。服一劑而狂定。惡露亦下矣。此方用芎歸以養血。何以又用生地丹皮之涼血。似非產後所宜。不知惡露所以奔心。原因虛熱相犯。於補中涼之。而涼不爲害。況益之以荷葉。七竅相通。引邪外出。不惟內不害心。且佐蒲黃以分解乎惡露也。但只可暫用以定狂。不可多用以取咎也。謹之慎之。

正產腸下六十六

產婦腸下。亦危症也。人以爲兒門不關之故。誰知是氣虛下陷。而不能收乎。夫氣虛下陷。自宜用升提之藥。以提其氣。然新產之婦。恐有瘀血在腹。一旦提氣。並瘀血升騰於上。則沖心之患。又恐變出非常。是氣又不可竟提也。氣既不可竟提。而氣又下陷。將用何法以治之哉。蓋氣之下陷者。因氣之虛也。但補其氣。則氣旺而腸自升舉矣。惟是補氣之藥少。則氣力薄。而難以上升。必須以多爲貴。則陽旺力強。斷不能降而不升矣。方用補氣升腸飲。

人參。一兩。去蘆。生黃芪。一兩。當歸。一兩。酒洗。白朮。五錢。土炒。川芎。三錢。酒洗。升麻。一分。

水煎。服一劑而腸升矣。此方純於補氣。全不去升腸。即如用升麻一分。亦不過引氣而升耳。蓋升麻之爲用。少則氣升。多則血升也。不可不知。又方用草麻仁四十九粒。搗塗頂心。以提之。腸升即刻洗去。時久則恐吐血。此亦升腸之一法也。

產後少腹疼六十六

婦人產後。少腹疼痛。甚則結成一塊。按之愈疼。人以爲兒枕之疼也。誰知是瘀血作祟乎。夫兒枕者。前人謂兒頭枕之物也。兒枕之不疼。豈兒生不枕而反疼。是非兒枕可知矣。既非兒枕。何故作疼。乃是瘀血未散。結作成塊而作疼耳。凡此等症。多是壯健之婦。血有餘而非血不足也。似乎可用破血之藥。然血活則瘀自除。血結則瘀作祟。若不補血。而反敗血。雖瘀血可消。暴亡耗損難免。不若於補血之中。以行逐瘀之法。則氣血不耗。而瘀亦盡消矣。方用散結疼湯。

當歸。一兩。酒洗。川芎。五錢。丹皮。二錢。益母草。三錢。黑芥穗。二錢。乳香。去油。一錢。山查。十粒。炒黑。桃仁。七粒。泡去皮尖。炒研。

服藥後狂定。宜服加味生化湯。當歸。酒洗。一兩。一錢。川芎。二錢。桃仁。錢半。研。荊芥穗。炒炭。一錢。丹皮。錢半。服四劑愈。

生產有子未下。腦先下者。名盤腸生。勿遽服此方。急取一浮盆。用開水洗熱。將腸置於盆內。靜待勿慌。子下後。腸即徐徐收回。若時久。盆與腸俱冷。不能速收。盆用開水一盆。待溫。以入得手爲度。將溫水傾於置腸盆內。腸熱氣充。即可收起矣。若子先下。急服此方。少遲。恐氣脫不救。

前後二方極效。不必加減。

水煎服一劑而疼止而愈。不必再劑也。此方逐瘀於補血之中。消塊於生血之內。妙在不專攻瘀病。而瘀病止。彼世人一見兒枕之疼動。用元胡蘇木蒲黃靈脂之類以化塊。又何足論哉。

婦人產後。少腹疼痛。按之即止。人亦以爲兒枕之疼也。誰知是血虛而然乎。夫產後亡血過多。血室空虛。原能腹疼。十婦九然。但疼有虛實之分。不可不辨。如燥糖觸體光景。是虛疼而非實疼也。大凡虛疼宜補。而產後之虛疼。尤宜補焉。惟是血虛之疼。必須用補血之藥。而補血之味。多是潤滑之品。恐與大腸不無相礙。然產後血虛。腸多乾燥。潤滑正相宜也。何礙之有。方用腸寧湯。

當歸一兩酒洗　熟地一兩　人參三錢　麥冬三錢去心　阿膠三錢炒珠　山藥三錢炒　續斷二錢　甘草一錢　肉桂二分研

水煎服一劑而疼輕。二劑而疼止。多服更宜。此方補氣補血之藥也。然補氣而無太鬱之憂。補血而無太滯之患。氣血既生。不必止疼而疼自止矣。

產後氣喘六十八

婦人產後氣喘。最是大危之症。苟不急清。立刻死亡。人只知是氣血之虛也。誰知是氣血兩脫乎。夫既氣血兩脫。人將立死。何又能作喘。然此血將脫。而氣猶未脫也。血脫欲留。而氣不能留挽乎血之脫。而氣反上喘。如人與賊鬬。而力不勝賊之強。又不肯自安於不鬬。乃召鄰同志。以求鄰人之助。故呼聲而喘作。其症雖危。而可救處正在能作喘也。蓋肺主氣。喘則肺氣似壓。而不知實肺氣之衰也。當是之時。血將脫而萬難驟生。望肺氣之相救甚急。若赤子之望慈母然。而肺因血失。止存幾微之氣。自顧尚且不暇。又何能提挈乎血。氣不與血俱脫者幾希矣。是救血必須補氣也。方用救脫活母湯。

人參二兩當歸一兩酒洗　熟地一兩　枸杞子一錢　山萸五錢去核　麥冬一兩去心　阿膠二錢炒珠　肉桂一錢去粗研　黑芥穗二錢

水煎服一劑而喘輕。二劑而喘減。三劑而喘定。四劑而全愈矣。此方用人參以接續元陽。然徒補其氣而不補其血。則陽燥而狂。雖回生於一時。亦旋得旋失之道。即補血而不補其肝腎之精。則本原不固。陽氣又安得而續乎。所以又用熟地山萸枸杞之類。以大補其肝腎之精。而後大益其肺氣。則肺氣健旺。升提有力矣。特產新產之後。用補陰之藥。膩滯不行。又加肉桂以補命門之火。使火氣有根。助人參以生氣。且能運化地黃之類。以化精生血。若過於助陽。萬一血隨陽動。竄而上行。亦非保全之策。更加荊芥以引血歸經。則肺

產後。不可加減。

氣安而喘速定。治難其神乎。

產後惡寒身顫六十九

婦人產後。惡寒惡心。身體顫。發熱作渴。人以爲產後傷寒也。誰知是氣血兩虛。正不敵邪而然乎。大凡人之氣不虛。則邪斷難入。產婦失血既多。則氣必大虛。氣虛則皮毛無衛。邪原易入。正不必戶外之風來襲體也。即一舉一動。風即可乘虛而入之。然產後之婦。風易入而亦易出。凡有外邪之感。俱不必祛風。況產婦之惡寒者。寒由內生也。發熱者。熱由內弱也。身顫者。顫由氣虛也。治其內寒。而外寒自散。治其內弱。而外熱自解。壯其元陽。而身顫自除。方用十全大補湯。

人參三錢　白朮三錢土炒　茯苓三錢去皮　甘草一錢炙　川芎一錢酒洗　當歸三錢酒洗　熟地五錢　白芍二錢酒炒　黃芪一兩蜜炙　肉桂一錢去粗研

宜連服數劑。不可只服一劑。

水煎服一劑而諸病悉愈。此方但補氣與血之虛。而不去散風與邪之實。正以正足而邪自除也。況原無邪氣乎。所以奏功之捷也。

產後惡心嘔吐七十

婦人產後。惡心欲嘔。時而作吐。人皆曰胃氣之寒也。誰知是腎氣之寒乎。夫胃爲腎之關。胃之氣寒。則胃氣不能行於腎之中。腎之氣寒。則腎氣亦不能行於胃之內。是腎與胃不可分而兩之也。惟是產後失血過多。必致腎水乾涸。腎水涸。應腎火上炎。當不至胃有寒冷之虞。何故腎寒而胃亦寒乎。蓋新產之餘。水乃遽然涸去。虛火尚不能生。火既不生。而寒之象自現。治法宜補其腎中之火。然火無水濟。則火在水上。未必不成火動陰虛之症。必須於水中補火。腎中溫。胃而後腎無太熱之患。胃有既濟之歡也。方用溫腎止嘔湯。

熟地五錢蒸　巴戟一兩鹽水浸　人參三錢　白朮一兩土炒　山萸五錢蒸去核　炮薑一錢　茯苓二錢去皮　白蔻一錢研　橘紅五分蜜汁洗

服此方。必待過當產後。蓋初產而兩之也。惟是產後失血過多。必致腎水乾涸。腎水涸。應腎火上炎。當不至胃有寒冷之虞。何故腎寒而胃亦寒乎。蓋新產之餘。水乃遽然涸去。虛火尚不能生。火既不生。而寒之象自現。治法宜補其腎中之火。然火無水濟。則火在水上。未必不成火動陰虛之症。必須於水中補火。腎中溫。胃而後腎無太熱之患。胃有既濟之歡也。方用溫腎止嘔湯。

熟地五錢蒸　巴戟一兩鹽水浸　人參三錢　白朮一兩土炒　山萸五錢蒸去核　炮薑一錢　茯苓二錢去皮　白蔻一錢研　橘紅五分蜜汁洗

水煎服一劑而嘔吐止。二劑而不再發。四劑而全愈矣。此方補腎之藥。多於治胃之品。然而治腎仍是治胃也。所以腎氣升騰。而胃寒自解。不必用大熱之劑溫胃而祛寒也。

產後血崩七十一

少婦產後半月。血崩昏暈。目見鬼神。人皆曰惡血沖心也。誰知是不慎房幃之過乎。夫產後業經半月。氣血雖不比其初產之二三日。而新氣血初生。尚未全復。即血路已淨。而胞胎之損傷未痊。斷不可輕於一試。以重傷其門戶。無奈少婦之婦。氣血初復。不知慎發。慾心大動。貪合歡歡。以致血崩昏暈。目見鬼神。是心腎兩傷。不特胞胎門戶已也。明明是既犯色戒。又

亦有中氣素虛。產後頃刻血崩不止。氣亦隨之而脫。此至危之證。十常不救者。

丸。惟用高麗人參。渦角可救活一二。逢人參。去蘆。五錢。打碎煎服。遇則氣脫不及待矣。脫成後後徐灌之。待氣回再煎一服灌之。其餘治法。參看血崩門。但產後不可用枳芍炭。以及諸涼藥。然血證皆係臨產一二日前。入房久戰所致。或之胞破。諸書單方多。然不如此之妙。

加酒戰。以致大洩其精。精洩而神亦隨之而欲脫。此等之症。乃自作之孽。多不可活。然於不可活之中。而思一急救活之法。舍大補其氣與血。別無良法也。方用救敗求生湯。

人參。二兩。當歸。二兩。酒洗。白朮。二兩。土炒。九蒸熟地。一兩。山萸肉。五錢。山藥。五錢。炒。遠仁。五錢。生用。附子。一分。或一錢。白水煎。服一劑而神定。二劑而血止。三劑而血亦止矣。倘一服見效。連服三四劑。減去一半。再服十劑。可壽更生。此方補氣以回元陽於無何有之鄉。陽回而氣回。自可攝血以歸神。生精而續命矣。

產後手傷胞胎淋漓不止七十二

婦人有生產之時。被穩婆手入產門。損傷胞胎。因而淋漓不止。欲少忍須臾而不能。人謂胞破不能再補也。孰知不然。夫破傷皮膚。尚可完補。豈破在腹內者。獨不可治療。或謂破在外。可用藥外治。以生皮膚。破在內。雖有靈膏。無可救補耳。然破之在內者。外治雖無可施力。安必內治不可奏功乎。試思猶傷之毒。大有缺陷。尚可服藥以生肌肉。此不過收生不謹。小有所損。並無惡毒。何難補其缺陷也。方用完胞飲。

人參。一兩。白朮。十兩。土炒。茯苓。三錢。去皮。生黃芪。五錢。當歸。一兩。酒炒。川芎。五錢。桃仁。十粒。泡。紅花。一錢。益母草。三錢。白芨末。一錢。

用豬羊胞一個。先煎湯。後煎藥。飢服。十劑全愈。夫胞損宜用補胞之藥。何以反用補氣血之藥也。蓋生產本不可手探試。而穩婆竟以手探胞胎。以致傷損。則糜產必矣。難產者。因氣血之虛也。產後大傷氣血。是虛而又虛矣。因虛而損。復因損而更虛。若不補其氣與血。而胞胎之破。何以奏功乎。今之大補其氣血者。不啻飢而與之食。渴而與之飲也。則精神大長。氣血再造。而胞胎何難補完乎。所以旬日之內便成功也。

產後四肢浮腫七十三

產後四肢浮腫。寒熱往來。氣喘咳嗽。胸膈不利。口吐酸水。兩脅疼痛。人皆曰敗血流於經絡。滲於四肢。以致氣逆也。誰知是肝腎兩虛。陰不得出之陽乎。夫產後之婦。氣血大虧。自然腎水不足。腎火沸騰。然水不足。則不能發肝。而肝木大燥。木中乏津。木燥火發。腎火有焰。子母兩焚。火焰直冲而上。刑肺金。金受火刑。力難制肝。而咳嗽喘滿之病生焉。肝火既旺。而下刑脾土。土受木刑。力難制水。而四肢浮腫之病出焉。然而肝木之火旺。乃假象而非眞旺也。假旺之氣。若盛而實不足。故時而熱。時而寒。往來無定。乃隨氣之盛衰以爲寒熱。而寒非眞寒。熱亦非眞熱。是以氣逆於胸膈之間而不舒耳。兩脅者。肝之部位也。酸者。肝之氣味也。吐酸脅疼痛。皆肝虛而腎不能榮之象也。治法宜補血以養肝。補精以生血。精血足而氣自順。而

寒熱咳嗽浮腫之病悉退矣。方用轉氣湯。

人參。三錢。茯苓。三錢。去皮。白朮。三錢。土炒。當歸。五錢。酒洗。白芍。五錢。酒炒。熟地。一兩。九蒸。山萸。三錢。山藥。五錢。炒。炙黃。三錢。炒。故紙。一錢。鹽水炒。柴胡。五分。

水煎。服三劑效。十劑痊。此方皆是補血補精之品。何以名爲轉氣耶。不知氣逆由於氣虛。乃是肝腎之氣虛也。補肝腎之精血。卽所以補肝腎之氣也。蓋虛則逆。旺則順。是補卽轉也。氣轉而各症盡愈。陰出之陽。則陰陽無扞格之患矣。

產後肉線出七十四

婦人有產後。水道中出肉線一條。長二三尺。動之則疼痛欲絕。人以爲胞胎之下墜也。誰知是帶脈之虛脫乎。夫帶脈束於任督之間。任脈崩而督脈後。二脈有力。則帶脈堅牢。二脈無力。則帶脈崩墜。產後亡血過多。無血以養任督。而帶脈崩墜。力難升舉。故隨溺而隨下也。帶脈下垂。每每作痛於腰臍之間。況下墜者而出於產門之外。其失於關鍵也更甚。安得不疼痛欲絕乎。方用兩收湯。

此方凡腎虛腰痛諸脈皆可治。善勿輕忽。

人參。一兩。白朮。二兩。土炒。川芎。三錢。酒洗。九蒸熟地。二兩。山藥。一兩。山萸肉。四錢。炙黃。五錢。炒。扁豆。五錢。炒。巴戟。三錢。鹽水浸。杜仲。五錢。炒黑。白果。十枚。搗碎。

水煎。服一劑而收半。二劑而全收矣。此方補任督。而仍補腰臍者。蓋以任督連於腰臍也。補任督而不補腰臍。則任督無助。而帶脈何以升舉。惟兩補之。則任督得腰臍之助。帶脈亦得任督之力而收矣。

產後肝痿七十五

婦人產後陰戶中垂下一物。其形如帕。或有角。或二岐。人以爲產顛也。誰知是肝痿之故乎。夫產後何以成肝痿也。蓋因產前勞役過傷。又觸動怪怒。以致肝不藏血。血亡過多。故肝之脂膜隨血崩墜。其形似子宮。而實非子宮也。若是子宮之下墜。狀如茄子。只到產門。而不能越出於產門之外。惟肝之脂膜。往往出產門外者。至六七寸許。且有粘席乾落一片如手掌大者。如是子宮墜落。人立死矣。又安得而復生乎。治法宜大補其氣與血。而少加升提之品。則肝氣旺而易生。肝血旺而易養。肝得生養之力。而脂膜自收。方用收膜湯。

生黃芪。一兩。人參。五錢。白朮。五錢。土炒。白芍。五錢。酒炒。當歸。三錢。酒洗。升麻。一錢。

水煎。服一劑卽收矣。或疑產後。禁用白芍。恐伐生氣之原。何以頻用之而奏功也。是未讀仲景之書者。嗟乎。白芍之在產後。不可頻用者。恐其收斂乎瘀也。而謂伐生氣之源則誤矣。況病之在肝者。尤不可以不用。且用之於大補氣血之中。在芍藥亦忘其爲酸收矣。又

收肝膜。全賴白芍之功。不可用炭。

何能少有作祟者乎。矧脈虛下陷。正藉酸收之力。助升麻以提升氣血。所以奏功之捷也。

產後氣血兩虛乳汁不下七十六

婦人產後。絕無點滴之乳。人以爲乳管之閉也。誰知是氣與血之兩涸乎。夫乳乃氣血之所化而成也。無血固不能生乳汁。無氣亦不能生乳汁。然二者之中。血之化乳。又不若氣之所化爲尤速。新產之婦。血已大虧。血本自顧不暇。又何能以化乳。乳全賴氣之力。以行血而化之也。今產後數日。而乳不下點滴之汁。其血少氣衰可知。氣旺則乳汁旺。氣衰則乳汁衰。氣涸則乳汁亦涸。必然之勢也。世人不知大補氣血之妙。而一味通乳。豈知無氣則乳無以化。無血則乳無以生。不幾向佩人而乞食。貧人而索金乎。治法宜補氣以生血。而乳汁自下。不必利竅以通乳也。方名通乳丹。

人參。一兩。生黃芪。一兩。當歸。二兩。酒洗。麥冬。五錢。去心。木通。三分。桔梗。三分。七孔豬蹄。二隻。去爪殼。

水煎。服二劑而乳如泉湧矣。此方專補氣血以生乳汁。正以乳生於氣血也。產後氣血涸而無乳。非乳管之閉而無乳者可比。不去通乳。而名通乳丹。亦因服之乳通而名之。今不通乳而乳生。即名生乳丹亦可。

產後鬱結乳汁不通七十七

少壯之婦。於生產之後。或聞丈夫之嫌。或聽姑之詐。遂致兩乳脹滿疼痛。乳汁不通。人以爲陽明之火熱也。誰知是肝氣之鬱結乎。夫陽明屬胃。乃多氣多血之府也。乳汁之化。原屬陽明。然陽明屬土。壯婦產後。勝云亡血。而陽明之氣實未盡衰。必得肝木之氣以相通。始能化成乳汁。未可全責之陽明也。蓋乳汁之化。全在氣而不在血。今產後數日。宜其有乳。而兩乳脹滿作痛。是欲化乳而不可得。非氣鬱而何。明明是鬱憤成鬱。土木相結。又安能化乳而成汁也。治法宜大舒其肝木之氣。而陽明之氣血自通。而乳亦通矣。不必專去通乳也。方名通肝生乳湯。

白芍。五錢。酒炒。當歸。五錢。酒洗。白朮。五錢。土炒。熟地。三分。甘草。三分。麥冬。五錢。去心。通草。一錢。柴胡。一錢。遠志。一錢。

水煎。服一劑即通。不必再服也。

麥冬用小米炒。不惟不寒胃。且得米味。一直引入胃中。而化乳愈速。

產後編

薛立齋著

產後編目錄

上卷

產後總論
產前後方症宜忌
正產　傷產　誤產　催生　凍產　熱產　橫產　倒產　產難　死產　下胞　斷臍　產產治法
產後用藥十誤　產後瘀滯　胎前氣傷羸瘦產後疾臨胎等症
血塊
血暈
厥症
血崩
氣短似喘
妄言妄見
傷食

悲怒
類瘧
類傷寒二陽症
類傷寒三陰症
類中風
類痙
出汗
發汗
口渴兼小便不利
遺尿

下卷

誤破尿胞
患淋
便數
溺
完穀不化
瘛
霍亂
嘔逆不食
咳嗽
水腫
流注
膨脹
怔仲驚悸
骨蒸
心痛
腹痛
小腹痛

虛勞
通身疼痛
腰痛
脊痛
陰痛
惡露
乳癌
風甚
不語
補編
大便不通
鷄爪風
浮腫

產後編上 共四十三症

陽曲傅 山寄主手著

產後總論

凡病起於血氣之衰。脾胃之虛。而產後尤甚。是以丹溪先生論產後必大補氣血爲先。雖有他症。以末治之。斯言蓋治產之大旨。若能調充立方。則治產可無過矣。夫產後發驚勞倦。氣血虛羸。諸症乘虛易入。如有氣毋專耗散。有食毋專消導。熱不可用苦連。寒不可用桂附。寒則血塊停滯。熱則新血崩流。至若中虛外感。見三陽表症之多。似可汗也。在產後而用麻黃。則重竭其陽。見三陰裏症之多。似可下也。在產後而用承氣。則重亡陰血。耳聾膚脹。乃腎虛惡寒之停。休用柴胡。謬語出汗。乃元弱似邪之症。非同胃實。厥由陽氣之衰。無分寒熱。非大補不能回陽而起弱。蓋因陰血之虧。不論剛柔。非滋榮不能舒筋而活絡。乍寒乍熱。發作無期。症似瘧也。若以瘧治。邊延難愈。言論無倫。神不守舍。病似邪也。若以邪治。危亡可待。去血過乞。而大便燥結。肉蓯蓉加於生化。非潤腸承氣之能通。去汗過多。而小便短澀。六君子倍加參芪。必凡津助液之可利。加參生化湯煎服。救產後之危。長生活命丹服用。甦絕穀之人。

痼疾脫肛。多是氣虛下陷。補中益氣之方。口噤拳攣。乃因血燥類風。加參生化之劑。產戶入風而痛甚。服宜羌活養榮湯。玉門傷涼而不閉。洗宜蠟兒黃硫散。怔忡驚悸。生化湯加以定志。似邪恍惚。安神丸助以歸脾。因氣而悶滿虛煩。生化湯加木香爲佐。因食而噯酸惡食。大君子加神麯麥芽爲良。蘇木莪朮。大能破血。青皮枳殼。最消滿脹。一應耗氣破血之劑。汗吐宜下之法。止可施諸壯實。豈宜用於胎產。大抵新產後。先問惡露如何。塊疙未除。不可遽加參朮。腹中痛止。補中益氣無疑。至若亡陽脫汗。氣虛喘促。類服加參生化湯。是從權也。又如亡陰火熱。血崩厥暈。速煎生化原方。是救急也。王太僕云。治下補下。治以急緩。緩則道路遠而力微。急則氣味厚而力重。故治產當遵丹溪而固本。服法宜效太僕以類加。凡付生死之重寄。須着意於極危。欲求俯仰之無虧。用存心於愛物。此雖未盡產症之詳。然所聞一症。皆僅近鄉治驗爲據。亦未必無小補云。

正產

正產者。有腹或痛或止。腰脊酸痛。或勢急而胞未破。名弄胎。服八珍湯。加香附自安。有胞破數日而痛尚緩。亦服上藥俟之。

傷產

傷產者。胎未足月。有所傷動。或腹痛臍痛。或服催生藥太早。或產母努力太過。逼兒錯路。不能正產。故臨月必舉動從容。不可多睡飽食飲酒。但覺腹中動轉。即正身仰臥。待兒轉順。與其臨時費力。不如先時慎重。

調產

調產者。產母臨月擇穩婆。辦器用。備參藥。產時不可多人喧鬧。二人扶身。或憑物站。心炷用滾水調白蜜一匙。獨活湯更妙。或飢服糜粥少許。勿令飢泛。有生息未順者。只說有雙胎或胎衣不下。忽令產母驚恐。

催生

催生者。因坐草太早。困倦難產。用八珍湯。稍佐以香附乳香。以助血氣。胞衣早破。漿血已乾。亦用八珍湯。

凍產

凍產者。天寒血氣凝滯。不能速生。故衣裳宜厚。產室宜煖。背心下體尤要。

熱產

熱產者。暑月宜溫涼得宜。若產室人衆。熱氣蒸逼。致頭痛面赤昏暈等症。宜飲清水少許以

解之。然風雨陰涼，亦當避之。

橫產

橫產者，兒居母腹，頭上足下，產時則頭向下，產母若用力逼之，胎轉至半而橫，當令產母安然仰臥，令其自順，稍緩以中指挾其眉，勿使臍帶纏絆，用催生藥，努力即生。

當歸、紫蘇各三錢、長流水煎服，即下。

一方，用好京墨磨服之，即下。

一方，用敗筆頭一個，火鍛，以藕節自然汁調服之，即下。

一方，用益母草六兩，濃煎，加童便一大杯，調服即下。

盤腸產

盤腸產者，產則子腸先出，然後生子，其腸或未即收，以苴麻子四十九粒，研碎塗頭上，腸收，急急洗去，遲則有害，又方止用四十粒，去皮研爲膏，塗頂中，收即拭之，如腸燥，以磨刀水潤之，再用磁石煎湯服之，須陰陽家用過有驗者。

難產

難產者，交骨不開，不能生產也，服加味芎歸湯，良久即下。

小川芎一兩、當歸一兩、敗龜版酒炙一個、婦人髮灰一錢，須用生過男女者，爲末，水一鍾煎七分服。

死產

死產者，子死腹中也，驗母舌青黑，其胎已死，先用平胃散一服，酒水各一鍾，煎八分，投朴硝煎服，即下，用蚕便亦好，後用補劑調理。

下胞

胞衣不下，用滾酒送下失笑散一劑，或益母丸，或生化湯送鹿角灰一錢，或以產母髮入口作吐，胞衣即出，有氣虛不能送出者，腹必脹痛，單用生化湯。

全當歸一兩、川芎三錢、白朮一錢、香附一錢、加人參三錢，更妙，用水煎服。

一方用苴麻子二兩，雄黃二錢，研膏塗足下，湧泉穴，衣下急速洗去。

平胃散

南蒼朮米泔水浸炒、厚朴薑炒、陳皮、炙草各二錢，

共爲粗末，或水煎，或酒煎，成時加朴硝二錢，再煎一二沸，溫服。

失笑散

五靈脂、蒲黃、俱研爲細末，每服三錢，熱酒下。

斷臍

斷臍，必以綿裹咬斷爲妙，如遇天寒，或因難產，母子勞倦，宜以大麻油紙燃，徐徐燒斷，以助元氣，雖兒已死，令煖氣入臍，多得生，切勿以刀斷之。

滑胎散臨月常服數劑，以便易生。

當歸三五錢、川芎五錢、杜仲二錢、熟地三錢、枳殼七分、山藥二錢、水二鍾，煎八分，食前溫服，如氣體虛弱人，加人參白朮，隨宜服之，如便實多滯者，加牛膝二錢。

治產祕驗良方

治橫生逆產，至數日不下，一服即下，有未足月忽然胎動，一服即安，或臨月先服一服，保護無虞，更能治胎死腹中，及小產傷胎無乳者，一服即如原體。

全當歸、川芎各一錢、川貝母一錢去心、荊芥穗、黃芪各八分、厚朴薑炒、鞭艾、紅花各七分、兔絲子二錢、白芍一錢二分冬月不用、枳殼六分、麩炒、羌活六分、麩炒、甘草五分。

上十三味，只用十二味，不可加減，安胎去紅花，催生去鞭艾，用井水鍾半，薑二片爲引，熱服，渣用水一鍾，煎半鍾，熱服，如不好，再用水一鍾，煎半鍾服之，即效，不用二劑。

催生兔腦丸治橫生逆產神效

臘月兔腦髓一個、母丁香一錢、乳香一錢另研、麝香一分、兔腦爲丸，芡實大，陰乾密封，用時以溫酒送下一丸。

奪命丹

臨產未產時，口反口噤，面黑脣青，口中吐沫，命在須臾，若臉面微紅，子死母活，急用蛇退、蠶故子燒灰存性、髮灰不、乳香五分，共爲細末，酒下。

加味芎歸湯治子宮不收，產門不閉。

人參二錢、黃芪一錢、川芎一錢、當歸二錢、升麻八分、炙草四分、五味子十五粒，再不收，加半夏八分、白芍八分酒炒。

新產治法

生化湯先連進二服，若胎前素弱，婦人見危症熱症墮胎，不可拘帖數，服至病退乃止，若產時勞甚，血崩形脫，即加人參三四錢在內，頻服無虞，若氣促亦加人參，加參於生化湯者，血塊無滯，不可以參爲補而弗用也，有治產不用當歸者，見偏之甚，此方處治萬全，必無一失，世以四物湯治產，地黃性寒滯血，芍藥微酸無補，伐傷生氣，誤甚。

產後用藥十誤

一因氣不舒，而誤用耗氣順氣等藥，反增他悶，陳皮用至五分，禁枳實厚朴。

二因傷氣。而誤用消導。反損胃氣至絕證。禁枳殼、大黃、蓬、莪、朴。

三因身熱。而誤用寒涼。必致損胃增熱。禁芩、連、梔、柏、升、棊。

四因日內未曾服生化湯。勿用參、芪、朮。以致塊痛不消。

五毋用地黃。以滯膩膠。

六毋猶用枳殼、牛膝、枳實以消塊。

七便秘。毋用大黃、芒硝。

八毋用蘇木、莪、蓬以行塊。芍藥能伐氣。不可用。

九毋猶用山查湯。以攻塊定痛。而反損新血。

十毋輕服濟坤丹。以下胎下胞。

產後危疾諸症。當頻服生化湯。隨症加減。照後方論。

產後寒熱。

凡新產後。榮衛俱虛。易發寒熱。身痛腹痛。決不可妄投發散之劑。當用生化湯爲主。稍佐發散之藥。產後脾虛。易於停食。以致身熱。世人見有身熱。便以爲外感。遽然發汗。速亡甚矣。當於生化湯中。加扶脾消食之藥。大抵產後。先宜補血。次補氣。若偏補氣。而專用參、芪、犀、蓽也。產後補虛。用參、芪、芎、歸、白朮、陳皮、炙草。熱輕則用茯苓、淡滲之藥。其熱自除。重則加乾薑。或云大熱而用薑何也。曰此熱非有餘之熱。乃陰虛內生熱耳。蓋乾薑能入肺分。利肺氣。又能入肝分。引歸藥生血。然必與陰血藥同用之。產後惡寒發熱。腹痛者。當主補血。若腹不痛。非惡血也。

產後寒熱。口眼歪邪。此乃氣血虛甚。以大補爲主。左手脈不足。補血藥多於補氣藥。右手脈不足。補氣藥多於補血藥。切不可用小續命等發散之藥。

胎前患傷寒瘧症。產疾。墮胎等症。

胎前或患傷寒瘧症。產疾。熱久必致墮胎。隨後急增熱。因熱消陰血。而又繼產失血故也。治者宜勿妄論傷寒瘧瘧未除。誤投梔子豉湯、紫苓、連、柏等藥。雖或往來潮熱。大小便秘。五苓承氣等藥。斷不可用。只重產輕邪。大補氣血。頻服生化湯。如形脫氣脫。加生脈散。以防血暈。薑、川芎、味辛能散。乾薑能除虛火熱。雖有便秘煩渴等症。只多服生化湯。自津液生而二便通矣。若熱用寒劑。愈虛中氣。誤甚。

產後諸症治法

血塊第一

此症勿拘古方。妄用蘇木、莪、蓬。以輕人命。其一應散血方破血藥俱禁用。雖山查性緩。亦能害命。不可擅用。惟生化湯係血塊聖藥也。

生化湯原方

當歸八錢。川芎三錢。桃仁十四粒。去皮尖研。黑薑五分。炙草五分。用黃酒盞便各半。煎服。

又益母丸。鹿角灰。就用生化湯送下一錢。外用烘熱衣服煖和。塊痛處雖大暑亦要和煖。塊痛處有氣不運。而暈迷厥。切不可妄說惡血攻心。只服生化湯爲妙。俗有生地牛膝行血。山稜莪朮敗血。山查沙糖消塊。薑艾椒酒定痛。反致昏暈等症。切不可妄用。二三四日內覺痛減可緩。乃虛痛也。宜加參生化湯。

如七日內。或因寒涼食物。結塊痛甚者。加入肉桂八分於生化湯內。如血塊未消。不可加參、芪。用之則痛不止。總之慎勿用峻利藥。勿多飲薑椒艾酒。頻服生化湯行氣助血。外用熱衣以緩腹。如用紅花以行之。蘇木牛膝以攻之則誤。其胎氣脹用烏藥香附以順之。枳殼厚朴以舒之。甚有青皮枳實蘇子以下氣定喘。芩、連、梔子青柏以退熱除煩。至於血結更甚。反用承氣湯下之。面赤結。汗多小便短澀。反用五苓散通之而愈祕。非徒無益。而又害之也。

凡兒生下。或停血不下。半月外尚痛。或外加腫毒高寸許。或身熱。減飲食。倦甚。必用生化湯加三稜、莪朮、肉桂等。攻補兼治。其塊自消。如虛甚食少泄瀉。只服此帖定痛。且健脾胃。進食止瀉。然後服消塊湯。

加味生化湯治血塊日久不消。半月後方可用之。

川芎一錢。當歸三錢。肉蓯蓉四分。桃仁十五粒。三稜。醋炒。六分。元胡六分。肉桂六分。炙草四分。

血暈第二

分娩之後。眼見黑花。頭眩昏暈。不省人事者。一因勞倦甚而氣竭神昏。二因大脫血而氣欲絕。三因痰火乘虛泛上而神不守。當急服生化湯二三帖。外用韭菜細切納有嘴瓶中。用淡酒二鍾。沖入瓶內。急沖產母鼻中即醒。若偏信古方。認爲惡血攻心。而輕用散血之劑。認爲痰火。而用無補消降之方。誤甚矣。

如暈厥牙關緊閉。速煎生化湯。挖開口。將鵝毛探喉。酒盞盛而灌之。如灌下腹中漸溫煖。不可拘帖數。外用熱手在單衣上。從心揉按至腹。常熱火煖之。一兩時服生化湯四帖完。即神清。始少緩藥。方進粥。服至十服而安。故犯此者。連灌藥火煖。不可棄而不救。若在冬月。婦人身欠煖。亦有大害。臨產時。必預煎生化湯。預燒稱錘硬石子。候兒下地。連服二三帖。又產婦枕邊行醋韭投醋瓶之法。決無暈症。又兒生時。合家不可喜子而慢母。產母不可顧子忘倦。

又不可產訖即臥。或忿怒逆氣。皆致血暈。慎之慎之。

加味生化湯 治產後三等血暈症

川芎三錢。當歸六錢。黑豆四分。桃仁十粒。炙草五分。荊芥四分。炒黑。大棗水煎服。

勞倦甚而暈。及血崩氣脫而暈。並宜速灌兩服。如形色脫。或汗出而脫。皆急服一帖。即加人參三四錢。一加肉桂四分。決不可疑參爲補而緩服。爽火乘虛泛上而暈。方內加橘紅四分。虛甚加人參二錢。肥人多痰。再加竹瀝七分。薑汁少許。總不可用棱朮破血等方。其血塊痛甚。兼送益母丸。或鹿角灰。或元胡散。或獨勝散。上消血塊方。服一服即效。不必易方從權救急。

加參生化湯 治產後形色脫暈。或汗多脫暈。

人參三錢。有倍加者。川芎二錢。當歸五錢。炙草四分。桃仁十粒。炮薑四分。大棗水煎服。

脈脫形脫將絕之症。必服此方。加參四五錢。頻頻灌之。產後血崩血暈。兼汗多。宜服此方。無汗不脫。只服本方。不必加參。左尺脈脫亦加參。此方治產後危急諸症可通用。一晝一夜。必須服三四劑。若照常症服。豈能接將絕之氣血。扶危急之殘症耶。產後一二日血塊痛。雖未止。產婦氣血虛脫。或暈或厥。或汗多或形脫。口氣漸涼。煩渴不止。或氣喘急。無論塊痛。從權用加參生化湯。病勢稍退。又當減參。且服生化湯。

加減法。血塊痛甚。加肉桂七分。渴加麥多一錢。五味十粒。汗多加麻黃根一錢。如血塊不痛。加炙黃芪一錢以止汗。傷飯食麵食。加炒神麯一錢。麥芽五分炒。傷肉食。加山查五個。砂仁四錢炒。

厥症第三

婦人產後用力過多。勞倦傷脾。故逆冷而厥。氣上胸滿。脈去形脫。非大補不可。豈錢數川芎當歸能回陽復神乎。必用加參生化湯。倍參進二劑。則氣血旺。而神自生矣。厥自止矣。若服藥而反渴。另有生脈散。獨參代茶飲。救臟之燥。如四肢逆冷又泄瀉。類傷寒陰症。又難用四逆湯。必用倍參生化湯。加附子一片。可以回陽止逆。又可以行參歸之力。立二方於左。分先後。

加參生化湯 治產後發厥。塊痛未止。不可加炙甘草。

川芎二錢。當歸四錢。炙草五分。炮薑四分。桃仁十粒。去皮尖。研。人參二錢。凝水煎進二服。

滋榮益氣復神湯 治產後發厥。間塊痛已除。可服此方。

人參三錢。黃芪一錢。炙。白朮一錢。土炒。當歸三錢。炙草四分。陳皮四分。五味十粒。川芎一錢。熟地一錢。麥芽一錢。凝

一枚。水煎服。

手足冷加附子五分。汗多加麻黃根一錢。熟棗仁一錢。妄言妄見。加益智柏子仁龍眼肉。大便實。加肉蓯蓉二錢。大抵產後兼厥二症相類。但暈在臨盆。症急甚於厥。宜頻服生化湯幾帖。塊化血旺。神清暈止。若多氣促形脫等症。必加參芪。厥在分娩之後。宜倍參生化湯。止厥以復神。並補氣血也。非如上偏補氣血而可愈也。要知暈有塊痛。芪朮不可加。厥症若無塊痛。芪朮地黃並用無疑也。

血崩第四

產後血大來。審血色之紅紫。視形色之虛實。如血紫有塊。乃當去其敗血也。止留作痛。不可論崩。如鮮紅之血。乃是驚傷心。不能生血。怒傷肝。不能藏血。勞傷脾。不能統血。俱不能歸經耳。當以崩治。先服生化湯幾帖。則行中自有補。血凝氣生。若形脫汗多氣促。宜服倍參生化湯幾帖以益氣。非棕灰之可止者。如產後半月外崩。又宜升舉大補湯治之。此症虛極。服藥平穩。未見速效。須二十帖後。諸症頓除。

生血止崩湯 治產後血崩

川芎一錢。當歸四錢。黑豆四分。炙草五分。桃仁十粒。荊芥五分。炒黑。烏梅五分。服灰。蒲黃五分。炒。凝水煎。忌鹽椒熱物生冷。

鮮紅血大來。荊芥穗炒黑。白芷各五分。血竭形敗。加參三四錢。汗多氣促。亦加參三四錢。無汗。形不脫。氣促。只服生化湯。多服則血自平。有言歸芎但能活血。甚誤。

升舉大補湯 治產後氣虛。如有塊動。只服此方。芪朮勿用。

黃芪。白朮。陳皮。各四分。人參二錢。炙草。升麻。各四分。當歸。芷四分。黃連三分。荊芥穗四分。炒黑。

汗多。加麻黃根一錢。浮麥炒一小撮。大便不通。加肉蓯蓉一錢。禁用大黃。有氣。磨木香三分。痰。加貝母六分。竹瀝薑汁少許。寒嗽。加杏仁十粒。桔梗五分。知母一錢。驚。加棗仁柏子仁各一錢。傷飯。加神麯麥芽各一錢。傷肉食。加山查砂仁各八分。俱加棗水煎。身熱不可加連柏。傷食怒氣。均不可專用耗散無補藥。凡年老虛人患崩。宜升舉大補湯。

氣短似喘第五

因血脫勞甚。氣無所恃。呼吸止息。逆其常度。有認爲痰火。反用散氣化痰之方。誤人性命。當以大補血爲主。如有塊。不可用參芪朮。無塊。方可用本方。去桃仁加熟地。並附子一片。足冷。加熟附子一錢。及參朮陳皮。接續補氣養榮湯。

加參生化湯治分娩下部血氣痛者有塊不可加炭耎

川芎二錢當歸四錢炙草五分桃仁十粒去皮尖研人參二錢引加棗一枚連進二三帖後再用後方。

補氣養榮湯治產後氣短倦血塊不痛宜服此方

黃芪一錢白朮一錢當歸四錢人參三錢陳皮四分炙草四分熟地二錢川芎二錢黑豆四分如手足冷加熟附子一錢汗多加麻黃根一錢浮麥一小撮渴加麥冬一錢五味子十粒大便不通加肉蓯蓉一錢麻仁一撮傷麵飯加炒神麯一錢炒麥芽一錢傷肉食加山查砂仁各五分。

按麥芽有回乳之害用者慎之。

黃芪白朮一作各二錢凡止汗用浮麥宜炒

妄言妄見第六

由氣血虛神魂無依也治當論塊痛有無緩急若塊痛未除先服生化湯二三帖痛止繼服加參生化湯或補中益氣湯加安神定志丸湯丸調服之若產日久形氣俱不足即當大補氣血安神定志服至藥力充足其病自愈勿謂邪祟若噴以法水驚之每至不救屢治此症服藥至十數帖方效病虛似邪欲除其邪先補其虛先調其氣次論諸病此右人治產後虛症及年老虛喘弱人妄言所當用心也。

安神生化湯治產後塊痛未止妄言妄見症宜可用此方

川芎一錢柏子仁一錢人參二錢當歸二三錢伏神二錢桃仁十二粒黑豆四分炙草四分益智八分陳皮三分薑水煎。

滋榮益氣復神湯塊痛已止妄言妄見服此方即愈

黃芪白朮麥冬川芎柏子仁茯神益智各一錢人參熟地各二錢陳皮三分炙草四分棗仁十粒元肉八個棗水煎服。

產後血崩血脫氣喘氣脫神脫妄言雖有血氣陰陽之分其精散神去一也比產後少殺亦危症也若非厚藥頻服失之者多矣誤論氣實痰火者非也新產有血塊痛並用加參生化湯行中有補斯免滯血血症之失也其塊痛止宜用升舉大補湯少佐黃連鹽火以治血脫安血歸經也宜用倍參補中益氣湯少佐附子助參以治氣脫攝氣歸源也宜用滋榮益氣復神湯少佐痰劑以清心火安君主之官也。

傷食第七

新產後禁膏粱遠厚味如飲食不節必傷脾胃治當扶元溫補氣血健脾胃審傷何物加以消導諸藥生化湯加神麯麥芽以消麵食加山查砂仁以消肉食如寒冷之物加吳萸肉桂

如產母虛甚加人參白朮又有塊然後消補並治無有不安者屢見治者不重產後之弱惟知速消傷物反損眞氣益增滿悶可不慎歟。

加味生化湯治血塊未消服此以消食

川芎二錢當歸五錢黑豆四分炙草五分桃仁十粒

問傷何物加法如前煎服。

健脾消食生化湯治血塊已除服此消食

川芎一錢人參當歸各二錢白朮一錢半炙草五分

審傷何物加法如前。

如停寒物日久脾胃虛弱恐藥不能運用可用揉按炒神麯熨之更妙凡傷食誤用消導藥及絕粥幾日者宜服此方。

長生活命丹

人參三錢水一鍾半煎半鍾先用參湯一盞以米飯鍋焦研粉三匙漸漸加參湯鍋焦粉引開胃口煎參湯用新罐或銅杓恐聞藥氣要嗅也如服寒藥傷者加益三大片煎湯入參名活命草鍋焦名活命丹此方曾活數十人。

忿怒第八

產後怒氣逆胸膈不利血塊又痛宜用生化湯去桃仁服時磨木香二分在內則塊化怒散不相悖也若輕產重氣偏用木香烏藥枳殼砂仁之類則元氣反損益增滿悶又加怒後即食胃弱停悶當審何物治法如前慎勿用木香檳榔丸流氣引子之方使虛弱愈甚也。

木香生化湯治產後血塊已除因受氣者

川芎二錢當歸六分陳皮三分黑豆四分服時磨木香二分在內此方減桃仁用木香陳皮前有減乾薑者詳之。

健脾化食散氣湯治受氣傷食無塊痛者

白朮二錢當歸二錢川芎一錢黑豆四分人參二錢陳皮三錢

審傷何物加法如前大抵產後忿怒氣逆及停食二症善治者重產而輕怒氣消食必以補氣血爲先佐以調肝順氣則怒鬱散而元不損佐以健脾消導則停食行而思穀矣若專理氣消食非徒無益而又害之。

類瘧第九

產後寒熱往來每日應期而發其症似瘧而不可作瘧治夫氣血虛而寒熱更作元氣虛而

外邪或傳，或嚴寒或極熱，或晝輕夜重，或日晡寒熱，絕類瘧症，治當滋榮益氣，以退寒熱，有汗急宜止，或加麻黃根之類，只頭有汗而不及於足，乃孤陽絕陰之危症，當加地黃當歸之類，如陽明無惡寒，頭痛無汗，且與生化湯加羌活防風連鬚蔥白數根以散之，其柴胡清肝飲等方，常山草藥等藥，俱不可用。

滋榮發氣扶正湯 治產後寒熱有汗，午後發期發者。

人參、二錢，炙黃芪，白朮，川芎，熟地，麥冬，麻黃根，各一錢，當歸，三錢，陳皮，四分，炙草，五分，薑水煎。

加減發胃湯 治產後寒熱往來，頭痛無汗，類瘧者。

炙草，四分，白茯苓，一錢，半夏，八分，川芎，一錢，陳皮，四分，當歸，二錢，苦朮，一錢，藿香，四分，人參，一錢，

薑引，煎服，有痰加竹瀝薑汁半夏神麯，弱人兼服河車丸，凡久瘧不愈，兼服參朮膏以助藥力。

參朮膏

白朮，一斤，米泔浸一宿，剉焙，人參，一兩，用水六碗，煎二碗，再煎二次，共汁六碗，合在一處，將藥汁又熬成一碗，空心米湯化半酒盞。

類傷寒二陽症第十

產後七日內，發熱頭痛惡寒，毋專論傷寒為太陽症，發熱頭痛骨痛，毋專論傷寒為少陽症，二症皆由氣血兩虛，陰陽不和，而類外感，治者慎勿輕產後熱悶，而用麻黃湯，以治類太陽症，又勿用柴胡湯，以治類少陽症，且產母脫血之後，而重發其汗，虛虛之禍，可勝言哉，昔仲景云，亡血家不可發汗，丹溪云，產後切不可發表，二先生非謂產後其無傷寒之象症也，蓋恐後學業偏門而輕產，執成方而發表耳，誰知產後真感風感寒，生化中芎藭亦能散之乎。

加味生化湯 治產後三日內發熱頭痛症

川芎，防風，各一錢，當歸，三錢，炙草，四分，桃仁，十粒，羌活，四分，

一本無桃仁，有黑豆四分。

查刊本去桃仁，然必須問有塊痛與否，方可議去，服二帖後頭仍痛，身仍熱，加白芷八分，細辛四分，如發熱不退，頭痛如故，加連鬚蔥五個，人參三錢，產後敗血不散，亦能作寒作熱，何以辨之，曰，時有刺痛者，敗血也，但寒熱無他症者，陰陽不和也，刺痛用當歸，乃和血之藥，若乃積血而刺痛者，宜用紅花桃仁歸尾之類。

類傷寒三陰症第十一

潮熱有汗，大便不通，毋專論為陽明症，口燥咽乾而渴，毋專論為少陰症，腹滿，液乾，大便實，毋專論為太陰症，又汗出，譫語，便閉，毋專論為腸胃中燥糞宜下症，敗症多由勞倦傷脾，運化稽遲，氣血枯槁，腸腑燥澀，乃虛症類實，當補之症，治者勿執偏門輕產，而妄為三承氣湯，以治類三陰之症也，間有少壯產後妄下，幸而無妨，虛弱產婦，亦復妄下，多致不救，屢見妄下成膨，誤導反結，又有血少，數日不通，而即下致瀉不止者，危哉，婦人良方云，產後大便祕，若計其日期，飯食數多，即用藥通之，禍在反掌，必待腹滿發脹，欲去不能者，反結在直腸，宜用猪膽汁潤之，若日期雖久，飲食如常，腹中如故，只用補劑而已，若服苦寒疏通，反傷中氣，通而不止，或成瘧滿，誤矣。

養正通幽湯 治產後大便祕結，類傷寒三陰症。

川芎，二錢，當歸，六錢，炙草，五分，桃仁，十五粒，麻仁，二錢，炒，肉蓯蓉，酒洗去甲，一錢，汗多便實，加黃芪，一錢，麻黃根，一錢，人參，二錢，口燥渴，加人參麥冬，各一錢，腹滿溢便實，加麥冬，一錢，枳殼，六分，人參，二錢，蓯蓉，一錢，汗出譫語便實，乃氣血虛竭，精神失守，宜養榮安神，加茯神，遠志，蓯蓉，各一錢，人參，白朮，二者，黃芪，白芷，各一錢，柏子仁，一錢。

以上數等，大便燥結症，非用當歸人參至斤數，難取功效，大抵產後虛中傷寒，口傷食物，外症雖見頭痛發熱，或骨痛腰痛，是外感宜汗，猶當重產，亡血禁汗，惟宜生化湯，最為加減，調理無失，又如大便祕結，猶當重產，亡血禁下，宜養正助血通潤，則穩當矣。

芝麻一升研末，和米二合煮粥食，腸潤即通。

類中風第十二

產後氣血衰虛，百骸少血潤養，忽然口噤牙緊，手足筋脈拘搐等症，類中風癇症，蓋虛火泛上有痰，皆當以末治之，勿執偏門而用治風消痰之方，以重虛產婦也，治法當先服生化湯，以生旺新血，如見危症，三服後即用加參益氣以救血脫也，如有痰火，少佐橘紅炒芩之類，竹瀝薑汁，亦可加之，黃柏黃連，切不可並用，慎之。

滋榮活絡湯 治產後血少口噤項強筋搐類風症。

川芎，牛，一錢，當歸，熟地，人參，各二錢，黃芪，茯神，天麻，各一錢，炙草，陳皮，荊芥穗，防風，羌活，各四分，黃連，八分，薑汁炒，有痰，加竹瀝薑汁半夏，渴，加麥冬葛根，有食，加山查砂仁以消肉食，神麯麥芽以消飯食，大便閉，加肉蓯蓉一錢半，汗多，加麻黃根一錢，驚悸，加琥珀仁一錢。

天麻丸 治產後中風，恍惚語謬，四肢不利。

天麻一錢，防風一錢，川芎七分，羌活七分，人參，遠志，柏子仁，山藥，麥冬各一錢，棗仁一兩，細辛四兩，南星麵八分，石菖蒲一錢，研細末，煉蜜爲丸，辰砂爲衣，清湯下六七十丸。

類癇第十三

產後汗多，即變癇者，項強面身反，氣息如絕，宜速服加減生化湯。

加減生化湯 專治有汗變癇者。

川芎，麻黃根各一錢，當歸四分，桂枝五分，人參一錢，炙草五分，羌活五分，天麻八分，附子一片，羚羊角八分。

如無汗類癇者，中風用川芎三錢，當歸一兩，酒洗，棗仁，防風叫藥分，桂枝，

出汗第十四

凡分娩時，汗出由勞傷脾，驚傷心，恐傷肝也。產婦多兼三者而汗出，不可即用斂汗之劑，神定而汗自止。若血塊作痛，芪朮未可遽加，宜服生化湯二三帖，以消塊痛，隨服加參生化湯，以止虛汗。若分娩後倦甚，濈濈然汗出，形色又脫，乃亡陽脫汗也。汗本亡陽，陽亡則陰隨之，故又當從權，速服加參生化湯，倍參以救危惡，毋拘塊痛。婦人產多汗，當健脾以斂水液之精，益榮衛以嗇血歸源，灌溉四肢，不使妄行，雜症雖有自汗盜汗之分，然當歸六黃湯，不可治產後之盜汗也，並宜服加參生化湯，及加味補中益氣二方。若服參芪，而汗多不止，及頭出汗而不至腰足，必難療矣。如汗出而手拭不及者不治，產後汗出氣喘等症，虛之極也，不受補者不治。

麻黃根湯 治產後虛汗不止

人參二錢，當歸二錢，黃芪一錢半，炙，白朮一錢，炒，桂枝五分，麻黃根一錢，粉草五分，炒，牡蠣研，少許，浮麥一大撮，

虛脫汗多手足冷，加黑豆四分，熟附子一片，渴加麥冬一錢，五味十粒，肥白人產後多汗，加竹瀝一盞，薑汁一小匙，以清痰火，惡風寒，加防風桂枝各五分，血塊不落，加熟地三錢，晚服八味地黃丸。

山茱萸，山藥，丹皮，豐苓各八錢，澤瀉五錢，熟地八錢，五味子五錢，炙黃芪一兩，

煉蜜爲丸，陽加於陰，則汗因而遇風變爲痙癇者，有之尤難治，故汗多宜難避風寒，汗多小便不通，乃亡津液故也，勿用利水藥。

盜汗第十五

產後睡中汗出，醒來即止，猶盜賊人睡，而謂之盜汗，非汗自至之比，雜症論云，自汗陽虛，盜汗陰虛，然當歸六黃湯，又非產後盜汗方也，惟斂氣血而調治之，乃爲得耳。

止汗散 治產後盜汗

人參二錢，當歸二錢，熟地一錢半，麻黃根五分，黃連五分，酒炒，浮小麥一大撮，棗一枚，

又方

牡蠣五分，小麥麩炒黃，研末，

口渴象小便不利第十六

產後煩燥咽乾而渴，象小便不利，由失血汗多所致，治當助脾益肺，升舉氣血，則陽升陰降，水入經而爲血，爲液，溉入胃而氣長脈行，自然津液生而便利矣。若認口渴爲火，而用苦連梔柏以降之，認小便不利爲水潤，而用五苓散以通之，皆失治也，必因其勢損而溫之益之，因其溜潤而潛之行之，則庶幾矣。

生津止渴益水飲

人參，麥冬，當歸，生地各三錢，黃芪一錢，葛根一錢，升麻，炙草各四分，茯苓八分，五味子十粒，

汗多加麻黃根一錢，浮小麥一大撮，大便燥加肉蓯蓉一錢五分，渴甚加生脈散，不可疑而不用。

遺尿第十七

氣血太虛，不能約束，宜八珍湯加升麻柴胡，甚者加熟附子一片。

產後編下

誤破尿胞第十八

產理不順。穩婆不精。誤破尿胞膀胱者。用參芪爲君。歸芎爲臣。桃仁陳皮茯苓爲佐。猪羊胞煎藥。百服乃安。又方云。用生黃絲絹一尺。白牡丹皮根爲末。白茯末各二錢。水二碗。煮絹爛如飴。服之宜靜臥。不可作聲。名補脬飲。神效。

（破。女科下卷另有方。稍尖且效。）

恙淋第十九

由產後虛弱。熱客於脬中。內虛頻數。熱則小便淋澀作痛曰淋。

茅根湯。凡產後冷熱淋。並治之。

石膏一兩。白茅根一兩。盤麥。

燈心水煎。入齒末。空心服。

又方。治產後小便痛淋血。

白茅根。　盤麥。　葵子。　車前子。　通草。（以上俱無分量。）鯉魚齒。一百

按齒末疑均是鯉魚齒。水煎服。亦入齒末。

（一本小註載症由內虛。方用石膏一兩。無此治法。不可拘執。此方以致誤人。一本石膏作一錢。無治石。一作各等分。）

便數第二十

由脬內素有冷氣。因產發動。冷氣入脬故也。用赤石脂二兩爲末。空心服。

又方。治小便數及遺尿。用益智仁二十八枚爲末。米飲送下二錢。

又桑螵蛸散

桑螵蛸。三十個。　人參。　黃芪。　鹿茸。　牡蠣。　赤石脂。各三錢。爲末。空心服二錢。米飲送下。

瀉第二十一

產後泄瀉。非雜症。有食泄、溼泄、水穀注下之論。大率氣虛食積與溼也。氣虛宜補。食積宜消。溼則宜燥。然瘧痢未淨。遽難燥澀。當先服生化湯二三帖。化滯生新。加茯苓以利水道。俟血生然後補氣以消食。燥溼以分利水道。使無滯澀。虛虛之失。若產旬日外。方論雜症。尤當論虛實而治也。如痛下清水。腹鳴。米飲不化者。以寒泄治。如糞水黃赤。肛門作痛。以熱泄治之。有因飲食過多。傷脾成滯。氣臭如敗卵。以食積治之。又有脾氣久虛。少食。食下即鳴急。藍下所食之物。方覺快者。以虛寒泄治之。治法寒則溫之。熱則清之。脾傷食積。分利健脾。兼消補虛。善爲調治。無失也。產後虛瀉。瞑昏人不識。弱甚形脫。危症。必用人參二錢。白朮茯苓各二錢。附子一錢。方能回生。若脈浮弦。按之不鼓。即爲中寒。此蓋陰先亡而陽欲去。速宜大補氣血。加附子黑薑。以回元陽。萬勿忽視。

加減生化湯。治產後塊未消。並瀉症。

川芎。二錢。　茯苓。二錢。　當歸。四錢。　黑薑。五分。　炙草。五分。　桃仁。十粒。　蓮子。八枚。　水煎。溫服。

健脾利水生化湯。治產後塊已除。並瀉症。

川芎。一錢。　茯苓。一錢半。　歸身。二錢。　黑薑。四分。　陳皮。五分。　炙草。五分。　人參。三錢。　肉果。一個。　白朮。一錢。炒。　澤瀉。八分。

寒瀉加乾薑八分。寒痛加砂仁炮薑各八分。熱瀉加炒黃連八分。瀉水腹痛。米飲不化。加砂仁八分。麥芽山查各一錢。瀉有酸嗳臭氣。加神麯砂仁各八分。脾氣久虛。瀉出所食物方快。以虛寒論。瀉水者加蒼朮一錢。以燥溼。脾氣弱。元氣虛。必須大補。佐消食清熱。却寒藥。弱甚形色脫。必須第一方。參、朮、苓、附。必用之藥也。諸瀉俱加升麻。酒炒。蓮子十粒。

完穀不化第二十二

因產後勞倦傷脾。而運轉稽遲也。名飧泄。又飲食太過。脾胃受傷亦然。俗呼水穀痢是也。然產方三日內塊未消化。此脾胃衰弱。參、芪、朮未可遽加。且服生化湯。加益智、香、砂。少溫脾氣。俟塊消後。加參、芪、朮補氣。肉果、木香、砂仁、益智溫胃。升麻、柴胡清胃氣。澤瀉、茯苓、陳皮以利水。爲上策也。

加味生化湯治產後三日內完穀不化塊未消者。

川芎一錢、益智一錢、當歸四錢、黑豆四分、炙草四分、桃仁十粒、茯苓一錢半。

一本當歸作三錢、有穀一枚。

參苓生化湯治產後三日內塊已消穀不化脇痛寒熱痢者。

川芎一錢、當歸二錢、黑豆四分、炙草五分、人參二錢、茯苓一錢、白芍一錢、益智一錢、白朮二錢、肉果一錢。

一本有薏子八枚、去心、澁一枚。

瀉水多、加澤瀉木通各八分、腹痛、加砂仁八分、渴、加麥冬五味子、寒瀉、加黑豆一錢、木香四分、食積、加神麯、麥芽消飯麵、砂仁、山查消肉食、產後瀉痢日久、胃氣虛弱、完穀不化、宜溫助胃氣、六君子湯加木香四分、肉果一個、製。

痢第二十三

產後七日內外、患赤白痢、裏急後重頻併、最爲難治、欲調氣行血、而推蕩痢邪、猶患產後元氣虛弱、欲滋榮益氣而大補虛弱、又助痢之邪、惟生化湯減乾薑、而代以木香、茯苓、則兼消惡露、而兼治痢疾、並行而不相悖也、再服香連丸、以俟一二日後、病勢如減、可保無虞、若產七日外、有患褐花色、後重頻並虛痢、即當加補無疑、若產婦稟厚、產期已經二十餘日、宜服生化湯、加連、芩、厚朴、芍藥行積之劑。

一本作十數日。

加減生化湯治產後七日內患痢

川芎二錢、當歸五錢、炙草五分、桃仁十二粒、茯苓一錢、陳皮四分、木香三分、紅痢腹痛、加砂仁八分。

青血丸治數日痢

香連爲末、加蓮肉粉各一兩半、和勻爲丸、酒送下四錢。

凡產三四日後、塊散、痢疾少減、共十症、開後依治。

一、產後久瀉。

元氣下陷、大便不禁、肛門如脫、宜服六君子湯、加木香四分、肉果一個、製、薑汁五分。

二、產後瀉痢。

色黃、乃脾土虧氣虛損、宜服補中益氣湯、加木香肉果。

三、產後傷麵食。

瀉痢宜服生化湯、加神麯、麥芽。

一本神麯、麥芽下有各一錢。

四、產後傷肉食。

瀉痢宜服生化湯、加山查、砂仁。

五、產後胃氣虛弱。

瀉痢完穀不化、當溫助胃氣、宜服六君子湯、加木香四分、肉果一個、製。

六、產後脾胃虛弱。

四肢浮腫、宜服六君子湯、加五皮散見後水腫。

七、產後瀉痢。

無后重、但久不止、宜服六君子湯、加木香、肉果。

八、產後赤白痢。

臍下痛、當歸、厚朴、黃連、肉果、甘草、桃仁、川芎。

九、產後久痢。

色白腦血虛、宜四物湯、加荊芥、人參。

十、產後久痢。

色赤腦氣虛、宜六君子湯、加木香、肉果。

霍亂第二十四

由勞傷氣血、臟腑空虛、不能運化食物、及感冷風所致、陰陽升降不順、清濁亂於脾胃、冷熱不調、邪正相搏、上下爲霍亂。

生化六和湯治產後血塊痛未除、感霍亂。

川芎二錢、當歸四錢、黑豆、炙草、陳皮、藿香各四分、砂仁六分、茯苓一錢、豆三片、煎。

附子散治產後霍亂吐瀉、手足逆冷、須無塊痛、方可服。

白朮一錢、當歸二錢、陳皮、黑豆、丁香、甘草各四分、共爲末、粥飲送下二錢。

一本有附子五分。

溫中湯治產後霍亂吐瀉不止、無塊痛者可服。

人參一錢、白朮一錢半、當歸二錢、厚朴八分、黑豆四分、茯苓一錢、草豆蔻六分、豆三片、水煎服。

嘔逆不食第二十五、

產後勞傷臟腑、寒邪易乘於腸胃、則氣逆嘔吐而不下食也、又有瘀血未淨而嘔者、亦有痰氣入胃、胃口不清而嘔者、當隨症調之。

加減生化湯治產後逆不食嘔。

川芎一錢、當歸三錢、黑豆、砂仁、藿香各五分、淡竹葉七片、水煎、和豆汁二匙服。

溫胃丁香散治產後七日外嘔逆不食。

當歸三錢、白朮二錢、黑豆四分、丁香四分、人參一錢、陳皮五分、炙草五分、前胡五分、藿香五分、豆三片、水煎服。

一本有白朮、無白茯苓、丁香作五錢、用者酌之。

石蓮散治產後嘔吐、心神目眩。

石蓮子一兩半、去殼去心、白茯苓一兩、丁香五分、共爲細末、米飲送下。

生津益液湯 治產後虛渴，口燥氣少，由產後血少多汗，內熱不生津液。

人參、麥冬（去心）、茯苓（各一兩）、大棗、竹葉、浮小麥、炙草、括蔞根、大渴不止，加蘆根。

一本人參一錢，麥冬、茯苓二錢，存參。

咳嗽第二十六

治產後七日內外，感風寒咳嗽，鼻塞聲重惡寒，勿用麻黃以動汗，嗽而脅痛，勿用柴胡湯。嗽而有聲，痰少面赤，勿用涼藥。凡產有火嗽有痰嗽，必須調理半月後，方可用涼藥。半月前不當用。

加味生化湯 治產後外感風寒咳嗽，及鼻塞聲重。

川芎（一錢）、當歸（二錢）、杏仁（十粒，去皮尖）、桔梗（四分）、知母（八分）。

知母一本作四分。

有痰加半夏麴。虛弱有汗，咳嗽，加人參。總之產後不可發汗。

加參安肺生化湯 治產後虛弱，旬日內外感風寒咳嗽，聲重有痰，或身熱頭痛及汗多者。

川芎（一錢）、人參（一錢）、知母（一錢）、桑白皮（一錢）、當歸（二錢）、杏仁（十粒，去皮尖）、甘草（四分）、桔梗（四分）、半夏（七分）、橘紅（三分）。

虛人多痰，加竹瀝一杯，薑汁半匙。

加味四物湯 治中月後乾嗽有聲痰少者。

川芎、白芍、知母、瓜蔞仁（各一錢）、生地、當歸（各二錢）、阿子（二錢）、冬花（六分）、桔梗（四分）、甘草（四分）、兜鈴（四分）、生薑一大片。

水腫第二十七

產後水氣，手足浮腫，皮膚見光澤色，乃脾虛不能制水，腎虛不能行水也。必以大補氣血為先，佐以蒼朮、白朮、茯苓補脾，選滿用陳皮、半夏、香附消之。虛人加人參、木通。有熱加黃芩、麥冬，以清肺金，健脾利水，補中益氣湯。七日外用人參、白朮各二錢，茯苓、白芍各一錢，陳皮五分，木瓜八分，紫蘇、木通、大腹皮、蒼朮、厚朴各四分。大便不通，加郁李仁、麻仁各一錢。如因寒邪滯氣傷脾，無汗而腫，宜薑皮、半夏、蘇葉，加於補氣方以表汗。

五皮散 治產後風邪寒傷脾經，氣血滯澀，以致面目浮虛，四肢腫脹氣喘。

五加皮、地骨皮、大腹皮、茯苓皮（各一錢）、薑皮（一錢）、煅一枚，水煎服。

又云：產後惡露不淨，停留胞絡，致令浮腫。若以水氣治之，投以甘遂等藥，誤矣。但服調經散，則血行而腫消矣。

調經散 此方能調經，治腹痛。

沒藥（另研）、琥珀（另研，各一錢）、肉桂、赤芍、當歸（各一錢）。

一本無桃仁。

右為細末，每服五分，薑汁、酒各少許調服。

流注第二十八

產後惡露流於腰臂足關節之處，或浸腫，或結塊，久則腫起作痛，肢體倦怠，急宜用慈熨法。以治外腫，內服參歸生化湯，以消血滯無緩也。未成者消，已成者潰。

慈熨法

用慈一握，炙熱搗爛作餅敷痛處，用厚布二三層，以熨斗火熨之。

參歸生化湯

川芎（一錢半）、當歸（二錢）、炙草（五分）、人參（二錢）、黃芪（一錢半）、肉桂（五分）、馬蹄香（二錢）。

此症若不補氣血，節飲食，慎起居，未有得生者。如腫起作痛，起居飲食如常，是病氣未深，形氣未損，易治。若漫腫微痛，起居倦怠，飲食不足，最難治。成未成膿，未潰，氣血虛也，宜服八珍湯，增寒惡寒，陽氣虛也，宜服十全大補湯。補後大熱，陰血虛也，宜服丹皮。嘔逆，胃氣虛也，宜服六君子湯，加炮薑、乾薑。食少體倦，脾氣虛也，宜服補中益氣湯。四肢冷逆，小便頻數，腎氣虛也，宜服四物湯加參、芪、鹿茸。日久成腫，用此宜導其腫，若未補氣血旺，不可服此方。

膨脹第二十九

婦人素弱，臨產又勞，中氣不足，胸膈不利，而轉運稽遲，若產後即服生化湯，以消塊止痛，又服加參生化湯，以健脾胃，自無中滿之症。其膨脹因傷食而誤消，因氣鬱而誤散，多食冷物，而停留惡露，又因血虛大便燥結，誤下而益脹，殊不知氣血兩虛，血塊消後，當大補氣血以補中虛，治者若但知傷食宜消，氣鬱宜散，惡露當攻，便結可下，則胃氣反損，滿悶益增，氣不升降，濕熱積久，遂成膨脹，豈知消導坐於補中，則脾胃強，而所傷食氣消散，助血衆行，大便自通，惡露自行。

如產後中風，氣不足，微滿，誤服耗氣藥而脹者，服補中益氣湯。

人參（五分）、當歸（五分）、白朮（五分）、白茯苓（一錢）、川芎（四分）、白芍（四分）、蘿蔔子（四分）、木香（三分）。

一本人參白朮俱作一錢，當歸作二錢，石菖一片。

如傷食，誤服消導藥成脹，或脅下積塊，宜服健脾湯。

人參、白朮、當歸（各三錢）、白茯苓、白芍、神麯、吳萸（各一錢）、大腹皮、陳皮（各四分）、砂仁、麥芽（各五分）。

一本人參白朮作二錢。

如大便不通，誤服下藥成脹及腹中作痛，宜服養榮生化湯。

當歸（四錢）、白芍（一錢）、白茯苓（一錢）、人參（一錢）、白朮（二錢）、陳皮（五分）、大腹皮（五分）、香附（五分）、蓽澄茄（一錢）、桃仁（十粒）。

塊痛，將藥送四消丸，脹誤下，須用參歸半斤，大便方通，膨脹方退。凡誤用消食耗氣藥以致

絕穀。長生活命丹屢效。方見傷食條

怔忡驚悸第三十

由產後勞傷。去血過多。則心中跳動不安。謂之怔忡。若惕然定驚。心中怯怯。如人將捕之狀。謂之驚悸。治此二症。惟調和脾胃。志定神清。而病愈矣。如分娩後。血塊未消。宜服生化湯。且補血行塊。血旺則怔定驚平。不必加安神定志劑。如塊消痛止後。患此。宜服加減發柴湯。

當歸。二錢。川芎。二錢。茯神。一錢。人參。一錢。棗仁。一錢。炒。麥冬。一錢。遠志。一錢。白朮。一錢。黃芪。一錢。元肉。八枚。陳皮。四分。炙草。四分。蜜煎。處頃加竹瀝薑汁。去川芎麥冬。再加竹茹一團。加木香。即歸脾湯。

養心湯治產後心血不足。心神不安。

炙黃芪。一錢。茯神。八分。川芎。八分。當歸。二錢。麥冬。八分。遠志。八分。柏子仁。一錢。人參。一錢。炙草。四分。五味。十粒。一本有元肉六枚。

蜜水煎服。

骨蒸第三十一

宜服保眞湯。先服清骨散。

柴胡梅連湯即清骨散。作湯連煎。

柴胡。前胡。黃連。烏梅。去核。

各二兩。共爲末。臨用。再將豬脊骨一條。豬苦膽一個。韭菜白十根各一寸。同搗成泥。入蜜便一酒盞。攪如稀糊。入藥末。再搗爲丸如菉豆大。每服三四十丸。清湯送下。如上腦熱多。食後服此方。凡男女骨蒸皆可用之。不專治產婦。

保眞湯

黃芪。六分。人參。二錢。白朮。二錢。炒。炙草。四分。川芎。六分。當歸。二錢。天冬。一錢。麥冬。二錢。白芍。二錢。枸杞。二錢。黃連。六分。黃柏。六分。炒。知母。二錢。生地。二錢。五味。十粒。地骨皮。六分。棗三枚。去核。水煎服。一本無麥冬黃連。

加味大造湯治骨蒸勞熱。若服清骨散。無效。服此方。

人參。一兩。當歸。一兩。麥冬。八分。石斛。八分。酒浸。柴胡。六錢。生地。二兩。胡連。五錢。山藥。一兩。枸杞。一兩。黃柏。七分。俱作八錢。柴胡五錢。黃柏四分。酒炒。一本麥冬石斛。

先將麥冬地黃搗爛。後入諸藥。開搗爲丸。加蒸紫河車另搗。焙乾爲末。煉蜜丸。

心痛第三十二

此即胃脘痛。因胃脘在心之下。勞傷風寒。及食冷物而作痛。俗呼爲心痛。心可痛乎。血不足則怔忡驚悸不安耳。若眞心痛。手足青黑色。且夕死矣。治當散胃中之寒氣。消胃中之冷物。必用生化湯。佐消寒食之藥。無有不安。若綿綿而痛。可按止之。間無血塊。則當論虛而加補也。產後心痛腹痛二症相似。因寒食與氣上攻於心則心痛。下攻於腹則腹痛。均用生化湯。

加肉桂吳萸等溫散之藥也。

加味生化湯

川芎。一錢。當歸。三錢。黑薑。五分。肉桂。八分。吳萸。八分。砂仁。八分。炙草。五分。

傷寒食。加肉桂吳萸。傷麵食。加神麯麥芽。傷肉食。加山查砂仁。大便不通。加肉蓯蓉。

腹痛第三十三

先問有塊無塊。塊痛只服生化湯。調失笑散二錢。加元胡一錢。無塊則是遇風冷作痛。宜服加減生化湯。

川芎。一錢。當歸。四錢。黑薑。四分。炙草。四分。防風。七分。吳萸。六分。白蔻。五分。桂枝。七分。

痛止去之。隨傷食物所加。如前。

小腹痛第三十四

產後虛中感寒飲冷。其寒下攻。小腹作痛。又有血塊作痛者。又產後血虛臍下痛者。並治之。以加減生化湯。

川芎。一錢。當歸。三錢。黑薑。四分。炙草。四分。桃仁。十粒。

有塊痛者。本方中送前胡散。亦治寒痛。若無塊但小腹痛。亦可按而少止者。屬血虛。加熟地三錢。前胡、肉桂各一錢。爲末。名前胡散。

虛勞第三十五

指節冷痛。頭汗不止。

人參。三錢。當歸。三錢。黃芪。二錢。淡豆豉。十粒。生薑。三片。韭白。十寸。豬脊。二條。

先將豬脊煮熟取汁。煎藥八分。溫服。

遍身疼痛第三十六

產後百節開張。血脈流散。氣弱則經絡間血多阻滯。累日不散。則筋牽脈引。骨節不利。故腰脊不能轉側。手足不能動履。或身熱頭痛。若誤作傷寒。發表出汗。則筋脈動蕩。手足發冷。變症出焉。宜服趁痛散。

當歸。一錢。甘草。 黃芪。 白朮。 獨活。各八分。 肉桂。八分。桑寄生。一錢。牛膝。八分。蘆白。五根。一本無桑寄生。

蜜。三片。水煎服。

腰痛第三十七

由女人腎位繫胞。腰爲腎腑。產後勞傷腎氣。損動胞絡。或虛未復。而風乘之也。

養柔壯腎湯治產後感風等。腰痛不可轉。

一本有川芎八分。

當歸二錢。防風四分。獨活。桂心。杜仲。續斷。桑寄生各八分。生薑三片。水煎服。兩帖後。痛未止。腰腎虛。加熟地三錢。

加味大造丸 治產後日久氣血兩虛。腰痛腎腳。方見骨蒸條。膏蜜丸。

胡桃一本作二十個。

胡桃十二個。破故紙八兩。酒炒。杜仲一斤。鹽汁炒。去絲。爲細末。煉蜜丸。淡醋湯送六十丸。

腰痛第三十八

乃肝經血虛氣滯之故。氣滯用四君子湯。加青皮柴胡。血虛用四物湯。加柴胡人參白朮。若概用香燥之藥。則反傷清和之氣。無所生矣。

補腎散 治腎虛

一本山萸二錢。當歸二錢。五味十粒。黃芪八分。川芎六分。熟地錢半。木瓜白朮各一錢。獨活八分。續斷一片。無山藥。存參。

山萸。當歸。五味。山藥。黃芪。川芎。熟地。木瓜。白朮。獨活。桑仁各等分。水煎服。

陰痛第三十九

產後起居太早。產門感風作痛。不發難近身體。宜用祛風定痛湯。

川芎一錢。當歸三錢。獨活。防風。肉桂。荊芥各五分。炒黑。茯苓一錢。地黃二錢。桑二枚。煎服。

又附陰疳、陰蝕、陰中瘡曰鼈瘡。或痛或癢。如蟲行狀。濃汁淋漓。陰蝕幾盡者。由心腎煩鬱。胃氣虛弱。致氣血流滯。經云。諸瘡痛癢。皆屬於心。治當補心發腎。外以藥薰洗。宜用十全陰疳散。

川芎。當歸。白芍。地榆。甘草各等分。水五碗。煎二碗。去渣。薰日三夜四。先薰後洗。

一方。用蒲黃一升。水銀二兩。二味調勻搽。

一方。用蝦蟆蒐蕊等分爲末。敷瘡。

一方。治疳蟲食下部及五臟。取東南桃枝。輕打頭散。以綿裹之。

一方。用石硫黃末。將縛桃枝燃之。接鼻嗅宜與上條合看。燃疑鼈之誤。

一方。截一短竹筒。先納陰中。以桃枝燒煙薰之。

惡露第四十

即係裹兒污血。產時惡露隨下。則腹不痛而產自安。若腹欠溫煖。或傷冷物。以致惡露凝塊。日久不散。則虛症百出。或身熱骨蒸。食少羸瘦。或五心煩熱。月水不行。其塊在兩脅。動則害鳴嘈雜。暈眩發熱似瘧。時作時止。如此數症。治者欲洩其邪。先補其虛。必用補中益氣湯。送三消丸。則元氣不損。惡露可消。

加味補中益氣湯

此方治產後傷食。惡露不淨。若初產惡露不下。宜服生化湯。加查炭三錢。每日一帖。連服四劑。

人參一錢。白朮二錢。當歸三錢。黃芪一錢。白芍一錢。廣皮四分。甘草四分。薑棗煎服。

三消丸 治婦人死血、食積、痰三等症。

黃連一兩。一半用吳黃連汁。去滓澄炒。一半用薑智仁炒。去薑智仁不用。萊菔子一兩五錢。炒。川芎五錢。桃仁十粒。山楂。青皮。三稜。莪朮各五錢。俱用醋炒。山查一兩。香附一兩。童便浸炒。

右爲末。蒸餅爲丸。食遠服。用補中益氣湯送下五六十丸。或用白朮三錢。陳皮五錢。水一鍾。煎五分送下亦可。

乳癰第四十一

乳頭屬足厥陰肝經。乳房屬足陽明胃經。若乳房腫脹。結核色紅。數日外腫痛潰破膿。膿盡而愈。此屬膽胃熱毒。氣血壅滯。名曰乳癰。易治。若初起內結小核。不紅不腫不痛。積之歲月。漸大如巉岩山。破如熟榴。難治。治法痛腫寒熱。宜發表散邪。痛甚宜疏肝清胃。膿成不潰。用托裏。肌肉不生。膿水淋漓。宜補脾胃。膿出及潰。惡寒發熱。宜補血氣。飲食不進。或作嘔吐。宜補胃氣。乳巖初起。用益氣發榮湯。加歸脾湯。間可內消。若用行氣補血之劑。速亡甚矣。

瓜蔞散 治一切癰疽。並治乳癰。雖者六腑不和之氣。鬱滯於陰則生之。

瓜蔞一個。連皮搗爛。生甘草五分。當歸三錢。乳香五分。醋炒。沒藥五分。醋炒。金銀花三錢。白芷一錢。青皮五分。

水煎溫服。

回脈散 乳癰未潰時服此。潰後大便出。虛人不用。

大黃三錢。牛白芷八分。乳香五分。木香五分。沒藥五分。穿山甲五分。蛤粉炒。

共爲末。人參二錢。煎湯調藥末服。

十全大補湯

人參。白朮。黃芪。熟地各三錢。茯苓八分。甘草五分。川芎八分。金銀花三錢。

瀉。加黃連、肉果。渴。加麥冬、五味。寒熱往來。用馬蹄香搗散。凡乳癰服薏苡仁粥好。

又方。用烏藥軟白香蕉者五錢。研水一碗。牛皮膠一片。同煎。七分溫服。如孕婦腹內癰。此二方可通用。

又有乳吹。乃小兒飲乳。口氣所吹。乳汁不通。遂結作痛。不急治則成癰。宜速服瓜蔞散。更以手揉散之。

風毒第四十二

用山羊血。取色新者。於新瓦上焙乾。研末。老酒沖下。五六分爲度。重者用至八分。其效如神。

又用抱不出殼雞子。瓦上焙乾。酒調服。

加治虛寒危症。用蔓鬚子根刮皮。新瓦上焙乾。研末。溫服一錢。雖危可保萬全。

不語第四十三

乃惡血停蓄於心。故心氣閉塞。舌強不語。用七珍散。

人參。石菖蒲。川芎。生地。各一兩。辰砂。五分。防風。五錢。細辛。一錢。

共爲細末。用薄荷湯下一錢。因痰氣鬱結。閉口不語者。用好明礬一錢。水泉過。沸湯送下。

一方。治產後不語。

人參。石蓮子。去心。石菖蒲。各等分。水煎服。

婦人良方云。產後痞。心腎虛不能發。七珍散。脾氣鬱結。歸脾湯。脾傷食少。四君子湯。氣血俱虛。八珍湯。不應。獨參湯。更不宜。急加附子。蓋補其血以生血。若單用佛手散等破血藥。誤矣。

補編

產後大便不通。用生化湯。內減黑薑加麻仁。服滿加陳皮。血塊痞。加肉桂元胡。如燥結十日以上。肛門必有燥糞。用蜜煎導之。

煉蜜煎法

用好蜜二三兩。火煉滾至茶褐色。先用溲桃葉煎蜜。在桃上用手作如塞狀。插肛門。待欲大便。去蜜塞方便。

又方。用麻油。口含竹管入肛門內。吹油四五口。腹內藥和即通。或豬膽亦可。

治產後雞爪風。

桑柴灰。三錢。存性。魚膠。三錢。炒。手指甲。十二個。炒。

共爲末。黃酒送下。取汗即愈。

保產無憂散

當歸。錢半。酒洗。川芎。錢半。炒。黑芥穗。八分。艾葉。七分。炒。麩炒枳殼。六分。炙黃芪。八分。兔絲子。錢四分。酒炒。光活。五分。厚朴。七分。薑炒。川貝母。一錢。去心。白芍。錢二分。酒炒。甘草。五分。薑三片。溫服。

右方保胎。每月三五服。臨產熱服。催生如神。

治逆體浮腫。是脾虛水溢之過。凡浮腫者可通用。俱神效。

真縮砂仁。四兩。萊菔子。二兩四錢。研末。水浸濕。取汁。浸砂仁。候汁盡晒乾。研極細末。每服一錢。漸加至二錢。爲度。淡薑湯送下。

保產神效方

未產能安。臨產能催。倘傷胎氣。腰疼腹痛。甚至見紅不止。勢欲小產。危急之際。一服即產。再服全安。臨產時。交骨不開。橫生逆下。或子死腹中。命在垂危。服之奇效。

全當歸。一錢五分。酒洗。真川芎。一錢五分。紫厚朴。七分。薑汁炒。兔絲子。一錢五分。酒浸。川貝母。二錢。去心。薑炒。川光活。六分。荊芥穗。八分。黃芪。八分。蜜炙。斷艾。五分。醋炒。炙草。五分。白芍。一錢二分。冬月用二錢。酒炒。生薑三片。水二鍾。煎八分。渣。水一鍾。煎六分。產前空心預服二劑。臨產隨時熱服。

此乃仙傳奇方。愼勿以庸醫輕加減其分兩。

按保產無憂散。保產神效方。與縮砂仁湯。皆治產後諸證。其方俱相同。特引論時別。並存參看可也。

小兒藥證眞訣

錢乙撰

敎郎大醫閻季忠序

原序

醫之爲藝誠難矣。而治小兒爲尤難。自六歲以下。黃帝不載其說。始有顫顖經。以占壽夭死生之候。則小兒之病。雖黃帝猶難之。其難一也。脈法雖曰八至爲和平。十至爲有病。然小兒脈微難見。醫爲持脈。又多啼。而不得其審。其難二也。脈既難憑。必資外證。而其骨氣未成。形聲未正。悲啼喜笑。變態不常。其難三也。問而知之。醫之工也。而小兒多未能言。言亦未足取信。其難四也。臟腑柔弱。易虛易實。易寒易熱。又所用多犀珠龍腦。醫苟難辨。何以已疾。其難五也。種種隱奧。其難固多。余嘗致思于此。又曰見庸醫妄施方藥。而救之者十常四五。良可哀也。蓋小兒治法。散在諸書。又多出于近世臆說。汗漫難據。求其要妙。豈易得哉。太醫丞錢乙字仲陽。汶上人。其治小兒。該括古今。又多自得。著名于時。其法簡當精審。如指諸掌。先子治平中登第。調須城尉。識之。余五六歲時。病驚搐癡癇。屢至危殆。嘗仲陽拯之。良愈。是時仲陽年高。少不肯輕傳其書。余家所傳者。纔十餘方耳。大觀初。余筮仕汝海。而仲陽老矣。于親舊間。始得說本數十條。後六年。又得雜方。蓋晚年所得益妙。比于京師復見別本。然旋著旋傳。皆雜亂。初無紀律。互有得失。固得參校焉。其先後則次之。重複則削之。訛謬則正之。俚語則易之。上卷。脈證治法。中卷。記嘗所治病。下卷。諸方。而著以全。于是古今治小兒之法。不可以加矣。余念恃愛者。仁者之用心。幼幼者。聖人之遺訓。此惠可不廣耶。將傳之好事者。使幼者免橫夭之苦。老者無哭子之悲。此余之志也。因以明仲陽之術于無窮。宣

錢乙傳

錢乙字仲陽。上世錢塘人。與吳越王有屬。俶納土。曾祖贊隨以北。因家于鄆。父顗。善鍼醫。然嗜酒喜游。一旦匿姓名。東游海上。不復返。乙時三歲。母前亡。父同產姑。嫁醫呂氏。哀其孤。收養爲子。稍長。讀書。從呂君問醫。呂將歿。乃告以家世。乙號泣請往尋父。凡五六返。乃得所在。又積數歲。乃迎以歸。是時乙年三十餘。鄉人驚嘆感慨。爲泣下。多賦詩詠其事。後七年。父以壽終。喪葬如禮。其事呂君猶事父。呂君歿無嗣。爲之行斬服。嫁其孤女。歲時祭享。皆與親等。乙始以顫顖方著。山東元豐中。長公主女有疾。召使視之。有功。奏授翰林醫學。賜緋。明年。皇子儀國公病痰癎。國醫未能治。長公主朝。因言錢乙起草野。有異能。立召入。進黃土湯而愈。神宗皇帝召見。褒諭。且問黃土所以愈疾狀。乙對曰。以土勝水。木得其平。則風自止。且諸醫所治垂愈。小臣適當其愈。天子悅其對。擢太醫丞。賜紫衣金魚。自是戚里貴室。逮士庶之家。願致之無虛日。其論醫。諸老宿莫能持難。俄以病免。哲宗皇帝復召。宿直禁中。久之。復辭疾。賜告。遂不復起。乙本有羸病。性簡易。嗜酒。疾脫攻。自以意治之。輒愈。最後得疾。惟甚。乃嘆曰。此所謂周痺也。周痺人腿者死。吾其已夫。已而曰。吾能移之。使病在末。因自製藥。日夜飲之。人莫見其方。居亡何。左手足挛不能用。乃喜曰。可矣。又使所親登東山。視兔絲所生。舉火燭其下。火滅處。剔之。果得茯苓。其大如斗。因以法瘞之。閱月而盡。蓋此雖偏廢。而氣骨堅悍。如無疾者。退居里舍。杜門。不冠履。坐臥一榻上。時時閱史記雜說。客至。酌酒劇談。

宣欲之適，則使二僕夫輿之出沒閭巷，人或邀致之，不肯往也。病者日造門，或扶攜襁褓，負壘累滿前，近自鄰井，遠或數十里，皆授之藥，致謝而去。初長公主女病泄痢，將殆，乙方醉曰，當發疹而愈，騎馬都尉以爲不然，怒責之，不對而退。明日疹果出，尉喜以詩謝之。廣親宗室子病，診之曰，此可無藥而愈，顧其幼曰，此兒旦夕變病，旅人，後三日，過午無恙，其家悲曰，幼何疾，醫貪利勳人，乃如此，明日果發痘，甚急，復召乙治之，三日愈，問何以無疾而知，曰火急直視，心與肝俱受邪，過午者，心與肝所用時，當更也。宗室王子病嘔泄，醫以藥溫之，加嘔，乙曰，病本中熱，脾且傷，奈何以剛劑燥之，將不得前後溲，與石膏湯，王與醫皆不信，能謝，乙曰，毋庸復召我，後二日果來召，適有故，不時往，王疑且怒，使人十數發趣之，至曰，閉石膏湯證也，竟如言而效。有士人病咳血，脈而其氣堅硬，乙曰，肝乘肺，此逆候，若秋得之可治，今春不可治，其家所哀，強之，與藥，明日曰，吾藥再瀉肝，而不少卻，三補肺而益虛，又加唇白，法當三日死，然安穀者過期，不安穀者不及期，今尚能粥，居五日而絕。有娠婦得疾，醫言胎且墮，乙曰，娠者五藏傳養，率六旬乃更，能候其月運，補之，可不墮，已而子母皆得全。又乳婦因大怒而病，病雖愈，目張不得瞑，久不能曉，以問乙，乙曰，蓋都李酒飲之，使醉，即愈，所以然者，目係內連肝脈，怒則氣結，膽衝不下，惟祛李去結，隨酒入膽，結去膽下，目則能瞑矣，如言而效。一日過所善翁，聞兒號，愕曰，何等兒聲，翁曰，吾家孿生二男子也，乙曰，謹視之，過百日乃可保，翁不懌，居月餘皆斃，乙爲方博達，不名一師，所治雜種皆通，非但小兒醫也，于藥無不關，他人斬斬守古，獨應趨縱舍，卒與法合，尤達本草，多識物理，辨正關誤，人或得異藥，或持疑事，問之，必爲言，出生本末，物色名狀，退而考之，皆中，末年，羸瘠沒劇，其嗜酒，喜食，皆不自禁，自診知不可爲，召親戚訣別，曷衣待盡，享年八十二，終于家，所著書有傷寒論指微五卷，嬰孩論百篇，一子早世，二孫今現爲醫，劉敞曰，乙非獨其醫可稱也，其篤行似儒，其奇節似俠，術藝行而身隱約，又類夫有道者，數謂余言，舉六元五運，夜宿東平王家，觀氣象，至達月不寐，今老且死，事誠有不在術者，肯以三十日暇，從我，當相授，余笑謝弗能，是後遂不復言，嗚呼，斯人也，如欲復得之，難哉，沒後余聞其所治驗尤衆，東州人人能言之，類其事事者著之篇，具時史家序方術之士，其將有致焉，宜和元年劉敞撰。

目錄

卷一

變蒸論　脈法論　驚癇發搐論
慢驚論　急慢驚論　心論
脾胃論　肺論　腎論
諸疳論　腹中有癖不食論　腹脹論
傷風論　傷風吐瀉論　嘔吐論
吐痢霍亂論　欬嗽論　風溫潮熱相似論
熱渴論　身熱論　積痛論
蟲痛論　胎實論　胎肥論
夜啼論　驚啼論　食乳論
龜胸論　龜背論　行遲論
曾落不生論　目論　傷寒痘疹同異論
痘疹風癢論　不治證論

五癇論
肝論
別處實證論
黃疸論
初生吐不止論
諸汗論
心痛論
胎怯論
齦顎不合論
弄舌舒舌論
痘疹候論

卷二
搐別眞假　發搐順逆
吐瀉間難　虛實下藥
痢爲濕熱　虛實熱證
溫冷用藥　陰痢壞病
病誤用巫　病篤訣
搐疹標本　搐疹有誤
卷三
地黃丸　當歸散
大青膏　敗毒散
荳蔻散　木瓜丸
辰砂丸　麻黃湯
胡黃連丸　蘭香丸
膽礬丸　青金丹
黃耆散　虎杖散
生犀散　三黃丸
橘皮飲子　白虎湯
瀉心湯　導赤散
紫霜丸　珍珠丸
麝蛤丸　安蟲散
荳卷散　龍腦散
羌活膏　溫白丸
金箔丸　蟬花散
瀉白散　蚤黃散
瀉青丸　生犀散
牛黃膏　牛黃丸
軟金丹　鈎藤膏
翦刀股丸　烏藥散
三聖丸　小青丸
福銀丸　百部丸

瘛熱間難　吐瀉爭功
塞熱相反　補下不同
熱不可下　預設驚疾
治病有毒　用藥識證
嗽痛決死　齒痛決死
調中丸　塌氣丸
玉露散　異功散
香銀丸　藿香散
生黃膏　木香丸
白粉散　如聖丸
止汗散　香瓜丸
郁李仁丸　塞頭散
大黃丸　龍腦膏
犀角丸　大黃丸
桃枝丸　白餅子
消柴丸　鐵粉丸
五色丸　鈎藤飲子
遇生散　梓朴散
蕪荑湯　小愧愧丸
安神丸　天南星散
瀉黃散　白虎散
秦艽散　地骨皮散
鐵液丸　鎮心丸
魏香散　涼驚丸
紫草散　蟬蛻丸
小紅丸　小黃丸
鐵砂丸　溫中丸

二氣散　白附子香連丸　荳蔻香連丸
大胡連丸　麝香丸　大惺惺丸
三黃散　人參散　檳榔散
地骨皮散　龍骨散　關香散
胡黃連麝香丸　大蓋膏丸　橘仁丸
龍粉丸　二聖丸　沒石子丸
鐵皮丸　白玉散
小潛連丸　獨活飲子　黃耆散
傳齒立效散　橘連丸　金華散

臣等謹按小兒藥證眞訣三卷宋大梁閻季忠所編錢乙方論也乙字仲陽東平人官至太醫院丞事跡具宋史方技傳乙在宣和間以巫方氏顯顯經治小兒甚著于時故季忠集其舊法以爲此書明以來舊本久佚惟上卷論證中卷爲醫案下卷爲方陳振孫書錄解題馬端臨文獻通考並著錄明以來舊本久佚惟雜見諸家醫書中今從永樂大典內掇拾排纂得論證四十七條醫案二十三條方一百一十有四各以類編仍爲三卷又得閻季忠序一篇劉跂所作錢仲陽傳一篇並冠簡端條理秩然幾還其舊疑當時全部收入故無大佚脫也小兒經方于古罕見自乙始別爲專門而其書亦爲幼科之鼻祖後人得其緒論往往有回生之功如六味丸方本後漢張機金匱要略所載崔氏八味丸方乙以爲小兒純陽無煩益火除去肉桂附子二味以爲幼科補劑明薛己承用其方遂爲直補眞陰之聖藥其斟酌通變動契精微亦可以槩見矣閻季忠永樂大典作閻孝忠然書錄解題及通考皆作季忠疑永樂大典爲傳寫之訛今改從諸家作季劉跂字斯立東平人彥之子也有學易集別著錄所撰乙傳與宋史方技傳略同蓋宋史即據此傳爲藍本云乾隆四十五年十一月恭校上

總纂官內閣學士臣紀昀
光祿寺卿臣陸錫熊
纂修官翰林院編修臣王嘉曾

小兒藥證眞訣卷一

宋 錢乙撰

變蒸論

小兒在母腹中，乃生骨氣五臟六腑，成而未具全，自生之後，卽長骨脈，五臟六腑之神智也。變者、易也。又生變蒸者、自內而長，自下而上，又身熱，故以生之日後三十二日一變，變每畢，卽情性有異于前，何者，長生腑臟智意故也。何謂三十二日長骨添精神，人有三百六十五骨，除手足中四十五碎骨外，有三百二十數，自生下骨一日十段，而上之十日百段，三十二日，計三百二十段，爲一遍，亦曰一蒸，骨之餘氣，自腦分入齦中，作三十二齒，而齒牙有不及三十二數者，由變不足，其常也，或二十八日卽至長二十八齒，已下，倣此，但不過三十二之數也。凡一周變，乃發虛熱諸病，如是十周，則小蒸畢也，計三百二十日，生骨氣乃全，而未壯也，故初三十二日一變，生腎志，六十四日再變，生膀胱，其發，耳與骨冷，腎與膀胱俱生于水，水數一，故先變生，九十六日三變，生心畧，一百二十八日四變，生小腸，其發，出汗而微驚，心爲火，火數一百六十日五變，生肝哭，一百九十二日六變，生膽，其發，目不閉而赤，肝生木，木數三，二百二十四日七變，生肺聲，二百五十六日八變，生大腸，其發，腑熱，或汗或不汗，肺者金，金數四，二百八十八日九變，生脾智，三百二十日十變，生胃，其發，不食，腸痛而吐乳，此後，乃齒生，能言，知喜怒，故云始全也，大倉云氣入四

肢，長碎骨，于十變後，六十四日長其經脈，手足，手受血故能持物，足受血故能行立，經云變且蒸，謂蒸畢而足一歲之日也，師曰，不汗而熱者發其汗，大吐者微止，不可別治，是以小兒須變蒸蚍齒者，如花之易苗，所謂不及三十二齒，由變之不及，齒當與發日相合也，年壯而齒方周。

脈法論

脈氣不治，氣不和，或急緩，傷食，沈緩，虛驚，急促，風，浮，冷，沈細。

驚癇發搐論

驚癇發搐，男發搐，目左視無聲，右視有聲，女發搐，目右視無聲，左視有聲，相勝故也，更有發時證

早辰發搐，因潮熱，寅卯辰時，身體壯熱，上視，手足動搖，口內生熱涎，項頸急，此肝旺，當補腎治肝也，補腎地黃丸，治肝，瀉青丸主之。

日午發搐，因潮熱，巳午未時，發搐，心神驚悸，目上視，白睛，赤色，牙關緊，口內涎，手足，卽搖，此心旺也，當補肝治心，治心，導赤散，涼驚丸，補肝，地黃丸主之。

日晚發搐，因潮熱，申酉戌時，不甚搐，而喘，目微斜視，身體似熱，睡露睛，手足冷，大便淡黃水，是脾旺，當補脾治心，肝，補脾，益黃散，治肝，瀉青丸，治心，導赤散主之。

夜間發搐，因潮熱，亥子丑時，不甚搐，而臥不穩，身體溫，壯，目睛緊斜視，喉中有痰，大便銀褐色，乳食不消，多睡，不省，一本云，不納津液，當補脾治心，補脾，益黃散，治心，導赤散，涼驚丸主之。

傷風後發搐，傷風後得之，口中氣出熱，呵欠頓悶，手足動搖，當發散，大青膏主之，小兒生本怯者，多此病也。

傷食後發搐，傷食後得之，身體溫，多吐，多睡，或吐不思飲食，而發搐，當先定搐，搐過，白餅子下之，後服安神丸，百日內發搐，眞者不過三兩次必死，假者發頻不爲重，眞者內生驚，假者外傷風冷，蓋血氣未實，不能勝任，乃發搐也，欲知假者，口中氣出熱也，治之可發散，大青膏主之，及用塗顖浴體法，卽塗顖浴體法，此三卷內不載。

雜病證，亦兼青者，欲發搐，目直而青，身反折強直，生驚，咬牙甚者發驚。

急驚，因聞大聲，或大驚而發搐，發過則如故，此無除也，當下，利驚丸主之，卽下卷只有涼驚丸，無利驚丸，利或涼字之誤。小兒急驚者，本因熱生于心，身熱面赤，引飲，口中氣熱，大小便黃赤，劇則搐也，蓋熱甚則風生，風屬肝，此陽盛陰虛也，故利驚丸主之，以除其痰熱，不可與巴豆及溫藥，大下之，恐當虛熱不消也，小兒熱痰客于心胃，因聞聲非常，則動而驚搐矣，若熱極，雖不因聞聲及驚，亦自發搐。

五癇論

凡治五癇，皆隨臟治之，每臟各有一證，並五色，犬癇，反折，上竄，犬叫，肝也，羊癇，目瞪，吐舌，羊叫，心也，牛癇，目直視，腹滿，牛叫，脾也，雞癇，驚跳，反折，手縱，雞叫，肺也，豬癇，如尸，吐沫，豬叫，腎也，五癇，重者死，病後甚者亦死。

慢驚論

慢驚。因病後或吐瀉。脾胃虛損。遍身冷。口鼻氣出亦冷。手足時瘛瘲。昏睡。睡露睛。此無陽也。薷蘆湯主之。

急慢驚論

凡急慢驚。陰陽異證。切宜辨而治之。急驚。合涼瀉。慢驚。合溫補。世間俗方。多不分別。誤小兒甚多。

凡小兒傷于風冷。病吐瀉。醫謂脾虛。以溫補之。不已。復以涼藥治之。又不能已。謂之本傷風。醫亂攻之。因脾氣卽虛。內不能散。外不能解。至十餘日。其證多睡。露睛。身溫。風在脾胃。故大便不聚而爲瀉。當去脾間風。風退則利止。宜風散主之。後用使君子丸補其胃。亦有諸吐痢久不差者。脾虛生風。而成慢驚。

心論

見多火旺。心強腎弱。當補腎治心。輕者病退。重者下瀉不語。腎怯虛也。

五臟所主。心主驚。實則叫哭發熱。飲水而搐。虛則困臥。悸動不安。心病多叫哭驚悸。手足動搐。發熱飲水。心熱。視其睡。口中氣溫。或合面睡。及上竄咬牙。皆心熱也。導赤散主之。心氣熱。則心胸亦熱。欲言不能。而有就冷之意。故合面臥。心氣實。則氣上下行澀。合臥則氣不得通。故喜仰臥。則氣得上下通也。瀉心湯主之。（閻孟堅張潔古錢氏補遺濃中丸亦妙。）

肝論

肝主風。實則目直。大叫。呵欠。項急。頓悶。虛則咬牙。多欠。氣熱則外生。氣溫則內生。

肝熱。手尋衣領。及亂捻物。瀉青丸主之。壯熱。飲水。嗜睡。瀉白散主之。

肝有熱。目直視。不搐。得心熱則搐。肝有風。目運劄。不搐。得心熱則搐。治肝。瀉青丸。治心。導赤散主之。

肝外生咸風。呵欠。頓悶。口中氣熱。當發散。大青膏主之。若能食。飲水不止。當大黃丸微下之。餘不可下。

肝有風甚。身反張。強直。不搐。心不受熱也。當補腎治肝。補腎地黃丸。治肝。瀉青丸主之。

凡病或新或久。皆引肝風。風動而上于頭目。目屬肝。風入于目。上下左右。如風吹。不輕不重。兒不能任。故目連劄也。若熱入于目。牽其筋脈。兩眦緊。不能轉視。故目直也。若得心熱則搐。以其子母俱有胎熱。風火相搏故也。治肝。瀉青丸。治心。導赤散主之。

肝病秋見。肝強勝肺。肺怯不能勝肝。當補脾肺。治肝。益脾者。母令子實故也。補脾。益黃散。治肝。瀉青丸主之。

脾胃論

脾主困。實則困睡。身熱。飲水。虛則吐瀉。生風。脾病。困。睡。洩瀉。不思飲食。

脾病見四旁。皆做此治之。順者易治。逆者難治。脾怯。當面目赤黃。五臟相反。隨證治之。

胃氣不和。面皰白無精光。口中氣冷。不思食。吐水。當補脾。益黃散主之。胃冷虛。面皰白色。羸弱。腹痛。不思食。當補脾。益黃散主之。下痢者。調中丸主之。氣不和。口頻撮。當調氣。益黃散主之。食不消。脾胃冷。故不能消化。當補脾。益黃散主之。

虛羸。脾胃不和。不能食乳。致肌瘦。亦因大病。或吐瀉後。脾胃尚弱。不能傳化穀氣也。有冷者。時時下痢。脣口青白。有熱者。溫壯。身熱。肌肉微黃。此冷熱虛羸也。冷者。木香丸主之。夏月不可服。如有證。則少服之。熱者。胡黃連丸主之。冬月不可服。如有證。則少服之。吐沫及痰。或白綠水。皆胃虛冷。

肺論

肺主喘。實則悶亂。喘促。有飲水者。有不飲水者。虛則哽氣。長出氣。肺病。悶亂。哽氣。長出氣。氣短喘。

肺熱。手掐眉目鼻面。甘桔湯主之。肺虛熱。脣深紅色。治之。散肺虛熱。少服瀉白散。

吐痢。及血皆肺熱。久則虛。

肺藏。復有冷風。胸滿。短氣。氣急。喘嗽上氣。當先散肺。後發散風冷。散肺。瀉白散。大青膏主之。

肺臟怯。脣白色。當補肺。阿膠散主之。若悶亂。氣急。喘促。哽氣者。難治。肺虛損故也。脾肺病久則虛。而脣白。脾者肺之母也。母子皆虛。不能相救。故名曰怯。肺主脣白。白而澤者吉。白如枯骨者死。

肺病見春。金旺。肺勝肝。當瀉肺。輕者肺病退。重者目淡青。必發驚。更有赤者。當搐。爲肝怯。當目淡青色也。

肺病勝肝。當補腎肝。治肺臟。肝怯者受病也。補肝腎。地黃丸。治肺。瀉白散主之。

腎論

腎主虛。無實也。惟塵瘀。腎實。則黑昏。腎病。無精光。畏明。體骨重。

腎病見夏。水勝火。腎勝心也。當治腎。輕者病退。重者悸動。當搐也。

腎虛兒本虛怯。由胎氣不成。則神不足。目中白睛多。其瞳卽解。（別本面色皎白。此皆難養。縱長。若悉色慾。夭卽亡也。）

或有因病而致腎虛者非也。腎氣不足。則下竄。蓋骨重。惟欲墜下而縮身也。腎水陰也。腎虛則畏明。皆宜補腎。地黃丸主之。

腎怯。失音。相似。病吐瀉。及大病後。雖有聲而不能言。又能進藥。此非失音。爲腎怯。不能上接于陽故也。當補腎。地黃丸主之。失音。乃猝病耳。

別虛實證論

假如肺病。又見肝證。咬牙多呵欠者易治。肝虛不能勝肺。故也。若目直。大叫。哭。項急。頓悶者。難治。蓋肺久病。則虛冷。肝強實而反勝肺也。虛病之病久。虛腎。虛則補母。實則瀉子。

凡病先虛或下之。令下者。先實其母。然後下之。假令肺虛而痰實。此可下。先當益脾。後方瀉肺也。

五臟相勝。輕重。肝臟病見秋木旺。肝強勝肺也。宜補肺瀉肝。輕者肝病退。重者脣白而死。

呵欠面赤者。風熱。呵欠面青者。驚風。呵欠面黃者。脾虛。驚。呵欠多睡者。內熱。呵欠氣熱者。傷風。血氣怯爲冷所乘。則脣青。尿深黃色。久則尿血。小便不通。久則脹滿。當利小便。洗浴扶脚不乾。風入作痛。令兒撮口。甚者。是脾虛。口噤不止。則失音。遲聲亦同。

諸瘖論

諸疳。疳在內。目腫、腹脹、痢色無常、或沫青白、漸瘦弱。此冷證也。疳在外。鼻下赤爛。自揉鼻頭上瘡。不著痂。漸遶耳生瘡。治鼻疳爛。蘭香散。諸瘡白粉散主之。

肝疳。白膜遮睛。當補肝。地黃丸主之。心疳。面黃頰赤。身壯熱。當補心。安神丸主之。脾疳。憎黃、腹大、食泥土、當補脾。益黃散主之。腎疳。極瘦、身有瘡疥。當補腎。地黃丸主之。肺疳。氣喘。口鼻生瘡。當補肺。益黃散主之。骨疳。喜臥冷地。當補腎。地黃丸主之。

諸疳。皆依本臟補其母。及與治疳藥。冷則木香丸。熱則胡黃連丸主之。疳。皆脾胃病。亡津液之所作也。因大病或吐瀉後。以藥吐下。致脾胃虛弱。亡津液。且小兒病疳。皆恣醫之所壞。假如潮熱。是脾臟虛。一臟實而內發虛熱也。法當補母而瀉本臟。則愈。假令日中發潮熱。是心虛熱也。肝爲心母。則宜先補肝。肝實而後瀉心。心得母氣。則內平而潮熱愈也。醫見潮熱。妄謂其實。乃以大黃牙硝雜諸冷藥利之。利既多矣。不能禁約。而津液內亡。即成疳也。又有病癖。其發作寒熱。飲水。脅下有形硬痛。治癖之法。當漸消磨。醫反以巴豆硇砂輩下之。小兒易虛易實。下之既過。胃中津液耗損。漸令疳瘦。又有病傷寒五六日。間有下證。以冷藥下之太過。致脾胃津液少。既使引飲不止。而生熱也。熱氣內耗。肌肉外消。他邪相干。證變諸端。因亦成疳。又有吐瀉久病。或醫妄下之。其虛益甚。津液燥損。亦能成疳。又有肥疳。即脾疳也。身瘦黃。皮乾。而有瘡疥。其候不一。種種異端。今略舉綱紀。目澀。或生白膜。腎赤。身黃乾。或黑。喜臥冷地。或食泥土。身有瘡疥。瀉青白黃沫水。痢色變易。腹滿。身耳鼻皆有瘡。髮稀作穗。頭大項細。極瘦。飲水。皆其證也。大抵疳病當辨冷熱肥瘦。其初病者爲肥熱疳。久病者爲瘦冷疳。冷者木香丸。熱者黃連丸主之。冷熱之疳。尤宜如聖丸。故小兒之臟腑柔弱。不可痛攻大下。必亡津液而成疳。凡有可下。鼠其大小虛實而下之。則不至爲疳也。初病津液少者。當生胃之津液。白朮散主之。唯多則妙。

腹中有癖不食論

腹中有癖不食。但飲乳是也。當漸用白餅子下之。小兒病癖。由乳食不消。伏在腹中。乍涼乍熱。飲水或嗽。與潮熱相類。不早治。必成疳。以其有癖。則令兒不食。致脾胃虛而發熱。故飲水過多。即蒸脾胃。亡失津液。脾胃不能傳化水穀。其脈沈細。益不食。脾胃虛衰。四肢不舉。諸邪遂生。羸瘦而成疳矣。（餘見脅門）

腹脹論

虛實腹脹。腹脹由脾胃虛。氣攻作也。實者。悶亂嗌滿。可下之。用蜜煎丸。白餅子。不嗌者虛也。不可下。若誤下。致脾虛。氣上附而行。肺與脾子母皆虛。肺主目胞。腫之類。脾主四肢。母氣虛甚。即目胞腫也。色黃者。屬脾也。治之用塌氣丸漸消之。未愈。漸加丸數。不可以丁香、木香、橘皮、荳蔻、大溫散藥治之。何以然。脾虛、氣未出。腹脹而不嗌。可以散藥治之。使上下分消其氣。則愈也。若虛氣已出。附肺而行。即脾胃內弱。每生虛氣。入于四肢面目矣。小兒易爲虛實。脾虛不受寒溫。服寒則生冷。服溫則生熱。當識此。勿誤也。胃久虛熱多生瘡病。或引飲不止。脾虛不能勝腎。隨肺之氣上行于四肢。若水狀。腎氣浸浮于肺。即大嗌也。此當服塌氣丸。病愈後。面赤紅者。虛氣未復故也。治腹脹者。當如行兵。戰寇于林。寇未出林。以兵攻之。必可獲

寇。若出林。不可急攻。攻必有失。當以意漸收之。即順也。

治虛腹脹。先服塌氣丸。不愈。腹中有食積結聚。小便黃。時微嗌。脈伏而實。時飲水。能食者可下之。蓋脾初虛。而後結有積。所治宜先補脾。後下之。下後又補脾。即愈也。補肺。恐生虛嗌。

黃疸論

黃柑似身皮目皆黃者。黃病也。身痛體背強。大小便澀。一身皆黃。面目指爪皆黃。小便如屋塵色。着物皆黃。渴者難治。此黃疸也。二證多病于大病後。別有一證。生下百日及半年。不因病後身微黃者。胃熱。大人亦同。又有面黃腹大。食土渴者。脾疸也。又有自生而身黃者。胎疸也。古書云諸疸皆熱。色深黃者是也。若淡黃兼白者。胃怯。胃不和也。

傷風論

傷風。貪睡。口中氣熱。呵欠頓悶。當發散。與大青膏解不散。有下證。當下。大黃丸主之。大飲水不止。而善食者。可微下。餘不可下也。

傷風。手足冷。脾臟怯也。當和脾。後發散。和解。益黃散。發散。大青膏主之。

傷風自利。脾臟虛怯也。當補脾。益黃散。發散。大青膏主之。未差。關中丸主之。有下證。大黃丸主之。後服溫驚丸。

傷風腹脹。脾臟虛也。當補脾。必不嗌。後發散。仍補脾也。去脹。塌氣丸主之。發散。大青膏主之。

傷風兼臟。兼心則驚悸。兼肺則悶亂嗌急。哽氣長出氣。嚏。兼腎則畏明。各隨補母。臟虛見。故也。

傷風下後。餘熱。以藥下之太過。胃中虛熱。飲水無力也。當生胃中津液。多服白朮散。

傷風吐瀉論

傷風吐瀉。身溫。乍涼乍熱。睡多、氣篇、大便黃白色。嘔吐。乳食不消。時欬嗽。更有五臟兼見證。當煎入臟君臣藥。先服大青膏。後服益黃散。如先曾下。或無下證。慎不可下也。此乃脾肺受寒。不能入食也。

傷風吐瀉。身熱。多睡。能食乳。飲水不止。吐痰。大便黃水。此爲胃虛熱渴吐瀉也。當生胃中津液。以止其渴。止後用發散藥。止渴。多服白朮散。發散。大青膏主之。

傷風吐瀉。身涼。吐沫。瀉青白色。悶亂不渴。哽氣長出氣。睡露睛。此傷風往再輕怯。因成吐瀉。當補脾。後發散。補脾。益黃散。發散。大青膏主之。此二證多病于春秋也。

夏秋吐瀉。五月夏至以後。吐瀉。身壯熱。此熱也。小兒臟腑。十分中九分熱也。或因傷熱。乳食吐瀉不消。瀉深黃色。玉露散主之。

六月大暑以後。吐瀉。身溫似熱。臟腑六分熱。四分冷也。吐嘔。乳食不消。瀉黃白色。似瀉。或食乳。或不食乳。食前少服益黃散。食後多服玉露散。

七月立秋以後。吐瀉。身溫涼。三分熱。七分冷也。不能食乳。多似睡。悶亂。哽氣長出氣。睡露睛。唇白。多驚。欲大便。不渴。食前多服益黃散。食後少服玉露散。

八月秋分以後、吐瀉、身冷、無陽也、不能食乳、乾嘔、瀉青褐水、當補脾、益黃散主之、不可下也、

嘔吐論

吐乳瀉黃、傷熱乳也、吐乳瀉青、傷冷乳也、皆當下、

吐瀉昏睡露睛者、胃虛熱、吐瀉昏睡不露睛者、胃實熱、吐瀉乳不化、傷食也、下之、瀉黃紅赤黑皆熱、赤青白、穀不化、胃冷、

初生吐不止論

凡小兒初生下、拭掠兒口中穢惡、不盡、嚥入喉中、故吐、木瓜丸主之、凡初生、急須拭掠口中令淨、若啼聲一發、則嚥下、多生諸病、

初生三日內、吐瀉壯熱、不思乳食、大便乳食不消、或白色、是傷食、當下之、後和胃、下、用白餅子、和胃、用益黃散主之、

初生三日以上至十日、吐瀉、身溫涼、不思乳食、大便青白色、乳食不消、此上實下虛也、更有兼見證、肺、睡露睛、喘氣、心驚悸、飲水、脾、困倦、繞睡、肝、呵欠頓悶、腎、不語、提明、當瀉、見兒兼驗、補脾、益黃散主之、此二證多病于秋夏也、

吐痰涎論

凡吐痰涎、熱者下之、冷者溫之、

咳嗽論

夫咳者、肺感微寒、八九月間、肺氣大旺、病嗽者、其病必實、非久病也、其證面赤、痰盛、身熱、法當以葶藶丸下之、若久者不可下也、十一月十二月嗽者、乃傷風也、風從背脊第三椎肺俞穴入也、當以麻黃湯汗之、有熱證、面赤、飲水、涎熱、咽喉不利者、宜兼甘桔湯治之、若五七日間、其證身熱、痰盛、唾黏者、以褊銀丸下之、有肺盛者、咳而後喘、面脹、欲飲水、有不飲水者、其身即熱、以瀉白散瀉之、若傷風、咳嗽五七日、無熱證而但嗽者、亦葶藶丸主之、後用化痰藥、有肺虛者、咳而嗽氣、時時長出氣、喉中有聲、此久病也、以阿膠散補之、痰盛者、先瀉脾、後以褊銀丸微下之、涎退即補肺、如上法、有嗽而吐水、或青綠水者、以百祥丸下之、有嗽而吐痰涎乳食者、以白餅子下之、有嗽而咯膿血者、乃肺熱、食後服甘桔湯、久嗽者、肺亡津液、阿膠散補之、咳而痰實、不甚喘、而面赤、時飲水者、可褊銀丸下之、治嗽大法、盛即下之、久即補之、更忌虛實、以意增損、

風溫潮熱相似論

風溫、潮熱、壯熱相似、潮熱者、時間發熱、過時即退、來日依時發熱、此欲發驚也、壯熱者、一向熱而不已、甚則發驚癇也、風熱者、身熱、而口中氣熱、有風證、溫壯者但溫而不熱也、治小兒壯熱、昏睡、傷風、風熱、痘疹傷食、皆相似、未能辨認、間服升麻、葛根湯、惺惺散、小柴胡湯、甚驗、蓋此四藥通治之、不致誤也、惟傷食、則大便酸臭、不消化、畏食、或吐食、宜以藥下之、

諸汗論

寐汗、厚衣臥而額汗出也、止汗散主之、

盜汗、睡而自汗出、肌肉虛也、止汗散主之、通身汗、香瓜丸主之、

六陽虛、汗上至頭、下至項、不過臍也、不須治之、

胃怯汗、上至頂、下至臍、此胃虛、當補胃、益黃散主之、

熱渴論

或洩瀉等諸病、須渴者、皆津液內耗也、不問陰陽、宜煎白虎散、使滿意取足飲之、彌多彌好、

身熱論

身熱不飲水者、熱在外、身熱飲水者、熱在內、

熱證、疎利或解化後、無虛證、勿溫補、熱必隨生、

積痛論

積痛、口中氣溫、面黃白、目無精光、或白睛多、及多睡、畏食、或大便酸臭者、當磨積、宜消積丸、（丸下卷有消積丸、無消積丸、）甚者、當用白餅子下之、後和胃、胃、白虎散、

心痛論

心痛不吐水者、冷、心痛吐水、不心痛者、胃冷病、心痛吐水者、蟲病、

蟲痛論（虛實痛附）

面皖白、心腹痛、口中沫、及清水出、發痛有時、安蟲散主之、小兒本怯者多此病、積痛、食痛、虛痛、大同小異、惟蟲痛者、當口淡而沫自出、治之、隨其證用藥、口中吐沫水者、後必蟲痛、蟲與癇相似、小兒本怯、故胃虛冷、則蟲動而心痛、與癇略相似、但目不斜、手不搐也、安蟲散主之、

胎熱論

胎熱、生下有血氣、時叫哭、身壯熱如煎茶色、目赤、小便赤黃、膏稠、急食乳、浴體法主之、更別父母肥瘦、肥不可生瘦、瘦不可生肥也、

胎熱、面紅、目黑睛多者、喜笑、

胎肥論

胎肥、生下肌肉厚、通身血色紅、滿月以後、漸漸肌瘦、目白、睛粉紅色、五心熱、大便難、時時生涎、浴體法主之、

胎怯論

胎怯、面黃、目黑睛少白睛多者、多哭、

胎怯、生下面色無精光、肌肉薄、大便白水、身無血色、時時嘔氣、多嚏、目無精采、當浴體法主之

夜啼論

夜啼脾臟冷兒痛也當以溫中藥及以法線之花火灸主之

驚啼論

驚啼邪熱乘心也安心定神丸主之（鈔下卷有安神丸無安心定神丸）

食乳論

大喜後食乳食多成驚哭後食乳多成吐瀉

急欲乳不能食由客風熱入兒臍流入心脾經即舌厚脣燥口不能乳當涼心脾

顖顖不合論

解顖生下而顖不合腎氣不成也長必少笑更有目白睛多皖白色瘦者多愁少喜也

龜胸論

龜胸肺熱脹滿攻于胸膈即成龜胸又乳母多食五辛亦成也

龜背論

兒生下客風入脊逐于骨髓即成龜背治之以龜尿點背灸取尿之法當逐藥安龜在上後用鍼照之自尿出以物盛之

行遲論

足大不行行則脚細（鈔此下有脫文）

弄舌舒舌論

弄舌脾臟微熱令舌絡微緊時時舒舌治之勿用冷藥及下之當少與瀉黃散服之亦或飲水醫疑爲熱必冷藥下之非也飲水者脾胃虛津液少也又加面黃肌瘦五心煩熱即爲疳瘦宜加胡黃連丸藥大病未已用藥弄舌者凶

齒落不生論

齒落不生齒生不固（鈔此下有脫文）

目論

目內證赤者心熱導赤散主之淡紅者心虛熱生犀散主之淸者肝熱瀉青丸主之淺淡者補之黃者脾熱瀉黃散主之無精光者腎虛地黃丸主之

傷寒瘡疹同異論

論傷寒瘡疹同異云傷寒男體盛面黃女面赤喘急憎寒及口中氣熱呵欠煩悶項急也瘡疹則腮赤燥多噴嚏悸動昏悶目肢冷傷寒當發散瘡疹當溫平有大熱者解毒（海藏云發散者神犀湯之類溫平者之類活人見鈔子湯是也與衆古老人解毒防風湯解毒醫用解毒者三黃瀉金花丸之類）

瘡疹候論

面燥腮赤目地亦赤呵欠煩悶乍涼乍熱嗽嗽噴嚏手足積冷夜臥驚悸多睡並瘡疹證此天行之病也

惟用溫涼治之不可妄下及妄攻發此辛涼調之也（海藏云肝臟水疱色或青肺臟膿疱色或白脾臟疱色或黃心臟疱色或赤腎臟疱色或黑此五色凡見于瘡或一色或三色相合間病或作次第或知鈔錄心臟疱其色赤腎臟疱色黑此五色凡見于瘡或一色或三色相合間病或作次第太小不等九日之內三角之赤無定也）惟斑疹病後發或痢餘瘡難發痢矣本勝脾本歸心故也若涼藥用涼驚丸溫藥用粉紅丸（鈔下卷有小紅丸白粉丸無粉紅丸）小兒在胎十月食五臟血穢生下則其毒當出故瘡疹之狀皆五臟之液肝主淚肺主涕心主血脾爲裹血其瘡出有五名肝爲水疱以淚出如水其色青小肺爲膿疱以涕稠濁色白而大心爲斑主心血色赤而小次于水疱脾爲疹小次斑疹其主裹血故色赤黃淺也涕淚出多故膿疱水疱皆大血榮于內所出不多故斑疹皆小也病疱者淚涕俱少譬如疱中容水水去則瘦故也

始發潮熱三日以上熱運入皮膚即發瘡疹而不甚多者熱留腐腠之間故也潮熱隨臟出如早食潮熱不已爲水疱之類也

瘡疹始出之時五臟證見惟腎無候但見平證耳尻涼耳涼是也尻耳俱屬于腎其居北方主冷也若瘡黑陷而耳尻反熱者爲逆若用百祥丸牛李齊三服不愈者死病也

凡瘡疹若出辨視輕重若一發便出盡者必重也瘡夾疹者半輕半重也出稀者輕裏外微紅者輕外黑裏赤者微重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑點如針孔者勢劇也膚乾紫陷昏睡汗出不止煩燥熱溫腹脹喘喝大小便不通者困也

凡瘡疹當乳母慎口不可令飢及當風冷必歸腎而變黑難治也（海藏云或熱極反變水化者亦能變黑當以涼藥主之不可不辨以脈則之可知或有因色正者內蘊有熱頭反陷色或者淡白黑中有針眼下陷常急以涼藥除之便結者大黃牽牛之類便利者金花丸之類）更有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾陷者百祥丸下之不黑者慎勿下更有時月輕重大抵瘡疹屬陽出則爲順故春夏病爲順秋冬病爲逆冬月腎旺又盛寒病多歸腎變黑又當辨春臟疱夏黑陷秋斑子冬疹子亦不順也重者十治四五黑者無問何時十難救其一二其候或寒戰噤牙或身黃腫紫宜以百祥丸下之復感寒不已身冷出汗耳尻反熱者死病也何以然腎氣大旺脾虛不能治故也下後身熱氣溫欲飲水者可治以脾主勝腎寒去而溫熱也治之當解毒不可妄下妄下則內虛多歸于腎若能食而痂頭焦起或未焦痂隱實者可下之身熱煩渴腹滿而喘大小便澀面赤悶亂大吐者當利小便不差者宜風散下之若五七日痂不焦是內發熱熱氣蒸于皮膚中故瘡不得焦痂也宜宣風散導之用生犀磨汁解之使熱不生必著痂矣

瘡疹由內相勝也惟斑疹能作瘡疹爲脾所生脾虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相煎動于心神心喜爲熱神氣不安因搐成痼斑子爲心所生心生熱熱則生風風屬于肝二臟相傳風火相爭故發搐也治之當瀉心肝補其母栝蔞根湯主之

瘡黑面忽瀉便膿血并痂皮者順水穀不消者逆何以然且瘡黑屬腎脾腎氣本強或服補脾藥脾氣得實腎雖用事脾可制之今瘡入腹爲膿血及連痂皮得出是脾強腎退即病出而安也米穀反瀉乳不化者是脾虛不能制腎自洩也此必難治（海藏云瘡出痂皮根在內也表裏俱病是爲大疾水穀化者順水穀不化者逆也鄒嶧友辨證錄氏鑑按錄氏論瘡疹證惟用溫涼證惟用溫涼）

痢不可妄吐下及攻發，又云寒熱嗜牙，身黃發腫，當以百祥丸下之，又身熱頻渴腹滿而喘，大小便澀，面赤，鬧亂，不吐，當利小便，不差，宜風散下之，此皆瘡疹出之證。先發膿疱，後發水疱，多者順，少者逆。先水疱，後斑子，多者逆，少者順。先瘡子，後斑子者順，凡瘡瘡只出一般者善。（裕藏云，此一句足以知辨出者，諸證相合，不齊也，用藥亦略矣。）雜證又云，先發膿疱，後發斑子者逆，先發膿疱，後發瘡子者順，先發水疱，後發瘡子者逆。（海藏云，前諸例，五色各顯，五臟，亦有二色相合，或有三色，即無定也，與此說後說，水斑瘡大不同，先後順逆，大意相若。）

瘡痧風癬論

夫小兒瘡痧風癬，可用雄黃散，加芒硝少許，油調傅之，如面上有瘡癬，不宜搽藥，恐因而入眼，則損目必矣。

不治證論

目亦脈貫瞳人，腦腫及陷，鼻乾黑，魚口氣急，吐蟲不定，瀉不定，精神好，大渴不定，止之又渴，吹鼻不嚏，病重，口乾不睡，時氣脣上青黑點，頰深赤，如塗臙脂，鼻開張，喘急不定。

小兒藥證眞訣卷二

搐別眞假

李司戶孫病，生百日，發搐三五次，請衆醫治，或作天弔，或作胎驚，或作驚風，皆無應者，後錢氏用大青膏，如小豆許，作一服發之，復與塗顖法封之，及浴法，三日而愈，何以然，嬰兒初生，肌骨嫩怯，被風傷之，子不能任，故發搐，頻發者輕，何者客風在內，每遇不任即搐，搐稀者是內臟發病，不可救也，頻搐者宜散風冷，故用大青膏，但不可多，兒至小易虛易實，多即生熱，止一服而已，更當封浴，無不效者。

發搐順逆

李寺丞子，三歲，病搐，自卯至巳，數醫不治，召錢氏視之，搐目右視，大叫哭，李曰，何以搐右，錢曰逆也，李曰何以逆，曰，男爲陽而本發左，女爲陰而本發右，若男發搐時，目左視無聲，右視有聲，女發搐時，右視無聲，左視有聲，所以然者，左肝右肺，肝木肺金，男目右視，肺勝肝也，今來刑木，二臟相戰，故有聲也，治之，瀉其強而補其弱，心實者亦當瀉之，肺虛不可瀉，肺虛之候，悶亂，哽氣，長出氣，此病男反女，故男易治于女也，假令女發搐目左視，肺之勝肝，又病在秋，即肺兼旺位，肝不爲任，故叫哭，當大瀉其肺，然後治心續肝，所以俱言目反右視者，乃肝主目也，凡搐者，風熱相搏于內，風屬肝，故引見之于目也，錢用瀉肺湯瀉之，二日不悶亂，當知肺病退，後用地黃丸補腎，三服後，用瀉青丸，涼驚丸，各二服，凡用瀉心肝藥，五日方愈，不妄治也，又言肺虛不大瀉者何也，曰，設令男目右視，木反尅金，肝旺勝肺，而但瀉肝，若更病在春夏，金氣極虛，故當補其肺，慎勿瀉也。

潮熱問難

皇都徐氏子，三歲，病潮熱，每日酉則發搐，身微熱，而目微斜，及露睛，四肢冷，而喘，大便微黃，錢與李醫同治，錢問李曰，病何搐，李曰有風，何身熱微溫，曰四肢所作，何目斜睛露，曰搐則目斜，何肢冷，曰冷必內熱，曰何喘，曰搐之甚也，曰何以治之，曰凡鼻中灌之必搐止，錢又問曰，既謂風病溫壯，搐引目斜露睛，內熱肢冷，及搐甚而喘，併以何藥治之，李曰皆此藥也，錢曰不然，搐者肝實也，故令搐，目西而身微熱者，肺潮熱用事，肺主身溫，且熱者爲肺虛，所以目微斜露睛者，肝肺相勝也，肢冷者，脾虛也，肺若虛甚，母脾亦弱，木氣乘脾，四肢即冷，治之當先用益黃散，阿膠散，得脾虛證退後，以瀉青丸，導赤散，涼驚丸，治之，九日愈。

吐瀉爭功

廣親北宅，四大王宮，五太尉，病吐瀉不止，米穀不化，衆醫用補藥，言用薑汁調服之，六月中，服溫藥，一日而加喘吐不定，錢曰當以涼藥治之，所以然者，謂傷熱在內也，用石膏湯三服，併服之，衆醫皆言吐瀉多，而米穀又不化，當補脾，何以用涼藥，王信衆醫，又用補脾散，丁香散，三服，錢後至，曰不可服此，三日外必腹滿身熱，飲水吐逆，三日外一如所言，所以然者，謂六月熱甚，伏入腹中，而令引飲，熱傷脾胃，即大吐瀉，他醫又行溫藥，即上焦亦熱，故喘而引飲，三日當死，衆醫不能治，復召錢，至宮中，見有熱證，以白虎湯三服，更以白餅子下之，一日減藥二分，二日三日，又與白虎湯各二服，四日用石膏湯一服，旋新合麥門冬，黃芩，牛子，牛黃，天竺黃，茯苓，以朱砂爲衣，與五丸，竹葉湯化下，熱退而安。

吐瀉問難

廣親宮七太尉，七歲，病吐瀉，是時七月，其證全不食，而昏睡，睡覺悶亂，哽氣乾嘔，大便或有或無，不渴，衆醫作驚治之，疑壓故也，錢曰，先補脾，後退熱，與使君子丸，補脾，退熱，石膏湯，次日以水銀硫黃二物末之，生薑水調下一字，錢曰，凡吐瀉，五月內，九分下而一分補，八月內，十分補而一分下，此是脾虛瀉，腎安治之，至于虛損，下之即死，當只補脾，若以使君子丸，即緩，錢又留溫胃益脾藥止之，醫者李生曰，何食而嗽，錢曰，脾虛不能食，津少即嘔逆，何瀉青水，曰，腸胃至虛冷極故也，錢治而愈。

虛實下藥

馮承務子，五歲，吐瀉，壯熱不思食，錢氏乃曰，目中黑睛少，白睛多，面色㿠白，此子必多病，面色㿠白，神怯也，黑睛少，腎虛也，黑睛屬水，本怯而虛，故多病也，縱長成，必肌膚不壯，不耐寒暑，易虛易實，脾胃亦怯，更不可縱酒恣慾，若不保養，不過壯年，面上常無精神光澤，如婦人之失血也，今吐痢不食，壯熱者，傷食也，不可下，下之虛，入肺則嗽，入心則驚，入脾則瀉，入腎則益虛，此但以消積丸磨之，爲微有食也，如傷食甚，則可下，不下則成癖也，實食在內，乃可下之，下畢補脾必愈，隨其虛實，無不效者。

寒熱相反

京東轉運使李公孫八歲病嗽面胸滿短氣醫者言肺經有熱用竹葉湯牛黃膏各二服治之三日加喘錢氏曰此肺氣不足復有寒邪即便喘滿當補肺脾勿服涼藥李曰醫已用竹葉湯牛黃膏錢曰何治也醫曰退熱退涎錢曰何熱所作曰肺經熱而生嗽嗽久不除生涎錢曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱何不治其肺而反瀉心蓋竹葉湯牛黃膏治心藥也醫有慙色錢治愈

補下不同

段齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血醫以桔梗湯及防已丸治之不愈其痰上攻吐喘不止請錢氏下褊銀丸一大服復以補肺散補脾散治之令段氏咯血肺虛何以下之曰肺雖咯血有熱故也久即虛羸令涎上潮而吐當下其涎若使不吐涎爲甚便也蓋吐涎能虛又生嗽也痰實上攻亦使發搐故依法只宜下痰後補脾肺必涎上而吐愈若先補其肺爲逆先下其痰爲順先下後補爲良也

癖爲潮熱

曹宣德子三歲面黃時發寒熱不欲食而飲水及乳不止衆醫以爲潮熱用牛黃丸麝香丸不愈及以止渴乾葛散服之反吐錢氏曰當下白餅子主之後補脾乃以消積丸磨之此癖也後果愈何以故不食但飲水者食伏脘內不能消致令發寒服止渴藥吐者藥衝脾故也下之即愈

虛實熱證

朱監簿子五歲忽發熱醫曰此心熱也腮赤而唇紅煩躁引飲遂用牛黃丸三服以一物瀉心湯下之來日不愈反加無力而不能食又下之便痢黃沫錢曰心證虛而有留熱在內必被涼藥下之致此虛勞之病也錢先用白朮散生胃中津後以生犀散治之朱曰大便黃沫如何曰胃氣正即瀉自止此虛熱也朱曰醫用瀉心湯如何錢曰瀉心湯者黃連一物耳黃連性寒多服則痢內傷脾胃也坐久衆醫至曰實熱錢曰虛熱若實熱何以瀉心湯下之不安又加面黃頰赤五心煩躁不食而引飲醫曰既虛熱何大便黃沫錢笑曰黃沫服瀉心湯多故也錢後與胡黃連丸治之愈

熱不可下

朱監簿子五歲夜發熱燒即如故衆醫有作傷寒者有作熱者以涼藥解之不愈其候多涎而喜睡他醫以牛黃圓下涎其病益甚至五日大引飲錢氏曰不可下之乃取白朮散來一兩煎藥汁三升使任其意取足服朱曰飲多不作瀉否錢曰無生水不能作瀉縱瀉不足怪也但不可下耳朱曰先治何病錢曰止瀉治痰退熱清神其藥至晚服盡錢氏曰更可服三升又煎白朮散三升服盡得稍減三日又服白朮散三升其子不渴無涎又投阿膠散二服而安

預說驚疾

廣親宅七太尉方七歲潮熱數日欲愈錢謂其父二大王曰七使潮熱將安八使預防驚搐王怒曰但使七使愈勿言八使病錢曰八使過來日午間即吾苦也次日午前果作急搐召錢治之三日而愈蓋預見目直視而顯赤必肝心俱熱更坐石机子乃欲冷此熱甚也肌肩素肥盛脈又急促故必驚搐所言午時

者自寅至午皆心肝所用事時治之瀉心肝補腎自安矣

溫冷用藥

東都張氏孫九歲病肺熱他醫以珠犀龍齒生牛黃治之一月不愈其證嗽喘悶亂飲不止食不能入錢氏用使君子丸益黃散張曰本有熱何以又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尙無效錢曰涼藥久則胃寒不能食小兒虛不能食當補脾候飲食如故即瀉肺經病愈矣服補脾藥二日其子欲飲食錢以瀉白散瀉肺遂愈七分張曰何以不虛錢曰先實其脾然後瀉肺故不虛也

陰癖壞病

東都王氏子吐瀉諸醫用藥下之至虛變慢驚其候睡露睛手足瘈瘲而身冷錢曰此慢驚也與龍腦湯其子胃氣實即開目而身溫王疑其子不大小便令諸醫以藥利之醫留八正散等數服不利而身復冷令錢氏利之錢曰不當利利之必身冷王曰已身冷矣因抱出錢曰不能食而胃中虛若利大小便即死久即脾腎俱虛當身冷而閉目幸胎氣實而難殺也錢用益黃散使君子丸四服令微飲至日午果能飲食所以然者謂利大小便脾胃虛塞當補脾不可攻也後又不語諸醫作失音治之錢曰既失音何開目而能飲食又牙不禁而口不緊也諸醫不能辯錢以地黃丸補腎所以然者用涼藥利小便致脾腎俱虛今脾已實腎尙虛故補腎必安治之半月而能言一月而痊也

治病有等

張氏三子病大者汗遍身次者上至頂下至胸小者但額有汗衆醫以麥煎散治之不愈錢氏曰大者與香瓜丸次者與益脾散小者與石膏湯各五日而愈

用藥識證

鄭人齊郎中者家好收藥散施人其子忽驚熱齊自取青金膏三服餅一服而餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言睡多亦驚又與青金膏一服又瀉二行加口乾而身熱齊言尙有微熱未盡又與青金膏其妻曰用藥十餘行未安莫生病否召錢氏曰已成虛羸先多煎白朮散時時服之後用香瓜丸十三日愈

病誤用巫

王駙馬子五歲病目直視而不食或言有神祟所使請巫師祝神燒紙病不愈召錢至曰驚癎之疾何用求神錢與瀉肝丸愈

病篤訣

黃承務子二歲病瀉衆醫止轉十餘日其證便青白乳物不消身涼加哽氣昏睡醫謂病困篤錢氏先以益脾散三服補肺散三服三日身溫而不哽氣後以白餅子微下之又與益脾散三服病止何以然痢本脾虛傷食初不與大下措置十日上實下虛脾氣弱引肺亦虛補脾肺病退即身溫不哽氣是也有所傷食仍下之也何不先下後補曰便青爲下臟冷先下必大虛先實脾肺下之則不虛而後更補之也

嗽痛決死

東都藥鋪杜氏有子五歲自十一月病嗽至三月末止始得嗽而吐痰乃外風寒搐入肺經令肺病嗽而吐痰風在肺中故也宜以麻黃罌粟散後用涼藥壓之即愈時醫與鐵粉丸半夏丸褊銀丸諸法下之其肺即虛而嗽甚至春三月間尙未愈召錢氏視之其候面青而光嗽而喘促哽氣又時長出氣錢曰病困十已八九所以然者面青而光肝氣旺也春三月肝位衰之時也嗽者肺之病肺自十一月至三月久即虛痿又曾下之脾肺子母也復爲肝所勝此爲逆也故嗽而喘促哽氣長出氣也錢急與瀉青丸散之後與阿膠散實肺次日面青而不光錢又補肺而嗽如前錢又瀉肝瀉肝未已又加肺虛脣白如練錢曰此病必死不可治也何者肝大旺而肺虛絕肺病不得其時而肝勝之今三瀉肝而肝病不退三補肺而肺證益虛此不久生故言死也此證病于秋者十救三四春夏者十難救一果大喘而死

蟲痛決死

辛氏女年五歲病蟲痛諸醫以巴漆砒砂之屬治之不效至三日外多哭而仰臥自按心腹時大叫面色或青或黃或白睛無光而慢脣白吐沫至五日胸高而臥不安錢詳而視之用藜蘆散三服見目不除青色錢氏曰此病大困若更加瀉則爲逆至次日錢見辛曰夜來三更而瀉錢于瀉盆中看如藥汁以杖攪之見有藥丸錢曰此子肌厚當氣實今證反虛不可治也何以然師曰脾虛胃冷則蟲動今反目青此肝乘脾又脾加瀉知其氣極虛也而丸藥隨糞下即脾胃已脫象形病不相應故知死病七日而死

瘡疹標本

睦親宅十太尉病瘡疹兼醫治之王曰疹未出屬何臟腑一醫言胃氣熱一醫言傷寒不退一醫言在母腹中有毒錢氏曰若言胃熱何以乍涼乍熱若言母腹中有毒屬何臟也醫曰在脾胃錢氏曰既在脾胃何以驚悸（醫曰此句下脫醫曰云云）錢曰夫胎在腹中月至六七則已成形食母穢液入兒五臟食至十月滿胃脘中至生之時口有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連汁壓之方下臍糞及涎穢也此亦母之不潔餘氣入見臟中本先因微寒入而成瘡疹未出五臟皆見病證內一臟受穢多者乃出瘡疹初欲病時先呵欠煩悶驚悸乍涼乍熱手足冷面腮赤燥咳嗽時嚏此五臟證具也呵欠煩悶肝也時發驚悸心也乍涼乍熱手足冷脾也面目腮頰赤嗽嚏肺也惟腎無候以在臍下不能食穢故也凡瘡疹乃五臟毒若出歸一證則肝水疱肺膿疱心斑脾疹惟腎不食毒穢而無諸證瘡黑者屬腎由不慎風冷而不飽內虛也又用抱龍丸散服愈以其別無他候故未發出則現五臟證已出則歸一臟也（海藏云本先因微寒入一句一句忽認作寒證當謂用抱龍丸即知內寒多熱也瘡疹未出五臟皆見內一臟受毒多者乃出此一句亦可以瓦知何臟以脈別之亦知何臟或症或參其名可得）

瘡疹有悞

睦親宅一大王病瘡疹始用一李醫又召錢氏錢留抱龍丸三服李以藥下之其疹稠密錢見大驚曰若非轉下則爲逆病王曰李已用藥下之錢曰瘡疹始出未有他證不可下也但當用平和藥調與乳食不受風冷可也如瘡疹三月不出或出不快即微發之發之不出即加藥加藥不出即大發之如大發後不

出及脈平無證者即瘡本稀不可更發也有大熱則當利小便小熱當解毒若出快勿發勿下故止用抱龍丸治之瘡痂若起能食者大黃丸下之瀉一二行即止今先下一日瘡疹未能出盡而稠密甚則難治此誤也縱得安其病有三一者疥二者癰三者目赤李不能治經三日黑陷復召錢氏錢氏曰幸不發寒而病未困也遂用百祥丸爲藥以牛李膏爲助各一大服至五日間瘡復紅活七日而愈蓋黑者歸腎也腎旺勝脾土不尅水因脾虛寒戰則難治所用百祥丸春以瀉勝脾之脂若不實腸自不勝也何以不瀉腎曰腎主虛不受瀉故三服不效即加寒而死

熱傳瘡疹

四大王宮五太尉因墜秋千發熱搐醫以發熱藥治之不愈錢曰本急慢後生大熱當先退其熱以大黃丸玉露散煎悔丸加以牛黃龍腦解之不愈至三日肌膚尙熱錢曰更二日不愈必發斑疹蓋熱不能出也他醫初用藥發散入表表熱而斑生本初驚時當用利驚藥下之今發散乃逆也後二日果斑出以必勝散治之七日而愈（鄭端友按案活人書用無此散治瘡疹惡候出不快及黑靨子內使薄性極難用小兒耳冷尻冷手足乍煖乍涼面赤時嘔時嚏驚悸此瘡疹欲發也未能辨認間服升麻湯消毒散已發未發皆宜服仍用胡麥酒黃藥膏暑月煩躁食後與白虎湯玉露散熱盛與紫雪咽喉或生瘡與甘桔湯甘露散餘依錢說大人同小兒法大藥與大人同惟劑料小大不同耳（海藏云消毒散太陽藥乾不得飲陽明藥也正爲漬時嚥之劑甘露飲子肺腎藥也紫雪天門冬麥門冬黃芩地黃爲血藥甘桔湯少陰藥也紫雪散肺腎藥石膏寒水石爲氣藥甘露飲白虎湯治身軀目痛煩渴者）

小兒藥證眞訣卷三

地黃丸

熟乾地黃（八錢焙秤）　山茱萸　乾山藥（各四錢）　澤瀉　牡丹皮　白茯苓（去皮各三錢）

右爲末煉蜜和丸如桐子大三歲以下一丸至三丸溫水空心化下

當歸散　凡小兒夜啼者臟寒而腹痛也面青手冷不吮乳是也宜此方

當歸（去蘆頭切焙秤）　白芍藥　人參（各一分）　桔梗　陳橘皮（不去白各一錢）　甘草（半分炙半分二分）

右爲細末水煎半盞時時少與服又有熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃人參湯下

調中丸

白朮　人參　甘草（炒半兩）　乾薑（炒）（各四錢）

右爲細末蜜丸如綠豆大每服半丸至五七丸至二三十丸食前溫水送下

塌氣丸

胡椒（一兩）　蠟尾（去毒半兩）

右爲細末麵糊丸粟米大每服五七丸至二三十丸陳米飲下無時一方有木香一錢

大青膏

天麻末（一錢半）　白附子末（生一錢半）　蠍尾（去毒生五分）　青黛研（一錢）　硃砂研　天竺黃研　麝香研（各一字七）

烏稍蛇肉（酒浸蜜蒸取末半錢）

右同再研細，生蜜和成膏，每服半皂子大，至一皂子大，月中兒，粳米大，同牛黃膏溫薄荷水化一處服之。五歲以上，同甘露散服。閻氏集保生信效方，內小兒諸方，言皆得于汝人錢乙，其間大青膏減天麻，添大青，生研一分，其餘藥味分料，和製與此皆同，藏證治云，治小兒傷風，其候仲欠頓悶，口中氣熱，惡風，眠汗，比此爲詳，只用薄荷湯下，今並見于此。

敗毒散　治傷風時氣，寒熱嗽嗽。

人參（去蘆）　茯苓（去皮）　甘草（炙）　前胡（去苗）　羌活（去蘆）　獨活（去蘆）　桔梗　柴胡（去苗）　枳殼（麩炒去麩）

右爲細末，每服二錢，水一盞，入生薑薄荷少許同煎，至七分，去滓，放溫，量大小加減與之。此古方也。錢氏加甜葶藶半兩，薄荷葉半兩，名羌活散。

玉露散（一名甘露散）

寒水石（中間軟而發青焦中有細紋者是）　石膏（中間堅白而有鱗紋手不可折者是如無以方解石代之堅白似石膏能之段段皆方是也）　甘草（生一分）

右同爲細末，每服一字，或半錢一錢，食後溫湯調下。海藏云，非實熱相火大盛，不宜服此。異功散　溫中和氣，治吐瀉不思食。凡治小兒虛冷病證，先與數服以正其氣。

人參（切去蘆）　茯苓（去皮）　白朮　甘草（炙）　陳橘皮（各等分）

右爲細末，每服二錢，水一盞，生薑五片，棗二個，同煎七分，食前溫熱服，量多少與之。海藏云，四君子補脾湯同。

豆蔻散　治吐瀉煩渴，腹脹，小便澀。

舶上硫黃（一分）　桂府白滑石（三分）　丁香　豆蔻（各半分）

右爲細末，每服一字至半錢，米飲調下，無時。

木瓜丸　止吐。

木瓜末　麝香　膩粉　木香末　檳榔末（各一字）

右同研，麵糊丸如小黃米大，每服一二丸，甘草水下，無時服。

香餌丸　治吐。

丁香　乾薑（各一兩）　半夏（湯浸七次切焙）　水銀（各半兩）

右上三味，同爲細末，將水銀與藥研勻，生薑汁丸麻子大，每服一二丸，煎金銀湯下，無時。

藿香散　治脾胃虛有熱，面赤，唇燥，涎嗽，及轉過度者。

麥門冬（去心焙乾秤）　半夏麴（炒）　甘草（炙）　石膏（各半兩）　藿香（一分用葉）

右同爲末，每服半錢至一錢，水一中盞，煎七分，食前溫。

辰砂丸　治驚風，涎盛，潮熱，及胃熱，吐逆不止。

辰砂（別研）　水銀（炒）　砂子（各一分）　牛黃　龍腦　麝香（別研各三錢）　生犀末　天麻　白僵蠶（酒炒）　蟬殼（去土）　乾蠍（去毒炒）　麻黃（去節秤）　天南星（湯浸七次切焙乾各一分）

右爲末，再研勻，熟蜜丸麻豆大，朱砂爲衣，每服一二丸，或五七丸，食後服，煎薄荷湯送下。

麻黃湯　治傷風，發熱，喘嗽，鼻急，若無汗者，宜服之。

麻黃（去節根寸剉二錢以水煮去沫沫出焙乾）　桂（去粗皮二錢不見火）　杏仁（泡去皮尖及雙仁者七箇麩炒黃色別研如膏）　甘草（炙一錢）

右爲粗末，入杏膏，拌勻，每服一錢，水六分，煎至四分，去滓，溫服，不計時候，以汗出爲度，量見大小加減。若有自汗者不宜服。

生黃膏　治熱及傷風，溫壯，疳疾，引飲。

雄黃研　甘草末　川甜硝（各一分）　寒水石（生一分煅研一作一兩）　鬱金末（一錢）　葉豆粉（半兩）　膽子（一錢）

右研爲末，用蜜和成膏，每服一錢，白湯化下。

木香丸

木香　青黛（別研）　檳榔　豆蔻（去皮各一分）　麝香（別研半錢）　縱隨子（去殼一兩）　蝦蟆（三箇燒存性）

右爲細末，蜜丸蓖豆大，每服三五丸，至一二十丸，薄荷湯下，食前服。

胡黃連丸

胡黃連　黃連（各半兩）　硃砂（別研一分）

右上，物爲細末，研，入硃砂末，都塡入豬膽內，用淡漿煮，以杖子于銚子上，用線釣之，勿著底，候一炊久，取出，研，入蘆荷麝香各一分，飯和丸如麻子大，每服五七丸，至一二十丸，米飲下，食後。（一作食前）又一方用蝦蟆半兩，不燒。

鬱香散

鬱香葉（柴者二錢燒灰）　銅青（半錢）　輕粉（一字）

右爲細末，令勻，看瘡大小，乾貼之。

白粉散

烏賊魚骨（末三七）　白芨末（二七）　輕粉（一七）

右爲細末，先用荷漿水洗，拭過，乾貼之，無時。

如聖丸　治冷熱疳瀉。

胡黃連　川黃連　白蘞（去皮炒各三兩一本作二兩）　使君子（二兩去皮殼取仁）　麝香（別研半錢）　乾蝦蟆（五個酒炙黃成膏）

右前藥爲末，與膏丸麻子大，每服人參湯下二三歲五七丸，十歲以上十九至十五丸，無時。

膽礬丸　治疳消瘦，進食止瀉，和胃進食。

綠礬二兩，須眞者，一鐵，研末。　膽礬少許，研末。　大黃四十兩，去核。　好醋一升，已上四物，同和後藥。　使君子二兩，去皮。　枳實三兩，麩炒。　黃連一兩。　訶黎勒去核取一兩，各爲末。　巴豆二十七箇，去皮膜之，已上五味，同炒令黑，約三分乾，入後藥。　夜明沙　蝦蟆灰存性，各一兩。　苦楝根皮末半兩，乾，同爲四物，杵羅爲末。

右同前膏和入臼中杵千下，如末成，旋入熟猪肉，亦不可多，恐服之難化，太稠，卽入溫水可丸，卽丸如菉豆大，每服二三十丸，米飲溫水下，不拘時。

青金丹

青黛研。　雄黃研。　胡黃連各半兩。　白附子炮，二錢。　水銀一錢，與鉛粉同研。　膩粉水飛同研。　蘆薈研。　蟾酥研，各一分。　麝香半分。　龍腦研。　硃砂研。　鉛粉研，一字。各

右爲細末，令勻，用熟過猪膽汁浸蒸餅和丸，如黃米大，退驚治風，化蟲殺疳，除百病，進乳食，治一切驚風，天弱目睛上視，手足搐搦，狀候多端，用藥一丸，溫水化，滴鼻中，令嚏頓，三五次，更用薄荷湯下二丸，卽愈。如久患五疳，腹脹頭大，四肢瘦小，好喫泥土，不思乳食，愛咬指甲，時摋眉毛，頭髮稀疎，肚上青筋，及又患瀉痢，並用米飲下二丸。如鼻下赤爛，口齒疳蝕，牙口疳等，用乳汁研二丸，塗在患處。疳眼雀目，白羊肝一枚，以竹刀子批開，入藥二丸在內，以麻線縛定，用淘米泔煮熟，空腹食之，仍令乳母常忌魚腥、大蒜、雞鴨、猪肉等。此藥若孩三二日一服，永無百疾，不染橫夭之疾。此古方也。錢氏獨廝香比此加倍。

止汗散

故蓆扇灰如無扇，用故蓆燒灰。

右研細，每服三錢，溫酒調下，無時。

香瓜丸

胡黃連　大黃瓜黃色者，一個。　川大黃逐紙裹，煨，埋紙裹。　柴胡去蘆。　鼈甲醋炙。　黃蘗酒去粗皮，炙。　黃連　蘆薈　槟榔　青橘皮各等分。

右除黃瓜外，同爲細末，將黃瓜割去頭，塡入諸藥，至滿，卻蓋口，用杖子插定，慢火內煨熟，將黃瓜及藥同用麪糊丸如菉豆大，每服二三丸，食後冷藥水或新水下，大者五七丸至十丸。

黃耆散　治虛熱盜汗。

牡蠣煅。　黃耆　生乾地黃焙，各等分。

右爲末，煎服，不拘時。

虎杖散　治實熱盜汗。

虎杖剉。

右水煎服，盜多少與之，無時。

郁李仁丸　治積滯小兒大小便不通，并驚熱痰實，欲得涌動者。

川大黃一兩，去粗皮，用實者，剉碎，酒浸半日，住乾，炒爲細末。　郁李仁一兩，去皮。　滑石十兩，細研。

右先將郁李仁研成膏，和大黃、滑石丸如黍米大，二歲服二三丸，更益大小與之，以乳汁或薄荷湯下，食前。

捻頭散　治小便不通。

瓜蔕胡索　川苦楝各等分。

右同爲細末，每服半錢，或一錢，捻頭湯調下，量多少與之，如無捻頭湯，卽湯中滴油數點，食前服。

生犀散　消壽氣，解內熱。

生犀凡藥物者，皆銼蓋，不堪用，須生者爲佳。

右一物不拘多少，于澄器物中，用新水磨濃汁，微溫，飲一茶脚許，乳食後，更益大小加減之。

三黃丸　治諸熱。

黃芩半兩。　大黃去皮，溫紙裹，煨。　黃連各一分。

右同爲細末，麪糊丸菉豆大，或麻子大，每服五七丸至十五二十丸，食後，米飲送下。

大黃圓

大黃　黃芩各一兩。

右爲末，煉蜜丸菉豆大，每服五丸至十丸，溫蜜水化下，量大小以意，無時服。

龍腦膏　治小兒伏熱在心，昏昏不省，或悞服熱藥，蓄熱，昏昧不知人，瘡疹倒壓黑陷。

生梅花腦子一字，或半字，研。

右取新殺猪心一個，取心中血同研，作大丸，用新汲水少許化下，未省，再服，如瘡疹陷伏者，溫酒化下，食後服。

梔豉飲子　治小兒蓄熱在中，身熱燥狂，昏迷不食。

大梔子仁七箇，劈破。　豆豉半兩。

右用水三盞，煎至二盞，看多少服之，無時，或吐，或不吐，立效。

白虎湯　解暑毒，煩躁，身熱，痰盛，頭痛，口燥，大渴。

知母一兩半，焙。　甘草半兩，剉，炒。　石膏四兩。　白粳米八錢。

右同爲粗末，每服三錢，水一盞，煎至八分，食後溫冷隨意服，氣虛人加人參少許同煎。

犀角圓　治小兒風熱痰實，面赤，大小便閉澀，三焦邪熱，驚悸煩躁，疎導極穩。

生犀角半分，一本作一分。　人參半兩，切。　黃連一兩。　槟榔半兩。　大黃二兩，酒浸，切片，以巴豆去皮一百箇，貼蒸，卻去巴豆不用。　枳實去穰，麸剉，一兩，或作半兩。

右爲細末，煉蜜和丸如麻子大，每服一二十丸，臨臥熱水下，未動，加數，亦治大人孕婦無損。

大黃丸　治風熱、蓄實、口中氣熱、大小便閉赤，飲水不止，有下證者，宜服之。

大黃（一兩，湯浸過，米下熟，切片，曬乾。）　川芎（半兩。）　甘草（一分，炙。）　黑牽牛（半兩，中生熟炒。）

右爲細末，稀糊和丸如麻子大，二歲，每服十丸，溫蜜水下，乳後服，以通利爲度，未利，加丸數，再服，益大小虛實用之。

導心湯　治小兒心氣實，則氣上下行澁，合臥，則氣不得通，故喜仰臥，則氣上下通。

黃連（一兩，去鬚。）

右爲末，每服一字，至半錢一錢，臨臥，溫水調下。

王海藏云，易老單導心湯加減法，出于此，乃實邪也，實則瀉其子，加黃芩爲二聖丸，加橘皮爲橘連丸，加檳仁爲檳仁丸，加黃芩大黃爲三黃丸，加阿膠茯苓爲阿膠丸，加阿膠當歸乾薑爲駐車丸，加木香白附子爲白附子香連丸，加胡子木香爲小香連丸，加荳蔻木香爲豆蔻香連丸。

導赤散　治小兒心熱，觀其睡，口中氣溫，或合面睡，及上齒咬牙，皆心熱也，心氣熱，則心胸亦熱，欲言不能，而有就冷之意，故合面臥。

生乾地黃（焙，秤。）　木通　甘草（炙，各等分。）

右同爲末，每服三錢，水一盞，入竹葉同煎至五分，食後溫服，一本，不用甘草，用黃芩。

桃枝圓　疎取積熱及結胸（又名桃枝丸。）

巴豆霜　川大黃（去皮。）　黃蘗末（各一字，分。）　輕粉　硇砂（各半錢。）

右爲細末，糊和丸粟米大，煎桃枝湯一晬兒五七丸，五七歲二三十丸，桃符湯亦得，末晬二三丸，臨臥服。

白餅子（又名玉餅子。）

沈石　輕粉　半夏（湯浸七次，切，焙，秤。）　天南星（各二錢，爲末。）　巴豆（二十四箇，去皮膜，水一升，煮，水盡爲度，一作水三升。）

右研勻，巴豆，後入餘藥，以糯米飯爲丸，小菉豆大，捻作餅子，三歲以上三五餅子，以下一二餅子，煎葱白湯下，臨臥。

紫霜丸

代赭石（二錢，研細，水飛，一本作一錢。）　巴豆（二十一箇，去油心皮膜。）　杏仁（二十一箇，去皮尖。）

右爲細末，飯丸如粟米大，每服三五丸，至十丸，煎皂角仁湯下，無時，海藏云，五色加減，並見活法。

珍珠丸　取小兒虛積，一切聚積驚涎，宿食，乳癖，治大小便澁滯，療腹脹行滯氣。

巴豆仁（十四箇，水浸一宿，研，篩細。）　木香　白丁香（直者。）　丁香末（各半錢。）　白滑石末（二錢。）　輕粉（半錢，留少許爲衣。）

右爲末，研勻，溫紙裹，燒粟米飯丸麻子大，一歲一丸，八九歲以上，至十五歲，服八丸，炮皂子煎湯，放冷下，挾風熱雜動者，先服涼藥一服，乳癖者，減丸數，隔日臨臥一服。

消壓丸　消乳癖，及下痰涎，又治痰熱脈實，取積。

硇砂（二錢。）　水銀砂子（一兩，研。）　黃明膠末（五錢。）　巴豆霜　輕粉（各一錢。）　古墨（少許。）

右同研細末，少入糊糊爲丸如麻子大，倒流水下，一歲兒服一丸，食後服。

輕粉丸　治涎潮盛搐，吐逆。

水銀砂子（一錢。）　硃砂（一分。）　天南星（一分，炮，去皮，取末。）　輕粉（二錢。）　鐵粉（一分。）

右同研，水銀星蕊爲度，薑汁糊和爲丸粟米大，煎生薑湯下，十九至十五九，二三十九，無時。

麝煎丸　治驚風，涎熱，潮搐。

龍腦（一字。）　大乾燥（炭炮，作燒炭，秤，二錢。）　輕粉（三錢。）　硃砂末（二錢。）　雄黃末　蛇黃（淬，取末。）　青礞石末（各三錢。）　麝香（一錢，研。）

右研勻，水浸蒸餅爲丸，如桐子大，硃砂爲衣，薄荷水化下，半丸至一丸，無時。

安蟲散

胡粉（炒黃。）　槟榔　川楝子（去皮核，研。）　鶴蝨（炒黃，各二兩。）　白礬（一分，燒令白，上點，研。）

右爲細末，每服一字，大者半錢，溫米飲調下，痛時宜服。

五色丸

硃砂（半兩，研。）　水銀（一分，作二兩。）　雄黃（一兩，作三兩。）　眞珠末（一兩，研。）　鉛（三兩，同水銀點。）

右煉鉛丸麻子大，每服三四丸，煎金銀花薄荷湯下。

鉤藤飲子　治吐涎，脾胃氣熱，虛風慢驚。

鉤藤（三分。）　蟬殼　防風（去蘆頭，切，焙。）　人參（切，去蘆頭，焙。）　麻黃（去節。）　白僵蠶（炒黃色。）　天麻　蝎尾（各半兩，去毒，炒。）　甘草（炙。）　川芎（各一分。）　藿香（一錢，別研。）

右同爲細末，每服二錢，水一盞，煎至六分，溫服，益多少與之，寒多者，加附子半錢，無時。

豆蔻散　治小兒慢驚，多用性太溫及熱藥治之，有驚未退而別生熱證，有病愈而致熱證者，有反爲急驚者，甚多，當問病者幾日，因何得之，曾以何藥療之，可用解毒之藥，無不效，宜此方。

大黃豆卷（水浸黑豆生芽，是也，曬乾。）　貫衆　板藍根　甘草（各一兩，炙。）

右四味，同爲細末，每服半錢，水煎，去滓服，甚者三錢，漿水內入油數點，煎，又治吐蟲，服無時。

龍腦散

大黃（剉。）　半夏（湯洗，薄切，用薑汁浸一日，焙乾，炒。）　甘草（炙。）　金星石　寒水石　馬餘糧　不灰木　青蛤粉（各半兩。）　銀星石（四味，分，爲末，篩。）

右同爲細末，研入龍腦一字，再研勻，新水調一字，至半錢，益兒大小與之，通解諸毒，本舊方也，仲陽添甘松三兩，枚，藿香葉末一錢，金芽石一分。

固生散　治小兒吐瀉，或誤服冷藥，脾虛生風，成慢驚。

大天南星（重八九錢以上者，良。）

右用地坑子一箇，深三寸許，用炭火五斤，燒通赤，入好酒半盞在內，然後入天南星，卻用炭火三兩

條蓋卻坑子候天南星微裂取出挫碎再炒用熟不可糊生放冷爲細末每服半錢或一字最兒大小濃煎生薑防風湯調下無時

梓朴散

梓州厚朴細剉一兩　半夏一錢湯洗七次薑汁浸半日剉乾

右用米泔三升同浸一百刻水盡爲度如百刻水未盡少加火熬乾去厚朴只將半夏碾爲細末每服半錢或一字薄荷湯調下無時

羌活膏　治脾胃虛肝氣盛生風或取轉過或吐瀉後爲慢驚者亦治寒傷無不效

羌活去蘆頭　川芎　人參切去蘆頭尖　白附子炮　赤茯苓去皮各半兩　天麻　白僵蠶酒浸炒黃　乾蠍去毒炒　白花蛇酒浸去肉焙乾各一兩　川附子炮去皮臍　防風去蘆頭切焙　麻黃去根節各二錢本作各三錢　肉豆蔻　鷄頭香母丁香也　藿香葉　沉香　木香各二錢　輕粉一字　真珠末　牛黃各一錢半　龍腦半字　麝香一錢七一錢本作一錢　雄黃　辰砂各一分以上七味各研別入

右爲細末煉蜜丸大豆大每服一二丸食前薄荷湯或麥門冬湯化下實熱急驚勿服性溫故也服無時　古今論鷄舌香者同異紛紛或以爲番棗核或以爲母丁香互相排抵竟無定說李忠以爲最爲易辨所以久無定說者惑于其名耳古人命藥多以其形似者名之如烏頭狗脊鷄頭之類是也番棗核母丁香本二物以其皆似鷄舌故名適同凡藥物名同實異如金櫻地錦之類不足怪也如鷄舌二種各有主療番棗核者得于乳香中今治傷折藥多用之母丁香即丁香之老者極芳烈古人含鷄舌香乃此類也今治氣溫中藥多用之所謂最易辨者如此

溫白丸　治小兒脾氣虛困洩瀉瘦弱冷疳洞痢及因吐瀉或久病或慢驚身冷病

天麻生半兩　白僵蠶炮　白附子生　乾蠍去毒　天南星剉浸七次各一分

右同爲末湯浸寒食麪爲丸如菉豆大丸了仍于寒食麪糞七日取出末及糞七日合成便服之每服五七丸至二三十丸空心煎生薑米飲下漸加丸數多與服之

龜蘇湯　治慢驚

蓽澄根末二錢　白甘遂末一錢

右同于慢火上炒焦黃研勻每服一字煎麝香薄荷湯調下無時

小煙煙丸　解諸毒治急驚風癇潮熱及諸疾虛煩藥毒上攻躁渴

膩日取東行母猪蓽燒灰存性半兩研　辰砂水研飛半兩　蛇黃四山者燒赤醋淬中兩五錢水研飛乾用　麝香　龍腦各二錢　牛黃一錢各研

右以東流水作麪糊丸桐子大用硃砂爲衣二三歲每服二丸鎔匙研破溫水化下小兒初生便宜服一丸除胎中百疾食後服

金箔丸　治急驚涎盛

牛黃　龍腦　麝香各半　雄黃　辰砂各一分　生犀末中分以上六味同研　天南星剉炒　白附子炮

防風去蘆頭切焙　半夏湯浸七次切焙各半兩　金箔二十片

右爲細末薑汁麪糊丸麻子大每服三五丸至一二十丸人參湯下如治慢驚去龍腦服無時

蟬花散　治驚風夜啼咬牙嗽啾及痰咽喉壅痛

蟬花炒　白僵蠶直者酒炒熱　甘草炙一分　延胡索半分

右爲末一歲一字四五歲半錢蟬殼湯調下食後服

安神丸

麥門冬去心焙　馬牙硝　白茯苓　乾山藥　寒水石研　甘草各半兩　硃砂研一兩　龍腦研一字

右爲末煉蜜丸雞頭大每服半丸沙糖水調下無時

天南星散　治鱗開不合鼻塞不通

天南星大者煨焙去皮

右爲細末淡醋調塗鱗帛上貼頭上火炙手熨之立效

瀉白散又名桑白皮散

桑白皮紙剉炒黃　地骨皮洗去土焙各一兩　甘草炙半兩

右件爲末每服一二錢水一中盞入粳米百粒同煎至六分食後溫服自汗用此以直瀉之梔子黃芩亦能瀉肺當以氣血分之

金黃散又名補肺散

陳橘皮一兩　青橘皮　訶子肉　甘草切炒各半兩　丁香二錢

右爲細末每服二錢水一盞煎六分食前溫服又有食後

瀉黃散又名瀉肺散

藿香葉七錢　山梔子仁一兩　石膏半兩　甘草三兩一作三分　防風四兩切去蘆焙

右剉同蜜酒微炒香爲細末每服一錢至二錢水一盞同煎至五分溫服清汁無時南方多以寒水石爲石膏以石膏爲寒水石正與京師相反乃大誤也蓋石膏潔白堅硬有牆壁而寒水石則軟爛以手可碎外惟青黑中有細紋方膏中寒水石則火煅用之石膏則堅硬不可入火如白虎湯用石膏則能解凡熱破痰治頭痛若用寒水石則誤矣又有一等堅白金類石膏而方敵之亦皆成方者名方解石也可代石膏用之南人有不信此說者李忠嘗相與同就京師大藥肆中買石膏寒水石方解石三種又同詣惠民和劑局及訪諸國醫詢之皆合此說乃信服李忠頃編保生信效方已爲辯論恐小兒尤不可悞故復見于此

白朮散

人參切去蘆頭　白朮　木香　白茯苓去皮　甘草炙剉　藿香葉各一兩　乾葛二兩

右爲粗末，每服一錢至二錢，水一盞，煎至五分，溫服。如飲水者，多煎服之。無時。王海藏云：四君子湯加減法，治溫勝氣脫，泄痢太過，與和中散同。

瀉青丸（又名肝丸，瀉）

當歸（去蘆頭，切，焙，秤）　龍腦（研，秤）　川芎　山梔子仁　川大黃（濃煎汁，一煮大黃）　羌活　防風（去蘆頭，切，焙，各等分）

右爲末，煉蜜和丸雞頭大。每服半丸至一丸，煎竹葉湯，同沙糖溫水化下。王海藏痘疹改誤云：東垣先生治痘後風熱毒翳膜氣盛遮睛，以此劑瀉之，大效。初覺易治，補肝丸、防風六合湯、四物湯內加防風、羌活等分，細末，煉蜜爲丸，是也。鎮肝丸、瀉青丸去梔子、大黃，治肝虛。

生犀散

生犀（剉，收末）二錢　地骨皮（自採者佳）　赤芍藥　柴胡　乾葛（剉）各一兩　甘草（炙）一兩

右爲粗末，每服一二錢，水一盞，煎至七分，食後溫服。

秦艽散　治潮熱，減食，蒸瘦。

秦艽（去蘆頭，切，焙）　甘草（炙）一兩，各　乾薄荷葉（半兩，切，焙）

右爲粗末，每一服二錢，水一盞，煎八分，食後溫服。

地骨皮散　治虛熱潮作，亦治傷寒壯熱餘熱。

知母　柴胡　甘草　人參（切，去蘆，焙）　地骨皮（自採者佳）　赤茯苓　半夏（湯洗七次，切，各等分）

右爲細末，每服二錢，蜜五片，水一盞，煎八分，食後溫服，並大小加減。

牛黃膏　治驚熱及傷風溫壯，疳熱引飲。

雄黃（研）　甘草（末）　川甜硝（各一分）　寒水石（生，搗，研）一兩　鬱金（末）　牆子（各一錢）　菉豆粉（半兩）

右研勻，煉蜜和成膏，薄荷水化下半皂子大，食後服。

牛黃丸

雄黃（研，水飛）　天竺黃（各二錢）　牽牛末（一錢）

右同再研，麵糊爲丸，如粟米大，每服三丸至五丸，食後，溫荷水下。愛治疳滯積，常服尤佳，大者加數丸。

樂液丸　治驚熱腦實，嘔吐，上盛涎熱。

天南星（二錢，炮）　白附子（一錢半，炮）　牆牆（中錢，一本作半兩）　蠍尾（二十一枚，去毒）　輕粉（一錢）　水銀（半錢）

右同研勻，石膏油丸如菉豆大，每服二三丸，乳香湯下，大者稍加之，無時。

鎮心丸　涼心經，治驚熱痰盛。

甜硝（白者）　人參（切，去蘆，末）　甘草（炙，取末）　寒水石（燒，研）各一兩　乾山藥（白者）　白茯苓（各二兩）　硃砂（研）一兩　龍腦（研，水飛）　麝香（各一錢，三味共研細）

右爲末，熟蜜丸雞頭大，如要紅，入坯子胭脂二錢，即染胭脂是也。溫水化下半丸至一二丸，食後。

軟金丹　治驚熱、痰盛、嗽、腦實。

天竺黃　輕粉（各一兩，一本作二兩）　青黛（一分）　半夏（三分，用生薑三分，半，鍋，同煙乾，再爲細末）　黑牽牛（三分，取末）

右同研勻，熟蜜劑爲膏，薄荷水化下半皂子大至一皂子大，量度多少用之，食後。

鈎藤膏　治小兒腹中癖塊，乾嗜後便，名盤腸內沼，方名木香膏。（鄭剛友金匱方中無乳香、沒藥、木香、木鼈子仁、黃連，名木香膏。）

好乳香（水中研細，秤）　沒藥（研）　木香　黃連（各四錢）　木鼈子仁（二十個，去外皮，一本作十二個）

右先將後三味同爲細末，次研入上二味，煉蜜和成劑，收之。每一歲兒可服半皂子大，餘以意加減。煎鈎藤湯化下，無時，次用魏香散。

魏香散

蓬莪蓯（中兩）　真阿魏（一錢）

右先用溫水化阿魏，浸蓬莪蓯一晝夜，焙乾爲細末，每服一字或半錢，煎紫蘇米飲，空心調下。

涼驚丸

硃砂（研）　粉霜（研）　郁李仁（去皮，焙乾爲末）　輕粉　鐵粉（研）　白牽牛末（各一錢）　好腦茶（三錢）

右同爲細末，熟梨爲膏，丸菉豆大，龍腦水化下一丸至三丸，亦名梨汁餅子，及治大人風涎，並食後。

翻刀殷丸　治小兒一切驚風，久經宣利，虛而生驚者。

硃砂　天竺黃（研）　白僵蠶（去頭足，炒）　全蝎（去毒，炒）　乾蟾（去四足并腦，洗，去黃膏，焙末用）　蟬殼（去頭足，一作去蛻）　五種脂（各一分）　牛黃　腦子（各一字）　麝香（中錢）　地黃（中兩，燒赤，醋淬三五遍，水研爛）

右爲末，共二兩四錢，東流水黃白麪和丸，桐子大，每服一丸，翻刀殷頭研破，食後薄荷湯下，如慢驚，即去龍腦。

烏藥散　治乳母冷熱不和，及心腹時痛，或水瀉，或乳汁不好。

香附子（略用白者）　高良薑　赤芍藥　天台烏藥（各等分）

右爲末，每服一錢，水一盞，同煎六分，溫服。如心腹痛，入酒煎；水瀉，米飲調下，無時。

紫草散　發癍疹。

鈎藤鈎子　紫草茸（各等分）

右爲細末，每服一字或半錢，一錢，溫酒調下，無時。

紫草散　治發癍辛亥樓隱孫先生出麻疹，又發痘瘡，瘡黑陷，亢拱辰出此方，亢云：錢氏方。紫草散，有枳殼難服。

紫草　甘草　糯米（亢云：幽味佳，好助胃氣）　黃芪（各等分）

右爲末，水煎服。

蟬蛻散　治瘡瘡入眼，半年以後者，一月取效。

猪腦滯甲（二兩，入罐子內，鹽泥固濟，煅存性）　蟬蛻（去土，用末一兩）

右二味，研入羚羊角細末一分，拌勻，每服一字，百日外兒半錢，三歲以上一二錢，溫水或新水調下。日三四，夜一二，食後服。一年以外難治，李忠頃守宣江南，每覓羚羊角，取得山羊角正如石膏寒水石之相易也。羚羊角纖細，面紋極密，京師儀場人多用以爲場衒，是也。山羊角粗長，及面紋稀，當是京師用爲正。

三聖丸　化痰涎，寬腸，消乳癖，化蠱風，食癖諸疳。小兒一歲以內常服，極妙。次有三名，小青丸、小紅丸、小黃丸，並爲三聖丸。

小青丸

青黛（一分）　牽牛末（三分）　膩粉（二錢）

右並研勻，麵糊爲丸，黍米大。

小紅丸

天南星末（一兩，三分）　硃砂（半兩，研）　巴豆（二錢，取霜）

右研勻，蜜汁麵糊丸黍米大，一本天南星一兩生。

小黃丸

生半夏末（一分）　巴豆霜（半）　黃蘗末（半錢）

右研勻，蜜汁糊丸黍米大，百日以上者各一丸，一歲者各二丸，隨乳下之。

褊銀丸　治風涎腸實，上熱及乳食不消，腹脹嗜粗等。

巴豆（半兩，去皮油，研細）　古墨（八錢，火燒，醋淬研）　水銀（半兩）　黑鉛（二錢半，同水銀結砂子）　麝香（半錢，別研）

右將巴豆末并墨再研勻，和入砂子，麝香，陳米粥和丸如菉豆大，捻褊，一歲一丸，二三歲二三丸，五歲以上五六丸，煎薄荷湯放冷送下，不得化破，更量虛實增減，並食後服。

百部丸　治小兒肺寒痰嗽，微喘。

百部（炒乾）　麻黃（去節，先作末，各三分）　杏仁（四十箇，去皮尖，並炒）

右和勻，熟蜜丸皂子大，溫水下二三丸，無時，日三四服。此方，仲陽加松子仁五十箇，糖丸之，含化，大妙。

銀砂丸　治涎盛，腸熱實，痰嗽，蠱風，積，潮熱。

水銀（結砂子，三皂子大）　辰砂（研，二錢）　蝦蟆（去腸，爲末）　硼砂（研）　郁李仁（去皮，煙，爲末）　粉霜（研）　白丞牛末　輕粉（各一錢）　鐵粉　好雄黃（各一錢）

右同爲細末，熟梨汁爲膏，丸如菉豆大，龍腦水化下一丸，至三丸，亦名梨汁餅子，及治大人風涎，並食後服。

溫中丸　治小兒胃寒瀉白，腹痛，腸鳴，吐酸水，不思食，霍亂吐瀉諸疾。

人參（去蘆）　甘草（炙）　白朮（各一兩）

右濃汁麵糊丸如菉豆大，米飲下一二十丸，不拘時服。

二氣散　治虛實冷熱，霍亂吐逆。

硫黃（不夾石者，半兩，研細）　水銀（一分，與黃再研）

右同研，如黑煤色，不見星，每服一字，至半錢，用生薑水調下，不以時候，益兒大小加減，此散浮泛難沈，先滴少水，以指緩緩研之，稍稍增湯，使調之，及治大人小兒一切吐逆，諸藥不效者。

白附子香連丸　治腸胃氣虛，暴傷乳哺，冷熱相雜，瀉痢赤白，羸急後重，腹痛拗撮，晝夜頻併，乳食減少

黃連（炒）　木香（各一分）　白附子（尖，二錢）

右爲末，粟米飯丸菉豆大，或黍米大，每服十丸，至二三十丸，食前濃米飲下，日夜各四五服。

荳蔻香連丸　治濕瀉，不拘寒熱，赤白陰陽不調，腹痛腸鳴，立效如神。

黃連（三分，炒）　肉荳蔻　南木香（各一分）

右爲細末，粟米飯丸米粒大，每服米飲下十丸，至三二十丸，日夜各四五服，食前。

小香連丸　治冷熱腹痛，水穀利，滑脫。

木香　訶子肉（各一錢）　黃連（半兩，炒）

右爲細末，飯和丸菉豆大，米飲下十丸至三五十丸，頻服之，食前。

大胡連丸　治一切驚疳，腹脹，蟲動，好喫泥土生米，不思飲食，多睡，吼喉，腫脹或秘或瀉，肌膚黃瘦，毛焦發黃，飲水，五心煩熱，能殺蟲消脹，進飲食，發治疳癖，常服不瀉痢。

胡黃連　黃連　苦楝子（各一兩）　白蘞（去皮，半兩）　蝕（別研，半錢）　蘆荟（別研，一分）　乾蟾頭（燒存性，別研，一分）　麝香（別研，一錢）　青黛（一兩）

右先將前四味爲細末，猪膽汁和爲劑，每一胡桃大，入巴豆仁一枚，置其中，用油單一重裹之，同米一升許，蒸米熟爲度，入後四味爲丸，少入麵糊丸。

麝香丸　治小兒一切驚疳等病。

草龍膽　胡黃連（各一錢，並各自研）　木香　蟬殼（去頭足，洗，各一錢，爲末，乾，又一本作去殼，各一分）　瓜蔕　龍腦　麝香　牛黃

右藥爲細末，和猪膽汁，丸桐子及菉豆大，驚疳，臟腑，或秘或瀉，清米飲或溫水下，小丸五七粒，至一二十粒，疳眼，猪肝湯下，疳渴，猪湯下，猪肉湯下亦得，驚風，發搐，眼上，薄荷湯下一丸，更水研一丸，滴鼻中，牙疳，口瘡，研貼，蟲痛，苦楝根或白蘞，蕎湯送下，百日內小兒，大小便不通，水研，封臍中，有蟲，加乾漆，好麝香，各少許，并入生油一兩點，溫水化下一大丸，病急，則研碎，緩則浸化，小兒虛極，慢驚者，勿服，尤治急驚痰熱，此方內一本，瓜蔕用二十一箇爲末，更用蘆荟，去沙、秤，熊膽、青黛，各一分、輕粉一錢。

大惺惺丸　治驚疳百病及諸壞病不可具述

辰砂（研）　青礞石　金牙石（各一錢半）　雄黃（一錢）　蟾灰（二錢）　牛黃　龍腦（各一字別研）　麝香（少許別研）　蛇黃（三錢醋淬五次）

右研勻細末水煮蒸餅爲丸砂爲衣如菉豆大百日兒每服一丸一歲兒二丸薄荷湯化下食後

獨活飲子　治腎疳臭息候良方

天麻　木香　獨活　防風（各一錢）　麝香（少許研細和入）

右每服一錢匕小者半錢麥門冬熟水調下

三黃散　治腎疳崩砂候良方

牛黃　大黃　生地黃　木香　青黛（各等分爲末）

右每服一錢匕熟水調服

人參散　治腎消槽候良方

肉荳蔻（煨）　胡黃連　人參　杏仁（炒）　甘草（炙各等分爲末）

右每服一錢匕小者半錢溫熟水調服

檳榔散　治腎疳宣露候良方

木香　檳榔　人參　黃連　甘草（炙各等分爲末）

右每服一錢小者半錢熟水調服

黃蓯散　治腎疳腐根候良方

黃蓯（蜜炙）　牛黃　人參　天麻　蠍（去毒）　杏仁（炒）　白茯苓　川芎藭　生地黃（洗）　熟乾地黃（各等分爲末）

右每服小者半匕煎天門冬熟水調服麥門冬亦得

地骨皮散　治腎疳齦齲牙齒肉爛腐臭鮮血常出良方

生乾地黃（半兩）　真地骨皮　細辛（各一分）　五倍子（炒令黃二錢）

右爲末每用少許傅之頻與功效多不妨　醫曰本經所載疳證有五謂五臟所受故得其名今遂腎疳一臟有五證候者最爲要急不可同常此疾具陳有五種候傳迅疾可畏乃知走馬之號不誣初發之時兒孩口臭上干胃口氣息臭穢漸進損筋齦肉生瘡或腫或爛其齒焦黑又進從牙槽內發作瘡疱破潰臭爛又進熱逼入腦常血出其熱注久牙齦腐壞槽寬齒脫六七歲孩落盡不復更生豈可治療今以妙方宜速與隨其傳變而理不待疾作而後療也

龍骨散　治疳口瘡走馬疳

砒霜（一字）　粉霜（半錢）　龍骨（一錢）　定粉（一錢半）　龍腦（半字）　蟾酥（一字）

右先研砒粉極細次入龍骨再研次入定粉等同研每用少許傅之

麝香散　治小兒走馬疳牙齒消爛以至崩砂出血齒落者

輕粉　麝香（末各一錢）　蜜陀僧（半兩醋煅爲末）

右研如粉傅齒及齦上立效　醫曰嬰孩受病證候多疳良由氣鬱三焦疳分五臟內有腎經常虛得疳名之曰急以走馬爲喻治療難難此等證初作口氣名曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則齦爛名曰消槽又盛血出名曰宣露重則齒自脫落名曰腐根其根既腐何由理之嗟乎豪家育子鋪以甘肥腎堂受之虛熱或因母在難月恣食厚味令兒所招俱非偶然而作今將秘方述于後

傅齒立效散

鵝糞（一錢燒上紅研）　麝香（少許）

右研勻每以少許傅牙齒齦上又一方用蟾酥一字加麝香和勻傅之　醫曰血之流行者榮也氣之循環者衛也變蒸足後飲食之間深恐有傷于榮衛而作衆疾其或氣傷于毒血傷于熱熱毒攻之虛臟所受何臟爲虛蓋小兒腎之一臟常主虛不可令受熱毒攻及腎臟傷乎筋骨惟齒受骨之餘氣故先作疾名曰走馬非徐徐而作所宜服藥甘露飲地黃膏化毒丹消毒飲其外證以前件立效散及麝酥膏傅之切忌與食熱毒之物此疳不同常證醫宜深究保全爲上若用常方難于痊愈

胡黃連麝香丸　治疳氣羸瘦白蟲作

胡黃連　白蘞（去蘆）　黃連（各一兩半）　黃連（各中）　木香（各半兩）　辰砂（一分別研）　麝香（一錢別研）

右爲細末糊丸菉豆大米飲下五七丸至十九三五歲以上者可十五丸二十丸無時

犬蓯蓉丸　治疳殺蟲和胃止瀉

胡黃連　黃連　白蘞（去蘆）　蓯蓉　木香　青橘皮　雷丸（破用白者化赤者殺人勿用）　鶴蝨（微炒各半兩）　麝香（別研二錢）

右爲細末粟米飯丸菉豆大米飲下一二十丸無時候服神效忌一切甜物

檳仁丸　治疳熱瘦悴有蟲久服充肥

檳仁（去殼）　黃連（去鬚各一兩）

右爲細末用猪膽七箇破開取汁與二藥同和入椀內甑上蒸九日每日一次候日數足研麝香半錢湯浸宿蒸餅同和成劑丸如菉豆大每服五七丸至一二十丸米飲下無時

橘連丸　治疳瘦久服消食利氣長肌肉

陳橘皮（一兩）　黃連（一兩半去鬚米泔浸一日）

右爲細末別研入麝香半錢用猪膽七箇分藥入膽內漿水煮候隨熟以針微刺破以熟爲度取出以粟米粥和菉豆大每服十丸至二三十丸米飲下量大小與之無時

龍粉丸　治疳渴

草龍膽　定粉（微炒）　烏梅肉（焙）　黃連（各二分）

右爲細末，煉蜜丸麻子大，米飲下一二十丸，無時。

二聖丸　治小兒疳，臟腑或好或瀉，久不愈，羸瘦成疳，宜常服。

川黃連（去鬚，一兩）　黃蘗（去粗皮，一兩）

右爲細末，糊藥末入猪膽內，湯裹熟，丸如菉豆大，每服二三十丸，飯飲下，量大小加減，與服無時。

沒石子丸　治小兒泄瀉白濁，及疳痢滑，肛門痛。

木香　黃連（各二錢半）　沒石子（一兩）　荳蔻仁（二兩）　訶子肉（三兩）

右爲細末，飯和丸如麻子大，米飲下十五丸，量大小加減服之。

金華散　治小兒一切濕疳癬疳。

黃蘗（黃連各半兩，爲細末）　黃丹（一兩，水飛）　輕粉（一錢）　麝香（一字，別研）

右同研勻，先以溫水洗，後貼之。

蚵蛾丸　治小兒五疳八痢，乳食不節，寒溫調適乖違，毛髮焦黃，皮膚枯悴，脚細肚大，顏解胸陷，漸覺尪羸，時發寒熱，盜汗嗽嗽，腦後核起，腹內塊生，小便淋濁，臟痢滑澁，揭眉咬指，喫土甘酸，吐食不化，頰渴併頻，心神昏昏，鼻赤唇燥，小蟲既出，蝕齒咬心，疳眼雀目，名曰丁癸，此藥效驗如神。

蚵蛾（酒浸去骨，焙）　白蘞（去皮）　黃連（去鬚）　胡黃連（各一兩半）　青黛（半兩，爲衣）

右件，研爲細末，猪膽汁麪和丸如粟米大，每服三十丸，用飯飲呑下，食後隔臥，日進三服。

白玉散

白玉（一分）　寒水石（半兩）

右爲末，用米醋或新水調塗。

顱顖經

撰人不詳

宋闕名撰

顱顖經

脉法

凡孩子三歲已下呼爲純陽元氣未散若有脉候卽須於一寸取之不得同大人分寸其脉候來來呼之脉來三至吸之脉來三至呼吸定息一至此爲無患矣所言定息呼氣未出吸氣未入定息之中又至此是平和也若以大人脉五至取之卽差矣如此七至已上卽爲有氣或脉如弓之張弦此爲有氣並可依後方合藥治之或七至已下此爲冷候亦宜依後方合藥療之或診候取平或忽而不見沉浮不定伏釜根平者此爲神鬼之病且合求果續宜使藥或桃柳枝湯浴煎飲子爲使一兩顆桃心

病證

初生小兒鵝口撒嚥並是出胎客風著顱髓致有此可以小艾三壯及烙之爲

初生小兒至夜啼者是有瘀血腹痛夜乘陰而痛則啼

初生小兒一月內乳痢如膠是母寒氣傷胃所致也

初生小兒一月內乳痢如血是母胃有滯熱所作也

初生小兒一月內兩眼赤者亦在胎之時母喫炙煿熱麵瘀滯氣入胎中熏兒腦所致也

小兒臍熱皆因從氣實而搏胃氣然若下之平氣卽盡氣虛則生黃而變癎

小兒黃癎一從虛邪客熱相搏而生其後當用補養安和卽愈加以性冷及太過卽死

小兒嘔逆吐皆胃氣虛逆氣客於藏氣而作當和胃養氣至下如冷卽極小兒猥亂吐逆皆胃氣上下交爭而作當用分和補藥調養卽愈餘皆死小兒客忤無辜皆因客入所觸及變蒸屋月小兒嫩弱所以此候多惡

小兒一眼青揉搽是肝疳二齒焦是骨疳三肉色鼻中乾是脾疳四皮乾肉裂是筋疳五髮焦黃是血疳六舌上生瘡是心疳七愛喫泥土是脾疳孩子肌骨肥實皮膚白無故煩渴此是小時妳猛衝損肺但依後方內用甘草人參合飲之若氣急甚胷脹起鼻連眼下臉青色呻吟之聲者此必死之兆不得與藥

孩子利如泔醬者難效利如鵝鴨血者脾已爛損不宜與藥

孩子凡有黃色疾苦但眼臉下垂率必定死矣

孩子癎皆難效或發無時卽口噤咬牙作聲此必死矣呼爲遙疳疳癎亦名爲鎖腸疳

孩子渴喫乳食夜啼作聲此卽是腹肚痛

孩子無故搖頭此是惱頂痛

孩子喫乳食皆出此是脾冷

孩子無故肚大頂綱四肢消瘦筋脉骨節起自是小來少乳喝食與喫早成骨熱疳勞先宜與保童丸喫續與柴胡鱉甲飲（保童丸方見一切疳門中柴胡飲子方見行遲門中）

孩兒頭面胷脇肌厚臂脛細瘦行走遲者是小持也損

孩子鼻流清涕或鼻下赤痒此是惱中鼻中疳極宜用後方青黛散吹鼻兼傅下赤爛處（方見疳疾吹鼻門中）

已前並診候孩子疾狀孩子氣脉未調藏府胞薄腠理開疎看脉以時依方用藥

孩子或夏中熱時因乳母沐浴多使冷水妳得冷氣血脉皆伏見孩兒氣未定便與妳使孩子多胃毒及赤白兩般惡痢此乃是妳母之過凡浴後令定息良久候氣定揉與之卽令無患

師巫燒鈴乳母須預祝之勿令著水喫兒皆令蒸熟入心轉成患害切細慎之

凡孩子自生但任陰陽推移卽每六十日一度變蒸此骨節長來四肢發熱或不下食乳遇如此之時上唇有珠子如粟粒大此呼爲變蒸珠子依後方退熱飲子療之不宜別與方藥（幼幼新書註云顱顖以下以三十二日爲一變取者不同故城存之六十日爲一變是氏病源）

藥方

牛黃鐵焰粉各等分 龍齒 馬牙硝

右爲細末鍼蜜丸如梧桐子大每日乳食前熱水調破一丸灌下令母忌口

又牛黃丸　治孩子驚熱入心，擬成癎疾，面色不定，嗜哭不出，潮熱無度，不吃乳食，大段眼翻露白，手足逆冷，呼喚不應。

牛黃研　大黃　獨活各一分　琥珀研別研　大麻二兩研各

升麻

右爲末，蜜丸如梧桐子大，空心熱水下一丸，頓服之，食後再服一丸至十，於閑各金銀箔各五片，忌藥毒物。

虎睛丸　治孩兒風癎，驚嗜不吃乳。

虎睛一隻　犀角　子芩各等分

梔子仁　大黃各十分

右五味爲細末，鍊蜜丸如梧桐子大，驚嗜不吃妳，乳汁下七丸，風癎，米飲下五丸至七丸，小兒減丸數。取利爲度，忌毒物，若有虛熱，加知母六分。

又虎睛丸　治小兒孩子二十四種驚癎，壯熱，抽搐，翻手，嘔吐，夜啼，眼翻。

虎睛二隻，童便浸一對，童便　梔子仁

牛黃少許，童便一兩，童便　大黃各四分

人參一分，童便一兩，童便　鈎藤四分

蛇退七寸，燒灰，童便浸用一分

右爲末，蜜丸如黍米大，空心熱水下，隨年丸輕者一服，重者三服，妳汁下亦得，童便熱水下，忌藥時一切生冷油膩毒物。

銅棋方　治孩子驚癎不知，迷悶，喝舌，仰目。

牛黃一大豆　茯苓各二分

右爲細末，研和蜜水服之。

二十味虎睛丸　治孩子從一歲至大，癲發無時，口出白沫，小便淋漓不和。

虎睛一隻，生眼作鏡，乾酒浸令黃色　眞珠　蜂房各三錢

麻黃去節二分　鈎藤三分　鐵精

防葵　大黃　子芩

龍齒　銀肖　梔子仁

羌活各四分　柴胡　升麻

白鮮皮　雷丸燒令赤　人參各二分

細辛一分　蛇皮五寸　石膏五分

蛙蟬四枚，去足翼

右爲末，蜜丸如赤豆大，四五歲五丸，日再服，大兒十丸，粥煎米飲下，忌生冷油膩。

疳痢證治

保童丸　治小兒孩子諸色疳候，或腹內虛脹，羸瘦，頭髮立，常咬手指，脊疳，脊勞，臂脛細弱，仍立不得，及鼻下常赤，清涕涎流不止，舌上生瘡，腦疳，口疳，腹上筋脈。

虎睛中隻　硃砂　麝香各一錢

牛黃　龍腦　巴豆

芎藭　桔梗　枳殼

檀香　茯神　人參

常歸　光活　代赭

雞風　白朮各中兩

右爲細末，下香砂巴豆勻，鍊蜜丸如梧桐子大，一歲至五歲每日一丸，十歲每日兩丸，並空心米飲下。但稍知孩子病甚，即加藥與之，孩子未較，妳母忌生冷油膩，炙煿毒魚，大蒜米醋。

又方　治孩子疳痢，諸色疳，并一十五種病狀，一腹大，二皮膚黑黃，三骨節麤，四眼赤，五口赤，六鼻中生瘡，七頭髮黃，八咬指甲，九愛喫土，十愛喫甜食，十一身熱，十二頭大，十三脚凸，十四項細，十五面無光，並宜常服保童丸方。

硃砂半分　牛黃　麝香

蟾酥各少許　阿魏二分

右先將硃砂於乳器中研如粉，入諸藥，一時以蒜餅爲丸，忌羊血等。

又方　治孩子疳氣，或釀，肚脹，上筋脈，頭大，項細，喫物不知足，夜中即起，腹內長鳴。

大黃一兩　陳橘皮二兩醋浸二合，浸二日曬乾　麝香

蜣蜋二十個，去翅足子，熱燒，醋安之，以瓦罐地上，去火毒，候冷取出，炒過

右爲末，蜜丸如梧桐子大，每日空心熟水下十丸，忌如常。

紫雪圓方　治小兒五疳，蒙腹脹，麻脹，疳氣煩悶，或時燥渴。

大黃　黃連　代赭各二分

硃砂　麝香各少許　杏仁去皮尖別研

肉豆蔻　巴豆去皮，以冷水浸別研各一兩

硃砂丸　治孩子疳痢，辨蟲顏色，定吉凶。

硃砂半石速大　阿魏如硃砂大

蟾酥少許　編蝠血三二滴

右爲細末，蜜丸如赤豆大，每服空心米飲下一圓，五歲十歲只可服五丸，臨時加減，忌冷水油膩炙煿。

右爲細末，和少許口脂調，先以桃柳枝煎湯浴兒後，看小兒大小，以菉豆大塡兒臍中，後用紙片可臍

中貼之。用青衣蓋兒。看齒出來。黃色輕。青黑色重。

青黛散　治孩子鼻流清涕。或鼻下赤爛。

青黛（一錢半）　麝香（半錢）
硃砂（七錢半）　瓜蒂（半錢）
宣連（半錢）　地龍（半錢）
細辛（一錢半）

右爲細末。和合。吹鼻中。入麝香少許。

保童丸

硃砂　麝香
右研合成劑。合子內盛。丸如麻子大。又於一合子內。浸一丸。以筯頭點入鼻中。亦名問命丸。但孩子病甚。即與吹之。或得七噴。可以治之。五噴即甚。三兩噴必死矣。此不可深著水浸。臨時入水亦不畏。

薑膈丸　治孩子膈疳鼻癢。毛髮作穗。面色赤。

地榆（炙）　蝦蟆（燒各一分）
青黛　石蜜（各二分）
右爲末。吹鼻。當有黃水出。忌甜物。

胡黃連丸　治孩子熱疳。

胡黃連　蟾酥（各等分）
右爲末。蜜丸如黃豆大。五歲。熟水送下二丸。

調中丸　治孩子諸疳。或熱攻衝心。肺氣急。晝夜有汗。日漸羸瘦。不吃乳食。

柴胡　茯苓
木香　桂心
枳殼（麩炒去皮瓤）　甘草（炙）
右爲末。蜜丸如梧桐子大。每歲兩丸。至五歲三丸。熟水下。忌如常。

地黃煎方　治孩子疳勞。肺氣熱。欬嗽。四肢漸瘦。心肺乾。

生地黃汁（五兩）　酥（各一兩）
蜜　鹿角膠（半兩）
右先將地黃汁安鍋內。慢火煎。手不住攪。約五六沸。下酥。又五六沸。下蜜。次下膠。又下薑汁。慢火煎。候如稀餳即住火。每食後兩度。其與一匙頭。忌毒物。

又方　治孩兒疳蝕口齒。齒龈宣露。臭穢不可近。

雄黃（炒）　梧桐律（等分）
右爲末。以臘月猪油調。微煎作膏。取柳木筯子。綿裹。微微搽藥。時烙。

又方　治孩子疳蝕脣鼻。及諸瘡。

硫黃　乾漆
右等分。燒灰。稍煙盡。研爲末。入麝子少許。以鼻拭瘡。後用藥乾掺之。立效。

又方　治孩子初患諸色痢。及微有疳氣。

文蛤
右藥不限多少。炒令黑。搗破。看內外相似。爲散。空心米飲下半錢。以歲加減。服之。忌如常。

又方　治孩子赤白痢。

阿膠　赤石脂
龍骨　訶子（燒半熟去核各半兩）
枳殼（麩炒）　白芷（一兩）
右爲末。一歲二歲。空心米飲下半錢。

又方　治孩子冷毒疳痢。白濃疳腚。瘦弱不喫食。腹痛。

青木香（一分）　黃連（半兩）
右爲末。蜜丸如梧桐子大。一歲以上。空心熟水下一丸。三歲五歲服二丸。藥性熱者。不宜多服。忌生冷。

溫脾散　治孩子水瀉利。并脾冷食乳不消。喫乳頻吐。

附子　乾薑
白芷（一兩）　甘草（炮剉各半兩）
右爲末。空心米飲下半錢。忌鮮魚毒物。

火丹證治

黃帝問岐伯曰。後生少稚。多被惡疾。丹毒。二品若何分之。岐伯曰。陽解百年。一十以上爲毒。一十已下爲丹。丹毒一也。隨其大小分別之。治之有毒至。依方。萬無一差。愈人間男女皆遭丹毒。至依此枉死者。復何限說。良由信邪師之語。仍被恐之。愚昧之人。勿與下手。請依方用。今出此圖。形狀如後。按此圖今失。

肘滿丹。從肘起。
尿瘡丹。從踝起。
神瘡丹。從肚起。
伊火丹。從兩脇起。
胡吹瘡丹。從陰囊上起。
天火丹。從腹背遍身起。
天雷丹。從頭頂起。
標火丹。從背甲起。
胡漏瘡丹。從腿中起。
廢瘡丹。從曲臂起。
神氣丹。從頭背上起。

土竈丹、從陰裸起。
朱賁丹、赤豆色、遍身上起。
蠶火丹、從耳起。
野竈丹、從背脊起。
鬼火丹、從面上起。
伊火丹、從兩腋起。
右用猪蠶燒灰、并鐵槽中泥、拌調、塗之。日三。
神竈丹、從肚起。
右用土蜂窠、杏仁、胭粉、生油調塗、立差。
尿竈丹、從踝起。
右用屋四角頭茅草、燒灰、使雞子白調塗之。
胡吹竈丹、從陰蠶上起。
右用水茄窩下泥、和苦酒、塗之。
天火丹、從腹背遍身起。
右用樺皮白末、和生油調塗之、亦用赤石脂、羊脂、調塗之。
天雷丹、從頭項起。
右用陰乾慈末、拌赤脂塗、又用竈下土、雞子白、調塗。
胡漏竈丹、從臍中起。
右用屋漏水調竈中土、塗之。
髀竈丹、從曲髀起。
右用屋四角茅草灰、雞子白調、塗之。
神氣丹、從頭背上起。
右用牯牛骨燒灰、羊脂塗之。
土竈丹、從陰踝起。
右用屋四角茅草、竈橫麻、及雞子白、調塗之。
朱賁丹、赤豆色、遍身上起。
右用愼火草、擣汁、和酒調塗之。
蚤火丹、從耳起。
右用愼火草、擣汁、塗之。
野竈丹、從背脊起。

右用桑香皆、陰擣、赤小豆、末、塗之、立差。
鬼火丹、從面上起。
右用竈下土、雞子白調、塗之、立差。
雜證
平和飲子　治小兒初生、可日與之。
人參　茯苓　升麻（已上各一分）　甘草炙
右以水一白盞、煎至一合半、已來、時時與之、乳母忌食油膩、滿月、及百晬以來、加之、臨時、冷、加白朮、熱加調、續（各半）
又方　治孩子臍中不乾。
白鮮（一錢、服過）　龍骨（一分）
右爲細末、入麝香少許、每次、使拭臍乾、擣之、用帕裹、避風。
青木香散　治孩子陰囊、或如痛腫脹。
狐陰（一具、炙）　蒺藜（炒）　地膚子
昆布　枳殼　槐子（炒、各一分）
右爲末、一歲二歲、空心米飲下一錢。
又方　治孩子蛔蟲咬心痛、面伏地臥、口吐清水涎沫。
檳榔　苦楝根　鶴蝨（炒、各半兩）
右爲末、空心熱茶下一錢、以意加減、忌粘食。
杏仁丸　治孩子或渴、此是蛔蟲傷。
杏仁（去皮尖）　胭粉（各一分）
右爲末、每用唾丸、空心米飲下一丸、二丸。
又方　治孩子赤遊腫、或如丹煩渴、渾身赤瘤壯熱。
蕪荑粉　鉛白霜
右細研、雞蓋汁調、塗之。
又方　取鉛霜法、將鉛來於石上、打令薄、掘地作坑、可鉛片大、以杵擣坑實、滿坑著酢、以鉛蓋定、經一宿、去取霜如珠子大、和藥使之、如頻渴、以後服解熱飲子。
又方　麥門冬　小蘆根　竹葉
乾葛（擣末）　瀉蘆　鹿角屑（各一分）

右用水四合半合煎一合。無問食前後。徐徐與之。

清石散 治孩子身上無故壓。但覺肉色赤熱。

消石　大黃　赤豆各等分

右為末。每用時。隨壓大小。取蒼逡根研汁。調塗壓上。如有壓物。即看有點子。以苦貼之。四面以散子燒之。若無蒼逡根。即用雞子白。或車前根。亦得。

又方　治孩子胎中受風。長後或滿身生瘡。痱瘡如疥癩。或如飲飽痒瘡。

慈白　硝　臭黃

右用油半兩。燒令熱。下少許蠟。先剝慈白三莖。細切。待油熱。即瀝慈上。細研。續下硫黃、臭黃、硝。更研之。旋塗。

薰香散 治孩子赤眼。并胎熱及瘖障多淚。

茴香　冬青膠炙乾　生甘草各等分

右為細末。每洗眼時。取藥一分。水一盞煎。一二沸後溫洗之。或孩兒長大。即加藥并水。

引子方　孩兒用藥洗眼後。可更服之。

知母　貫衆　青箱子
地骨皮　秦皮　車前子
山梔子　獨活各等分

右藥。以水五合煎二合。去滓。溫服。忌食如常。

又方　治孩子膠耳。

白礬燒半兩　龍骨
麝香少許　鉛丹燒一分

右為末。以綿裹竹枝子淨。探濃水。以一小豆大藥傅之。別以綿裹塞。慎之。勿令見風。

又方　治小兒膠耳。

石硫黃

右為細末。以摻耳中。日一夜一。

又方　治孩子小便不通。

茯苓　通草　冬瓜子

右以水四合。藥二兩。煎一合半。作二服。忌油膩。

側栢散 治孩子風熱。

側栢　鬱金
天南星　子芩

右為末。治風及驚。溫酒下。退熱。每夜熟水下半錢。

柴胡飲子　治小兒行遲。小兒傷抱。腳纖細無力。行止不得。或骨熱瘠勞。肌肉消瘦。

柴胡　鱉甲米醋炙令黃　乾蝎
桔梗　枳殼麩炒去麩　知母
升麻　元參　大黃已上各半兩

右藥等分。並細剉。每日煎時。三歲以下。取藥半兩。水五合。煎二合。去滓。分二服。空心食前後各一服。忌毒物。飲後用澡浴方。

澡浴方

苦參　茯苓皮　蒼耳
桑白皮　白礬各半兩　慈白少許

右藥剉細。每浴時。取一兩。沸水三升。浸藥後。通溫。與兒浴之。避風。於溫處妙。

又方　治小兒數歲不能行。取葬家未開戶。盜其飯食來。以哺之。不過三日。便起行。勿令人知之。

海藏斑論萃英

王好古著

海藏斑論萃英

瘡疹標本

昔睦親宅十大尉病瘡疹衆醫治之王曰疹未出屬何藏府一醫言胃氣熱一醫言傷寒未退一醫言在母腹中有毒錢氏曰若言胃氣熱何以　乍熱若言母腹中有毒屬何藏也醫曰兒在脾胃錢氏曰兒在脾胃何以驚悸錢曰天胎在腹中月至六七則已成形食母穢液入兒五藏食至十月滿胃九中至生之時口有不絜產母以手拭淨則無疾病俗以黃連汁塗之方下腊糞及涎穢也此亦母之不絜餘氣入兒藏中本先因微寒入而成瘡疹未出五藏皆兒病證內一藏受穢多者乃出瘡疹初欲病時先呵欠頓悶驚悸乍涼乍熱手足冷面肥赤燥欬嚏嗽此五藏證俱也呵欠頓悶肝也時發驚悸心也乍涼乍熱手足冷脾也面赤肥頰赤嚏嗽肺也惟腎無候以在府下不能食穢故也凡瘡疹乃五藏毒若出歸一證肝水疱肺膿疱心斑脾疹惟腎不食穢毒而無諸證瘡黑者屬腎由不慎風冷而不飽內虛也又用抱龍丸數服愈以其別無他候故未發出則見五藏證已出則歸一藏矣海藏云本先因微寒入一句并由不慎風冷而不飽內虛一句勿認作寒證當識用抱龍丸即知斑疹多熱也

治小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似未能辨認問服升麻葛根湯惺惺散柴胡湯其驗蓋此數藥通治之不致悞也惟傷食則大便酸臭不消化畏食或吐宜以藥下之海藏云傷食宜以藥下之者當詳其所傷何物生硬實熱不等不可遽用巴豆之類大毒之藥下之升麻葛根湯太陽陽明也惺惺散風熱咽不利脾不和少陽渴小便不利也小柴胡湯往來寒熱胸脇微痛少陽也然欲知其經當以脉別之小兒耳冷骨冷手足乍煖乍寒面赤時嗽時嚏驚悸此瘡疹欲發也未能辨認問服升麻湯消毒散已發未發皆宜服仍用胡麥酒黃柏黃耆月煩煩食後與白虎湯玉露散熱盛與紫雪咽喉或生瘡與甘桔湯甘露散餘依錢說大人小兒同治法惟劑小大不同耳

海藏云消毒散大陽藥白虎湯治身熱目疼鼻乾不得卧陽明藥也正為泄時者之劑甘露飲子肺腎藥也甘桔湯少陰藥也紫雪天門冬麥門冬黃芩地黃為血劑玉露散肺腎藥石膏寒水石為氣劑

紫雪 方在傷寒論中小兒門內

海藏云太陽陽明之劑

消毒散 治傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和

桔梗　細辛去苗葉　人參　甘草炙　白茯苓去皮　白朮　桔梗根各一兩

右同為細末每服二錢水一盞入薄荷五葉煎至七分溫服如要和氣入生姜五片同煎用防風一分用川芎一分此又法海藏云此加減四味亦各隨經說也

消毒散 治瘡疹未出或已出未能勻遍又治一切瘡疹涼膈去痰治咽喉痛

牛蒡子一兩炒　甘草半兩剉炒　荊芥穗二分半

右同為細末每服三錢水一盞半去粗溫服海藏云此前所註皆溫平之劑一法加防風薄荷

[illegible] 治瘡疹已出用此藥塗面次用胡麥酒外治法

黃蘗　新羅豆各兩半　甘草半兩

右同為細末生油調從耳前至眼匡並厚塗之日三兩次如早用瘡不至面縱有亦少

[illegible] 胡麥細切四兩以好酒一盞煎一二沸入胡麥再煎少時用物合定放冷右每吸一兩口微嚥從頂至足勻遍勿噴頭面病人左右常令有胡麥即能辟去汗氣瘡疹出快

[illegible] 治瘡疹出不快及倒靨

紫草　木通　甘草　枳殼麩炒去穰

右同為麤末每服一錢水一中盞煎至八分溫服無時

[illegible] 治心胃熱咽痛口舌生瘡并瘡疹已發未發並可服之又治熱氣上攻牙齦腫痛動搖

生地黃　熟地黃　天門冬去心　麥門冬去心　枇杷葉去毛　枳殼麩炒　黃芩去心　石斛去節　甘草剉炒　山茵陳葉

右各等分為麤末每服二錢水一盞食後溫服牙齒則令咽并服

海藏云甘露飲為血劑

[illegible] 方在保命小兒條下

海藏云東垣先生治斑後風熱毒瞖膜氣障遮睛以此劑瀉之大効初覺易治

[illegible] 四物湯內加防風羌活等分為細末煉蜜為丸是也

[illegible] 瀉青丸去梔子大黃　治肝虛

[illegible] 治腎虛解顱即腦病也治脉毛而虛

熟地黃　山茱萸　牡丹皮　白茯苓　乾山藥　澤瀉

右為末煉蜜丸如桐子大三歲已下一二丸或三五丸空心溫水下

[illegible] 治脉洪而實前地黃丸熟地黃改生地黃去山茱萸是也此治左手本部脉若右大洪實以瀉髓丹瀉之此地黃丸仲景八味丸去桂附若加五味子腎氣丸也此益肺之原以生腎水焉

[illegible] 瀉肺脾熱目黃口不吮乳喘嗽

桑白皮一兩剉炒黃　地骨皮一兩　甘草半兩炒

右為細末每服一二錢水一盞入粳米百粒同煎食後服

海藏云治肺熱傳骨蒸自汗用此以直瀉之梔子黃芩亦能瀉肺當以氣血分之

[illegible] 補肺

阿膠一兩半炒　馬兜苓半兩　甘草二分半炙　杏仁七個去皮尖麩米　黍粘子一分半炒者

右為末每服一二錢水一盞後

海藏云杏仁本瀉肺非若人參天門冬麥門冬之補也當以意消息

[illegible] 泄肺　方在保命小兒條下

[illegible] 瀉丁　黃連一兩去須

為極細末每服一字去聿錢一錢臨卧溫水調下

海藏云勿老草瀉心湯加減法出於此乃實邪也實則泄其子

補脾湯 青皮 陳皮 丁香 阿子肉 甘草

右為細末每服一錢水一盞煎服

海藏云此劑瀉脾以煉溫

瀉脾湯 瀉脾熱目黃口不能吮乳

藿香葉 山梔子仁 石膏 甘草 防風

右剉同麸炒為細末每服一錢至二錢水一盞煎清汁服 海藏云此劑瀉肺熱

白朮散 藿香葉 白朮 木香 白茯苓 甘草

右為末每服一錢至二錢水煎如飲水者多煎與之

海藏云四君子湯加減法治虛勝氣脫泄利太過

生犀湯 生犀 地骨皮 赤芍藥 柴胡 乾葛 甘草

右為末每服一二錢水煎

海藏云此少陽陽明相合也

檳榔散 檳榔 橘皮 甘草 滾牛

右為粗細末三錢蜜湯調下半錢已上一錢食前

海藏云與通腸丸相上下氣血也

大黃丸 大黃 牽牛 木通

右為細末滴水丸粟粒大每服三五十丸量虛實加減

湯中和氣 治吐泄思食凡小兒虛冷病先與數服以調其氣

人參 茯苓 白朮 甘草 陳皮

右為細末每服二錢水一盞生姜五片棗一枚同煎

海藏云四君子補脾湯加減法

防風湯 防風 青葉 龍腦 鈎藤 黃連 牛黃 麝香

右為細末糊丸粟米大每服二十丸金銀湯下

牡蠣散 治盜汗 牡蠣 黃耆 生地黃

右為末水煎

治一切熱兼治瘡疹有神 連翹 防風 梔子 甘草

右為末水煎

海藏云治熱在外而不厥此少陽藥也

治小兒瘡豆已出未出並可服之 紫草 升麻 甘草

右㕮咀水二盞粳米五十粒同煎此乃陽明之藥也

治小兒瘡疹 紫草 木通 人參 茯苓 粳米

右為末每服四錢水煎此小便不利之劑也

治小兒瘡豆欲出未能得透皮膚熱氣攻咽喉眼赤心煩 鼠粘子 荊芥穗 甘草

右為細末沸湯點 臨卧大利咽喉化痰凝止嗽老幼皆宜

海藏云太陽少陽藥也首論溫平者此也

治瘡子或出不快 白芍藥

酒調如欲止痛只用暖熟水調下

海藏云張和之治四支出不快加防風大効此正陽大陰藥也

治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛 桔梗 甘草 牛蒡子 麥門冬

右為末竹葉同煎細細服

方在妝將內脉訣中

索古老人斑論

論曰斑疹之病其為證多異瘡發於腠腠於外者屬少陽三焦相火也謂之斑小紅靨行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹凡顯斑證若自吐瀉者慎勿亂治而多吉謂邪氣上下皆出也大凡瘡疹首尾皆不可下恐妄動而變此謂少陽通表宜和之也當先安裏解毒次微發之安和解毒須安五臟防風湯是也如大便不通者須微發之藥錢氏方中甚多宜選用之如大過秘宜微利之當歸丸最變百祥丸是也初知斑疹若使之斑疹併出小兒難禁是以別生他證也首尾不可下者首曰上焦尾曰下焦若能吐利猶不可下也便宜安裏若不吐瀉者先安裏藥三五服如能食而大便秘結內實者宜疎利之若內虛而利者宜用裏藥末後一服調微發之藥服之大抵安裏之藥多發表之藥少秘則微疎之令邪氣不壅併而能作蒸大便兒易禁也身溫煖者順身涼冰者逆二者宜多服防風湯和之安裏若大便實秘能飲食而內實宜當歸丸微利之

防風湯 防風 地骨皮 黃耆 荊芥 枳殼 赤茯苓

右為麄末每服四五錢水煎

當歸丸 當歸 甘草 黃連 大黃

右先將當歸燃膏子入藥末二味為丸漸加服之以利為度

治斑疹大便秘結 紅牙大戟 青州棗

右用水一椀同煎至水盡為度去大戟不用將棗焙乾可和作劑旋丸從少至多以利為度

海藏老人斑論

夫斑之為病皆由子在母腹中時浸漬食母血穢蘊而成毒皆大陰濕土雍滯君相二火之所作也因小兒真氣既盛正氣又王邪無所容或因天令或因傷表或因傷裏斑由是而生焉治當何如外者外治內者內治中外皆和其斑自出至於延蔓者發之表大熱者奪之渴者清之大便秘結者下之小便不通者利之驚者安之泄者分之可以執一為哉大抵傷寒同治最為高論隨經用藥不可闕也假令五日已裏諸病與斑疹不能別辨者不可疑作斑疹必須發之但各從其所傷應見治之皆不妨斑出若強發之其變不可勝數矣前人言首尾俱不可下者何也曰首不可下者為斑未顯於表下則邪氣不得伸越此脉證有表而無裏故禁首不可下也尾不可下者為斑毒已顯於外內無根帶大便不實無一切裏證下之則斑氣陷故禁尾不可下也有如所言溫煖蓋覆不令通風以其斑未出或身表涼而惡寒或天令寒而惡冷溫煖蓋覆不令通風也斑若已出身熱天暄何必用蓋覆而不使之通風乎後人執此二句首尾俱不敢下溫煖不令通風不知天令之所加人身之所感致使悞人多矣大抵前人之言隨時應變以其所可者而言之後人不知其變故執常而不移也噫首尾俱不可下者以其始終藏府元無凝滯也若有一切裏證及大便結者安得不下溫煖不使之通風以其發在冬時故如此也若發在夏時斑雖未出亦不用於此也斑之用藥大率以脉為主浮中沉之脉平寒按之候察其虛實定其中外則可以万全矣

未題斑證所用之藥

外傷升麻湯主之　內傷枳實丸主之
大便實者枳朮丸主之　若傷冷者溫之神應丸主之
惡寒者發之宜防風蒼朮湯
表大熱者奪之此表者通言二陽也夫陽壅則氣必上行言
奪者治法不令上行也
渴者清之大渴者白虎湯小渴者涼膈散
大便秘結者下之桃仁承氣湯四順飲子柴胡飲子選用參
其在氣在血
小便不通者利之導赤散八正散之類當求上下二焦何經
而用之
證者分之爽則異功散四君子湯熱則淋漓茯苓湯
已顯證所用之藥
出不快　化毒湯
出太多　犀角地黃湯　地骨皮鼠粘子湯
咽不利　桔梗甘草鼠粘子湯
煩者　桔梗甘草梔子湯
肺不利　紫草茸甘草枳殼湯
太陽出不快　荊芥甘草防風湯
陽明出不快　升麻加紫草湯
少陽出不快　連翹防風湯
四肢出不快　防風芍藥甘草湯

瘡疹輕重候

凡出未而發稍者是外感風寒之邪內蘊心熱之所作也當用
茶粉下鮮毒犀角地黃湯主之
一發便密如針頭形勢重者合輕其表而涼其內連翹升麻湯
若痘已發密重機喘飲水者有熱證用去風藥微下之
若出不快清便自調知其在表不在裏當微發散升葛湯
若青紫黑陷身不大熱大小便澁則是熱在內風大黃湯下
宣風散
若身表大熱者表證未罷不可下
若痘疹已出見小熱小便不利當利小便八正散
若已發後有餘毒未散復有身熱瘡膿之類當用茶粉下鮮
毒丸瘡疹已出後有聲音者乃形病氣不病也瘡疹未出
先聲音不出者乃形不病而氣病也若瘡疹出而聲音不
出者是形氣俱病也當清其肺氣宜用八風湯并涼肺湯
去硝大黃亦可

田氏保嬰集

撰人未詳

田氏保嬰集

月裏生驚

急取豬乳細研辰砂牛黃各少許調抹口中神効乳母服防風通聖散三劑其驚自銷

月裏生赤

肌膚赤如丹塗者先用牛黃散托裏續後用藍葉散塗外乳母服清涼飲子三大劑

月裏生嘔

先用朱砂丸下之如利後用朱沉煎隆真邪氣惡物自下而不嘔也

月裏生黃

因母受濕熱傳於胎也乳母宜服生地黃湯

生下不大便

治法先用硬葱針任肛門如大便不下後用牛黃散送朱砂丸一時自見

春日病溫

凡遇溫病未滿三日先用惺惺散二服後四五日不解煩渴乾嘔用白木散如自汗口燥用製白虎湯至六七日大便燥結用四順飲子下心腹大實大滿牛黃通萬丸下初覺之時疑是瘡疹只宜用葛根升麻湯解肌

夏日吐瀉

凡小兒盛暑吐瀉邪熱在下則瀉在上則吐亡津必消用玉露散雖吐時時與啜之過三日不愈身熱脉大小便黃用五苓益元各半熱湯調溫飲之身涼脉細小便清早辰金黃散午後玉露散過四五日如因弱宜服異功湯和中丸開胃丸

秋日泄瀉

治泄瀉活法機要二十五論內甚多宜選而用之

冬日咳嗽

治咳嗽方前發明內甚多宜選而用之

五藏病

治法曰肝熱則手撫衣領瀉青丸主之

肺熱則手指眉毛甘桔湯主之

心熱則上竄咬牙導赤散主之

脾熱則目黃肚大瀉黃散主之

腎虛則下竄畏明地黃丸主之

急慢驚風

潔古曰急驚者陽證也多熱於心因聞大驚宜用涼驚丸導赤散瀉青丸瀉肝丸地黃丸搐止宜服安神丸

慢驚者陰證也因吐瀉病久脾胃虛損似搐而不似搐亦名瘈瘲脉有力先用宣風散導之後用益黃散平之天麻防風丸亦可

大凡小兒過煖生熱熱極生風提抱生癡餵飼生癖也

嘔吐

凡有嘔吐不止者皆宜朱沉散定吐熨金投用無不効也

重舌

治法竹瀝清黃柏末點舌上如不愈後用真青黛傅之不過三次愈

木舌

治法用局方中紫雪一分竹瀝半合和之時時抹入口中自消

鵝口

小兒初生白膏滿舌治法用髮纏指頭蘸井花水揩拭之後用黃丹鍛出火氣搽於上自愈

口瘡

治法乳母同兒宜服洗心散瀉心湯然後用黃蘗末青黛研細搽之

撮口

治法宜用白殭蠶末蜜調塗兒口又用牛黃一錢竹瀝一合時時抹入口中即瘥

解顱

治法宜用生乾地黃散

夜啼

治法宜五味子散亦宜用燈花七枚研細乳汁送下立已

聾耳

治法宜紅玉散搽之

鼻衄

治法先用甘草白礬水洗淨後搽蘆會黃連黃蘗末日三上

脫肛

治法宜用清黃一兩猪脂二兩煉猪脂和蒲黃成膏塗腸頭上即縮入

便青

因驚氣內感脾氣不和治法宜服白木湯

頻赤

由心藏邪熱上攻也宜服導赤散

弄舌

脾藏微熱舌絡緊也治法勿用冷藥下之當少與瀉黃散若肥實者用牛黃散治之

赤流

治法宜服犀角散一法先鍊去惡血服上藥一法用牛膝一兩去苗甘草半兩生剉碎水煎一大盞去滓調伏龍肝塗之

垂涎

其候笑啼俛仰坐卧不安自按心腹時時大吁面無正色或青或黃長慢而白目無精光口吐涎沫此為里病宜服安虫散

客忤

因而驚忤者治法用竈中黃土研二兩雞子殼二件相和入少許水調先以桃柳湯浴兒後將此藥塗五心及頂門上

眉煉

治法用青金散傅之如不愈燒小麥存性研細好油調塗

瘡癬

治法浸淫瘡宜用苦瓠散塗之乾癬宜用羊蹄根絞自然汁調膩粉塗之濕癬宜用青金散貼之

暴喘

俗傳為馬脾風也大小便硬宜急下之用牛黃散奪命散後用白虎湯平之

偏墜

宜服防葵丸令兒坐於土中午時灸印下偏墜之處七壯

便難

便難燥結兒或滋藥腹脹悶乱命在頃刻可用撞丸以男左女右手握之不移時大小便自利也

辨小兒病證

目赤兼青者發搐也　目直而青身反折者生驚也

咬牙甚者發驚也　口吐涎沫而叫者屋漏也

昏睡喜嗜怪者將發癇也

吐瀉昏睡露睛者胃虛熱也　吐稠涎唾血者肺熱也

吐瀉昏睡不露睛者胃實熱也　瀉青白穀不化者胃冷也

吐瀉乳不化者傷食也宜下之　身熱飲水者熱在內也

瀉黃紅赤黑者脾胃熱毒也　呵欠面赤者風熱也

身熱不飲水者熱在外也　呵欠面青者驚風也

呵欠面黃者脾虛驚也　呵欠而多睡者內熱也

呵欠兼熱者傷風也

錢氏得効大青膏方在前保命集小兒條下

[illegible]方在前無論差英內

[illegible]方在前保命集小兒條下

[illegible]治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

知母　炙甘草　半夏洗七次　銀州柴胡去芦

人參去蘆　地骨皮　赤茯苓已上各等分

右為細末每服一錢生薑五片水煎食後溫服量大小加減

[illegible]治證同前

生犀鎊末　地骨皮　赤芍藥　柴胡

葛根各壹兩　炙甘草半兩

右為麤末每服二錢水煎食後溫服

[illegible]方在前差英內

[illegible]治心虛潮熱面黃潮赤壯熱驚啼神志恍惚不寧

麥門冬去心焙　馬牙硝　白茯苓　乾山藥

寒水石研　甘草各半兩　朱砂壹兩研　龍腦壹分研

右為細末煉蜜丸如雞頭大每服半丸沙糖水化下無時

[illegible]方在前保命小兒條下

[illegible]方在後衛生寶鑑小兒條下

[illegible]治痢殺虫和胃止瀉

胡黃連　黃連　藿香研　木香　白蒺藜去刺

雷丸　青皮去白　鶴虱微炒紀上　麝香貳分另研

右為細末粟米飯和丸如綠豆大米下一二十丸無時

[illegible]方在前差英內

[illegible]方在前差英內

[illegible]治褪褓小兒大便不通下便澁滯并驚熱疳實欲得溏動者

郁李仁壹兩　川大黃壹兩酒浸焙　滑石半兩

右另為末將郁李仁研為膏和末為丸如黍米大量兒大小與之以乳汁或薄荷湯下食前

[illegible]方在保命小兒條下

[illegible]方在差英內

[illegible]治疳疹太盛宜服金液不入眼

生犀貳分　龍腦壹分　黃耆半兩　大黃貳分　桑白皮半兩炒黃　甘草炒各貳分

麻黃去節　釣藤子　石膏半兩　瓜蔞去皮

右為麤末每服二錢水煎食後溫服微利効

[illegible]湯治小兒生下胎黃

生地黃　赤芍藥　川芎　當歸　瓜蔞根各等分

右㕮咀每服五錢水煎乳母服時時少抹入兒口中

[illegible]治小兒泄瀉青白膿血相雜

黃連壹兩用吳茱萸炒後去茱萸　萆薢乳炒　木香壹分一味

右為細末麵糊為丸黍米大赤茯苓湯下白術厚朴湯下空心

[illegible]治小兒邪熱在表惡風惡寒所傷疹瘡未出可解表發疹

防風半兩　蒼朮　石膏各壹兩　炙甘草半兩

川芎　黃芩各貳分半

右為麤末每服二錢生薑三片薄荷七葉水煎日二

[illegible]方在前保命小兒條下

[illegible]方在寶鑑小便不通條下

[illegible]治小兒疹後結燥百無一失方在前保命小兒條下

[illegible]治痘疹後實熱往來嗜卧煩燥悶乱

生地黃　當歸　地骨皮　人參　甘草炙

赤芍藥

右等分㕮咀每服水煎服無時

[illegible]小兒漆瘡漸長不止

苦楝子兩　蛇蛻皮燒灰　露蜂房燒灰　輕粉

右為細末生油調塗故帛上貼

[illegible]治小兒驚風身熱喘急多睡驚悸手足搐掣精神昏憒痰涎壅盛

天麻　防風　人參各壹兩　蝎尾去毒半兩　甘草

朱砂　雄黃各貳分半　牛黃壹分　麝香壹分　姜蚕炒黃半兩

右為細末煉蜜丸櫻桃大朱砂為衣每服一丸薄荷湯下無時

[illegible]治小兒肺脹喘滿胸高氣急兩肋痛動陷下作坑

兩鼻翕張煩乱嗽渴聲嗄不鳴痰涎潮塞俗云馬脾風若不急治死在朝夕

白牽牛一兩半熟　黑牽牛半兩半熟　川大黃　檳榔各一兩

右為細末三歲兒每服二錢冷漿水調下涎多加風粉少許無時加蜜少許

[illegible]治小兒嘔吐不止

朱砂貳分研飛　沉香壹分　藿香葉三分　滑石半兩　丁香十四个

右為細末每服半錢用新汲水一盞芝麻油點成花子抛藥在上須臾嚥去水却用別水送下空心

[illegible]小兒驚熱煩躁吼癖

大黃半兩　黃連半兩　龍腦　防風　川芎

薄荷葉各半兩

右為細末麵糊為丸黍米大青黛為衣每服三五丸加至二十丸溫水下

[illegible]治小兒疹後口瘡咽喉腫痛牙齒臭爛

天門冬　麥門冬　玄參各三兩　甘草　薄荷葉各一兩

右為細末熬生地黃汁和丸櫻桃大每服一丸溫蜜水化服

[illegible]小兒疹後出不快或倒攝毒氣入腹

紫草茸　黃耆　桑白皮　木通　枳殼

白朮各等分

右為麤末每服三錢水酒各半盞慶香少許同煎

[illegible]治小兒一切嘔吐不止

人參　白朮　木香　丁香　半夏湯洗七次　藿香

右六味各一錢半為極細末稀麵糊為丸麥核大後用沉香一錢為末朱砂一錢水飛一味同研勻為衣陰乾每服一丸用小棗一枚去核納藥在內濕紙裹燒熟嚼與小兒服後以米飲送之

[illegible]一名清涼飲子方在保命小兒條下

[illegible]治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗五心煩躁四肢困倦飲食漸多不生肌肉

羌活　地骨皮　麥門冬　枳殼去穰炒　大黃蒸

柴胡　茯苓　赤芍藥　黃耆　桑白皮
人參　鱉甲生去裙爪焦　已上各等分

右為麤末每服二錢入青高少許水煎量兒大小加減

五味子散　治小兒夜啼及驚悸昏睡劇狀似風者

五味子　當歸　赤芍藥　白朮各半兩　茯神
陳皮　桂心　甘草各半兩

右為末每服量兒大小加減水煎

白礬散　治小兒聾耳

白礬火枯　乾胭脂　麝香各等分

右同研勻先以綿裹棗子蘸津搽之

胡粉散　治小兒虫痛

胡粉炒黃　鶴虱炒黃　川楝子去皮　檳榔各等分　白礬枯半錢

右為細末每服一字大者半錢溫米飲調下痛時服

白膠香散　治小兒濕癬浸淫瘡

白膠香等兩研　蛤粉半兩　青黛等分半

右研勻為細末乾搽瘡上

巴豆散　治小兒大小便難嘔吐藥食不下命在頃刻

巴豆半兩研　硫黃　良薑　附子　檳榔
甘遂各等分

右為細末棗米飯和丸菉豆大用椒湯洗小兒男左女右手搓之用綿裹定看行數多少置藥洗去不用即止

黃耆散　治久嗽喘逆身熱羸乾渴者是熱入肺經為客熱呻呼有聲黃耆為主人參為佐

黃耆等兩　人參半兩　桑白皮炒　地骨皮炒　甘草等分半

右㕮咀水煎放冷時時服之

麻黃散　治風熱喘促煩亂不安俗謂之馬脾風者

麻黃炒半兩　輕粉半分　甘遂等分半為末

右為細末每服一字用溫漿水少許上滴小油一點在藥上沉下去却漿水灌之立効如神

小兒身熱發黃腹脹四肢浮腫煩躁不寐喜飲小便赤澀

大人小兒口噤不開牙關者諸藥多効生天南星末一錢臘子少許相和研勻用指蘸生姜自然汁蘸藥於左右大牙根上擦之立開

灸慢驚風及脾風撮口

小兒慢驚風灸尺澤二穴各七壯在肘中橫紋約上動脉中炷如小麥大

小兒初生脾風撮口諸藥不効者灸然谷穴在內踝前起大骨下陷中可灸三壯鍼入三分不宜見血立効

灸小兒癲癇風癇驚癇

小兒癲癇喉瘖脊強低引項灸長強穴三十壯在脊底端尻地取之乃得

小兒癲癇驚風目眩灸神庭穴七壯在鼻直上入髮際五分

小兒風癇灸鼻柱上髮際窊窊中灸三壯炷如小麥大

小兒驚癇先驚啼叫後乃發也灸頂上旋毛中三壯及耳後青絡脉炷如小麥大旋毛中即百會穴也

小兒癇氣久而不瘥者灸中脘一穴章門一穴在大橫外直脅季肋端側卧曲上足舉臂取之右中脘章門各灸七壯脾俞脊中灸二七壯取中脘從鳩尾下取病人四指是穴灸之無不効也

小兒臍下滿漏脾重四肢不收瘦癖積聚腹痛不嗜食羸瘦寒熱脾俞二穴在十一椎下兩傍相去各一寸五分

又治腹脹引背食飲多漸漸羸瘦黃可灸七壯黃疸者可灸三壯

灸疳瘦法

小兒疳瘦於脊下鳩尾骨尖上灸三壯次於脊下端尾翠骨尖上灸三壯

小兒卵瘦脫肛疳瘦渴飲形容瘦悴諸方不差尾翠骨上三寸骨陷中灸三壯

小兒身羸瘦黃腹脹四肢浮腫煩躁不寐喜飲小便赤澀

小兒脫肛瀉血秋深不較灸龜尾一壯炷如小麥大脊端窮骨也

小兒脫肛者灸脚中三壯

小兒脫肛久不差及風癇中風角弓反張多哭言語不澤發無時節盛即吐沫灸百會一穴七壯在鼻直入髮際五寸頂中央旋毛中可容豆炷如小麥大

小兒偏墜若洪腫中所有在後生者於壁下腎囊前中間孩子上灸七壯愈

小兒囊間緣脬熱脹痛攻會腸所生又緣乳母食熱毒五辛轉更會高起也灸兩乳前各一寸五分上兩行三骨縫間六穴各三壯炷如小麥大春夏從下灸上秋冬從上灸下若不依此法十灸不愈一二也

又一法小兒喘脹俗謂之馬脾風又謂之風喉者以草莖等病兒手中指尖近掌紋至中指尖截斷如此三莖自乳上微斜直上立兩莖灸兩頭橫一莖兩頭尽頭點下各灸三壯此法多曾見愈

種痘心法

朱奕梁撰

種痘心法序

種痘一科昉乎有宋

御纂醫宗金鑑言其要矣至於方法多出於口授心傳或未備敢余幼好歧黃之學廣搜典籍博訪高明間有一得未敢自信誠以醫雖小道實寄生死自非洞垣斷不可浸爲嘗試也比遇明師授以種痘之訣析疑辨異檢訛訂謬得其要領抉其精微閱歷有年頗有成效嘗欲錄爲一編以備參考每不獲暇茲遊大梁客中暇日條列論方以爲一科詳愼備核可以積德可以養生不敢自私公諸同好願體天地好生之心勿懷一身營私之念雖無當於大方或有助於幼科也朱奕梁識

種痘心法

國朝朱奕梁撰

論痘源流

天運自北而南地氣自南而北痘疹之源本於父母媾精時慾火藏於嬰孩之命門所謂先天之毒是也上古俗厚人麗蓋無此患迨東漢馬伏波征交趾南方濕熱與相火煽動遂染痘瘡傳入中原流毒嬰孩千百餘年無可預挽宋王文正公之父生子數患痘殤後得又正公旦百計千方預求挽護廣詢醫巫力行善事感天母降凡神人授術慶衍化流而種痘之法遂傳於世由今推之蓋先天之毒伏於命門外無所感原靜而不動至氣運用事保攝失宜則比戶連村一人乍起傳染殆遍所以少陰司天在泉之歲痘症尤多其有飲食驚恐傷於內風寒跌撲傷於外者遇之輒殆此非痘之殺人良由多症之夾攻勢不支也若夫種痘則飢飽預節溫涼預調神完氣固時疫未作以馴粹之苗引平和之毒是以計日而發應候而收萬全無害譬諸渡江河衝風冒浪縱巨艦未免沉覆之虞而風恬浪靜雖小艇亦克濟於洪流詎得謂人事不能勝天遂委諸氣運也哉

審時熟苗

種痘之派有二其一爲湖州派其法選時痘之極順者取其痂以爲苗是名時苗種出之痘稀密不常時或有失起於秋分之後停止於小滿之前蓋圖利之所爲非仁人之心也其一爲松江派其法專用種痘之痂以爲苗是名熟苗種出之痘稀密視乎胎毒之輕重輕者不過數顆而毒已盡即重者亦不過二三百顆從無迅速合眼諸苦雖酷暑嚴寒並無妨礙良由其苗傳種愈久則藥力之提拔愈清人工之選練愈熟火毒汰盡精氣獨存所以萬全而無患也若時苗能連種七次精加選鍊即爲熟苗不可不知

選苗

痂不拘大小圓厚色紫明徹無昏濁氣者佳頭面爲上身手爲次腰下至足又其次皆可用惟手心足底紅唇無毒竅處及天庭眉心鼻尖人中地閣咽喉枕骨當胸乳尖當臍背脊各正中等處並前後陰器者俱不可用

收苗

收苗回漿結痂色老四圍起白衣用指甲輕輕挑起揭取爲上脫下拾取者爲次況脫下遺失尋覓甚難總宜揭取貴乎恰好太早則傷疤太遲則無及

貯苗

貯苗先選合式之痂用指撚淨浮污預備乾潔竹紙包好寫明日月并孩子姓名以便臨用揀取包不宜用紅礬紙恐損苗故也宜於近身少佩片時以去痂中潮氣則不蒸霉即藏於乾淨磁瓶內置之涼燥之處蓋熱則苗氣易耗穢則苗氣易雜不燥則潮濕相仗不密則鼠蟲竊損皆所宜避遇暑月及有時疫痘症或預備堅厚竹筒烘晒乾潔納苗包於內亦好須緊塞其口庶苗氣不散疫氣不侵

苗力久暫

苗之大而厚者冬月春初可貯月餘秋末夏初猶可半月盛暑僅可六七日若更薄小焉能耐久

用苗輕重

用苗輕重在量苗之大小厚薄孩之長幼虛實時之寒煖燥濕以斟酌調劑厚大之痂兩三顆足種一孩薄小

者二三十顆不嫌多也大抵孩長而實宜加重孩幼而虛宜減輕時煖而濕宜加重時寒而燥宜減輕此其概也權衡通變在乎臨時

可種不可種

凡孩子生滿百日時視靈動認生啼笑者即可種至十三四歲皆可種十五以上勿輕種蓋痘瘡最忌穢濁與走洩若男子情竇已開女子天癸已至能保無穢濁走洩之害乎若年長之男必須誠實自惜身命者方可下苗否則痘中走洩登時黑陷立致危殆無藥可救女之天癸其來以漸服眞阿膠可以力止猶得僥幸於萬一然亦不可不慎總之孩子種痘不愁太小只愁太大蓋太大則任性自由不容大人調理大而傾危小而痼疾何如兩三歲時不識不知任憑大人調度者之省事乎凡孩子須看兩目瞳人深黑緊小光芒流動便是命門充足根本深固壽雖重而無妨最忌黃淡散大呆滯無神

再診耳尻脈在耳後高骨上并驗中指尖脈動指熱爲相火煽動時痘將發之候不可種

凡有風寒外感飲食內傷諸症須留心調理宜緩種

凡面色㿠黃毛髮枯搽皮膚枯裂者不宜種

凡氣膚木腎身有隱病者不宜種

凡頭大頸細肌肉瘦削者不宜種

凡腰細膝大肉軟如棉者不宜種

憲兒疑惑語言不祥者不宜種

下苗吉日

下苗宜天德歲德月德天德合歲德合月德合毋倉開成等日

避忌日辰

忌破閉滿日月忌神在日孩子本命沖尅等日

治苗塞苗法

下苗時選入鉢用杵研細加水再研入和苗丹少許以微有紅色爲度不可太多再研極和乾濕得所大約苗新宜潤苗久宜乾天寒用溫水天熱用涼水隨取木棉絮一丸如豆大泡透仍挹乾先展鉢底苗漿再收杵上苗漿務必淨盡勿致狠藉然後令孩子向明用左手拈起苗丸塞入鼻孔男左女右再將乾絮豆許蓋塞苗丸之外右手取苗杵量鼻淺深拇指掐定送入鼻漿凹處須要恰好太深則傷鼻太淺則苗丸易致脫出苗氣不入徐疾淺深全在手法熟則生巧下苗後須防噴嚏打出苗丸宜仍送進必過五六時方可抽出即不抽出亦並無妨

下苗後兩三時即服稀痘丹五歲內三丸七歲內五丸八九歲以上七丸不拘湯下即入粥飲內亦可若幼不能服者須以少熟水浸透研爛塗母乳頭令兒吮食之務盡勿使狠藉

下苗後五日耳尻脈當動中指尖當熱七日身發熱十日佈點此一定之候也然亦時有不齊者孩體之氣稟有厚薄臟腑之傳送有遲疾肌體之腠理有疎密苗性之久新有馴暴時令之氣化有寒暑是以早者五日而發熱遲者或十二日而發熱要皆自然之理不可以一例拘也故種而不出者必俟十五日後方可覆苗

纔發熱於口鼻上下兩旁先見一點平塌腫硬者爲痘標四月八月間多有之急用銀針挑破其心使出紫黑血以洩毒則腫硬消而餘痘易起否則壯熱困人

凡發熱而兩目起紅者是痘將發於目中速用吹耳丹發熱時向來曾有驚風者不免舉發或抽搐搐搦者甚則角弓反張痰壅發厥俱不必張皇靜以待之不可悞治佈點自定從此驚風永除矣

凡發熱乍作乍止時輕時重不拘一例其以七日爲率者蓋人身內之五藏與外之軀殼相爲配合肺主皮毛心主血脈脾主肌肉肝主筋絡腎主骨髓苗氣之入自外至內每日一藏計五日而至腎五日之後先天之毒被苗氣引動腎中發熱其熱在骨髓外不覺也其候耳尻脈動中指尖熱目眸子滯而不流六日之後腎傳之肝其熱在筋絡外猶不覺也其候目中帶淚肢體怠倦情若不怡七日之後肝傳之脾其熱在肌肉蒸出皮膚外始覺熱故曰七日發熱也其候飲食減少手足欠伸噓噯作渴八日之後脾傳之心其熱在血脈而體乃大熱其候有若驚恐手足發搐睡臥不寧九日之後心傳之肺其熱在皮毛而毒氣欲出矣其候胸膈脹滿時作吐嘔或有汗出其點始佈故曰十日見點也至十一二日而點齊熱退身涼飲食如故十三四日而起脹十五六日而化漿十七八日而回漿結痂十九二十日而脫痂收功矣

佈點之後原與時痘相同痘之順症原不必服藥但調理之法宜知約署三方以備參考如其可已竟不必用種痘之異於時痘者有二一則佈點時痘初覺甚稀而日漸增佈每至加密種者始雖覺多而日漸減退總歸於稀一則周身無害處所時痘稍遲稍便覺費手極者不拘何處並無妨礙凡孩子身抱微疴原須俟其痊可方與下苗乃爲穩當然有父母愛子心迫過時痘將起

急於要種至親好友情難固辭不得已而種之或本來無病下苗之後調養失宜致滋別症其後收苗之中即帶此病氣如驚風欬嗽頭痛腹疼之類若以此苗種無病之孩至發熱時亦必現所帶病氣之症雖不傷人而孩已受困不可不知此等病苗定當撥去不得復用若犯前顯列不宜種各條斷斷不可徇情濫種也

凡苗專取純一不雜者如以兩孩身出之痂各取幾顆以種一孩將來其痘必多在前少時或可用此法以養苗但須擇壯實之孩方能此不可施之虛弱幼小之孩也戒之慎之

右種痘條法尤在順天時之寒煖適地性之燥濕調被服之厚薄辨食品之良毒俾寒暑無侵飢飽合節笑啼有度起居有常思過半矣

和苗丹

犀黃一分要色淡層片輕者良廣黃不可用 真珠二分光圓細白者良要每粒重一二厘可用 丹砂三分如雲母片者良研極細後水飛去滕鄙

右三味各研極細合和再研千杵貯磁瓶聽用

吹耳丹

珍珠一分 丹砂二分

右二味如法研細貯瓶內遇發熱時目起紅色者是痘將出於目中也速將此丹少許左紅吹右耳右紅吹左耳兩目俱紅則兩耳俱吹輕者一次重者兩三次其紅即退凡目疾紅腫者如法吹耳亦效并治耳中脹滿流膿出血等病勿以平淡無奇而忽之

稀痘丹

犀黃五分 珍珠一錢 赤金箔五百張泥細 古墨三錢 青黛三錢澄去泥沙 丹砂三錢一錢為衣 滑石二兩研細水飛

右七味各研極細和勻再將升麻一兩紫草一兩甘草一兩三味入瓦鍋煎濃汁渣再煎濃汁渣澄清將汁慢火收厚烊入真陳阿膠一兩然後將前藥杵和乾濕調勻丸如桐子大滾上丹砂末日中晒乾貯銀瓶量孩之大小每服三丸至七丸

透痧散 初見點一二三朝用

前胡一錢 荊芥一錢 連翹二錢 紫蘇一錢 牛蒡子三錢炒研 山查炭三錢 蟬蛻一錢去泥 生甘草三分

右八味為一劑薑根或茅根煎湯代水

傷風加防風 頭痛加羌活 腹痛加赤芍 內熱加赤芍 欬嗽加杏仁貝母 傷食加神麯麥芽 氣滯加厚朴枳殼 血熱加紅花紫草 壯熱加葛根山梔 驚悸加柴胡橘紅金器 便瀉去蘆根加茅术 虛弱去前胡加丹皮茯苓 血虛加當歸生地 氣虛加黃耆白术 起遲加川芎

化漿散 四五六朝用

生黃芪一錢 牛蒡子三錢炒研 山查炭三錢 粉全當歸一錢 新會皮八分 生地黃三錢 川芎一錢 生甘草三分

右八味為一劑加蔥尖或香菌仍用茅根湯煎

痛者加白芷 癢者加天蟲 熱者加犀角黃連 漿清加熟地木香 漿不化加角針 餘並如前方加減

固元丹 固漿結痂用

焦白术一錢土炒 炙甘草一錢 丹皮一錢二分 黃芪一錢蜜炙 茯苓三錢 蟬蛻一錢洗去泥 山藥三錢 白芍二錢

右八味為一劑薑棗煎 加減隨時斟酌仍依前法

透痧以下三方舉大意以見次第神而明之存乎其人然種花本順利原無藉乎藥力縱有不虞拋不能出此範圍蓋不必服藥者十之八九間有用藥者十之一二又不得恃其順利而竟置方論於不講也

嘉慶戊辰春三月
昭文張海鵬仿梓

種痘指掌

撰人不詳

種痘指掌序

種痘一科古方書所未載

御纂醫宗金鑑始備門目提綱挈領學者固可得其宗旨矣但一切看種擇苗之法術家以爲另有秘授作專門衣鉢之計故習是業者苟不得秘授有其法而不敢輕試而人亦不之信良足慨也丙辰春偶得種痘指掌一卷其書不著撰人姓氏論種痘用苗選擇禁忌之法與金鑑足相發明而所謂專門授受者亦不外是夫種痘一法全以人事斡旋造化果循此法行之眞可萬不失一乃老于醫者猶不免有誤其故有二非見于時痘盛行之日即出于不宜種痘之兒醫者不守禁忌苟且嘗試致失萬全此豈種痘之咎歟至于種痘之先後維持調護培養本原此又在爲父母者之責并非醫者之任矣篇中誤種救解之法姑備一說或未可盡信又神苗元化丹有其名而秘其方質之吾邑老醫皆無需此而自奏神效或亦以爲姑且惑人之說存而勿論第夏月接苗一法已爲是科鑿破混沌信秘傳也外尚有朱氏種痘秘旨一書略載方劑合而觀之種痘之方盡于是矣嘉慶戊辰春日黃廷鑑識

種痘指掌　失名

種痘之道如彼嘉穀由苗而秀由秀而實固恃乎種之功尤賴夫苗之美也夫苗之美者有二曰仙苗曰神苗仙苗者不染塵穢之氣神苗者包涵健順之性苟信之者眞而見不介乎疑似藏之也固而氣無使乎洩宣屆非寒非暑之時乘天朗氣清之候以無恙之兒施出神之技種則必出出則未有不奏奇功此種痘保全之道要非淺鮮之爲也人自受生之初孕毒潛伏于腎部遇天瘟流行染觸而出名曰時痘猶鏡中之日光射及而發是亦過之使然也順痘固多而逆而凶暴者亦復不少領毒達表者主乎氣氣不和則形不繇載毒外揚者由乎血血不融則色不澤而凡稀密不勻紅紫不一甚或腰疼腹痛嗆嗽音啞隨熱隨出等症氣血雖足不及防備反爲毒肆猶迅雷不及掩耳險逆之禍可勝道哉是知非本然之毒無遇天時不正之惡癘猝然而行以致此也故有腹痛發斑者報點塌陷者種種不一況又值夫外感內傷驚悸等忤一發熱而痘即隨之感乎風者肌表爲之阻塞感乎寒者腠理爲之氷凝傷乎飲者盪其脾而二便不調傷乎食者停于中而胃氣不暢驚悸則神思散亂客忤則魂魄難收一遇嚴寒酷暑不特調護維艱病者精神亦難支持觀此而種痘之功顧不重歟蓋種痘者值天氣暢和之候選神仙有力之苗施于病病弗染之體男左女右寒于鼻孔微以純陽至健之芳氣逼其深潛未動之元根勿爲邪感勿爲熱侵至三日後頸項二處腫塊先呈俗名喜塊塊越大則痘越稀此佳兆也至六七日間身漸熱而痘出朗朗見點而身涼者氣血調和裏束完聚頓拔而起神恬氣靜穩保無虞至若無力之苗有遲至七日八日後乃身熱而驟出者此或稀密之不可定甚或延至十餘日身壯熱而湧出者乃緊密難安耳故由種而出出而如期者氣血自和無慮其勞逸無慮其縱橫無傷乎臟腑無莽乎精神身熱不甚二便如常四肢溫煖五官明潤目更有神笑容自若自內及外靡一不寧其形自然綻凸其色自然光瑩其顆粒自然圓凈縱或稍密界畫枝分成堆回匯必能應期收功勿藥有喜此種痘之所以適勝時痘而毫無疑慮者也其或思患預防可服硃砂六一散少許以珠能解骨髓中之毒熱砂能辟邪鎮心使客氣不犯內加金箔調暢氣血可壯中外元神使肌膚色潤滑石療溢結利膀胱清理六腑之邪陽從溺而出甘草和中能解諸毒初出之時如是足矣至于調攝之法不過鈎藤薄荷以治驚甘桔元參以清喉大力蟬蜕以起透升麻葛根以開肌荊芥防風以疏表山查廣皮以順氣川芎紅花以活血丹皮生地以涼血犀角黃連連翹以解熱天蟲白芷以驅風定痒歸芍銀花以滋養成痂以

此類推屈指可數石膏之清細辛麻黃之散無庸也參茂桂附之溫補大黃芒硝之攻伐甲片蜂房胎髮人齒臍帶之發酵無庸也若夫落痂之後或用參芪甘草益其氣歸芎地黃養其血山藥米仁健其脾茱朮助其元陽鹿茸河車壯其筋骨補胎元之不足俾一生之强壯若夫未種之先于耳後之筋紋尤當細驗訣曰耳下不宜冷耳上不宜熱耳後驗筋紋溫和淡紅色者此兒若與種之出痘包他吉如紋脈細淡全無血色者胎元薄也紋脈全無元不續也濁紋密佈過輪勾轉者毒將熾也紋色青紫或現青蓮茄花木筆絳桃等色雜乎其間皆血不和也紋粗直硬或根蘖亂或條直豎或更有細碎多頭者皆氣不順故也更有形如蘭花如燈花形粗色異種必佳紫密佈不分顆粒又有青黑細縷相間者勢必夾班密布難透斷不宜種又有形如鋼叉色若生鐵尤不可種及面顏晦滯氣濁神粗則知內脏壅滯亦斷不宜種倘無足諸類者種後忽露急將耳紋惡血連針刺出以犀角地黃湯爲先用透肌湯化下痘至而身不熱灼神不昏迷即其驗也更宜慎者病初愈而元神未復瘡痍甚而氣血不和皆不宜種也素患腸痢者防蟲種之不消素患食疳者防疳疾復作亦未可種也脾胃當慎者種痘雖佳使元陽外佈內之溫養恐膏疾復作亦宜謹慎也其最險者痲氣已染不顯而種非期而出則難保此醫家大患也感冒未清鼻息閉塞不辨洵種過期不出亦不可不知也時疾徧染彼雖無疾必言其故亦不可妄投也夫既得夫種之之法尤宜講其種之之苗時痘之苗其性不純總美勿用時痘盛行雖係種苗恐染時邪亦宜謹慎種出之苗或染客症體元不足苗亦無力兼恐染傳客疾不宜收用新收之苗當下即種神氣完足其驗雖易不可多用多則必密若越三日後力漸薄而滯氣臻常有瘡毒之患必俟七日元氣復來滯氣退消庶幾無患擇苗者得飽滿肥膩之漿以棉花拭收用若用痘漿取尖細潤澤者時佩身旁護好鮮者其氣壯少用亦無不出宿者多用出者少若再少用則不出者亦有之此不可不知也用時以牙箸研極細未微滴以清水末細則氣宣而易達水潤則滋澤而邪清斷不可火焙火焙則火毒侵惹苗性失而無用矣彼種痘中之獨後獨大爲報痘之醫其性易于發毒亦不宜用黑操而厚者不宜用細薄少神者亦不宜用高厚有神者苗可月餘種來必出細薄者半月外其氣已脫種之無益至若因旁人種痘沾染而出其毒與時痘不遠名曰野苗亦不宜用苗固佳矣而用之時候又各有所宜收之即種者宜于秋冬蓄而後種者宜于春夏欽藏之日鼓之者利于速生發之際尊之者貴于遲事斯道者得其所宜謹其所戒施治勿涉乎苟且嬰孩得免夭天亡豈非盡人力以代天工挽回造化之一端歟苗之陸續應手不憂無繼者尤賴傳授之得我徒交友之可深信四時之苗惟霉雨鬱蒸之候苗易敗而氣駁最難久貯不得于已必資于人苟相與匪人苗亦難信以不信之苗輕嘗漫試其害立至毒率意妄爲希圖僥倖利猶未穩害已隨之良可慨也予不揣固陋瑣瑣繁言質諸當世雖不任灌溉之優渥盡禪嘉穀亦庶幾芟柞之維勤無滋秕稗云爾

用苗忌類

有一等種痘至出時非目紅鼻衄即喉疼目爛此等痘苗取以作種出自極易亦有稀者然過不可種之兒恒多敗事名曰禍苗

一苗有性稀而或有熱發如烙者腹痛不寧昏神昏如醉者其狀若驚者直至痘齊始釋此等種類均屬險苗不可收用

一雜苗不可用蓋一人之苗性主于一一則自清數人之苗性主于紛紛則多雜故須一人之苗種之貯苗之器須多如一器中欲藏幾種必用紙各包開明日期并記稀密隨收隨用無不遂意若不分痘之多少不辨日之遠近醇疵不一即名雜苗又或因苗無幾添以別苗以圖僥倖鮮不敗事

一幼兒稟性希薄種必易出放苗不可過多須宜稀痘苗種其氣不濁不傷元神不可混施以致其咎

一過痘之苗不可用凡兒之氣血調和者得佳苗而用之中外和順全無濁氣故雖同居亦不過者易過者其氣之濁盛可知其或精神充足腠理充實者彼氣雖盛仍不受過至于易過在受過者之氣血亦不能無弊倘因其形色可觀冒然收用禍亦莫測矣

一病人之苗不可用蓋每有種時無病種後或緣外感內傷等症以致血氣不和種類雜嘉元神已缺斷勿謬收以致咎

一毒苗不可用毒苗者不特小兒素有痼毒之謂或乳母向有陰毒惡癬乳癰串癤等症其氣已毒吮之者有不受其毒乎又或有父母淫污尸死穢觸亦即毒也倘爾相觸有不變乎此二者一受于中一犯于外其或漿水未成而色先老黃間落之醫頻即焦黑無澤此謂毒苗倘一悞用非疗毒如蟲即繁密難安其禍非淺也

一火苗不可用火苗者不特小兒舊有痼疾恒多內熱其或乳母體虛火盛或時疾相傳或目疾喉痛其火熾矣吮其乳者有不罹其焰乎以致行漿時熱勢太急漿未足而旋即干燥其靨厚薄不等嵌肌抓肉鐵硬難脫此爲火苗其或悞用致發熱如烙心神燥烈其狀若驚非小便赤閉即昇衄成流矣

一苗性固佳種後有塊至六七日間微微發熱熱至三日見點初有報痘隨發正痘後補贈痘其性最純弟報痘正痘有漿而靨厚其氣性自存種出防密苗宜少用贈痘靨薄而細其性氣已薄倘或收用恒多不出

一苗性本純人力又壯天氣又和耳紋不佳强與之種而偶或僥倖後遂放胆恐多致悔　古人云胎產弗種經久瘧痢弗種瘡毒淋漓勿種

悞種救解法

前論擇苗愼矣偶有擇之不精一時悞用即觸其毒險狀多端任事者必預將頂好磁石研之極細用活雞一隻剖開滲磁石屑于雞上先煎鐵銹水一碗令兒乘熱廣飲隨將此雞乘熱覆兒背胸上吸去腹內惡毒惡火其雞即變青色其兒便覺舒爽此急救之法乘毒未定前務必施之于早也

余于時痘從事有年竊窺一二種痘其道本不相謀而時下售是術者每常棘手往往訪予予用意見少參末議如右所說孟子嘗于友處揀種痘一書翻閱之餘竊喜十搖九得不相謀而適相合有如斯也篇中所載一粒丹之四丸方詢稱寫美盡矣畧爲研出至如所云催苗之法于理爲贅何則苗之有力者一種即出何用催哉或因種而不出遂襲是語而復催之名曰補苗抑知

有禍不勝言者蓋種而不出因毒錮而卒難搖動以發阻而未易宣達催之能保無後患乎故種而不出不若聽之爲善即欲補種必俟三月已後前之苗性全無然後再種發熱時有汗甚妙不必服藥服之恐碍其說似也然余謂原無感冒因放苗如期而熱兼有微汗則膝理已暢痘自起透發表和中之道固不必矣若再發散將未粗者不齊細小者泯迹又何以彰種痘之功哉況本有選製丸丹如期進用誠無事乎藥也但人狃于是說概不服藥有汗無汗並不分清倘或毒乘火熾客症橫侵因而大汗猝至可不爲之分解又云項中有核雖大不妨其或未消回後化之余謂是塊也苗性猛而拔周身之毒萃于一處塊之所結毒之所聚也然嘗有久而不消者或消而難化者當時雖或無恙忽乘感觸蘊聚咽喉以時毒而觸毒洶湧潰爛而不可救者有矣故經久不消必服清疎之劑重用前胡薄荷加夏枯草等而後可釋其或未消又必于疎透中佐以全蝎貝母角針天蟲牛蒡等藥用生天南星研細酷調圍出其項俾得微膿而息其毒庶無後患行是道者循習此書旁參余說種痘之法已見一班矣附錄原書于左

種痘原說

痘之發也本平時行時順則順時逆則逆明斯旨即可觸類而旁通焉又何痘之不可種哉是法舊云傳自興醫古仙三白眞人憫世間小兒痘患爲最痛苦一遇險逆之症不惟父母哀告無從即名醫亦手足無措患痘者不獨行貌不堪抑亦恐其無及因將種痘一法并所用藥餌相傳以來久而無考三白眞人之名惟傳種痘者知之他未之識也習是法者勿忘神麻庶與小兒有

補云

一小兒自週歲以來即可種痘先看其氣色無諸疾病痛方可放苗漿苗靨苗咸可漿則百發百中靨則間有一二不出體氣壯盛者靨用四枚爲一苗瘦弱之兒用五枚作一苗間二日再用一苗爲催苗取漿苗法用棉花衣子兩手背胸間刺四五點要在漿足之時取之爲妙若于面部取之致有瘡痕也收漿後裹氣壯者亦即飽滿如初靨苗可留月餘或半月或二十日漿苗止可留半月若天氣熱者止宜四五日久則氣變而不可用漿苗靨苗時序久暫之不同揔酌乎天時之寒暑收苗必置于竹節內一頭塞之佩之于身以得人氣不可間斷否則用極細紙包好亦可若天氣暑熱漿苗置竹筒內涼處放好即靨苗亦不宜放身邊蓋天氣炎蒸復加人氣苗驟變矣種而不擒者稀矣

一男婦自三十以內亦可種種即如小兒看其氣色等項及諸疾病夫婦分床半月每日服滋陰補血藥一劑牛月後始可放苗女則俟其經過方可放苗法或漿苗或靨苗男左女右漿苗塞于鼻內再用些棉花衣以塞之靨苗若干以牙箸研細少滴清水包花衣內塞于鼻孔再以些花衣蓋之勿令脫出須一周時方可去苗如遇噴嚏或出仍塞鼻內至足七日方發熱熱三日則退而痘自出有熱至七日退者痘亦仍稀間有放苗至九日十日不發熱者如前再放若放苗後一二時間有嚏者其氣充暢自必易出出亦必稀

一凡種痘本日即用神皇豈一粒煎湯送通天元化丹一凡用藥多少法照前所開

一身發熱後見痘或一粒或數粒或數十百至千餘粒眼鼻

不封起居飲食如常間有未熟而先報粒者不必如時看法刺去血無妨也

一種痘切須節飲食慎寒煖勿令驚恐跌蹼及被氣觸犯年長者戒性忌色餘俱如小兒　忌猪肉鮮者并炒糟糠等物勿烘焙衣服勿烘火爐勿入火箱中臥

一忌用時苗致有變端失名非淺揔以神苗爲美神苗即種苗也

一用藥法放苗時用預製通天元化丹神皇豆一粒去殼煎湯送下豆不與小兒食至發熱時用消熱一粒丹起痘時用起痘一粒丹貫漿時用貫漿一粒丹以燈心湯送下

一放苗後兒或多食或跌蹼驚嚇痘形大異種痘者即將所製之藥如期而用亦保無虞倘伊父母必求前劑黃連石膏在所禁用以種痘所感本淺藥味妄投反生不測屢經試驗敢不愼歟

一時痘盛行勿可妄種恐預感天行氣也

一兩頰紅者不可亂種痘發必密預爲說明種亦無妨

一皮肉白而細者種之必稀黑而粗者種之必密

一醫苗取厚而小者爲上

一小兒耳後紋青紫者出痘多紅者出痘少

一發熱時有汗不必服藥服之有碍若發汗則痘乃不出矣所以與時痘異者在此

一發熱時男左女右耳垂腮下有一粒核雖極大不妨因毒聚于此痘反稀矣勿認爲痰毒及痘毒十人中間有一二無此核四五日內自消無形其或未消俟痘回後以化毒散解之

一或有痘疔如時痘法刺之出紫血以硃砂少許和藥油抹之種之後必看者爲此故也

一發熱時無汗再用通天元化丹一粒燈心湯送下

一凡種家有不種之兒當先與言明頻服發散藥則相繼而出多屬順症否則或有出逆症者殊不便矣莫若一時種之爲妙

一神苗必多方覓取于同道中不得輕用時苗或種之有致死者或種後有發毒致死者俱採時苗之過蓋苗性猛烈多致有變若夫神苗其性本柔綏萬無一失倘斷神苗即停不種另覓神苗圖種永不失名種痘者愼之

一種痘初見極細三日後必自肥大不必嫌其小而用前劑以求起發蓋種痘所感者淺藥性猛烈恐反敗事有一二日不飲食者亦不必服藥痘齊自食或兒體素嬌因痘尤弱亦不必服藥痘齊自強凡一切種痘禁忌前劑重用致有他變

一種痘初見細而白者即痘不甚稀亦勿藥爲尚

一種痘極密與時等亦不必服藥但照後所製丸丹如期用之自愈即甚密眼斷不封此種痘之神妙即可領悟時痘之看法雖云不同揔之種痘感淺時痘感深一用前劑恐遺後累屢試屢驗愼之愼之

一種家每有用前劑者或不得製藥之傳或苦于製藥之艱因以前劑求代往多差失殊不知小兒求安所以種痘即前劑之遺害未形而湯藥之强吞先苦我家相傳此法以來所種不可勝數從無失悞是知神苗之功既大製藥之法亦妙矣故時苗宜禁製藥宜勤也

是書製藥法製苗藏藥痘多痘少種法險逆二症用藥退之再發順症以及看兒不可種種則必死秘法書內不及全載必須口授心傳所以杜絕竊書之匪類耳

耳紋訣

蛛網牽絲過耳鈎　根紋細密亂針頭　最嫌深紫渾如漆　又怕虛鋪濁似油　遇著此兒須回絕　種之必定受驚憂

種痘諸法

下藥丹數與人年相配不論男女一歲至三歲三粒四歲五歲四粒六歲七歲五粒八歲九歲六粒十歲十一歲至十六七歲照前加之十八以後不過用十二丸而止然雖有定法倘年長大即稍加一二丸亦無碍也

種後幾日發熱幾日見點幾日上漿幾日回醫幾日收痂發熱揔以七日爲正若小兒本元充足用苗再輕則遲至十日者有之倘四五天即熱者藥苗之性傳經未過此兒已感時疫于種前所出者時痘而非種痘順固不受功逆亦不任咎種時當時講出然于時痘流行之際莫如不種爲高見點發熱三朝必現至于上漿回醫收痂心經則速脾經則遲未可一格而定大約九十朝見點十二三朝上漿十六七朝回醫二十日收痂若速者上漿與回收早一二日耳　種後或發熱而不見痘或不發熱亦不見痘發熱而不見痘者此固小兒痘本稀者于發熱之時或吐或瀉其毒已洩止出一二對故不見也至于不發熱而不見痘必苗宿而用之太輕隔年月重種可也下苗之後見痘標痘疔標用銅刀挑破痘疔亦然疔若甚者以藥搽之倘種痘之日值天朗氣清竟無發標者若遇陰晦之天則恒多發如不挑破則毒過而痘不能起發或現于未發熱之前或現于將見點之際其形大而發癢揔在于兩頤及人中鼻孔下隨

現隨挑若隔幾日其毒凝聚根已堅必大挑出血爲度疗即毒類也然疗更甚于發毒種本無疗如或有之其形欠而黑用銅刀挑之以四聖散塡入瘡內即愈　下苗後忌食生冷鷄肉蛋麵雞消者等物當用筍尖香菌鯽魚鮮蝦等物作淡薰湯食之令痘起發見點後不必用也　苗有好歉及有毒無毒黑閣無光經紅不淨者必有火毒光明肩潤如蜜蠟者無火毒凡小兒膚本黑色而痂偏微白此必氣血太虛其痂不可用若肌膚本白而痂黑色此又火毒所重亦不堪用并痘出愈稀則痂中火毒必輕小兒身上有瘡瘡邊之痘必多于他處其毒聚此收痂時切不可混收以作苗用小兒發熱期必以七日爲正其苗最佳若六日十二日者雖小兒元稟有殊總不若正七日者之爲妙然用之亦無妨也至若五日而熟者恐夾入時氣斷不可用十日外者究不宜用蓋種痘之道苗爲君而藥爲臣此針線之不可不明也　苗之鮮者有氣可嗅少用宿者重用太宿者不用痘密至三四百粒者其毒已散收痂作苗必重用之夏令人氣外洩苗輕則不熟不出必重用些方克有濟春令天氣發生之際苗宜輕用且宜選蜜蠟色者用之有火毒者宜慎之惟秋冬二令乃收藏之候即稍帶火氣亦不至有害全于閱歷心參非言語所能盡　用苗多少全看鮮宿鮮而大者三四个宿則遞加耳　藏苗法春季以紙包夾在書內用木板夾好不使出味厚者可用一月或放身邊夏冬用兩水洗淨日內晒乾收在石羔匣內取其乘涼之意大約可用七八日若有苗而無種處欲作度苗之謀將黃蠟兩許以紙包苗作心做爲丸子將竹管刮去外青

以白蜜灌半管以丸子放入再用蠟糊好以木塡塞管口待痘係長線沉于井中可歇兩月春季與秋季同法冬間用紙包好放在身邊一日然後夾好書內亦可二月如臨種時痂有火毒者用和苗藥和之其毒即解研苗水春秋用溫夏用涼冬用熱　苗隔有訣春秋一月苗宜厚做薄只可半月餘惟有夏來性便短冬藏月外有餘零　痘有可種不可種幼稚男女須要辨別其精神如面部有精彩喜色明亮透達印堂三根年壽無青晦之氣滿面紅光純粹上吉可種有病者不種內熱虛瘦者不種孕婦不種痢疾者不種疳膨食積者不種近隣出時痘者不種未滿五月者不種新婚者不種身有惡瘡者不種皮肉如發麵樣者不種病後元氣未復者不種生大毒正氣未還者不種肌膚傷火未愈者不種燥淡無神者不種若眼中生翳以獨腳將軍草搗爛紮臂上即退在百日內眼內有紅絲者可退在百日外者則難退製藥紮臂法附後　痘後發毒乃火氣未洩透也若用煎劑當發散滿火利便不可過用寒涼之品并外敷方附後　種痘發熱在痘前無碍痘後則危凡小兒面肉肥胖緊瘦兩種當防驚悸現可預告勿使臨時惶恐　痘之稀密在面部上推之若皮寬不緊肉頭鬆泛有神者出痘必稀肉緊皮薄而亮眼暴者出痘當重

看耳後筋紋近世諸家亦爲不少惟吾家所傳之道筋紋則不必拘執若必欲看淡紅清顯是心脾痘淡清顯是肺經痘此爲順症若青筋則險紫筋則逆無筋則大凶而不可種也

耳後筋紋訣

生死輕重天地人　千藤百蔓一根眞　倒灣有葉瘦須重　橫直無枝痘必輕　細細垂絲知欲死　絲絲蛛網定難生　白微黑點皆斯類　斷隱難明有十分

種痘指掌終

嘉慶戊辰春二月
聖文張海鵬校刊

惟其瞻涉者博。故引類比方。悉符藥論。後儒或忽爲方技家言。漁獵所及。又是末師。而非往古。甚至經典所載。鳥獸草木。亦輒轉而昧其名。不已傎乎。後漢書華陀傳。吳普從陀學。依準陀療。多所全濟。陀以五禽之戲別傳。又載魏明帝使普爲禽戲。普以其法語諸醫。疑其方術相傳。別有奇文異數。今觀普所稱本草。則神農黃帝岐伯雷公桐君醫和扁鵲。以及後代名醫之說。靡不賅載。則其多所全濟。由於稽考之勤。比驗之審。而非必別有其奇文異數。信乎非讀三世書者。不可服其藥也。世俗所傳。黃帝神農扁鵲之書。多爲後人竄易。余願得夫閎覽博物者爲之是正也。因孫君伯仲校定本草。而發其端。至其書考證精審。則讀者宜自得之。餘姚邵晉涵序。

神農本草經序

記曰。醫不三世。不服其藥。鄭康成曰。愼物齊也。孔沖遠引舊說云。三世者。一曰黃帝鍼灸。二曰神農本草。三曰素女脈訣。康成周禮注。亦曰五藥草木蟲石穀也。其治合之齊。則存乎神農子儀之術。是禮記注所謂愼物齊者。猶言治合之齊。指本草諸書而言也。沖遠既引舊說。復疑其非鄭義。過矣。漢書引本草方術。而藝文志闕載。賈公彥引中經簿。有子儀本草經一卷。不言出於神農。至隋經籍志。始載神農本草經三卷。與今分上中下三品者相合。當屬漢以來舊本。隋志又載雷公本草集注四卷。蔡邕本草七卷。今俱不傳。自別錄以後。累有損益升降。隨時條記。或傳合本文。不相別白。據陸元朗經典釋文所引。則經文與名醫所附益者。合併爲一。其來舊矣。孫君伯淵偕其從子因大觀本草黑白字書。蓋正神農本經三卷。又據太平御覽引經云。生山谷生川澤者。定爲本文。其有預草。朱崖常山零高郡縣名者。定爲後人羼入。釋本草者。以吳普本爲最古。散見於諸書徵引者。綴集之以補大觀本所未備。疏通古義。系以考證。非濬雅之才。沈鬱之思。未易爲此也。古者協陰陽之和。宣贏縮之節。凡夫含聲負氣。以及倒生旁達。蠕飛蝡動之倫。皆盡其性。遇物能名。以達於利用生生之具。儒者宜致思焉。淮南王書曰。地黃主腐骨。而甘草主生肉之藥也。又曰大戟去水。亭歷愈張。用之不節。乃反爲病。論衡曰。治風用風。治熱用熱。治邊用蜜丹。濬夫論曰。治疾當眞人參。反得支羅服。當得麥門冬。反蒸橫麥。已而不識眞。合而服之。病以浸劇。斯皆神農之緒言。

神農本草經序

儒者不必以醫名。而知醫之理。則莫過於儒者。春秋時。和與緩神于醫者也。其通周易。辨蠱之義。醫也而實儒也。世之言醫者。必首推神農。然使神農非與太乙遊。則其傳不正。非作赭鞭鉤鋸。巡五岳四瀆。則其識不廣。非以土地所生萬千類。驗其能治與否。則其業不神。傳不正。識不廣。業不神。雖日取玉石草木禽獸蟲魚米穀之屬。歷試之。親嘗之。亦僅與商賈市販等耳。於醫乎何與。吾故曰神農。于古之大儒也。考崇文總目。載食品一卷。五臟論一卷。皆醫之神農。其本久不傳。傳之者神農本草經耳。而亦無專本。唐審元奚耕之書錄解題。謂之大觀本草。讀書志謂之證類本草。厥後繆希雍有疏。盧之頤有乘雅。牢偽。皆以本經爲之主。然或參以臆說。或益以衍斷。解愈紛。義愈晦。未有考核精審。卓然有所發明者。則證古難。證古而析衷于至是。爲尤難。孫淵如觀察。偕其從子鳳卿。輯神農本草經三卷。于吳普名醫外。益以說文。爾雅。廣雅。淮南子。抱樸子。諸書。不列古方。不驗厥證。而古聖殷殷治世之意。燦然如列眉。孔子曰多識于鳥獸草木之名。又曰致知在格物。則是書也。非徒醫家之書。而實儒家之書也。其遠勝于希雍之頤諸人也。固宜。或以本草之名始見漢書平帝紀。樓護傳。幾有疑于本草經者。然神農始嘗百草。始有醫藥。見于三皇紀矣。因三百六十五種注釋爲七卷。見于陶隱居別錄矣。增一百十四種。廣爲二十卷。唐本草宗之。增一百三十三種。孟昶復加蒐定。蜀本草又宗之。至郡縣本屬後人所附益。經但云生山谷生川澤耳。洪範

以歲事爲禍。雅頌稱壽考萬年。又何疑于久服輕身延年。爲後世方士之說哉。大抵儒者之嗜學如醫然。淵源其厭也。覆審其胷襟也。辨邪正。定是非。則溫寒平熱之介也。觀察方開經學。以鴻儒名海內求其著述者。如金膏水碧之珍。鳳卿好博聞。研丹吮墨。日以儒爲事。則上溯之羲皇以前。數千年如一日。非嗜之專且久而能然耶。顧吾獨怪是編中無所謂治書辭者。安得起神農而一問之。嘉慶四年太歲在己未。冬十月望日。宜城張炯謹於瞻園之灌木莊。

校定神農本草經序

神農本草經三卷。所傳白字書。見大觀本草。按嘉祐補注序云。所謂神農本經者。以朱字名醫因神農舊條。而有增補者。以墨字別於朱字。開寶重定序云。舊經三卷。世所流傳。名醫別錄。互爲編纂。至梁貞白先生陶宏景。乃以別錄參其本經。朱墨雜書。時謂明白。據此則宋所傳黑白字書。實陶宏景手書之本。自梁以前。神農黃帝岐伯雷公扁鵲各有成書。魏吳普見之。故其說藥性主治。各家殊異。後人纂爲一書。然猶有旁注。或朱墨字之別。本經之文以是不亂。舊說本草之名。僅見漢書平帝紀及樓護傳。予按藝文志有神農黃帝食藥七卷。今本謂爲食禁。賈公彥周禮醫師疏。引其文。正作食藥。宋人不考。遂疑本草非七略中書。賈公彥引中經簿。又有子儀本草經一卷。疑亦此也。梁七錄有神農本草三卷。其卷數不同者。古今分合之異。神農之世。書契未作。說者以此疑經。如皇甫謐言。則知四卷成於黃帝。陶宏景云。軒轅已前。文字未傳。藥性所主。當以識識相因。至於桐雷。乃著在於編簡。此書當與素問同類。其言良是。且藝文志。農兵五行雜占經方神仙諸家。俱有神農書。大抵述作有本。其傳非妄。是以博物志云。太古書今見存。有神農經。春秋傳注。賈逵以三墳爲三皇之書。神農預其列。史記言。秦始皇不去醫藥卜筮之書。則此經幸與周易並存。顏之推家訓乃云。本草神農所述。而有豫章朱崖趙國常山寒高眞定臨淄馮翊等郡縣名出諸藥物。皆由後人所爲。非本文。陶宏景亦云。所出郡縣。乃後漢時制。疑仲景元化等所記。按裴駰注張衡

賦。引本草經。太一禹餘糧。一名石腦。生山谷。是古本無郡縣名。太平御覽。引經上云生山谷或川澤。下云生某山某郡。明生山谷本經文也。其下郡縣名醫所益。今大觀本。俱作黑字。或合其文。云某山川谷。某郡川澤。恐傳寫之誤。古本不若此。仲景元化後。有吳普李當之。皆修此經。當之書。世少行用。魏志華陀傳。言普從陀學。陶經籍志稱吳普本草。梁有六卷。嘉祐本草云。普修神農本草。成四百四十一種。唐經籍志。尚存六卷。今廣內不復存。惟諸書多見引。據其說藥性寒溫五味。最爲詳悉。是普書宋時已佚。今其文惟見掌禹錫所引。藝文類聚。初學記。後漢書注。事類賦諸書。太平御覽。引據尤多。足補大觀所缺。並是別錄前書。因采其文附於本經。亦略備矣。其普所稱有神農說者。卽是本經。大觀或誤作黑字。亦據增其藥物。或數浮于三百六十五種。由後人以意分合。難以定之。其藥名有禹餘糧。王不留行。徐長卿。鬼臼。郵之屬。不類太古時文。按字書以禹爲蟲。不必反禹。其餘名號。或係後人所增。或聲音傳述。改古舊稱之致。又經有云宜酒漬者。或以酒非神農時物。然本草衍義。已據素問。首言以妄爲常。以酒爲漿。謂酒自黃帝始。又按文選注引博物志。亦云杜康作酒。王著與杜康絕交書曰。康字仲寧。或云黃帝時人。則俱不得疑經矣。孔子云述而不作。信而好古。又云多識於鳥獸草木之名。今儒家拘泥耳目。未能及遠。不覩醫經本草之書。方家循守俗書。不察古本藥性異同之說。又見明李時珍作本草綱目。其名已過。並取大觀本。割裂舊文。妄加增駁。迷誤後學。予與家鳳卿集成是書。庶以補翼完經。啓蒙方伎。略以所知。加之考證。本經云。上藥本上經。中藥本中經。下藥本下經。是古以玉石草木等。上中下品。分卷。而序錄別爲一卷。陶序宋書云。本草經卷上。注云。序藥性之源本。論病名之形診。卷中云。玉石草木三品。卷下云。蟲獸果菜米合三品。此名醫所改。今依古爲次。又帝王世紀及陶序。稱四卷者。掌禹錫云。按舊本亦作四卷。韓保昇又云。神農本草上中下。并序錄。合四卷。若此。則三四之異。以有序錄。則抱朴子養生要略。太平御覽所引神農經。或云問于太乙子。或引太乙子云云。皆經所無。或亦在序錄中。後人節去之耳。至其經文。或以痒爲瘙。徂爲蛆。沙爲砂。兎爲菟之類。皆由傳寫之誤。據古訂正。勿嫌鄙俗也。其辨析物類。引據諸書。本之毛詩。爾雅。說文。方言。廣雅。諸子雜家。則鳳卿增補之力俱多云。陽湖孫星衍撰。

神農本草經卷一

魏 吳普等述

清 孫星衍 孫馮翼 同輯

上經

上藥一百二十種。爲君。主養命以應天。無毒。多服。久服不傷人。欲輕身益氣。不老延年者。本上經。

丹沙。雲母。玉泉。石鍾乳。泚石。

消石。朴消。滑石。石膽。石英。

曾青。禹餘糧。太乙餘糧。白石英。

五色石脂。白青。扁青。右玉石。上品一十八種。舊同。

昌蒲。蕃蕪。人參。天門冬。

乾地黃。北。兎絲子。牛膝。

女萎。防葵。茈胡。麥門冬。

車前子。木香。署豫。薏苡仁。

遠志。龍膽。細辛。石斛。

白英。白蒿。赤箭。奄閭子。

薯蕷。赤、黑、青、白、黃、紫、芝。

芎藭。黃耆。蘼蕪。黃連。

續斷。肉松容。防風。

丹參。淫羊藿。

蘭草。茜根。

杜若。蛇牀子。

薇銜。沙參。

姑活。雲實。

牡桂。別羈。

柏實。菌桂。

乾漆。伏苓。

杜仲。五加皮。

髮髲。右人一種。舊同。女貞實。

龍骨。麝香。牛黃。

卷柏。

絡石。

菖蒲。

天名精。

五味子。

景天。

徐長卿。

升麻。

淮木。右草上品七十三種。舊七十二種。

桑上寄生。

槁柚。右木上品二十種。舊一十九種。

蓯蓉。

白膠。

阿膠。右獸上品六種。舊同。

丹雄雞。鴈肪。右禽上品二種。舊同。

石蜜。蜜脂。

桑螵蛸。蜂子。

蒲黃。蜜蠟。

海蛤。

大棗。文蛤。

胡麻。麻蕡。右米穀上品二種。舊三種。

葡萄。

冬葵子。苜蓿。瓜蒂。

牡蠣。

瓜子。

鱉甲。

鯉魚膽。右鱗魚上品一十種。舊同。

蓬蘞。

雞頭實。右菓菜上品五種。舊五種。

苦菜。右菜上品五種。舊同。

丹沙、味甘。微寒。主身體五藏百病。養精神。安魂魄。益氣。明目。殺精魅邪惡鬼。久服。通神明不老。能化爲汞。

生丹沙。山谷。太平御覽引多有生山谷三字。大觀本作生丹陵山谷。俱作無字。老生山谷是經文。後人加郡縣耳。宜改爲白字。而以郡縣爲墨字。下皆仿此。

吳普本草曰。丹沙。神農甘。黃帝苦。有毒。扁鵲苦。李氏大寒。或生武陵。採無時。能化未成水銀。畏磁石。惡鹹水。太平御覽。

名醫曰。作末。名眞朱。光色如雲母。可析者良。生符陵山谷。采無時。

案說文云。丹。巴越之赤石也。象采丹井、象丹形。古文作日。亦作彤。沙。水散石也。頌。丹沙所化爲水銀也。管子地數篇云。山上有丹沙者。其下有鉛金。淮南子地形訓云。赤天七百歲生赤丹。赤丹七百歲生赤頌。高誘云。赤丹。丹沙也。山海經云。丹粟。粟沙。青之緩急也。沙。俗作砂。非。汞。卽頌省文。列仙傳云。赤斧

能作水漿、鍊丹、與消石服之、按金石之藥、古人云久服輕身延年者、謂當避穀、絕人道、或服數十年乃効耳、今人和肉食服之、遂多相反、轉以成疾、不可疑古書之虛誣。

雲母、味甘平、主身皮死肌、中風寒熱、如在車船上、除邪氣、安五藏、益子精、明目、久服輕身延年、一名雲珠、一名雲華、一名雲英、一名雲液、一名雲沙、一名磷石、生山谷。

名醫曰、生太山、齊盧山、及琅邪北定山石間、二月采、此錄名醫說者、卽是仲景元化、及等所說、但後人合之、無從別耳、亦以補普書不備也。

案列仙傳云、方回、鍊食雲母、抱朴子仙藥篇云、雲母有五種、五色並具、而多青者、名雲英、宜以春服之、五色並具、而多赤者、名雲珠、宜以夏服之、五色並具、而多白者、名雲液、宜以秋服之、五色並具、而多黑者、名雲母、宜以冬服之、但有青黃二色者、名雲沙、宜以季夏服之、皆是純白名磷石、可以四時長服之也、李善文選注引異物志、雲母一名雲精、入地萬歲不朽、說文無磷字、玉篇云、磷薄也、雲母之別名。

玉泉、味甘平、主五藏百病、柔筋強骨、安魂魄、長肌肉、益氣、久服耐寒暑、御覽引耐字多作能、古通、不飢渴、不老、神仙、人隱死服五斤、死三年色不變、一名玉杙、御覽又引云、玉桃、初學記引云、玉桃、服之長生不死、若不得早服之長生不死、臨死御覽引作玉盧、日服之、其尸舉天地不朽、則此疑當作桃、生山谷。

玉髓如白蜜、

吳普曰、玉泉一名玉屑、神農岐伯雷公、甘、李氏、平、畏冬華、惡青竹、御覽白玉杙如白頭公、同上、事類賦引云、白

案周禮玉府、玉齋、則供食玉、鄭云、玉是陽精之純者、食之以禦水氣、鄭司農云、王齋、當食玉屑、抱朴子

仙藥篇云、玉可以爲米酒、及地榆酒、化之爲水、亦可以蔥漿、消之爲粕、亦可餌以爲丸、亦可燒以爲粉、服之、一年以上、入水不溺、入火不灼、刃之不傷、百毒不犯也、不可用已成之器、傷人無益、當得璞玉、乃可用也、得于閬國白玉尤善、其次有南陽徐善亭部界中玉、及日南盧容水中玉、亦佳。

石鍾乳、味甘溫、主欬逆上氣、明目益精、安五藏、通百節、利九竅、下乳汁、御覽引云、一名留公乳、大觀本、作一名公乳、黑字、生山谷。

吳普曰、鍾乳、一名盧中、神農辛、桐君黃帝醫和甘、扁鵲甘無毒、御覽引云李氏、大寒、生山谷、御覽引云、太山山谷、陰處岸下、溜汁成、御覽引作溜汁所成聚、如乳汁、黃白色、空中相通、二月三月采、陰乾、凡藥本草、皆爲錄所引者、不注、惟注其出御覽諸書者、

名醫曰、一名公乳、一名虛石、一名夏石、生少室及太山、采無時、案范子計然云、石鍾乳出武都、黃白者善、凡引計然、多出范文頗異、文選注、御覽、及大觀本草、列仙傳云、卬疏、煑石髓而服之、謂之石鍾乳、鍾當爲種、說文云、乳汁也、鍾假音字、

涅石、書作礜石、擣郭璞注、山海經、引作涅石、味酸寒、主寒熱洩利、白沃陰蝕、惡創、目痛、堅筋骨齒、鍊餌服之、輕身不老、增年、一名羽碧、生山谷。

吳普曰、礜石、一名羽碧、一名羽澤、神農岐伯酸、扁鵲鹹、雷公酸、無毒、生河西、或隴西、或武都石門、采無時、岐伯、久服傷人骨、御覽

名醫曰、一名羽澤、生河西及隴西、武都石門、采無時、

案說文無礜字、玉篇云、礜石也、碧礜石也、西山經云、女牀之山、其陰多涅石、郭璞云卽礜石也、楚人名爲涅石、案名爲羽涅也、本草經、亦名曰涅石也、范子計然云、礜石出武都、淮南子俶眞訓云、以涅染緇、高誘云、涅礜石也、儁涅石作礜石、羽涅作羽碧非、

消石、味苦寒、主五藏積熱、胃張閉、滌去舊結飲食、推陳致新、除邪氣、鍊之如膏、久服輕身、御覽引云一名芒硝、大觀本、作黑字、生山谷、

吳普曰、消石、神農苦、扁鵲甘、凡出草禹錄所引、亦見御覽者、不著所出、

名醫曰、一名芒消、生益州、及五都、隴西、西羌、采無時、

案范子計然云、硝石出隴道、據名醫一名芒消、又別出芒消條、非、北山經云、京山、其陰有元礵、疑礵、卽消異文、

朴消、味苦寒、主百病、除寒熱邪氣、逐六府積聚、結固、留癖、能化七十二種石、鍊餌服之、輕身神仙、生山谷、

吳普曰、朴硝石、神農岐伯雷公無毒、生益州、或山陰、入土千歲不變、鍊之不成、不可服、御覽

名醫曰、一名消石、朴、生益州、有鹽水之陽、采無時、

案說文云、朴、木皮也、此蓋消石外裹如玉璞耳、舊作硝、俗字、

滑石、味甘寒、主身熱洩澼、女子乳難、癃閉、利小便、蕩胃中積聚寒熱、益精氣、久服輕身、耐飢、長年、生山谷、

名醫曰、一名液石、一名共石、一名脫石、一名番石、生赫陽、及太山之陰、或掖北、白山、或卷山、采無時、

案范子計然云、滑石、白滑者善、南越志云、營城縣出營石、卽滑石也、

石膽、味酸寒、主明目目痛、金創、諸痺、女子陰蝕、痛石淋、寒熱、崩中下血、諸邪毒氣、令人有子、鍊餌服之、不老、久服、增壽神仙、能化鐵爲銅、成金銀、御覽引作成、一名畫石、生山谷、

吳普曰、石膽、神農酸、小寒、李氏、大寒、桐君辛有毒、扁鵲苦無毒、御覽引云、一名黑石、一名銅勒、生光道、或句青山、二月庚子辛丑采、

名醫曰、一名黑石、一名恭石、一名銅勒、生光道、光里、句青山、二月庚子辛丑日采、

案范子計然云、石膽出隴西、光道、陶宏景云、仙經一名立制石、周禮鬻醫、凡療瘍以五毒攻之、鄭云、今醫方有五毒之藥、作之合黃丹、丹沙、雄黃、礜石、慈石、其中燒之三日三夜、其煙上著、以雞羽掃取之、以注創、惡肉破骨則盡、出圖經、曰、故翰林學士楊億嘗筆記直史館楊嶠、有瘍生於頰、人語之依鄭法合燒藥成、注之瘡中、遂愈、信方攻病之速也、

空青、味甘寒、主靑盲、耳聾、明目、利九竅、通血脈、養精神、久服輕身延年不老、能化銅鐵鉛錫作金、生山谷、

吳普曰、空青、神農甘、一經酸、久服、有神仙、玉女來、時使人志高、御覽

名醫曰、生益州及越巂山有銅處、銅精熏則生空青、其腹中空、三月中旬采、亦無時、

案西山經云、盡人之山、其下多青雄黃、郭璞云、空青曾青之屬、范子計然云、空青出巴郡、司馬相如賦云、丹

青、張揖云青、青腹也、顏師古云、青腹、今之丹青也、

曾青、味酸小寒、主目痛止淚、出風痹利關節、通九竅、破癥堅積聚、久服輕身不老、能化金銅、生山谷、

名醫曰、生蜀中及越巂、采無時、

案管子揆度篇云、案明山之曾青、荀子云、南海則有曾青、楊倞注、曾青、銅之精、范子計然云、曾青出宏農、豫章、白青出新淦、青色者善、淮南子地形訓云、青天八百歲生青曾、高誘云、青曾、青石也、

禹餘糧、味甘寒、主欬逆寒熱、煩滿下（御覽有痢字）赤白、血閉、癥瘕、大熱、煉飼服之、不飢、輕身延年、生池澤及山島中、

名醫曰、一名白餘糧、生東海及池澤中、

案范子計然云、禹餘糧出河東、列仙傳云、赤松、上華山取禹餘糧、博物志云、世傳昔禹治水、棄其所餘食于江中、而爲藥也、按此出神農經、則禹非夏禹之禹、或本名白餘糧、名醫等移其名耳、

太一餘糧、味甘平、主欬逆上氣、癥瘕血閉、漏下、除邪氣、久服、耐寒暑、不飢、輕身、飛行千里、神仙、（御覽引作若神仙）一名石腦、生山谷、

吳普曰、太一禹餘糧、一名禹哀、神農岐伯雷公甘平、李氏小寒、扁鵲甘無毒、生太山上有甲、甲中有白白中有黃、如雞子黃色、九月采、或無時、

名醫曰、生太山、九月采、

案抱朴子金丹篇云、鹽丹經、用丹沙、雄黃、雌黃、石硫黃、曾青、礬石、磁石、戎鹽、太一禹餘糧、亦用六一泥、及神室祭醮、合之三十六日成、

白石英、味甘、微溫、主消渴、陰痿不足、欬逆、（御覽引作嘔）胸鬲閉久寒、益氣、除風溼痹、（御覽引作陸溼痹）久服、輕身、（御覽作扁輕）長年、生山谷、

吳普曰、白石英、神農甘、岐伯黃帝雷公扁鵲無毒、生太山、形如紫石英、白澤、長者二三寸、采無時、（御覽引云、久服、日月光、）

名醫曰、生華陰及太山、

案司馬相如賦、有白附、蘇林云白附、白石英也、司馬貞云、出魯陽山、

紫石英、味甘溫、主心腹欬逆、（御覽引作嘔逆）邪氣、補不足、女子風寒在子宮、絕孕十年無子、久服、溫中、輕身延年、生山谷、

吳普曰、紫石英、神農扁鵲味甘平、李氏大寒、雷公大溫、岐伯甘無毒、生太山、或會稽、采無時、欲令如削紫色、逢頭如椈蒲者、

又曰、青石英、形如白石英、青端、赤後者是、赤石英、形如白石英、赤端白後者是、赤澤有光、味苦、補心氣、黃石英、形如白石英、黃色如金、赤端者是、黑石英、形如白石英、黑澤有光、（御覽掌禹錫引此節文、）

名醫曰、生太山、采無時、

青石、赤石、黃石、白石、黑石脂等、味甘平、主黃疸、洩利、腸澼、膿血、陰蝕、下血、赤白、邪氣、癰腫、疽痔、惡創、頭瘍、疥搔、久服、補髓益氣、肥健、不飢、輕身延年、五石脂、各隨五色補五藏、生山谷中、

吳普曰、五色石脂、一名青赤黃白黑符、青符、神農甘、雷公酸無毒、桐君辛無毒、李氏小寒、生南山、或海涯、采無時、赤符、神農雷公甘、黃帝扁鵲無毒、李氏小寒、或生少室、或生太山、色絳、滑如脂、黃符、李氏小寒、雷公苦、或生嵩山、色如豚腦、鴈難、采無時、白符、一名隨髓、岐伯雷公酸無毒、李氏小寒、桐君甘無毒、扁鵲辛、或生少室天堂山、或太山、黑符、一名石泥、桐君甘無毒、生洛西山空地、

名醫曰、生南山之陽、一本作南陽、又云黑石脂、一名石涅、一名石墨、

案吳普引神農甘云云、五石脂各有條、後世合爲一條也、范子計然云、赤石脂出河東、色赤者善、列仙傳云、赤須子好食石脂、

白青、味甘平、主明目利九竅、耳聾、心下邪氣、令人吐殺、諸毒、三蟲、久服通神明、輕身延年不老、生山谷、

吳普曰、神農甘平、雷公酸無毒、生豫章、可消而爲銅、（御覽）

名醫曰、生豫章、采無時、

案范子計然云、白青出巴郡、

扁青、味甘平、主目痛、明目、折跌、癰腫、金創不瘥、破積聚、解毒氣、（御覽引作解毒、）利精神、久服、輕身不老、生山谷、

吳普曰、扁青、神農雷公小寒無毒、生蜀郡、治丈夫內絕、令人有子、（御覽引云、治丈夫、）久服、輕身、

名醫曰、生朱崖武都朱提、采無時、

案范子計然云、扁青出宏農豫章、

右玉石上品一十八種、舊同、

昌蒲、味辛溫、主風寒溼痹、欬逆上氣、開心孔、補五藏、通九竅、明耳目、出聲音、久服、輕身不忘不迷、或延年、

一名昌陽、（御覽引云、生石上、一寸九節者、久服、輕身云云、大觀本、無生石上三字、右云一寸九節者良、作黑字、）生池澤、

吳普曰、昌蒲、一名堯韭、（藝文類聚引云、一名昌陽、）

名醫曰、生上洛及蜀郡嚴道、五月十二日采根、陰乾、

案說文云、菖、昌蒲也、益州生、菖、菖蒲也、廣雅云、邛昌陽、昌蒲也、周禮醢人云、昌本、鄭云、昌本、昌蒲根、切之四寸爲菹、春秋左傳云、饑以昌歜、杜預云、昌歜、昌蒲菹、呂氏春秋云、冬至後五旬七日、昌始生、昌者百草之先、於是始耕、淮南子說山訓云、昌羊去蚤蝨而來蛉窮、高誘云、昌羊、昌蒲、列仙傳云、商邱子胥食昌蒲根、務光服菖蒲韭根、離騷草木疏云、沈存中云、所謂蘭蓀、即今昌蒲是也、

鞠華、味苦平、主風頭眩腫痛、目欲脫、淚出、皮膚死肌、惡風溼痹、久服、利血氣、輕身、耐老延年、一名節華、生川澤及田野、

吳普曰、菊華、一名白華、（初學記）一名女華、一名女莖、

名醫曰、一名日精、一名女節、一名女華、一名女莖、一名更生、一名周盈、一名傅延年、一名陰成、生雍州、

正月采根。三月采葉。五月采莖。九月采花。十一月采實。皆陰乾。

案說文云。藸。治牆也。藸日精也。似秋華。或省作蕧。爾雅云。藸治牆。郭璞云。今之秋華菊。則藸、藸、蕧、皆秋華字。惟今作菊。說文以爲大菊。蘧麥。假音用之也。

人參。味甘微寒。主補五藏。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目。開心益智。久服。輕身延年。一名人衡。一名鬼蓋。生山谷。

吳普曰。人參一名土精。一名神草。一名黃參。一名血參。一名人微。一名玉精。神農甘小寒。桐君雷公苦。岐伯黃帝甘無毒。扁鵲有毒。生邯鄲。三月生葉。小兒核黑莖有毛。三月九月采根。根有頭足手面目如人狀。御覽

名醫曰。一名神草。一名人微。一名土精。一名血參。如人形者有神。生上黨及遼東。二月四月八月上旬採根。竹刀刮。暴乾。無令見風。

案說文云。藸人。藥草出上黨。廣雅云。地精。人蓯也。范子計然云。人參出上黨。狀類人者善。劉敬叔異苑云。人參一名土精。生上黨者佳。人形皆具。能作兒啼。

天門冬。味苦平。主諸暴風溼偏痹。強骨髓。殺三蟲。去伏尸。久服輕身益氣延年。一名顯勒。御覽引云。門冬一名滿冬。文。今無生山谷。

名醫曰。生泰高山。二月七月八月采根。暴乾。

案說文云。藸。藸。蘮。蘮冬也。中山經云。條谷之山。其草多藸冬。爾雅云。藸。蘮。蘮冬。列仙傳云。赤須子食天門冬。抱朴子仙藥篇云。天門冬。或名地門冬。或名筵門冬。或名顯棘。或名淫羊食。或名管松。

甘草。味甘平。主五臟六府寒熱邪氣。堅筋骨。長肌肉。倍力。金創。尰。解毒。久服輕身延年。御覽引云。一名美草。一名密甘。大觀本作鼎字。生川谷。

名醫曰。一名密甘。一名美草。一名蜜草。一名蘜。當作藸。草。生河西積沙山及上郡。二月八日除日采根。暴乾。十日成。

案說文云。甘。甘草也。蘜。大苦也。苦。大苦荅也。廣雅云。美草。甘草也。毛詩云。隰有荅。傳云。荅。大苦。爾雅云。蘜。大苦。郭璞云。今甘草。蔓延生。葉似荷。青黃。莖赤黃。有節。節有枝相當。或云。蘜似地黃。此作甘。省字。蘜。荅。通。

乾地黃。味甘寒。主折跌絕筋。傷中。逐血痹。填骨髓。長肌肉。作湯。除寒熱積聚。除痹。生者尤良。久服。輕身不老。一名地髓。生川澤。名醫曰。一名苄。一名芑。生成陽。黃土地者佳。二月八日采根。陰乾。

案說文云。苄。地黃也。禮曰。餅毛牛蹤羊苄豕薇。廣雅云。地髓。地黃也。爾雅云。苄。地黃。郭璞云。一名地髓。江東呼苄。列仙傳云。呂尚服地髓。

尤。味苦溫。主風寒溼痹。死肌。痙。直。止汗。除熱。消食。作煎餌。久服輕身延年不飢。一名山薊。藏文頗聚引作山筋。生山谷。

吳普曰。尤。一名山連。一名山芥。一名天蘇。一名山薑。藏文頗聚

名醫曰。一名山薑。一名山連。生鄭山漢中南鄭。二月三月八月九月采根。暴乾。

案說文云。蕊。山薊也。廣雅云。山薑。蕊也。白尤。牡丹也。中山經云。首山草多蕊。郭璞云。蕊。山薊也。爾雅云。尤。山薊。郭璞云。今尤似薊。而生山中。范子計然云。尤出三輔。黃白色者善。列仙傳云。涓子好餌尤。抱朴子仙藥籍云。尤一名山薊。一名山精。故神藥經曰。必欲長生。長服山精。

菟絲子。味辛平。主續絕傷。補不足。益氣力。肥健。汁去面皯。久服明目。輕身延年。一名菟蘆。生川澤。

吳普曰。菟絲。一名玉女。一名松蘿。一名鳥蘿。一名鴨蘿。一名複實。一名赤網。生山谷。御覽

名醫曰。一名菟縷。一名唐蒙。一名玉女。一名赤網。一名菟蘆。生朝鮮田野。莖延草木之上。色黃而細爲赤網。色淺而大爲菟蘆。九月采實。暴乾。

案說文云。蒙。玉女也。廣雅云。菟邱。菟絲也。女蘿。松蘿也。爾雅云。唐蒙。女蘿。女蘿。菟絲。又云。蒙。玉女。毛詩云。爰采唐矣。傳云。唐蒙。藥名。又蔦與女蘿。傳云。女蘿。菟絲。松蘿也。陸璣云。今菟絲。蔓連草上生。黃赤如金。今合藥。菟絲子是也。非松蘿。松蘿自莖松上。枝正青。與菟絲異。楚詞云。被薜荔兮帶女蘿。王逸云。女蘿。菟絲也。淮南子云。千秋之松。下有茯苓。上有菟絲。高誘注云。茯苓千歲松脂也。菟絲生其上。而無根。舊作菟。非。御覽作

牛膝。味苦酸。御覽作辛。主寒。御覽作傷寒。溼痹。四肢拘攣。膝痛不可屈伸。逐血氣。傷熱。火爛。墮胎。久服輕身耐老。御覽作能老。一名百倍。生川谷。

吳普曰。牛膝。神農甘。一經酸。黃帝扁鵲甘。李氏溫。雷公酸無毒。生河內。或臨邛。葉如夏藍。莖本赤。二月八月采。御覽

名醫曰。生河內及臨朐。二月八月十月采根。陰乾。

案廣雅云。牛莖。牛膝也。陶宏景云。其莖有節。似膝。故以爲名也。膝當爲䐃。

充蔚子。味辛。微溫。主明目益精。除水氣。久服輕身。莖主癰瘙痒。可作浴湯。一名益母。一名益明。一名大札。生池澤。

名醫曰。一名貞蔚。生海濱。五月采。

案說文云。萑。萑也。廣雅云。益母。充蔚也。爾雅云。萑。萑。郭璞云。今蔈蔚也。毛詩云。中谷有蓷。傳云。蓷。雉也。陸璣云。俗說及魏博士濟陰周元明皆云。萑。萑也。韓詩及三蒼說。悉云益母。故曾子見益母而感。劉歆曰。萑。臭穢。臭穢。卽蔈蔚也。舊作蔈。非。

女萎。味甘平。主中風暴熱。不能動搖。跌筋結肉。諸不足。久服。去面黑皯。好顏色。潤澤。輕身不老。生山谷。

吳普曰。女萎一名菝葜。一名玉馬。一名地節。一名蟲蟬。一名烏萎。一名熒。一名玉竹。神農苦。一經甘。桐君雷公扁鵲甘無毒。黃帝辛。生太山山谷。葉青黃相值如薑。二月七月采。治中風暴熱。久服輕身。御覽一名左眄。久服輕身耐老。御覽上

名醫曰一名燕一名地節一名玉竹一名馬薰生太山及邱陵立春後采陰乾

案爾雅云蕢委委郭璞云藥草也葉似竹大者如箭竿有節葉狹而長表白裏青根大如指長一二尺可啖陶宏景云按本經有女委無委蕢別錄有委蕢而爲用正同疑女委即委蕢也惟名異耳陳藏器云魏志樊阿傳膏黏一名黃芝一名地節此即委蕢防葵味辛寒主疝瘕腸洩勝光熱結溺不下欬逆溫瘧頻頻驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身一名梨蓋生川谷

吳普曰防葵一名梨蓋一名爵離一名房苑一名晨草一名利如一名方蓋神農辛小寒桐君扁鵲無毒岐伯雷公黃帝苦無毒葉如葵上黑黃二月生根根大如桔梗根中紅白六月花白七月八月實白三月三日采根御覽

名醫曰一名房慈一名爵離一名農果一名利茹一名方蓋生臨淄及蒿高太山少室三月三日采根暴乾

案博物志云防葵與狼毒相似

茈胡味苦平主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明目益精一名地熊

吳普曰茈胡一名山菜一名茹草神農岐伯雷公苦無毒生冤句二月八月采根御覽

名醫曰一名山菜一名芸蒿草葉一名芸蒿辛香可食生宏農及冤句二月八月采根暴乾

案博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白蒿長四五寸香美可食長安及河內數有之夏小正云正月采芸月令云仲春芸始生呂氏春秋云菜之美者華陽之芸皆即此也急就篇有芸顏師古注云即今芸蒿也然則是此茈胡葉矣茈柴前聲相轉名醫別錄而初條非陶宏景云本經上品有茈胡而無此晚來醫乃用之

麥門冬味甘平主心腹結氣傷中傷飽胷絡脈絕羸瘦短氣久服輕身不老不飢生川谷及隰阪

吳普曰一名馬韭一名愛冬一名忍冬一名忍陵一名不死藥一名僕壘一名隨脂一名羊韭太平御覽引云一名禹韭一名禹韭一名禹韭一名禹餘糧一名神農岐伯甘平黃帝桐君雷公甘無毒李氏甘小溫扁鵲無毒生山谷肥地葉如韭肥澤叢生采無時實青黃

名醫曰秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊蓍一名禹葭一名禹餘糧葉如韭冬夏長生生兩谷肥土石間久廢處二月三月八月十月采陰乾

案說文云葱葱冬草中山經云青要之山是多僕纍據吳普說即麥門冬也忍葱僕纍音同陶宏景云實如青珠根似穬麥故謂麥門冬

獨活味苦平主風寒所擊金瘡止痛賁豚痼疾女子疝瘕久服輕身耐老一名護光使者生川谷

吳普曰獨活一名胡王使者神農黃帝苦無毒八月采此藥有風花不動無風獨搖御覽

名醫曰一名胡王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自動生雍州或隴西南安二月八月采根暴乾

案列仙傳云山圖服羌活獨活則似二名護羌胡王皆羌字緩聲猶專諸爲專設諸庾公差爲庾公之斯非有義也

車前子味甘寒無毒主氣癃止痛利水道小便除濕痹久服輕身耐老一名當道御覽有云一名牛舌大觀本作牛遺黑字

生平澤

名醫曰一名芣苢一名蝦蟇衣一名牛遺一名勝舄生真定邱陵阪道中五月五日采陰乾

案說文云芣一曰芣苢芣苢一名馬舄其實如車令人宜子周書所說廣雅云當道馬舄也爾雅云芣苢馬舄馬舄車前郭璞云今車前草大葉長穗好生道邊江東呼爲蝦蟇衣又隱牛殘孫炎云車前一名牛耳毛詩云采采芣苢傳云芣苢馬舄馬舄車前也陸璣云馬舄一名車前一名當道喜在牛蹄中生故曰車前當道也今藥中車前子是也幽州人謂之牛舌草

木香味辛主邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋露御覽引云主氣不足本作黑字久服不夢寤魘寐御覽引云一名密蒙又云輕身

延年一名山芋生山谷

吳普曰薯蕷一名諸薯御覽作薯蕷文選張衡亦作諸薯山芋鄭樵名山芋一名玉延神農甘小溫桐君需公甘御覽作無毒或生臨朐鍾山始生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落根中白皮黃類芋御覽引云二月八月采根溫甘遂

名醫曰秦楚名玉延鄭越名土藷生嵩高二月八月采根暴乾

案廣雅云玉延藷薯預也北山經云景山草多藷薯郭璞云根似羊蹄可食今江南單呼爲薯語有輕重耳范子計然云藷薯本出三輔白色者善本草衍義云山藥上一字犯宋英廟諱下一字曰預唐代宗名豫故改下一字爲藥

益智仁味甘微寒主補不足益氣安神止小便遺溺

名醫曰一名屋蘘一名起實一名藉生真定八月采實采根無時

案說文云蘘蘘苗一曰蘘草廣雅云蘘起實蓋目也吳越春秋蘇婁於有莘氏之女名曰女嬉年壯未孳嬉於砥山得薏苡而吞之意若爲人所感因而妊孕後漢書馬援傳援在交趾常飯薏苡實用能輕身省欲以勝瘴蓋俗作薏非

澤瀉味甘寒主風寒溼痺乳難消水養五臟益氣力肥健久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行水

上，一名水瀉，一名芒芋，一名鵠瀉，生池澤。

名醫曰：生汝南五六八月采根，陰乾。

案說文云：鬻水寫也。爾雅云：藨蕮，郭璞云：今澤蕮，又發牛脣。郭璞云：毛詩傳云：水蕮也，如積斷，寸寸有節，拔之可復。毛詩云：言采其蕮，傳云：蕮水鳥也。陸璣云：今澤鳥也，其葉如車前草大，其味亦相似。徐州廣陵人食之。

遠志，味苦溫，主驚邪，傷中，補不足，除邪氣，利九竅，益智慧耳目聰明，不忘，強志倍力，久服，輕身不老。葉名小草，一名棘菀（陶隱居明醫雜言作葶藶，義引作葶藶）。一名蕀蘿（御覽作蕀蘿，要略云）。一名細草，生川谷。

名醫曰：生太山及冤句，四月采根，葉陰乾。

案說文云：蕀，蕀蕀也。廣雅云：蕀菀，遠志也。其上謂之小草。爾雅云：蕀蘿，蕀蕀。郭璞云：今遠志也，似麻黃。亦莖葉銳而黃。

龍膽，味苦澀，主骨間寒熱，驚癇，邪氣，續絕傷，定五藏，殺蠱毒，久服益智不忘，輕身，耐老。一名陵游，生山谷。

細辛，味辛溫，主欬逆頭痛，腦動，百節拘攣，風溼痺痛，死肌，久服明目，利九竅，輕身長年。一名小辛，生山谷。

吳普曰：細辛一名細草（御覽引云：一名小辛。）神農黃帝雷公桐君辛小溫，岐伯無毒，李氏小寒，如葵葉，色赤黑，一根一葉相連（御覽引云：三月八月采根。）

名醫曰：生華陰二月八月采根，陰乾。

案廣雅云：細條少辛，細辛也。中山經云：浮戲之山，上多少辛。郭璞云：細辛也。管子地員篇云：少辛大蘖。

范子計然云：細辛出華陰，色白者善。

石斛，味甘平，主傷中，除痹，下氣，補五藏虛勞，羸瘦，強陰，久服厚腸胃，輕身延年。一名林蘭（御覽引云：一名禁生，大霍本作黑字。）生山谷。

吳普曰：石斛，神農甘平，扁鵲酸，李氏寒（御覽）。

名醫曰：一名禁生，一名杜蘭，一名石蘭，生六安水傍石上，七月八月采莖，陰乾。

案范子計然云：石斛出六安。

巴戟天，味辛微溫，主大風邪氣陰痿不起，強筋骨，安五藏，補中，增志，益氣，生山谷。

名醫曰：生巴郡及下邳，二月八月采根，陰乾。

白英，味甘寒，主寒熱八疸，消渴，補中益氣，久服輕身延年。一名穀菜（元本誤作黑字。）生山谷。

名醫曰：一名白草，生益州，春采葉，夏采莖，秋采花，冬采根。

案爾雅云：苻鬼目，郭璞云：今江東有鬼目草，莖似葛，葉圓而毛，子如耳璫也，赤色叢生。唐本注：白英云：此鬼目草也。

白蒿，味甘平，主五藏邪氣，風寒溼痹，補中益氣，長毛髮，令黑，療心煩，少食，常飢，久服輕身，耳目聰明，不老。

生川澤。

名醫曰：生中山二月采。

案說文云：蘩，白蒿也。艾，冰盛也。廣雅云：蘩母，蒚蘈也。爾雅云：艾，冰益。郭璞云：今艾，白蒿，又小正云：二月采蘩。傳云：蘩由胡，由胡者繁母也。繁母者旁勃也。爾雅云：蘩皤蒿。郭璞云：白蒿，又蘩由胡。郭璞云：未詳。毛詩云：于以采蘩，傳云：蘩皤蒿也。又采蘩祁祁，傳云：蘩白蒿也。陸璣云：凡艾，白色者爲皤蒿。楚詞王逸注云：艾，白蒿也。按皤白，音義皆相近。艾是藥名，本草經無者，卽白蒿是也。名醫別出艾條，非。

赤箭，味辛溫，主殺鬼精物，蠱毒惡氣，久服益氣力，長陰，肥健，輕身，增年。一名離母，一名鬼督郵，生川谷。

吳普曰：鬼督郵，一名神草，一名閻狗，或生太山，或少室，莖箭赤無葉，根如芋子，三月四月八月采根，日乾。治癰腫（御覽）。

名醫曰：生陳倉雍州及太山少室，三月四月八月采根，暴乾。

案抱朴子云：按仙方中，有合離草，一名獨搖，一名離母，所以謂之合離，離母者，此草爲物下根如芋魁，有游子十二枚周環之，去大魁數尺，雖相須而實不相連，但以氣相感耳。別說云：今醫家見用天麻，卽是此赤箭根。

奄閭子（蕕作蕕菌。御覽作奄閭是。）味苦微寒，主五藏瘀血，腹中水氣，臚脹，留熱，風寒溼痹，身體諸痛，久服輕身延年不老，生川谷。

吳普曰：奄閭，神農雷公桐君岐伯苦小溫無毒，李氏溫，或生上黨，葉青厚，兩相當，七月花白，九月實黑。

七月九月十月采。（御覽）驢馬食仙去。

名醫曰：驢馬食之神仙，生雍州，亦生上黨及道邊，十月采實，陰乾。

案司馬相如賦有奄閭，張揖云：奄閭，蕕也，子可治疾。

析蓂子，味辛微溫，主明目目痛，淚出，除痹，補五藏，益精光，久服輕身不老。一名蔵析，一名大蔵，一名馬辛，生川澤及道旁。

吳普曰：析蓂，一名析目，一名蓂實，一名馬蔺，雷公神農扁鵲辛，李氏小溫，四月采乾，二十日生道旁，得細辛良，畏乾薑，苦參，薺實，神農無毒，生野田，五月五日采陰乾，治腹脹。（御覽）

名醫曰：一名大薺，生咸陽，四月五月采，暴乾。

案說文云：蓂，析蓂，大薺也。廣雅云：析蓂，馬辛也。爾雅云：析蓂，大薺。郭璞云：薺葉細，俗呼之曰老薺，舊作菥，非。

薺實，味苦平，主益氣，充肌膚，明目，聰慧，先知，久服不飢不老，輕身，生山谷。

吳普曰：薺實，味苦酸，平無毒，主益氣，充肌膚，明目聰慧，先知，久服不飢不老，輕身，生少室山谷，八月九月采實，暴乾。（御覽）

名醫曰：生少室，八月九月采實，日乾。

案說文云：薺，蔈，蔈生千歲，三百莖。史記龜策傳云：蓍百莖共一根。

紫芝．味苦平．主胸中結．益心氣．補中．增慧智．不忘．久食．輕身不老延年．神仙．一名丹芝．黑芝．味鹹平．主癃．利水道．益腎氣．通九竅．聰察．久食．輕身不老．延年．神仙．一名元芝．青芝．味酸平．主明目．補肝氣．安精魂．仁恕．久食．輕身不老延年．神仙．一名龍芝．白芝．味辛平．主欬逆上氣．益肺氣．通利口鼻．強志意．勇悍．安魄．久食．輕身不老延年．神仙．一名玉芝．黃芝．味甘平．主心腹五邪．益脾氣．安神．忠信和樂．久食．輕身不老延年．神仙．一名金芝．紫芝．味甘溫．主耳聾．利關節．保神．益精氣．堅筋骨．好顏色．久服．輕身不老延年．一名木芝．生山谷．（一作六種．今并．）

吳普曰．紫芝．一名木芝．

名醫曰．赤芝．生霍山．黑芝．生恆山．青芝．生太山．白芝．生華山．黃芝．生嵩山．紫芝．生高夏地上．色紫．形如桑．（御覽）六芝皆無毒．六月八月采．

案說文云．芝．神草也．爾雅云．芝．一歲三華．瑞草．禮內則云．芝栭．盧植注云．芝．木芝也．笵蒙云．采三秀于山間．王逸云．三秀謂芝草．後漢書華陀傳．有漆葉青莖散．注引陀傳曰．青莖者．一名地節．一名黃芝．主理五藏．益精氣．本字書無莖字．相傳香女廉反．列仙傳云．呂尚服澤芝．抱朴子仙藥篇云．赤者如珊瑚．白者如截肪．黑者如澤漆．青者如翠羽．黃者如紫金．而皆光明洞徹．如堅冰也．

卷柏．味辛溫．生山谷．主五藏邪氣．女子陰中寒熱．痼瘕．血閉．絕子．久服．輕身．和顏色．一名萬歲．生山谷石間．

吳普曰．卷柏．神農辛．桐君甘．（御覽引云．一名萬歲．一名豹足．一名求股．一名神枝．時．生山谷．）

名醫曰．一名豹足．一名求股．一名交時．生常山．五月七月采．陰乾．

案范子計然云．卷柏出三輔．

藍實．味苦寒．主解諸毒．殺蠱蜚．注鬼．螫毒．久服．頭不白．輕身．生平澤．

名醫曰．其莖葉可以染青．生河內．

案說文云．蔵．馬藍也．藍．染青草也．爾雅云．蔵．馬藍．郭璞云．今大葉冬藍也．周禮寧染草．鄭注云．染草．藍．

蒨．象斗之屬．夏小正五月啓灌藍．毛詩云．終朝采藍．箋云．藍．染草也．

芎藭．味辛溫．主中風入腦．頭痛．寒痹．筋攣．緩急．金創．婦人血閉．無子．生川谷．

吳普曰．芎藭．（御覽引云．一名神農黃帝岐伯雷公辛．無毒．扁鵲酸．無毒．李氏生溫熱寒．或生胡．無桃山陰．或太山．御覽作或斜谷西嶺．或太山．）葉香細．青黑文．赤如蕣．本冬夏叢生．五月華．赤．七月實．黑．莖端兩葉．三月采．根有節．似馬銜狀．

名醫曰．一名胡窮．一名香果．其葉名蘼蕪．生武功斜谷西嶺．三月四月采根．暴乾．

案說文云．菅．菅藭．香草也．芎．司馬相如說．或从弓．春秋左傳云．有山鞠窮乎．杜預云．鞠窮．所以禦溼．西山經云．號山．其草多芎藭．郭璞云．芎藭．一名江離．范子計然云．芎藭生始無．枯者善．（有脫字．）司馬相如賦．有芎藭．司馬貞引司馬彪云．芎藭似蕣本．郭璞云．今歷陽呼爲江離．

蘼蕪．味辛溫．主欬逆．定驚氣．辟邪惡．除蠱毒鬼注．去三蟲．久服．通神．一名薇蕪．生川澤．

吳普曰．蘼蕪．一名芎藭．（御覽）

名醫曰．一名茳蘼．芎藭苗也．生雍州及冤句．四月五月采葉．暴乾．

案說文云．蘼．麋蕪也．茳．蘼．蘼蕪．爾雅云．蘄．茝．蘼蕪．郭璞云．香草．葉小如委．狀．淮南子云．似蛇牀．山海經云．臭如麋蕪．司馬相如賦．有江離．蘼蕪．司馬貞引樊光云．蘼本．一名蘼蕪．根名蘄茝．

黃連．味苦寒．主熱氣．目痛．眥傷．泣出．明目．（御覽引云．主五藏．大觀本．無．）腸澼．腹痛．下利．婦人陰中腫痛．久服．令人不忘．一名王連．生川谷．

吳普曰．黃連．神農岐伯黃帝雷公苦．無毒．李氏小寒．或生蜀郡．太山之陽．（御覽）

名醫曰．生巫陽及蜀郡．太山．二月八月采．

案廣雅云．王連．黃連也．范子計然云．黃連出蜀郡．黃肥堅者善．

絡石．味苦溫．主風熱．死肌．離傷．口乾舌焦．瘰．腫不消．喉舌腫．水漿不下．久服．輕身明目．潤澤．好顏色．不老延年．一名石鯨．生川谷．

吳普曰．落石．一名鱗石．一名明石．一名縣石．一名雲華．一名雲珠．一名雲英．一名雲丹．神農苦．小溫．雷公苦．無毒．扁鵲．桐君甘．無毒．李氏大寒．云．藥中君．采無時．（御覽）

名醫曰．一名石蹉．一名略石．一名明石．一名領石．一名縣石．生太山或石山之陰．或高山巖石上．或生人間．正月采．

案西山經云．上申之山．多絡石．疑即此．郭璞云．絡．磊落大石兒．非也．虜本注云．俗名耐冬．山南人謂之石血．以其包絡石木而生．故名絡石．別錄謂之石龍藤．以石上生者良．

蒺藜子．味苦溫．主惡血．破癥結積聚．喉痹．乳難．久服．長肌肉．明目輕身．一名旁通．一名屈人．一名止行．一名豺羽．一名升推．（御覽引云．一名君水．大觀本．無文．）生平澤．或道旁．

名醫曰．一名即藜．一名茨．生馮翊．七月八月採實．暴乾．

案說文云．蒺藜．蒺也．詩曰．牆有茨．以茨爲茅茨．開屋字．爾雅云．茨．蒺藜．郭璞云．布地蔓生．細葉．子有三角．刺人．毛詩云．牆有茨．傳云．茨．蒺藜也．舊本作蒺藜．非．

黃耆．味甘．微溫．主癰疽．久敗創．排膿．止痛．大風．瘻．疾．五痔．鼠瘻．補虛．小兒百病．一名戴糝．生山谷．

名醫曰．一名戴椹．一名獨椹．一名芰草．一名蜀脂．一名百本．生蜀郡．白水漢中．二月十月采．陰乾．

肉松容．味甘．微溫．主五勞七傷．補中．除莖中寒熱痛．養五藏．強陰．益精氣．多子．婦人癥瘕．久服．輕身．生山谷．

吳普曰．肉從蓉．一名肉松蓉．神農黃帝鹹．雷公酸．小溫．（御覽作李氏小溫．）生河西．（御覽作東．）山陰．地長三四寸．叢生．或代郡．（御覽下有脫門二字．）二月至八月采．（陰乾用之．）

名醫曰．生河西及代郡鴈門．五月五日采．陰乾．

案吳普云一名肉松蓉當是古本蓉即容字俗寫從蓉非正字也陶宏景云是野馬精落地所生生時似肉當作肉從蓉非

防風味甘溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛（御覽作痛）煩滿久服輕身一名銅芸（御覽作芸）生川澤

吳普曰防風一名邁蕭一名回草一名百枝一名開根一名百韭一名百種神農黃帝岐伯桐君雷公扁鵲甘無毒李氏小寒或生邯鄲上蔡正月生葉細間青黑黃白五月花黃六月實熟三月十月采根日乾（御覽）瑣邪者良（御覽）

名醫曰一名茴草一名百枝一名屏風一名開根一名百蛩生沙苑及邯鄲瑣邪上蔡二月十月采根暴乾

案范子計然云防風出三輔白者善

蒲黃味甘平主心腹旁光寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙生池澤

名醫曰生河東四月采

案玉篇云蒲謂今蒲頭有蘂蘂上有重蘂中出黃即蒲黃陶宏景云此即蒲蘂花上黃粉也仙經亦用此考爾雅荷離其上蕖荷離與蒲蘂聲相近疑即此

香蒲味甘平主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老（御覽作老）一名雎（御覽云雎或蒲）生池澤

吳普曰雎一名雎石一名香蒲神農雷公甘生南海池澤中（御覽）

名醫曰一名醋生南海

案說文云菖草也玉篇云菖香草也又音蒲本草圖經云香蒲蒲黃苗也春初生嫩葉未出水時紅白色茸茸然周禮以爲菹

續斷味苦微溫主傷寒補不足金創續傷折跌續筋骨婦人乳難（御覽作乳難云扇中・別本・大觀本・作黑字）久服益氣力一名龍豆一名屬折生山谷

名醫曰一名接骨一名南草一名槐生常山七月八月采陰乾

案廣雅云續斷也范子計然云續斷出三輔桐君藥錄云續斷生葢延葉細莖如荏大根本黃白有汁七月八月采根

漏蘆味苦鹹寒主皮膚熱惡創疽痔瀝痹下乳汁久服輕身益氣耳目聰明不老延年一名野菰生山谷

名醫曰生霍山八月采根陰乾

案廣雅云飛廉扇蘆也陶宏景云俗中取根名鹿驪

營實味酸溫主癰疽惡創結肉跌筋敗創熱氣陰蝕不瘥利關節一名牆薇一名牆麻一名牛棘生川谷

吳普曰蔷薇一名牛勒一名牛膝一名蔷薇一名山棗（御覽）

名醫曰一名牛勒一名蔷薇一名山棘生零陵及蜀郡八月九月采陰乾

案陶宏景云即是牆薇子

天名精味甘寒主癰血血瘕欲死下血止血利小便久服輕身耐老一名麥句薑一名蝦蟆蓋一名豕首生川澤

名醫曰一名天門精一名玉門精一名地顛一名蟾蜍蘭一名鬼目生平原五月采

案說文云蓋豕首也爾雅云蔄豕首郭璞云今江東呼豨首可以爛蝨陶宏景云此即今人呼爲豨莶唐本云鹿活草是也別錄一名天蓋菁南人呼爲地松蜀西錫云陳藏器別立地菘條後人不當仍其誤

決明子味鹹平主青盲目淫腐赤白膜眼赤痛淚出久服益精光（太平御覽引作理日珠・別治字）輕身生川澤

吳普曰決明子一名草決明一名羊明（御覽）

名醫曰生龍門石決明生豫章十月采陰乾百日

案廣雅云羊蹄蘧英光也又決明羊明也爾雅云蘧蓄英光郭璞云英明也葉黃銳赤華實如山茶莢

陶宏景云形似馬蹄決明

丹參味苦微寒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣一名郄蟬草生川谷

吳普曰丹參一名赤參一名木羊乳一名郄蟬草神農桐君黃帝雷公扁鵲苦無毒李氏大寒（御覽）伯鹹生桐柏或生太山山陵陰蔓華小方如荏毛根赤四月華紫五月采根陰乾治心腹痛（御覽）

名醫曰一名赤參一名木羊乳生桐柏山及太山五月采根暴乾

案廣雅云郄蟬丹參也

茜根味苦寒主寒溼風痹黃疸補中生川谷

名醫曰可以染絳一名地血一名茹藘一名茅蒐一名蒨生蘇山二月三月采根暴乾

案說文云茜茅蒐也蒐茅蒐茹藘人血所生可以染絳从草从鬼廣雅云地血茹藘蒨也爾雅云茹藘茅蒐郭璞云今蒨也可以染絳毛詩云茹藘在阪傳云茹藘茅蒐也陸璣云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓徐廣注史記云茜一名紅藍其花染緋赤黃也按名醫別出紅藍條非

飛廉味苦平主骨節熱脛重酸疼久服令人身輕一名飛輕（已上四字原本無字）生川澤

名醫曰一名伏兎一名飛雉一名木禾生河內正月采根七月八月采花陰乾

案廣雅云伏豬木禾也飛廉扇蘆也陶宏景云今既別有漏蘆則非此別名耳

五味子味酸溫主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精（御覽引云・一名會及・大觀本・作黑字）生山谷

吳普曰五味子一名元及（御覽）

名醫曰一名會及一名元及生齊山及代郡八月采實陰乾

案說文云蔬蓋豬也玉篇豬草也蓋豬蓋豬

蓋藉也廣雅云會及五味也爾雅云味蓋郭璞云五味也蓋生子叢在蓋頭抱樸子仙藥篇云五味者五行之精其子有五味移門子服五味子十六年色如玉女入水不溺入火不灼也

旋華味甘溫主益氣去面皯（御覽作令人黑色媚好・色澤深・）其根味辛主腹中寒熱邪氣利小便久服不

飢輕身。一名筋根華。一名金沸。御覽引云一名美草。大觀本作墨字。生平澤。

名醫曰。生豫州五月采。陰乾。

案陶宏景云。東人呼爲山薑。南人呼爲美草。本草衍義云。世又謂之蔓子花。

蘭草。味辛平。主利水道。殺蠱毒。辟不祥。久服。益氣輕身。不老。通神明。一名水香。生池澤。

名醫曰。生大吳。四月五月采。

案說文云。蘭。香草也。廣雅云。菌。蘭也。易。其臭如蘭。鄭云。蘭香草也。夏小正。五月蓄蘭。毛詩云。方秉蕳分。傳云。蕳。蘭也。陸璣云。蕳卽蘭。香草也。其莖葉似藥草。澤蘭。范子計然云。大蘭出漢中。三輔。蘭出河東。宏農。白者善。元楊齊賢注李白詩。引本草云。蘭草。澤蘭。二物同名。蘭草一名水香。云。都梁是也。水經。零陵郡。都梁縣西小山上。有泉水。其中悉生蘭草。綠葉紫莖。澤蘭如薄荷。微香。荊湘嶺南人家多種之。與蘭大抵相類。顏師古以蘭草爲澤蘭。非也。

蛇牀子。味苦平。主婦人陰中腫痛。男子陰痿。溼痒。除痹氣。利關節。癲痫惡創。久服輕身。一名蛇米。生川谷及田野。

吳普曰。蛇牀一名蛇珠。御覽

名醫曰。一名蛇粟。一名虵牀。一名思鹿。一名繩毒。一名蛇棘。一名蘼蕪。生臨淄。五月采實。陰乾。

案廣雅云。虵粟。馬牀。虵牀也。爾雅云。盱虵牀。灌南子氾論訓云。亂人者若蛇牀之與蘼蕪。

地膚子。味苦寒。主旁光熱。利小便。補中益精氣。久服耳目聰明。輕身耐老。一名地膚。御覽引云一名地膚四字。經本無一名地膚四字。皆黑字。生平澤及田野。

古醫曰。一名地麥。生荊州。八月十月采實。陰乾。

案廣雅云。地葵。地膚也。列仙傳云。文賓服地膚。鄭樵云。地膚曰落帚。亦曰地扫。爾雅云。莽。馬帚。卽此也。今人亦用爲帚。

景天味苦平。主大熱。火創。身熱煩邪。惡氣。華主。女人漏下赤白。輕身明目。一名戒火。御覽引云一名水母。大觀本作火。生川谷。

名醫曰。一名火母。一名救火。一名據火。生太山。四月四日。七月七日采。陰乾。

案陶宏景云。今人皆盆養之。於屋上云以辟火。

因陳。御覽作茵蔯。味苦平。主風溼寒熱邪氣。熱結黃疸。久服輕身。益氣耐老。御覽作能老。生邱陵阪岸上。

吳普曰。因塵。神農岐伯雷公苦無毒。黃帝辛無毒。生田中。葉如藍。十一月采。御覽

名醫曰。白兔食之仙。生太山。五月及立秋采。陰乾。

案廣雅云。因塵。馬先也。陶宏景云。仙經云。白蒿。白兔食之仙。而今因陳乃云此。恐非耳。陳藏器云。茵蔯。經冬不死。因舊苗而生。故名茵陳。後加蒿字也。據此。知舊作茵蔯蒿。非。又按廣雅云。馬先。疑卽馬新蒿。亦白蒿之類。

杜若。味辛。微溫。主胸脇下逆氣。溫中。風入腦戶。頭腫痛。多涕淚出。久服。益精。御覽文類聚引作益氣。明目。輕身。一名杜衡。藝文類聚引作衡。津。生川澤。

名醫曰。一名杜蓮。一名白蓮。一名白蓉。一名若芝。生武陵及冤句。二月八月采根。暴乾。

案說文云。若。杜若。香草。廣雅云。楚蘅。杜蘅也。西山經云。天帝之上有草焉。其狀如葵。其臭如蘼蕪。名曰杜衡。爾雅云。杜土鹵。郭璞云。杜蘅也。似葵而香。楚詞云。采芳洲兮杜若。范子計然云。杜若生南郡漢中。又云。秦蘅出於關西天水。沈括補筆談云。杜若。卽今之高良薑。後人不識。又別出高良薑條。按經云一名杜衡。是名醫別出杜蘅條。非也。衡正字。俗加草。

沙參。味苦。微寒。主血積驚氣。除寒熱。補中。益肺氣。久服利人。一名知母。生川谷。

吳普曰。白沙參。一名苦心。一名識美。一名虎須。一名白參。一名志取。一名文虎。神農黃帝扁鵲無毒。岐伯鹹。李氏大寒。生河內川谷。或殷陽濱山。三月生如葵葉。莖青黃白如芥。根大白如蘘荷。三月采。御覽

名醫曰。一名苦心。一名志取。一名虎鬚。一名白參。一名識美。一名文希。生河內及冤句。殷陽續山。二月八月采根。暴乾。

案廣雅云。苦心。沙參也。其蒿。青蒿也。范子計然云。白沙參。出洛陽。白者善。

白兔藿。味苦平。主蛇虺。蜂蠆。猘狗。菜肉蠱毒。注。一名白葛。生山谷。

吳普曰。白兔藿。一名白葛。穀。御覽

名醫曰。生交州。

案陶宏景云。都不聞有識之者。想當似葛耳。唐本注云。此草荆巫山谷大有。俗謂之白葛。

徐長卿。味辛溫。主鬼物。百精。蠱毒。疫疾邪惡氣。溫瘧。久服。強悍輕身。一名鬼督郵。生山谷。

吳普曰。徐長卿。一名石下長卿。神農雷公辛。或生隴西。三月采。御覽

名醫曰。生太山及隴西。三月采。

案廣雅云。徐長卿。鬼督郵也。陶宏景云。鬼督郵之名甚多。今俗用徐長卿者。其根正如細辛。小短扁扁爾。氣亦相似。

石龍芻。味苦。微寒。主心腹邪氣。小便不利。淋閉。風溼。鬼注。惡毒。久服。補虛羸。輕身。耳目聰明。延年。一名龍蒭。一名草續斷。一名龍多。一名龍蓑。一名續斷。一名龍本。一名草毒。一名龍華。一名懸莞。神農李氏小寒。

吳普曰。龍蒭。一名龍多。一名龍蓑。一名續斷。一名龍本。一名草毒。一名龍華。一名懸莞。御覽此條：斷斷。

雷公黃帝苦無毒。扁鵲辛無毒。生梁州。七月七日采。御覽誤附續斷。莖葉。暴乾。

名醫曰。一名龍華。一名懸莞。一名草毒。生梁州溼地。五月七月采。莖葉。暴乾。

案廣雅云。龍木。龍須也。中山經云。賈超之山。其中多龍修。郭璞云。龍須也。似莞而細。生山石穴中。莖列垂。可以爲席。別錄云。一名方賓。鄭樵云。爾雅所謂蘢。虯莞也。舊作蒿。非。

薇衡。味苦平。主風溼痹。歷節痛。黃黯。洞吐舌。悸氣。賊風。鼠瘻。瘰癧。一名麋衡。生川澤

吳普曰、微蒻、一名糜蕪、一名無頗、一名承符、一名醜、一名無心、御覽

名醫曰、一名承脊、一名承肌、一名無心、一名無頗、生漢中及宛句邯鄲、七月采莖葉、陰乾。

雲實、味辛溫、主洩利、舊作瀉利、御覽作瀉利、腸癖、殺蟲、蠱毒、去邪惡結氣、止痛除熱、辟主見鬼精物、多食令人狂走、久服輕身通神明、生川谷。

吳普曰、雲實、一名員實、一名天豆、神農辛小溫、黃帝鹹、雷公苦、葉如麻、兩兩相值、高四五尺、大莖空中、六月花、八月九月實、十月采、御覽

名醫曰、一名員實、一名雲英、一名天豆、生河間、十月采、暴乾、案廣雅云、天豆、雲實也、

王不留行、味苦平、主金創、止血逐痛、出刺、除風痹內寒、久服輕身耐老、御覽作能老、增壽、生山谷。

吳普曰、王不留行、一名王不流行、神農苦平、岐伯雷公甘、三月八月采、御覽

案鄭樵云、王不留行、曰蕓宮花、曰剪金花、葉似花、實作房、

升麻、味甘辛、大觀本作甘平、主解百毒、殺百老物殃鬼、辟溫疾障、邪毒蠱、久服不夭、大觀本作主解百毒、殺百精老物殃鬼、辟溫疾、據氣節氣蠱毒、御覽、此用御覽文、一名周升麻、大觀本作周麻、舊作馬字、據吳普有云、神農、則本經當有此、今增入、生山谷、甘、御覽

吳普曰、升麻、神農甘、御覽

名醫曰、生益州、二月八月采根、日乾。

案廣雅云、周麻、升麻也、此據御覽

青囊、味甘寒、主五藏邪氣、風寒溼痹、益氣、補腦髓、堅筋骨、久服耳目聰明、不飢不老、增壽、巨勝苗也、生川谷、舊在米穀部、誤、

吳普曰、青囊、一名夢神、神農苦、雷公甘、御覽

名醫曰、生中原。

案抱樸子仙藥篇云、孝經援神契曰、巨勝延年、又云巨勝、一名胡麻、餌服之不老、耐風溼、補衰老也、

姑活、味甘溫、主大風邪氣、溼痹寒痛、久服輕身益壽耐老、一名多葵子、舊在唐本逸中、今增、

名醫曰、生河東。

案水經注解縣、引神農本草云、地有固活、女疏、銅芸、紫菀之族也、陶宏景云、方藥亦無用此者、乃有固活丸、即是野葛、一名此又名多葵子、非葵菜之多葵子、療體乖異、舊在唐本逸中、今增、

別錄、味苦微溫、主風寒溼痹、身重四肢疼酸、寒邪、歷節痛、生川谷、無藏、

名醫曰、一名別枝、一名別騎、一名鼈蔣、生藍田二月八月采、案陶宏景云、方家時有用處、今俗亦絕耳、

瓜草、味苦、主胸脇下痛、邪氣、腹脹、寒熱陰痹、久服輕身益氣耐老、御覽作補、能老、生川澤、無藏、今增、

名醫曰、生漢中五月采。

案陶宏景云、方藥不復用、俗無識者。

淮木、味苦平、主久欬上氣、腸中盧蠹、女子陰蝕、漏下、赤白沃、一名百歲城中木、生山谷、舊在唐本逸中、今增、

吳普曰、淮木、神農雷公無毒、生晉平陽河東平澤、治久欬上氣、傷中羸盧、補中益氣、御覽

名醫曰、一名炭木、生太山、采無時。

案李當之云、是樟樹上寄生樹、大衝枝在肌肉、今人皆以胡桃皮當之、非也、桐君云、生上洛、是木皮、

如厚朴、色似桂、白其理一縱一橫、今市人皆削乃以厚朴、而無正縱橫理、不知此復是何物、莫可妄假、

何者爲是也。

右草上品七十三種、舊七十二種、考六芝當爲一、升麻當白字、米穀部誤入青囊、唐本逸六種、姑活、

草、淮木、皆當入此。

牡桂、味辛溫、主上氣欬逆、結氣喉痹、吐吸、利關節、補中益氣、久服通神輕身不老、生山谷。

名醫曰、生南海。

案說文云、桂、江南木、百藥之長、從桂也、南山經云、招搖之山多桂、郭璞云、桂、葉似枇杷、長二尺餘、廣數

寸、味辛、白花、叢生山峯、冬夏常青、閒無雜木、爾雅云、梫、木桂、郭璞云、今人呼桂皮厚者、爲木桂、及單名

桂者、是也、一名肉桂、一名桂枝、一名桂心。

菌桂、味辛溫、主百病、養精神、和顏色、爲諸藥先、聘通使、久服輕身不老、而生光華、媚好、常如童子、生山谷。

名醫曰、生交趾桂林巖崖間、無骨、正圓如竹、立秋采。

案楚詞云、雜申椒與菌桂兮、王逸云、菌桂皆香木、列仙傳云、范蠡好服桂。

松脂、味苦溫、主疕、惡創、頭瘍、白禿、疥搔、風氣、安五藏、除熱、久服輕身不老、延年、一名松脂、一名松肪、生山谷。

名醫曰、生太山、六月采。

案說文云、松木也、或作𣏟、范子計然云、松脂出隴西、松膠者善。

槐實、味苦寒、主五內邪氣熱、止涎唾、補絕傷、五痔、火創、婦人乳痕、子藏益氣、生平澤。

名醫曰、生河南。

案說文云、槐木也、爾雅云、櫰、槐、大葉而黑、郭璞云、槐樹葉大色黑者名爲櫰、又守宮槐葉、晝覆宵炕、郭璞云、槐葉晝日覆合而夜炕布者、名爲守宮槐。

枸杞、味苦寒、主五內邪氣熱中、消渴、周痹、久服堅筋骨、輕身不老、御覽作耐老、一名杞根、一名地骨、一名枸忌、一名地輔、生平澤。

吳普曰、枸杞、一名枸已、一名羊乳、御覽

名醫曰、一名羊乳、一名卻暑、一名仙人杖、一名西王母杖、生常山及諸邱陵阪岸、冬采根、春夏采葉、秋采莖實、陰乾。

案說文云、𣏟、枸杞也、杞、枸杞也、廣雅云、地筋、枸杞也、爾雅云、杞、枸檵、郭璞云、今枸杞也、毛詩云、集子苞杞、傳云、杞、枸檵也、陸璣云、苦杞秋熟正赤、服之輕身益氣、列仙傳云、陸通食蠡盧木實、抱樸子仙藥篇

云。象柴。一名托盧。是也。或名仙人杖。或云西王母杖。或名天門精。或名卻老。或名地骨。或名枸杞也。

柏實。味甘平。主驚悸。安五藏。益氣。除濕痹。久服。令人悅澤美色。耳目聰明。不飢不老。輕身延年。生山谷。

名醫曰。生太山。柏葉尤良。田四時各依方而采。陰乾。

案說文云。柏。鞠也。廣雅云。桔。柏也。爾雅云。柏椈。郭璞云。禮記曰。鬯臼以椈。范子計然云。柏脂出三輔。上升價七千。中三千。一斗。

伏苓。味甘平。主胸脇逆氣。御覽作疑患。驚邪。恐悸。心下結痞。寒熱煩滿。欬逆。口焦舌乾。利小便。久服安魂魄。神不飢。延年。一名茯菟。御覽作茯神。案元本云。其石字。抱根者。名茯神。生山谷。

吳普曰。茯苓通神。桐君甘。雷公扁鵲甘無毒。或生茂州。大松根下。入地三丈一尺。二月七日采。御覽

名醫曰。其有抱根者名茯神。生太山大松下。二月八月采。陰乾。

案廣雅云。茯神。茯苓也。范子計然云。茯苓出嵩高三輔。列仙傳云。昌容采茯苓。餌而食之。史記褚先生云。傳曰。下有伏靈。上有兔絲。所謂伏靈者。在兔絲之下。狀似飛鳥之形。伏靈者千歲松根也。食之不死。

淮南子說林訓云。茯苓掘。兔絲死。舊作茯。非。

榆皮。味甘平。主大小便不通。利水道。除邪氣。久服輕身不飢。其實尤良。一名零榆。生山谷。

名醫曰。生潁川。三月采皮。取白暴乾。八月采實。

案說文云。榆。白枌。枌。榆也。廣雅云。柘。榆。梗榆也。爾雅云。榆。白枌。郭璞云。枌榆先生葉卻著莢。皮色白。又

蓋荎。郭璞云。今云刺榆。毛詩云。東門之枌。傳云。枌。白榆也。又山有穀傳云。蓋荎也。陸璣云。其皮刺如柏。其葉如榆。瀹爲茹。美滑。如白榆之類。有十種。葉皆相似。皮及木理異矣。

酸漿。味酸平。主心腹寒熱。邪結氣聚。四肢酸疼。溼痹。久服安五藏。輕身延年。生川澤。

名醫曰。生河東。八月采實。陰乾。四十日成。

案說文云。菼。酸漿也。爾雅云。菼。酸漿。郭璞云。味小酢。酢。孟子云。養其菼棘。趙岐云。菼。棘。小棘。所謂酸漿是也。

蘗木。味苦寒。主五藏。腸胃中結熱。黃疸。腸痔。止泄利。女子漏下赤白。陰陽蝕創。一名檀桓。生山谷。

名醫曰。生漢中及永昌。

案說文云。蘗。黃木也。蘗木也。司馬相如賦有蘗。張揖云。蘗木可染者。顏師古云。蘗。黃蘗也。

乾漆。味辛溫。無毒。主絕傷補中。續筋骨。填髓腦。安五藏。五緩六急。風寒溼痹。生漆去長蟲。久服輕身耐老。生川谷。

名醫曰。生漢中。夏至後采。乾之。

案說文云。漆木汁可以髹物。象形。桼如水滴而下。以漆爲漆水字。周禮載師云。漆林之征。鄭元云。故書漆林爲桼林。杜子春云。當爲漆林。

五加皮。味辛溫。主心腹疝氣。腹痛。益氣。療躄。小兒不能行。疸。創。陰蝕。一名豺漆。

名醫曰。一名豺節。生漢中及冤句。五月十月采莖。十月采根。陰乾。

案大觀本草引東華眞人煮石經云。舜常登荅梧山曰。厥金玉之香草。朕翔偃息正道。此乃五加也。魯定公母。單服五加酒。以致不死。

蔓荊實。味苦微寒。主筋骨間寒熱痹。拘攣。明目堅齒。利九竅。去白蟲。久服輕身耐老。不飢。實亦蔓。生山谷。

名醫曰。生河間南陽冤句。或平臨都鄉高岸上。及田野中。八月九月采實。陰乾。

案廣雅云。牡荊。蔓荊也。廣志云。楚荊也。牡荊。蔓荊也。據牡蔓聲相近。故本經于蔓荊。不載所出州土。以其見牡荊也。今或別爲二條。非。

辛夷。味辛溫。主五藏。身體寒風。頭腦痛。面皯。久服。下氣。輕身。明目。增年耐老。一名辛矧。御覽作引。一名侯桃。一名房木。生川谷。

名醫曰。九月采實。曝乾。

案漢書揚雄賦云。列新雉於林薄。師古云。新雉。卽辛夷耳。爲樹甚大。其木枝葉皆芳。一名新矧。史記司馬相如傳。雜以流夷。注漢書音義曰。流夷。新夷也。陶宏景云。小時氣辛香。卽離騷所呼辛夷者。陳藏器云。初發如筆。北人呼爲木筆。其花最早。南人呼爲迎春。按唐人名爲玉蕊。又曰玉蘭。

桑上寄生。味苦平。主腰痛。小兒背強。難屈。安胎。充肌膚。堅髮齒。長鬚眉。其實。明目。輕身通神。一名寄屑。一名寓木。一名宛童。生川谷。

名醫曰。一名蔦。生宏農桑樹上。三月三日采莖。陰乾。

案說文云。蔦。寄生也。詩曰。蔦與女蘿。或作樵。廣雅云。宛童。寄生樵也。又寄屏。寄生也。中山經云。龍山上多寓木。郭璞云。寄生也。爾雅云。寓木宛童。郭璞云。寄生樹。一名蔦。毛詩云蔦與女蘿。傳云。蔦。寄生也。陸璣云。蔦。一名寄生。葉似當盧。子如覆盆子。赤黑甜美。

杜仲。味辛平。主要脊痛。補中。益精氣。堅筋骨。強志。除陰下痒溼。小便餘瀝。久服輕身耐老。一名思仙。生山谷。

吳普曰。杜仲。一名木縣。一名思仙。御覽

名醫曰。一名思仲。一名木縣。生上虞及上黨漢中。二月五月六月九月采皮。

案廣雅云。杜仲。曼檢也。博物志云。杜仲皮中有絲。折之則見。

女貞實。味苦平。主補中。安五藏。養精神。除百疾。久服肥健。輕身不老。生山谷。

名醫曰。生武陵。立冬采。

案說文云。楨。剛木也。東山經云。太山上多楨木。郭璞云。女楨也。葉冬不凋。毛詩云。南山有杞。陸璣云。木杞。其樹如桤。陳藏器作棣。一名狗骨。理白滑。其子爲木蜜。子可合藥。司馬相如賦有女貞。師古曰。女貞樹。冬夏常青。未嘗凋落。若有節操。故以名焉。陳藏器云。冬青也。

木蘭。味苦寒。主身大熱。在皮膚中。去面熱。赤皰。酒皶。惡風。瘙痒。陰下痒溼。明耳目。一名林蘭。生川谷。

名醫曰一名杜蘭皮似桂而香生零陵及太山十二月采皮陰乾

案廣雅云木蘭桂蘭也劉逵注蜀都賦云木蘭大樹也葉似長生冬夏榮常以冬華其實如小柿甘美南人以爲梅其皮可食顏師古注漢書云皮似椒而香可作面膏藥

蕤核味甘溫主心腹邪氣明目目赤痛傷淚出久服輕身益氣不飢生川谷

吳普曰蕤核一名蕤神農雷公甘平無毒生池澤八月采補中強志明目久服不飢御覽

名醫曰生函谷及巴西

案說文云桵白桵棫爾雅云棫白桵郭璞云桵小木叢生有刺實如耳璫紫赤可啖一切經音義云本草作蕤今桵核是也

橘柚味辛溫主胸中瘕熱逆氣利水穀久服去臭下氣通神一名橘皮生川谷產在果部非

名醫曰生南山江南十月采

案說文云橘果出江南柚條也似橙而酢爾雅云柚條郭璞云似橙實酢生江南禹貢云厥包橘柚僞孔云大曰橘小曰柚列子湯問篇云吳楚之國有木焉其名爲橘碧樹而冬生實丹而味酸食其皮汁已憤厥之疾司馬相如賦有橘柚張揖曰柚即橙也似橘而大味酢皮厚

右木上品二十種舊一十九種考果部橘柚當入此

髮髮味苦溫主五癃關格不通利小便水道療小兒痫大人狂仍自還神化

案說文云髮根也髮鬄也髮髲也或作髲毛詩云不屑髮也鬄云鬄髲也儀禮云主婦被鬄注云被鬄讀爲髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髮鬄焉李當之云是童男髮据漢人說髮髮當是剃刑人髮或童男髮本經不忍取人髮用之故用剃餘也方家至用天靈蓋害及枯骨卒不能治病古人所無矣

右人一種舊同

龍骨味甘平主心腹鬼注精物老魅欬逆泄利膿血女子漏下癡痓堅結小兒熱氣驚癇齒主小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸痙殺精物久服輕身通神明延年生山谷

吳普曰龍骨生晉地山谷陰大水所過處是龍死骨也淸白者善十二月采或無時龍骨畏乾漆蜀椒理石龍齒神農李氏大寒治狐癇久服輕身御覽大觀本節文

名醫曰生晉地及太山巖水岸土穴中死龍處采無時

案范子計然云龍骨生河東

麝香味辛溫主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲久服除邪不夢寤厭寤生川谷

名醫曰生中臺及益州雍州山中春風取之生者益良

案說文云麝如小麋臍有香黑色麝也御覽引多字爾雅云麝父麝足郭璞云麝似麂有香

牛黃味苦平主驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼生平澤

吳普曰牛黃味苦無毒牛出入呻吟御覽作鳴吼者有之夜有光御覽作夜有光走牛字角中牛死入膽中如雞子黃傳注

名醫曰生晉地於牛得之即陰乾百日使時躁無令見日月光

熊脂味甘微寒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘡白禿面皯皰久服強志不飢輕身生山谷

名醫曰生雍州十一月取

案說文云熊獸似豕山居冬蟄

白膠味甘平主傷中勞絕要痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎久服輕身延年一名鹿角膠

名醫曰生蠻中養鹿角作之

案說文云膠昵也作之以皮考工記云鹿膠青白牛膠火赤鄭云皆謂煮用其皮或用角

阿膠味甘平主心腹內崩勞極濺濺如雞狀要腹痛四肢酸疼女子下血安胎久服輕身益氣一名傅致膠

名醫曰生東平郡煮牛皮作之出東阿

案二膠本經不著所出疑本經但作膠名醫增白字阿字分爲二條

右獸上品六種舊同

丹雄雞味甘微溫主女人崩中漏下赤白沃補虛溫中止血通神殺鬼辟不祥頭主殺鬼東門上者尤良肪主耳聾腸主遺溺脫肛裹黃皮主洩利尿白主消渴傷寒寒熱黑雌雞主風寒溼痺五緩六急安胎翮羽主下血閉雞子主除熱火瘡痓可作虎魄神物雞白蘇肥脂生平澤

吳普曰丹雞卵可作琥珀御覽

名醫曰生朝鮮

案說文云雞知時畜也籀文作雞肪肥也腸大小腸也脛鳥脛脛鳥胃也䐑糞也翮羽莖也羽鳥長毛也此作肥省文尿即脲字古文徙亦通假音字也

雁肪味甘平主風肆拘急偏枯氣不通利久服益氣不飢輕身耐老一名鴈肪生池澤

吳普曰鴈肪神農岐伯雷公甘無毒御覽引云作一名鴈肪二字殺諸石藥毒采無時

名醫曰生江南取無時

案說文云鴈鵝也鶩舒鳧也廣雅云鵝鵝倉鴨鴈也鳧鶩鴨也爾雅云舒鴈鴈郭璞云禮記曰出如舒鴈今江東呼鴨又舒鳧鶩郭璞云鴨也方言云鴈自關而東謂之鵝鵝南楚之外謂之鵝或謂之倉鴨

據說文云別有雁以爲鴻雁字無鴨字鴨即雁之急音此雁肪即鵝鴨脂也當作鴈字名醫不曉別出爲肪條又出白鴨鵝條反疑此爲鴻雁何其謬也陶蘇皆亂說之

右禽上品二種舊同

石蜜味甘平主心腹邪氣諸驚悸痙安五藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥久服強志輕身不飢不老一名石飴生山谷

吳普曰石蜜神農雷公甘氣平生河源或河梁（御覽又一引云生武都山谷）

名醫曰生武都河源及諸山石中色白如膏者良

案說文云蠭蟲甘飴也一曰螟子或作蜜中山經云平逢之山多沙石實惟蜂蜜之庭郭璞云蜜赤蜂名蜜西京雜記云南越王獻高帝石蜜五斛玉篇云蠭蟲甘飴也蘇恭云當去石字

蜂子味甘平主風頭除蠱毒補虛羸傷中久服令人光澤好顏色不老大黃蜂子主心腹復滿痛輕身益氣土蜂子主癰腫一名蜚零生山谷

名醫曰生武都

案說文云蠭飛蟲螫人者古文省作蠭廣雅云蠭蜂蜂也又上蜂蠭蜫也爾雅云土蠭郭璞云今江南大蠭在地中作房者爲土蠭啖其子即馬蠭今荊巴閒呼爲蠭又木蠭郭璞云似土蠭而小在樹上作房江東亦呼爲木蠭又食其子禮記檀弓云范則冠鄭云范蠭也方言云蠭燕趙之閒謂之蠮螉其小者謂之蠮螉或謂之蜘蛛其大而蜜謂之蠭蠭郭璞云今黑蠭穿竹木作孔亦有蜜者或呼笛師按蠭名爲范者聲相近若司馬相如賦以氾爲楓左傳溷溷即汎汎也

蜜蠟味甘微溫主下利膿血補中續絕傷金創益氣不飢耐老生山谷

名醫曰生武都蜜房木石閒

案西京雜記云南越王獻高帝蜜蠟二百枚玉篇云蠟蜜滓陶宏景云白蠟生於蜜中故謂蜜蠟說文無蠟字張有云臘別蠟非舊作蠟今據改

牡蠣味鹹平主傷寒寒熱溫瘧洒洒惡怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白久服強骨節殺邪氣延年一名蠣蛤生池澤

名醫曰一名牡蛤生東海采無時

案說文云蠣蚌屬似蠙微大出海中今民食之讀若賴又云蜃屬有三皆生於海蛤屬千歲雀所化秦謂之牡厲

龜甲味鹹平主漏下赤白破癥瘕疝瘕五痔陰蝕溼痹四肢重弱小兒顖不合久服輕身不飢一名神屋生池澤

名醫曰生南海及湖水中采無時

案廣雅云介龜也高誘注淮南云龜殺龜甲也

桑螵蛸味鹹平主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血閉要疝通五淋利小便水道一名蝕肬生桑枝上采蒸之

吳普曰桑螵蛸一名（今本脫此二字）蝕肬一名害焦一名致神農鹹無毒（御覽）

名醫曰螳蜋子也二月三月采火炙

案說文云蟁蟲蛸也或作蟷蛸蟁蛸蟷蛸子廣雅云蟷蟭鳥浪冒焦螵蛸也爾雅云不過螵蜩郭璞云一名螵焦螳蜋卵也范子計然云螵蛸出三輔上價三百舊作螵蜂相近字之誤也玉篇云蟷同螵

海蛤味苦平主欬逆上氣喘息煩滿胸痛寒熱一名魁蛤

吳普曰海蛤神農苦岐伯甘扁鵲鹹大篇頭有文文如磨齒采無時

名醫曰生南海

案說文云蛤蜃屬海蛤者百歲燕所化魁蛤一名復絫老服翼所化爾雅云魁陸郭璞云本草云魁狀如海蛤圓而厚朴有坳縱橫即今之蛤也周禮鼈人供鼈鄭司農云蜃蛤也杜子春云蜃蜃也周禮王會云東越海蛤孔晁云蛤文蛤按名醫別出海蛤條云一名魁陸一名活東非文蛤主惡瘡蝕（御覽作除蝕五痔御覽下有大孔出血大觀本作黑字）

名醫曰生東海表有文采無時

蠡魚（初學記引作鱧魚）味甘寒主溼痹面目浮腫下大水一名鮦魚生池澤

名醫曰生九江采無時

案說文云鱧鮦也鮦鱧也蘇若蔣權廣雅云鱧鱧鮦也爾雅云鱧郭璞云鮦也毛詩云魴鱧傳云鱧鮦也據說文鱧鱧鮦鱧字說文所云鮦廣志以爲江豚本草衍義以爲黑鯉魚若作鯉字說文又以爲鱧廣雅以爲鱧鱧陸璣以爲鮑魚說各不同難以詳究

鯉魚膽味苦寒主目熱赤痛青盲明目久服強悍益志氣生池澤

名醫曰生九江采無時

案說文云鯉鱣也鱣鯉也爾雅云鯉鱣舍人云鯉一名鱣郭璞注鯉云今赤鯉魚注鱣云大魚似鱣毛詩云鱣鮪發發傳云鱣鯉也据此知郭璞別爲二非矣古今注云兗州人呼赤鯉爲赤驥謂青鯉爲青馬黑鯉爲元駒白鯉爲白駒黃鯉爲黃雉

右蟲魚上品一十種舊同

藕實莖味甘平主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹生池澤

名醫曰一名蓮生汝南八月采

案說文云蕅夫渠根蓮夫渠之實也茄夫渠莖爾雅云荷芙渠郭璞云別名芙蓉江東呼荷又其莖茄其實蓮郭璞云蓮謂房也又其根藕

大棗味甘平。主心腹邪氣。安中養脾。助十二經。平胃氣。通九竅。補少氣。少津液。身中不足。大驚。四肢重。和百藥。久服輕身長年。葉覆麻黃能令出汗。生平澤。

吳普曰。棗主調中益脾氣。令人好顏色。美志氣。大觀本草引吳氏本草

名醫曰。一名乾棗。一名美棗。一名良棗。八月采。暴乾。生河東。　案說文云。棗。羊棗也。爾雅云。遵羊棗。郭璞云。今河東猗氏縣出大棗。子如雞卵。

蒲萄味甘平。主筋骨澤。益氣。倍力。強志。令人肥健。耐飢忍風寒。久食輕身不老延年。可作酒。生山谷。

郭璞云。實小而圓。紫黑色。今俗呼之爲羊矢棗。又洗大棗。

名醫曰。生龍西五原敦煌。

案史紀大宛列傳云。大宛左右。以蒲萄爲酒。漢使取其實來。於是天子始種苜蓿。蒲萄。肥饒地。或疑此本經不合有蒲萄。名醫所增。當爲黑字。然周禮場人云。樹之果蓏。珍異之物。鄭元云。珍異。葡萄枇杷之屬。則古中國本有此。大宛種類殊常。故漢特取來植之。舊作葡。據史記作蒲。

蓬藥味酸平。主安五藏。益精氣。長陰。令堅。強志。倍力有子。久服輕身不老。一名覆盆。生平澤。

吳普曰。缺盆。一名決盆。御覽甄氏本草曰。覆盆子。一名馬藨。一名陸荊。同上

名醫曰。一名陵藨。一名陰藨。生荊山及冤句。

案說文云。藨。木也。莖缺盆也。廣雅云。蔵盆。陸英莓也。爾雅云。蓋。蔵盆。郭璞云。覆盆也。實似莓而小。亦可食。毛詩云。葛藟藟之。陸璣云。一名巨瓜。似燕薁。亦逕蔓。葉似艾。白色。其子赤可食。列仙傳云。昌容食蓬蘽根。李當之云。即是人所食莓。陶宏景云。蓬藨是根名。覆盆是實名。

雞頭實味甘平。主漏精。益精氣。強志令耳目聰明。久服輕身不飢。耐老。神仙。一名鳧脛。

山川云。雞頭已瘦。高誘云。水中芡。幽州謂之雁頭。古今注云。葉似荷而大。葉上蹙縐如沸。實有芒刺。其中有米。可以度飢。即今鳧子也。

鳧脛。豚實。生池澤。

名醫曰。一名芡。生甾澤。八月采。

案說文云。芡。雞頭也。廣雅云。蔆芡。雞頭也。周禮籩人加籩之實芡。鄭元鳥芡雞頭也。方言云。蔆芡雞頭也。北燕謂之蔆。青徐淮泗之間謂之芡。南楚江湘之間謂之雞頭。或謂之雁頭。或謂之烏頭。淮南子說山川云。雞頭已瘦。高誘云。水中芡。幽州謂之雁頭。古今注云。葉似荷而大。葉上蹙縐如沸。實有芒刺。其中有米。可以度飢。即今鳧子也。

右果。上品五種。舊六種。今以橘柚入木。

胡麻味甘平。主傷中虛羸。補五內。御覽作益氣力。長肌肉。填髓腦。久服輕身不老。一名巨勝。藥名胥蕤。生川澤。

吳普曰。胡麻一名方金。神農雷公甘無毒。一名狗蝨。立秋采。

名醫曰。一名狗蝨。一名方莖。一名鴻藏。生上黨。

案廣雅云。狗蝨。巨勝。藨蕫。胡麻也。孝經援神契云。鉅勝延年。宋均云。世以鉅勝爲苟杞子。陶宏景云。本生大宛。故曰胡麻。按本經已有此。陶說非也。且與麻實並列。胡之言大。或以葉大於麻。故名之。

麻蕡味辛平。主五勞七傷。利五藏。下血寒氣。多食令人見鬼狂走。久服通神明輕身。一名麻勃。麻子。味甘平。主補中益氣。肥健不老。神仙。生川谷。

吳普曰。麻子中仁。神農岐伯辛。雷公扁鵲無毒。不欲牡厲白蘞。先藏地中者。食殺人。麻藍。一名麻蕡。一名寄。欲。一名寄蔦。神農辛。岐伯有毒。雷公甘。摮牡厲白蘞。葉上有毒。食之殺人。麻勃。一名花。雷公辛無毒。摮牡厲。御覽

名醫曰。麻勃。此麻花上勃勃者。七月七日采。良。子九月采。生太山。

案說文云。麻。與枲同。人所治在屋下。枲麻也。麤枲實也。或作蕡。學。麻母也。麤。學。麻母也。麤。學。麻母也。麤

案說文云。茶。苦菜也。廣雅云。游冬。苦菜也。爾雅云。茶。苦菜。又檟。苦荼。郭璞云。樹小如栀子。冬生葉。可煮作羹。今呼早採者爲茶。晚取者爲茗。一名荈。蜀人名之苦菜。陶宏景云。此卽是今茗。茗一名荼。又令人不眠。亦凌冬不凋而變其止生益州。唐本注駁之非矣。還與荈音相近。

右菜。上品五種。衆同。

神農本草經卷二

中經

中藥一百二十種爲臣。主養性以應人。無毒有毒斟酌其宜。欲遏病補羸者。本中經。

雄黃。　雌黃。　石流黃。　石脂。　慈石。　凝水石。　陽起石。　水銀。　孔公孽。　殷孽。　鐵精落。　理石。　長石。　石蜜。　右玉。石。中品十種。　乾薑。　泉耳實。　葛根。　孔公孽。　菖蒲。　麻黃。　通草。　菖蒲。　右玉。石。中品十種。　當歸。　秦艽。　括樓。　麻黃。　盟蟲。　元參。　白蔹。　牡蠣。　苦參。　芍藥。　白蔹。　牡蠣。　貝母。　知母。　百合。　石龍芮。　狗脊。　黃芩。　茅根。　紫菀。　白鮮皮。　紫參。　紫草。　酸醬。　白薇。　水萍。　藁本。　石韋。　防己。　王瓜。　地榆。　牡丹。　蔓荊實。　海藻。　澤蘭。　款冬華。

雄黃。味苦平寒。主寒熱。鼠瘻惡創。疽痔死肌。殺精物。惡鬼。邪氣。百蟲毒。勝五兵。鍊食之。輕身神仙。一名黃食石。生山谷。

名醫曰。生武都敦煌山之陽。采無時。

吳普曰。雄黃。神農苦。山陰有丹雄黃。生山之陽。故曰雄。是丹之雄。所以名雄黃也。

案西山經云。高山其下多雄黃。郭璞云。晉太興三年。高平郡界有山崩。其中出數千斤雄黃。抱朴子僞藥篇云。雄黃當得武都山所出者。純而無雜。其亦如雞冠。光明曄曄。乃可用耳。其但純黃似雄黃。色無赤光者。不任以作仙藥。可以合理病藥耳。

石流黃。流黃。覽引作硫。御覽引云石流黃。主益肝氣明目。石流黃。生羌道山谷。味酸溫。主婦人陰蝕。疽痔惡血。堅筋骨。除頭禿。能化金銀銅鐵奇物。御覽引云石流黃。白色

吳普曰。硫黃。一名石留黃。神農黃帝雷公鹹有毒。醫和扁鵲苦無毒。或生易陽。或河西。或五色。黃是潘水石液也。潘。卽鄉古字。燒令有紫焰者。八月九月采。治婦人血結。御覽云。治婦人絕孕。金銀銅鐵。

名醫曰。生東海牧羊山及太山河西山。礬石液也。

案范子計然云。石流黃出漢中。又云劉瓢餌石流黃而更少。劉逵注吳都賦云。流黃土精也。

雌黃。味辛平。主惡創頭禿痂疥。殺毒蟲蝨。身痒。邪氣諸毒。鍊之久服。輕身增年不老。生山谷。

馬先蒿。　積雪草。　女菀。　王孫。　蜀羊泉。　鹿藿。　假蘇。　翹根。右草。中品四十九種。舊四十六種。　白蒺藜。　山茶英。　桑根白皮。　竹葉。　吳茱萸。　尼子。　松蘿。　枳實。　厚朴。　秦艽。　紫。　豬。　白棘。　龍眼。　衝矛。　合歡。右木。中品一十七種。舊闕。　白馬蓋。　鹿茸。　牛角鰓。　殺羊角。　羚羊角。　犀角。右獸。中品七種。舊闕。　燕屎。　天鼠屎。右禽。中品二種。舊三種。　蝟皮。　鱉甲。　蠶蛹。　蜂房。　白僵蠶。　活蟲。　烏賊魚骨。　蛇魚甲。　鹿角。　石龍子。　木蠹。　蝨。　伏翼。右蟲。魚。中品一十七種。舊十六種。　蝱。　雞子。　梅實。右果。中品一種。舊闕。　大豆黃卷。赤小豆。　粟米。　黍米。右米。穀。中品三種。舊二種。　蜜。　水蘇。右菜。中品三種。舊闕。

蓯蓉。　慈實。　菖蒲。

名醫曰生武都、與雄黃同山生、其陰山有金、金精黃、則生雌黃、采無時。水銀、味辛寒、主疥瘙痂瘙白禿、殺皮膚中蟲、鹽胎除熱、殺金銀銅鐵毒、鎔化還復爲丹、久服神仙不死、生平土。

名醫曰、一名汞、生符陵出於丹砂。

案說文云、頌丹沙所化爲水銀也、廣雅云水銀謂之汞、淮南子地形訓云、白礜九百歲生白頌、白頌九百歲生白金、高誘云白頌、水銀也。

石膏、味辛微寒、主中風寒熱心下逆氣、驚喘口乾、苦焦不能息、腹中堅痛、除邪鬼、產乳金創、生山谷。

名醫曰、一名細石、生齊山及齊盧山、魯蒙山、采無時。

慈石、味辛寒、主周痺風溼、股節中痛不可持物、洗洗酸消、除大熱煩滿及耳聾、一名元石、生山谷。

吳普曰、慈石、一名戀君。

名醫曰、一名處石、生太山、及慈山山陰有鐵處則生其陽、采無時。

案北山經云、灌題之山其中多慈石、郭璞云可以取鐵、管子地數篇云、山上有慈石者、下必有銅、呂氏春秋精通篇云、慈石召鐵、淮南子說山訓云、慈石能引鐵、只作慈、舊作磁、非、名醫別出元石條、亦非、

凝水石、味辛寒、主身熱腹中積聚、邪氣、皮中如火燒、煩滿、水飲之久服不飢、一名白水石、生山谷。

吳普曰、神農辛、岐伯鹹、扁鵲甘無毒、李氏大寒、或生邯鄲、采無時、如雲母色、名寒水石。

名醫曰、一名寒水石、一名鹽水石、鹽之精也、生常山、又中水縣及邯鄲。

案范子計然云、凝水石出河東、色澤者善。

陽起石、味鹹微溫、主崩中漏下、破子藏中血、癥瘕結氣、寒熱、腹痛無子、陰痿不起、（御覽引、作陰陽不合）補不足、（御覽引、有句讀二字。）一名白石、生山谷。

吳普曰、陽起石、神農扁鵲酸無毒、桐君雷公岐伯鹹無毒、李氏小寒、或生太山、（御覽引云、或鹹起山、采無時。）

名醫曰、一名石生、一名羊起石、雲母根也、生齊山及琅邪、或雲山陽起山、采無時。

孔公孽、味辛溫、主傷食不化、邪結氣、惡創、疽瘻、痔、利九竅、下乳汁。（御覽引云、一名流石、大觀本、作鳥字。）生山谷。

吳普曰、孔公孽、神農辛、岐伯鹹、扁鵲酸無毒、色青黃。

名醫曰、一名通石、殷孽根也、青黃色、生梁山。

殷孽、味辛溫、主爛傷瘀血、洩利寒熱、鼠瘻瘰瘕結氣、一名蓋石、生山谷、（按此當與孔公孽爲一條。）

名醫曰、鍾乳根也、生趙國、又梁山及南海、采無時。

鐵精、平、主明目化銅、鐵落、味辛平、主風熱惡創、瘙疽創、痂疥、氣在皮膚中、鐵、主堅肌耐痛、生平澤、（疑爲三條。今井。）

名醫曰、鐵落一名鐵液、可以染皁、生牧羊及祝城或析城、采無時。

案說文云、鐵、黑金也、或省作鐵、古文作銕。

理石、味辛寒、主身熱、利胃解煩、益精明目、破積聚、去三蟲、一名立制石、生山谷。

名醫曰一名飢石、如石膏、順理而細、生漢中及廬山、采無時。

長石、味辛寒、主身熱、四肢寒厥、利小便、通血脈、明目去翳、眇、下三蟲、殺蠱毒、久服不飢、一名方石、生山谷。

吳普曰、長石一名方石、一名直石、生長子山谷、如馬齒、潤澤玉色、長鮮、服之不飢、（御覽）

名醫曰一名土石、一名直石、理如馬齒、方而潤澤玉色、生長子山、及太山陰、淄、采無時。

廣雅、味辛平、主蠱毒、及蛇菜肉諸毒、惡創、生川谷。

名醫曰、一名推將、一名推石、生益州。

案陶宏景云、俗方及仙經、並無用此者、亦相與不復識。

石玉、中品、一十四種、備十六種、考鐵落、鐵宜與鐵精爲一。

乾薑、味辛溫、主胸滿欬逆上氣、溫中止血、出汗、逐風溼、痹、腸澼、下利、生者尤良、久服去臭氣、通神明、生川谷。

名醫曰、生楗爲及荊州揚州、九月采。

案說文云、薑、禦溼之菜也、廣雅云、荷、薑、蓋也、呂氏春秋本味篇云、和之美者、陽樸之薑、高誘注陽樸地名、在蜀郡、司馬相如上林賦、有此薑云云。

菜耳實、味甘溫、主風頭、寒痛、風溼、周痹、四肢拘攣痛、惡肉死肌、久服益氣、耳目聰明、強志輕身、一名胡菜、一名地葵、生川谷。

名醫曰、一名葅、一名常思、生安陸及六安田野、實熟時采。

案說文云、菥、卷耳也、苔、卷耳也、廣雅云、苔耳、蒐、常枲、胡枲、枲耳也、爾雅云、葹、耳、苔耳、郭璞云、江東呼爲常枲、形似鼠耳、叢生如盤、毛詩云、采采卷耳、傳云、卷耳、苔耳也、陸機云、葉青白色、似胡荽、白華、細莖蔓生、可羹、爲茹、滑而少味、四月中生子、正如蟹人耳璫、今或謂之耳璫草、鄭康成謂是白胡荽、幽州人謂之爵耳、淮南子覽冥訓云、位卑尊高、高誘云、蔈者、蔈耳、枲名也、幽冀謂之檀、菜、雒下謂之胡枲、

葛根、味甘平、主消渴、身大熱、嘔吐、諸痹、起陰氣、解諸毒、葛穀、主下利、十歲已上、一名雞齊根、生川谷。

吳普曰、葛根、神農甘、生太山。（御覽）

名醫曰、一名鹿藿、一名黃斤、生汶山、五月采根、暴乾。

括樓根、味苦寒、主消渴、身熱煩滿、大熱、補虛安中、續絕傷、一名地樓、生川谷及山陰。

吳普曰、括樓、一名澤巨、一名澤姑。（御覽）

名醫曰、一名果蓏、一名天瓜、一名澤姑、實名黃瓜、二月八月采根、暴乾、三十日成、生宏農。

案說文云、蓏、蓏蔓果蓏也、廣雅云、王白瓜也、（當爲王爾雅云、果蓏之實、括樓、郭璞云、今齊人呼之爲天瓜、毛詩云、果蓏之實、亦施于宇、傳云、果蓏、括樓也、呂氏春秋云、王善生、高誘云、善或作瓜、瓠瓜也、案呂氏春秋善字乃蓏之誤。

苦參、味苦寒。主心腹結氣、癥瘕積聚、黃疸、溺有餘瀝、逐水除痺、脂中、明目、止淚。一名水槐、一名苦蠶。生山谷及田野。

名醫曰、一名地槐、一名蘧槐、一名騫槐、一名白莖、一名虎麻、一名野莖、一名禄曰、一名陵郎。生汝南。三月八月十月采根、暴乾。

當歸、味甘溫。主欬逆上氣、溫瘧、寒熱、洗在皮膚中、大醫本・洗苦菊・婦人漏下絕子、諸惡創瘡金創、煮飲之。一名乾歸。生川谷。

吳普曰、當歸、神農黃帝桐君扁鵲甘無毒、岐伯雷公辛無毒、李氏小溫、或生羌胡地。

名醫曰、生隴西二月八月采根、陰乾。

案廣雅云、山蘄、當歸也、爾雅云、薛、山蘄、郭璞云、今似蘄而粗大、又薛、白蘄、郭璞云、即上山蘄、范子計然云、當歸出隴西、無枯者善。

麻黃、味苦溫。主中風傷寒頭痛溫瘧、發表出汗、去邪熱氣、止欬逆上氣、除寒熱、破癥堅積聚。一名龍沙。

吳普曰、麻黃一名卑相、一名卑盭、神農雷公苦無毒、扁鵲酸無毒、李氏平、或生河東、四月、立秋采、御覽

名醫曰、一名卑相、一名卑鹽、生晉地及河東、立秋采莖、陰乾令青。

案廣雅云、龍沙、麻黃也、麻黃莖、狗骨也、范子計然云、麻黃出漢中三輔。

通草、御覽作蒲草・味辛平。主去蝨蟲、除脾胃寒熱、通利九竅血脈關節、令人不忘。一名附支。生山谷。

吳普曰、蓲草、一名丁翁、一名附支、神農黃帝辛、雷公苦、生石城山谷、葉菁莖延、止汗、自正月采、御覽

名醫曰、一名丁翁、生石城及山陽、正月采枝、陰乾。

案廣雅云、附支、蓲草也、中山經云、升山其草多寇脫、郭璞云、寇脫草、生南方、高丈許、似荷葉、而莖中有瓤、正白、蓉陵人植而日灌之以爲樹也、爾雅云、雕南、活、郭璞注同、又倚商、活脫、郭璞云、即雕南也、范子計然云、蓲草出三輔。

芎藭、味苦平。主邪氣腹痛、除血痺、破堅積寒熱、疝瘕、止痛、利小便、益氣。藏文頻聚引云・一名白芷・大觀本・作黑字・生川谷及邱陵。

吳普曰、芎藭、神農苦、桐君甘無毒、岐伯鹹、李氏小寒、雷公酸。一名甘積、一名鮮倉、一名鼎、一名餘容、一名白芷、三月三日采、御覽

名醫曰、一名白芷、一名餘容、一名雩食、一名解食、一名鋌、生中岳、二月八月采根、暴乾。

案廣雅云、蠻夷、芎藭也、白芷、牡丹也、北山經云、繡山其草多芎藭、郭璞云、芎藭一名辛夷、亦香草屬、毛詩云、贈之以芎藭、傳云、芎藭、香草、范子計然云、芎藭出三輔、崔豹古今註云、芎藭有三種、有草芎藭、有木芎藭、木有花、大而色深、俗呼爲牡丹、非也、又云、一名可離。

蠡實、味甘平。主皮膚寒熱、胃中熱氣、風寒溼痺、堅筋骨、令人喜食、久服輕身、花葉、去白蟲、一名劇草、一名三堅、一名豕首。生川谷。

吳普曰、蠡實、一名劇草、一名三堅、一名劇蕩、御覽一名澤蓋、一名豕首、神農黃帝甘辛無毒、生宛句、五月采、御覽上

名醫曰、一名蕩實、生河東、五月采實、陰乾。

案說文云、蕩草也、似蒲而小、根可作飯、廣雅云、馬薞、蕩也、月令云、仲冬之月、荔挺出、鄭云、荔挺、馬薞也、高誘注淮南子云、荔馬、荔草也、通俗文云、一名馬蘭、顏之推云、此物河北平澤率生之、江東頗多、種于階庭、但呼爲旱蒲、故不識馬薞。

瞿麥、味苦寒。主關格、諸癃結、小便不通、出刺、決癰腫、明目、去翳、破胎、墮子、下閉血。一名巨句麥、生川谷。

名醫曰、一名大菊、一名大蘭、生大山、立秋采實、陰乾。

案說文云、蘧蘧麥也、菊、大菊、蘧麥、廣雅云、茈、戚、藙、蘧麥也、爾雅云、大菊、蘧麥、郭璞云、一名麥句薑、即瞿麥、陶宏景云、子顏似麥、故名瞿麥。

元參、味苦微寒。主腹中寒熱積聚、女子產乳餘疾、補腎氣、令人目明。一名重臺、生川谷。

吳普曰、元參、一名鬼藏、一名正馬、一名重臺、一名鹿腹、一名端、一名元臺、神農桐君黃帝雷公扁鵲苦無毒、岐伯鹹、李氏寒、或生冤朐山陽、二月生葉、如梅毛、四四相值、似芍藥、黑蓋、方高四五尺、華赤、生枝閒、四月實黑、御覽

名醫曰、一名元蓋、一名鹿腸、一名正馬、一名減、一名端、生河間及冤句、三月四月采根、暴乾。

案廣雅云、鹿腸、元參也、范子計然云、元參出三輔、青色者善。

秦艽、味苦平。主寒熱邪氣、寒溼、風痹、肢節痛、下水、利小便、生山谷。

名醫曰、生飛鳥山、二月八月采根、暴乾。

案說文云、荄、草之相乃者、玉篇作艽、居包切、云秦艽、藥、尤同、遵炳云、本經名秦瓜、然則今本經名、亦有名醫改之者。

百合、味甘平。主邪氣腹張心痛、利大小便、補中益氣、生川谷。

吳普曰、百合一名重箱、一名中庭、生冤朐及荊山、藏文頻聚引云・一名鼠匿・

名醫曰、一名重箱、一名摩羅、一名中逢花、一名強瞿、生荊州、二月八月采根、暴乾。

案玉篇云、蹱、百合蒜也。

知母、味苦寒。主消渴熱中、除邪氣、肢體浮腫、下水、補不足、益氣。一名蚔母、一名連母、一名野蔌、一名地參、一名水參、一名水浚、一名貨母、一名蚍母、生川谷。

吳普曰、知母、神農桐君無毒、補不足、益氣、御覽引云・一名提母・

名醫曰、一名女雷、一名女理、一名兒草、一名鹿列、一名韭逢、一名兒腫草、一名東根、一名水須、一名沈燔、一名地蠶、生河內、二月八月采根、暴乾。

案說文云、芐、芐母也、蔣、宋藩也、或從艾作蘄、廣雅云、芐母、兒腫、東根也、爾雅云、蘄、洗藩、郭璞云、生山上。

葉如韭。一曰蜺母。范子計然云。蜺母出三輔。黃白者善。玉篇作蜺母。

貝母。味辛平。主傷寒煩熱淋瀝。邪氣。疝瘕。喉痺。乳難。金創。風痙。一名空草。

名醫曰。一名藥實。一名苦花。一名苦菜。一名商學。草。一名勤母。生晉地。十月采根。暴乾。

案說文云。茵。貝母也。廣雅云。貝父。藥實也。爾雅云。茵。貝母。郭璞云。根如小貝。圓而白瓣。葉似韭。毛詩云。言采其蝱。傳云蝱。貝母也。陸璣云。其葉如栝樓而細小。其子在根下。如芋子。正白。四方連累相著。有分解也。

白蔹。味辛溫。主女人漏下赤白。血閉。陰痿。寒熱。風頭。侵目。淚出。長肌膚。潤澤。可作面脂。一名芳香。生川谷。

吳普曰。白芷一名齧。一名苻離。一名澤芬。一名蕘。御覽

名醫曰。一名白蔹。一名齧。一名蕘。一名苻離。一名澤芬。葉一名蘄麻。可作浴湯。生河東下澤。二月八月。采根。暴乾。

案說文云。蔹。齧也。齧。楚謂之離。晉謂之蘩。齊謂之蔹。廣雅云。白芷。其葉謂之葯。西山經云。虢山。其草多葯。郭璞云。葯。白芷別名。蘄。香草也。淮南子修務訓云。身苦秋葯被風。高誘云。葯。白芷。香草也。王逸注楚詞云。葯。白芷。按名醫一名蕘云云。似即爾雅蕘。苻離。其上爲而說文別有蔹。夫離也。齧。夫離上也。是非一草。舍人云。白蔹一名苻離。楚謂之蕘。豈蔹與蔹相似。而名醫誤合爲一乎。或說文云。楚謂之蔹。即夫離也。未可得詳。舊作芷。非。

淫羊藿。味辛寒。主陰痿絕傷。莖中痛。利小便。益氣力。強志。一名刺前。生山谷。

吳普曰。淫羊藿。神農雷公辛。李氏小寒。堅骨。御覽

名醫曰。生上郡陽山。

黃芩。味苦平。主諸熱黃疸。腸澼。洩利。逐水。下血閉。惡創。殺蝕。火瘡。一名印頭。一名內虛。神農桐君黃帝雷公扁鵲

吳普曰。黃芩。一名黃文。一名妒婦。一名虹勝。一名經芩。一名印頭。一名內虛。神農桐君黃帝雷公扁鵲苦無毒。李氏小溫。二月生赤黃葉。兩兩四四相值。莖空中。或方員。高三四尺。四月花紫紅赤。五月實黑根黃。二月至九月采。御覽

名醫曰。一名空腸。一名內虛。一名黃文。一名經芩。一名妒婦。生祁歸及冤句。三月三日采根。陰乾。

案說文云。蓋。黃蓋也。廣雅云。莛。黃文。內虛。黃芩也。范子計然云。黃芩出三輔。色黃者善。

狗脊。味苦平。主腰背強。關機緩急。周痹。寒溼。膝痛。頗利老人。一名百枝。生川谷。

吳普曰。狗脊。一名狗脊。一名赤節。神農苦。桐君黃帝岐伯雷公扁鵲甘無毒。李氏小溫。如草。解。莖節如竹。有刺。葉圓。赤根。黃白。亦如竹根。毛有刺。岐伯經云。莖長節。葉端員。青赤。皮白有赤脈。

名醫曰。一名強脊。一名扶筋。生常山。二月八月采根。暴乾。

案廣雅云。狗脊。狗脊也。玉篇云。狗脊。狗脊根也。名醫別出。狗脊。與此異。

石龍芮。味苦平。主風寒溼痹。心腹邪氣。利關節。止煩滿。久服輕身明目不老。一名鼠尾。御覽作果能食果。一名地

椹。生川澤石邊。

吳普曰。龍芮。一名蓋苦。一名天豆。神農苦平。岐伯酸扁鵲李氏大寒。當公鹹無毒。五月五日采。御覽

名醫曰。一名石能。一名彭根。一名天豆。生太山。五月五日采子。二月八月采皮。陰乾。

案范子計然云。石龍芮出三輔。色黃者善。

茅根。味甘寒。主勞傷虛羸。補中益氣。除瘀血。血閉寒熱。利小便。其苗。主下水。一名蒻根。一名茹根。生山谷田野。

名醫曰。一名地管。一名地筋。一名兼杜。生楚地。六月采根。

案說文云。茅。菅也。菅。茅也。廣雅云。菅。茅也。爾雅云。白華野菅。郭璞云。菅。茅屬。詩云。白華菅兮。白茅束兮。傳云。白華。野菅也。已漚爲菅。

紫菀。味苦溫。主欬逆上氣。胸中寒熱結氣。去蠱毒。痞滿。安五藏。生山谷。

吳普曰。紫菀。一名青菀。御覽

名醫曰。一名紫菊。一名青菀。生房陵及真定邯鄲。二月三月采根。陰乾。

案說文云。菀。茈菀。出漢中房陵。陶宏景云。白者名白菀。唐本注云。白菀。即女菀也。

紫草。味苦寒。主心腹邪氣五疸。補中益氣。利九竅。通水道。一名紫丹。一名紫芙。御覽引云。一名地血。大觀本。無文。生山谷。

吳普曰。紫草。節赤。二月花。御覽

名醫曰。生碣山及楚地。三月采根。陰乾。

案說文云。茈草也。藐。茈草也。可以染留黃。廣雅云。茈。茈草也。山海經云。勞山多茈草。郭璞云。一名紫茢。中染紫也。爾雅云。藐。茈草。郭璞云。可以染紫。

敗醬。味苦平。主暴熱火創。赤氣。疥搔。疽痔。馬鞍。熱氣。一名鹿腸。生川谷。

名醫曰。一名鹿首。一名馬草。一名澤敗。生江夏。八月采根。暴乾。

案范子計然云。敗醬出三輔。陶宏景云。氣如敗醬。故以爲名。

白鮮。味苦寒。主頭風。黃疸。欬逆。淋瀝。女子陰中腫痛。溼痹。死肌。不可屈伸。起止行步。生川谷。

名醫曰。生上谷及冤句。四月五月采根。陰乾。

案陶宏景云。俗呼爲白羊鮮。氣息正似羊羶。或名白羶。

酸醬。味酸平。主熱煩滿。定志。益氣。利水道。產難。吞其實立產。一名酢醬。生川澤。

吳普曰。酸醬。一名酢醬。御覽

名醫曰。生荆楚及人家田圃中。五月采。陰乾。

案爾雅云。蔵。蘇。醬。郭璞云。今酸醬草。江東呼曰苦蔵。

紫參。味苦辛寒。主心腹積聚。寒熱邪氣。通九竅。利大小便。一名牡蒙。生山谷。

吳普曰伏蒙一名紫參一名泉戎一名音腹一名伏苑一名重傷神農黃帝苦李氏小寒生河西山谷或宛句商山圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月花紫赤實黑大如豆三月采根御覽大觀本草衍文

名醫曰一名桑戎一名音腸一名馬行生河西及宛句三月采根火炙使紫色

案范子計然云紫參出三輔赤青色者善

紫本味辛溫主婦人痼寒陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚說顏色一名鬼臼一名地新生山谷

名醫曰一名微莖生崇山正月二月采根暴乾三十日成

案廣雅云山莖蘇香紫本也管子地員篇云五臭時生紫本荀子大略篇云蘭莖紫本漸于鹽醯一佩易之樊光注爾雅云紫本一名蘇蘇根名蘄芷舊作紫非

石韋味苦平主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道一名石蘚生山谷石上

名醫曰一名石皮生華陰山谷不聞水及人糞者良二月采葉陰乾

草薢味苦平主腰背痛強骨節風寒溼周痹惡創不瘳熱氣生山谷

名醫曰一名赤節生眞定八月采根暴乾

案博物志云拔葵與草薢相亂

白微味苦平主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸痹溫瘧洗洗發作有時生川谷

名醫曰一名白幕一名微草一名春草一名骨美生平原三月三日采根陰乾

水萍味辛寒主暴熱身痒作瘙·此是·下水氣勝酒長須髮藏文類聚引云·水萍·生池澤

吳普曰水萍一名水廉生澤水上葉員小一莖一葉根入水五月華白三月采日乾御覽

名醫曰一名水白一名水蘇生雷澤三月采暴乾

案說文云萍蓱也無根浮水而生者萍苹也蘋大萍也廣雅云蘋萍也夏小正云七月湟潦生苹爾雅云萍蓱郭璞云水中浮萍江東謂之蘋又其大者蘋毛詩云于以采蘋傳云蘋大萍也范子計然曰水萍出三輔色青者善淮南子原道訓云萍樹根于水高誘云萍大蘋也

王瓜味苦寒主消渴內痹瘀血月閉寒熱酸痿益氣愈聾一名土瓜生平澤

名醫曰生魯地田野及人家垣牆間三月采根陰乾

案說文云葝王蒦也廣雅云藤菇瓜瓠王瓜也夏小正云四月王蒦秀爾雅云鉤藤菇郭璞云鉤瓠也一名王瓜實如瓜正赤味苦月令王瓜生鄭元云月令云王蒦生孔穎達云疑王蒦則王瓜也管子地員篇剽土之次曰五沙其種大蒦細蒦白莖青秀以莖本草圖經云大蒦即王蒦也苟亦謂之土瓜自別是一物

地榆味苦微寒主婦人乳瘕痛七傷帶下病止痛除惡肉止汗療金創御覽引云·主消渴·又云明目·大觀本草·消渴作鼎字·面目·生山谷

名醫曰生桐柏及宛句二月八月采根暴乾

案廣雅云菌除地榆也陶宏景云葉似榆而長初生布地而花子紫黑色如皮故名玉皮

海藻味苦寒主瘿瘤氣頸下核破散結氣癭腫瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫一名落首生池澤

名醫曰一名澤生東海七月七日采暴乾

案說文云藻水草也或作藻廣雅云海蘊海藻也爾雅云蘊海藻也郭璞云藻水草云又藻石衣郭璞云水苔也一名石髮江東食之或曰藻葉似蓬而大生水底也亦可食生海中本草云又藻石衣郭璞云水苔也一名石髮江東食之或曰藻葉似蓬而大生水底也亦可食

澤蘭味苦微溫主乳婦內衄御覽作·鼻血·中風餘疾大腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金創癰腫創膿一名虎蘭一名龍枝生大澤傍

吳普曰澤蘭一名水香神農黃帝岐伯桐君酸無毒李氏溫生下地水傍葉如蘭二月生香赤節四葉相值枝節閒

名醫曰一名虎蒲生汝南三月三日采陰乾

案廣雅云虎蘭澤蘭也

防已味辛平主風寒溫瘧熱氣諸癎除邪利大小便一名解離御覽作石解引云·通藻理·利九竅·大觀本·六字鼎·生川谷

吳普曰木防已一名解離一名解蕪神農辛黃帝岐伯桐君苦無毒李氏大寒如芎藭莖延如芎白根外黃似桔梗內黑又如車轄解二月八月十月采根御覽

名醫曰生漢中二月八月采根陰乾

案范子計然云防已出漢中句陽

款冬花味辛溫主欬逆上氣善喘喉涕諸欬癎寒熱邪氣一名蜜吾御覽作石·一名顆涼御覽作顆冬·一名虎須一名兔奚生山谷

吳普曰款冬十二月花黃白藏文類聚·

名醫曰一名氐冬生常山及上黨水傍十一月采花陰乾

案廣雅云苦菜款涼也爾雅云菟奚顆涼郭璞云款冬也紫赤華生水中西京雜記云款冬華于嚴冬傅咸款冬賦序曰仲冬之月冰凌積雪款冬獨敷華藍

牡丹味辛寒主寒熱中風瘈瘲癎癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五臟療癰創一名鹿韭一名鼠姑生山谷

吳普曰牡丹神農岐伯辛李氏小寒雷公桐君苦無毒黃帝苦有毒葉如蓬相植根如柏黑中有核二月采八月采日乾人食之輕身益壽御覽

名醫曰生巴郡及漢中二月八月采根陰乾

案廣雅云白花牡丹也范子計然云牡丹出漢中河內赤色者亦善

馬先蒿味平主寒熱鬼注中風溼痹女子帶下病無子一名馬屎蒿生川澤

名醫曰生南陽。

案說文云蔚牡蒿也。廣雅云因應馬先也。爾雅云蔚牡蕭。郭璞云無子者。毛詩云匪莪伊蔚。傳云莪牡蒿也。陸璣云三月始生七月華。華似胡麻華而紫赤。八月爲角。角似小豆角銳而長。一名馬新蒿。案新先聲相近。

積雪草。味苦寒。主大熱。惡創癰疽。浸淫。赤標。皮膚亦身熱。生川谷。

名醫曰生荊州。

案陶宏景云荊楚人以葉如餳。謂爲地餳草。徐儀樂圖名逕餳草。本草圖經云成洛二京亦有。或名胡荽。

蒲荷。

女菀御覽作苑。味辛溫。主風洗洗。瘙氣。洩利。腸鳴上下無常處。驚悸。寒熱百疾。生川谷。或山陽。

名醫曰一名白菀。一名織女菀。一名茈。生漢中。正月二月采。陰乾。

案廣雅云女腸。女菀也。

王孫。味苦平。主五臟邪氣。寒溼痹。四肢疼酸。郝冷痛。生川谷。

吳普曰黃孫一名王孫。一名蔓延。一名公草。一名海孫。神農雷公苦無毒。黃帝甘無毒。生西海山谷及汝南城郭垣下。蔓延。亦文。蔓葉相當。御覽

名醫曰吳名白功草。楚名王孫。齊名長孫。一名黃孫。一名黃昏。一名海孫。一名蔓延。生海西及汝南城郭下。

案陶宏景云今方家皆呼王昏。又云壯蒙。

蜀羊泉。味苦微寒。主頭禿惡創。熱氣。疥搔。痂癬。蟲。瘙。齒。生川谷。

名醫曰一名羊泉。一名飴。生蜀郡。

案廣雅云荼姑。艾但。鹿何。澤翔也。唐本注云此草一名漆姑。

爵牀。味鹹寒。主腰脊痛。不得著牀。俛仰艱難。除熱。可作浴湯。生川谷及田野。

吳普曰爵牀一名爵卿。御覽

名醫曰生漢中。

案別本注云今人名爲香蘇。

假蘇。味辛溫。主寒熱。鼠瘻。瘰癧。生創。破結聚氣。下痰血。除溼痹。一名鼠糞。生川澤。舊在菜部今移。

吳普曰假蘇一名鼠糞。一名蓋芥也。御覽名荆芥。葉似落藜而細。蜀中生噉之。蜀本注

名醫曰一名蓋芥。生漢中。

案陶宏景云即荆芥也。蓋荆聲譌耳。先居草部中。今人食之。錄在菜部中也。

翹根。味甘寒。平。御覽作味苦平。主下熱氣。益陰精。令人面說好。明目。久服輕身耐老。生平澤。舊在唐本退中。今移。

吳普曰翹根。神農岐伯甘有毒。三月八月采。以作蒸飲酒病人。御覽

名醫曰生嵩高二月八月采。

案陶宏景云方藥不復用。俗無識者。

右神中品四十九種。舊四十六種。考菜部假蘇。及唐本退中翹根。宜入此。

桑根白皮。味甘寒。主傷中。五勞六極。羸瘦。崩中。脈絕。補虛益氣。葉主除寒熱出汗。桑耳黑者主女子漏下。亦白汁。血病。癰腫。積聚。陰補陰陽。寒熱無子。五木耳名檽。益氣不飢。輕身強志。生山谷。

名醫曰桑耳一名桑菌。一名木麥。生雒。爲六月多雨時采。即晾乾。

案說文云桑。霜所食葉。木爕。木耳也。重桑爕。爾雅云桑薪有莅。梔。舍人云桑樹一半有莅。半無莅。名梔也。郭璞云薪半也。又女桑。桋。桑。郭璞云今俗呼桑樹小而條長者爲女桑樹。又壓山桑。郭璞云似桑材中作弓及車轅。又桑柳槐條。郭璞云阿那垂條。

竹葉。味苦平。主款逆上氣。溢筋急。惡瘨。殺小蟲。根作湯。益氣止渴。補虛下氣。汁主風痓。實。通神明。輕身益氣。

名醫曰生益州。

案說文云竹多生艸也。象形。下形者。箸也。

吳茱萸。御覽引無吳字。是。味辛溫。主溫中。下氣。止痛。款逆。寒熱。除溼血痹。逐風邪。開腠。舊作腠。御覽作湊。是。理。根殺三蟲。一名藙。生山谷。

名醫曰生蒐句。九月九日采。陰乾。

案說文云茱萸。茱萸。屬。萸。茱萸也。藙。煎茱萸。漢律。會稽獻藙一斗。廣雅云椒、椒、樵、樵、茱萸也。三蒼云茱萸也。御覽爾雅云椒、椒。醜。郭璞云茱萸子。聚生成房。貌。今江東亦呼茱椒。似茱萸而小。赤色。禮記云三牲用藙。鄭云藙。煎茱萸也。漢律。會稽獻焉。爾雅謂之椒。范子計然云茱萸出三輔。陶宏景云禮記名藙。而俗中呼爲藙子。當是不識藙字。似藙字。仍以相傳。

扈。舊作梔。御覽引。藙文如茱及作文。是。子。味苦寒。主五內邪氣。胃中熱氣。面赤。酒皰。齄鼻。白顯。赤瘤。創瘍。一名木丹。生川谷。

名醫曰一名越桃。生南陽。九月采實。暴乾。

案說文云梔。黃木可染者。廣雅云梔子。檛桃也。史記貨殖傳云巴蜀地饒巵。集解云徐廣曰音支。烟支也。案赤色也。據說文當爲梔。

蕘荑。味辛。主五內邪氣。散皮膚骨節中淫。淫溫行毒。去三蟲。化食。一名無姑。一名蕘。御覽引云。逐寸白。散腹中溫溫噦噦。大腹本作鼎字。生川谷。

名醫曰一名蕘。生晉山。三月采實。陰乾。

案說文云梗。山汾榆。有束莢可爲蕘荑者。廣雅云山榆。母佑也。爾雅云茲荑蕘。蘠。郭璞云一名白蕘。又

無姑。其實夷。郭璞云。無姑。姑榆也。生山中。葉圓而厚。剝取皮合濱之。其味辛香。所謂蘇薰。范子計然云。蘇薰在地。宗心者善。

枳實。味苦寒。主大風在皮膚中。如麻豆苦痒。御覽作瘙痒。除寒熱結。止利。舊作痢。御覽作利。是。長肌肉。利五臟。益氣輕身。生川澤。

吳普曰。枳實。苦。雷公酸無毒。李氏大寒。九月十月采。陰乾。御覽

名醫曰。生河內。九月十月采。陰乾。

案說文云。枳木似橘。周禮云。橘踰淮而化爲枳。沈括補筆談云。六朝以前。醫方唯有枳實。無枳殼。後人用枳之小椒者爲枳實。大者爲枳殼。

厚朴。味苦溫。主中風。傷寒。頭痛。寒熱。驚悸。氣血痺。死肌。去三蟲。

吳普曰。厚朴。神農岐伯雷公苦無毒。李氏小溫。御覽引云。一名厚皮。生交阯。

名醫曰。一名厚皮。一名赤朴。其樹名榛。其子名逐。生交阯。冤句。九月十月采皮。陰乾。

案說文云。朴木皮也。榛木也。廣雅云。重皮。厚朴也。范子計然云。厚朴出宏農。按今俗以榛爲柰。不知是厚朴。說文榛。果。字作柰。

秦皮。味苦。微寒。主風寒。澀。辨。洗。洗。寒氣。除熱。目中青翳白膜。久服。頭不白。輕身。生川谷。

吳普曰。岑皮。一名秦皮。神農雷公黃帝岐伯酸無毒。李氏小寒。或生冤句。水邊。二月八月采。御覽

名醫曰。一名岑皮。一名石楨。生廬江及冤句。二月八月采皮。陰乾。

案說文云。梣。青皮木。或作樣。淮南子俶眞訓云。梣木。色青翳。高誘云。梣木。苦蠱木也。生于山。剝取其皮。以水浸之。正青。用洗眼。益人目中。廣翳。据吳普云。岑皮名秦皮。本經作秦皮者。後人以俗稱改之。當爲岑皮。

秦椒。味辛溫。主風邪氣。溫中。除寒。辨。堅齒髮。明目。久服。輕身好顏色。耐老。增年。通神。生川谷。

名醫曰。生太山及秦嶺上。或琅邪。八月九月采實。

案說文云。椒。椒。茱萸也。北山經云。景山多秦椒。郭璞云。子似椒而細。葉草也。爾雅云。檓。大椒。郭璞云。今椒樹。叢生。實大者名爲檓。又椒檓。醜菉。郭璞云。裹萸子。聚成房。貌。今江東亦呼菉檓。似茱萸而小。赤色。毛詩云。椒聊之實。傳云。椒聊。椒也。陸璣云。椒樹似茱萸。有鍼刺。葉堅而滑澤。蜀人作茶。吳人作茗。皆合煮其葉。以爲香。范子計然云。秦椒出天水隴西。細者善。淮南子人間訓云。申椒杜茝。美人之所懷服。舊作椒。非。据山海經。有秦椒。生閒。喜景山。則秦非秦地之秦也。

山茱萸。味酸平。主心下邪氣。寒熱。溫中。逐寒溼。辨。去三蟲。久服。輕身。一名蜀。蛅。生山谷。

吳普曰。山茱萸。一名鬾實。一名鼠矢。一名雚足。神農黃帝雷公扁鵲酸無毒。岐伯辛。一經酸。或生冤句琅邪。或東海承縣。葉如梅。有刺毛。二月華。如杏。四月實。如酸蛅。亦五月采實。御覽

名醫曰。一名雚足。一名鬾實。生漢中及琅邪冤句。東海承縣。九月十月采實。陰乾。

紫葳。味酸。御覽作鹹。微寒。主婦人產乳餘疾。崩中。瘀血。閉。寒熱。羸瘦。養胎。生川谷。

吳普曰。紫葳。一名武威。一名墨麥。一名陵居。一名鬼目。一名茇葵。神農雷公酸。岐伯辛。扁鵲苦。鹹。黃帝甘無毒。如麥根。黑。正月八月采。或生真定。御覽

名醫曰。一名陵苕。一名茇葵。生西海及山陽。

案廣雅云。茈葳。陵苕。蘧麥也。爾雅云。苕。陵苕。郭璞云。一名陵時。本草云。又黃蜀葵。白蜀葵。郭璞云。苕、蜀、色異。名亦不同。毛詩云。苕之華。傳云。苕。陵苕也。范子計然云。紫葳出三輔。李當之云。是蜀葵根。据李說。

與廣雅合。而唐本注引爾雅注。有一名陵霄四字。謂即陵霄花。陸璣以爲鼠尾。疑皆非。故不采之。

豬苓。味甘平。主痎瘧。解蠱毒。殺精鬼。御覽作蛀。不祥。利水道。久服。輕身耐老。御覽作能者。一名豕橐。生山谷。

吳普曰。豬苓。神農甘。雷公苦無毒。御覽引云。如茯苓。或生冤句。八月采。

名醫曰。生衡山及濟陰冤句。二月八月采。陰乾。

案莊子云。豕零。司馬彪注。作豕蓋。云。一名豬苓。根似豬卵。可以治渴。

白棘。味辛。寒。主心腹痛。癰腫。消膿。止痛。一名棘。生川谷。

名醫曰。一名棘刺。生雍州。

案說文云。棘。小束。叢生者。爾雅云。髦。顯。棘。孫炎云。一名白棘。李當之云。此是酸棗樹鍼。今人用天門冬苗代之。非是眞也。案經云。天門冬一名顯勒。勒。棘。聲相近。則今人用此。亦非無因也。

龍眼。味甘平。主五臟邪氣。安志。厥食。久服。強魂。聰明。輕身。不老。通神明。一名益智。生山谷。

吳普曰。龍眼。一名益智。要術。一名比目。御覽

名醫曰。其大者似榛。樗。生南海松樹上。五月采。陰乾。

案廣雅云。益智。龍眼也。劉逵注吳都賦云。龍眼。如荔枝而小。圓如彈丸。味甘。勝荔枝。蒼梧。交阯。南海。合浦。皆獻之。山中人家亦種之。

松蘿。味苦平。主瞋怒邪氣。止虛汗。頭風。女子陰寒。腫病。一名女蘿。生山谷。

名醫曰。生熊耳山。

案廣雅云。女蘿。松蘿也。毛詩云。蔦與女蘿。傳云。女蘿。菟絲。松蘿也。陸璣云。松蘿。自蔓松上。枝正青。與兎絲異。

衝矛。味苦寒。主女子崩中下血。腹滿。汗出。除邪。殺鬼毒蠱注。一名鬼箭。生山谷。

吳普曰。鬼箭。一名衝矛。神農黃帝桐君苦無毒。葉如桃。如羽。正月二月七月采。陰乾。或生野田。御覽

名醫曰。生霍山。八月采。陰乾。

案廣雅云。鬼箭。神箭也。陶宏景云。其莖有三羽。狀如箭羽。

合歡。味甘平。主安五臟。利心志。藝文類聚作和心志。御覽作和心氣。令人歡樂無憂。久服。輕身明目。得所欲。生山谷。

名醫曰生益州。

案唐本注云或曰合昏。歡昏音相近。日華子云夜合。

右木。中品一十七種。舊同。

白馬莖。味鹹平。主傷中脈絕陰不起。強志益氣。長肌肉。肥健。生子。服。主驚狂。腹滿。瘧疾。當殺用之。懸蹄。主

驚邪。痍瘙。乳難。辟惡氣鬼魅。蠱注。不祥。生平澤。

名醫曰生雲中。

鹿茸。味甘溫。主漏下惡血。寒熱。驚悸。益氣強志。生齒不老。角主惡創癰腫。逐邪惡氣。留血在陰中。

名醫曰。茸四月五月解角時取。陰乾。使時躁。角七月采。

牛角腮。下閉血。療血瘀痛。女人帶下血。髓。補中填骨髓。久服增年。膽可丸藥。

案說文云。腮角中骨也。

羖羊角。味鹹溫。主青盲明目。殺蠱毒。止寒洩。辟惡鬼虎狼。止驚悸。久服安心益氣。輕身。生川谷。

名醫曰生河西。取無時。

案說文云。羖夏羊。牝曰羖。爾雅云。羊牝。羖。郭璞云。今人便以牂羖。羖。為黑白羊名。

牡狗陰莖。味鹹平。主傷中。陰痿不起。令強熱大。生子。除女子帶下十二疾。一名狗精。膽主明目。名醫曰。六月上伏日。取陰乾。

麋角。味鹹寒。主明目益氣。起陰。去惡血注下。辟蠱毒惡鬼不祥。安心氣。常不厭寒。生川谷。

名醫曰生石城及邯陰山。采無時。

案說文云。麋大羊而細角。廣雅云。美皮洽角。爾雅云。麋大羊。郭璞云。麋羊似羊而大。角圓銳。好在山崖間。陶宏景云。爾雅名麋羊。據說文云。莧山羊細角也。爾雅云。麋如羊。郭璞云。麋似吳羊而大角。角橢出西方。莧即麋正字。然本經羚字實麋字俗寫。當以麋為是。爾雅釋文。引本草作麋。

犀角。味苦寒。主百毒蠱注。邪鬼障氣。殺鉤吻鴆羽蛇毒。除不迷或厥寒。久服輕身。生山谷。

名醫曰生永昌及益州。

案說文云。犀南徼外牛。一角在鼻。一角在頂。似豕。爾雅云。犀似豕。郭璞云。形似水牛。豬頭大腹。卑脚。脚有三蹄。黑色。三角。一在頂上。一在鼻上。一在額上。鼻上者即食角也。小而不橢。好食棘。亦有一角者。山海經云。琴鼓之山多白犀。郭璞云。此與辟寒。鍔怒。辟惡。辟暑。諸犀。皆異種也。范子計然云。犀角出南郡。

上價八千。中三千。下一千。

右獸。中品七種。舊同。

燕屎。味辛平。主蠱毒鬼注。逐不祥邪氣。破五癃。利小便。生平谷。

名醫曰生高山。

案說文云。燕。元鳥也。籥口布翅。枝尾。象形作巢。避戊巳。乙元鳥也。齊魯謂之乙。取其名自呼。象形或作

乭。爾雅云。燕乭。夏小正云。二月來降。燕乃睇。傳云。燕。乙也。九月陟元鳥。整。傳云元鳥者燕也。

天鼠屎。味辛寒。主面皯。皮膚洗洗。時痛。腸中血氣。破寒熱積聚。除驚悸。一名鼠沙。一名石肝。生山谷。

名醫曰生合浦。十月十二月取。

案李當之云。即伏翼屎也。李云。天鼠方言一名僊鼠。案今本方言云。或謂之老鼠。當為天字之誤也。

右禽。中品二種。舊同。

蝟皮。味苦平。主五痔陰蝕下血。赤白五色。血汁不止。陰腫。痛。引要背酒煮殺之。生川谷。

名醫曰生楚山田野。取無時。

案說文云。蝟似豪豬者。或作蝟。廣雅云。虎王。蝟也。爾雅云。蝟。毛刺。郭璞云。今謂狀似鼠。淮南子說山訓云。蝟矢中蝟。

蠭房。味苦平。主驚癇瘈瘲。寒熱邪氣。痫疾。鬼精。蠱毒。腸痔。火熬之良。一名蜂腸。生山谷。

名醫曰一名百穿。一名蜂勑。生泮柯。七月七日采。陰乾。

案淮南子氾論訓云。蜂房不容卵。高誘云。房巢也。

鼈甲。味鹹平。主心腹癥瘕堅積。寒熱。去瘧。息肉。陰蝕。痔。惡肉。生池澤。

名醫曰生丹陽。取無時。

案說文云。鼈。甲蟲也。

蟹。味鹹寒。主胸中邪氣。熱結痛。喝僻。面腫。敗漆。燒之致鼠。生池澤。

名醫曰生伊洛諸水中。取無時。

案說文云。蟹有二敖八足旁行。非蛇蟬之穴無所庇。或作蟹。蟹。蟹也。荀子勸學篇云。蟹六跪而二螯。非蛇蟬之穴無所寄託。廣雅云。蜻蟹。蝦也。爾雅云。蟛蜞。小者蟧。郭璞云。或曰即蟹蛸也。似蟹而小。

作蟬。味鹹寒。主小兒驚癇夜啼。瘈病。寒熱。生楊柳上。

名醫曰五月采。蒸乾之。

案說文云。蟬以旁鳴者。蜩。蟬也。廣雅云。蜩。蟬也。復育。蛻也。舊作蛑蟬。別錄云蛑者。鳴蟬也。殼一名楷蟬。又名伏蜩。案蛑即作字。周禮考工記云。侈則作。鄭元云。作讀為咋。咋然之咋。聲大外也。說文云。譜。大聲也。音同作。今據作作。作蟬即五月鳴蜩之蜩。夏小正云。五月良蜩鳴。傳良蜩也。五采具。爾雅云。蜩。蟬。毛詩云。如蜩。傳云蜩。蟬也。方言云。楚謂之蜩。宋衛之間謂之蟬。陳。鄭之間謂之蟬。蜩。秦晉之間謂之蟬。海岱之間謂之蜩。論衡云。蟬生於復育。開背而出。而玉篇云。蛑。蟬。七月生。陶宏景菩蛑作笮云。瘈蟬。是為月令之寒蟬。爾雅所云蜺。御覽作。瘈。唐本注非之也。

蟬蜕。味鹹微溫。主惡血。血瘀。血瘕。瘈氣破折。血在脅下堅滿。淋。月閉。目中淫。腐。青翳。白膜。一名蟬蛻。生平澤。

名醫曰。一名腥齊。一名敦齊。生河內人家積糞草中。取無時。反行者良。

案說文云、蠀、蠮螉也、蛸、蛸蠮也、蝎、蛸蠮也、廣雅云、蜓蛸、發蟈、地鼅、蠮螉、蠮蛸、爾雅云、蜆、蠐螬、郭璞云、在蓺土中、又蛴螬、蝎、郭璞云、在木中、今雖通名蝎、所在異、又蝎、蛣蜣、郭璞云木中蠹蟲、蝎桑蠹、郭璞云、卽桔梗、毛詩云、領如蛴螬、傳云、蛴螬、蝎蟲也、方言云、蠐螬、謂之蝤蠐、自關而東、謂之蝤蠐、或謂之蝎、或謂之蝤蠐、秦晉之間、謂之蠐、或謂之蝎、或謂之蛭蛴、秦晉之間、謂之蠐、或謂之天蝼、列子天瑞篇云、烏足根爲蠐螬、博物志云、蠐螬以背行、抉於足用、說文無蜣字、當借蜚爲之、聲相近、字之誤也、

烏賊魚骨、味鹹微溫、主女子漏下赤白經汁、血閉、陰蝕、腫痛、寒熱、癥瘕、無子、生池澤、

名醫曰、生東海、取無時、

案說文云、鯽、烏鯽、魚名、或作鯽、左思賦、有烏賊、劉逵注云、烏賊魚、腹中有墨、陶宏景云、此是鶉烏所化作、今其口腳具存、猶相似爾、

白僵蠶、味鹹、主小兒驚癇夜啼、去三蟲、滅黑皯、令人面色好、男子陰瘍病、生平澤、

名醫曰、生潁川、四月取自死者、

案說文云、蠶任絲也、淮南子說林訓云、蠶食而不飲、二十二日而化、博物志云、蠶三化、先孕而後交、不交者亦生子、子後爲蠶、皆無眉目、易傷、收采亦難、玉篇作蠶、蠶、正當爲僵、僵作殭、非、

蛇魚甲、味辛微溫、主心腹癥瘕、伏堅、積聚、寒熱、女子崩中、下血五色、小腹陰中相引痛、創疥、死肌、生池澤、

名醫曰、生南海、取無時、

案說文云、鱓、魚名、皮可爲鼓、鼉、水蟲似蜥蜴、長大、陶宏景云、蛇卽鼉中也、

樗雞、味苦平、主心腹邪氣、陰痿、益精、強志、生子好色、補中輕身、生川谷、

名醫曰、生河內樗樹上、七月采、暴乾、

案廣雅云、樗鳩、樗雞也、爾雅云、鞠、天雞、李巡云、一名鵝雞、郭璞云、小蟲、黑身赤頭、一名沙雞、又曰樗雞、毛詩云、六月莎雞振羽、陸璣云、莎雞、如蝗而班色、毛翅數重、其翅正赤、或謂之天雞、六月中飛而振羽、案、案作聲、幽州人謂之蒲錯、是也、

活蟲、味鹹寒、主賊風、喎僻、軼筋、及脫肛、驚癇、攣縮、一名陵蟲、生池澤、

名醫曰、一名土蟲、一名附蟲、生大山及陰地沙石垣下、八月取、

案說文云、蟲、虺蟲也、蠆、一名虺蟲、廣雅云、蠆、蝎牛、蠍蟲也、中山經云、青要之山是多僕蠱、郭璞云、僕蠱、蝎牛也、周禮、蠱人、祭祀供蠱、鄭云、蠱、蜣蟲、爾雅云、蜣蠆、蜣蟲、郭璞云、卽蝎牛也、名醫曰、別出蝎牛條、非、衍作蛞、說文所無、據玉篇云、蛞蛞、東、知卽活東、異文、然則當爲活、

石龍子、味鹹寒、主五癃邪、結氣、破石淋、下血利小便、水道、一名蜥蜴、生川谷、

吳普曰、石龍子、一名守宮、一名石蜴、一名石龍子、御覽

名醫曰、一名山龍子、一名守宮、一名石蜴、生平陽及荊山石間、五月取、著石上、令乾、

案說文云、蜥、蜴之蜥易也、易、蜥易、蜴蜓、守宮也、象形、蜓在壁曰蜥蜴、在草曰蜥易、或作蜴、蜥、蜥蜴、蛇、醫

以注鳴者、廣雅云、蛤解、蟹、蛔、蠅、蜥蜴也、爾雅云、蜥蜴、蜥蜴、蜥蜴、蜓蜓、守宮也、毛詩云、胡爲虺蜴、傳云、蜴、蜥也、陸璣云、虺蜴、一名蜥蜴、蜥蜴也、或謂之蛇醫、如蜥蜴、青綠色、大如指、形狀可惡、方言云、守宮、秦晉西夏謂之守宮、或謂之蠮螉、或謂之蜥易、其在澤中者、謂之易蜴、南楚謂之蛇醫、或謂之蜥蜴、北燕謂之祝蛇、桂林之中、守宮大者而能鳴、謂之蛤解、

木虱、味苦平、主目赤痛、眥傷、淚出、瘀血、血閉、寒熱、酸斷無子、一名魂常、生川澤、名醫曰、生漢中、五月取、

案說文云、蝨、蟣蝨、蝨也、此省文、淮南子齊俗訓云、水蝨爲蟻、志、高誘云、青蛉也、又說山訓云、蝨、散積血、

蜚虻、味苦微寒、主逐瘀血、破下血積堅、寄熱、積聚、寒熱、通利血脈、及九竅、生川谷、

名醫曰、生江夏、五月取、腹有血者良、

蜚廉、味鹹寒、主血瘀、御覽引云、逐下血、癥堅、寒熱、破積聚、喉咽痹、內寒、無子、生川澤、

吳普曰、蜚廉蟲、神農黃帝云、治婦人寒熱、御覽

名醫曰、生晉陽及人家屋間、立秋采、

案說文云、蜚、虛、蜚也、蠹、臭蟲、負蠜也、蠜、負蠜也、廣雅云、蜚蠊、蜚蠊也、爾雅云、蜚蠊、蜚、郭璞云、卽負盤臭蟲、唐本注云、漢中人食之下氣、名曰石蜚、一名嵐蜚、一名負盤、舊作蠜、据邢昺疏引此作廉、

蜚蟲、味鹹寒、主心腹寒熱、洗洗、血積、癥瘕、破堅、下血閉、生子大良、一名地鼈、生川澤、

吳普曰、蜚蟲、一名土鼈、御覽

名醫曰、一名土鼈、生河東及沙中、人家牆壁下、土中濕處、十月、暴乾、

案說文云、蟲、蟲屬、蠶、白蠶也、廣雅云、負蠜、蠜也、爾雅云、草蟲、負蠜、郭璞云、常羊也、毛詩云、喓喓草蟲、傳云草蟲、常羊也、陸璣云、小大長短如蝗也、奇音、青色好在茅草中、

伏翼、味鹹平、主目瞑、明目、夜視有精光、久服、令人輕樂、媚好無憂、一名蝙蝠、生川谷、舊作禽部、今移、

吳普曰、伏翼、或生人家屋間、立夏後、陰乾、治目冥、令人夜視有光、藏文類聚、

名醫曰、生太山及人家屋間、立夏後采、陰乾、

案說文云、蝙、蝙蝠也、蝠、蝙蝠、服翼也、廣雅云、伏翼、飛鼠、仙鼠、蚨蟘也、爾雅云、蝙蝠、服翼、方言云、蝙蝠、自關而東、謂之伏翼、或謂之飛鼠、或謂之老鼠、或謂之仙鼠、自關而西、秦隴之間、謂之蝙蝠、北燕謂之蝠、李當之云、卽天鼠、

右蟲魚中品二十七種、舊十六種、考禽部伏翼宜入此、

梅實、味酸平、主下氣除熱、煩滿、安心、肢體痛、偏枯不仁、死肌、去青黑志、惡疾、生川谷、

吳普曰、梅實、大觀本草作核、明目、益氣、御覽、大觀本草、引不飢、吳氏本草、

名醫曰、生漢中、五月采、火乾、

案說文云、檄、乾梅之屬、或作潰、菜、酸果也、以梅爲杜、爾雅云、梅杜、郭璞云、似杏實酢、是以菜注梅也、周

禮、蓮人續食、蓮其實乾樱、鄭云、乾樱、乾梅也、有桃諸梅諸、是其乾者、毛詩疏云、梅、柟爲膳、蔗、脂、蜜中、人含之以香口、大觀本草・

右果中品一種、舊同、

大豆黃卷、味甘平、主溼痺、筋攣、鄰痛、生大豆、塗癰腫、煮汁、飲、殺鬼毒、止痛、赤小豆、主下水、排癰腫膿血、生平澤、

吳普曰、大豆黃卷、神農黃帝雷公無毒、采無時、去面皯、得前胡、烏喙、杏子、牡厲、天雄、鼠屎、其蜜和佳、不欲海藻、龍膽、此法、大豆初出黃土芽是也、生大豆、神農岐伯生熟寒、九月采、殺烏豆毒、並不用元參、赤小豆、神農黃帝鹹雷公甘、九月采、御覽

名醫曰、生大山、九月采、

案說文云、赤豆也、象豆生之形也、荅、小赤也、菽、赤之少也、廣雅云、大豆、赤也、小豆、荅也、豆角謂之莢、其葉謂之萑、爾雅云、戎叔謂之萑、孫炎云、大豆也、

粟米、味鹹、微寒、主養腎氣、去胃脾中熱、益氣、陳者、味苦、主胃熱、消渴、利小便、大觀本草・作黍、御覽、學・據吳普增・

吳普曰、陳粟、神農黃帝苦無毒、治脾熱、炎粟養腎氣、御覽

案說文云、粟、嘉穀實也、孫炎注爾雅、粢稷云、粟也、今關中人呼小米爲粟米、是、

黍米、味甘溫、主益氣、補中、多熱、令人煩、大觀本・作黍、學・據吳普增・

吳普曰、黍、神農甘無毒、七月取、陰乾、益中、補氣、御覽

案說文云、黍、禾屬而黏者、以大暑而種、故謂之黍、孔子曰、黍可爲酒、禾入水也、廣雅云、穄、黍、稻、其采謂之禾、齊氏要術引記勝之書曰、黍忌丑、又曰、黍生於巳、壯於酉、長於戌、老於亥、死於丑、惡於丙午、忌於丑寅卯、按黍、卽穄之種也、

右米穀中品三種、舊二種、大小豆爲二、無粟米、黍米、今增、

蔓實、味辛溫、主明目、溫中、耐風寒、下水氣、面目浮腫、癰腫、馬蔓、去腸中蛭蟲、輕身、生川澤、

吳普曰、蔓實一名天蔓、一名野蔓、一名澤蔓、藏文類聚・

名醫曰、生雷澤、

案說文云、蔓、辛菜、薔虞也、薔、薔虞、蔓、廣雅云、紅、蘢、蒼、馬蔓也、爾雅云、蔣、虞、蔓、郭璞云、虞、蔓、澤蔓、又、紅、蘢、古、其大者、歸郭璞云、俗呼紅草爲蒼、蒼、蘢、轉耳、毛詩云、隰有游龍、傳云、龍、紅草也、陸璣云、一名馬蔓、葉大而赤色、生水中、高丈餘、又以蘸茶、蔓、傳云、蔓、水草也、

葱實、味辛溫、主明目、補中不足、其莖可作湯、主傷寒寒熱、出汗、中風面目腫、

蘭、味辛溫、主金創、創敗、輕身不飢、耐老、生平澤、

名醫曰、生魯山、

案說文云、蘭、菜也、葉似韭、廣雅云、韭、蘭、蔣、其華謂之蔣、爾雅云、蘭、鴻薈、郭璞云、卽蘭菜也、又動山薑、陶

宏景云、葱、蘭異物、而今共條、本經既無韭、以其同類、故也、

水蘇、味辛、微溫、主下氣、辟口臭、去毒、辟惡、久服、通神明、輕身、耐老、生池澤、

吳普曰、芥菹、一名水蘇、一名勞祖、御覽

名醫曰、一名雞蘇、一名勞祖、一名芥菹、一名芥苴、生九真、七月采、

案說文云、蘇、桂荏也、廣雅云、芥菹、水蘇也、爾雅云、蘇、桂荏、郭璞云、蘇荏類、故名桂荏、方言云、蘇、亦荏也、關之東西、或謂之蘇、或謂之荏、周鄭之閒、謂之公蕡、沅湘之南、謂之蕕、其小者謂之蘇、蘇、按蘇、卽香薷也、亦名香菜、名醫別出香薷條、非今紫蘇薄荷等、皆蘇類也、名醫俱別出之、

右菜中品三種、舊四種、考葱實宜與蘭同條、今并假蘇、宜入草部、

神農本草經卷三

下經

下藥一百二十五種爲左使、主治病以應地、多毒、不可久服、欲除寒熱邪氣、破積聚、愈疾者、本下經、

石灰、　礬石、　鉛丹、　粉錫、錫鏡鼻、　虎掌、
白堊、　冬灰、　青琅玕、右玉・石・下品八種・舊一十二種・　烏頭、　天雄、　半夏、　菖蒲子、
附子、　烏頭、　亭歷、　桔梗、　射干、
蔦尾、　大黃、　藜蘆、　鉤吻、　白斂、
草蒿、　旋覆花、　蜀漆、　甘遂、　澤漆、
蛇合、　恆山、　白及、　大戟、　羊蹄、
青葙子、　雚菌、　牡蠣、　芫花、　白頭翁、
茵芋、　貫衆、　藜蘆、　牙子、　閻茹、
商陸、　羊踯躅、　鳶尾、　狼毒、　陸英、
鬼臼、　羊桃、　女青、　連翹、
烏韭、　鹿藿、　蚤休、　石長生、

蘆草、牛蒡、豆豆、蜀椒、郁李仁、茅草、石南、黃環、蔓荊、茯苓、雞蘇、蠶蛹、蠶蛾、豚卵、蠶蛾、蠶蛾、蠶蛾

烏頭、味辛溫。主中風、惡風、洗洗出汗、除寒溼痹、欬逆上氣、破積聚、寒熱、其汁煎之、名射罔、殺禽獸。一名奚毒。一名卽子。一名烏喙。生山谷。

吳普曰、烏頭、一名萆。一名千狄。一名毒公。一名卑負。御覽作暴負。一名耿子。神農雷公桐君黃帝甘有毒。正月始生。葉厚。莖方中空。葉四四相當。與藁相似。

又云、烏喙。神農雷公桐君黃帝有毒。李氏小寒十月采。形如烏頭。有兩岐相合。如烏之喙。名曰烏喙也。所長惡使。盡與烏頭同。一名訾子。一名萆。神農岐伯有大毒。李氏大寒八月采。陰乾。是附子角之大者。長惡與附子同。御覽・大觀本節文。

名醫曰、生朗陵。正月二月采。陰乾。長三寸已上爲天雄。

按說文云、䓖、烏喙也。爾雅云、茇、葍草。郭璞云、卽烏頭也。江東呼爲葍。范子計然云、烏頭出三輔中。白者善。國語云、驪姬置葍于肉。韋昭云、葍、烏頭也。淮南子主術訓云、莫凶于雞毒。高誘云、雞毒、烏頭也。按雞毒卽奚毒。卽子。卽訾子。卽訾子側子也。名醫別出側子條。非。

天雄、味辛溫。主大風、寒溼痹。溼節痛。拘攣。緩急。破積聚。邪氣。金創。強筋骨。輕身健行。一名白幕。御覽引云・強志・令人武勇・力作不倦・大觀本・作鼎字・生山谷。

名醫曰、生少室。二月采根。陰乾。

案廣雅云、藉奚毒、附子也。一歲爲訾子。二歲爲烏喙。三歲爲附子。四歲爲烏頭。五歲爲天雄。淮南子繆稱訓云、天雄、烏喙、藥之凶毒也。良醫以活人。

半夏、味辛平。主傷寒寒熱。心下堅。下氣。喉咽腫痛。頭眩胸張。欬逆腸鳴。止汗。一名地文。一名水玉。已上八字・元本黑・生川谷。

吳普曰、半夏一名和姑。生微邱。或生野中。葉三三相偶。二月始生。白華員上。御覽

名醫曰、一名示姑。生槐里。五月八月采根。暴乾。

案月令云、二月半夏生。范子計然云、半夏出三輔。色白者善。列仙傳云、赤松子服水玉以教神農。疑卽半夏別名。

虎掌、味苦溫。主心痛。寒熱。結氣。積聚。伏梁。傷筋。痿。拘緩。利水道。生山谷。

吳普曰、虎掌、神農雷公苦無毒。岐伯桐君辛有毒。立秋九月采之。御覽引云・或生太山・或蔡・蜀・

名醫曰、生漢中及冤句。二月八月采。陰乾。

案廣雅云、虎掌、瓜屬也。

鳶尾、味苦平。主蠱毒邪氣。鬼注。諸毒。破癥瘕積聚。去水。下三蟲。生山谷。

吳普曰、鳶尾、治蠱毒。御覽

名醫曰、一名烏園。生九疑山。五月采。

案廣雅云、鳶尾、烏蘭也。疑當作鳶尾烏蘭也・烏射干也・是二物・唐本注云、與射干全別。

大黃、味苦寒。主下瘀血。血閉。寒熱。破癥瘕積聚。留飲。宿食。蕩滌腸胃。推陳致新。通利水穀。御覽・此下有通字・調中化食。安和五臟。生山谷。

吳普曰、大黃一名黃良。一名火參。一名膚如。神農雷公苦有毒。扁鵲苦無毒。李氏小寒。爲中將軍。或生蜀郡北部。或龍西。二月花生。生黃赤葉。四四相當。黃莖高三尺許。三月華黃。五月實黑。三月采根。根有黃汁。切陰乾。御覽

名醫曰、一名黃良。生河西及隴西。二月八月采根。火乾。

案廣雅云、黃良大黃也。

亭歷、御覽作葶藶・御覽作亭歷・味辛寒。主癥瘕積聚。結氣。飲食。寒熱。破堅。一名大室。一名大適。生平澤。及田野。

名醫曰、一名下歷。一名葶藶。生華城。立夏後。采實。陰乾。得酒良。

案說文云、葶、亭歷也。廣雅云、狗薺。大室。亭歷也。爾雅云、葶、亭歷。郭璞云、實葉皆似芥。淮南子繆稱訓云、亭歷急張。西京雜記云、亭歷死於盛夏。

桔梗、味辛微溫。主胸脅痛如刀刺。腹滿。腸鳴。幽幽驚恐悸氣。御覽引云・一名利如・大觀本・作鼎字・生山谷。

吳普曰、桔梗、一名符扈。一名白藥。一名利如。一名梗草。一名直如。神農醫和苦無毒。扁鵲黃帝鹹。岐伯雷公甘無毒。李氏大寒。葉如薺苨。莖如筆管。紫赤。二月生。御覽

名醫曰、一名利如。一名房圖。一名白藥。一名梗草。一名薺苨。生蒿高及冤句。二八月采根。暴乾。

案說文云、桔、桔梗、藥名。廣雅云、犂如、桔梗也。戰國策云、今求柴胡、及之畢黍。梁父之陰。則郄車而載耳。桔梗于沮澤。則鼠盡不得一焉。爾雅云、苨、蘮苨。郭璞云、薺苨。據名醫云、是此別名。下又出薺苨條。非。然陶宏景亦別爲二矣。

薺苨子、味苦寒。主齒痛出蟲。因痹。拘急。使人健行。見鬼。多食令人狂走。久服輕身。走及奔馬。強志。益力通神。一名橫唐。生川谷。

名醫曰、一名行唐。生海濱。及雍州。五月采子。

案廣雅云、葱葵、薺苨也。陶宏景云、今方家多作猥薺。舊作菪。案說文無菪薺字。史記淳于意傳云、菑川王美人懷子而不乳。飲以薺苨藥一撮。本草圖經引作浪蕩。是。

草蒿、味苦寒。主疥搔。痂痒。惡創。殺蟲。留熱在骨節間。明目。一名青蒿。一名方濆。生川澤。

名醫曰、生華陰。

案說文云、蒿、菣也。菣、香蒿也。或作藄。爾雅云、蒿菣。郭璞云、今人呼青蒿香中炙啖者爲菣。史記司馬相如傳、蓽閭。注漢書音義曰、蓽閭、一也。陶宏景云、卽今青蒿。

旋復花、味鹹溫。主結氣。脅下滿。驚悸。除水。去五臟間寒熱。補中。下氣。一名金沸。一名盛椹。生川谷。

名醫曰、一名戴椹。生平澤。五月采花。日乾。二十日成。

案說文云、莧、盜庚也。爾雅云、莧、盜庚。郭璞云、施旋似菊。

藜蘆、御覽作梨蘆・味辛寒。主蠱毒、欬逆、洩利、腸澼、頭瘍、疥搔、惡創。殺諸蟲毒。去死肌。一名葱苒。生山谷。

吳普曰、藜蘆一名葱葵。一名憐蘆。御覽引云・一名公葬・神農雷公辛有毒。御覽引云黃帝有毒・岐伯鹹有毒。李氏太寒。大毒。扁鵲苦有毒。大寒。葉根小相連。御覽引云・二月采根・

名醫曰、一名葱葵。一名山葱。生太山。三月采根。陰乾。

案廣雅云、藜蘆葱蔥也。范子計然云、藜蘆出河東。黃白者善。爾雅云、蒼山葱。疑非此。

鉤吻、御覽作鉤吻・味辛溫。主金創乳痓中惡風。欬逆上氣。水腫。殺鬼注。舊作注・御覽作注・是・蠱毒。一名野葛。生山谷。

吳普曰、秦鉤吻一名毒根。一名野葛。神農辛。雷公有毒。殺人。生南越山。或益州。葉如葛。赤莖。大如箭。方根黃。或生會稽東冶。正月采。御覽

名醫曰、生傅高山及會稽東野。

案廣雅云、莨鉤吻也。淮南子說林訓云、蝮蛇螫人。傅以和藍則愈。高誘云、和藍野葛。毒藥。博物志云、鉤吻毒。桂心葱葉溲解之。陶宏景云、或云鉤吻是毛茛。沈括補筆談云、閩中人呼爲吻莽。亦謂之野葛。嶺南人謂之胡蔓。俗謂之斷腸草。此草人間至毒之物。不入藥用。恐本草所出別是一物。非此鉤吻也。

射干、味苦平。主欬逆上氣。喉痹咽痛不得消息。散急氣。腹中邪逆。食飲大熱。一名烏扇。一名烏蒲。生川谷。

吳普曰、射干一名黃遂。御覽

名醫曰、一名烏翣。一名草蠶。生南陽田野。三月三日采根。陰乾。

案廣雅云、蒼尾、烏蒲、射干也。荀子勸學篇云、西方有木焉。名曰射干。莖長四寸。范子計然云、射干根如□□□安定。舊注云・合蛇合皮含字・味苦微寒。主鷹鷂寒熱邪氣。除熱。金創。疝痔。鼠瘻。惡創。頭瘍。一名蛇銜。生山谷。

名醫曰、生益州。八月采。陰乾。

按本草圖經云、或云是密瓢。卽是羅摩之別名。據陸璣云、芄蘭一名蘿摩。幽州謂之雀瓢。則卽爾雅蘿藦。芄蘭也。唐本草別出羅摩條。非又見女青。

恆山、舊作常山・御覽作恆山・是・味苦寒。主傷寒。寒熱。熱發。溫瘧。鬼毒。胸中痰結吐逆。一名互草。生川谷。

吳普曰、恆山一名漆葉。神農岐伯苦。李氏大寒。桐君辛有毒。二月八月采。

名醫曰、生益州及漢中。八月采根。陰乾。

案後漢書華陀傳云、陀授以漆葉青黏散。漆葉屑一斗。青黏十四兩。以是爲準。言久服去三蟲。利五藏。輕體。使人頭不白。

蜀漆、味辛平。主瘧及欬逆。寒熱。腹中癥堅。瘕結。積聚。邪氣。蠱毒。鬼注。舊作疰・御覽作蛀・生川谷。

吳普曰、蜀漆葉一名恆山。神農岐伯雷公辛有毒。黃帝辛。一經酸。如漆葉。藍青相似。五月采。御覽

名醫曰、生江陵山及蜀漢中常山。苗也。五月采葉。陰乾。

案廣雅云、恆山蜀漆也。范子計然云、蜀漆出蜀郡。

甘遂、味苦寒。主大腹疝瘕。腹滿。面目浮腫。留飲宿食。破癥堅積聚。利水穀道。一名主田。生川谷。

吳普曰、甘遂一名主田。一名曰澤。一名重澤。一名鬼醜。一名陵藁。一名甘藁。一名甘澤。神農桐君苦有毒。岐伯雷公有毒。御覽

名醫曰、一名甘藁。一名陵藁。一名陵澤。一名重澤。生中山。二月采根。陰乾。

案廣雅云、陵澤甘遂也。范子計然云、甘遂出三輔。

白斂、味苦平。主癰腫疽瘡。散結氣。止痛除熱。目中赤。小兒驚癇。溫瘧。女子陰中腫痛。一名兔核。一名白草。生山谷。

名醫曰、一名白根。一名鼠嚙。生衡山。二月八月采根。曝乾。

案說文云、菝白斂也。或作蔹。毛詩云、蔹蔓于野。陸璣疏云、蔹似栝樓。葉盛而細。其子正黑。如燕薁。不可食也。幽人謂之烏服。其莖葉蜜以哺牛。除熱。爾雅云、蔹蔆。郭璞云、未詳。據玉篇云、蔹白斂也。經云、一名菟核。核與蔆聲相近。卽此矣。

青葙子、味苦微寒。主邪氣。皮膚中熱。風搔身痒。殺三蟲。子名草決明。療肝口苦。一名草蒿。一名萋蒿。生平谷。

名醫曰、生道傍。三月三日采莖葉。陰乾。五月六日采子。

案魏略云、初平中有青牛先生。常服青葙子。葙當作箱字。

菌、味鹹平。主心痛。溫中。去長恚。白癡。蠱毒。蛇螫毒。蠱疰。諸蟲。一名蕈。生池澤。

名醫曰、生東海及渤海。章武。八月采。陰乾。

案爾雅云、菌灌芝。文選注引作菌。聲類云、菌灌芝也。疑卽此溫菌。或一名溫。一名芝。未敢定之。

白及、御覽作及・味苦平。主癰腫惡瘡。敗疽。傷陰。死肌。胃中邪氣。賊風。鬼擊。痱緩。不收。一名甘根。一名連及草。生川谷。

吳普曰、神農苦。黃帝辛。李氏大寒。雷公辛無毒。莖葉似生薑。藜蘆。十月華。面上紫赤。根白連。二月八月九月采。

名醫曰、生北山及冤句。及越山。

案隋羊公服黃精法云、黃精一名白及。亦爲黃精別名。今名醫別出黃精條。

大戟、味苦寒。主蠱毒。十二水腫。滿。急痛。積聚。中風。皮膚疼痛。吐逆。一名卬鉅。案此無生川澤三字者。古或與澤途爲一條・

名醫曰、生常山。十二月采根。陰乾。

案爾雅云、蕎卬鉅。郭璞云、今藥草大戟也。淮南子繆稱訓云、大戟去水。

澤漆、味苦微寒。主皮膚熱。大腹。水氣。四肢面目浮腫。丈夫陰氣不足。生川澤。

名醫曰、一名漆茎。大戟苗也。生太山。三月三日。七月七日采莖葉。陰乾。

案廣雅云、泰莖澤漆也。

茵芋、味苦溫、主五藏邪氣、心腹寒熱、風痺如瘧狀、發作有時、諸關節風濕痛、生川谷。

吳普曰、茵芋一名卑共、微溫有毒、狀如莽草而細軟。御覽

名醫曰、一名芫草、一名卑共、生太山、三月三日采葉、陰乾。

貫衆、味苦微寒、主腹中邪熱氣、諸毒殺三蟲、一名貫節、一名貫渠、一名百頭。御覽作白。一名虎卷、一名扁符、生山谷。

吳普曰、貫衆一名貫來、一名貫中、一名渠母、一名貫鉗、一名伯芹、一名藥藻、一名扁符、一名黃鐘。神農、岐伯苦有毒、桐君扁鵲苦、一經甘有毒、黃帝鹹酸、一經苦無毒、葉黃兩兩相對、莖黑毛聚生、冬夏不老、四月花、八月實黑、聚相連卷旁行生、三月八月采根、五月采藥。御覽

名醫曰、一名伯萍、一名藥蓋、此謂草鴟頭、生元山及宛句、少室山、二月八月采根、陰乾。

案說文云、芾草也、廣雅云、貫節、貫衆也、爾雅云、櫟貫衆、郭璞云、葉圓銳、莖毛黑、布地冬夏不死、一名貫渠、又上云、扁符止、郭璞云未詳、據經云一名鉗符、即此也、爾雅當云、籠符止、濮貫衆。

蕘花、味苦平寒、主傷寒溫瘧、下十二水、破積聚、大堅癥瘕、蕩滌腸胃中留癖飲食、寒熱邪氣、利水道、生川谷。

名醫曰、生咸陽及河南中牟、六月采花、陰乾。

牙子、味苦寒、主邪氣熱氣、疥搔惡瘡、創痔、去白蟲、一名狼牙、生川谷。

吳普曰、狼牙一名支蘭、一名狼齒、一名犬牙、一名抱子。神農黃帝苦有毒、桐君咸鹹、岐伯甘扁鵲苦無毒、生宛句、葉青根黃赤、六月七月華、八月實、黑正月八月采根。御覽

名醫曰、一名狼齒、一名狼子、一名犬牙、生淮南及宛句、八月采根、暴乾。

案范子計然云、狼牙出三輔、色白者善。

羊蹄、味辛溫、主賊風在皮膚中淫淫痛、溫瘧、惡毒諸痟、生川谷。

吳普曰、羊蹄一名蜀、神農雷公辛有毒、生淮南、治賊風惡毒諸邪氣。御覽

名醫曰、一名玉支、生太行山及淮南山、三月采花、陰乾。

案廣雅云、羊蹄蹄、尖光也、古今注云、羊蹄蜀花黃、羊食之則死、羊見之則蹶蹄分散、故名羊蹄蹄、陶宏景云、花苗似鹿葱。

商陸、味辛平、主水張疝瘕痹、除蹇腫、殺鬼精物、一名夜呼、生川谷。

名醫曰、如人形者有神、生成陽。

案說文、蓫草、枝枝相值、葉葉相當、廣雅云、常蓼、馬尾、商陸也、爾雅云、蓫蔹、馬尾、郭璞云、今關西亦呼爲蔹、江東爲當陸、周易夬云、莧陸夬夬、鄭元云、莧陸、商陸也、蓋蔹即蓫俗字、商即蓫假音。

羊蹄、味苦寒、主頭禿疥搔、除熱、女子陰蝕。御覽此四字作無字。一名東方宿、一名連蟲陸、一名鬼目、生川澤。

名醫曰、名蓄、生陳留。

案說文云、萆草也、讀若蓋、蓋草也、芨、堇草也、廣雅云、堇、羊蹄也、毛詩云、言采其蓫、箋云、蓫、牛蘈也、陸機明云、本又作蓄、陸璣云、今人謂之羊蹄、陶宏景云、今人呼禿菜、即是蓄音之譌、詩云、言采其蓄、案陸英疑即此草之花、此草一名連蟲陸、又陸英即蒴藋、一名堇也、亦苦寒。

蓄蓄、味辛平、主浸淫疥搔、疽痔、殺三蟲。御覽引云、一名蓄竹、大觀本無文。生山谷。

吳普曰、蓄蓄一名蓄辯、一名蓄蓋。御覽

名醫曰、生東萊、五月采、陰乾。

案說文云、蓄、蓄玩也、玩、蓄玩也、薄水蓄、玩、讀若督、爾雅云、竹蓄、郭璞云、似小蓼、赤莖節、好生道旁、可食、又殺蟲、毛詩云、綠竹猗猗、傳云、竹、蓄竹也、韓詩薄云、薄、蓄玩也、石經同。

狼毒、味辛平、主欬逆上氣、破積聚飲食、寒熱、水氣惡創、鼠瘻、疽蝕、鬼精、蠱毒、殺飛鳥走獸、一名續毒、生山谷。

名醫曰、生秦亭及奉高、二月八月采根、陰乾。

案廣雅云、狼毒也、疑上脫續毒二字、中山經云、大騩之山有草焉、其狀如蓍而毛、背華而白實、其名曰狼、服之不夭、可以爲腹病。

白頭翁、味苦溫、主溫瘧、狂易、寒熱、癥瘕積聚、瘈氣、逐血、止痛、療金瘡、一名野丈人、一名胡王使者、生山谷。

吳普曰、白頭翁一名野丈人、一名奈河草、神農扁鵲苦無毒、生嵩山川谷、破氣狂寒熱、止痛。御覽

名醫曰、一名奈河草、生高山及田野、四月采。

案陶宏景云、近根處有白茸、狀似人白頭、故以爲名。

鬼臼、味辛溫、主殺蠱毒鬼注、精物、辟惡氣不祥、逐邪、解百毒、一名爵犀、一名馬目毒公、一名九臼、生山谷。

吳普曰、一名九臼、一名雀犀、一名馬目公、一名解毒、生九眞山谷及宛句、二月八月采根。御覽

名醫曰、一名天臼、一名解毒、生九眞及宛句、二月八月采根。

羊桃、味苦寒、主熛熱、身暴赤色、風水積聚、惡瘡、除小兒熱、一名鬼桃、一名羊腸、生川谷。

名醫曰、一名萇楚、一名御弋、一名銚弋、生山林及田野、二月采、陰乾。

案說文云、萇、萇楚銚弋、一名羊桃、廣雅云、鬼桃、銚弋、羊桃也、中山經云、釐山多羊桃、狀如桃而方、莖可以爲皮張、爾雅云、長楚、銚弋、郭璞云、今羊桃也、或曰鬼桃、葉似桃華、白子如小麥、亦似桃、毛詩云、隰有萇楚、傳云、萇楚、銚弋也、陸璣云、今羊桃是也、葉長而狹、華紫赤色、其枝莖蔓弱、過一尺、引莖於草上、令人以爲汲灌、重而善沒、不如楊柳也、近下根、刀切其皮、著熱灰中、脫之可韜筆管。

女青、味辛平、主蠱毒逐邪惡氣、殺鬼溫瘧、辟不祥、一名雀瓢。御覽作瓢。

吳普曰、女青一名雀由、神農黃帝辛。御覽

名醫曰、蛇銜根也、生朱崖、八月采、陰乾。

案廣雅云、女青、烏蔦也、爾雅云、蘠蕍、郭璞云、蘠蕍蔓生、斷之有白汁可噀、毛詩云、蕍、蘭之支、傳云、蕍

蘭蓍也。陸璣云。一名蘿蔔。幽州人謂之雀瓢。別錄云。雀瓢白汁。注蟲蛇毒。即女青苗汁也。唐本草。別出蘿蔔條非。

連翹、味苦平。主寒熱。鼠瘻。瘰癧。癰腫。惡創。瘈瘲。結熱。蠱毒。一名異翹。一名蘭華。一名軹。一名三廉。生山谷。

名醫曰。一名折根。生太山。八月采。陰乾。

案爾雅云。連。異翹。郭璞云。一名連苕。又名連本草云。

關茹。（御覽作閭。是。）味辛寒。主蝕惡肉。敗創。死肌。殺疥蟲。排膿。惡血。除大風熱氣。善忘不樂。生川谷。

吳普曰。閭茹一名離樓。一名屈居。神農辛。岐伯酸。鹹有毒。李氏大寒。二月采葉。黃高四五尺。葉四四相當。四月華黃。五月實黑。根黃有汁。亦同黃。三月五月采根。黑頭者良。（御覽）

名醫曰。一名屈据。一名雌婁。生代郡。五月采。陰乾。

案廣雅云。屈居。蘆茹也。范子計然云。閭茹出武都。黃色者善。

烏韭、味甘寒。主皮膚往來寒熱。利小腸。旁光氣。生山谷石上。

案廣雅云。昔邪。烏韭也。在屋曰昔邪。在牆曰垣衣。西山經云。草焉。狀如烏韭。唐本注云。即石衣也。亦名石苔。又名石髮。按廣雅又云。石髮。石衣也。未知是一否。

鹿藿、味苦平。主蠱毒。女子腰腹痛。不樂。腸鳴。瘈瘲。（御覽作驚。）驚氣。生山谷。

名醫曰。生汶山。

案說文云。藿。鹿藿也。讀若劇。廣雅云。藿。鹿藿也。爾雅云。豳。鹿藿。其實莥。郭璞云。今鹿豆也。葉似大豆。根黃而香。蔓延生。

蚤休、味苦微寒。主驚癎。搖頭弄舌。熱氣在腹中。痎瘧。癰創。陰蝕。下三蟲。去蛇毒。一名蚩休。生川谷。

名醫曰。生山陽及冤句。

案郭璞云。蚤休。曰蚩休。曰重樓金線。曰重臺。曰草甘遂。今人謂之紫河車。服食家所用。而盤蕪亦可愛。多植庭院間。

石長生、味鹹微寒。主寒熱。惡創。火熱。辟鬼氣不祥。（御覽作辟溫氣。不詳。鬼氣。）一名丹草。（御覽引云丹沙草。）生山谷。

吳普曰。石長生。神農苦。雷公辛。一經甘。生咸陽。（御覽）

名醫曰。生咸陽。

陸英、味苦寒。主骨間諸痹。四肢拘攣。痿酸。鄰。寒痛。陰痿。短氣。不足。脚腫。生川谷。

名醫曰。生熊耳及冤句。立秋采。又曰菊花。味酸溫有毒。一名蕺。（今本誤作蓋。）一名蕺。生田野。春夏采葉。秋多采莖根。

案說文云。蕺草也。讀若益。及。蕺草也。讀若急。蕺。蕺草也。廣雅云。蕺。盆。陸英。蕺也。爾雅云。蕺。菖蒲。唐本注陸英云。此物菊蕺是也。後人不識。浪出菊蕺條。今注云。陸英。味苦寒無毒。菊蕺味酸溫有毒。既此不同。雖謂一種。蓋其類爾。

蓋蒲、味苦平。主久欬上氣喘逆。久寒驚悸。痂疥。白禿。瘙氣。殺皮膚小蟲。生川谷。

吳普曰。王芻一名黃草。神農雷公口。生太山山谷。治身熱邪氣。小兒身熱氣。（御覽）

名醫曰。可以染黃。作金色。生寄衣。九月十月采。

案說文云。蓋草也。蓋。王芻也。爾雅云。蓋。王芻。郭璞云。蓋、蓐也。今呼鵝腳莎。毛詩云。綠竹猗猗。傳云。蓋、王芻也。唐本注云。蓋草俗名蓋蓐草。爾雅所謂王芻。

牛扁、味苦微寒。主身皮創熱氣。可作浴湯。殺牛蝨小蟲。又療牛病。生川谷。

名醫曰。生桂陽。

案陶宏景云。太常貯名扁特。或名扁毒。

夏枯草、味苦辛寒。熱瘰癧。鼠瘻。頭創。破癥。散瘿結氣。腳腫。溼痹。輕身。一名夕句。一名乃東。生川谷。

名醫曰。一名燕面。生蜀郡。四月采。

茺蔚、味辛溫。主欬逆上氣。喉鳴喘咽腫。短氣。蠱毒。鬼疰。疝瘕。癰腫。殺蟲魚。一名去水。生川谷。（舊在木部。非。）

吳普曰。茺蔚一名益母。一名貞草。根一名黃大戟。神農黃帝有毒。扁鵲岐伯苦。李氏大寒。二月生。葉青。加厚則黑。華有紫赤白者。三月實。蔚。葉乃生。三月五月采。華。茺花根。一名赤茺根。神農雷公苦有毒。生鄱陽。九月八月采。陰乾。久服令人洩。可用毒魚。（御覽亦見圖經節文。）

名醫曰。一名毒魚。一名杜茺。其根名蜀桑。可用毒魚。生淮源。三月三月采花。陰乾。

案說文云。茺。魚毒也。爾雅云。杌。魚毒。郭璞云。杌。大木。子似栗。生南方。皮厚。汁赤。中藏卵果。范子計然云。茺華出三輔。史記倉公傳。隨苗女子病蟯瘕。飲以茺花一撮。出蟯可數升。病已。顏師古注急就篇云。郭景純說。誤耳。其生南方。用藏卵果。自別一杌木。乃左思所云。縣杌。梔檀者耳。非毒魚之杌。

右草下品四十九種。舊四十八種。考木部茺華宜入此。

巴豆、味辛溫。主傷寒。溫瘧。寒熱。破癥瘕。結聚。堅積。留飲。淡癖。大腹水腫。蠱毒。五藏六府。開通閉塞。利水穀道。去惡內。除鬼毒。蠱注邪物。（御覽作鬼。邪注。）殺蟲魚。一名巴叔。（蔡作椒。御覽作菽。）生川谷。

吳普曰。巴豆。一名巴戟。神農岐伯桐君辛。有毒。黃帝甘。有毒。李氏主溫熱寒。葉如大豆。八月采。（御覽）

名醫曰。生巴郡。八月采。陰乾。用之去心皮。

案廣雅云。巴。赤。巴豆也。列仙傳云。元俗飼巴豆。淮南子說林訓云。魚食巴菽而死。人食之而肥。

蜀椒、味辛溫。主邪氣。欬逆。溫中。逐骨節皮膚死肌。寒溼。痹痛。下氣。久服之。頭不白。輕身增年。生川谷。

名醫曰。一名巴椒。一名蔓椒。生武都及巴郡。八月采實。陰乾。

案范子計然云。蜀椒出武都。赤色者善。陸璣云。蜀人作茶。又見秦椒。即爾雅蔓。陶宏景云。俗呼爲樧。

皁莢、味辛鹹溫。主風痹。死肌。邪氣。風頭。淚出。利九竅。殺精物。生川谷。

名醫曰。生雍州及魯鄭縣。如豬牙者良。九月十月采。陰乾。

案說文云。莢。草實。范子計然云。皁莢出三輔。上價一枚一錢。廣志曰。雞栖子。皁莢也。（御覽）皁即草省文。

楊華、味苦寒。主風水黃疸。面熱黑。一名柳絮。葉主馬疥痂。創。實主消癰。逐膿血。子汁療渴。生川澤。

名醫曰。生琅邪。

案說文云。柳、小楊也。檉、河柳也。楊木也。爾雅檉、河柳。郭璞云。今河旁赤莖小楊。又旄澤柳。郭璞云。生澤中者。又楊。蒲柳。郭璞云。可以爲箭。左傳所謂董澤之蒲。毛詩云。無折我樹杞。傳云。杞、木名也。陸璣云。杞、柳屬也。

楝實、味苦寒。主溫疾傷寒。大熱煩狂。殺三蟲疥瘙。利小便水道。生山谷。

名醫曰。生荊山。

案說文云。楝木也。中山經云。其實如楝。郭璞云。楝、木名。子如指頭。白而黏。可以浣衣也。淮南子時則訓云。七月其樹楝。高誘云。楝實。鳳皇所食。今雒城旁有楝樹。實秋熟。

郁李仁、味酸平。主大腹水腫。面目四肢浮腫。利小便水道。根。主齒斷腫。齲齒堅齒。一名爵李。生川谷。

吳普曰。郁李。一名雀李。一名車下李。一名棣。御覽

名醫曰。一名車下李。一名棣。生高山及邱陵上。五月采根。

案說文云。棣、白棣也。廣雅云。山李。雀其啟也。爾雅云。常棣。棣。郭璞云。今關西有棣樹。子如櫻桃可食。毛詩云。六月食鬱。傳云。鬱。棣。郭璞云。其樹高五六尺。其實大如李。正赤。食之甜。又詩云。常棣之華。傳云。常棣。棣也。陸璣云。奧李。一名雀李。一曰車下李。所在山中皆有。其花。或白或赤。六月中熟。大子如李。子可食。沈括補筆談云。晉宮閣銘曰。華林園中有車下李。三百一十四株。蓋李一株。

莽草、味辛溫。主風頭癰腫乳癰。疝瘕。除結氣。疥搔。御覽有二字 殺蟲魚。生山谷。

吳普曰。莽草一名春草。神農辛。甘。公桐君苦。有毒。生上谷山谷中。或冤句。五月采。治風。御覽

名醫曰。一名葞。一名春草。生上谷及冤句。五月采葉。陰乾。

案中山經云。朝歌之山有草焉。名曰莽草。可以毒魚。又蕺山有木焉。其狀如棠而赤。葉可以毒魚。爾雅云。葞。莽草。郭璞云。一名芒草。本草云。周禮云。翦氏掌除蠹物。以莽草薰之。范子計然云。莽草。出三輔者善。陶宏景云。字亦作茻。

雷丸。御覽作雷公丸。本草作雷矢。味苦寒。主殺三蟲。逐毒氣。胸中熱利。丈夫不利。女子作癰瘡。除小兒百病。御覽引云。一名雷矢。大觀本草。生山谷。

吳普曰。雷丸。神農苦。黃帝岐伯桐君甘。有毒。扁鵲甘無毒。李氏大寒。御覽引云。一名雷實。或生漢中。八月采。

名醫曰。一名雷矢。一名雷實。生石城及漢中。土中。八月采根。暴乾。

案范子計然云。雷矢出漢中。色白者善。

桐葉、味苦寒。主惡蝕。創。著陰皮。主五痔。殺三蟲。蕁。主傳豬。創。飼豬。肥大三倍。生山谷。

名曰醫。生桐柏山。

案說文云。桐、桑也。梧。梧桐木。一名櫬。爾雅云。櫬、梧。郭璞云。今梧桐。又桑桐木。郭璞云。即梧桐。毛詩云。梧

桐生矣。傳云。梧桐柔木也。

梓白皮、味苦寒。主熱。去三蟲。葉搗傅豬創。飼豬肥大三倍。生山谷。

名醫曰。生河內。

案說文云。梓、楸也。或作椑。椅梓也。楸梓也。檟楸也。爾雅云。槐小葉曰榎。郭璞云。槐當爲楸。楸細葉者爲榎。又大而散。楸。郭璞云。老乃皮粗散者爲楸。又椅梓。郭璞云。即楸。毛詩云。椅桐梓漆。傳云。椅梓屬。陸璣云。梓者楸之疏理。白色而生子者。曰梓。梓實。桐皮。曰椅。

石南、味辛苦。主養腎氣。內傷陰衰。利筋骨皮毛。實。殺蠱毒。破積聚。逐風痺。一名鬼目。生山谷。

名醫曰。生華陰。二月四月采實。陰乾。

黃環、味苦平。主蠱毒鬼注。鬼魅邪氣。在臧中。除款逆寒熱。一名凌泉。一名大就。生山谷。

吳普曰。蜀黃環。一名生芻。一名根韭。神農黃帝岐伯桐君扁鵲辛。一經。味苦。有毒。二月生。初出。正赤。高二尺。葉黃。員端。大莖。葉有汙。黃白。五月實員。三月采根。根黃。從理如車轄。解。治蠱毒。御覽

名醫曰。生蜀郡。三月采根。陰乾。

案蜀都賦。有黃環。劉逵云。黃環出蜀郡。沈括補筆談云。黃鉞。即今朱藤也。天下皆有。葉如槐。其花穗縣紫色如葛花。可作菜食。火不熟。亦有小毒。京師人家園圃中。作大架種之。謂之紫藤花者是也。

澤漆、味辛寒。主身皮膚中熱。除邪氣。止遺溺。可作浴湯。生山谷及田野故邱虛地。

名醫曰。一名巨骨。生熊耳山。四月采。

案李當之云。澤漆。一名楊櫨。一名牡荊。一名空疏。皮白中空。時時有節。子似枸杞。子冬日熟。色赤。味甘苦。

鼠李、主寒熱瘧。瘧劑。生田野。

吳普曰。鼠李。一名牛李。御覽

名醫曰。一名牛李。一名鼠梓。一名皀。采無時。

案說文云。樲、鼠梓木。爾雅云。樲、鼠梓。郭璞云。樲、鼠也。今江東有虎梓。毛詩云。北山有樲。傳云。樲、鼠梓。樹

名醫名鼠梓。未知是此否。唐本注云。一名趙李。一名皂李。一名烏槎。

藥實根、味辛溫。主邪氣諸惡。疼酸。結絕。傷。補骨髓。一名連木。生山谷。

名醫曰。生蜀郡。采無時。

案廣雅云。貝父。藥實也。

蘻蕍、味苦寒。主目痛淚出。傷骨。消。目腫。生川谷。

名醫曰。生漢中。五月采。

案說文云。蘻木似櫚。山海經云。雲雨之山。有木名蘻。黃木赤枝青葉。堯帝焉取藥。郭璞云。虎通云。諸侯墓樹柏。大夫蘻。士槐。沈括補筆談云。蘻有一種。樹生。其實可作數珠者。謂之木蘻。即本草蘻花是也。

蓽茇、味苦溫。主風寒溼痺。腰節疼。除四肢厥氣。鄒澍。一名家椒。生川谷及邱冢間。

名醫曰。一名豬椒。一名蔬椒。一名狗椒。生雲中。采蓽根。煮釀酒。

案陶宏景云。俗呼爲樛。以椒蘊小不香爾。一名稀椒。可以蒸病出汗也。

右木下品一十七種。舊十八種。今移芫華入草。

豚卵。味苦溫。主懸蹄。風疾。鬼注。蠱毒。除寒熱。黃豚。五癃。邪氣。釐縮。一名豚顛。懸蹄。主五痔。伏熱在腸。陽雞。內蝕。

案說文云。豨、小豕也。从豕省。象形。从又持肉以給祭祀。篆文作豚。方言云豬。其子或謂之豚。或謂之豶。

吳揚之間謂之豬子。

麋脂、味辛溫。主癰腫惡創。死肌。寒風。溼痺。四肢拘緩不收。風頭。風氣。通腠理。一名官脂。生山谷。

名醫曰。生南山及淮海邊。十月取。

案說文云。麋。鹿屬。冬至解其角。漢書云。劉向以爲麋之爲言迷也。蓋牝獸之淫者也。

鼷鼠。主瘡胎。令人產易。生平谷。

名醫曰。生山都。

案說文云。鼷鼠。形飛走且乳之鳥也。籀文作鼷。廣雅云。鼷鼠。飛鼠也。陶宏景云是蝙蝠。一名飛生。見爾雅云。鼷鼠。夷由也。舊作鼷。非。

六畜毛蹄甲。味鹹平。主鬼注。蠱毒。寒熱。驚癇。癲痓。狂走。駱駝毛。尤良。

案陶宏景云。六畜。謂馬、牛、羊、豬、狗、雞也。蹄。卽蹄省文。

右獸下品四種。舊同。

蝦蟇。味辛寒。主邪氣。破癥堅。血癰腫。陰創。服之不忍熱病。生池澤。

名醫曰。一名蟾蜍。一名蠬。一名去甫。一名苦蠪。生江湖。五月五日取。陰乾。東行者良。

案說文云。蝦、蝦蟆也。蟆、蝦蟆也。蝦蟆也。蟇、蝦蟆也。蟇、蛷蟇。齊諸也。其鳴齊諸。其皮蹙。其行蛷蛷。或作蝦蟇。蝦蟇。齊諸也。夏小正傳云。域也者。長股也。或曰屈造之屬也。詩曰。得此戮蟇。言其行蛷蛷。蝦蟇。齊諸。以脰鳴者。廣雅云。蛙。苦蠪。胡蟇。蝦蟆也。爾雅云。蟇。鼃。蟾諸。郭璞云。似蝦蟆。居陸地。淮南謂之去蟹。又蟹蟆。郭璞云。蛙類。周禮云。蝈氏。鄭司農云。蝈。讀爲蟈。蟈。蝦蟇也。元謂蝈。今御所食蛙也。月令云。仲夏之月。反舌無聲。蔡邕云。今謂之蝦蟇。薛君韓詩注云。戚施蟾蜍。高誘注淮南子云。蟾蜍蝦蟇也。又蝈、蝦蟇也。又蟾蜍。蝦蟇。又鼓造。一曰蝦蟇。抱樸子內篇云。或問魏武帝曾收左元放。而桎梏之。而得自然解脫。以何法乎。抱樸子曰。以自解去父血。

馬刀、味辛微寒。御覽有補中二字。大觀本。無字。主漏下赤白。寒熱。破石淋。殺禽獸。賊風。生池澤。

吳普曰。馬刀。一名齊魚。神農岐伯桐君鹹有毒。扁鵲小寒大寒。生池澤江海。采無時也。御覽

名醫曰。一名馬蛤。生江湖及東海。采無時。

案范子計然云。馬刀出河東。說文類聚引本經云。文蛤表有文。又曰馬刀。一曰名蛤。則豈古本與文蛤爲一邪。

蛇蛻、味鹹平。主小兒百二十種驚癇。瘈瘲。痓。寒熱。腸痔。蠱毒。蛇痼。火熬之良。一名龍子衣。一名龍子衣。一名蛇符。一名龍子單衣。一名弓皮。生川谷及田野。

吳普曰。蛇蛻。一名龍子單衣。一名弓皮。一名蛇附。一名蛇筋。一名龍皮。一名龍單衣。御覽

名醫曰。一名龍子皮。生荊州。五月五日十五日取之良。

案說文云。它、蟲也。从虫而長。象蜿曲形。或作蛇。蛇蟬所解皮也。廣雅云。蝮蛇、蚖也。中山經云。來山多蛇。郭璞云。卽蛇皮脫也。

邱螭、味鹹寒。主蛇瘕。去三蟲。伏尸。鬼注。蠱毒。殺長蟲。仍自化作水。生平土。

吳普曰。蚯螭。一名白頸螭。螭。一名附引。御覽

名醫曰。一名土龍。二月取。陰乾。

案說文云。螭。側行者。或作螭。螭螭也。廣雅云。蚯螭。蜿螭。引無也。爾雅云。蝘螭。蜥蜴。江東呼寒螭。舊作蚯。非。呂氏春秋。淮南子。邱螭出不。从蟲。又說山訓云。螭無筋骨之強。高誘注。螭。一名蜥蜴也。舊又有白頸二字。據吳普古本當無也。

蠮螬、味辛平。主久聾。欬逆。毒氣。出刺出汗。生川谷。

名醫曰。一名土蜂。生熊耳及泮柯。或人屋閒。

案說文云。蠮螬。蒲盧。細要土蜂也。或作蜾蠃。蜾蠃也。廣雅云。土蜂。蠮螬也。爾雅土蜂。毛詩云。螟蛉有子。蜾蠃負之。傳云。蜾蠃。蒲盧也。禮記云。夫政也者。蒲盧也。鄭云。蒲盧。果蠃。謂土蜂也。方言云。蠭。其小者謂之蠮螬。或謂之蜻蛉。說文無蠮字。或當爲醫。

吳蝨、味辛溫。主鬼注。蠱毒。噉諸蛇蟲魚毒。殺鬼物老精。溫虐。去三蟲。御覽引云。一名至掌。大觀本在水經下。生川谷。

名醫曰。生大吳江南。赤頭足者良。

案廣雅云。蝨。蛆。吳公也。

水蛭、味鹹平。主逐惡血瘀血。月閉。御覽作水閉。破血瘕積聚。無子。利水道。生池澤。

名醫曰。一名蚝。一名至掌。生雷澤。五月六月采。暴乾。

案說文云。蛭、蟣也。蟣、蛭蛭。至掌也。爾雅云。蛭蟣。郭璞云。今江東呼水中蛭蟲入人肉者爲蟣。又蛭蟣至掌。郭璞云。未詳。據名醫。卽蛭也。

斑苗、味辛寒。主寒熱。鬼注。蠱毒。鼠瘻。惡創。疽蝕。死肌。破石癰。一名龍尾。生川谷。

吳普曰。斑貓。一名斑蝥。一名龍蝥。一名斑苗。一名勝髮。一名盤蝥。一名妾青。神農辛。岐伯鹹。桐君有毒。

扁鵲甘有大毒。生河內川谷。或生水石。

名醫曰。生河東。八月取。陰乾。

案說文云、蟹、蟹、蟹、蟹也、廣雅云、蟹、蟹、蟹、蟹也、名醫別出芫青條、非、芫、蚑音相近也、舊作猫、俗字、据吳氏云、一名斑苗是也、

貝子、味鹹平、主目翳、鬼注、蠱毒、腹痛、下血、五癃、利水道、燒用之良、生池澤、

名醫曰、一名貝齒、生東海、

案說文云、貝、海介蟲也、居陸名蚧、在水名蛸、象形、爾雅云、貝小者鮔、郭璞云、今細貝、亦有紫色、出日南、又蟹、小而橢、郭璞云、即上小貝、

石蠶、味鹹寒、主五癃、破石淋、墮胎、內解結氣、利水道、除熱、一名沙蟲、生池澤、

吳普曰、石蠶亦名沙蟲、神農雷公酸無毒、生淡中、治五淋、破隨內結氣、利水道、除熱、御覽

名醫曰、生江淡、

案廣雅云、沙蟲、蟺、蟺也、淮南萬畢術云、沙蟲、一名蟣活、一名地肥、御覽引李當之云、類蟲、形如老蠶、生附石、廣志云、皆蟲、蟲色赤、大過蟣、在水中、入人皮中、殺人、與李似不同、

雀甕、味甘平、主小兒驚癇寒熱、結氣、蠱毒、鬼注、一名躁舍、

名醫曰、生漢中、采蒸之、生樹枝間、蛸蛸房也、八月取、

案說文云、蛸、蛸蛸、蛸蛸、蛸

杏核仁、味甘溫、主欬逆上氣、雷鳴喉痹下氣、產乳金創、寒心、賁豚、生川谷、

名醫曰、生晉山、

案說文云、杏、果也、管子地員篇云、五沃之土、其木宜杏、高誘注淮南子云、杏有核在中、

右果、下品二種、舊同、

腐婢、味辛平、主痎瘧寒熱、邪氣、洩利、陰不起、病酒頭痛、生漢中、

吳普曰、小豆花、一名腐婢、舊作付、月誤、神農甘毒、七月采、陰乾、四十日、治頭痛止渴、御覽

名醫曰、生漢中、即小豆花也、七月采、陰乾、

右米穀、下品一種、舊同、

苦瓠、味苦寒、主大水、面目四肢浮腫、下水、令人吐、生川澤、

名醫曰、生晉地、

案說文云、瓠、匏也、廣雅云、匏瓠也、爾雅云、瓠棲、蠡、毛詩云、瓠有苦葉、傳云、匏謂之瓠、又九月斷壺、傳云、壺、瓠也、古今注云、瓠、壺蘆也、壺盧、瓠之無柄者、瓠有柄者、又云瓢瓠也、其揔曰匏、瓠則別名、

水斷、味甘平、主女子赤沃、止血養精、保血脈益氣、令人肥健、嗜食、一名水英、生池澤、

名醫曰、生南海、

案說文云、芹、楚葵也、近菜類也、周禮有菹菹、爾雅云、芹、楚葵、郭璞云、今水中芹菜、字林云、蓴、蒲生水中、

根可緣器、又云蒓菜、似蒜、生水中、

右菜、下品二種、舊同、

彼子、味甘溫、主腹中邪氣、去三蟲、蛇螫、蠱毒、鬼注、伏尸、生山谷、奪在唐本退中、

名醫曰、生永昌、

案陶宏景云、方家從來無用此者、古今諸醫、及藥家子不復識、又一名雞子、不知其形何類也、葛洪鍋云、樹似杉、子如頃、鄉本經蟲部云、彼子、蘇注云、彼字合從木、爾雅云、彼一名榧、

三合合三百六十五種、法三百六十五度、一度應一日、以成一歲、倍其數、合七百三十名也、

掌禹錫曰、本草例、神農本經以朱書名、醫別錄以墨書、神農藥三百六十五種、今此言倍其數、合七百三十名、是併名醫別錄副品而言也、則此下節別錄之文也、當作墨書矣、蓋傳寫淩久、朱墨錯亂之所致耳、

案禹錫說是也、改爲細字、

藥有君臣佐使、以相宣攝合和、宜用一君、二臣、三佐、五使、又可一君、三臣、九佐使也、

藥有陰陽、配合、子母兄弟、根莖華實、草石骨肉、有單行者、有相須者、有相使者、有相畏者、有相惡者、有相反者、有相殺者、凡此七情合和時之當用、相須相使者良、勿用相惡相反者、若有毒宜制、可用相畏相殺者、不得、勿合用也、

藥有酸鹹甘苦辛五味、又有寒熱溫涼四氣、及有毒無毒、陰乾暴乾、采造時月、生熟土地所出真僞陳新、並各有法、

藥性有宜丸者、宜散者、宜水煮者、宜酒煮者、宜膏煎者、亦有一物兼宜者、亦有不可入湯酒者、並隨藥性、不得違越、

欲療病先察其原、先候病機、五臟未虛、六府未竭、血脈未亂、精神未散、服藥必活、若病已成、可得半愈、病執已過、命將難全、

若用毒藥療病、先起如黍粟、病去即止、不去倍之、不去十之、取去爲度、

療寒以熱藥、療熱以寒藥、飲食不消以吐下藥、鬼注蠱毒、以毒藥、癰腫創瘡、以鍼藥、風溼、以風溼藥、各隨其所宜、

病在胸膈以上者、先食後服藥、病在心腹以下者、先服藥而後食、病在四肢血脈者、宜空腹而在旦、病在骨髓者宜飽滿而在夜、

夫大病之主、有中風傷寒、寒熱溫瘧、中惡霍亂、大腹水腫、腸澼下利、大小便不通、賁豚上氣、欬逆嘔吐、黃疸、消渴、留飲、癖食、堅積、癥瘕、邪氣、鬼注、喉痹、齒痛、耳聾、目盲、金創、接折、癰腫、惡創、痔瘻、髮瘡、男子五勞七傷、虛乏羸瘦、女子帶下崩中、血閉陰蝕、蟲蛇蠱毒所傷、此大略宗兆、其間變動枝葉、各宜依端緒以取之、

右序例白字、

本草經佚文、

上藥令人身安命延、昇天神仙、遨遊上下、役使萬靈、憘生毛羽、行厨立至、抱朴子內篇、引神農經、

中藥養性、下藥除病、能令毒蟲不加、猛獸不犯、惡氣不行、衆妖併辟、抱朴子內篇、引神農經、

太一子曰、凡藥上者養命、中者養性、下者養病、本草經、藏文類聚引

太一子曰、凡藥上者養命、中藥養性、下藥養病、神農乃作赭鞭鉤鋸、尺制切、從六陰陽、與太乙外字鄉、五岳四瀆、土地所生草石骨肉心灰皮毛羽萬千類、皆鞭問之、得其所能治主、當其五味、一日作二字舊誤百、七十毒、太平御覽引本草經、

神農稽首再拜、問於太乙子曰、曾聞之時壽過百歲、而祖落之咎、獨何氣使然也、太乙子曰、天有九門、中道最良、神農乃從其嘗藥、以拯救人命、太平御覽引神農本草、

按此諸條、與今本經卷上文略相似、諸書所引、較本經文多、又云、是太一子說、今無者、疑後節之、其云赭鞭鉤鋸、當是表辨候製之假音、鞭問之、即辨問之、無怪說也、

藥物有大毒、不可入口鼻耳目者、即殺人、一曰鉤吻、虛氏曰陰地黃、蔓延根莖獨生者、是也、二曰鴆、狀如雌雞、生山中、三曰陰命、赤色、著木傍、其子、生海中、四曰內雀、狀如鵲、赤、生海中、五曰烏羽、如雀、頭赤、六曰蟾蜍、生海中、雄曰蟾、雌曰蜍、博物志引神農經、

藥種有五物、一曰猥毒、占斯解之、二曰巴頭、藍汁解之、三曰黎、廬湯解之、四曰天雄烏頭、大豆解之、五曰

46

17A

班茅、戎鹽解之、毒菜害小兒、乳汁解、先食飲二升。（博物志引神農經。）

五芝、及餌丹砂、玉札、曾青、雄黃、雌黃、雲母、太乙禹餘糧、各可單服之、皆令人飛行長生。（抱朴子內篇引神農四經。）

春夏爲陽、秋冬爲陰。（文選江賦引神農本神。）

春爲陽、陽溫生萬物。（同上。）

黃精與朮、餌之却粒、或遇凶年可以絕粒、謂之米脯。（太平御覽引抱朴子神農經。）

五味、養精神、強魂魄、五石養髓、肌肉肥澤、諸藥、其味酸者、補肝養心、除腎病、其味苦者、補心養脾、除肝病、其味甘者、補肺養脾、除心病、其味辛者、補肺養腎、除脾病、其味鹹者、補肺除肝病、故五味應五行、四體應四時、夫人性生于四時、然后命于五行、以一補身、不死命神、以母養子、長生延年、以子守母、除病究年。（太平御覽引抱朴子神農經。）

案此諸條、當是玉石草木三品前總論、而後人節去。

附吳氏本草十二條。

龍眼、一名益智、一名比目。（齊民要術。）

鼠尾、一名蒴、一名山陵翅、治痢也。（太平御覽。）

滿陰實、生平谷、或園中、延蔓如瓜、葉實如桃、七月采、止渴延年。（太平御覽。）

千歲垣中腐皮、得蓋、赤石脂、治。（太平御覽。）

小蒜、一名結草。（太平御覽。）

木瓜、生夷陵。（太平御覽。）

穀樹皮、治喉閉、一名楮。（太平御覽。）

櫻桃、味甘、主調中益氣、令人好顏色、美志氣、一名朱桃、一名麥英也。（蒙文類聚。）

李核、治仆倒、花令人好顏色。（太平御覽。）

大麥、一名穄麥、五穀之盛、無毒、治消渴、除熱益氣、食穀爲便、麥麩一名小麥、無毒、治利而不中口。（太平御覽。）

薏苡、益人氣。（太平御覽。）

暉日、一名鴆羽。（太平御覽。）

附諸藥制使。

唐慎微曰、神農本經相使、正各一種、莫以藥對參之、乃有兩三。

石膽、水英爲使、畏牡桂、菌桂、芫花、辛夷、白。

鍾乳、蛇牀子爲使、惡牡丹、牡蠣、元石、牡蠣、畏紫石英、蕙草。

雲母、澤瀉爲使、畏蛇甲及流水。

消石、口爲使、惡苦參、苦菜、畏女菀。

朴消、畏麥句薑。

芒消、石蕚爲使、惡麥句薑。

礬石、甘草爲使、畏母蠣。

滑石、石蕚爲使、惡曾青。

紫石英、長石爲使、畏扁青、附子、不欲蛇甲、黃連、麥句薑。

白石英、惡馬目毒公。

赤石脂、惡大黃、畏芫花。

黃石脂、曾青爲使、惡細辛、畏蜚蠊。

太一餘糧、杜仲爲使、畏鐵落、昌蒲、貝母。

玉、石、中部。

水銀、畏磁石。

殷孽、惡防已、畏木。

孔公孽、木蘭爲使、惡細辛。

湯起石、乘螵蛸爲使、惡澤瀉、菌桂、雷丸、蛇脫皮、畏菟絲子。

石膏、雞子爲使、惡莽草毒公。

凝水石、畏地榆、解巴豆毒。

磁石、紫胡爲使、畏黃石脂、惡牡丹、莽草。

元石、惡松脂、柏子仁、菌桂。

理石、滑石爲使、惡麻黃。

玉、石、下部。

礜石、得火良、練鍼爲使、惡虎掌毒公、鶯屎、細辛水。

青琅玕、得水銀良、畏雞骨、殺錫毒。

特生礜石、得火良、畏水。

代赭、畏天雄。

方解石、惡巴豆。

大鹽、漏蘆爲使。

草、藥、上部。

六芝、薯預爲使、得髮良。惡常山。畏扁青茵陳。

朮防風地榆爲使。

天門冬、垣衣、地黃爲使。畏曾青。

麥門冬、地黃、車前爲使。惡款冬苦瓠。畏苦參青葛。

女萎、萆、主畏鹵鹹。

乾地黃、得麥門冬、清酒良。惡貝母。畏無夷。

昌蒲、秦花、秦皮爲使。惡地膽、麻黃。

澤瀉、畏海蛤、文蛤。

遠志、得茯苓、冬葵子、龍骨良。殺天雄、附子毒。畏奚珠、雚蘆、藜蘆。

齊蛤、蜀預、紫芝爲使。惡甘遂。

石斛、陸英爲使。惡凝水石、巴豆、畏白殭蠶、雷丸。

菊花、朮、枸杞、根、桑根、白皮爲使。

甘草、朮、乾漆、苦參爲使。惡遠志。反甘遂、大戟、芫花、海藻。

人參、茯苓爲使。惡溲疏。反藜蘆。

牛膝、惡螢火、龜陰、英、畏白。

細辛、曾青、東根爲使。惡狼毒、山茱萸、黃耆。畏滑石、消石。反藜蘆。

獨活、蘆石爲使。

柴胡、半夏爲使。惡皁莢。畏女菀、藜蘆。

菴閭子、荊子、蓋蔓仁爲使。

蒺藜子、得荊子、細辛、良。惡乾薑、苦參。

龍膽、貫衆爲使。惡防葵、地黃。

菟絲子、得酒良。蜀預、松脂爲使。惡藿菌。

巴戟天、覆盆子爲使。惡鵝生、雷丸、丹參。

蕤蕤子、烏頭爲使。

沙參、惡防己、反藜蘆。

防風、惡乾薑、藜蘆、白斂、芫花、殺附子毒。

絡石、杜仲、牡丹爲使。惡鐵落、畏萵蒲、貝母。

黃連、黃岑、龍骨、理石爲使。惡菊花、芫花、元參、白解皮、畏款冬、勝烏頭、解巴豆毒。

丹參、咏、鹹水、反藜蘆。

天名精、垣衣爲使。

決明子、蕃實爲使。惡大麻子。

續斷、地黃爲使。惡雷丸。

芎藭、白芷爲使。

黃蓍、惡龜甲。

杜若、得辛夷、細辛、良。惡柴胡、前胡。

蛇牀子、惡牡丹、巴豆、貝母。

茜根、畏鼠姑。

飛廉、得烏頭、良。惡麻黃。

薇銜、得秦皮、良。

五味子、蓯蓉爲使。惡委萎、勝烏頭。

草、藥、中部。

當歸、惡茵茹、畏昌蒲、海藻、牡蒙。

秦艽、昌蒲爲使。

黃芩、山茱萸、龍骨爲使。惡薏實、畏丹砂、牡丹、藜蘆。

芍藥、須丸爲使。惡石斛、芒消、畏石鼈甲、小蓟。反藜蘆。

乾薑、秦椒爲使。惡黃連、黃芩、天鼠屎、殺半夏、貫衆毒。

葉本、畏茵茹。

麻黃、厚朴爲使。惡辛夷、石韋。

葛根、殺野葛、巴豆、百藥毒。

前胡、半夏爲使。惡皁莢、畏藜蘆。

貝母、厚朴、白微爲使。惡桃花、畏秦艽、礬石、莽草、反烏頭。

括樓、枸杞爲使。惡乾薑、畏牛膝、乾漆、反烏頭。

元參、惡黃耆、乾薑、大棗、山茱萸、反藜蘆。

苦參、元參爲使。惡貝母、瀉蘆、菟絲子、反藜蘆。

石龍芮、大戟爲使。畏蛇蛻、吳茱萸。

萆薢、薯蕷爲使。畏蘘根、大黃、柴胡、牡蠣、前胡。

石韋、滑石、杏仁爲使。得萵蒲、良。

狗脊、萆薢爲使。惡敗醬。

瞿麥、蘆草、牡丹爲使。惡螵蛸。

白芷、當歸爲使、惡旋復花、
紫菀、款冬爲使、惡天雄、雷丸、遠志、畏茵蘭、
白鮮皮、惡螵蛸、桔梗、茯苓、草薢、
白蘞、惡黃耆、大黃、大戟、乾薑、乾漆、大戟、山茱萸、
紫參、畏辛夷、
淫羊藿、畏葶苈爲使、
款冬花、杏仁爲使、得紫菀、良、惡皁莢、消石、元參、畏貝母、辛夷、麻黃、黃芩、黃連、黃耆、青葙、
牡丹、畏菟絲子、
防已、殷孽爲使、惡細辛、畏草薢、殺雄黃毒、
女菀、畏鹵鹹、
澤蘭、防已爲使、
地榆、得髮、良、惡麥門冬、
海藻、反甘草、
草藥、下部、
大黃、黃芩爲使、

桔梗、節皮爲使、畏白及、反龍膽、龍眼、
甘遂、瓜蔕爲使、惡遠志、反甘草、
葶藶、檀皮爲使、得酒、良、惡殭蠶、石龍芮、
芫花、決明爲使、反甘草、
澤漆、小豆爲使、惡蕃蘇、
大戟、反甘草、
鉤吻、半夏爲使、惡黃芩、
藜蘆、黃連爲使、反細辛、芍藥、五參、惡大黃、
烏頭、烏喙、莽草爲使、反半夏、括樓、貝母、白斂、白及、惡藜蘆、
天雄、遠志爲使、惡麋茸、
附子、地膽爲使、惡螺蛳、畏防風、甘草、黃耆、人參、烏韭、大豆、
貫衆、藺爲使、
半夏、射干爲使、惡皁莢、畏雄黃、生薑、乾薑、秦皮、龜甲、反烏頭、
蜀漆、括樓爲使、惡貫衆、
虎掌、蜀漆爲使、畏莽草、

狼牙、雀瓢爲使、惡棗肌、地榆、
常山、畏玉札、
白及、紫石英爲使、惡理石、李核仁、杏仁、
白斂、代赭爲使、反烏頭、
茵蔯、得酒、良、畏雞子、
蘭茹、甘草爲使、惡麥門冬、
蓯蓉、畏鼠婦、
夏枯草、土瓜爲使、
狼毒、大豆爲使、惡麥、甸蓋、
鬼臼、畏衣、
木藥、上部、
茯苓、茯神、馬鬱爲使、惡白斂、畏牡蠣、地榆、雄黃、秦艽、龜甲、
杜仲、惡蛇蛻、元參、
柏實、牡蠣、桂心、瓜子爲使、畏菊花、羊蹄、諸石、麴糵、
乾漆、半夏爲使、畏雞子、

蔓荊子、惡烏頭、石膏、
五加皮、遠志爲使、畏蛇皮、元參、
蘗木、惡乾漆、
辛夷、芎藭爲使、惡五石脂、畏昌蒲、蒲黃、黃連、石膏、黃芩、
酸棗仁、惡防已、
槐子、景天爲使、
牡荊實、防已爲使、惡石膏、
木藥、中部、
厚朴、乾薑爲使、惡澤瀉、寒水石、消石、
山茱萸、蓯蓉爲使、惡桔梗、防風、防已、
吳茱萸、蓯蓉爲使、惡丹參、消石、白蘞、畏紫石英、
秦皮、大戟爲使、惡茱萸、
占斯、解狼毒、
梔子、解鬱蜀毒、
秦椒、惡括樓、防葵、畏雌黃

桑根白皮續斷桂心麻子爲使。
木、藥下部。
黃環鳶尾爲使惡茯苓防己。
石南五加皮爲使。
巴豆芫花爲使惡藜草畏大黃黃連藜蘆殺斑猫毒。
蠟蕈決明爲使。
蜀椒杏仁爲使畏款冬
滲疏瀉蘆爲使。
卑菱柏實爲使惡麥門冬畏空青人參苦參。
雷丸茯實厚朴爲使惡葛根。
獸、上部。
龍骨得人參牛黃良畏石膏。
龍角畏乾漆蜀椒理石。
牛黃人參爲使惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝。
白膠得火良畏大黃。
阿膠得火良畏大黃。
獸、中部。
犀角松脂爲使惡雷菌雷丸。
羚羊角菟絲子爲使。
鹿茸麻勃爲使。
鹿角杜仲爲使。
獸、下部。
藥脂畏大黃。
伏翼菖蒲雲實爲使。
天鼠屎惡白斂白微。
蟲、魚上部。
蜜蠟惡芫花齊蛤。
蜂子畏黃芩芍藥牡蠣。
牡蠣貝母爲使得甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃吳茱萸辛夷
桑螵蛸畏旋復花。

海蛤蜀漆爲使畏狗脊甘遂芫花。
龜甲惡沙蟲蜚蠊。
蟲、魚中部。
蛸皮得酒良畏桔梗麥門冬。
斯蝎惡硫黃斑猫蘖黃。
露蜂房惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣。
蜃蛤畏卑菱昌蒲。
蟾蜍蜚蠊爲使惡附子。
鼈甲惡礬石。
蟹殺莨菪毒漆毒。
蛇魚甲蜀漆爲使畏狗脊甘遂芫花。
烏賊魚骨惡白斂白及。
蟲、魚下部。
蜣蜋畏羊角石膏。
蛇蛻畏磁石及酒。
斑猫馬刀爲使畏巴豆丹參空青惡牆青。
地膽惡甘草。
馬刀得水良。
果、上部。
大棗殺烏頭毒。
果、下部。
杏仁得火良惡黃耆黃芩葛根解錫胡粉毒畏麥門冬。
菜、上部。
冬葵子黃芩爲使。
葱實解藜蘆毒。
米、上部。
麻蕡麻子畏牡蠣白微惡茯苓。
米、中部。
大豆及黃卷惡五參龍膽得前胡烏喙杏仁牡蠣良殺烏頭毒。
大麥蜜爲使。

右二百三十一種。有相制使。其餘皆無。三十四種。當云三十五種。案：

立冬之日。菊卷柏先生。時爲陽起石。桑螵蛸。凡十物使。主二百草。爲之長。

立春之日。木蘭。射干先生。爲柴胡。半夏使。主頭痛。四十五節。

立夏之日。蠶蠟先生。爲人參。茯苓使。主腹中。七節。保神守中。

夏至之日。豕首。茶荑先生。爲牡蠣。鳥喙使。主四肢。三十二節。原注有此五條。出藥對中。義留闕疑。故亦錄之。

立秋之日。白芷。防風先生。爲細辛。蜀漆使。主胸背。二十四節。非俗所究。雖莫可遵用。而是主統之本。

石藥爾雅

梅彪集

石藥爾雅序

夫爾雅者。古人以訓釋難尋之所作也。每想此機捷妙無以加。故朝廷用之。兼經多歷年代。余西蜀江源人也。少好道藝。性攻丹術。自弱至于知命。窮究經方。曾覽數百家論功者。如同指掌。用藥皆是隱名。就於隱名之中。又有多本。若不備見。猶畫餅夢桃。遇其經方。與不遇無別。每噫嘻。此事悵恨無師。由何意也。因見參同契云。未能悉究。當施直義。其理蓋矣。經曰。吾欲結舌不言。恐畏羅罪誅。寫情於竹帛。恐泄天之符。故知聖賢至道元妙之法。不欲流俗偶然之所聞解也。故委曲其事。令上士勤而習之。便下士藥而笑之。理昭然也。但恐後學同余苦心。今附六家之口訣。兼石之異名。參爾雅詞句。凡六篇。勒為一卷。令疑迷者尋之稍易。習業者誦之不難。兼諸丹所有別名奇方異術之號。有法可營造者。條列於前。無法難作之流。具名於後。時唐元和丙戌梅彪序。

石藥爾雅卷上

唐　梅　彪　集

飛鍊要訣

釋諸藥隱名

元黃花一名輕飛。一名火丹。一名鉛飛。一名飛流。一名紫粉。

鉛黃花一名黃丹。一名聯。一名一軍門。一名龍汁。一名金柳。一名九光。一名鍾錫。

精一名黃精。一名黃髓。一名元黃。一名紫粉。一名飛精。一名黃華。一名金公華。一名黃鵠。一名黃芽。一名黃泊。一名伏丹。一名河車。一名釧丹。一名太陰。一名沈一名珠。一名元珠。一名太陰。一名太女陰。一名處女。一名男。一名崇金。一名水。一名編立。一名太陰。一名太陰。一名沈一名珠。一名元。一名水。一名金液。一名黃

精一名黃精。一名黃髓。一名金精。一名金公河車。一名金公。一名公黃。一名鉛精。一名天元金公飛鉛。一名河車。一名鍾黃公。一名水編立。一名太陰。一名太陰。一名一名元。一名黑虎。一名白虎。一名黑武。一名黃男。一名青金。一名水銀。一名子汞。一名明。一名鉛精。一名流球。一名神膽元珠。一名元。一名水。一名金液。一名奚

水銀一名陽明子。一名河上蛇女。一名沙汞。一名天水銀精。一名金液。一名奚

雄黃一名朱雀。一名太白。一名白陵。一名天陽石。一名黃。一名赤。一名絳宮朱兒。一名朱雀。一名赤帝精。一名赤帝體。一名赤金。一名白虎。一名白虎髓。一名水銀。一名金銀虎

丹砂一名日精。一名太陽。一名眞珠。一名朱砂。一名仙砂。一名朱鳥。一名赤沙。一名陵。一名朱兒。一名赤

雌黃一名帝女血。一名生。一名錄者。一名安。一名元。一名月牛。一名赤斯者。一名柔。一名黃男。一名雄精。一名赤雌。一名妹。一名丹石。一名山黃。一名帝。

石硫黃一名黃龍血。一名黃英。一名九靈。一名黃童。一名烟。一名硫。一名黃。一名硫砂。一名黃。一名山。一名石。一名不住。一名硇砂。一名女菫。一名月魂。一名帝男血。一名深黃。一名期。一名迄利迦。一名帝男精。一名帝女上。一名妹。一名生者。一名元。一名童女丹血。一名黃。一名安。一名巳。一名帝。一名雄。一名

一名白礦金・一名猛砂・一名赤砂・一名黃砂・一名鐵砂・一名赤鐵砂・一名曾青・一名膚青・一名龍血・一名空青・一名黃雲英・一名中女・一名青神羽・一名帝流漿・一名雲母石・一名不拾・一名君唐流漿・一名綠秋陽起石・一名青油羽・一名帝流漿・一名君唐流漿・一名綠秋陽起石・一名元石・一名伏石・一名元武石・一名元水石・一名元武石・一名元石・一名元石・一名元

石藥爾雅卷下

載諸有法可營造丹名

太一金丹、太一玉粉丹、太一金膏丹、太一小還丹、還魂駐魄丹、召魂丹、太一玉液丹、華陽玉漿丹、華漿太一龍胎丹、太一三使丹、光明麗日丹、熟紫粉丹、黃丹、小神丹、安期先生丹、太一足火丹、眞人蒸成丹、硫黃赤丹、裴君牌祭丹、無忌丹、王君雞子丹、東方朔銀丹、石湯赤鳥丹、冷紫粉丹、太一小玉粉丹、太一小金英丹、韓衆漆丹、雄黃紫油丹、劉君鳳駐年丹、五嶽眞人小還丹、紫遊丹、太一赤車使者八神精起死人仙丹、太一一味硇砂丹、太一八景四藥紫藥五珠絳生丹、四神丹、艮雪丹、八石丹、八神丹、流黃丹、龍珠丹、龍虎丹、雌雀丹、五靈丹、紫蓋丹、三奇丹、朝霞丹、肘後丹、凌霄丹、羨門丹、日成丹、穀汁丹、七變丹、太黃丹、蒐血丹、日丹、酒丹、聚丹、密丹、乳丹、椒丹、太一琅玕丹、杏金丹、紫金小還丹、石腦丹、赤石脂丹、紅槿丹、紫霞丹、石膽丹、紫蓋丹、

釋諸丹中有別名異號

召魂丹一名返魂丹、一名奠生丹、一名嚴命丹、一名金生丹、無忌丹一名鹽丹、一名雌神丹、紫遊丹一名步虛丹、一名華輕丹、一名到景丹、一名翔景丹、四神丹一名沙虛丹、艮雪丹一名水銀霜丹、一名流珠白雪丹、一名飛仙英丹、一名流珠絳雪丹、一名神液丹、一名神艮雪丹、一名流珠紅霜丹、一名元珠絳雪丹、一名太陽紅粉

丹、一名朝霞散彩丹、一名少月濃光丹、一名傾相珠丹、一名凝陰積雪丹、五嶽眞人小還丹一名金精丹、一名救世丹、一名仙丹、太一小還丹一名太清丹、一名朝霞丹、一名紫霞丹、一名紫光丹、一名非羅丹、一名金光丹、一名吐綬丹、還魂駐魄丹一名駐顏丹、一名朱雀丹、一名延齡丹、八神丹、一名還神丹、一名迴命丹、一名再生丹、一名迴魂神丹、一名光丹、一名流珠神光丹、一名神陽玉漿丹一名鵲光丹、一名玉髓丹、一名鵲髓丹、太一赤車使者八神精起死人丹一名迴魂神丹、一名紫紹丹、一名元飛雪丹、太一小玉粉丹一名紫紹丹、一名元飛雪丹、太一小金英丹一名陽明丹、一名元日精丹、太一金液華丹一名金華丹、太一一味雄黃丹一名赤龍珠丹、一名紫蟬丹、一名赤蟬丹、一名紅紫相間丹、太一八景四藥紫遊玉珠生丹、一名天眞丹、一名金仙丹、一名雌雄丹、太一一味硇砂丹一名飛霜丹、一名定神丹、一名鹽粉丹、一名凝雪丹、一名靈粉丹、一名紫雪丹、一名定神丹、一名鹽粉丹、一名凝雪

造柔赤圻法。柔黃雌法。造白河車法。赤河車法。單青河車法。造黃華法。硝河車法。石亭脂河車法。東野河車法。鐵河車法。紫河車法。造銅青法。五鹽法。雄雪法。雌雪法。元女五符法。元女白雪飛符法。造鉛白法。元女神丹九轉法。造飛霜赤雪法。造元黃法。作續食法。造石灰煎法。造元珠法。涓子菊華九變法。元子神鐵法。作水華法。土龍灼法。伏雄黃法。伏雌黃法。鍊礬石法。伏空青法。造銀元珠法。造鉛扼火法。造空亭液法。柔煤法。拒鐵法。液蠟法。造鉛華法。作灰坯法。作水坯法。造鍊雌法。造炮礬法。造黃瑋法。造礬華池法。九轉鉛精法。造大黃牙法。青丹牙法。漏鼎牙法。秋石牙法。苞裹流帝漿牙法。攪柳牙法。淀鉛法。縮賀法。造烏鉛法。造黑銅法。液銀法。造鉛粉法。鍮石粉法。小還丹牙法。造黑牙法。水鍊雲母粉法。

右件經方。世上並有文本。或可以資經貸利。或可以養性全生。但遇一方。並可營造。若遍留意。其途雜繁。然此衆之道。雖道有優劣。但隨根器之所入。而各尋其所好也。故水不可以乘駿馬。陸不可以御輕舟。稻粱菰肉。終同於飽。麻紵紈綃。終同於煖。飽煖雖一。而精麤有殊。逐甘利者。卽重小丹如金。好延生者。敬大丹似寶。金寶之利。各齊其分。故具載於前矣。

論諸大仙丹有名無法者

黃帝九鼎丹。大仙昇霞丹。紫青仙童丹。太和龍胎丹。張眞人靈飛丹。太一八景丹。馬明生白日昇天丹。金液神丹。茅君白鹽丹。白雪赤雪丹。絳陵垂璧丹。七精辟惡丹。三味消炭丹。九光神景丹。流霞鮮翠丹。含暉吐耀丹。太清五色丹。北帝元珠丹。神光散魂丹。凝霜積雪丹。奔星御月丹。墮月驚心丹。感靈降眞丹。通神役使丹。九變丹。大還丹。九成丹。紫精丹。按楚澤經已上諸丹。並是往古得道者出世仙丹。服之白日昇天。身生羽翼。變化自在。坐有立無。藥味方法。既非塵俗所知。莫得測其至要也。自非宿有仙骨。積代累功。夢中神授者。不可得其方法也。

唐元和中。西蜀人梅彪撰石藥爾雅。醫方以藥石並稱。爾雅止釋草木。石不及焉。宜彪取其隱名而顯著之也。自序言衆石異名。象爾雅詞句。凡六篇。勒爲一卷。而白雲霽道藏目錄作二卷。疑後人附益之。唐代遺書傳世者罕矣。乃鈔而入諸經部。秀水朱彝尊跋。

近從吳中得袁氏貞節堂鈔本石藥爾雅二卷。復假得道藏本對勘一過。并錄竹垞跋于後。其卷分上下者。蓋由藏本析之。非後人有所附益。故六篇之目。與序相符。但此書自宜入道家類。或入醫家類。經義致編入擬經。而此跋云鈔而入諸經部。似屬未安。夫編書當覩其全體。不當覩其面貌。若跋所云。則近時周松靄大令嘗作佛爾雅。後人將以之入諸經部。其可乎哉。至道藏中儘有儒書。爲彼所妄據。又不可以一概論也。同里吳槎客老人。鑑別最精。持論甚允。頃間購得此本。遺書借觀。因以商之。未識以爲然否。嘉慶十五年冬。陳鱣記。

梅氏石藥爾雅。當屬偽眞服食之書。非特無關經學。亦非醫宗所急。竹垞檢討殆因唐人書流傳難得。又觀其序之總冒。遂入之擬經。簡非孝廉駁之甚。當以余見只當列之若書錄解題神僊家龍虎金液、通元論、及彝僊珠玉集、純陽金丹訣、崔公入藥鏡之類。庶乎近之。然而昔人言服餌金石藥日久。必發丹毒。余年來略究心攝生吐納之理。術釋是編。而觀其敍述之祕。幾如聞東方先生譚十洲三島事。而不禁有盈洋之歎也。辛未清明前二日。免牀吳騫志。時年七十又九。

46
1
5A

本草衍義

寇宗奭編撰

光緒三年歲在彊圉赤奮若仲冬之月鹽安陸心源撰

本草衍義二十卷。宋通直郎、添差充收買藥材所、辨驗藥材、寇宗奭撰。晁公武讀書志、陳直齋書錄解題、皆著於錄。政和六年、提舉荊湖北路常平等事劉亞夫、申投尚書省太醫學博士李康、看詳狀申、有旨轉一官、添差充收買藥材所、辨驗藥材。宣和元年、其姪宣教郎知解州解縣丞寇約、鏤板印行。宗奭里貫無考。以劄付及卷六礬石條、菊花水條、卷十三桑寄生條、推之。知其曾官杭州永嘉順安軍等處。由承直郎、澄州司戶進書轉一官而已。神農本草之名、始見於梁七錄。凡三百六十五種。陶隱居又增三百六十五種。是爲名醫別錄。唐顯慶中、命蘇恭等參考得失、增一百一十四種。是爲唐本草。宋太祖命劉翰等、以醫家常用有效者、增一百三十三種。是爲開寶重定本草。仁宗命掌禹錫等、再加校正、增一百種。是爲嘉祐補註本草。蜀人唐愼微、博採羣書、增六百餘種。是爲經史證類本草。徽宗又命曹孝忠刊正之。是爲政和重修經史證類備用本草。宗奭以禹錫所修、愼微所續、尚有差失、因考諸家、參以目驗、拾遺糾謬、著爲此書。凡名未用而意義已盡者、皆不編入。其所辨證、如東壁土取太陽少火之壯、冬灰取冬令燒灼之久、水味不因菊花而香、鼠不能遁溺生子、玉泉爲玉漿之露、石中黃子爲黃水之露、皆能實事求是、破通證明。洵乎本草之功臣、醫林之津筏也。宋時、與證類本草別本單行、自金人張存惠採附證類本草之中、明人因之、而單行本遂微。余所藏爲南宋麻沙本、完善無缺、因重梓以廣其傳。

本草衍義目錄

第一卷
序例上
第二卷
序例中
第三卷
序例下
第四卷
其神農本經名醫別錄唐本先附今附新補新定之目緣本經已著此更不贅說
玉泉　丹砂　空青
綠青　雲母　石鍾乳
朴消　芒消　消石
英消　礬石　滑石
紫石英　白石英　赤石脂

白石脂　石中黃　婆娑石
無名墨　菩薩石
第五卷
金屑　銀屑生銀附　水銀
水銀粉　雄黃　蠅黃
石硫黃　陽起石　凝水石
石膏　礦石　理石
鐵礦　食鹽　太陰玄精石
密陀僧　桃花石　花乳石
珊瑚　馬腦　石花
石蟹　石蛇
第六卷
青琅玕　礬石　代赭自□赤□土
大鹽　波鹽　鉛丹
粉錫　鉛霜　古文錢
金牙　石灰　多灰餅爐灰
伏龍肝東壁土附　半天河屋霤水井簷水倒流水附　菊花水
漿水　熱湯　硇砂
蓬砂　鹽石　自然銅
石鹽　砒霜　浮石
金星石　銀星石
第七卷
赤箭　天門冬　麥門冬
蒼朮　地黃　菖蒲
澤瀉　山藥　菊花
甘草　人參　石斛
牛膝　細辛　莪朮
蕙苣仁　車前子　茺蔚子
木香　菟絲子　巴戟天

第八卷
肉蓯蓉　萆薢白萆薢附　防風
黃耆　千歲藥　黃連
藍實　景天　蒲黃
蘭草　商陸藤　決明子
芍藥　五味子　茄花
第九卷
當歸　芍藥　生薑
麻黃　葛根　栝樓
苦參　石龍芮　狼麥
白芷　杜蘅　紫菀
百合　酸漿　蠶實
石香薷
第十卷
款冬花　牡丹　女菀
澤蘭　地榆　白蘞
玉瓜　薺苨　積雪草
莎草　漏蘆　大小薊
艾葉　陟釐　蒐葵
白藥　藿香子　鬱金
肉豆蔻　茅香花　青黛
零陵香　天麻　蕃蕉
使君子　蜜蒙花
第十一卷
大黃　桔梗　甘遂
葶藶　蕘花　旋復花
蓽茇　烏頭　射干
細辛　蜀漆　常山
車前子　白蘞　白及
菟絲子

第十二卷
連翹　白頭翁　面菇
羊蹄　蒴藋　夏枯草
蠶休　虎杖　馬勃
蛇苺　孛根　菰根
蒼耳　牽牛子　蓽澄茄子
萆薢　獨行根　芭蕉
蒲公草　水紅子　角藻
蓯蓉　骨碎補　馬兜
燈心草　威靈仙　何首烏
五倍子　金櫻子　萱草
葫蘆巴　金星草　木賊
第十三卷
茯苓　琥珀　松黃子附
栢　桂桂心附　楓香
乾漆　蔓荊實　桑寄生
沈香蓬莪茂附　丁香　蘗木
辛夷　檢皮　蕉葉
酸漿　槐實　槐莢
槐花　枸杞
第十四卷
龍眼　厚朴殼　猪苓
竹葉　枳實枳殼附　山茱萸
吳茱萸　梔子　榕樹
合歡　秦椒　衝矛
紫葳　蘗英　茗苦茶
桑根白皮　白棟　龍腦
菴蘿勒　紫鵝　天竺黃
天竺桂　烏藥　沒藥
墨

第十五卷
石楠　獨椒　莽草
郁李仁　鼠李　藥屑
杉　楠材　榧實
裨木皮　白楊　蘼莉
紫荊木　釣藤子　檍藤子
皂莢　柳華　桐葉
烏臼　訶梨勒　椿木葉椿葉附
胡椒　橡實　無石子
槲若　黃藥　無患子
椰子　樺木皮　赤檀木
木鱉子　木槿　櫻櫚木
柘木
第十六卷
髮髮亂髮附　人乳　人尿
人溺　人指甲今補　龍骨
牛黃　麝　象牙
醍醐　犀角　羚羊角
羯羊角　牛角鰓　白水牛鼻牛屎附
虎骨　鹿茸　鹿骨
兔　獺骨　豹肉
獺　鰡鼠音瘤　鰡鼠音瘤
狐　獨猬附　野猪豪猪附
驢肉　腽肭脐　野駝
敗鼓皮　鴈　鷺
鷺屎白　雉　丹雉雞
伏翼　鵝　鶴鶊
白鴿　孔雀　鶴鶊
斑鳩

鵝
第十七卷
石蜜
海蛤
秦龜
鯊魚
鯽魚
蜂房
白殭蠶
蜻蜻
龜甲
原蠶蛾
鮫魚
鱧魚
蛤蚧
蛸蛤
蛇黃
白花蛇
蝙蝠
蛩
螻蛄
馬刀
蝸
第十八卷
豆蔻
覆盆子
藕實
櫻桃
樓子皮
柿
牡蠣
石決明
瑇瑁
鯨魚
蝟皮
樗雞
木蠹
蛤蟆（音蝦蟆命）
烏賊魚
蠶退
河鱕
蝦蟆
鯪鯉甲
石蠶
金蛇
蜈蚣
雀瓮
衣魚
蜣蜋
斑貓
貝子
五靈脂
葡萄
大棗
菱
橘柚
梅實
枇杷
木賊
桑螵蛸
蚌珠
鱔魚
鱖魚
石龍子
蛴螬
蜜蠟
水蛭
蟹
鰻鱔魚
紫貝
蠹
蜘蛛
蛇蛻
烏蛇
馬陸
鼠婦
白頭蚯蚓
甲香
薄荷
蒜
馬齒莧
第二十卷
胡麻
白油麻
赤小豆
粟米
秫米
穞豆
稷米
薺
蓬藁
雞頭實
栗
乾柑子
枇杷葉
甘蔗

石蜜
烏芋
杏實
胡桃
蓽澄茄
榅桲
第十九卷
白瓜子
甜瓜
黃蜀葵花子（附）
萵苣（苦苣附）
松菜
蓼（木紅附）
韭
水蘇
蘘荷（音穰）
芸薹
沙糖
荔枝
桃核仁
李核仁
安石榴
白冬瓜
冬葵子
莧實（紅人莧附）
蘇背
芥
葱實
白蜀葵
假蘇
大麻子
生大豆
青黃白粳米
糜米
酒
稻米
醋
芋
杏核仁
猴桃
梨
橄欖
瓜蔕
蜀葵
苦菜
菜蔥根
苜蓿
雞
蘇
香薷
蒜
茄子
大麥
陳廩米
糠米
穄子粟
小麥

本草衍義卷之一

宋 通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇宗奭編撰

序例上

衍義總敘

天地以生成爲德。有生所甚重者身也。身以安樂爲本。安樂所可致者。以保養爲本。世之人必本其本。則本必固。本既固。疾病何由而生。夭橫何由而至。此攝生之道無逮於此。夫草木無知。猶假滋溉。矧人爲萬物之靈。豈不資以保養。然保養之義其理萬計。約而言之其術有三。一養神。二惜氣。三隄疾。忘情去智。恬澹虛無。離事全眞。內外無寄。加是則神不內耗。境不外惑。眞一不雜。則神自事矣。此養神也。抱一元之本根。固歸精之眞氣。三焦定位。六賊忘形。識界既空。大同斯契。則氣自定矣。此惜氣也。飲食適時。溫涼合度。出處無犯於八邪。寤寐不可以免強。則身自安矣。此隄疾也。三者甚易行。然人自以謂難行。而不肯行。如此雖有長生之法。人罕敦尚。遂至永謝。是以疾病交攻。夭和頓失。聖人憫之。故假以保救之術。輔以獨痾之藥。俾有識無識。咸臻壽域。所以國家編撰聖惠。校正素問。重定本草。別爲圖經。至于張仲景傷寒論。及千金、金匱、外臺之類。粲然列於書府。今復考拾天下醫生。補以名職。分隸曹屬。普救世人之疾苦。蓋全聖至德之君。合天地之至仁。接物厚生。大賚天下。故野無遺逸之藥。世無不識之病。然本草二部。其間撰著之人。或執用己私。失於商較。致使學者檢據之間。不得無惑。今則併考諸家之說。參之實事。有未盡厥

理者。衍之以臻其理。如車鹽土圓流水冬炭之類。匿避不斷者。伸之以見其情。如水自臺下過而水自臺下過而水自臺下過而生子。文簡誤脫者。證之以明其義。如玉泉石鹽之類。諱避而易名者。原之以存其名。如山蟲避本朝諱。及唐避代宗諱。使是非歸一。治療有源。檢用之際。瞭然無惑。是以搜求訪緝者十有餘年。採拾衆善。膠療疾苦。和合收蓄之功。舉皆周備。矧疾爲聖人所謹。無常不可以爲醫。豈容易言哉。宗奭常謂疾病所可憑者醫也。醫可據者方也。方可恃者藥也。苟知病之虛實。方之可否。若不能達藥性之良毒。辨方宜之早晚。眞僞相亂。新陳相錯。則禍由去道人陳宿之藏。唐類立晉仕爲太常丞爲醫官有道人心授遺稿二卷。診曰。腹有蠱。誤食雞而然。令飼雄黃一劑。少選吐一蛇。如拇無目。燒之有髮氣乃愈。生張果駢潔之齋。唐張果謂見元宗謂高力士曰。吾聞飲並無害者。奇士也。時天寒。取以飲果。三進。頓然曰。非桂酒乃庭堦砌齒鐵耶。頓左右取鐵如意。擊碎之。鐵帶中。更出藥。條其斷。良久齒已去。粲然明潔。香發神之。此書之意於是乎作。今則編次成書。謹依二經類例。分門條析。仍衍序例爲三卷。內有名未用及意義已盡者。更不編入。其神農本經名醫別錄。唐本先附。今附新補新定之目。緣本經已著目錄內。更不聲說。依舊作二十卷。及目錄一卷。目之曰本草衍義。若博愛衛生之士。志意或同。則更爲詮脩以稱聖朝好生之德。時政和六年丙申歲記。

本草之名自黃帝岐伯始。其補注總敘。言舊說本草經者。神農之所作。而不經乎帝紀。元始五年。舉天下通知方術本草者。所在詣傅。遣詣京師。此但見本草之名。終不能斷自何代而作。又樓護傳。稱護少誦醫經本草方術。數十萬言。本草之名蓋見於此。是尤不然也。世本曰神農嘗百草以和藥濟人。然亦不著本草之名。皆未臻厥理。管子曰。黃帝使岐伯嘗味草木。定本草經。造醫方以療衆疾。則知本草之名。自黃帝岐伯始。其淮南子之言。神農嘗百草之滋味。一日七十毒。亦無本草之說。是知此書。乃上古聖賢具生知之智。故能辨天下品物之性味。合世人疾病之所宜。後之賢智之士。從而和之者。又增廣其品。至一千八千二名。補注本草。稱一千八十二種。然一種有分條用者。有三用者。其稱字爲名字。於義方允。可謂大備。然其間注說不盡。或捨理別趣者。往往多矣。是以衍摭餘義。期於必當。非足以發明聖賢之意。冀有補於闕疑。

夫天地既判。生萬物者惟五氣爾。五氣定位。則五味生。五味生。則千變萬化。至於不可窮已。故曰生物者氣也。成之者味也。以奇生。則成而禍。以耦生。則成而奇。寒氣堅。故其味可用以耎。熱氣耎。故其味可用以堅。風氣散。故其味可用以收。燥氣收。故其味可用以散。土者冲氣之所生。冲氣則無所不和。故其味可用以緩。氣堅則壯。故苦可以養氣。脈耎則和。故鹹可以養脈。骨收則強。故酸可以養骨。筋散則不韙。故辛可以養筋。肉緩則不壅。故甘可以養肉。堅之而後可以耎。收之而後可以散。欲緩則用甘。不欲則弗用。用之不可太過。太過亦病矣。古之養生治疾者。必先通乎此。不通乎此。而能已人之疾者。蓋寡矣。

夫安樂之道。在能保養者得之。況招來和氣之藥少。攻決之藥多。不可不察也。是知人之生。須假保養。無犯和氣。以資生命。纔失將護。便致病生。苟或處治乖方。旋見顛越。防患須在閑日。故曰安不忘危。存不忘亡。此聖人之預戒也。

攝養之道。莫若守中。守中則無過與不及之害。經曰。春秋冬夏四時。陰陽、生病、起於過用。蓋不適其性。而

強去爲逐強處、卽病生。五臟受氣蓋有常分。用之過耗。是以病生。善發生者既無過耗之弊。又能保守其元。何患乎外邪所中也。故善服藥不若善保養。不善保養。不若善服藥。世有不善保養。又不善服藥。倉卒病生。而歸咎於神天。噫。是亦未嘗思也。可不謹歟。

夫未聞道者。放逸其心。逆於生樂。以精神徇智巧。以憂畏徇得失。以勞苦徇禮節。以身世徇財利。四徇不證。心爲之病矣。極力勞形。譟暴氣逆。當風縱酒。食嗜辛鹹。肝爲之病矣。飲食生冷。溫涼失度。久坐久臥。大飽大飢。脾爲之病矣。呼叫過常。辨爭陪答。冒犯寒暄。恣食鹹苦。肺爲之病矣。久坐濕地。強力入水。縱慾勞形。三田漏溢。腎爲之病矣。五病既作。故未老而齒。未齒而病。病至則重。重則必斃。嗚呼。是皆非思而自取之也。衛生之士。須謹此五者。可致終身無苦。經曰。不治已病。治未病。正爲此矣。

夫善養生者。養內。不善發生者。養外。養外者實外。以充快悅澤。貪欲恣情爲務。殊不知外實則內虛也。善養內者實內。使臟腑安和。三焦各守其位。飲食常適其宜。故莊周曰。人之可畏者。衽席飲食之間。而不知爲之戒者。過也。若能常如是畏謹。疾病何緣而起。壽考焉得不長。貴者造形而悟。愚者陷病不知。誠可畏也。

夫柔情難綰而不斷。不可不以智慧決也。故幹蠱不可不遠。斯言至近易。其事至難行。蓋人之智慧淺陋。不能勝其貪欲也。故佛書曰。諸苦所因。貪欲爲本。若滅貪欲。何所依止。是知貪欲不滅。苦亦不滅。貪欲滅。苦亦滅。聖人言近而指遠。不可不思。不可不懼。善攝生者。不勞神。不苦形。神形既安。禍患何由而致也。

夫人之生。以氣血爲本。人之病。未有不先傷其氣血者。世有貴男室女。積想在心。思慮過常。多致勞損。男則神色先散。女則月水先閉。何以致然。蓋愁憂思慮則傷心。心傷則血逆竭。血逆竭。故神色先散。而月水先閉也。火既受病。不能榮養其子。故不嗜食。脾既虛。則金氣虧。故發咳嗽。既作。水氣絕。故四肢乾。木氣不充。故多怒。髮焦。筋痿。俟五臟傳遍。故卒不能死。然終死矣。此一種於諸勞中最爲難治。蓋病起於五臟之中。無有已期。藥力不可及也。若或自能改易心志。用藥扶接。如此則可得九死一生。舉此爲例。其餘諸勞。可按脈與證而治之。

夫治病有八要。八要不審。病不能去。非病不去。無可去之術也。故須審辨八要。庶不違誤。其一曰虛。五虛是也。脈細皮寒氣少。漉漉然汗出。發昏。食不入。此爲五虛。二曰實。五實是也。脈緊皮熱。腹脈前後不通。悶欲死。此五實也。三曰冷。臟腑受其積冷是也。四曰熱。臟腑受其積熱是也。五曰邪。非臟腑正病也。六曰正。非外邪所中也。七曰內。病不在外也。八曰外。病不在內也。既先審此八要。參知六脈。審度所起之源。繼以望聞問切。加諸病者。烏有不可治之疾也。夫不可治者有六失。失於不審。失於不信。失於過時。失於不擇醫。失於不識病。失於不知藥。六失之中。有一於此。卽爲難治。非止醫家之罪。亦病家之罪也。矧又醫不慈仁。病者猜鄙。二理交馳。於病何益。由是言之。醫者不可不慈仁。不慈仁則招禍。病者不可猜鄙。猜鄙則招禍。惟賢者洞達物情。各就安樂。亦治病之一說耳。

合藥分劑料理法則中言。凡方云用桂一尺者。削去皮畢。重半兩爲正。既言廣而不言狹。如何使以半兩爲正。且桂卽皮也。若言削去皮畢。卽是全無桂也。今定長一尺闊一寸。削去皮上篦麁無味者。約爲半兩。

然終不見當日用桂一尺之本意。亦前人之失也。

序例。藥有酸鹹甘苦辛五味。寒熱溫涼四氣。今詳之。凡稱氣者。卽是香臭之氣。其寒熱溫涼。則是藥之性。且如鵝條中云。白鵝脂性冷。不可言其氣冷也。況自有藥性。論其四氣。則是香、臭、臊、腥。故不可以寒熱溫涼配之。如蒜、阿魏、鮑魚、汗臭、則其氣臭。雞、魚、鵝、鮑、則其氣腥。臀、狐、狸、白馬莖、褌近隱處。人中白。則其氣臊。沉檀龍麝。則其氣香。如此則方可以氣言之。其序例中氣字。恐後世誤書。當改爲性字。則於義方允。

今人用巴豆。皆去油訖生用。蓋必爲本經言生溫熱寒。故欲避寒而卽溫也。不知寒不足避。當避其大毒。矧本經全無去油之說。故陶隱居云。熬令黃黑。然亦太過矣。日華子云。炒不如去心膜。蓋五度換水各煮一沸。爲佳。其杏仁、桃仁、萝蔔、胡麻。亦不須熬至黑。但慢火炒令赤黃色。斯可矣。

凡服藥多少。雖有所說一物一毒。服一丸如細麻之例。今更合別論。緣人氣有虛實。年有老少。病有新久。藥有多毒少毒。更在逐事斟量。不可舉此爲例。但古人凡設例者。皆是假令。豈可執以爲定法。

本草第一序例。言犀角、羚羊角、鹿角、一藥末如粉。臨服內湯中。然今昔藥法中。有生磨者。煮取汁者。且如丸藥中用蠟。取其能固護藥之氣味。勢力全備。以過關爲而作效也。今若投之蜜相和。雖易爲丸劑。然下咽亦易散化。如何得到臟中。若其間更有毒藥。則便與人作病。豈徒無益而又害之。全非用蠟之本意。至如桂心於得更有上虛秋甲錯處。可削之也。凡此之類。亦更加詳究。

今人用麻黃。皆合搗諸藥中。張仲景方中。皆言去上沫。序例中言。先別煮三兩沸。掠去其沫。更益水如本數。乃內餘藥。不爾。令人發煩。甚得用麻黃之意。醫家可持此說。然云折去節。令通理。寸剉之。寸剉不若碎剉。如豆大爲佳。藥味易出。而無遺力也。

陶隱居云。藥有宜通、補、洩、輕、重、澀、滑、燥、濕。此十種。今詳之。惟寒熱二種。何獨見遺。如寒可去熱。大黃朴消之屬是也。如熱可去寒。附子桂之屬是也。今物補此二種。以盡厥旨。

右隱居以謂凡餌丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣數百過如此恐乾末滴蕩不可擣不若令力士合研爲佳又曰凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟亦可以葛布篩令調勻並以絹囊內中其雄黃朱砂澄細末如粉今詳之凡諸石雖是湯酒中亦須稍細藥力方盡出效亦速但臨服須澄澄後再上火不用恐遺藥力不見效湯酒中尚應幾若在服食膏中豈得更加粟也不合如此立例當在臨時應用詳酌爾又說咬咀兩字唐本注謂爲商量斟酌非也嘉祐復符陶隱居說爲細切亦非也儒家以謂有含味之意如人以口齒咀嚼雖破而不塵但使含味耳張仲景方多言咬咀其義如此

病人有既不洞曉醫藥復自行臆度如此則九死一生或醫人未識其病或以財勢所迫占奪強治如此之輩醫家病家不可不察也要在聰明賢達之士審之則病無不濟醫無不功世間如此之事甚多故須一一該舉以隄或然

夫人有貴賤少長病當別論病有新久虛實理當別藥蓋人心如面各各不同惟其心不同臟腑亦異臟腑既異乃以一藥治衆人之病其可得乎故張仲景曰又有土地高下不同物性剛柔飲居亦異是故黃帝與四方之間岐伯舉四治之能臨病之功宜須兩審如是則依方合藥一藥而用亦以疎矣且如貴豪之家形藥志苦者也衣食足則形樂心虛多則志苦岐伯曰病生於脈形樂則外實志苦則內虛故病生於脈所發既與貧下異憂樂思慮不同當各逐其人而治之後世醫者直委此一節閉絕不行所失甚矣

嘗有一醫官著月與貴人飲貴人曰我昨日飲食所傷今日食減醫曰可餌消化藥佗人當服十丸公當減其半下嚥未久疎逐不已幾致斃以此較之虛實相遼不可不察故曰病當別論又有一男子著月患血痢醫者妄以涼藥遏制專用黃連阿膠木香藥治之此藥始感便治則可今病久腸虛理不可服愈甸不已幾致委頓故曰理當別藥如是論之誠在醫之通變又須經歷則萬無一失引此爲例餘可效此

凡用藥必須擇州土所宜者則藥力具用之可據如上黨人參用蜀當歸齊州半夏華州細辛又如東壁土多月灰半天河水熱湯漿水之類其物至微其用至廣蓋亦有理若不推究厥理治病徒費其功終亦不能活人聖賢之意不易蘊知然捨理何求哉

凡人少長老其氣血有盛壯衰三等故岐伯曰少火之氣壯壯火之氣衰蓋少火生氣壯火散氣況復衰火不可不知也故治法亦當分三等其少日服餌之藥於壯老之時皆須別處之決不可忽也世有不留心於此者往往不信遂致困危哀哉

今人使理中湯丸倉卒之間多不效者何也是不知仲景之意爲必效藥蓋用藥之人有差殊耳如治胷痺心中痞堅氣結胷滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參、朮、乾薑、甘草四物等其一十二兩水八升煮取三升每服一升日三服以知爲度或作丸須雞子黃大皆奇效今人以一丸如湯梅許服之病既不去乃曰藥不神非藥之罪用藥者之罪也今引以爲例他可做此然年高及素虛寒人當逐宜減甘草

夫高醫以蓄藥爲能倉卒之間防不可售者所須也若桑寄生、桑螵蛸、鹿角膠、天麻、蓋、虎膽、蝟酥、野駝蓉、蓬莪茂、青葵茂石、石蠟、冬灰、臘雪水、松黃之類如此者甚多不能一一逼舉唐元濟字行沖嘗謂狄仁傑

本草衍義卷之二

序例中

人之生實陰陽之氣所聚耳若不能調和陰陽之氣則害其生故寶命全形篇論曰人以天地之氣生又曰天地合氣命之曰人是以陽化氣陰成形也夫遊魂爲變者陽化氣也精氣爲物者陰成形也陰陽氣合神在其中矣故陰陽應象大論曰天地之動靜神明之紀也知神明不可以陰陽攝也易所以言陰陽不測之謂神蓋爲此矣故曰神不可大用大用卽竭形不可大勞大勞卽斃是知精氣神人之大本不可不謹養智者養其神惜其氣以固其本世有不謹衛生之經者動皆觸犯既以犯養生之禁須假以外術保救不可坐以待斃本草之經於是興焉既知保救之理不可不窮保救之事衍義於是存焉二者其名雖異其理僅同欲使有知無知盡臻壽域率至安樂之鄉適是意者求其意而可矣

養心之道未可忽也六欲七情千變萬化出沒不定其言至簡其義無窮而以一心對無窮之事不亦勞乎心苟不明不爲物所病者未之有也故明達之士遂至忘心心既忘矣則六欲七情無能爲也六欲七情無能爲故內事不生內事不生故外患不能入外患不能入則本草之用實世之藥物耳若未能達是意而至是地則未有不緣六欲七情而起憂患者憂患既作則此書一自不可閉也恐何人哉必欲斯文絕人之憂患乎

曰。下之事上。譬富家儲積以自資也。脯臘膜腺。以供滋膳。參朮芝桂。以防疾疢。門下充旨味者多矣。顯以小人備一藥可乎。仁傑笑曰。公正吾藥籠中物。不可一日無也。然藥公因事而言。獨譬之以藥。則有以見天下萬物之中。尤不可闕者也。知斯道者。知斯意而已。

凡爲醫者。須略通古今。粗守仁義。絕馳騖能所之心。專博施救拔之意。如此則心識自明。神物來相。又何必戚戚沽名。齪齪求利也。如或不然。則曷以致姜撫沽譽之慙。逝華佗之矜能受戮乎。

醫藏唐方技傳有云。醫要在視脈。唯用一物攻之。氣純而愈速。一藥偶得。他藥相制。非能專力。此難愈之驗也。今詳之。病有大小新久虛實。豈可止以一藥攻之。若初受病。小則虛幾。若病大多日。或虛或實。豈得不以他藥佐使。如人用硫黃。皆知此物大熱。然石性緩。倉卒之間。下咽不易。便作效。故智者又以附子乾薑桂之類。相佐使以發之。將併力攻疾。庶幾速效。若單用硫黃。其可得乎。故知許國宗之言未可全信。賢者當審處之。

夫用藥如用刑。刑不可誤。誤即手人命。用藥亦然。一誤即便隔生死。然刑有鞫司。鞫成然後議定。議定然後書罪。蓋人命一死。不可復生。故須如此詳識。今醫人纔到病家。便以所見用藥。若高明識病知脈。藥又相當。如此。即應手作效。或庸下之流。孟浪亂投。湯劑逡巡。便致困危。如此殺人。何太容易。世間此事甚多。良由病家不擇醫。平日未嘗留心於醫術也。可不懼哉。

本草衍義卷之三

序例下

治婦人雖有別科。然亦有不能盡聖人之法者。今蒙足之家。居奧室之中。處幃幔之內。復以帛幪手臂。既不能行望色之神。又不能殫切脈之巧。四者有二闕焉。黃帝有言曰。凡治病。察其形氣色澤。形氣相得。謂之可治。色澤以浮。謂之易已。形氣相失。謂之難治。色夭不澤。謂之難已。又曰。診病之道。視人勇怯。骨肉皮膚。能知其情。以爲診法。書患人脈病不相應。既不得見其形。醫人止據脈供藥。其可得乎。如此言之。焉能盡其術也。此醫家之公患。世不能革。醫者不免盡理質問。病家見所問繁。以爲醫業不精。往往得藥不肯服。似此甚多。扁鵲見齊侯之色。尚不肯信。況其不得見者乎。嗚呼可謂難也已。

又婦人病溫。已十二日。診之。其脈六七至。面灑灑。寸稍大。尺稍小。發寒熱。頰赤。口乾。不了了。耳聾。問之。病後數日。經水乃行。此屬少陽熱入血室也。若治不對病。則必死。乃按其證。與小柴胡湯服之。二日。又與小柴胡湯。加桂枝乾薑湯。一日。寒熱遂已。又云。我臍下急痛。又與抵當丸。微利。臍下痛瘥。身漸涼和。脈漸勻。尚不了了。乃復與小柴胡湯。次日云。我但胷中熱燥。口鼻乾。又少與調胃承氣湯。不得利。次日又云。心下痛。又與大陷胷丸半服。利三行。而次日虛煩不寧。時妄有所見。時復狂言。雖知其尚有燥屎。以其極虛。不敢攻之。遂與竹葉湯。去其煩熱。其夜大便自通。至曉兩次。中有燥屎數枚。而狂言虛煩盡解。但咳嗽唾沫。此

肺虛也。若不治。恐乘虛而成肺痿。遂與小柴胡。去人參大棗生薑。加乾薑五味子湯。一日咳減。二日而病悉愈。已上皆用張仲景方。

有婦人病吐逆。大小便不通。煩亂。四肢冷。漸無脈息。一日半。與大承氣湯兩劑。至夜半漸得大便通。脈漸生。翌日乃安。此關格之病。極難治。醫者當謹審也。經曰。關則吐逆。格則不得小便。如此亦有不得大便者。

有小兒病虛滑。食略化大便。日十餘次。四肢柴瘦。腹大。食訖又饑。此疾正是大腸移熱於胃。善食而瘦。又謂之食㽲者。時五六月間。脈洪大。按之則絕。今六脈既單洪。則夏之氣獨然。按之絕。則無胃氣也。經曰。夏脈洪洪多。胃氣少曰病。但洪無胃氣曰死。夏以胃氣爲本。治療失於過時。後不逾旬。果卒。

有人病久嗽。肺虛生寒熱。以款冬花焚三兩芽。俟煙出。以鉛管吸其煙。滿口則嚥之。至惱則已。凡數日之間。五七作差。

有人病瘧月餘日。又以藥吐下之。氣遂弱。疾未愈。觀其病與脈。乃夏傷暑。秋又傷風。乃與柴胡湯一劑。安後。又飲食不節。寒熱復作。此蓋前以傷暑。今以飲食不謹。遂致吐逆不食。脇下牽急而痛。寒熱無時。病名痰瘧。以十棗湯一服。下痰水數升。明日又與理中湯二錢。遂愈。

有人苦風痰。頭痛。頭掉。吐逆。飲食減。醫以爲傷冷物。遂以藥溫之。不愈。又以丸藥下之。遂厥。復與金液丹。後證甚。吐逆、頭掉、不省人事。若見鬼。循衣摸床。手足冷。脈伏。此胃中有結熱。故昏昏不省人。以陽氣不能布於外。陰氣不持於內。即頭掉而厥。遂與大承氣湯。至一劑。乃愈。方見仲景。後服金箔丸。方見圓。

有男子年六十一。脚腫生瘡。忽食猪肉。不安。醫以藥利之。稍愈。時出外。中風。汗出。後頭面皆腫。起紫黑色。多睡。耳輪上有浮泡小瘡。黃汁出。乃與小續命湯。中加羌活一倍。服之。遂愈。

有人年五十四。素羸。多中寒。近服兔絲有效。小年常服生硫黃。數斤。脈、左上二部。有下二部。弦緊有力。五七年來。病右手足筋急拘攣。言語謇澀。遂與仲景小續命湯。加薏苡仁一兩。以治筋急。減黃芩人參芍藥各半。以避中寒。杏仁只用一百五枚。後云。尚覺大冷。因令盡去人參芍藥黃芩三物。却加當歸一兩半。遂安。今人用小續命湯者。比比皆是。既不能逐證加減。遂至危殆。人亦不知。今小續命湯。世所須也。故舉以爲例。可不謹哉。

夫八節之正氣。生活人者也。八節之虛邪。殺人者也。非正氣則爲邪。非眞實則爲虛。所謂正氣者。春溫、夏熱、秋涼、冬寒。此天之氣也。若春在經絡。夏在肌肉。秋在皮膚。冬在骨髓。此人之氣也。在處爲實。不在處爲虛。故曰。若以身之虛。逢時之虛邪。不正之氣。兩虛相感。始以皮膚經絡。次傳至臟腑。逮於骨髓。則藥力難及矣。如此則醫家治病。正宜用藥抵敵。散補。防其深固而不可救也。又當須保護胃氣。舉斯爲例。餘可做此。

本草衍義卷之四

【玉泉】經云生藍田山谷採無時今藍田山谷無玉泉泉水古今不言採又曰服五斤古今方水不言斤又曰一名玉札如此則不知定是何物諸家所解更不言泉俱爲玉立文陶隱居雖曰可消之爲水故名玉泉誠如是則當言玉水亦不當言玉泉也蓋泉其流布之義別之則無所不通易又曰山下出泉蒙如此則誠非止水絡未鑄厥理今詳泉字乃是漿字於義方允漿中既有玉故曰服五斤去古既遠亦文字脫誤也採玉爲漿斷無疑焉且如書篇尚多亡逸況本草又在唐亮之上理亦無怪謂如蚰舍本草誤爲蚰全唐本注云全字乃是舍字陶見誤本改爲舍尚如化不定後有鐵漿其義同此又道藏經有金鉢玉漿之文唐李商隱有瓊漿未飲結成冰之詩是知玉漿可以爲漿又荊門軍界有玉泉寺中有泉與尋常泉水無異亦不能治病寺中日用此水又西洛有萬安山山腹間有寺曰玉泉嘗兩登是山有玉泉之疑寺僧皆備不能答寺前有泉一派供寺中用泉竇皆嘗石與諸井水無異若按別本注玉泉玉之泉液也以仙室玉池中者爲上如此則舉世不能得亦漫立此名故知別本所注爲不可取又有燕玉出燕北體柔脆如油和粉色不入藥當附于此

【丹砂】今人謂之朱砂辰州朱砂多出蠻峒錦州界猜獠峒老鴉井其井深廣數十丈先聚薪于井滿則縱火焚之其背石壁迸裂處即有小竅竅中自有白石床其石如玉床上乃生丹砂小者如箭鏃大者如

芙蓉其光明可鑒研之鮮紅砂泊床大者重上八兩至十兩者晟州亦有形如箭鏃帶石者得自上中非此之比上此物鎮養心神但宜生使煉服少有不作疾者亦不減硃黃粟又一醫流服伏火者數粒一旦大熱數夕而斃今蘇勝菁鍊朱砂爲丹經歲餘沐浴再入鼎誤遺不一塊其徒丸服之遂發悸目一夕而斃其生朱砂初生見便可服因火力所變遂能殺人可不謹也

【空青】功長於治眼仁廟朝嘗詔御藥院須中空有水者將賜近戚久而方得其楊梅青治翳極有功中亦或有水者其用與空青同第有優劣耳今信州穴山而取世謂之楊梅青梅難得

【綠青】即石碌是也其石黑綠色者佳大者刻爲物形或作器用又同爾砂作吐風涎藥驗則驗矣亦損心肺

【雲母】古雖有服鍊法今人服者至少謹之至也市廛多折花紮以售之今惟合雲母膏治一切雜毒瘡等惠民局別有法

【石鍾乳】蘇炳云如蟬翼爪甲者爲上如鵝管者下經既言乳今復不取乳此何義也蓋乳取其性下不用如鵝管者謂如烏頭附子不用尖角之義同但明白光潤輕鬆色如鍊消石者佳服鍊別有法

【朴消】是初採掃得一煎而成者未經再鍊治故曰朴消其味酷澀所以力壓急痛不和可以熟生牛馬皮及治金銀有僞葛洪治食飴不化取此以蕩逐之臘月中出新瓦罐滿注熟水用朴消二升投湯中攪散掛北簷下俟消滲出罐外別收之以人乳汁調半錢掃一切風熱毒氣攻注目瞼外及發於頭面四支胸痛應手神驗

【芒消】經云生於朴消乃是朴消以水淋汁澄清再經熬鍊減半傾本盆中經宿遂結芒有廉稜者故其性和緩方今多用以治傷寒

【消石】是再煎鍊時已取訖芒消凝結在下如石者精英既去但餘滓而已故功力亦緩惟能發熱火唐本注蓋以能消化諸石故名消石煎柳枝湯煮三周時即伏火湯耗即又添柳枝湯

【芒消】是消之精英者其味甘即馬牙消也別有法鍊治而成由其煎鍊故其味亦別治五藏積熱然四物本出於一物由此煎鍊故分出精麤所以其用亦不相遠

【礬石】今坊州礬務以野火燒過石取以煎礬色惟白不逮晉州者皆不可多服損心肺却水故也水化書紙上纔乾水不能濡故知其性却水治涎藥多須者用此意爾火枯爲粉貼瘡甲牙縫中血出如衄者貼之亦愈

【滑石】今謂之畫石以其軟滑可寫畫淋家多用若暴得吐逆不下食以生細末二錢匕溫水服仍急以熱麵半蓋押定

【紫石英】明澈如水精其色紫而不勻張仲景治風熱濕痺及無痴癡風引湯紫石英、白石英、寒水石、石膏、乾薑、大黃、龍齒、牡蠣、甘草、滑石等分混合㕮咀（五汝切、子與切）以水一升煎去三分食後盡多少溫服不用滓服之無不效者

【白石英】狀如紫石英，但差大而六稜，白色如水精。紫白二石英，當攻疾，可醫煮汁用，未聞久服之益。張仲景之意，只令咬咀，不爲細末者，豈無意焉。其久服，更宜詳審。

【赤石脂】今四方皆有，以舌試之，黏著者爲佳。有人病大腸塞滑，小便精出，諸熱藥服及一斗二升，未甚效。後有人教服赤石脂乾薑各一兩，胡椒半兩，同爲末，醋糊丸如梧桐子大，空心及飯前，米飲下五七十丸，終四劑，遂愈。

【白石脂】有初生未滿月小兒，多啼叫，致臍中血出，以白石脂末貼之，即愈。未愈，微微炒過，放冷再貼，仍不得剝揭。

【石中黃子】此又字誤也，子當作水，況當條自言未成餘糧黃濁水，焉得却名之子也。若言未乾者，亦不得謂之子也。子字乃水字無疑。又曰太一餘糧者，則是兼石言之者也。今醫家用石中黃，只石中乾者，及細末者，即便是。若用禹餘糧石，即用其穀，故本條言一名石腦，須火燒醋淬，如此即是石中黃水爲一等。石中黃爲一等，太一餘糧爲一等，斷無疑焉。

【婆娑石】今則轉爲靡娑石，如淡色石緣間微有金星者佳，磨之色如淡乳汁，其味淡，又有豆斑石，亦如此，但於石上有黑斑點，無金星。

【無名異】今圖經曰：本經云味甘平，治金瘡折傷，生肌肉。今云味鹹寒，消腫毒，與本經所說不同，疑別是一種。今詳上文三十六字未審，今云字下，即不知是何處云也。

【菩薩石】出義嶺山中，如水精明澈，日中照出五色光，如義嶺背賢菩薩圓光，因以名之。今醫家鮮用。

本草衍義卷之五

【金屑】不曰金而更加屑字者，是已經磨屑可用之義，如玉屑之義同。二經不解屑爲末盡，蓋須烹鍊鍛屑爲薄，方可研屑入藥。陶隱居云：凡用銀屑，以水銀和成泥，若非鍛屑成薄，焉能以水銀和成泥也。獨不言金屑，亦其闕也。生金有毒，至於殺人，仍爲難解。有中其毒者，惟鵝鴨肉可解，若不經鍛屑，則不可用。顧塊金即穴山，或至百十尺，見伴金石，其石褐色，一頭如火燒黑之狀，此定見金也。其金色深赤黃，麩金即在江沙水中淘汰而得，其色淺黃。此等皆是生金也。得之皆當銷鍊，麩金耗折少，塊金耗折多，入藥當用塊金，色既深則金氣足，餘更防鍛成及點化者，如此焉得更有造化之氣也。若本朝張永德字抱一，并州人，五代爲潞帥，淳化二年改并州，初寓睢陽，有術生鄰居臥病，永德療之，獲愈，生一日就永德求永伍兩，即置鼎中，煮成中金，永德懇求藥法，生曰：君當貴，吾不吝此，虛損君福，鍛工畢，升言祥符年，嘗在禁中，爲方士王捷鍛金，以鐵爲金，凡百餘兩，爲一餅，輒解爲八段，謂之鵝黃金，初自冶中出，色尚黑，由是言之，如此之類，乃是水銀及鐵，用藥製成，非造化所成，功治焉得不差殊。如惠民局合紫雪用金，蓋假其自然金氣爾，然惡錫，又東南方金色深，西南方金色淡，亦土地所宜也。入藥故不如色深者，然得餘甘子，則體柔，亦相感。

【銀屑】金條中已解屑義，銀本出於礦，須煎鍊而成，故名熟銀，所以於後別立生銀條也。其用與熟銀大

同，世有術士能以朱砂而成者，有鉛汞而成者，有燒銅而成者，烏復更有造化之氣，豈可更入藥，既有此類，不可不區別，其生銀即是不自礦中出，而特然自生者，又謂之老翁髮，亦取像而言之耳。然銀屑經官有毒，生銀經言無毒，釋者漏略不言，蓋生銀已生發於外，無蘊鬱之氣，故無毒，礦銀尚蘊蓄於石中，鬱結之氣全未敷暢，故言有毒，亦惡錫。

【水銀】入藥雖各有法，極須審謹，有毒故也。婦人多服絕娠，今人治小兒驚熱涎潮，往往多用，經中無一字及此，亦宜詳諦。得鉛則凝，得硫黃則結，併煮肉研之則散，別法煅爲膩粉，粉霜、唾餅、艷虱、綿得之則明，濃屍中則令尸後腐，以金銀銅鐵盛其上則浮，得紫河車則伏，唐韓愈云太學博士李千遇，信安人，方士柳貴，能燒水銀爲不死藥，以鉛滿一鼎，接中爲空，實以水銀，蓋封四際，燒爲丹砂，服之下血，比四年病益急，乃死。余不知服食說自何世起，殺人不可計，而世慕尚之益至，此其惑也，在文書所記，及耳聞傳者不說。今直取目見親與之游，而以藥敗者六七公，以爲世誡。工部尚書歸登自說，既服水銀得病，若有燒鐵杖自頭貫其下，摧而爲火，射致節以出，狂痛號呼乞絕，其兩齒得水銀，發且止，唾血十數年以斃。殿中御史李虛中直斃其背死，刑部尚書李遜，謂余曰：我爲藥誤，遂死，刑部侍郎李建一旦無病死，工部尚書孟簡邀我於萬州屏人曰：我得秘藥，不可獨不死，今遺子一器，可用煮肉爲丸服之，別一年而病，後有人至，訊之曰：前所服藥誤，方且下之，下則平矣。病二歲卒。東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍，乞死，金吾將軍李道古以柳貫得罪，食貫藥五十，死海上，此可爲滅者也。斬不死乃速得死，謂之智可不可也。五穀三性鹹酸果蔬，人所常御，人相厚勉必曰強食，今惑者皆曰五穀令人夭，當務減節，臨死乃悔，嗚呼哀也已。今有水銀燒成丹砂，醫人不曉，研爲藥衣，或入藥中，豈不遂誤，可不謹哉。

【水銀粉】下涎藥，并小兒涎潮痰癡多用，然不可常服，及過多，多則其損，兼行，若兼驚，則尤須審謹，蓋驚爲心氣不足，不可下，下之裏虛，慌氣入心，不可治，若其人本虛，便須禁此一物，謹之至也。

【雄黃】非金苗，今有金窟處，無雄黃，金條中言金之所生，處處皆有雄黃，豈處處皆得也，別法，治蛇蝮，使之爛蛇遠去，又武都者，鐫磨成物形，終不免其臭，唐甄立言仕爲太常丞，有道人病心腹漲煩，彌二歲，診曰：腹有蠱，誤食蛭而然，令飼雄黃一劑，少選，吐一蛇如拇，無目，燒之有髮氣，乃愈，此殺毒蟲之驗也。

【雌黃】入藥最稀，服石者宜審諦，治外功多，方士點化，病多用，亦未聞其終始如何，畫工或用之。

【石硫黃】今人用治下元虛冷，元氣將絕，久患寒泄，脾胃虛弱，垂命欲盡，服之無不効，中病當便已，不可盡劑，世人蓋知用而爲禍，不知用久爲禍，此物損益兼行，若俱弃而不用，當倉卒之間，又可闕乎，或更以法製，炬火而又常服者，是亦非思也，在本朝則不言如此服良，但專治婦人，不知者，往往更以酒服，其可得乎，或臟中久冷，服之先利，如病勢危急，可加丸散服，少則不効，仍加附子乾薑桂。

【陽起石】如狼牙者佳，其外色不白，如靈石，其大塊者，亦內白，治男子婦人下部虛冷，腎氣乏絕，子藏久寒，須水飛研用，凡石藥冷熱皆有毒，正宜斟酌。

【飛水石】又謂之寒水石，紋理細微，人或磨刻爲枕，以備暑月之用，入藥須燒過，或市人燒入膩粉中以

亂真。不可不察也。陶隱居言夏月能爲冰者佳。如此則舉世不能得。似乎失言。

【石膏】二膏分辨不決。未悉厥理。詳本經。元無方解石之說。正緣唐本注石膏方解石。大體相似。因此一說。後人遂惑。經曰。生齊山山谷及齊盧山。魯蒙山。採無時。卽知他處者爲非。今圖經中又以汾州者編入。前後人都不詳經中所言。細理白澤者良。故知不如是。則非石膏也。下有理石條中。經云。如石膏。順理而細。又可明矣。今之所言石膏方解石。二者何等有順理細文。又白澤者。有是。則石膏也。無是。則非石膏也。仍須是經中所言州土者。方可入藥。餘皆偏見。可略不取。仲景白虎湯中服之如神。新校正仲景傷寒論後。言四月已後。天氣熱時。用白虎者是也。然四方氣候不齊。又歲中氣運不一。方所既異。雖其說甚雅。當此之時。亦宜兩審。若偽寒熱病。或大汗後。脈洪大。口舌燥。頭痛。大渴不已。或着暑熱。身痛憊怠。白虎湯服之無不効。

【磁石】色輕紫。石上顯澁。可吸連針鐵。俗謂之熁鐵石。養益腎氣。補塡精髓。腎虛耳聾目昏。皆用之。入藥須燒赤醋煉。其玄石。卽磁石之黑色者也。多滑淨。其治體大同小異。不可不分而爲二也。磨針鋒則能指南。然常偏東不全南也。其法取新縷中獨縷。以半芥子許蠟。繫于針腰。無風處垂之。則針常指南。以針橫貫燈心。浮水上。亦指南。然常偏丙位。蓋丙爲大火。庚辛金受其制。故如是。物理相感耳。

【理石】如長石。但理石如石膏順理而細。其非順理而細者爲長石。治療亦不相遠。

【鐵精】【針沙】【鐵漿】已上上等。取汁各依經用。【鐵華粉】【鐵粉】已上二等。燒煅取。【馬齒】【秤錘】【車轄】【杵鐶】已上五等。特以其意使之耳。其生鐵。既自火中煉石而出。世謂之生鐵。亦如炒脂麻取油。謂之生油。其義亦同。白油麻條中。已著鐵粉。以生鹽汁調。塗眉上。牛眉毛。鋼鐵。今用柔鐵屈盤。乃以生鐵陷其間。泥封煉之。鍛令相入。謂之團鋼。又曰灌鋼。此蓋草創之鋼。亦不免僞也。蓋生鐵之堅及三四煉。則生鐵亦自熟。却是柔鐵。而天下莫以爲非。磁州煉坊。方識眞鋼。凡鐵之有鋼。如麵之有筋。淅洗、揉麵既盡。筋乃見。鍊鋼亦然。恒取精鐵一百餘斤。每鍛一火。稱之。遂輕。累鍛稱之。至於不減耗。此則純鋼也。雪鐵之精純者。雖百鍊不耗矣。其色清明。磨瑩之。則黯黯而清且黑。亦有鍊之盡。全無鋼者。蓋地之所產精粗爾。前所謂鐵精者。其說有二。陶隱居言出鍛鑪中。如塵紫色。輕者爲佳。亦以磨瑩銅器用之。日華子又云。殺鐵尖浸水。名爲鐵精。本條既言化銅。則隱居所說是。蓋鍛鑪中塵紫塵銅。則明浸擊鑪尖水。非是。

【食鹽】素問曰。鹹走血。故東方食魚鹽之人。多黑色。走血之驗。故可知矣。病嗽及水者宜全禁之。北狄用以淹尸。取其不壞也。至今如此。若中蜈蚣毒。常以鹽洗沃。亦宜湯化飲汁。其燒剝金銀鑛汁作藥。仍須解州池鹽爲佳。齒縫中多血出。常以鹽湯嗽。卽已。蓋齒走血之驗也。

【太陰玄精石】合他藥。塗大風疾。別有法。陰證傷寒。指甲面色青黑。六脈沉細而疾。心下脹滿、結硬、躁渴。虛汗不止。或時狂言。四支逆冷。咽喉不利。腹疼。亦須佐他藥兼之。醫經本草已有法。惟出解州者良。

【蛮蛇骨】堅重。椎破。如金色者佳。

【桃花石】有赤白兩等。有赤地淡白點如桃花片者。有淡白地。有淡赤點如桃花片者。人往往鐫磨爲器用。今人亦挈服食。

【花乳石】其色如硫黃。本經第五卷中已著。今出陝華間。於黃石中間。有淡白點。以此得花之名。今惠民局花乳石散者是。此物陝人又能鐫爲器。圖經第二卷中。易其名爲花蘂石。是卻取其色黃也。更無花乳之名。虛歲久爲世所惑。故書之。

【珊瑚】治腎目。今人用爲點眼筯。有一等紅油色。有細縱紋可愛。又一種如鉛丹色。無縱紋。爲下。入藥用紅油色者。嘗見一本高尺許。兩枝直上。分十餘枝。將至其頂。則交合連環。仍紅潤有縱紋。亦一異也。波斯國海中。有珊瑚洲。海人乘大船。墮鐵網水底。珊瑚所生。磐石上。白如菌。一歲面黃。三歲赤。枝幹交錯。高三四尺。鐵發其根。繫網船上。絞而出之。失時不取則腐。

【馬腦】非石非玉。自是一類。有紅白黑色三種。亦有其紋如纏絲者。出西戎者佳。彼土人以小者碾爲好玩之物。大者碾爲器。今古方入藥。絕可用此物。西方甚重。故佛經多言之。其馬口吐出。既知誤言。不合編入。

【石花】白色。圓如覆大馬杓。上有百十枝。每枝各搓牙分歧。如鹿角。上有細文起。以指撩之。錚錚然有聲。此石花也。多生海中石上。世方難得。家中自有一本。後又於大相國宮中見一本。然其體甚脆。不禁觸擊。本條所注皆非是。

【石蟹】直是今之生蟹。更無異處。但有泥與鑑石相着。凡用。須去其泥并鑑石。止用蟹。磨合他藥點目中。須水飛。

【石蚰】本經不收。始自開寶本草。添附。其色如古墻上土。盤結如楂梨大。中空。兩頭巨細一等。無蓋。不與石蟹同類。蟹則頭蟹也。蚰非真蚰。今人用之絕少。

本草衍義卷之六

【青琅玕】書曰三危既宅。三危。西裔之山也。厥貢惟球琳琅玕。孔穎達以謂琅玕石似玉。新書亦謂三苗西戎。西域記云。天竺國正出此物。陶隱居謂爲未名大丹名。既是大丹名。則本經豈可更言煉服之。又曰可化爲丹。陶不合遠引非此琅玕也。唐本注云。是瑠璃之類。且瑠璃火成之物。琅玕又非火成。經曰生蜀郡平澤。安得同類言之。其說愈遠。且佛經所謂瑠璃者。正如鬼谷珠之礜。乃火成之物也。今人絕不見用。

【礜石】并【特生礜石】博物志及陶隱居。皆言此二石。鶴取之以蠶卵。如此則是一物也。隱居又言。仙經不云特生。則止是前白礜石。今補注但隨文解義。不見特生之意。蓋二條止是一物。但以特生不特生爲異耳。所謂特生者。不附著他石爲特耳。今用者絕少。惟兩字礜石入藥。然極須謹用。其毒至甚。及至論鶴巢中有又却從謬說。鶴巢中皆無此石。乃曰。鶴常入水冷。故取以蠶卵。如此則鷗鷺鴨鷺之類。皆食於水。亦自繁息生化。復不用此二石。其說往往取俗士之言。未嘗究其實而窮其理也。嘗官於順安軍。親檢鶴巢。率無石。矧礜石焉得處處有之。然治久積及久病腹冷有功。直須謹用。蓋其毒不可當。

【代赭】方士煉火中多用。丁頭光澤堅實。赤紫色者佳。【白垩】卽白善土。京師謂之白土子。方寸許切成段。鬻於市。人得以浣衣。今人合王瓜等分爲末。湯點二錢服。治頭痛。【赤土】今公府用以飾椽柱者。水調

細末一二錢服。以治風癮。

【大鹽】新者不苦。久則鹹苦。今解州鹽池所出者。皆成斗子。其形大小不等。久亦苦。海水煎成者。但味和二鹽互有得失。入藥及金銀作。多用大鹽。及解鹽。傍海之人多黑色。蓋日食魚鹽。此走血之驗也。齒縫中血出。鹽湯漱之。及接鼻入腎。北虜以鹽淹尸便不腐。

【戎鹽】成塊。狀之如枕。細白味甘鹹。亦功在却血。入腎。治目中瘀赤澁昏。

【鉛丹】本謂之黃丹。化鉛而成。別有法。唐本注。炒鍋作。然經稱鉛丹。則炒鍋之說誤矣。亦不爲難辨。蓋鍋則色黃暗。鉛則明白。以此爲異。治瘡及久積皆用。

【粉錫】胡粉也。又名定粉。止澁痢積聚。及久瘧。

【鉛霜】圖經已著其法。治上膈熱涎。塗木瓜失酸味。金尅木也。

【古文錢】古銅焦赤有毒。治目中瘀瘀。腐蝕壞肉。婦人橫逆產。五淋。多用。非特爲有鍮也。此說非是。今但取漢王莽時。大泉五十。及寶貨秦半兩。漢莢錢。大小五銖。與大泉五百、大泉當千、宋四銖二銖。及梁四柱北齊常平五銖。爾後其品尙多。如此之類方可用。少時常自患鼻赤自腫痛。數日不能開。客有教以生薑一塊。洗淨去皮。以古青銅錢。刮取薑汁。就錢鋒上點。初甚苦熱。淚蓐面。然終無損。後有患者。教如此點。往往疑惑。信士點之。無不獲驗。一點遂愈。更不可再作。有猶者不可用。

【金牙】今方家絕不用。以此故。商客無利不販賣。醫者由是委而不用。蓋所出惟蜀郡有之。蓋亦不廣也。餘如經。

【石灰】水調一盞。如稠粥。揀好糯米粒全者。半置灰中。半灰外。經宿。灰中米。色變如水精。若人手面上。有黑靨子。及紋刺。先微微以針頭撥動。置少許如水精者於其上。經半日許。蠟汁自出。刷去藥。不用。且不得著水。三二日愈。又取新硬石灰一合。以醋炒。調如泥。於患偏風牽口喎邪人口脣上不患處。一邊塗之。立便牽正。

【冬灰】諸家止解灰而不解冬。亦其闕也。諸灰一烘而成。惟冬灰。則經三四月方徹爐。灰、既曉夕燒灼。其力得不全燥烈乎。而又體益重。今一燕而成者。體輕。蓋火力劣。故不及冬灰耳。若舌緊面少容。方中用九燒益母灰。蓋取此義。如或諸方中用桑灰。自合依本法。既用冬灰。則須爾。唐本注云。冬灰本是藜灰。未知別有何說。又湯火灼。以餅爐中灰細羅。脂麻油調。羽搽。不得著水。仍避風。

【伏龍肝】婦人血露。鹽沙一兩。炒伏龍肝半兩。阿膠一兩。同爲末。溫酒調。空肚服二三錢。以知爲度。本條中有東壁土。陳藏器云。取其東壁土。久乾也。今詳之。兩壁土。亦向陽久乾也。何不取。蓋東壁常先得曉日烘炙。日者太陽眞火。故治瘧瘧。或曰何不取午盛之時。兩壁土。而取日初出東壁土者。何也。火生之時。其氣壯。故素問云。少火之氣壯。及其當午之時。則壯火之氣衰。故不取。實用此義。或曰何以知日者太陽眞火。以水精珠。或心凹銅鑑。向日射之。以艾承接其光。聚處。火出。故知之。

【半天河水】一水也。然用水之義有數種。種各有理。如半天河水。在上天澤水也。故治心病、鬼疰、狂、邪氣

惡毒。【臘雪水】大寒水也。故解一切毒。治天行時氣溫疫、熱病、丹石發、酒後暴熱、黃疸。【井華水】清冷澄徹水也。故通九竅。洗目腦髓。及酒後熱病。後世又用【東流水】者。取其狀順疾速。通關下焦者也。【倒流水】取其回旋留止。上而不下者也。

【菊花水】本條見南陽郦縣北潭水。其源悉芳。菊生被崖。水爲菊味。此說甚怪。且菊生於浮土上。根深者不過尺。百花之中。此特澆露。水泉莫非深遠而來。況菊根亦無香。其花當九月十月間。止三兩旬中。焉得香入水也。若因花而香。其無花之月合如何也。殊不詳。水自有甘淡鹹苦。焉知無有菊味者。嘗官於永耀間。沿幹至洪門北山下。古石渠中。泉水清徹。衆官酌而飲。其味與惠山泉水等。亦微香。世皆未知之。烹茶無相宜。由是知泉脈如此。非緣浮土上所生菊能變泉味。博識之士。宜細詳之。

【漿水】不可同李實飲。令人霍亂吐利。

【熱湯】助陽氣行經絡。患風冷氣痺人。多以湯渫脚至膝上。厚覆使汗出周身。然別有藥。亦終假湯氣而行也。四時暴泄利。四支冷。臍腹疼。深湯中坐。浸至腹上。頻頻作。生陽佐藥無速於此。虛寒人始坐湯中。必戰。仍常令人伺守。

【硇砂】金銀有僞。投鎔鍋中。其僞物盡消散。刮人腹中有久積。故可潰腐也。合他藥。治目中瞖。用之須水飛過。入甆器中。於重湯中煮。其器使自乾。殺其毒。及去其塵穢。

【蓬砂】味化嚥津。治喉中腫痛。膈上痰熱。初覺便治。不能成喉痺。亦緩取効可也。南番者色重褐。其味和。其效速。西戎者。其色白。其味燥。其功緩。亦不堪作銲。

【蓬石】所在皆有。須不見日色。旋取微白者佳。治丁腫殊效。

【自然銅】有人飼折翅鴈。後遂飛去。今人打撲損。研極細。水飛過。同當歸沒藥各半錢。以酒調。頻服。仍以手摩痛處。

【石蠶】今人用者如蜆蛤之狀。色如土。堅重。則石也。既無羽翼。焉能自石穴中飛出。何故只墮沙灘上。此說近妄。唐本注。永州土崗上。掘深丈餘取之。形如蚶而小。重如石。則此自是一物。餘說不可取。潰瘍積藥中多用。

【砒霜】鑪冢或用。纔過劑。則吐瀉兼作。須濃研菉豆汁。仍兼冷水飲。得石腦油即伏。今信州鉛坑井下取之。其坑常封鎖。坑中有濁綠水。先絞水盡。然後下鑿取。生砒謂之砒黃。其色如牛肉。或有淡白路。謂石非石。謂土非土。磨研酒飲。治癖結氣有功。纔見火。便有毒。不可造次服也。取砒之法。將生砒就置火上。以器覆之。令砒烟上飛。着覆器。遂凝結。纍然下垂如乳。尖長者爲勝。平短者次之。圖經言大塊者。其大塊者已是下等。片如細屑者極下也。入藥當用如乳尖長者。直須詳謹。

【浮石】水飛。治目中瞖。今皮作家用之。磨皮上垢。無出此石。石蠶條中云。浮石平無毒。止渴、治淋、殺野獸毒。合於此條收入。

【金星石】【銀星石】治大風疾。別有法。預燒用。金星石於蒼石內。外有金色鈒片。銀星石有如銀色鈒片。

又一種深青色。堅潤中有金色如鈒片。不入藥。工人鑿爲器。或婦人首飾。餘如經。

【石腦油】眞者難收。多滲蝕器物。今入藥最少。燒煉或須也。仍常用有油。去器貯之。又研生砒霜。人石腦油。再研如膏。入砒鍋子內。用淨瓦片子蓋定。置火上。俟鍋子紅粒蒸油出之。又再研。再入油。再上火。凡如此共兩次。即砒霜伏。

本草衍義卷之七

【赤箭】天麻苗也。然與天麻治療不同。故後人分之爲二。經中言八月採根曝乾。故知此即苗也。

【天門冬】麥門冬之類。難曰去心。但以水漬漉。使周潤。滲入肌。俟軟、緩緩擘取。不可浸出脂液。其不知者。乃以湯浸一二時。柔即柔矣。然氣味都盡。用之不效。乃曰藥不神。其可得乎。治肺熱之功爲多。其味苦。但專泄而不專收。寒多人禁服。餘如二經。

【麥門冬】根上子也。治心肺虛熱。并虛勞客熱。亦可取苗作熟水飲。

【蒼朮】其長如大拇指。肥實。皮色褐。氣味辛烈。須米泔浸。洗。再換泔。浸二日。去上麤皮。【白朮】麤促。色微褐。氣味亦微辛。苦而不烈。古方及本經止言朮。未見分其蒼白二種也。只緣陶隱居言朮有兩種。自此人多貴白者。今人但貴其難得。惟用白者。往往將蒼朮置而不用。如古方平胃散之類。蒼朮爲最要藥。功尤速。殊不詳本草元無白朮之名。近世多用。亦宜兩審。嵇康曰。聞道人遺言。餌朮、黃精。令人久壽。亦無白字。

【地黃】葉如甘露子。花如脂麻花。但有細斑點。北人謂之平姑子花。蒸有微細短白毛。經只言乾生二種。不言熟者。如血虛勞熱。產後虛熱。老人中虛燥熱。須地黃者。生與生乾常虛大寒。如此之類。故後世改用熟者。蒸曝之法。以細碎者洗出研取汁。將麤地黃蒸出。曝乾。投汁中。浸三二時。又曝。再蒸。如此再過爲勝。亦不必多。此等名乾生。二種功治殊別。陶但云擣汁和蒸。殊用工意。不顯其法。不注治療。故須悉言耳。

【菖蒲】世又謂之菖蒲。生水次。失水則枯。根節密者。氣味足。有人患遍身生熱毒瘡。痛而不痒。手足尤甚。然至頸而止。粘着衣被。晝夕不得睡。痛不何任。有下俚教以菖蒲三斗。剉。日乾之。擣羅爲末。布席上。使病瘡人悉臥其間。仍以被衣覆之。既不粘着衣被。又復得睡。不五七日之間。其瘡如失。後自患此瘡。亦如此用。應手神驗。其石菖蒲。根絡石而生者。節乃密。入藥須此等。

【澤瀉】其功尤長於行水。張仲景曰。水搖渴煩。小便不利。或吐或瀉。五苓散主之。方用澤瀉。故知其用長於行水。本經又引扁鵲云。多服病人眼澀。蓋爲行去其水。張仲景八味丸用之者。亦不過引接桂附等歸就腎經。別無他意。凡服澤瀉散人。未有不小便多者。小便既多。腎氣焉得復實。今人止洩精。多不敢用。

【山藥】按本草上一字犯英廟諱。下一字曰蕷。唐代宗名豫。故改下一字爲藥。今人遂呼爲山藥。如此則雖失當日本名。盧歲久。以山藥爲別物。故醫之。此物貴生乾方入藥。其法。多月以布裹。手用竹刀子剛去皮。於屋簷下風涼處。盛竹篩中。不得見日色。一夕乾五分。俟全乾收之。惟風緊則乾速。所以用乾之意。蓋生濕則滑。不可入藥。熟則只堪啗。亦澀氣。餘如經。

【菊花】近世有二十餘種。惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄。應候而開者。是也。月令所謂菊有黃華者也。又杭州白菊。單葉者亦入藥。餘醫經不用。專治頭目風熱。今多收之作枕。

【甘草】枝葉悉如槐。高五六尺。但葉端微尖而糙澁。似有白毛。實作角。生如相思角作一本。生子如小扁豆。齒嚙不破。今出河東西界。入藥須微炙。不爾亦微涼。生則味不佳。

【人參】今之用者。皆河北搉場。博易到蓋是高麗所出。率虛軟味薄。不若潞州上黨者。味厚體實。用之有據。土人得一窠。則置於版上。以色絲繩繫。根頗纖長。不與搉場者相類。根下垂有及一尺餘者。或十枝者。其價與銀等。稍爲難得。

【石斛】細若小草。長三四寸。柔韌。折之如肉而實。今人多以木斛誑行。醫工亦不能明辨。世又謂之金釵石斛。蓋後人取象而言之。然甚不經。將木斛折之。中虛如禾草。長尺餘。但色深黃光澤而已。與石斛治胃中虛熱有功。

【牛膝】今西京作畦種。有長三尺者。最佳。與莖蓉浸酒服。益腎。竹木刺入肉。嚼爛罨之。即出。

【細辛】用根。今惟華州者佳。柔韌。極細直。深紫色。味極辛。嚼之習習如椒。治頭面風痛。不可闕也。葉如葵葉。亦黑。非此。則杜蘅也。杜蘅葉形如馬蹄。故俗云馬蹄香。蓋根似白薊。又似細辛。裏漢間一種細辛。極細而直。色黃白。乃是鬼督郵。不可用。

【毗胡】本經並無一字治勞。今人治勞方中。鮮有不用者。嗚呼。凡此誤世甚多。當原病勞。有一種虛損。復爲邪熱。邪因虛而致勞。故曰勞者牢也。當須斟酌用之。如經驗方中。治勞熱。青蒿煎丸。用毗胡正合宜耳。服之無不效。熱去即須急已。若或無熱。得此愈甚。雖至死。人亦不怨。目擊甚多。且華子又謂補五勞七傷。藥性論亦謂治勞乏羸瘦。若此等病。苟無實熱。醫者執而用之。不死何待。注釋本草。一字亦不可忽。蓋萬世之後。所誤無窮耳。苟有明哲之士。自可處治。中下之學。不肯考究。枉致淪沒。可不懲哉。可不戒哉。

如張仲景治寒熱往來如瘧狀。用柴胡湯正合其宜。

【薏苡仁】此李商隱太倉銘中。所謂薏苡似珠。不可不廣者也。取仁用。本經云。微寒。主筋急拘攣。拘攣有兩等。索問註中。大筋受熱。則縮而短。縮短故攣急不伸。此是因熱而拘攣也。故可用薏苡仁。若索問言因寒即筋急者。不可更用此也。凡用之須倍於他藥。此物力勢和緩。須倍加用。即見效。蓋受寒即止能人筋急受熱。故使人筋攣。若但熱而不甞受。又亦能使人筋緩。受濕則又引長無力。

【車前】陶隱居云。其葉擣取汁服。療洩精。大誤矣。此藥甘滑。利小便。走泄精氣。經云。主小便赤下氣。有人作菜食。小便不禁。幾爲所誤。

【芜荑子】藥至初春。亦可煮作菜食。凌冬不凋悴。唐武后九燒此灰。入紫雪藥。九燒之義。已具冬灰條中。

【木香】專泄決胸腹間滯塞冷氣。他則次之。得橘皮肉豆蔻生薑相佐使。絕佳。效尤速。又一種。皆自峨州出。寒。得生寄木香。持歸西洛。葉如牛蒡。但狹長。莖高三四尺。花黃。一如金錢。其根則寄木香也。生嚼之。極辛香。尤行氣。

【菟絲子】附蓽木中。即便蔓延。花實無綠葉。此爲草中之異。其上有菟絲。下有茯苓之說。未必耳。已於茯苓條中具言之。

【巴戟天】本有心。乾縮時。偶自落。或可以抽摘。故中心或空。非自有小孔子也。今人欲要中間紫色。則多僞以大豆汁沃之。不可不察。外盤難染。故先從中間紫色。有人嗜酒。日須五七盃。後患脚氣甚危。教以巴戟牛膝糯米同炒。米微轉色。不用米。大黃一兩。剉、炒、同爲末。熟蜜爲丸。溫水服五七十丸。仍禁酒。遂愈。

本草衍義卷之八

【肉蓯蓉】圖經以謂皮如松子有鱗。子實爲殼。於義爲允。又曰以酒淨洗。去黑汁作羹。黑汁既去。氣味皆盡。然嫩者方可作羹。老者苦。入藥少則不效。

【蔇䕷】有兩等。一等杜蔇䕷。即今之道傍布地而生。或生墻上。有小黃花。結芒刺。此正是墻有茨者。花收摘。陰乾爲末。每服三二錢。飲後以溫酒調服。治白癜風。又一種白蔇䕷。出同州沙苑牧馬處。黃紫花。作莢。結子如羊肉腎。補腎藥。今人多用。風家惟用刺蔇䕷。

【防風】【黃耆】世多相須而用。唐許胤宗爲新蔡王外兵參軍。王太后病風。不能言。脈沉難。對。醫告術窮。胤宗曰。餌液不可進。即以黃耆防風煮湯數十斛。置床下。氣如霧蒸薄之。是夕語。

【千歲棗】唐開元末。訪隱民姜撫已幾百歲。召至集賢院。言服常春藤。使白髮還黑。則長生可致。藤生太湖。終南往往有之。帝遣使多取。以賜老臣。詔天下使自求之。搬撫銀青光祿大夫。號冲和先生。又言終南山有旱藕。即之延年。狀類葛粉。帝取之作湯餅。賜大臣。右驍騎將軍甘守誠曰。常春者千歲蟲也。旱藕者杜蒙也。方家久不用。撫易名以神之。民間以酒漬藤飲者。多染死。乃止。撫內慙。請求藥牢山。遂逃去。今留之以備世疑。

【黃連】今人多用治痢。蓋執以苦燥之義。下俚但見腸胃滲泄。微似有血。便即用之。更不知止。又不顧寒

熱多少。但以藍劑爲度。由是多致危困。若氣實初病熱多、血痢服之便止。仍不必藍劑也。或藍而冷。則不須服。餘如經。

【藍實】即大藍實也。謂之蓼藍。非是爾雅所說。是解藩蘩等語。不可闕也。實與葉兩用。注不解實。只解藍葉爲未盡。經所說藍矣。藍一本而有數色。刮竹青、綠、紫、碧、青、藍、黃。豈非青出於藍而青於藍者也。生葉汁解藥毒。此即大葉藍。又非蓼藍也。蓼藍、即蓼蓝。搗汁染翠碧。花成長穗。細小淺紅色。

【景天】陶隱居既云今人皆盆盛養之於屋上。即知是草藥。又言廣州城外有一株。云可三四圍。呼爲慎火木。既曰云。即非親見也。蓋是傳聞。亦非誤耳。乃陶之輕聽也。然極易種。但折生枝置土中。頻澆溉。旬日便下根。濃研取汁。塗火心瘡。甚驗。乾爲末。水調。搽游風赤腫熱者。

【蒲黃】處處有。即蒲槌中黃粉也。今京師謂槌爲蒲棒。初得黃。細羅。取蕊別貯。以備他用。將蒲黃。水調爲膏。塑爲塊。人多食之。以解心臟虛熱。小兒尤嗜。涉月則燥。色味皆淡。須蜜水和。然不可多食。令人自利。不益極虛人。

【闌草】諸家之說異。同是食末的識。故無定論。葉不香。惟花香。今江陵鼎澧州山谷之間頗有。山外平田即無。多生陰地。生於幽谷。益可驗矣。葉如麥門冬。而闊且觀。長及一二尺。四時常青。花黃。中間葉上有細紫點。有春芳者。爲春闌。色深。秋芳者爲秋闌。色淡。秋闌稻雖得。二闌移植小檻中。置座右。花開時。滿室盡香。與他花香又別。唐白樂天有種闌不種艾之詩。正爲此闌矣。今未見用者。未經蘇注。八月花白。此即澤闌也。

【茵陳蒿】張仲景治傷寒。熱甚發黃者。身面悉黃。用之極效。又一僧因傷寒後發汗不徹。有留熱。身面皆黃。多熱。期年不愈。醫作食黃治之。治不對病。不去。問之。食不減。疑與此藥。服五日。病減三分之一。十日減三分之二。二十日病悉去。方用山茵陳、山梔子、各三分。秦艽、升麻各四錢。末之。每用三錢。水四合。煎及二合。去滓。食後溫服。以知爲度。然此藥以茵陳蒿爲本。故書之。

【決明子】苗高四五尺。春亦爲蔬。秋深結角。其子生角中。如羊腎。今湖南北人家園圃所種甚多。或在村野成叢。種。蜀本圖經言。葉似苜蓿而闊大。甚爲允當。

【芎藭】今出川中。大塊。其裏色白不油色。嚼之微辛甘者。佳。他種不入藥。止可爲末。煎湯沐浴。此藥今人所用最多。頭面風不可闕也。然須以他藥佐之。沈括云。予一族子。舊服芎藭。鄭叔熊見之云。芎藭不可久服。多令人暴死。後族子果無疾而卒。又朝士張子通之妻。病膈風。服芎藭甚久。亦一旦暴亡。皆目見者。此蓋單服耳。若單服既久。則走散真氣。既使他藥佐使。又不久服。中病便已。則烏能至此也。

【五味子】今華州之西。至秦州。皆有之。方紅熟時。採得。蒸爛。研濾汁。去子。熬成稀膏。益酸甘。入蜜。再火上。待蜜熟。俟冷。器中貯。作湯。肺虛寒人。可化爲湯。時時服。作果。可以寄遠。本經言溫。今食之多致虛熱。小兒益甚。藥性論以謂除熱氣。日華子又謂暖水臟。又曰除煩熱。後學至此多惑。今既用之治肺虛寒。則更不取除煩熱之說。則下藥亦用之。入藥生嚼不去子。

【旋花】蔓生。今之河北京西關陝田野中。甚多。最難鋤艾。治之又生。世又謂之旋子花。言其形肖也。四五月開花。亦有多葉者。其根寸截。置土下。頻澆溉。方涉旬。苗已生。蜀本圖經是矣。

本草衍義卷之九

【當歸】爾雅云。山蘄古岸切。當歸也。似芹而麤大。說文云。蘄。草也。生山中者名蘄。音旨。新書圖經。以謂當歸。芹類也。在平地者名芹。生山中麤大者名當歸。若然則今川蜀。皆以平地作畦種。尤肥好。多脂肉。不以平地山中爲等差。但肥潤不枯燥者佳。今醫家用此一種爲勝。市人又以薄酒酒使肥潤。不可不察也。藥性論云。補女子諸不足。此說盡當歸之用矣。

【芍藥】全用根。其品亦多。須用花紅而單葉。山中者爲佳。花葉多即根虛。然其根多赤色。其味澁。若或有色白麤肥者。益好。餘如經。然血虛寒人。禁此一物。古人有言曰。減芍藥以避中寒。減不可忽。

【牛膝】治暴嗽氣喘。三兩皂子大。下嚥。定。屢服屢定。初得寒熱痰嗽。燒一塊。冷嚼之。終日間。嗽自愈。蓋赤眼無瘡者。以古銅錢。刮滑。蘸上取汁。於錢脣點目。熱淚出。今日點。來日愈。但小兒甚懼。不須疑。已試。良驗。

【麻黃】出鄭州者佳。剪去節。半兩。以蜜一匙。匕同炒。良久。以水半升煎。俟沸。去上沫。再煎。去三分之一。不用滓。病瘡疱倒靨黑者。乘熱盡服之。避風。倘其瘡復出。一法用無灰酒煎。但小兒不能飲酒者難服。然其效更速。以此知此藥入表也。

【葛根】湯鼎之間。冬月取生葛。以水中揉出粉。澄成塊。先煎湯使沸。後擘成塊。下湯中。良久。色如膠。其體甚翹。以蜜湯中拌食之。擦少生薑尤佳。大治中熱酒渴病。多食行小便。亦能使人利。病酒及渴者。得之甚

良。彼之人又切入煮茶中以待賓。但甘而無益。又將生薯根煮熟者。作果賣。度吉州南安軍亦如此賣。

【栝樓實】九月十月間。取穰。以乾葛粉拌。焙乾。銀石器中。緩火炒熟。爲末。食後夜臥。以沸湯點一二錢服。治肺燥、熱渴、大腸秘。其根與貝母知母秦艽黃芩之類。皆治馬熱。

【苦參】有朝士苦腰重。久坐。旅拒十餘步。然後能行。有一將佐謂朝士曰。見公日逐以藥揩齒。得無用苦參否。曰始以病齒。用苦參已數年。此病由苦參入齒。其氣味傷腎。故使人腰重。後有太常少卿舒昭亮。用苦參揩齒。歲久亦病腰。自後悉不用。腰疾皆愈。此皆方書爲不載者。有人病遍身風熱細瘙。痒痛不可任。連胸頸臍腹及近隱處皆然。涎痰亦多。夜不得睡。以苦參末一兩。皂角二兩。水一升。揉濾取汁。銀石器熬成膏。和苦參末爲丸如梧桐子大。食後溫水服二十至三十丸。次日便愈。

【石龍芮】今有兩種。水中生者。葉光而末圓。陸生者。葉有毛而末銳。入藥須生水者。陸生者又謂之天炙。取少葉揉繫臂上。一夜作大泡。如火燒者是。惟陸生者。補陰不足。藥常冷。失精。餘如經。

【罌粟】八政散用罌粟。今人爲至要藥。若心經雖有熱。而小腸虛者。服之則心熱未退。而小腸別作病矣。料其意者不過爲心與小腸爲傳送。故用此入小腸藥。按經。罌粟並不治心熱。若心無大熱。則當止治其心。若或制之不盡。須當求其屬以衰之。用八政散者。其意如此。

【白芷】匯是也。出吳地者良。經曰。能蝕膿。今人用治帶下。腸有敗膿。淋露不已。腥穢殊甚。遂至臍腹更增冷痛。此蓋爲敗膿血所致。卒無已期。須以此排膿。白芷一兩。單葉紅蜀葵根二兩。芍藥根白者。白礬各半兩。礬燒枯別研。餘爲末。同以蠟丸如梧子大。空肚及飯前。米飲下十丸或十五丸。俟膿盡。仍別以他藥補之。

【杜蘅】用根似細辛。但根色白。葉如馬蹄之下。市者往往亂細辛。須如此別之。爾雅以謂似葵而香。是也。將杜蘅與細辛相對。便見其僞。況細辛惟出華州者良。杜蘅其色黃白。拳局而脆。乾則作團。

【紫菀】用根。其根柔細紫色。益肺氣。經具言之。唐本注言無紫菀時。亦用白菀。白菀卽女菀也。今本草無白菀之名。蓋唐修本草時。已刪去。

【百合】張仲景用治傷寒壞後百合病。須此也。莖高三尺許。葉如大柳葉。四向攢枝而上。其頭卽有淡黃四花。四垂向下。覆長蕊。花心有檀色。每一枝頭。須五六花。子紫色。圓如梧子。生於枝葉間。每葉一子。不在花中。此又異也。根卽百合。其色白。其形如松子殼。四向攢生。中間出莖。

【酸漿】今天下皆有之。苗如天茄子。開小白花。結青殼。熟則深紅。殼中子大如櫻。亦紅色。櫻中復有細子。如落蘇之子。食之有青草氣。此卽苦虒也。今醫經又立苦虒條。顯然重複。本經無苦虒。

【蘇實】陶隱居云方藥不復用。俗無識者。本經諸家所注不相應。若果是馬蘭。則日華子不當更言。亦可爲證。案食蓋馬蘭。其葉馬牛皆不食。爲纖出土葉已硬。況又無味。豈可更搗入食也。今不敢以蘇實爲馬蘭子。更俟博識者。

【石香薷】處處有之。不必山巖石縫中。但山中臨水附崖處。或有之。九月十月尙有花。

本草衍義卷之十

【款冬花】百草中惟此。不顧冰雪最先春也。世又謂之鑽凍。雖在冰雪之下。至時亦生芽。春時。人或採以代蔬。入藥須微見花者良。如已芬芳。則都無力也。今人又多使如筯頭者。恐未有花爾。有人病嗽多日。或教以煙款冬花三兩枚。於無風處。以筆管吸其煙。滿口則嚥之。數日効。

【牡丹】用其根上皮。花亦有緋者。如西洛潛溪緋是也。今禁苑又有深碧色者。惟山中單葉花紅者爲佳。家椑子次之。若移枝接者不堪用。爲其花葉既多發。奪根之氣也。何以知之。今千葉牡丹。初春留花稍多。來年花枝幷葉便瘦。多是開不成。市人或以枝梗皮售於人。其乖殊甚。

【女菀】一名白菀。或者謂爲二物非也。唐刪去白菀之條。甚合宜。陶能言不能指說性狀。餘從經中所說甚明。今直取經。

【澤蘭】按補注云葉如蘭。今蘭葉如麥門冬。稍闊而長。及一二尺無枝梗。殊不與澤蘭相似。澤蘭纔出土便分枝。梗葉如菊。但尖長。若取其香嗅。則稍相類。既謂之澤蘭。又曰生汝南大澤傍。則其種本別。如蘭之說誤矣。

【地榆】性沉寒。入下焦。熱血痢則可用。若虛寒人。及水瀉白痢。卽未可輕使。

【白前】保定肺氣。治嗽。多用。白而長於細辛。但麤而脆。不似細辛之柔。以溫藥相佐使。則尤佳。餘如經。

【土瓜】體如栝樓，其殼漸寸，一穗長二寸許，上微圓，下尖長，七八月間熟，紅赤色，殼中子如蝗蟲頭者，今人又謂之赤瓜子，其根即土瓜根也，於細根上又生淡黃根，三五相連，如大指許，根與子兩用，紅子同白土子，治頭風。

【薯蕷】今陝州採爲脯，別有法，甚甘美，兼可寄遠，古人以謂薯蕷似人參者是，此解藥毒甚驗。

【積雪草】今南方多有，生陰濕地，不必揀楚，形如水荇而小，而亦光潔，微尖爲異，今人謂之連錢草，蓋取象也，葉葉各生，搗爛，貼一切熱毒瘰疬等，秋後收之，蔭乾爲末，水調。

【涉草】其根上如棗核者，又謂之香附子，亦入印香中，亦能走氣，今人多用，雖生於涉草根，然根上或有或無，有薄皺皮紫黑色，非多毛也，刮去皮，則色白若便以根爲之，則誤矣，其味苦。

【惡實】是子也，今謂之牛蒡，未去毒時，又謂之鼠粘子，根謂之牛蒡，疎風壅涎唾多，咽喉不利，微炒，同入荊芥穗各一兩，甘草炙半兩，併爲末，食後夜臥，湯點二錢服，當緩取效，子在莢中，莢上有細鈎，多至百十，謂之芒，則誤矣，根長一二尺，麤如拇指，煮爛爲菜。

【大小薊】皆相似，花如髻，但大薊高三二尺，葉皺，小薊高一尺許，葉不皺，以此爲異，小薊山野人取爲蔬，甚適用，雖有微芒，亦不能害人。

【艾葉】乾搗，篩去青滓，取白，入石硫黃，爲硫黃艾，炙家用，得米粉少許，可搗爲末，入服食藥，入硫黃別有法。

【陟釐】今人事治，音遲，爲苦腳堪喝，京城市者甚多，然治渴疾，仍須禁食鹽，餘方家亦罕用。

【菟葵】綠葉如黃蜀葵，花似拗棉，甚雅，形如至小者，初開單葉弱葵，有檀心，色如牡丹姚黃葉，則弱葵也，唐劉夢得還京云，唯菟葵燕麥動搖春風者是也。

【白藥】今爲治馬肺熱藥，有效。

【藿香子】今人止呼爲茴香，治勝膀冷氣，及瘧痛，亦調和胃氣，唐本注似老胡蔞，此誤矣，胡蔞葉如蛇床，葉香徒有葉之名，但散如絲髮，特異諸草，枝上時有大青蟲，形如蠶，治小腸氣甚良。

【鬱金】不香，今人將染婦人衣最鮮明，然不奈日炙，染成衣，則微有鬱金之氣。

【肉豆蔻】對草蔻，蔻言之，去殼，只用肉，肉油色者佳，枯白，味薄，瘦虛者下等，亦善下氣，多服則泄氣，得中則和來其氣。

【茅香】花白，根如茅，但明潔而長，皆可作浴湯，同藥本尤佳，仍入印香中，合香附子用。

【青黛】乃藍爲之，有一婦人患臍下腹上下連二陰，遍滿生濕瘡，狀如馬瓜瘡，他處乾無，熱痒而痛，大小便澁，出黃汁，食亦減，身面微腫，醫作惡瘡治，用蠣鰂魚，松脂，黃丹之類，藥塗上，瘡愈熱，痛愈甚，治不對，故如此，問之，此人嗜酒，貪啗，喜魚蟹發風等物，急令用溫水洗，拭去青藥，尋以馬齒苋四兩，爛研，細，入青黛一兩，再研，勻塗瘡上，即時熱減，痛痒皆去，仍服八政散，日三服，分散客熱，每塗藥，得一時久，藥已乾燥，又再塗新濕藥，凡如此，及日減三分之一，五日減三分之二，自此二十日愈，既愈而問曰，此瘡何緣至此，曰

中下焦蓄風熱，毒氣若不出，當作腸癰內痔，仍當須禁酒，及發風物，然不能禁酒，後果然患內痔。

【零陵香】至枯乾猶香，入藥絕可用，婦人沒油飾髮香，無以加此，即薰草是也。

【天麻】用根，須別藥相佐使，然後見其功，仍須加而用之，人或蜜煎爲果，或蒸煮食，用天麻者，深思之，則得矣，苗則赤箭也。

【蓽撥】走腸胃中冷氣，嘔吐，心腹滿痛，多服走泄眞氣，令人腸虛下重。

【使君子】紫黑色，四稜，高瓣深，今經中謂之稜瓣深，似令人難解，秋末冬初，人將人鼎澄，其仁味如椰子肉，經不言用仁，爲復用皮，今按文味甘，即是用肉，然難得仁，蓋絕小，今醫家或兼用殼。

【蜜蒙花】利州路甚多，葉冬亦不凋，然不似冬青，蓋柔而不光潔，不深綠，花細碎，數十房成一朵，冬生春開，此木也，今居草部，恐未盡善。

本草衍義卷之十一

【大黃】損益，前書已具，仲景治心氣不足，吐血衄血，瀉心湯，用大黃黃芩黃連，或曰心氣既不足矣，而不用補心湯，更用瀉心湯何也，答曰若心氣獨不足，則不當須吐衄也，此乃邪熱因不足而客之，故吐衄，以苦泄其熱，就以苦補其心，蓋兩全之，有是證者，用之無不效，最虛實用藥。

【桔梗】治肺熱氣奔促，嗽道，肺癰，排膿，陶隱居云，俗方用此乃名薺苨，今別有薺苨，所謂亂人參者，便是，非此桔梗也，唐本注云，陶引薺苨亂人參，謬矣，今詳之，非也，隱居所言，其意止以根言之，所以言亂人參，唐本注，卻以苗難之，乃本注誤矣。

【甘遂】今惟用連珠者，然經中不言，此藥專於行水，攻決爲用，入藥須斟酌。

【葶藶】用子，子之味有甜苦兩等，其形則一也，經既言味辛苦，即甜者不復更入藥也，大槩治體皆以行水走泄爲用，故曰久服令人虛，蓋取苦泄之義，其理甚明，藥性論所說盡矣，但不當言味酸。

【藝花】今京洛間甚多，張仲景傷寒論，以藝花治利者，以其行水也，水去則利止，其意如此，然今人用時，當以意斟酌，不可使過與不及也，仍須是有是證者方可用。

【旋復花】葉如大菊，又如艾蒿，八九月有花，大如梧桐子，花淡黃，綠繁茂圓而覆下，亦一異也，其香過於菊，行痰水，去頓目風，其味甘苦辛，亦走散之藥也，其旋花四月五月有花，別一種，非此花也，第八卷已具

【蕤蕊】爲末細調，治馬疥痒。

【烏頭】【烏喙】【天雄】【附子】【側子】凡五等，皆一物也，止以大小長短似像而名之。後世補虛塞，則須用附子，仍取其端平而圓大及半兩以上者，其力全，不僭。風家卽多用天雄，亦取其大者，以其尖角多熱性，不肯就下，故取散散也。此用烏頭附子之大略如此。餘三等，則盡其材而用之，其炮製之法，經方已著。

【射干】此乃荀子所說西方之木，名曰射干者也。注復引本草曰，不合以射干爲木，殊不知五行止以水火木金土而言之，故儒者以草木皆木也，金銀皆金也，糞土皆土也，灰火皆火也，水泄皆水也。由是言之，卽非佛經所說火宅喻之獸，及阮公所云臨層城者之木，況本經亦曰一名草蓋，故知是草無疑。今治肺氣喉痺爲佳。日華子曰，大小似高良薑，赤黃色，此得之。

【半夏】今人惟知去痰，不言益脾，蓋能分水故也。脾惡濕，濕則濡而困，困則不能制水。經曰，濕勝則瀉。一男子夜數如廁，或教以生薑一兩碎之，半夏湯洗，與大棗各三十枚，水一升，瓷瓶中，慢火燒爲熟水，時時呷，數日便已。

【蜀漆】常山苗也。治瘧多吐人，其他亦未見所長，此草也，虛歲久，人或別有異論，故預云。餘如經。

【常山】蜀漆根也，亦治瘧吐痰，如雞骨者佳。

【青箱子】經中並不言治眼，藥性論始言之，能治肝臟熱毒衝眼、赤障、青盲，蕭炳可云、理眼，日華子云、益臟腑，明耳目，鎮肝，今人多用之治眼，殊不與經意相當。

【白蘞】【白及】古今服餌方，少有用者，多見於斂瘡方中，二物多相須而行。

【草蒿】今青蒿也，在處有之，得春最早，人刷以爲蔬，根亦葉香，今人謂之青蒿，亦有所別也，但一類之中，又取其青者，陝西綏銀之間有青蒿，在蒿叢之間，時有一兩窠，迥然青色，土人謂之爲香蒿，莖葉與常蒿一同，但常蒿色淡青，此蒿色深青，獨青故氣芬芳，恐古人所用以深青者爲勝，不然諸蒿何皆不香。

本草衍義卷之十二

【迎翹】亦不至翹出衆草，下濕地亦無，太山山谷間甚多，今止用其子，折之，其間片片相比如翹，應以此得名爾。治心經客熱最勝，尤宜小兒。

【白頭翁】生河南洛陽界及新安土山中，性溫，止腹痛，暖腰膝，唐本注及藥性論甚詳，陶隱居失於不審，宜其排叱也。新安縣界兼山野中，嘗見之，正如唐本注所說，至今本處山中人賣白頭翁丸，言服之壽考，又失古人命名之意。

【茼茹】治疥，馬疥尤奇，服食方用者至少。

【羊蹄】經不言根，圖經加根字，處處有葉，如菜中菠薐，但無歧，而色差淺白，葉厚，花與子亦相似，葉可瀹擦，瀹浦器，根取汁塗疥癬，子謂之金蕎麥，燒煉家用以制鉛汞，又剉根研絞汁取三二匙，水半盞，煎一二沸，溫溫空肚服，治產後風秘，殊驗。

【蒴藋】與陸英既性味及出產處不同，治療又別，自是二物，斷無疑焉，況蒴藋花白，子初青如菉豆類，每朵如蓋而大，又平生有一二百子，十月方熟紅，豈得言剩，出此條，孟浪之甚也。

【夏枯草】今又謂之鬱臭，自秋便生，經冬不萎，春開白花，中夏結子，遂枯，古方丸燒灰合緊面藥，初生嫩時，作菜食之，須浸洗，淘去苦水，治瘰癧鼠瘻。

【蚤休】無旁枝，止一莖，挺生高尺餘，頗有四五葉，葉有歧，似虎杖，中心又起莖，亦如是生葉，惟根入藥用。

【虎杖】根微苦，經不言味，此草藥也，蜀本圖經言作木高丈餘，此全非虎杖，大率皆似蹇菊，然花葉蕊蘂差大爲異，仍蹙葉有淡黑斑，自六七月旋旋開花，至九月中方已，花片四出，其色如桃花，差大，外微深，陝西山麓水次甚多，今天下暑月多煎根汁爲飲，不得甘草，則不堪飲，藥性論云和甘草煎管之，甘美，其味甘，即是甘草之味，非虎杖也，論其攻治則甚當。

【馬勃】此屑韓退之所謂牛溲馬勃，俱收並蓄者也，有大如斗者，小亦如升杓，去膜，以蜜揉拌，少以水調，呷，治喉閉咽痛。

【虬莓】今田野道傍，處處有之，附地生葉，如覆盆子，但光潤而小，微有縐紋，花黃，比蔗蘂花差大，春末夏初，結紅子如荔枝色，餘如經。

【苧根】如蕁麻，花如白楊而長，成穗生，每一朵，凡數十穗，青白色。

【蒲根】蒲類，四時取根，擣絞汁用，河朔邊人，止以此苗飼馬，曰菰蔣，及作鹿花如葦，結青子，細若青麻黃，長幾寸，彼人收之，合粟爲粥，食之甚濟饑，此杜甫所謂蒲作冷秋菰者是也，爲其皆生水中及岸際，多食亦令人利。

【蘊草】爾雅曰蓄，育備，蔓子，左傳亦曰一薰一蕕，十年尚猶有臭者，是此草。

【秦牛子】諸家之說紛紛不一，陶隱居尤甚，言花狀如蠶豆，殊不相當，花朵如鼓子花，但碧色，日出開，日西合，今注又謂其中子類蕎麥，亦非也，蓋直如木猴梨子，但黑色，可微炒，搗取其中粉一兩，別以麩炒去皮尖者，桃仁末半兩，以熟蜜和丸如梧桐子，溫水服三二十丸，治大腸風秘，藥熱結澀，不可久服，亦行脾胃氣故也。

【蓖麻子】作朵，生從下，旋旋開花而上，從下結子，宛如牛身之蜱，取子炒熟，去皮，爛嚼，臨睡服三二枚，漸加至十數枚，治瘰癧必效。

【葎草】葛勒蔓也，治傷寒汗後虛熱，剉、研、取生汁飲，一合、餘。

【獨行根】苗蔓生，子則馬蓐零也，根扁，其嗅稍似葛根，細搗，水調，傅丁腫，後有馬蓐零條。

【芭蕉】三年已上，即有花自心中出，一莖止一花，全如蓮花，葉亦相似，但其色微黃綠，從下脫葉，花心但向上生，常如蓮樣，然未嘗見其花心，剖而視之，亦無蘂，悉是葉，但花頭常下垂，每一朵自中夏開，直至中秋後方盡，凡三葉開，則三葉脫落，北地惜其種，人故少用，樓其苗爲布，取汁，婦人塗髮令黑，餘說如經。

【蒲公草】今地丁也，四時常有花，花能飛絮，絮中有子，落處即生，所以庭院間亦有者，蓋因風而來也。

【水紅子】不以多少，微炒一半，餘一半生用，同爲末，好酒調二錢，日三服，食後夜臥各一服，治瘰癧瘡，被者亦治，水、今大率與水紅相似，但枝低爾，今造酒，取以水浸汁，和麴作麴，亦假其辛味。

【角蓿】蓋蘇如青蒿，開淡紅紫花，花大約徑三四分，花罷結角子，長二寸許，微彎，苗與角，治口齒，絕勝。

【雀麥】今謂之野麥，其苗與麥同，但穗細長而疎，唐劉夢得所謂蕓蒿野麥，動搖春風者也。

【骨碎補】苗不似蕨，蕨苗如葦梢，此物苗每一大葉兩邊，小葉槎牙，兩兩相對，葉長有尖瓣，餘如經。

【馬蓐零】蔓生，附木而上，葉脫時，零尚垂之，其狀如馬項鈴，故得名，然熟時則自拆，拆開有子，全者，採時須八九月間，治肺氣喘急。

【燈心草】陝西亦有，蒸熟，乾則拆取中心，穰然燈者，是謂之熟草，又有不蒸，但生乾剝取者，爲生草，入藥宜用生草。

【威靈仙】治腸風，根性快，多服，疏人五臟眞氣。

【何首烏】兼黑髭鬚，與蘿蔔相器，令人髭鬚早白，治腸風熱，多用。

【五倍子】今染家亦用，口瘡以末摻之，便可飲食。

【金櫻子】經九月十月熟時採，不爾復令人利。

【萱草】根洗淨，研汁一盞，生蜜汁半盞，相和，時時細呷，治大熱衄血。

【茵蔯】本經云，得覆盆子、桃仁，治膀胱氣甚效，當合，惟桃仁麩炒各等分，半以酒糊丸，半爲散，每服五七十丸，空心食前鹽酒下，散以熱米飲調下，與丸子相間，空心服，日各一二服。

【金生草】丹石毒發於背，及一切癰腫，每以根葉一分，用酒一大盞，煎汁服，不惟下所服石藥，兼毒去瘡愈，如不欲酒，將末一二錢，新汲水調服，以知爲度。

【木賊】細剉，微微炒，搗爲末，沸湯點二錢，食前服，治小腸膀胱氣，緩緩服必效。

本草衍義卷之十三

【茯苓】乃樵斫訖多年，松根之氣所生，此蓋根之氣味，噎鬱未絕，故爲是物，然亦由土地所宜與不宜，其津氣盛者，方發泄於外，結爲茯苓，故不抱根而成物，既離其本體，則有苓之義，茯神者，其根但有津氣，而不甚盛，故止能伏結於本根，既不離其本，故曰伏神，此物行水之功多，益心脾，不可闕也，或曰松既樵矣，而根尚能生物乎，答曰，如馬勃菌、五芝、木耳、石耳之類，皆生於枯木石糞土之上，精英未瀉，安得不爲物也，其上有蔓絲下，有茯苓之說，甚爲輕信。

【琥珀】今西戎亦有之，其色差淡而明徹，南方者色深而重濁，彼土人多磨爲物形，若謂千年茯苓所化，則其間有沾着蟻蠅蟻，宛然完具者，是極不然也，地里誌云林邑多琥珀，實松脂所化耳，此說爲勝，但七地有所宜不宜，故有能化有不能化者，張茂先又爲燒蜂窠所作，不知得於何處，以手摩熱可以拾芥，餘如經。

【松黃】一如蒲黃，但其味差淡，治產後壯熱，頭痛頰赤，口乾唇焦，多煩燥渴，昏悶不爽，松花、川芎、當歸、石蒲、黃五物等同爲末，每服二錢，水二合，紅花二稍，同煎七分，去滓，粥後溫溫細呷，【松子】多海東來，今關右亦有，但細小味薄，與栢子仁同治虛祕。

【栢】取瀝以療馬癘疥，今未見用松瀝者，老人虛祕，栢子仁、大麻子仁、松子仁等分，同研，溶白蠟丸梧子

大以少黃丹湯服二三十丸食前。嘗官陝西。每登高望之。雖千萬株。皆一一西指。蓋此木爲至堅之木。不提指。得木之正氣。他木不逮也。所以受金之正氣所制。故一一向之。

【桂】大熱。素問云。辛甘發散爲陽。故漢張仲景桂枝湯。治傷寒。表虛皆須此藥。是專用辛甘之意也。本草第一又云。療寒以熱藥。故知三種之桂。不取菌桂牡桂者。蓋此二種。性止溫而已。不可以治風寒之病。獨有一字桂。本經言甘辛大熱。此正合素問辛甘發散爲陽之說。尤知菌牡二桂不及也。然本經止言桂。仲景又言桂枝者。蓋亦取其枝上皮。其木身麤厚處。亦不中用。諸家之說。但各執己見。終無證據。今又謂之官桂。不知緣何而立名。蓋後世爲別物。故書之。又有桂心。此則諸桂之心。不若一字桂也。

【楓香】與松脂皆可亂乳香。尤宜區別。楓香微黃白色。燒之尤見眞僞。兼能治風癱瘓痺毒。水煎熱、燥、澀。

【乾漆】若濕漆。藥中未見用。凡用者皆乾漆耳。其濕者。在燥熱及霜冷時。則難乾。得陰濕。雖寒月亦易乾。亦物之性也。若霑濕人。以油治之。凡驗漆。惟稀者。以物蘸起。細而不斷。斷而急收起。又塗於乾竹上。陰之速乾者。並佳。餘如經。

【蔓荊實】諸家所解。蔓荊牡荊。紛紜不一。經既言蔓荊。明知是蔓生。即非喬木也。既言牡荊。則自是木上生者。況漢書郊祀志所言。以牡荊蓋爲幡竿。故知蔓荊即子大者。是又何疑焉。後條有蔓荊。此即便是牡荊也。子肯色。如菜萸。不合更立蔓荊條。故文中云。本草不載。亦無別名。但有蔓花。功用又別。斷無疑焉。注中妄稱石刊當之。其說稱見穿鑿。

【桑寄生】紅藥書云。今處處有之。從宜南北。實處處難得。豈歲歲窠斫摘殘之苦而不能生邪。抑方宜不同也。若以爲鳥食物子。落枝節間。感氣而生。則麥當生麥。穀當生穀。不當但生此一物也。又有於柔滑細枝上生者。如何得子落枝節間。由是言之。自是感造化之氣。別是一物。古人當日惟取桑上者。蓋假其氣耳。又云今醫家鮮用。此極誤矣。今醫家非不用也。第以難得眞桑上者。醫得眞桑寄生。下驗必驗如神。向承乏吳山。有來藥於諸邑者。乃遍令人搜摘。卒不可得。遂以實告。蓋不敢以僞藥問人。鄰邑有人僞以他木寄生送之。服之逾月而死。哀哉。

【沉香本】嶺南諸郡悉有之。旁海諸州尤多。交錄連枝。崗嶺相接。千里不絕。葉如冬青。大者合數人抱。木性虛柔。山民或以構茅廬。或爲橋梁。或爲飯甑。尤佳。有香者。百無一二。蓋木得水方結。多在折枝枯株中。或爲沉。或爲煎。或爲黃熟。自枯死者。謂之水盤香。今南恩高竇等州。惟產生結香。蓋山民入山見香木之曲幹斜枝。必以刀斫成坎。經年得雨水所漬。遂結香。復以鋸取之。刮去白木。其香結爲斑點。遂名鷓鴣斑。燔之極清烈。沉之良者。惟在瓊崖等州。俗謂之角沉。黃沉。乃枯木中得者。宜入藥用。彼木皮而結者。謂之青桂。氣尤清。在土中歲久。不待刮剔而成者。謂之龍鱗。亦有削之自卷。咀之柔韌者。謂之黃蠟沉。尤難得也。然經中止言療風水毒腫。去惡氣。餘更無治療。今醫家用以保和衝氣。爲上品藥。須極細爲佳。今人故多與烏藥磨服。走散滯氣。獨行則勢弱。與他藥相佐。當緩取效。有益無損。他藥不可方也。【蓽澄香】木葉類棗。梨。南印度界。阿吒薩國出。今謂之西香。南番者更佳。此即今人謂之乳香。爲其垂滴如乳。鎔場在地

者。謂之場香。皆一也。

【丁香】日華子云。治口氣。此正是御史所含之香。治胃寒及脾胃冷氣不和。有大者名母丁香。氣味尤佳。爲末。縫紗囊如小指。實末內陰中。主陰冷病。中病便已。

【棗木】今用皮。以蜜勻炙。與青黛各一分。同爲末。入生龍腦一字。研勻。治心脾熱。舌類生瘡。當摻瘡上。有涎即吐。又張仲景棗皮湯。無不驗。傷寒論中已著。

【辛夷】先花後葉。即木筆花也。最先春。以其花未開時。其花苞有毛。光長如筆。故取像曰木筆。有紅紫二本。一本如桃花色者。一本紫者。今入藥。當用紫色者。仍須未開時收取。入藥去毛苞。

【榆皮】今初春先生夾者是。去上皺澀乾枯者。將中間嫩處剉、乾、礱爲粉。當歉歲。農將以代食。葉清嫩時收貯。亦用以爲醬茹。蓋荒年過豐沛。人關食。鄉民多食此。

【蕪荑】有大小兩種。小蕪荑。即榆莢也。採取仁。醞爲醬。味尤辛。入藥。當用大蕪荑。別有種。然小蕪荑醞造多假以外物相和。切須擇去也。治大腸寒滑。及多冷氣。不可闕。

【酸漿】微熱。經不言用仁。仍療不得眠。天下皆有之。但以土產宜與不宜。嵩陽子曰。酸漿縣。即滑之屬邑。其木高數丈。味酸。醫之所重。今市人賣者皆棘子。此說未盡。殊不知小則爲棘。大則爲酸漿。平地則易長。居崖塹則難生。故棘多生崖塹上。久不撫則成榦。人方呼爲酸漿。更不言棘。徒以世人之意如此。在物則爲若是也。其實一本。以其不甚爲世所須。及礙塞行路。故成大木者少。多爲人樵去。然此物幾及三尺。便開花結子。但窠小者氣味薄。本大者氣味厚。又有此別。今陝西臨潼山野所出者。亦好。亦土地所宜也。並可取仁。後有白棘條。乃是酸漿未爲大時。枝上刺也。及至長成。其刺亦少。實亦大。故漿取大木。刺取小窠也。亦不必強分別爾。

【槐實】止言實。今當分爲二。實本出夾中。若擣夾作煎者。當言夾也。夾中子。大如豆。堅而紫色者。實也。今本條不析出夾與夾中子。蓋其用各別。皆疎導風熱。

【槐花】今染家亦用。收時折其未開花。蒸一沸。出之盞中。有所澄下。稠黃滓。滲漉爲餅。染色更鮮明。治腸風熱。瀉血甚佳。不可過劑。

【枸杞】當用梗皮。地骨當用根皮。枸杞子當用其紅實。是一物有三用。其皮寒。根大寒。子微寒。亦三等。此正是孟子所謂性由杞柳之杞。後人徒勞分別。又爲之枸棘。茲強生名耳。凡杞未有無棘者。雖大至有成架。然亦有棘。但此物小則多刺。大則少刺。還如酸漿及棘。其實皆一也。今人多用其子。直爲補腎藥。是曾未考究。經意當更益其虛實冷熱用之。

本草衍義卷之十四

【龍眼】經曰一名益智。今專爲果。未見入藥。補注不言神農本草編入本部中品。果部中復不曾收入。今除爲果之外。別無龍眼。若謂爲益智子。則專調諸氣。今爲果者復不能也。矧自有益智條。遠不相當。故知本部龍眼。卽便是今爲果者。按今注云甘味歸脾。而能益智。此說甚當。

【厚朴】今西京伊陽縣及商州亦有。但薄而色淡。不如梓州者厚而紫色有油。味苦。不以薑製。則棘人喉舌。平胃散中用。故調中至今此藥盛行。既能溫脾胃氣。又能走冷氣。爲世所須也。

【猪苓】行水之功多。久服必損腎氣。昏人目。果欲久服者更宜詳審。

【竹葉】凡諸竹與笋。性皆微寒。故知葉其用一致。本經不錄苦笋及苦竹性。若取瀝作油。亦不必強擇也。

【竹瀝】張仲景竹葉湯。會淡竹笋。難化不益脾。鄰家一小兒方二歲。偶失照管。壯熱。喘麤不食。多睡。仰頭。呻吟。微嚘嚘。眼目多瞪。凡三五日。醫作慢驚治之。治不對病。不愈。忽然其母誤將巴豆食藥作驚藥。化五丸如麻子大。嚼之。大久。大吐。有物噎於喉中。乳媼以指摘出之。約長三寸。脆如小指。乃三日前臨堦曝者乾笋。是夜諸證皆定。次日但以和氣藥調治遂安。其難化也如此。經曰聞而知之者謂之工。小兒不能問。故爲難治。醫者當愼謹也。

【枳實】枳殼一物也。小則其性酷而速。大則其性詳而緩。故張仲景治傷寒倉卒之病。承氣湯中用枳實。

此其意也。皆取其疎通、決泄、破結實之義。他方但導敗風壅之氣。可常服者。故用枳殼。其意如此。

【山茱萸】與吳茱萸甚不相類。山茱萸色紅。大如枸杞子。

【吳茱萸】如川椒。初結子時。其大小亦不過椒。色正青。得名則一。治療又不同。未審當日何緣如此命名。然山茱萸補養腎臟。無一不宜。經與注所說備矣。

【吳茱萸】須深湯中浸去苦烈汁。凡六七過。始可用。今文與注及注中藥法皆不言。亦漏落也。此物下氣最速。腸虛人服之愈甚。

【梔子】仲景治發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯治之。虛故不用大黃。有寒毒故也。梔子雖寒無毒。治胃中熱氣。既亡血亡津液。脾藏無潤養。內生虛熱。非此物不可去。張仲景傷寒論已著。又治心經留熱。小便赤澀。去皮。山梔子、火炮大黃、連翹、甘草、炙、等分、末之。水煎三二錢匕。服之無不效。

【檀樹】　醫所說甚詳。今人又取尖長者入藥。言其快銳速效。屢嘗試之。果如其說。

【合歡花】其色如今之雞蕊線。上半白。下半肉紅。散垂如絲。爲花之異。其絲葉至夜則合。又謂之夜合花。陳藏器曰華子皆曰皮殺蟲。又曰續筋骨。經中不言。

【秦椒】此秦地所貢者。故言秦椒。大率椒株皆相似。秦椒但葉差大。椒粒亦大。而紋低。不若蜀椒皺紋高爲異也。然秦地亦有蜀種椒。如此區別。

【衙矛】所在山谷皆有之。然未嘗於平陸地見也。葉絕少。其莖黃褐色。若雞皮。三面如鋒刃。人家多燔之遣祟。方家用之亦少。

【紫菽】今蔓延而生。謂之爲草。又有木身。謂之爲木。又須物而上。然餘不逐冬凋。亦得木之多也。故分入木部爲至當。唐白樂天詩有木名凌霄。穠秀非孤標。由是益知非草也。本經又云莖葉味苦。是與瞿麥別一種甚明。唐本注云。且紫菽瞿麥皆本經所載。若用瞿麥根爲紫菽。何得復用莖葉。此說盡矣。然其花赭黃色。本條雖不言其花。又却言莖葉味苦。則紫菽爲花。故可知矣。

【蕪荑】性溫。治大腸寒滑。不可闕也。須佐以他藥。爲丸服。溫而散走寒氣。

【茗苦樣】今茶也。其文有陸羽茶經、丁謂北苑茶錄、毛文錫茶譜、蔡宗顏茶山節對。其說甚詳。然古人謂其芽爲雀舌麥顆。言其至嫩也。又有新芽。一發便長寸餘。微蹙。如針。惟芽長爲上品。其根幹水土力皆有餘。故也。如雀舌麥顆。又下品。前人未盡識。誤爲品題。唐人有言曰。釋滯消壅。一日之利。所佳。斯言甚當。飲茶者宜原其始終。又皆溫嶠上表貢茶千斤。若三百斤。郭璞曰。早採爲茶。晚採爲茗。茗或曰荈。荈音喘。葉老者也。

【桑根白皮】條中桑之用稍多。然獨遺烏桕。桑之精英盡在於此。採擣。微研。以布盛去滓。石器中熬成稀膏。益多少入蜜。再熬成稠膏。貯瓷器中。每抄一二錢。食後夜臥。以沸湯點服。治服金石發熱渴生精神。及小腸熱。性微涼。

【白棘】一名棘刺。按經如此甚明。諸家之意強生疑惑。今掠不取。求其經而可矣。其白棘。乃是取其肥盛紫色枝上有皺。薄白膜先剝起者。故曰白棘。取白之意。不過如此。其棘刺花。乃是棘上所開花也。餘無他義。今人燒枝取油。塗垢髮。使垢解。

【龍腦】傳中與圖經所說各未盡。此物大通利關竅熱塞。其清香爲百藥之先。大人小兒風涎閉壅及暴得驚熱。甚濟用。然非常服之藥。獨行則勢弱。佐使則有功。於茶亦相宜。多則掩茶氣味。萬物中香無出其右者。西方抹羅短吒國在南印度境。有羯布羅香。幹如松株。葉異。濕時無香。揉乾之後折之。中有香。狀類蜜母。色如冰雪。此龍腦香也。蓋西方亦有。

【蓖麻勒】餘甘子也。解金石毒。爲末。作湯點服。佛經中所謂蓖麻勒果者是。此蓋西度亦有之。

【紫鉚】音鉚。如糖霜。結於細枝上。累累然。紫黑色。研破則紅。今人用造綿烟脂。邇來亦難得。餘如經。

【天竹黃】自是竹內所生。如黃土。着竹成片。涼心經。去風熱。作小兒藥尤宜。和緩。故也。

【天竺桂】與牡蠣桂同。味薄而已。

【烏藥】和來氣少。走泄多。但不甚猛。與沉香同磨作湯。點治胸腹冷氣。甚穩當。

【沒藥】大概通滯血。打撲損疼痛。皆以酒化服。血滯則氣壅滯。氣壅滯則經絡滿急。經絡滿急。故痛且腫。凡打撲者肌肉須腫脹者。經絡傷。氣血不行。壅滯。故如是。

【墨】松之煙也。世有以粟草灰僞爲者。不可用。須松煙墨方可入藥。然惟遠煙爲佳。今高麗國每貢墨於中國。不知用何物合和。不宜入藥。此蓋未遠不敢嘗之義。又治大吐血。好墨細末二錢。以白湯化服。膠清調。稀稠得所。頓服。熱多者尤相宜。又鄜延界內有石油。燃之。煙甚濃。其煤可爲墨。黑光如漆。松煙不及。其識文曰延川石液者。是不可入藥。當附于此。

本草衍義卷之十五

【石南葉】狀如枇杷葉之小者。但背無毛。光而不皺。正二月間開花。冬有二葉。爲花苞。苞既開。中有十五餘花。大小如椿。花甚細碎。每一苞約彈許大。成一毬。一花六葉。一朵有七八毬。淡白綠色。葉末微淡赤色。花既開。葉涵花。但見葉不見花。花纔能去年綠葉盡脫落。漸生新葉。治腎衰、脚弱。最相宜。但京洛河北河東山東頗少。人以此故少用。湖南北江東西二浙甚多。故多用。南寶今醫家絕可用。

【蜀椒】須微炒使汗出。又須去附紅黃殼。去殼之法。先微炒。乘熱入竹筒中。以梗搗之。播取紅。如未盡。更揀。更搗。以盡爲度。凡用椒須如此。其中子謂之椒目。治盜汗尤功。將目微炒。搗爲極細末。用半錢匕。以生豬上脂煎湯一合調。臨睡服。無不効。蓋椒目能行水。又治水蠱。

【葶苈】今人呼爲菌草。濃煎湯。淋渫皮膚麻痺。本經一名葶苈。諸家皆謂爲草。今居木部。圖經亦然。今世所用者皆木葉也。如石楠、枝、梗、乾則綠。揉之。其臭如椒。爾雅釋草云。葶苈。釋曰今葶苈也。與本經合。今當具言之。石南條中。陶隱居注云。似菌草。凌冬不凋。誠未無疑。

【郁李仁】其子如御李子。至紅熟。壓昭。微澀。其仁、湯去皮。研極爛。入生龍腦。點赤目。陝西甚多。根煎湯。漬鳳蛾牙。

【鳳李】即牛李子也。木高七八尺。葉如李。但狹而不澤。子於條上四邊生。熟則紫黑色。生則青。葉至秋則

蒂子尚在枝，是處皆有，故經不言所出處。今關陝及湖南江南北甚多。木皮與子兩用。

【蘭華】今長安山中亦有，其子即謂之木蘭子，擔至京都爲數珠，未見其入藥。

【杉】其幹端直，大抵如松，冬不凋，但葉闊成枝，廬山有萬杉寺，即此杉也。作屑、煮汁、浸洗脚氣腫滿，今處處有。

【補材】今江南等路造船場，皆此木也。緣木性堅而善居水，久則多中空，爲白蟻所穴。

【榧實】大如橡斗，殼色紫褐而脆，其中子有一重籠黑衣，其仁黃白色，嚼久漸甘美，五痔人常如果食之，愈過多則滑腸。

【樟木皮】今人呼爲樟柳，然葉謂柳非柳，謂槐非槐，木最大者，高五六十尺，合二三人抱，湖南北甚多，然亦下材也，不堪爲器用。嫩皮取以緣榜槎，與蕺廚。

【白楊】陝西甚多，永耀間居人皆蓋，多此木也，然易生根，斫木時碎札入土，即下根，故易以繁植，非止墟墓間，於人家舍前後及夾道，往往植之，土地所宜爾。風稍至，葉如大雨墜，葉梗故如是，又謂無風自動，即無此事。嘗官永耀間，熟見之，但風微時，當風運者，其葉孤，經處則往往獨搖，以其蒂細長，葉重大，微風雖過，故往來卒無已時，勢使然也。其葉面青光，背白，木身微白，故曰白楊，非如粉之白。

【紫荊】即前所謂牡荊也，不合更立此條，況本經元無紫荊，已具荊實條中。

【紫荊木】春開紫花甚細碎，共作朵生出，無常處，或生於木身之上，或附根土之下，直出花，花能葉出，光緊微圓圓間多植之。

【鈎藤】中空二經不言之，長八九尺，或一二丈者，湖南北江南江西山中皆有，小人有以穴隙間致酒甕中，盜取酒，以氣吸之，酒既出，涓涓不斷，專治小兒驚熱。

【槲藤子】紫黑色，微光，大一二寸，圓扁，治五痔有功，燒成黑灰，微存性，米飲調服，人多剔去肉，作藥甑蒸，腰間。

【皂莢】其子炒春去赤皮、仁，將骨浸軟，煮熟，以鹽漬之，可食，甚疎導五臟風熱藝，其莢不蛀肥者，微炙爲末，一兩，入生白礬末半兩，膩粉半兩，風涎壅塞氣不通，水調嚥一二錢，但過咽，則須吐涎，凡用白礬者，分隔下涎也。又著中濕熱時，或久雨，合蒼朮燒，辟溫疫邪濕氣。

【柳華】經曰味苦，即是初生有黃蘂者也，及其華乾，絮方出，又謂之柳絮，收之，貼炙瘡，及爲菌褥，絮之下蓮小黑子，因風而起，得水濕處便生，如地丁之類，多不因種植，於人家庭院中自然生出，蓋亦如柳絮兼子而飛，陳藏器之說是，然古人以絮爲花，陶隱居亦曰花隨風狀如飛雪，誤矣，經中有實及子汁，諸家不解，今人亦不見用。釋氏謂柳爲尼俱律陀木，其子極細，如人衣因極小，衣果至大，是知小黑子得因風而起。

【楝葉】經注不指定是何楝，致難執用，今具四種楝，各有治療條，其狀列于後，一種白楝，可斲琴者，葉三枝，開白花，亦不結子，藥性論云，皮能治五淋，沐髮，去頭風生髮，一種茬楝，早春先開，淡紅花，狀如鼓子花

成筒子，子或作桐油，日華子云，桐油冷，微毒，一種梧桐，四月開，淡黃小花，一如槐花，枝頭出絲，墮地成油，滓濟衣履，五六月結桐子，今人收炒作果，動風氣，此是月令清明之日，桐始華者，一種崗桐，無花，不中作琴，體重。

【烏臼】葉如小杏葉，但微濃而綠色，差淡，子八九月熟，初青後黑，分爲三瓣，取子出油，然燈及染髮。

【阿黎勒】氣盛人亦宜，緩緩煨熟，少服，此物雖澀腸，而又泄氣，蓋其味苦澀。

【椿木葉】【椿樗】皆臭，但一種有花結子，一種無花不實，世以無花不實，木身大，其梢端直者爲椿，椿用木葉，其有花而莢，木身小，梢多透矮者爲樗，樗用根葉，莢故曰未見椿上有莢者，惟樗木上有，又有樗雞，故知古人命名曰不言椿雞，而言樗雞者，以顯有雞者爲樗，無雞者爲椿，其義甚明，用椿木葉，樗木根葉夾者，宜依此推窮，洛陽一女子，年四十六七，耽飲無度，多食魚蟹，攝理之方蔑如也，後以飲噤過常，蓄毒在腸，日夜二三十瀉，大便與膿血雜下，大腸連肛門痛不堪任，醫以止血痢藥不效，又以腸風藥則益甚，蓋腸風則有血而無膿，凡如此已半年餘，氣血漸弱，食漸減，肌肉漸瘦，稍服熱藥，則腹愈痛，血愈下，服稍涼藥，即泄注氣羸，粥飲減，服溫平藥則病不知，如此將奔歲，醫告術窮，垂命待盡，或有人教服人參散，病家亦不敢主，當謾與服之，纔一服知，二服減，二服膿血皆定，自此不十服，其疾遂愈，後問其方云，治大腸風虛，飲酒過度，挾熱下痢，膿血疼痛，多日不差，樗根白皮一兩，人參一兩，爲末，每用二錢匕，空心，以溫水調服，如不飲酒，以溫米飲代，忌油膩濕麵，青菜菓子，甜物，雞豬魚腥等。

【胡椒】去胃中寒痰吐水，食已即吐，甚驗，過劑則走氣，大腸寒滑，亦用，須各以他藥佐之。

【橡實】樸木子也，葉如栗葉，在處有，但堅而不堪充材，亦木之性也，山中以椿仁爲糧，然澀腸，木薪爲炭，他木皆不及，其殼堪染皂，若曾經雨水者，其色淡，不若不經雨水者，斟亦有殺，但少而不及樸木所實者。

【無石子】今人合他藥染髭。

【槲若】亦有斗，但不及樸木，雖堅而不堪充材，葉微炙炒槐花，減槲葉之半，同爲末，米飲調服，治初得腸風及血痔熱多者，尤佳，亦堪爲炭，但不及樸木。

【黃藥】亦治馬心肺熱有功。

【無患子】今釋子取以爲念珠，出佛經，惟取紫紅色，小者佳，今入藥絕少，西洛亦有之。

【椰子】開之，有汁如乳，極甘香，自別是一種氣味，中又有一塊，瓤形如瓜蔞，上有細毳起，亦白色，但微虛，紋若婦人裙裙，其味亦如其汁，又著殼一重，白肉剛取之皆可與，瓤糖煎爲果，汁色如白酒，其味如瓤，然謂之酒者，好事者當日強名之，取其殼爲酒器，如酒中有毒，則酒沸起，今人皆漆其裏，則全失用椰子之意。

【樺木皮】燒爲黑灰，合他藥，治肺風毒，及取皮上有紫黑花勻者，塗鞍弓鐙。

【赤楝木】又謂之三春柳，以其一年三秀也，花肉紅色，成細穗，河西者，戎人取滑枝爲鞭，京師亦甚多。

【木槿子】蔓生，叢一枯，葉如蒲桃，實如大栝樓，熟則紅黃色，微有刺，不能刺人，今荊南之南皆有之，九月

十月熟。實中之子曰木鼈子。但根不死。春旋生苗。其子一頭尖者爲雄。凡植時須雌雄相合。麻線繫定。及其生也。則去其雄者方結實。

【木槿】小如葵花。淡紅色。五葉成一花。朝開暮歛。花與枝兩用。湖南北人家。多種植爲籬障。餘如經。

【櫻櫚木】今人旋爲器。皮燒爲黑灰。治婦人血露。及吐血。仍佐之他藥。每歲剛取椶皮。不爾束死。花如魚子。淡、熟、流爲果。

【柘木】裏有紋。亦可旋爲器。葉飼蠶曰柘蠶。葉梗然不及桑葉束行。根及皮煮汁釀酒。治風虛耳聾有驗。餘如經。

本草衍義卷之十六

【髮髮】與亂髮自是兩等。髮髮味苦。卽陳舊經年歲者。如橘皮皆橘也。而取其陳者。狼毒麻黃吳茱萸半夏枳實之類。皆須陳者。謂之六陳。入藥更良。敗蒲亦然。此用髮之義耳。今人又謂之頭髮。其亂髮條中自無用髮之義。此二義甚明。亦不必如此過謂搜索。右以亂髮如雞子大。無油器中熬燒黑。就研爲末。以好酒一盞沃之。何首烏末二錢。同勻攪。候溫嚥之。下烟。過一二刻。再嚥。治破傷風。及沐髮中風。極效。

【人乳汁】治目之功多。何也。人心生血。肝藏血。肝受血則能視。蓋水人於經。則其血乃成。又曰上則爲乳汁。下則爲月水。故知乳汁則血也。用以點眼。豈有不相宜者。血爲陰。故其性冷。藏寒人如乳餅酪之類不可多食。雖曰牛羊乳。然亦不出乎陰陽造化爾。西戎更以駝馬乳爲酥酪。老人忠口齒不能食。飲人熱乳良。

【人屎】用乾陳者爲末。於陰地淨黃土中。作五六寸小坑。將末三兩匙於坑中。以新汲水調勻。良久。俟澄清。與時行大熱狂渴須水人飲之。愈。今世俗謂之地漿。然飲之勿極意。恐過多耳。又治一切癰瘡熱毒腫。膿血未潰。疼痛不任。用乾末麝香各半錢。同研。細抄一豆大。津唾調塗。膿潰出去藥。

【人溺】須童男者。產後溫一盃飲。壓下敗血惡物。有飲過七日者。過多。恐久遠血藏寒。今人發帶病人亦不登。氣血虛無熱者。尤不宜多服。此亦性寒。故治熱勞方中亦用。

【人指甲】治鼻齆。細細剉取。俟血稍定。去淚血。於所齆鼻中搐之。立愈。獨不可偏。則衆人取之。甚善。藥并法最多。或效或不效。故須博採。以備道途田野中用。

【觝骨】諸家之說紛然不一。既不能指定。終是臆度。西京頴陽縣民家。忽屋壞。得觝骨一副。支體頭角悉具。不知其蛻也。其斃也。若謂蛻斃。則是有形之物。而又生不可得見。死方可見。謂其化也。則其形獨不能化。然西域記中所說甚詳。但未敢據證。凶物所竄各異。造化不可盡知。莫可得而詳矣。孔子曰君子有所不知。蓋闕如也。妄亂穿鑿。恐誤後學。治精滑及大腸滑。不可闕也。

【牛黃】亦有駱駝黃。皆西戎所出也。駱駝黃極易得。醫家當審別考而用之。爲其形相亂也。黃牛黃輕鬆。自然微香。以此爲異。蓋又有驚音璃牛黃。堅而不香。

【麝】每歲時。須聚於一所。人見其所聚處。及有遺麝氣。遂爲人獲。亦物之一病爾。此獵人云。餘如經。

【象牙】取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者。非口內食齒。齒別入藥。今爲象笏者是牙也。

【犀角】作醋時。上一重凝者爲醋面。醋面上。其色如油者爲醍醐。熬之卽出。不可多得。極甘美。雖如此取之用處亦少。惟潤養痞痼最相宜。

【犀角】凡入藥須烏色。未經湯水浸煮者。故曰生犀。川犀及南犀。紋皆細。烏犀尙有顯紋。者露。黃犀紋絕少。皆不及西番所出。紋高兩脚顯也。物像黃外黑者爲正。透。物像黑外黃者爲倒。蓋以烏爲正。以形像皆物者爲佳。既曰通犀。又須紋頭顯。黃黑分明。透不脫。有兩脚滑潤者爲第一。鹿取茸。犀取尖。其精銳之力盡在是矣。犀角尖。磨服爲佳。若在湯散。則屑之。西番者佳。

【羚羊角】今皆取有掛痕者。陳藏器取耳邊鬼之。集集鳴者良。亦強出此說。未嘗遍試也。今將他角附耳。皆集集有聲。不如有掛痕一說盡矣。然多僞。不可不察也。

【羖羊角】出陝西。河東。謂之茫羝。羊尤很健。毛最長而厚。此羊可入藥。如要食。不如無角。白大羊。本草不言者。亦有所遺爾。又同華之間。有臥沙細肋。其羊有角。似羖羊。但低小。供饌。在諸羊之上。張仲景治寒疝。用生羖羊肉湯。服之無不驗。又一婦人產。當寒月。寒氣入產門。臍下脹滿。手不敢犯。此寒疝也。醫將治之。以抵當湯。謂其有瘀血。舊教之曰。非其治也。可服張仲景羊肉湯。少減水。二服遂愈。

【牛角鰓】此則黃牛角鰓。用尖燒爲黑灰。微存性。治婦人血崩。大便血。及冷痢。又白水牛鼻。乾濕皆可用。治偏風口喎斜。以火炙熱。於不患處一邊熨之。漸正。

【犬膽】深鎰如金色。又救生。接元氣。補虛損。燭黃。狗脊骨一條。去兩頭。殘爲五七段。帶肉塗。小用好銅砂一兩。細研。藥水二升。入兩砂。在藥水中攪勻。浸骨三日。後以炭火炙令黃色。又入汁。漸漸煎汁盡爲度。其餘骨已經煎。搗令極細。後入治藥。

肉蓯蓉去沙。酒浸切。火焙乾。　菟絲子酒浸二日。蒸乾。　杜仲去粗皮。　肉桂去皮上薄。　附子炮。去皮。　鹿茸燎去毛。蜜炙黃色。不可令黃色。又入汁。漸漸煎汁盡爲度。各一兩。　蛇床子中兩。微炒。　陽起石半兩。煮一日。令軟。人不住手研一日。　將前八味同作。羅爲末。次入陽起石。并狗骨末。用熟

浪肉五兩酥一兩同和再搗千餘下若硬軟丸如小豆大曝乾每日空心鹽湯下二十丸。

【鹿茸】他獸肉多周十二辰及八卦昔黃帝立子丑等爲十二辰以名月又以名獸配十二辰周故麋鹿肉爲肉中第一者避十二辰也味亦勝他肉三祀皆以鹿腊其義如此茸最難得不破及不出却血者蓋其力盡在血中獵時多有損傷故也茸上毛先薄以酥塗勻於烈餞中急炙之若不先以酥塗恐火餞傷茸俟毛淨微炙入藥今人亦能將麻茸僞爲之不可不察也頗亦可醞酒然須作藥時稍益蓽撥角爲膠別有法按月令冬至一陽生麋角解夏至一陰生鹿角解各逐陰陽分合如此解落今人用麋鹿茸作一種殆疎矣凡麋鹿角自生至堅完無兩月之久大者二十餘斤其堅如石計一晝夜須生數兩凡骨之類成長無速於此雖草木至易生亦無能及之豈可與凡骨血爲比麋茸利補陽鹿茸利補陰凡用茸無須太嫩唯長四五寸茸端如馬鬣紅者最佳須佐以他藥則有功。

【虎骨】頭脛與脊骨入藥肉微鹹陳藏器所注乙骨之事反射之目光墮地如白石之說必得之於人終不免其所誣也人或問曰風從虎例也風木也虎金也木受金制焉得不從故呼嘯則風生自然之道也所以治風驚急屈伸不得走疰癲疾驚癇骨節風毒等乃此義耳。

【豹肉】毛赤黃其紋黑如錢而中空比比相次此獸猛捷過虎故能安五藏補絕陽輕身又有土豹毛更無紋色亦不赤其形亦小此各自有種非能變爲虎也聖人假喻而已恐醫家未喻故書之。

【狸骨】形類猫其紋有二一如連錢者一如虎紋者此二色狸皆可入藥其肉味與狐不相遠江西一種牛尾狸其尾如牛人多糟食未聞入藥孟詵云骨理痔病作羹臛食之然則骨如何作羹臛音郝肉羹也二炙骨和蘇香雄黃爲丸服治痔及瘻瘡甚效。

【狐】有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘兔至秋深時則可食金氣全也纔至春夏其味變取四脚肘後毛爲逐食飼鵰鷹至次日却吐出其意欲腹中逐蘊脂肥使饑急捕逐速爾然作醬必使五味既忠豌豆瘡又食此則發毒太甚恐班爛損人。

【鼯鼠】經中不言性味惟是於難產通用藥中云鼯音吾鼠微濕毛赤黑色長尾人掘得取皮爲煖帽但向下飛則可亦不能致遠今關西山中甚有毛極密人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蝦背偃僂身有竹節紋長二三寸今謂之海馬。

【鼹鼠】鼹鼠也其毛色如小今京畿田中甚多脚絕短但能行尾長寸許目極小項尤短家易掘取或安竹弓射之用以飼鷹鷂不合更引今諸山林中大如水牛形似猪灰赤色者也說使是鼠則孰能見其溺積成鼠也陶如此輕信但眞醇之士不以無稽之言爲妄矣今經云在土中行則鼹鼠無疑。

【鼬】四足俱知頭與身尾皆褊毛色若故紫帛大者身與尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死亦能休於大木上世謂之水獺腎縣置大水甕中於其間旋轉如風水謂之成旋堆起四面高中心凹下觀者駭目皮西戎將以飾裘服領袖問之云垢不着如風鐵鏽日即就袖口飾目中即出又毛端果不着塵亦一異也又本草敍例言獺腦分盃嘗試之不驗惟塗於蓋唇但使酒稍高于盞面分盃之事亦古今傳誤言也不可不正之肝用之有驗。

【狐】今用肝治風皮被毛用爲裘者是也此獸多疑極審聽人智出之以多疑審聽而捕取捕者多用罝。

【獺】肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑背尖黑尾短闊蒸食之極美豁形如小狐毛黃褐色野獸中獺肉最甘美仍益瘦人。

【野猪】黃在膽中治小兒諸癇疾京西界野猪甚多形如家猪但腹小脚長毛色褐作羣行獵人惟攻射最後者射中前奔者則羣猪散走傷人肉色赤如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有間得之世亦少用食之尙勝家猪。

【驢肉】食之動風脂肥尤甚厥試厥驗日華子以謂止風狂治一切風未可憑也煎膠用皮者取其發散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏蛇烏鴉之類其物雖治風然更取其水色蓋以治其熱則生風之義。

【驢脚脛】今出登萊州藥性論以謂是海內狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前卽似獸尾卽魚其身有短密淺青白毛腹脇下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色復淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍轡其膽治臍腹積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說蓋今人多不識麋獐之屬又小於獐但口兩邊有長牙好鬬則用其牙皮爲第一無出其右者然多牙傷痕四方皆有山深處則頗多其聲如擊磁鈸

【野駝】生西北界等處家生者峯蹄最精人多養熟糟喂蒸爲乾末搐鼻中治鼻齆此西番多用腎進築於彼厥見之。

【敗鼓皮】黃牛皮爲勝今不言是何皮蓋亦以驢馬皮爲之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用處猶少尤好煎膠專用牛皮始可入藥。

【丹雄雞】今言赤雞者是也蓋以毛色言之巽爲雞爲風雞鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故不可食經所著其用甚備產後血暈身瘦面、帶眼、口角與目外眥、同上、牽急不知人取子一枚去殼分消以荆芥末二錢調服遂安仍依次調治若無他疾則不須功甚敏捷烏雞子尤喜經注皆不言雞發風今體有風人食之無不發作爲雞爲巽信可驗矣食雞者當謹。

【鴛肪】陶隱居云鴛音牧卽是鴨然有家鴨有野鴨陳藏器本草曰尸子云野鴨爲鳧家鴨爲鴛獨本注云爾雅云野鳧鴛注云鴨也如此則鳧鴛皆是鴨也又云本經用鴛肺卽家鴨也如此所說各不同其義不定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鶩齊飛則明知鶩爲野鴨也勃唐之名儒必有所據故知鴛爲野鴨明矣。

【鴈肪】人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之行序世或謂之天鵝亦道家之一說爾食之則治諸

風。唐本注曰。鴈爲陽鳥。其義未盡。茲蓋得中和之氣。熱則卽北。寒則卽南。以就和氣。所以爲禮幣者。一以取其信。二取其和。

【鷓鴣】鄭谷所謂相呼相應湘天闊者。南方專充庖。然治瘧及菌毒。甚效。餘悉如雉。

【雉】其飛若矢。一往而墮。故今人取其尾置船車上。意欲如此快速也。漢呂太后名雉。高祖字之曰野雞。其實卽雞屬也。食之所損多。所益少。

【鹿屎白】兼他藥用之。作潰虛積藥。治小兒妳癖黃膈。蜜陀僧一兩。船上硫黃一分。丁香二十一箇。右爲末。每服一字。三歲已上半錢。用乳汁或白麵湯調下。並不轉瀉。一復時取下青黑物。後服補藥。

【伏翼】屎合丹藥。白日亦能飛。但畏鷙鳥不敢出。此物善服氣。故能壽。冬月不食。亦可驗也。

【孔雀】尾不可入目。昏翳人眼。

【鵂鶹】陶隱居云。此鳥不卵生。口吐其雛。今人謂之水老鴉。巢於大木。羣集。宿處有常。久則木枯。以其糞毒也。懷妊者不敢食。爲其口吐其雛。陳藏器復云。使易產。臨時令產婦執之。與陶相戾。蓋官於澧州公宇後有大木一株。其上有三四十巢。日夕觀之。旣能交合。兼有卵殼布地。其色碧。豈得鵂吐口中。是全未考尋。可見當日鵂人之誤言也。

【白鴿】其毛羽色於禽中品第最多。野鴿糞一兩。炒微焦。麝香別研。吳白芷各一分。赤芍藥。青木香。各半兩。柴胡三分。延胡索一兩。炒。赤色去薄皮。七物同爲末。溫無灰酒空心調一錢服。治帶下排膿。候膿盡卽止後服。仍以他藥補血。

【斑鳩】斑鳩也。醫養之數年。並不見春秋分化。有有斑者。有無斑者。有灰色者。有小者。有大者。久病虛損人食之。補氣。雖有此數其用卽一也。

【鵪】有雌雄。從卵生。何言化生。其說甚容易。嘗於田野間得其卵。初生謂之鶉。至初秋謂之旦秋。中秋已後謂之白唐。然一物四名。嘗悉嘗之。小兒患疳及下痢五色。且且食之。有效。

本草衍義卷之十七

【石蜜】嘉祐本草。石蜜收蟲魚部中。又見果部。新車取蘇恭說。直將石字不用。石蜜旣自有本條。煎煉亦自有法。今人謂之乳糖。則蟲部石蜜自是差誤。不當更言石蜜也。本經以謂白如膏者良。由是知石蜜字。乃白蜜字無疑。去古旣遠。亦文字傳寫之誤。故今人尙言白沙蜜。蓋經久則陳白而沙。新收者惟稀而黃。次條蜜蠟。故須別立目。蓋是蜜之房。攻治亦別。至如白蠟。又附于蜜蠟之下。此又誤矣。本是續上文敍蜜蠟之用。又注所出州土。不當更分之爲二。何者白蠟本條中蓋不言性味。止是言其色白爾。旣有黃白三色。今止言白蠟。是取蠟之精英者。其黃蠟直置而不言。黃則蠟陳。白則蠟新。亦是蜜取陳。蠟取新也。唐注云除蜜字爲佳。今詳之。蜜字不可除。除之卽不顯蠟自何處來。山蜜多石中。或古木中。有經二三年。或一得而取之。氣味醇厚。人家窠檻中蓄養者。則一歲春秋二取之。取之旣數。則蜜居房中日少。氣味不足。所以不逮陳白者。日月足也。雖收之。纔過夏亦酸壞。若置於井中近水處。則免湯火傷。塗之痛止。仍搗雞白相和。雖無毒。多食亦生諸風。

【牡蠣】須燒爲粉用。兼以麻黃根等分同搗。研爲極細末。粉盜汗及陰汗。本方使生者。則自從本方左顧。經中本不言。止從陶隱居說。其酉陽雜俎已言牡蠣。言牡非爲雄也。且如牡丹。豈可更有牡丹也。今則合於地、人、面向午位。以牡蠣頂向子視之。□□在左者爲左顧。此物於無目如此。焉得更有顧跨也。

【桑螵蛸】自採者眞。市中所售者恐不得蓋皆桑中者。蜀本圖經。浸炮之法。不若略蒸過爲佳。醫家有一男子小便日數十次。如稠米泔。色亦白。心神恍惚。瘦瘁食減。以女勞得之。令服此桑螵蛸散。未終一劑而愈。安神魂。定心志。治健忘。小便數。補心氣。桑螵蛸、遠志、舊蒲、龍骨、人參、茯神、當歸、龜甲、醋炙、已上各一兩、爲末。夜臥。人參湯調下二錢。如無桑上者。卽用餘者。仍須以炙桑白皮佐之。量多少可也。蓋桑白皮行水意以接螵蛸。就腎經用桑螵蛸之意如此。然治男女虛損。益精。除痿。夢失精。遺溺。疝瘕。小便白濁。腎衰。不可闕也。

【海蛤】【文蛤】陳藏器所說是。今海中無殼。豈有食蛤蜊出者。若蛤中殼有肉時。尙可食。肉既無。焉得更有蜊中過數多者。必爲其皆無塵穢。乃有是說。殊不知風浪日夕淘汰。故如是。治傷寒。汗不溜。搐却手脚。海蛤川烏頭各一兩。川山甲二兩。爲末。酒糊爲丸大一寸許。揑搗。置所患足心下。擣葱白蓋藥。以帛纏定。於暖室中。取熱水浸脚至膝上。久則水溫。又添熱水。候遍身汗出爲度。凡一二日一次。浸脚以知爲度。

【石決明】經云味鹹。卽是肉也。人採肉以供饌。及乾致都下。北人遂爲珍味。肉與殼兩可用。方家宜審用之。然皆治目。殼研。水飛點磨外障醫。登萊州甚多。

【眞珠】小兒驚熱藥中多用。河北塘濼中。亦有國及寸者。色多微紅。珠母與廉州珠母不相類。但淸水急流處。其色光白。水濁及不流處。其色暗。餘如經。

【秦龜】卽生於秦者。秦地山中多老龜。極大而毒。龜甲卽非止秦地有。四方皆有之。但取秦地所出。大者爲勝。今河北獨流釣蟹甚多。取龜筒治瘧。亦入衆藥。止此二種。各逐本條。以其靈於物。方家故用以補心。然甚有驗。

【瑇瑁】治心經風熱。生者入藥。蓋性味全也。既入湯火中。卽不堪用。爲器物者是矣。與生熟犀其義同。

【鯉魚】至陰之物也。其鱗故三十六。陰極則陽復。所以素問曰魚熱中。王叔和曰。熱卽生風。食之所以多發風熱。諸家所解並不言。日華子云鯉魚涼。今不取。直取素問爲正。萬一風家更使食魚。則是貽禍無窮矣。

【鱧魚】今人謂之黑鯉魚。道家以謂頭有星爲根。世有知之者。往往不敢食。又發故疾。亦須忌猪。今用之療病。亦止取其一端耳。

【鮎魚】形少類鯉。有四足。腹重鱉如蠶。身微紫色。嘗剖之。中有三小鮒。又有四五小石塊。如指面許小魚五七枚。然無鱗。與鮎鱔相類。今未見用者。

【鱓魚】腹下黃。世謂之黃鱓。此尤動風氣。多食令人霍亂。嘗見之。向在京師。鄰舍一郎官。因食黃鱓。遂致霍亂吐利。幾至委頓。又有白鱓。稍麤大。色白。二者皆亡鱗。大者長尺餘。其形類蛇。但不能陸行。然皆動風。江陵府西有湖曰西湖。每歲夏秋沮河水漲。卽湖水滿溢。多卽復涸。土人於乾土下掘得之。每及二三尺。則有往來鱓行之路。中有泥水。水漏又下。水至復出。

【鱔魚】開其腹。內藥燒之。治齒。

【蝟皮】取乾皮、燎刺。用刺作刷。治紐帛絕佳。此物兼治胃逆。開胃氣。有功。從虫從胃。有理焉。醫治蠱食病。世有養者。去而復來。久亦不去。當縮身藏足之時。人滿之。卽開。合穿山甲等分燒存性。治痔。人肉豆蔻一半。末之。空肚熱米飲調二錢。服。醫者所說。跳入虎耳及仰腹受啄之事。唐本注見於蟲然。

【石龍子】蜥蜴也。今人但呼爲蜴蜥。大者長七八寸。身有金碧色。仁廟朝。有一蜥蜴在右掖門兩簷間。中此眞是蜥蜴也。鄭狀元有詩。有樵者於澗下行。見一蜥蜴自石罅中出。飲水訖而入。良久。凡百十次。尙不已。樵者疑不免。鑿石視之。有冰澄一二升。樵人訖而去。行方三五里。大雨至。良久風雹。蓋作。今之州縣依法用此所雨。經云治五癃。破石淋。利水道。亦此義乎。

【露蜂房】有兩種。一種小而其色淡黃。窠長六七寸至一尺者。闊二三寸。如蜜脾下垂。一邊是房。多在叢木鬱翳之中。世謂之牛舌蜂。又一種或在高木上。或屋之下。外作圓如三四斛許。小者亦一二斗。中有窠。如瓠之狀。由此得名。蜂色赤黃。其形大於諸蜂。世謂之玄瓠蜂。蜀本圖經言十一月十二月採者。應避生息之時也。今人用露蜂房。兼用此兩種。

【樗雞】東西京界尤多。形類蠶蛾。但頭是微黑。翅兩重。外一重灰色。下一重深紅。五色皆具。腹大。此卽樗雞也。今人又用之。行瘀血月閉。

【蚱蟬】夏月身與聲皆大者是。始終一般聲。仍皆乘昏夜方出土中。昇高處。背殼坼蟬出。所以皆夜出者。一以畏人。二畏日炙。乾其殼而不能蛻也。至時寒則墜地。小兒蓄之。雖數日亦不須臾。古人以爲飲風露。信有之。蓋不蘇而濕。亦可見矣。西川有蟬花。乃是蟬在殼中不出。而化爲花。自項中出。又殼。治目昏翳。又水煎殼汁。治小兒出疹難不快。甚良。

【白殭蠶】然蠶有兩三番。惟頭番殭蠶最佳。大而無蛆。治小兒驚風。白殭蠶、蝎梢等分。天雄尖、附子尖、共一錢。微炮過。爲細末。每服一字。或半錢。以生薑溫水調。灌之。其蠶蛾。則第二番者。以其敏於生育。

【木蝨】大小有三種。蜚蠊、今人多用之。大如蜜蜂。腹圓褊。微黃綠色。雖蠀州順安軍、滄塘濼界河甚多。以其惟食牛馬等血。故治瘀血血閉。

【蠶蟲】今人謂之簇蠶蟲。爲其像形也。乳脈不行。研一枚。水半合。濾淸。服。勿使服藥人知。

【蟾蜍】此蟲藏廚木根下有之。樗木津甘。故根下多有此蟲。其木身未有完者。亦有生於糞土中者。雖肥大。但腹中黑。不若木中者。雖瘦而稍白。生研。水絞汁。濾淸飲下。故【蛤蟆】【蝸牛】二物矣。蛤蟆、其身肉止一段。蝸牛、背上別有肉。以負殼行。顯然異矣。若爲一物。經中焉得分爲二條也。其治療亦大同小異。故知別類。又謂蛞蝓是蝸牛之老者。甚無謂。蛞蝓有二角。蝸牛四角。兼背有附殼肉。豈得爲一物也。

【水蛭】陳藏器日華子所說備矣。大者京師又謂之馬蟥。腹黃者謂之馬黃。畏鹽。然治傷折有功。經與注皆不言。惟製宜子細。不可忽也。今人用者皆炒。

【鼈甲】凡肋者佳。煮熟者不如生得者。仍以醋醋炙黃色用。經中不言治勞。惟蜀本藥性論云。治勞瘦。除骨蒸。後人遂用之。然甚有據。亦不可過劑。頭血塗脫肛。又燒頭灰亦治。

【烏賊魚】乾骨四方人炙食之。又取骨鏟爲末。研細。水飛。澄下。比去水。日乾之。蜜和。得所點目中。緩取效。

【蟹】伊洛絕少。今多自京師來。京師亦自河北貨之。今河北沿邊滄瀛州等處所出甚多。徐州亦有。但不及河北者。小兒解脆。以鹽并白及爛搗。塗顏上。盧合。此物極動風。體有風疾人。不可食。屢見其事。河北人取之。當八九月蟹浪之時。直於塘濼岸上。伺其出水而拾之。又夜則以燈火照捕。始得之。時黃與白滿殼。凡收藏十數日不死。亦不食。此物每至夏末秋初。則如蟬蛻解。當日名蟹之意。必取此義。

【原蠶蛾】有原復敏速之義。此則第二番蛾也。白殭蠶條中已具。屎飼牛代穀。又以三升醇酒。拌蠶屎五斗。用甑蒸熟。於暖室中。鋪於油單上。令患風冷氣閉。及近感癱風人。就所患一邊臥。看溫熱厚蓋覆。汗出爲度。若盧人須常在左右。防大熱昏冒。仍令頭面在外。不得壅覆。未全愈間。再作。

【蠶退】治婦人血風。此則眠起時所蛻皮是也。其蠶退紙。謂之蠶連。亦燒灰用之。治婦人血露。

【鰻鱺魚】生剖曬乾。取少許。火上微炙。候油出。塗白剝用以指擦之。即時色轉。凡如此五七次。用即愈。仍先於白處微微擦動。

【鮫魚】沙魚皮。一尋形稍異。今人取皮飾鞍劍。餘如經。

【河鯽】經言無毒。此魚實有大毒。味雖珍。然脩治不如法。食之殺人。不可不謹也。厚生者不食。亦好。蘇子美云河鯽于此時貴。不數魚蝦。此即詩家鄙諺之言。未足全信也。然此物多怒。觸之則怒氣滿腹。鱗浮水上。漁人就以物撩之。遂爲人獲。檄攪并蘆根汁解其毒。

【紫貝】大二三寸。背上深紫有點。但黑。本經以此燒存性入點服藥。

【鯉魚】益肝腎。補五藏。和腸胃。食之宜人。不甚發病。宜然。張翰思之也。

【蝦蟆】多在人家渠壍下。大腹品類中最大者是。遇陰雨、或昏夜即出食。取眉間有白汁。謂之蟾酥。以油單裹眉裂之。酥出單上。入藥用。有人病齒縫中血出。以紙紬子。蘸乾蟾酥少許。於血出處按之。立止。世有人收三足枯蟾以罔衆。但以水沃半日。盡見其僞。蓋本無三足者。

【蛙】其色青。腹細紫尖。後脚長。故善躍。大其聲則曰蛙。小其聲則曰蛤。月令所謂雀入大水化爲蛤者也。唐韓退之詩一夜青蛙鳴到曉者是。此食之性平。解勞熱。

【蛤蚧】補肺虛勞嗽有功。治久嗽不愈。肺間蘊熱。久則成痰。故嗽出膿血。曉夕不止。喉中氣塞。胸膈疼痛。蛤蚧、阿膠、生犀角、鹿角膠、羚羊角各一兩。除膠外。皆爲屑。次入膠。分四服。每服用河水三升。於銀石器中。慢火煮至半升。濾去滓。臨臥微溫。細細呷其滓。候服盡再餵。都作一服。以水三升煎至半升。如前服。若病人久虛不喜水。當減減水。張刑部子皐病極。田樞密況送此方。遂愈。

【鯪鯉甲】穴山而居。亦能水。燒一兩存性。肉荳蔻仁三錢。同爲末。米飲調二錢。服。治氣痔。膿血。甚者加蝟皮一兩。燒入。中病即已。不必盡劑。

【蜘蛛】品亦多。皆有毒。經不言用是何種。今人多用人家簷角、雜頭、廳巷之間。空中作圓網。大腹、深灰色者。遺屎者人作斑蝥。

【蝟蛸】其中一種最大。京師名爲馬大頭者是。身綠色。雌者。腰間一遍碧色。用則當用雄者。陶隱居以謂青色大眼。一類之中。元無青者。眼一類皆大。此物生化於水中。故多飛水上。唐杜甫云點水蜻蜓款款飛。

【石蠶】謂之爲草則繆矣。經言肉解結氣。注中更辯不定。此物在處有。附生水中石上。作絲網如紋殷。長寸許。以蔽其身。色如泥。蠶在其中。此所以謂之石蠶也。今方家用者絕稀。此亦水中虫耳。山河中多。

【蛇蛻】從口蠕退出。眼睛亦退。今合眼藥多用。取此義也。入藥洗淨。

【蛇黃】椎破。中間有如自然銅者。佳。治心悸動火。燒赤、酒淬至酥、二兩、朱砂一兩、與蛇黃同研、水飛。天麻二兩。別爲末。與前二味合均。每以半錢。少以薄荷湯調。食後夜臥服。殊效。

【金蛇】今方書往往不見用。

【烏蛇】尾細長。能穿小銅錢一百文者、佳。有身長一丈餘者。蛇類中此蛇入藥最多。嘗於順安軍塘濼堤上見一烏蛇。長一丈餘。有鼠狼嚙蛇頭。曳之而去。是亦相畏伏。鼠市者多僞以佗蛇燻黑色貨之。不可不察也。烏蛇脊高。世謂之劍脊烏梢。

【白花蛇】諸蛇鼻向下。獨此蛇鼻向上。背有方勝花紋。以此得名。用之。去頭尾換酒浸三日。棄酒不用。火炙。仍盡去皮骨。此物毒甚。不可不防也。

【蜈蚣】背光黑綠色。足赤。腹下黃。有中其毒者。以烏雞屎水稠調塗咬處。效。大蒜塗之亦效。復能治丹毒。

【蜈蚣】一條乾者。白礬皂子大。雷丸一錢。百步二錢。秤。同爲末。醋調塗之。又畏蛞蝓。不敢過所行之路。觸其身。則蜈蚣死。人故取以治蜈蚣毒。桑汁白鹽亦效。

【馬陸】即今百節蟲也。身如槎節。即有細蹙紋起。紫黑色。光潤。百足。死則側臥如環。長二三寸。尤者。麤如小指。西京上陽宮及內城塼壇中甚多。入藥至鮮。

【蟻】【蟻】諸家所論備矣。然終不敢捨詩之意。嘗析窠而視之。果有子。如半粟米大。其色白而微黃。所負蟲亦在其中。乃青菜蟲。却在子下。不與蟲相著。又非葉蟲及草上青蟲。應是諸蟲皆可也。陶隱居所說近之矣。人取此房。研細。醋調塗蜂螫。

【雀瓮】多在棘枝上。故又名棘蒯子。研其間蟲汁。嚥小兒。治。

【鼠婦】此濕生蟲也。多足。其色如蚓。背有橫紋。蹙起。大者長三四分。在處有之。搏蟄及下濕處多。用處絕少。

【蚤】常在大暑前後飛出。是得大火之氣而化。故如此明照也。今人用者少。月令雖曰腐草所化。然非陰濕處終無。

【衣魚】多在故書中。久不動帛中。或有之。不若故紙中多也。身有厚粉。手搖之則落。亦嚙裘衣。用處亦少。

其形稍似魚。其尾又分二歧。世用以滅瘢痕。

【白顯蚯蚓】自死者良。然亦應候而鳴。此物有毒。昔有病腹大。夜聞蚯蚓鳴於身。有人教用鹽水浸之而愈。崇寧末年。隨州兵士。嘗月中在倅廳前。跣立廳下。爲蚯蚓所中。遂不救。後數日又有人被其毒。博識者教以先飲鹽湯一盃。次以鹽湯浸足。乃愈。今入藥。當去土了微炙。若治腎臟風下注病。不可闕也。仍須鹽湯送。王荆公所謂蚓壤太牢俱有味。可能蚯蚓獨清廉者也。

【螻】與【蛄】同。此蟲當立夏後至夜則鳴。月令謂之螻蟈鳴者是矣。其聲如蚯蚓。此乃是五伎而無一長者。

【蜣蜋】大小二種。一種大者爲胡蜣蜋。身黑光。腹翼下有小黃子。附母而飛行。蓋不出。夜方飛出。至人家庭戶中。見燈光則來。一種小者。身黑暗。晝方飛出。夜不出。今當用胡蜣蜋。其小者。研三十枚。以水灌牛馬。治腸結。絕佳。狐遇而必盡食之。

【斑猫】須糯米中炒米黃爲度。妊身人不可服。爲能潰人肉。治淋藥多用。極苦。人尤宜斟酌。下條芫青。其用與此不相遠。故附于此。

【馬刀】京師謂之矯岸。春夏人多食。然發風痰。性微冷。又順安軍界河中亦出。蜀大庭。與馬刀相類。肉頗濟。人作鮓以寄隣左。又不能致遠。亦發風。此等皆不可多食。今蛤粉皆此等衆蛤灰也。

【貝子】今謂之貝齒。亦如紫貝。但長寸餘。故曰貝子。色微白。有深紫黑者。治目中翳。燒用。北人用之。氈帽上爲飾。及繞衣。或作鞾鼻下垂。

【甲香】善能管香煙。與沉檀龍腦用之。甚佳。

【蝎】大人小兒通用。治小兒驚風。不可闕也。有用全者。有只用梢者。梢力尤功。今青州山中石下捕得。慢火逼。或烈日中曝。蝎渴熱時。乃與青泥食之。既滿。復以火逼殺之。故其色多赤。欲其體重而售之。故也。醫家用之。皆悉去土如發。人還能禁止之。自嘗被其毒。兄長禁而止。及令。故蜇終不痛。翰林禁科具矣。

【五靈脂】行經血有功。不能生血。嘗有人病眼中翳。往來不定。如此乃是血所病也。蓋心生血。肝藏血。肝受血則能視。目病不治血。爲背理。此物入肝最速。一法五靈脂二兩、沒藥一兩、乳香半兩、川烏頭一兩半。炮去皮。同爲末。滴水丸如彈子大。每用一丸。生薑溫酒磨服。治風冷氣血閉。手足身體疼痛冷麻。又有人被毒蛇所傷。良久之間已昏困。有老僧以酒調藥二錢嚥之。遂蘇。及以藥涂瘡處。良久。復嚥二錢。其苦皆去。問之。乃五靈脂一兩、雄黃半兩。同爲末。止此耳。後有中毒者用之。無不驗。此藥雖不甚貴。然亦多有僞者。

本草衍義卷之十八

【豆蔻】草豆蔻也。氣味梅辛。微香。此是對肉豆蔻而名之。若作果。則味不和。不知前人之意。編入果部。有何意義。性溫而調。散冷氣力甚速。花性熱。淹留京師。然味不甚美。微苦。必爲能消酒毒。故爲果。花乾則色淡紫。

【葡萄】先朝西夏持師子來獻。使人兼賫葡萄遍州郡。比中國者皆相似。最難乾。不乾不可收。仍酸澀不可食。李白所謂胡人歲獻葡萄酒者是此。瘡疱不出。食之盡出。多食皆昏人眼。波斯國所出。大者如雞卵。

【蓬蘽】非覆盆也。自別是一種。雖枯敗而枝梗不散。今人不見用。此即賈山策中所言者是此。

【覆盆子】長條。四五月紅熟。秦州甚多。永興華州亦有。及時。山中人採來賣。其味酸甘。外如荔枝。櫻桃許大。軟紅可愛。失採則就枝生蛆。益腎藏。縮小便。服之。當覆其溺器。如此取名。食之多熱。取時五六分熟。便可採。烈日曝。仍須薄綿蒙之。今人取汁作煎爲果。仍少加蜜。或蒸爲稀湯。點服。治肺虛塞。採時若水則不堪煎。

【大棗】今先青州。次晉州。此二等可蹙曝入藥。益脾胃。爲佳。餘止可充食用。又云御棗甘美輕脆。後衆棗熟。以其甘故多生蟲。今人所謂僕落酥者是。又有牙棗。先衆棗熟。亦甘美。但微酸。尖長。此二等止堪噉。不堪收曝。今人將乾棗去核。於鐺鍋中微火煨逼。乾爲末。量多少。入生薑末爲湯。點服。調和胃氣。又將煮棗

肉。和治脾胃丸藥尤佳。人青州銀去皮核。焙乾爲粗圓。達都下。爲奇果。

【雞頭實】今天下皆有之。河北沿淀濼居人採得。舂去皮。搗以爲粉。蒸蒸作餅。可以代糧。食多不益脾胃氣。兼難消化。

【藕實】就蓬中乾者爲石蓮子。取其肉。於砂盆中。乾擦去浮上赤色。留青心爲末。少入龍腦爲湯點。寧心志。清神。然亦有粉。紅千葉白千葉者。皆不實。如此是有四等也。其根惟白蓮爲佳。今禁中又生白蓮。亦一瑞也。

【菱】今世俗謂之菱角。所在有。煮熟取仁食之。代糧。不益脾。又有水菱亦菱也。但大而脆。可生食。和合治療。未聞其用。有人食生菱多則利及難化。是亦性冷。

【栗】欲乾莫如曝。欲生收莫如潤。沙中藏至春末夏初。尚如初收摘。小兒不可多食。生者難化。熟即滯氣。隔食。生蟲。往往致小兒病。人亦不知。所謂補腎氣者。以其味鹹。又滯其氣。關湖北路有一種栗。頂圓末尖。謂之旋栗。圖經引詩言莘（音秦）栗者。謂其象形也。

【櫻桃】孟詵以爲櫻非桃類。然非桃類。蓋其以形肖桃。故曰櫻桃。又何疑焉。謂如木猴梨葫蘆之類。亦取其形相似爾。古謂之唐桃。可薦宗廟。禮云先薦寢廟者是此。唐王維詩云。纔是寢園春薦熟。非干御苑鳥啣殘。小兒食之。纔過多無不作熱。此果在三月末四月初間熟。得正陽之氣。先諸果熟。性故熱。今西洛一種紫櫻。正熟時正紫色。皮裏間有細碎黃點。此最珍也。今亦上供朝廷。藥中不甚須。

【橘柚】自是兩種。故曰一名橘皮。是元無柚字也。豈有兩等之物。而治療無一字別者。即知柚字爲誤。後人不深求其意。謂柚字所惑。妄生分別。亦以過矣。且青橘與黃橘。治療尚別。矧柚爲別種也。郭璞云柚似橙而大於橘。此即是識橘柚者也。今若不如此言之。恐後世亦以柚皮爲橘皮。是貽無窮之患矣。去古既遠。後之賢者亦可以意逆之耳。橘惟用皮與核。皮天下甚所須也。仍湯浸去穰。餘如經。與注。核皮二者須自收爲佳。有人患氣嗽將期。或教以橘皮、生薑、焙乾、神麯、等分爲末。丸桐子大。食後夜臥。米飲服三五十丸。象舊患膀胱。絲服此倍愈。然亦取其陳皮入藥。此六陳中一陳也。腎疼、腰痛、膀胱氣痛。微炒核去殼爲末。酒調服。愈。

【乳柑子】今人多作橘皮。售於人。不可不擇也。柑皮不甚苦。橘皮極苦。至熟亦苦。若以皮緩慢分別橘與柑。又緣方宜各不同。亦互有緊慢者。脾腎冷。人食其肉。多致藏寒或洩利。

【橙子皮】今人止以爲果。或取皮合湯待賓。未見入藥。宿酒未醒。食之速醒。

【梅實】食梅則津液泄。水生木也。津液泄。故傷齒腎屬水外無齒故也。王叔和曰。膀胱腎合爲津液。此語雖鄙。然理存焉。燻之爲烏梅。曝乾藏密器中爲白梅。

【枇杷葉】江東西、湖南北、二川、皆有之。以其形如琵琶。故名之。治肺熱嗽有功。花白、最先春也。子大如彈丸。四五月熟。色若黃杏。微有毛。肉韌。性亦平。與葉不同。有婦人患肺熱、久嗽、身如炙。肌瘦將成肺。數以枇杷葉、木通、款冬花、紫菀、杏仁、桑白皮、各等分。大黃減半。各如常製。治訖。同爲末。蜜丸。如櫻桃大。食後夜臥。

各嚥化一丸。未終劑而愈。

【柿】有青蒸柿。於蓐下別生一重。又牛心柿。如牛之心。蒸餅柿。如今之市賣蒸餅。華州有一等朱柿。比諸品中最小。深紅色。又一種瑞柿。亦大於諸柿。性皆涼。不至大寒。食之引痰。極甘。故如是。去皮、掛大木梁上。使風日中自乾。食之多動風火。乾者味不佳。生則澀。以溫水發之。需澀去可食。速至自然紅爛。澀亦自去。乾則性平。

【木賊】得木之正。故入筋。以鉛霜塗之。則失醋味。受金之制。故如是。今人多取西京大木瓜爲佳。其味和美。至熟止。青白色。入藥。絕有功。勝宣州者味淡。此物入肝。故益筋。與血病。腰腎脚膝無力。此物不可闕也。

【甘蔗】今川廣、湖南北、二浙、江東西、皆有。自八九月已堪食。收至三四月。方酸壞。石蜜、沙糖、糖霜、皆自此出。惟川浙者爲勝。

【石蜜】川浙最佳。其味厚。其他次之。煎煉成。以鍮象物。遠京都。至夏月。及久陰雨。多自消化。土人先以竹葉及紙裹。外用石灰塊之。仍不得見風。遂免。今人謂乳糖。其作餅。黃白色者。今人又謂之搶糖。易消化。入藥至少。

【沙糖】又次石蜜。蔗汁清。故費煎煉。致紫黑色。治心肺大腸熱。兼噦。駝馬。今醫家治暴熱。多以此物爲先導。小兒多食則損齒。土制水也。及生蚛蟲。裸蟲屬土。故因甘遂生。

【芋】所在有之。江浙二川者。最大而長。京洛者。差圓小。而惟東西京者佳。他處味不及也。當心出苗者爲芋頭。四邊附芋頭而生者。爲芋子。八九月已後。可食。至時掘出。做十數日。却以好土勻埋。至春猶好。生則芋而涎。多食。滯氣困脾。唐杜甫詩曰。園收芋栗不全貧者是此。以梗蘇蜂螫處愈。

【烏芋】今人謂之芻臍。皮厚。色黑。肉硬白者。謂之猪芻臍。皮薄澤。色淡紫。肉軟者。謂之羊芻臍。正二月人採食之。此二等。藥罕用。荒歲。人多採以充糧。

【荔枝】藥品中。今未見用。惟崔元亮方中。收之。果實中爲上品。多食。亦令人發虛熱。此物喜雙。實尤可愛。宋朝有蔡君謨荔枝譜。其說甚詳。唐杜牧詩云。一騎紅塵妃子笑。無人知是荔枝來。此是用蜀荔枝。亦可生啖之。長安也。以核煖火中。燒。存性爲末。新酒調。一枚。末服。治心痛及小腸氣。

【杏核仁】犬傷人。益所傷大小。爛嚼沃破處。以帛繫定。至差。無苦。又湯去皮。研一升。以水一升半。飜覆絞取稠汁。入生蜜四兩。甘草一莖。約一錢。銀石器中。煖火熬成稀膏。盛器盛。食後夜臥。入少酥。沸湯點一匙匕服。治肺燥嗽。大腸秘。潤澤五藏。如無上證。更入鹽點。尤佳。

【杏實】本經別無治療。曰華子言多食傷神。有數種皆熱。小兒尤不可食。多致瘡癰。及上膈熱。應蜜爲乾果。其深赭色。核大而褐者。爲金杏。此等須接。其他皆不遠也。如山杏。雖只可收仁。又有白杏。至熟。色黃白。或微黃。其味甘淡而不酸。

【桃核仁】桃品亦多。京畿有白桃。光小於衆桃。不益脾。有赤點斑。而光如塗油。山中一種。正是月令中桃始華者。但花多子少。不堪噍。惟堪取仁。唐文選謂山桃發紅萼者是矣。又太原有金桃。色深黃。西京有崑

畜桃。肉深紫紅色。此二種尤甘。又餅子桃。如今之香餅子。如此數種。入藥惟以山中自生者爲正。蓋取走泄爲用。不取肥好者。如偽寒八九日間。發熱如狂不解。小腹滿痛。有瘀血。用桃仁三十箇。湯去皮尖。麩炒。赤色。別研。蜜丸三十枚。去麩。水蛭二十枚。各炒。川大黃一兩。同爲末。再與桃仁同擣。令勻。煉蜜丸如小豆大。每服二十丸。桃仁湯下。利下瘀血惡物。便愈。未利再服。

【獼猴桃】今永興軍南山甚多。食之。解酒熱。過多則令人藏寒洩。十月。爛熟。色淡綠。生則極酸。子繁細。其色如芥子。枝條柔弱。高二三丈。多附木而生。沒山傍道。則有存者。深山則多爲猴所食。

【胡桃】發風。陝洛之間甚多。外有青皮包之。胡桃乃核也。核中穰爲胡桃肉。雖如此說。用時。須以湯剝去肉上薄皮。過夏至則不堪食。有人患酒齄風。鼻上赤。將橘子核微炒爲末。每用一錢匕。研胡桃肉一箇。同以溫酒調服。以知爲度。

【李核仁】其窟大者高及丈。今醫家少用。實合漿水食。令人霍亂。澀氣而然。今畿內小窟鎮一種。最佳。堪入實。又有御李子。如櫻桃許大。紅黃色。先諸李熟。此李品甚多。然天下皆有之。所以比賢士大夫。蘇德及天下者。如桃李。無處不芬芳也。別本注云。有野李。味苦。名郁李子。取仁入藥。此自是郁李仁。別是一種。本部第十四卷。非野李也。

【梨】多食則動脾。少則不及病。用梨之意。須當斟酌。惟病酒煩渴人食之甚佳。終不能却疾。

【蓮藕果】西洛甚多。亦梨之類也。其狀亦梨。先諸梨熟。七夕前後已堪噉。色黃如鴨梨。纔熟便綠軟。入藥。絕稀用。

【安石榴】有酸淡兩種。旋開單葉花。旋結實。實中子紅。孫枝甚多。秋後經雨。則自坼裂。道家謂之三尸酒。云三尸得此果則醉。河陰縣最多。又有一種。子白。瑩徹如水晶者。味亦甘。謂之水晶石榴。惟酸石榴皮。合斷下藥。仍須老本所結。及收之陳久者。佳。微炙爲末。以煉蜜米飯爲丸梧子大。食前熟米飲下三十至五十丸。以知爲度。如塞滯。加附子赤石脂各一倍。

【橄欖】味澀。食久則甘。嚼汁嚥。治魚鯁。

【溫棒】食之。須削去上浮毛。不爾損人肺。花亦香。白色。諸果中惟此多生蟲。少有不蛀者。圖經言。欲臥。嚙一兩枚而寢。如此。恐太多。寒冒脘。

本草衍義卷之十九

【白瓜子】實。多瓜仁也。服食中亦稀用。

【白冬瓜】一二斗許大。冬月收爲菜。壓去汁。蜜煎。代果。忠發背及一切癰疽。削一大塊置瘡上。熱則易之。分散熱毒氣甚良。

【瓜蔕】此即甜瓜蔕也。去瓜皮。用蔕。約半寸許。曝極乾。不限多少。爲細末。益疾。每用一二錢匕。膩粉一錢匕。以水半合。同調勻。嚥之。治風涎。發作氣塞倒臥。服之。良久。涎自出。或覺有涎。用藥行化不下。但如此服。涎即出。或服藥良久。涎未出。含沙糖一塊。下咽。即涎出。此物甚不損人。全勝石碌硇砂輩。

【甜瓜】著月服之。永不中暑氣。多食未有不下利者。貧下多食。至深秋作痢。爲難治。爲其消損陽氣故也。亦可以如白冬瓜煎蜜收。

【冬葵子】葵菜子也。四方皆有。苦性滑利。不益人。患癰癤毒熱內攻。未出膿者。水吞三五枚。遂作瘡。膿出。

【蜀葵】四時取紅單葉者。根陰乾。治帶下排膿血惡物。極有驗。

【黃蜀葵花】與蜀葵別種。非爲。蜀葵中黃者也。葉心下有紫檀色。摘之。碎爲數處。就日乾之。不爾。即浥爛。婦家爲要藥。子臨產時。取四十九粒。研爛。用溫水調服。良久。產。

【莧實】入藥亦稀。苗又謂之人莧。人多食之。莖高。而葉紅黃二色者。謂之紅人莧。可淹菜用。

【苦菜】四方皆有，在北道則冬方彫瘁，生南方則冬夏常青，此月令小滿節後，所謂苦菜秀者是此。葉如苦蕒，更狹，其綠色差淡，折之白乳汁出，常常點瘊子自落。味苦，花與野菊相似，春夏秋皆旋開，花去中熱，安心神。

【萵苣】今菜中惟此自初生便堪生噉，四方皆有，多食昏人眼，蛇亦畏之，蟲入耳，以汁滴耳中，蟲出。諸蟲不敢食其葉，以其心留耳中，留蟲出路，蟲亦出。有人自長立禁此一物不敢食，至老目不昏。苦苣搗汁，傅丁瘡殊驗，青苗陰乾，以備冬月，爲末，水調傅，亦可。

【蕪菁】【蘆菔】二菜也。蘆菔，卽蘿蔔也。蕪菁，今俗俗謂之蔓菁。夏則枯，當此之時，蔬圃中復種之，謂之雞毛菜，食心正在春時。諸菜之中，有益無損，於世有功。採擷之餘，收子爲油，根過食動氣，河東太原所出極大，他處不及也。又出吐谷渾，後於菜菔條中，爾雅釋，但名蘆菔，今謂之蘿蔔，是也。則蕪菁條中，不合更言及蘆菔二字，顯見重復，從爾雅爲正。

【菜菔根】卽前條所謂蘆菔，今人止謂之蘿蔔。河北甚多，登萊亦好，服地黃何首烏人食之，則令人髭髮白，世皆言草木中，惟此下氣速者，爲其辛也，不然如生薑芥子又辛也，何止能散而已，菜菔辛而又甘，故能散氣，而又下氣速也。散氣用生，蓋下氣用菜菔。

【菘菜】張仲景傷寒論，凡用甘草，皆禁菘菜者是此。菘菜也，葉如蕪菁，綠色差淡，其味微苦，葉嫩，稍闊，不益中，虛人食之凝冷。

【芥】似蕪菁，葉上紋皺起，色尤深綠爲異。子與苗皆辛，子尤甚，多食動風，一品紫芥，與此無異，紫色可愛，人多食之，然亦動風。又白芥子，比諸芥稍大，其色白，入藥用。

【苜蓿】唐李白詩云：大馬常咆苜蓿花，是此。陝西甚多，飼牛馬，嫩時，人兼食之，微甘淡，不可多食，利大小腸，有宿根，刈訖又生。

【蔘實】卽神農本經第十一卷中，水蔘之子也。彼言蔘則用莖，此言實，卽用子，故此復論，子之功，故分爲二條。春初以葫蘆盛水浸漬，高掛於火上，晝夜使煖，遂生紅芽，取以爲蔬，以備五辛盤。又一種，水紅，與此相類，但苗莖高及丈，取子，微炒，碾爲細末，薄酒調二三錢，服，治瘧瘧，久則效，效則已。

【葱實】葱初生名葱針，至夏則有花，於秋月植，作高溝壠，旋壅起，以備冬用，曰冬葱。其實一也，又有龍角葱，每莖上出歧如角，皮赤者，名樓葱，可煎湯洗下部，子皆辛，色黑，有皺紋，作三瓣，此物大底以發散爲功，多食昏人神。

【薤】葉如金燈葉，差闊，而更光，故古人言薤露者，以其光滑難竚之義。千金治肺氣喘急，用薤白，亦取其滑泄也，與蜜同搗，塗湯火傷，效甚速。

【韭】春食則香，夏食則臭，多食則昏神，子止精滑，甚良。未出糞土爲韭黃，最不益人，食之卽滯氣，蓋啥噎鬱未之氣，故如是。孔子曰不時不食，正爲此。藿花食之動風。

【白蓮荷】八九月間，淹漬之以備冬月，作蔬果，治療只用生者。

【蘇】此紫蘇也，背面皆紫者佳，其味微辛甘，能散其氣，香。今人朝暮湯其汁飲，爲無益，醫家以謂芳草，致豪貴之疾者，此有一焉，脾胃塞人，飲之多泄滑，往往不覺。子治肺氣喘急。

【水蘇】氣味與紫蘇不同，辛而不和，然一如蘇，但面不紫，及周圍樓牙如鴈齒，香少。

【假蘇】荊芥也，只用穗，治產後血暈及中風，目帶上，四肢強直，爲末，二三錢，煎子小便一小盞，調下嚥，良久卽活，甚有驗。又治頭目風，荊芥穗，細辛，川芎等爲末，飯後湯點二錢，風搔遍身，濃煎湯淋漬，或坐湯中。

【香薷】生山野，荊湖南北二川皆有，兩京作園種，暑月亦作蔬菜，治霍亂，不可闕也，用之無不效，葉如苗，蘇花，茸紫，在一邊成穗，凡四五十房，爲一穗，如荊芥穗，別是一種香，餘如經。

【湖荷】世謂之南薄荷，爲有一種龍腦薄荷，故言南以別之，小兒驚風壯熱，須此引藥，猶食之卽醉，物相感爾，治骨蒸熱勞，用其汁與衆藥熬爲膏。

【鼠尾】音鱔，雞腸草，一物也，今雖分之爲二，其雞腸草條中，獨不言性味，故知一物也。雞腸草，春開小花如蔊豆大，莖葉如園葵，初生則直，長大卽覆地，小戶收之爲齋食之，烏髭髮。

【茄】大蒜也，其氣極臭，然能臭肉中，掩臭氣，中暑毒人，爛嚼三兩瓣，以溫水送之，下嚥，卽知，仍禁飲冷水，又忠恕下血，以茄五七枚，去梗皮，量多少入豆豉，搗爲膏，可丸卽丸梧子大，以米飲下五六十丸，無不愈者，人鼻齆爛，研一顆，塗兩足心下，縫止，便拭去，又辦紫皮者，橫切作片子，厚一分，初患瘡發於背脇間，未辨癰疽者，若陽潛於陰，卽爲癰，陰潛於陽，卽爲疽，癰卽皮光赤，疽卽皮肉紋起不澤，並以茄片覆之，用艾灸，如已痛，灸之不痛，如不痛，灸至痛，初覺，卽便灸，無不效者，仍審度正，於中心貼茄，灸之，世人往往不晤此術，初見其術小，不肯灸，惜哉。

【蒜】小蒜也，又謂之蔥，苗如葱針，根白末者如烏芋，子兼根食之，又謂之宅蒜，華佗用蒜齏，是此物。

【芸薹】不甚香，經冬根不死，辟蠹，於諸菜中，亦不甚佳。

【茄子】新羅國出一種，淡光微紫色，形長味甘，今其子已逼中國蔬圃中，惟此無益，並無所治，止說損人。後人雖有處治之法，然終與本經相失，圃人又植於暖處，厚加糞壤，遂於小滿前後，求貴價以售，既不以時，損人益多，不時不食，烏可忽也。

【馬齒莧】人多食之，然性寒滑，青黛條中已詳。

本草衍義卷之二十

【胡麻】諸家之說參差不一。正是今脂麻。更無他義。蓋其種出於大宛。故言胡麻。今胡地所出者。皆肥大。其紋黝。其色紫黑。故如此區別。取油亦多。故詩云。松下作胡麻。此乃是所食之穀無疑。與白油麻爲一等。如川大黃。川當歸。川升麻上蜀人參。齊州半夏之類。不可與他土者更爲一物。蓋特以其地之所宜立名也。是知胡麻與白油麻爲一物。昔官於順安軍雄霸州之間。備見之。又二條皆言無毒。治療大同。今之用白油麻世不可一日闕也。然亦不至於大寒。宜兩密之。

【青蘇】音稣。即油麻葉也。陶隱居注。亦曰胡麻葉也。胡脂麻黝色。子頗大。日華子云。葉作湯沐。潤毛髮。乃是今人所取胡麻葉。以湯浸之。良久。涎出。湯遂稠黃色。婦人用之梳髮。由是言之。胡麻與白油麻。今之所謂脂麻者是矣。青蘇即其葉無疑。

【大麻子】海東來者最勝。大如蓮實。出毛羅島。其次出上郡北地。大如豆。南地者子小。去殼法。取麻子帛包之。沸湯中浸。湯冷出之。垂井中一夜。勿令着水。次日日中曝乾。就新瓦上揉去殼。簸揚取仁。粒粒皆完。張仲景麻仁丸。是用此大麻子。

【白油麻】與胡麻一等。但以其色言之。比胡麻差淡。亦不全白。今人止謂之脂麻。前條已具。炒熟。乘熱壓出油。而謂之生油。但可點照。須再煎煉。方謂之熟油。始可食。復不中點照。亦一異也。如鐵自火中出。而謂之生鐵。亦此義耳。

【飴糖】即糖是也。多食動脾風。今醫家用以和藥。糯與粟米作者佳。餘不堪用。獨黍米亦可造。不思食人少食之。亦使脾胃氣和。唐白樂天詩。一榛較牙糖者是此。

【生大豆】有綠褐黑三種。亦有大小兩等。其大者出江浙湖南北。黑小者生他處。今用小者。力更佳。炒熟。以蛤肉同擣之。爲麴。代糟又治產後百病。血熱。并中風疾痺。止痛。背強口噤。但煩熱頭疼。若渴。身背腫脹。嘔噦。大豆五升。急水淘淨。無灰酒一斗。熬豆令微煙出。傾入酒抵中。沃之。經一日已上。服酒一升。取差爲度。如藥不飲酒。即量多少服。若口噤。即加獨活半斤。微微椎破。同沃。仍增酒至一斗二升。若月旋作。恐酸壞。又可磨爲腐食之。

【赤小豆】食之行小便。久則虛人。令人黑、瘦枯燥。關西湖北。京東西多食之。花治宿酒。渴病。

【大麥】性平涼。有人患嘔噦風。食不能下。將此麴作稀糊。令嚥之。既滑膩。容易下嚥。以助胃氣。三伏中朝廷作麴。以賜臣下。作蘖造糵。

【青黃白蘖米】此三種。食之不及黃蘖。青白二種。性皆微涼。獨黃蘖性甘平。豈非得土之中和氣多邪。今黃白二種。西洛田農家多種爲餘。尤佳。餘用則不相宜。然其粒尖小於他穀。收實少。故能種者亦稀。白色者味淡。

【粟米】利小便。故益脾胃。

【丹黍米】黍皮赤。其米黃。惟可爲糜。不堪爲餘。黏着難解。然亦動風。

【蘖米】此則粟蘖也。今穀神散中用之。性又溫於大麥。

【秫米】初搗出。淡黃白色。經久。色如糯。或作酒者是此。米亦不堪爲餘。最黏。故宜酒。

【陳糜米】今經典諸家注說。皆不言是秫米。爲復是粟米。然秫粟二米。陳者性皆冷。頗食之。令人自利。與經所說稻屋。煎煮亦無膏膩。入藥者。今人多用新粟米。至如舂杵頭細糠。又復不言新陳秫粟。然皆不及新稻粟二糟陳。則氣味已腐敗。

【酒】呂氏春秋曰。儀狄造酒。戰國策曰。帝女儀狄造酒。進之於禹。然本草中已著酒名。信非儀狄明矣。又讀者問首言以妄爲常。以酒爲漿。如此則酒自黃帝始。非儀狄也。古方用酒。有醇酒。春酒。社壇。餘糟酒。糟下酒。白酒。菁酒。好酒。美酒。葡萄酒。秫黍酒。秫酒。蜜酒。有灰酒。新熟。無灰酒。地黃酒。今有糯酒煮酒。小豆麴酒。香藥麴酒。鹿頭酒。羔兒等酒。今江浙湖南北。又以糯米粉入衆藥。和合爲麴。曰餅子酒。至於官務中。亦用四夷酒。更別中國不可取以爲法。今醫家所用酒。正宜斟酌。但飲家惟取其味。不顧入藥如何爾。然久之未見。不作疾者。蓋此物損益兼行。可不謹歟。漢賜丞相上樽酒。糯爲上。稷爲中。粟爲下者。今入藥佐使。專以糯米。用清水白麴。麴。所造爲正。古人造麴。未見入諸藥。今和者。如此。則功力和厚。皆勝餘酒。今人又以麥蘖造者。蓋止是醴爾。非酒也。書曰。若作酒醴。爾惟麴蘖。酒則須用麴。醴故用蘖。蓋酒與醴。其氣味甚

相遂治療豈不殊也。

【蕎豆】有黑白鵲三等。皆於豆莖有白路白者。治霍亂筋轉。

【粳米】白晚米爲第一早熟。米不及也。平和五藏。補益胃氣。其功莫逮。然稍生則復不益脾。過熟則佳。

【稻米】今造酒者是此。水田米皆謂之稻。前既言粳米。卽此稻米。乃糯稻無疑。蓋故可以爲酒。酒爲陽。故多熱。又令人大便堅。非糯稻孰能與於此。西域記。天竺國土溽熱。稻歲四熟。亦可驗矣。

【稷米】今謂之穄米。先諸米熟。又其香可愛。故取以供祭祀。然發故疾。只堪爲飯。不黏着。其味淡。

【罌子粟】其花亦有多葉者。其子一罌數千萬粒。大小如葶藶子。其色白。隔年種則佳。研子。以水煎。仍加蜜爲罌粟湯。服石人甚宜飲。

【醋】酒糟爲之。乞鄰者是此物。然有米醋。麥醋。粟醋。米醋。最釀。入藥多用。穀氣全也。故勝糟醋。產婦房中常得醋氣則爲佳。酸益血也。雞雄黃塗蜂螫。亦取其收而不散也。今人食酸則齒軟。謂其水生木。水氣弱。木氣盛。故如是。造鞋皮須得此而紋縮。故知其性收斂。不負酸收之說。

【醬】聖人以謂不得鹽不食。蓋欲五味和。五藏悅而受之。此亦安樂之一端。

【小麥】暴淋煎湯飲。爲麵作糊。入藥。水調。治人中暑。鼻病肺。卒熱。亦以水調濃塗。生嚙成筋。可以黏禽獸。

防風甘 純陽太陽經本藥 身去上風 稍去下風與
乾姜 藜蘆 白斂 芫花相反
藁本辛 純陽少陽本藥治 頭痛 頭痛
細辛辛 純陽主少陰苦頭痛
白芷辛 純陽陽明經本藥去達治 正陽陽明頭痛
黃芩苦 陰中微陽酒炒上頭主上部積血
東垣曰泄肺火而解肌 熱肺苦氣急食苦以泄之
甘草生甘平炙甘溫 純陽補血養胃 稍去腎經之痛與 遠志
大戟 芫花 甘遂 海藻相反
當歸 陽中微陰 頭破血 身行血 尾止血
治上酒浸 治外酒洗 糖色大辛可能潰堅與
蒲黃 海藻相反
連翹苦平 陰中微陽諸客熱非此不能除
又治手足少陽瘰癧腫
黃連苦 純陰瀉心火心下痞酒炒酒浸上頭已上與
芫花 菊花 獨蒜 欵花相反
蒼朮甘辛 陽中微陰諸腫溫非此不能除
足陽明太陰能建胃安脾
苦酒甘苦 純陽太陽經頭痛去諸骨節疼痛非此不能除亦
能溫膽太陽風藥也
白朮甘苦 陽中微陰脾苦溫急食苦以燥之 又利腰脅間
血與蒼朮同用 海云蒼白有止發之異
生地黃甘寒 陰中微陽涼血補 不足血治頭已上酒浸熨

潔古老人珍珠囊

李杲

月母 蘇葉相反
白芍藥甘酸 陰中之陽曰補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經止中
部腹痛與 石斛 硝石相反
人參甘苦 陽中微陰養血補胃氣瀉心火喘嗽勿用之類氣
用之與 蘇葉相反
柴胡苦 陰中之陽去往來寒熱膽痺非此胡稍不能除
與皂莢 蘇葉相反 少陽厥陰行經藥也
黃耆甘 純陽益胃氣去肌熱止自汗諸痛用之與
鱉甲相反
葛根甘 純陽止渴升陽解酒毒陽明經之本藥也
澤瀉甘 陰中微陽滲泄止渴泄伏水
升麻甘苦 陽中微陰主脾胃解肌肉間熱脾痺非升麻稍不
能除手足陽明傷風引用之的藥也
半夏苦辛 陰中之陽除痰涎胃中寒痰治太陽痰厥頭痛與
烏羊血 鱉甲 皂莢 雄黃相反
桔梗辛苦 陽中之陰除咽喉痛利肺氣治與寒為舟楫之劑
與草龍膽相反
蔓荊子辛苦 陰中之陽涼諸經血止頭痛主目睛內痛與
石膏相反
枳殼苦酸 陰中微陽破氣泄肺中不利之急
枳實苦酸 純陰去胃中溫熱消心下痞
厚朴苦 陰中之陽去腹脹厚腸胃
梔子苦 純陰去心懊憹煩燥
橘皮苦辛 陰中之陽利肺氣有甘則補無則瀉脾活人治噦
五味子酸 陰中微陽治嗽補真氣與 歲藥 烏頭相反
知母苦 陰中微陽涼腎經本藥上頭行經酒炒
乾姜辛 純陽經曰寒淫所盛以辛散之見火後稍苦故止
而不走也
麻黃苦甘 陰中之陽泄衛中實去榮中寒發太陽少陰之汗
入手太陰
藁本辛苦 陽中微陰去太陽經本藥治巔頂痛腦齒痛與
青箱子相反
地榆苦酸甘 陽中微陰治下部有血與 麥門冬相反
大黃苦 純陰熱淫所盛以苦泄之 酒浸入太陽經 酒
洗入陽明經 其餘經不用酒 其性走而不守
獨活甘苦 陰中之陽頭眩目運非此不能除足少陰行經藥

吳茱萸辛 陽中微陰溫中下氣腹痛溫胃與 丹參 硝石
五石英相反
郁李仁苦辛 陰中之陽破血潤燥
豉苦鹹 純陰去心中懊憹傷寒頭痛煩躁
黃蘗苦辛 陰中之陽治腎水膀胱不足諸痿厥腳膝無力
防葵辛苦 陽中之陰泄濕氣與 細辛相反
川芎辛 純陽去寒濕風痺血痺行經與
半夏 瓜蔞相反 附子同
瞿麥辛 陽中微陰利小便為君
秦粘子辛 純陽潤肺散氣主風毒腫利咽膈
白蒺藜辛 純陽散肺中滯氣主積冷氣止吐逆反胃消穀進
食
麥門冬甘 陽中微陰治肺中伏火生脉保神強陰益精與
苦參相反
茯苓甘淡 純陽滲泄止渴伐腎邪小便多則能止之澀則能
利之白入辛壬癸赤入丙與 白斂 地榆相反
熟地黃甘苦 陰中微陽大補血虛不足通血脉益氣力忌蘿蔔
阿膠甘 純陽補肺補虛安胎止痢
蘇木甘鹹 陽中之陰破死血及血脹欲死
猪苓甘苦 陽中之陰滲泄止渴 又治淋腫
肉桂甘辛 純陽太陽經本藥去衛中風邪秋冬下部腹痛非
桂不能除 湯液發汗用桂枝補腎用肉桂 忌
生葱
草龍膽苦 純陰瀉肝熱止眼睛疼 酒浸上行
木香辛 純陽和胃氣 療中下焦氣結滯刺痛須用檳榔
為使
石膏辛甘 陰中之陽止陽明頭痛止消渴中暑潮熱
甘遂甘 純陽水結胃中非此不能除與 甘草相反
天南星苦 與半夏同
金鈴子酸苦 陰中之陽心暴痛非此不能除
神麯辛 純陽益胃氣
紅藍花苦 陰中微陽入心養血 又治血運惡血不盡絞痛
地骨皮苦 純陰涼骨熱酒浸解骨蒸非此不能除
瓜蔞根苦 純陰心中枯渴非此不能除與 乾姜半夏相反
秦艽苦 陰中微陽去陽明經風濕痺仍治口瘡毒
通草甘 純陽瀉肺利小便通陰竅澁

牡丹皮辛苦 陰中微陽涼骨蒸 又治腸胃積血衄血吐血手厥陰足少陰治無汗骨蒸也 地骨皮手少陽足少陰治有汗骨蒸也

琥珀甘 純陽利小便清肺 又消瘀血 安魂魄

萱黃辛

牡礪鹹 耎痞積 又治帶下溫瘧瘡腫爲要經取濕之劑

梧桐淚鹹 治瘧瘧非此不能除

草蔻辛 純陽益脾胃去寒 又治客寒心胃痛

巴豆辛 純陽去胃中濕破癥瘕結聚 斬關奪門之將不可輕用

茯神甘 純陽療風眩心虛非此不能除

蜀葵花 陰中微陽治帶下 赤治赤 白治白

檳榔辛 純陽破氣滯泄胃中至高之氣

苦參苦 純陰氣沉去濕與 兎絲子相反

薷香甘苦 純陽微陰補衛氣益胃氣進飲食 又治吐逆霍亂

青皮辛苦 陰中之陽主氣滯破積結少陽經下藥也 陳皮治高 青皮治低

甘菊花苦 純陽養目血

商陸苦甘 陰中微陽治傷寒散黃

丁香辛 純陽去胃中之實 又治腎氣奔豚痛

大棗甘 純陽溫胃

天門冬甘苦 陽中之陰保肺氣治血熱侵肺上喘氣促

生薑辛 純陽益脾胃散風寒

蔚金辛苦 陰中微陽涼心

京三稜甘苦 陰中之陽破氣瀉真氣主老癖癥瘕氣結塊血脉不調氣虛者不用

高良薑辛 純陽溫通脾胃

款冬花辛甘 純陽溫脾止嗽

香附子甘苦 陽中之陰快氣

果附子辛 純陽治脾中大實腎中寒甚通行諸經與防風相反

白芨苦甘 陽中之陰止肺澀 白歛同

蜀膝辛 純陽破血

射干苦甘 陽中之陰去胃中癰瘡

嚴冬仙甘 純陽去風去大腸之風通十二經絡

馬兜冬苦 陰中微陽利小便主肺熱安肺氣補肺

燈草甘 純陽利小便

葫芦芭苦 純陰治元氣虛冷及腎虛冷

白附子辛苦 純陽溫中血痺行藥勢主中風失音 乃行而不止者也

槐花苦 純陽涼大腸之熱

槐實苦 同上

沉香甘 純陽補腎又能去惡氣調中 東垣曰能養諸氣上而至天下而又衆與藥爲使

檀香甘苦 陽中微陰主心腹霍亂中惡引胃氣上升進食

乳香甘 純陰定經之痛

川楝子甘 純陽入心主上下部腹痛

竹葉苦 陰中微陽涼心經

山茱萸酸 陰中之陽溫肝又能強陰益精 經云滑則氣脫濇則可以收之山茱萸之澁以收其滑

蜀椒辛 純陽明目 又溫中止精洩

朱砂苦 純陰涼心熱非此不能除

龍骨甘 純陽固大腸脫

赤石脂甘酸 陽中之陰固脫 白石脂同

芎藭辛 純陽散諸經之風

茜根苦 陰中微陽去諸死血

艾葉苦 陰中之陽溫胃

王不留行甘苦 陽中之陰妳子導引利瘡瘍主治痢 苦寒以爲君

黃芩去心 黃連去須 黃蘗去皮 知母去須

生地黃 但用酒洗過用之以酒熱爲因也

甘寒以爲佐 黃耆 人參 甘草

大辛以解結爲臣 結者散之 連翹 當歸去芦 葉本

通經以爲使 手之三陽手走頭而頭走足足之三陰足走腹而腹走手

足太陽膀胱經 羌活 葉本

足少陽膽經 柴胡

足陽明胃經 升麻 葛根 白正

足太陰脾經 芍藥 白者補 赤破經

足少陰腎經 獨活 桂

足厥陰肝經 柴胡

手太陽小腸經 羌活 葉本

手少陽三焦經 柴胡

手陽明大腸經 白正 升麻 加葱白亦能走經

手太陰肺經 白正 獨活

手少陰心經 柴胡

手厥陰心包絡 當歸梢 蘇木 紅花

辛溫活血去惡血 牡丹皮 專治胃流血疼血 必先歲氣無伐天和

春防風 升麻 夏黃芩 知母 白芍藥

秋澤瀉 茯苓 冬桂 桂枝

補胃實胃進飲食 橘皮 人參 甘草

內實內熱者 黃連 黃蘗 知母

表虛表寒者 黃耆 人參 桂枝內發在外

氣虛氣弱者 陳皮 黃耆 人參入脾

氣實氣結者 青皮 厚朴 木香 沉香

血虛者 生地黃 當歸身

血實惡血積聚者 當歸梢 蘇木 紅花

散陰瘡之結聚排膿者 肉桂 入心引血化汗化膿

出瘡毒消瘡腫 桑粉子 用半生半熟鮮表裏 一名大力子 牛蒡子

瘡出膈已上須用防風上節 羌活 桔梗 此一味爲舟楫使諸藥不能下沉

瘡出身中已下須用酒水中半盞

瘡堅而不潰者 昆布 王瓜根 廣茂 京三稜

瘡痛甚者加用 黃芩 黃連 黃蘗 知母

十二經中但有瘡皆血結氣聚必用 連翹

瘡發而渴者加 葛根

瘡出而嘔吐者 半夏 薑膏

瘡出而渴悶者 黃連

瘡出而飲水者 澤瀉 茯苓

瘡出而大便不通者 煨大黃

大便結燥而難得者 桃仁 麻子仁 郁李仁

上焦有瘡者須用 黃芩酒洗

中焦有瘡須用 黃連酒洗

下焦有瘡須用 黃蘗 知母 防己俱酒洗

先有燥熱而病瘡者蓋胃火受邪當補腎水之不足

黄蘗　知母

因酒過多瘡出者當除膀胱留熱用　澤瀉　防風

瀉腎火補下焦元氣　生甘草稍子

補三焦元氣調和諸藥共力成功者　炙甘草

馬刀挾興須用　昆布　王瓜根　草龍膽

馬刀未破而堅者須用　廣茂　京三稜

地之濕氣濕寒傷之外發雍腫經絡不行外有大寒濕之邪而內必生大熱當以辛溫之藥及行木經藥通其皮毛雍滯內則苦寒之劑瀉其當氣之不從是其治也

病在上為天

製度宜炒酒洗　煎藥宜武宜清　服之宜緩飲

病在下為地　煎藥宜文宜濃　服之宜急飲

去咽嗌近者奇之　遠者偶之　汗不可奇　下不可偶

補上治上以緩緩者氣味薄能遠其表劑小服而頻食後使氣味能遠去表去上故曰治肺者九蓋欲少而頻者也

肺　氣　石膏辛　血　黄芩苦

腎　氣　知母　血　黄蘗

地骨皮　瀉腎火　總治熱在外　地為陰骨為裏皮為表

牡丹皮　治包火　無汗而骨蒸　四物內加上二味治婦人骨蒸

知母　瀉腎火　有汗而骨蒸

湯液本草

王好古集

湯液本草序

世有知醫問爲醫之祖而不知軒岐之書實出於神農本草也殷伊尹用本草爲湯液漢仲景廣湯液爲大法此醫家之正學雖後世之明哲有作皆不越此予集是書復以本草正條各從三陰三陽一二經爲例仍以主病者爲元首臣佐使應次之不必如編類者先玉石次草木次蟲魚以上中下三品爲門也如太陽經當用桂枝湯麻黃湯必以麻黃桂枝爲主本方中餘藥後附之如陽明經當用白虎湯必以石膏爲主本方中餘藥後附之如少陽經當用三禁湯必以柴胡爲主本方中餘藥後附之如太陰少陰厥陰之經所用熱藥皆倣諸此至於金匱祖方湯液外定爲常制凡可用者皆雜附之或以傷寒之劑改治雜病或以權宜之料更療常疾以湯爲散以散爲圓變易百端增一二味別作他名減一二味另爲殊法醫壘元戎陰證略例痃論萃英錢氏補遺等書安樂之法湯液本草統之其源出於潔古老人珍珠囊也其間議論出新意於法度之中註奇辭於理趣之外見聞一得久弊全更不特藥品之咸精抑亦疾病之不悞夭橫不至壽域可期其湯液本草歟

湯液本草上卷目錄
五臟苦欲補瀉藥味　臟腑瀉火藥
東垣先生藥類法象　藥性要旨
用藥法象
氣味厚薄寒熱陰陽升降圖
升降者天地之氣交　用藥升降浮沉補瀉法
五味所甲　藥類法象
標本陰陽論　五方之正氣味（制方用藥附）
東垣先生用藥心法
隨證治病藥品　用藥凡例
東垣報使　請經嚮導
製方之法　用藥各定分兩
用藥酒洗曬乾　用藥根梢身例
用圓散藥例　升合分兩
君臣佐使法　治法綱要
藥味專精　湯液煎造
古人服藥活法　古人服藥有法
察病輕重
海藏老人湯液本草
五宜　五傷
五走　服藥可慎
論藥所生
天地生物有厚薄堪用不堪用
氣味生成流布
十劑　七方

湯液本草卷上

江陰朱氏刊校本

元　趙州王好古類集

五臟苦欲補瀉藥味

肝苦急急食甘以緩之甘草欲散急食辛以散之川芎以辛補之細辛以酸瀉之芍藥虛以生薑陳皮之類補之經曰虛則補其母水能生木腎乃肝之母腎水也苦以補腎熟地黃黃蘗是也如無他證錢氏地黃丸主之實則白芍藥瀉之如無他證錢氏瀉青丸主之實則瀉其子心乃肝之子以甘草瀉之

心苦緩急食酸以收之五味子欲軟急食鹹以軟之芒硝以鹹補之澤瀉以甘瀉之人參黃芪甘草虛以炒鹽補之虛則補其母木能生火肝乃心之母肝木也以生姜補肝如無他證錢氏安神丸主之實則甘草瀉之如無他證錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤散

脾苦濕急食苦以燥之白术欲緩急食甘以緩之甘草以甘補之人參以苦瀉之黃連虛則以甘草大棗之類補之如無他證錢氏益黃散主之心乃脾之母以炒鹽補心實則以枳實瀉之如無他證以瀉黃散瀉之肺乃脾之子以桑白皮瀉肺

肺苦氣上逆急食苦以瀉之訶子皮一作黃芩欲收急食酸以收之白芍藥以辛瀉之桑白皮以酸補之五味子虛則五味子補之如無他證錢氏阿膠散補之

脾乃肺之母以甘草補脾實則桑白皮瀉之如無他證以瀉白散瀉之腎乃肺之子以澤瀉瀉之

腎苦燥急食辛以潤之知母黃蘗欲堅急食苦以堅之知母以苦補之黃蘗以鹹瀉之澤瀉虛則熟地黃黃蘗補之腎本無實不可瀉錢氏止有補腎地黃丸無瀉腎之藥肺乃腎之母以五味子補肺

以上五臟補瀉內經臟氣法時論中備言之欲究其精詳看本論

臟腑瀉火藥

黃連瀉心火　木通瀉小腸火

黃芩瀉肺火（梔子生之）　黃芩瀉大腸火

柴胡瀉肝火（黃連佐之）　柴胡瀉膽火（亦以黃連佐之）

白芍藥瀉脾火　石膏瀉胃火

知母瀉腎火　黃蘗瀉膀胱火

柴胡瀉三焦火（黃芩佐之）

以上諸藥各瀉其火不惟止能如此更有治病合爲君合爲臣處詳其所宜而用勿執一也

東垣先生藥類法象

用藥法象

天有陰陽

風寒暑濕燥火　三陰三陽上奉之

溫涼寒熱四氣是也溫熱者天之陽也涼寒者天之陰也此乃天之陰陽也

地有陰陽

金木水火土　生長化收藏下應之辛甘淡酸苦鹹五味是也皆象於地辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也此乃地之陰陽也

味之薄者爲陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也味之厚者爲陰中之陰味厚則泄酸苦鹹寒是也氣之厚者爲陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也氣之薄者爲陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平涼寒是也

輕清成象（味薄之類）　本乎天者親上

重濁成形（味厚之類）　本乎地者親下

氣味辛甘發散爲陽　酸苦湧泄爲陰

清陽發腠理　清之清者也

清陽實四肢　清之濁者也

濁陰歸六腑　濁之濁者也

濁陰走五臟　濁之清者也

藥性要旨

苦藥平升　微寒平亦升

甘辛藥平降　甘寒瀉火

苦甘寒瀉血熱

升降者天地之氣交

茯苓淡爲在天之陽也陽當上行何謂利水而泄下經云氣之薄者乃陽中之陰所以茯苓利水而泄下然而泄下亦不利乎陽之體故入手太陽麻黃苦爲在地之陰也陰當下行何謂發汗而升上經云味之薄者乃陰中之陽所以麻黃發汗而升上然而升上亦不利乎陰之體故入手太陰附子氣之厚者乃陽中之陽故經云發熱大黃味之厚者乃陰中之陰故經云泄下粥淡爲陽中之陰所以利小便茶苦爲陰中之陽所以清頭目

用藥升降浮沉補瀉法

肝膽 味辛補酸瀉 氣溫補涼瀉 所膽之經前後寒熱不同逆順 互換入求責法

心小腸 味鹹補甘瀉 氣熱補寒瀉 三焦命門補瀉同

脾胃 味甘補苦瀉 氣溫涼寒熱補瀉各從其宜 通腎互換入求責法

肺大腸 味酸補辛瀉 氣涼補溫瀉

腎膀胱 味苦補鹹瀉 氣寒補熱瀉

五臟更相平也一臟不平所勝平之此之謂也故云安穀則昌絕穀則亡水去則榮散穀消則衛亡榮散衛亡神無所居又仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脈道乃行故血不可不養衛不可不溫血溫衛和榮衛將行常有天命矣

五味所用

苦泄 甘緩 酸收 鹹軟

淡滲泄 辛散

藥類法象

風升生 味之薄者陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也

防風 純陽性溫味甘辛 升麻 氣平味微苦

羌活 氣微溫味苦甘平 葳靈仙 氣溫味苦

獨活 氣微溫味苦甘平 細辛 氣溫味大辛

白芷 氣溫味大辛 葉本 氣溫味大辛

蔓荊子 氣清味辛 川芎 氣溫味辛

秦艽 氣微溫味苦辛平 麻黃 氣溫味甘苦

前胡 氣微寒味苦 薄荷 氣溫味苦辛

熱浮長 氣之厚者陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也

黑附子 氣熱味大辛 烏頭 氣熱味大辛

柴胡 氣平味苦辛

葛根 氣平味甘

桔梗 氣微溫味甘辛

鼠粘子 氣平味辛

荆芥 氣溫味苦辛

天麻 氣平味苦

乾生薑 氣溫味辛

佳枝 氣熱味甘辛

厚樸 氣溫味辛

白豆蔻 氣熱味大辛

茴香 氣平味辛

紅藍花 氣溫味辛

濕化成 戊癸其本氣平其兼氣溫涼寒熱在人以胃應之脾應己土其本味鹹其兼味辛甘鹹苦在人以

黃芪 氣溫平味甘

人參 氣溫味甘

甘草 氣平味甘

良薑 氣熱味辛本味甘辛

草豆蔻 氣熱味大辛

丁香 氣溫味辛

木香 氣熱味苦辛

川芎 氣溫味大辛

延胡索 氣溫味辛

縮砂 氣溫味辛

肉桂 氣熱味大辛

乾薑 氣熱味大辛

燈心草 氣平味甘

天門冬 氣寒味微苦

犀角 氣寒味苦鹹

地骨皮 氣寒味苦

連翹 氣平味苦

寒沉藏 味之厚者陰中之陰味厚則泄酸苦鹹氣寒是也

大黃 氣寒味苦

黃連 氣寒味苦

生地黃 氣寒味苦

五味子 氣溫味酸

白芍藥 氣微寒味酸

烏梅 氣平味酸

枳殼 氣寒味苦

枳實 氣寒味苦酸

桑白皮 氣寒味苦酸

麥門冬 氣寒味微苦

牡丹皮 氣寒味苦

琥珀 氣平味甘

木通 氣平味甘

當歸 氣溫味辛一作味甘

白朮 氣溫味甘

青皮 氣溫味辛

萆薢 氣溫味甘

訶子 氣溫味苦

桃仁 氣溫味甘苦

燥降收 氣之薄者陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平寒涼是也

茯苓 氣平味甘

滑石 氣寒味甘

熟地黃 氣寒味苦

蒼朮 氣溫味甘

陳皮 氣溫味微苦

檳榔 氣溫味辛

阿膠 氣微溫味甘辛

杏仁 氣溫味甘苦

大麥蘖 氣溫味鹹

紫草 氣寒味苦

蘇木 氣平味甘鹹一作味酸

半夏 氣微寒味辛平

茯苓 氣平味甘

澤瀉 氣平味甘

猪苓 氣寒味甘

車前子 氣寒味甘

瞿麥 氣平味甘

臟腑經絡之標本也更人身之臟腑陰陽氣血經絡各有標本也以病論之先受病爲本後傳流病爲標凡治者必先治其本後治其標若先治其標後治其本邪氣滋甚其病益畜若先治其本後治其標雖病有十數證皆去矣謂如先生輕病後滋生重病亦先治輕病後治重病如是則邪氣乃伏蓋先治本故也若有中滿無問標本先治中滿謂其急也若中滿後有大小便不利亦無問標本先利大小便次治中滿謂尤急也除大小便不利及中滿三者之外皆治其本不可不慎也從前來者爲實邪從後來者爲虛邪此子能令母實母能令子虛是也治法云虛則補其母實則瀉其子假令肝受心火之邪是從前來者爲實邪當瀉其子火也然非直瀉其火十二經中各有金木水火土當木之分瀉其火也故標本論云本而標之先治其本後治其標既肝受火邪先於肝經五穴中瀉榮心行間穴是也後治其標者於心經五穴內瀉榮火少府穴是也以藥論之入肝經藥爲之引用瀉心火藥爲君是治實邪之病也假令肝受腎邪是從後來者爲虛邪虛則當補其母故標本論云標而本之先治其標後治其本既受水邪當先於腎經湧泉穴中補水是先治其標後於肝經曲泉穴中瀉水是後治其本此先治其標者推其至理亦是先治其本也以藥論之入腎經藥爲引用補肝經藥爲君是也

五方之正氣味 制方用藥附

東方甲風乙木其氣溫其味甘在人以肝膽應之

南方丙熱丁火其氣熱其味辛在人以心小腸三焦包絡應之

中央戊濕其本氣平其兼氣溫涼寒熱在人以胃應之

中央已土其本味鹹其兼味辛甘酸苦在人以脾應之

西方庚燥辛金其氣涼其味酸在人以肺大腸應之

北方壬寒癸水其氣寒其味苦在人以腎膀胱應之

人乃萬物中之一也獨陽不生獨陰不長須稟兩儀之氣而生化也聖人垂世立教不能渾說必當分析以至理而言則陰陽相附不相离其實一也呼則因陽出吸則隨陰入天以陽生陰長地以陽殺陰藏此上說止明補瀉用藥君之一也故曰主病者爲君用藥之機會要明醫清成象重濁成形木乎天者親上本乎地者親下則各從其類也清中清者清肺以助其天真清中濁者榮華腠理濁中清者榮養於神濁中濁者堅强骨髓故至真要大論云五味陰陽之用辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰淡味滲泄爲陽鹹味涌泄爲陰六者或收或散或緩或急或燥或潤或軟或堅各以所利而行之調其氣使之平也詳見本論

東垣先生用藥心法

隨證治病藥品

如頭痛須用川芎如不愈各加引經藥 太陽川芎 陽明白芷 少陽柴胡 太陰蒼朮 少陰細辛 厥陰吳茱萸

如頂巔痛須用藁本去川芎

如肢節痛須用羌活去風濕亦宜用之

如腹痛須用芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃蘗

如心下痞須用枳實黃連

如肌熱及去痰者須用黃芩肌熱亦用黃蘗

如腹脹用薑製厚樸一本有芍藥

如虛熱須用黃蘗止虛汗亦用

如脇下痛往來潮熱日晡潮熱須用柴胡

如脾胃受濕沉困無力怠惰好卧去痰用白朮

如破滯氣用枳殼高者用之失枳殼者損胸中至高之氣二三服而已

如破滯血用桃仁蘇木

如補血不足須用甘草

如去痰須用半夏熱痰加黃芩風痰加南星胸中寒痰痞塞用陳皮白朮多用則瀉脾胃

如腹中窄狹須用蒼朮

如調氣須用木香

如補氣須用人參

如和血須用當歸凡血受病者皆宜用當歸也

如去下焦濕腫及痛并膀胱有火邪者必須酒洗防已草龍膽黃蘗知母

如去上焦濕及熱須用黃芩瀉肺火故也

如去中焦濕與痛熱用黃連能瀉心火故也

如去滯氣用青皮勿多服多則瀉人眞氣
如渴者用乾葛伏苓禁半夏
如嗽者用五味子
如喘者用阿膠
如宿食不消須用黃連枳實
如胸中煩熱須用梔子仁
如水瀉須用白朮茯苓芍藥
如氣刺痛用枳殼看何部分以引經藥導使之行則可
如血刺痛用當歸詳上下用根梢
如瘡痛不可忍者用寒苦藥如黃蘗黃芩詳上下用根梢及引經藥則可
如眼痛不可忍者用黃連當歸身以酒浸煎
如小便黃者用黃蘗數者澁者或加澤瀉
如腹中實熱用大黃芒硝
如小腹痛用青皮
如莖中痛用生甘草梢
如驚悸恍惚用茯神
如飲水多致傷脾用白朮茯苓猪苓
如胃脘痛用草豆蔻
凡用純寒純熱藥必用甘草以緩其力也寒熱相雜亦用甘草調和其性也中滿者禁用經云中滿者勿食甘
用藥凡例
凡解利傷風以防風爲君甘草白朮爲佐經云辛甘發散爲陽風宜辛散防風味辛及治風通用故防風爲君甘草白朮爲佐
凡解利傷寒以甘草爲君防風白朮爲佐是寒宜甘發也或有別證於前隨證治病藥內選用分兩以君臣論
凡眼暴發赤腫以防風黃芩爲君以瀉火以黃連當歸身和血爲佐兼以各經藥用之
凡眼久病昏暗以熟地黃當歸身爲君以羌活防風爲臣甘草甘菊之類爲佐
凡病疾腹痛以白芍藥甘草爲君當歸白朮爲佐便血先後以三焦熱論
凡水瀉以茯苓白朮爲君芍藥甘草爲佐
凡諸風以防風爲君隨治病爲佐
凡嗽以五味子爲君有痰者以半夏佐之喘者以阿膠爲佐有熱無熱以黃芩爲佐但分兩多寡不同耳
凡小便不利黃蘗知母爲君茯苓澤瀉爲佐
凡下焦有濕草龍膽防已爲君甘草黃蘗爲佐
凡痔漏以蒼朮防風爲君甘草芍藥爲佐詳別證加減
凡諸瘡以黃連當歸爲君甘草黃芩爲佐
凡瘧以柴胡爲君隨所發時所屬經分用引經藥佐之
已上皆用藥之大要更詳別證於前隨證治病藥內逐旋加減用之

東垣報使

太陽	羌活	下黃蘗
陽明	白芷升麻	下石膏
少陽	柴胡	下青皮
太陰	白芍藥	
少陰	知母	
厥陰	青皮	柴胡

小腹膀胱屬太陽　藥本羌活是本方

三焦膽與肝包絡　少陽厥陰柴胡藥
陽明大腸兼足胃　葛根白芷升麻當
太陰肺脈中焦起　白芷升麻蔥白鄉
脾經少與肺經異　升麻芍藥白芍詳
少陰心經獨活主　腎經獨活加桂良
通經用此藥爲使　更有何病到當旨

經	導	藥
寅手太陰	圖	南星 款冬花 山藥 粳米 麥門冬 阿膠 桑白皮 麻黃 丁香 杏仁 蔥白 縮砂 稻蓋蔻爲使 梔子 知母 黃芩 石膏
	導	升麻 桔梗 檀香 皂莢 五味子 天冬
卯手太陽	圖	防風 當歸 草豆蔻 茱萸 益智 黃芪 代赭石 麥芩 升麻 白芷 麻仁 甘草 半夏 皂脂 縮砂 白石脂爲使 白豆蔻 石膏
巳足陽明	經	縮砂人參益智爲使 蒼朮 白朮 膠飴
	導	麻黃 大黃 連翹
	圖	皂莢 延胡索 縮砂
辰足胃	經	石膏 白朮
	導	皂莢
	圖	丁香 草豆蔻 縮砂 防 石膏 知母 白朮 神麯 葛根 烏藥 半夏 蒼朮 升麻 白芷 蔥白

三焦經 少陽經 膽導圖 足膽子 戊心胞手厥陰經 胃導圖 足肝丑 未小腸手太陽經 膀導圖 足膀胱 中

玄川芎 柴胡 青皮 白朮 熟黃 黃耆 地骨皮 石膏 細辛 附子

青皮 川芎 柴胡

半夏 藁本 柴胡

連翹 柴胡 青皮

沙參 白朮 柴胡 熟地黃 敗醬 牡丹皮

青皮 柴胡 熟地黃

藁莖荊子 阿膠 瞿麥 桃仁 甘草

柴胡 川芎 皂角 桃仁 甘草

白朮 生地黃 赤茯苓 羌活 赤石脂 縮砂 赤石脂爲使

防風 羌活 藁本 藁莖荊 茴香 黃蘗

藁莖荊子 滑石 茵陳 猪苓 澤瀉 桂枝 黃蘗 羌活 麻黃

白朮 澤瀉 防己 黃蘗 藁本 羌活 羌活 下 黃蘗

午心手少陰經 膽導圖 足腎右 酉 腎附

麻黃 桂心 當歸 生地黃 黃連 代赭 紫菀 梔子 獨活 赤茯苓

細辛 熟地黃 五味子 澤瀉

知母 黃蘗 地骨皮 阿膠 猪膚 牡丹皮 玄參 敗醬 牡蠣 烏藥 茵冬 猪苓 澤瀉 附子 茯苓 知母 茱萸 益智 白朮

丹皮 茵冬 甘草 茱萸 玄味子

獨活 或用桂枝 或用硝 或用縮砂 赤石脂 代赤石脂

附子 沉香 益智 黃耆

製方之法

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味各有所能不可不通也藥之氣味不比同時之物味皆鹹其氣皆寒之類是也凡同氣之物必有諸味同味之物必有諸氣互相氣味各有厚薄性用不等製其方者必且明其爲用經曰味爲陰味厚爲純陰味薄爲陰中之陽氣爲陽氣厚爲純陽氣薄爲陽中之陰然味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱又曰辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰鹹味涌泄爲陰淡味滲泄爲陽凡此之味各有所能然辛能散結潤燥苦能燥濕泄熱鹹能軟堅酸能收緩收散甘能緩急淡能利竅故經曰肝苦急急食甘以緩之心苦緩急食酸以收之脾苦濕急食苦以燥之肺苦氣上逆急食苦以泄之腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通其氣也肝欲散急食辛以散之心欲軟急食鹹以軟之脾欲緩急食甘以緩之肺欲收急食酸以收之腎欲堅急食苦以堅之凡此者是明其氣味之用也若用其味必明其氣之可否用其氣必明其味之所宜識其病之標本臟腑寒熱虛實微甚緩急而用其藥之氣味隨其證而製其方也是故方有君臣佐使輕重緩急君臣大小反正逆從之制也主治病者爲君佐君者爲臣應臣者爲使用此隨病之所宜而又贊成方而用之君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君二臣六偶之制也去咽嗌近者奇之遠者偶之汗者不奇下者不偶補上治上制之以緩補下治下制之以急急者氣味厚也緩者氣味薄也薄者少服而頻食厚者多服而頻食又當明五氣之鬱木鬱達之謂吐令條達也火鬱發之謂汗令疎散也土鬱奪之謂下無壅滯也金鬱泄之謂解表泄小便也水鬱折之謂制其衝逆也通此五法乃治病之大要也

用藥各定分兩

爲君者最多爲臣者次之佐者又次藥之於證所主同者則等分

用藥酒洗曝乾

黃芩黃連黃蘗知母病在頭面及手梢皮膚者須用酒炒之借酒力以上騰也咽之下膊之上須酒洗之在下生用大凡生升熟降大黃須煨恐寒則損胃氣至於川烏附子須炮以制毒也黃蘗知母下部藥也久弱之人須合用之者酒浸曝乾恐寒傷胃氣也熟地黃酒洗亦然當歸酒浸助發之意也

用藥根梢身例

凡根之在土者中半已上氣脈之上行也以生苗者爲根中半已下氣脈之下行也入土以爲梢病在中焦與上焦者用根在下焦者用梢根升而梢降大凡藥根有上中下人身半已上天之陽也用頭在中焦用身在身半已下地之陽也用梢述類象形者也

用圓散藥例

仲景言剉如麻豆大與㕮咀同意夫㕮咀古之制也古者無鐵刃以口㕮細令如麻豆爲粗藥煎之使藥水清飲於腹中則易升易降也此所謂㕮咀也今人以刀器剉如麻豆大此㕮咀之易成也若一槩爲細末不分清濁矣經云清陽發腠理濁陰走五臟果何謂也又曰清陽實四肢濁陰歸六腑㕮咀之藥取汁易行經絡也若治至高之病加酒煎去濕以生薑補元氣以大棗發散風寒以蔥白去膈上痰以蜜細末者不循經絡止去胃中及臟腑之積氣味厚者白湯調氣味薄者煎之和渣服去下部之疾其丸極大而光且圓治中焦者次之治上焦者極小稠麪糊取其遲化直至下焦或酒或醋取其收其散之意也犯牛夏南星欲去濕者以生薑汁糝糊爲圓取其易化也水浸宿炊餅又易化滴水調又易化煉蜜圓者取其遲化而氣循經絡也蠟圓者取其難化而旋旋取效也大抵湯者蕩也去大病用之散者散也去急病用之圓者緩也不能速去之其用藥之舒緩而治之意也

升合分兩

古之方劑錙銖分兩與今不同謂如㕮咀者即今剉如麻豆大是也云一升者即今之大白盞也云銖者六銖爲一分即二錢半也二十四銖爲一兩也云三兩者即今之一兩云二兩即今之六錢半也料例大者只合三分之一足矣

君臣佐使法

帝曰方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使非上中下三品之謂也帝曰三品何謂曰所以明善惡之殊貴也

凡藥之所用者皆以氣味爲主補瀉在味隨時換氣主病者爲君假令治風者防風爲君治上焦熱黃芩爲君治中焦熱黃連爲君治濕防已爲君治寒附子之類爲君兼見何證以佐使藥分治之此制方之要也本草說上品藥爲君各從其宜也

治法綱要

氣交變論云夫五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之化者應之變者復之此生長化成收藏之理氣之常也失常則天地四塞矣失常之理則天地四時之氣無所運行故動必有靜勝必有復乃天地陰陽之道也假令高者抑之非高者固當抑也以其本下而失之太高故抑之而使下若本高何抑之有假令下者舉之非下者固當舉之也以其本高而失之太下故舉而使之高若本下何舉之有如仲景治表虛製桂枝湯方桂枝味辛熱發散助陽體輕本乎天者親上故桂枝爲君芍藥甘草爲佐陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛製小建中湯方芍藥味酸寒主收補中本乎地者親下故芍藥爲君桂甘草佐之一則治表虛一則治裏虛各言其主用也後之用古方者觸類而長之不致差誤矣

藥味專精

至元庚辰六月許信房年五十四中氣本弱病傷寒八九日醫者見其熱甚以涼藥下之又食梨三四枚痛傷脾胃四肢冷時發昏憒予診其脈動而中止有時自還乃結脈也心亦悸動吃噫不絕色變青黃精神減少目不欲開倦臥惡人語笑以炙甘草湯治之成無已云補可去弱人參大棗之甘以補不足之氣桂枝生姜之辛以益正氣五臟痿弱榮衛涸流濕劑所以潤之麻仁阿膠麥門冬地黃之甘潤經益血復脈通心是也加以人參桂枝急扶正氣生地黃減半恐傷陽氣剉一兩劑服之不效予再候之脈證相對莫非藥有陳腐者致不效乎再市藥之氣味厚者煎服其證減半再服而安凡藥之昆蟲草木產之有地根葉花實採之有時失其地則性味少異矣失其時則氣味不全矣又況新陳之不同精粗之不等倘不擇而用之其不效者醫之過也內經曰司歲備物氣味之精專也修合之際宜加謹焉

湯藥煎造

病人服藥必擇人煎藥能識煎熬制度須令親信恭誠至意者煎藥銚器除油垢腥穢必用新淨甜水爲上量水大小斟酌以慢火煎熬分數用紗濾去柤取清汁服之無不效也

古人服藥活法

在上不厭頻而少在下不厭頓而多少服則滋榮於上多服則峻補於下

古人服藥有法

病在心上者　先食而後藥
病在心下者　先藥而後食
病在四肢者　宜饑食而在日
病在骨髓者　宜飽食而在夜

察病輕重

凡欲療病先察其源先候其機五臟未虛六腑未竭血脈未亂精神未散服藥必效若病已成可得半愈病勢已過命將難存自非明醫聰聲察色至於診脈孰能知未病之病乎

海藏老人湯液本草

五宜

肝色青宜食甘粳米牛肉棗葵皆甘
心色赤宜食酸犬肉麻李韭皆酸
肺色白宜食苦小麥羊肉杏薤皆苦
脾色黃宜食鹹大豆豕肉栗藿皆鹹
腎色黑宜食辛黃黍雞肉桃葱皆辛

毒藥攻邪　五穀爲養　五果爲助
五畜爲益　五菜爲充

氣味合而服之以補精益氣此五者有辛酸甘苦鹹各有所利或散或收或緩或急或堅或軟四時五臟病隨五味所宜也

大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也薔陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味是故味過於酸肝氣以津脾氣乃絕味過於鹹大骨氣勞短肌心氣抑味過於甘心氣喘滿色黑腎氣不衡味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚味過於辛筋脈沮弛精神廼央是故謹和五味骨正筋柔氣血以流腠理以密如是則氣骨以精謹道如法長有天命

五傷

多食鹹　則脈凝泣而變色
多食苦　則皮槁而毛拔
多食辛　則筋急而爪枯
多食酸　則肉胝脣而唇揭
多食甘　則骨痛而髮落

五走

鹹走血　血病毋多食鹹
苦走骨　骨病毋多食苦
辛走氣　氣病毋多食辛
酸走筋　筋病毋多食酸
甘走肉　肉病毋多食甘

夫五味入胃各歸所喜故酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之常也氣增而久夫之由也

服藥可慎

熱中消中不可服醫絜方草石藥夫芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩心和人不可以服此夫熱氣標悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾脾者土也而惡木服此藥者至甲乙日更論

論藥所主

海藏云湯液要藥最爲的當其餘方論所著雜例比之湯液稍異何哉蓋伊尹仲景取其治之長也其所長者神農之所註也何以知之本草云一物主十病取其偏長爲本又當取潔古珍珠囊斷例爲准則其中藥之所主不必多言只一兩句多則不過三四句非務簡也亦取其所主之偏長故不爲多也

天地生物有厚薄堪用不堪用

厥陰
少陰　司
太陰
少陽
陽明　天
太陽

風化
熱化　在
濕化
火化
燥化
寒化

酸化木
苦化火
甘化土
苦化火
辛化金
鹹化水

司地氣故物化從

酸苦甘苦辛鹹

故治病者必明六化分治五味五色所生五臟所宜廼可以言登虛病生之緒也謹候氣宜無失病機其主病何如言採藥之歲也司歲備物則無遺生矣先歲物何也天地之專精也專精之氣乘物肥濃又於使用當其正氣味也五運主歲不足則物薄有餘則物精非專精則散氣散氣則物不純是以質同而異等形質雖同力用則異也氣味有厚薄性用有躁靜治化有多少力化有殺殺此之謂也

氣味生成流布

陽爲氣陰爲味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食氣形食味化生精氣生形味傷形氣傷精精化爲氣氣傷於味陰味出下竅陽氣出上竅味厚者爲陰薄爲陰中之陽厚則泄薄則通氣厚者爲陽薄爲陽中之陰薄則發泄厚則發熱壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺上使五色修明音聲能彰五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生

次位之主

之客　甘瀉　鹹補
之勝　辛寒　苦鹹　甘瀉　少陰可次無犯　少陽陰絕不達熱
之復　鹹冷　苦辛　鹹軟　酸收　辛苦發
少陽　在泉　淫于內　治以　鹹冷　甘苦　酸收　苦發
司天　火淫所勝　平以　酸冷　以甘苦　酸收　苦發　酸復之

木位之主 酸瀉 辛補
之客 辛補 酸瀉 甘緩
厥之勝 甘滑 苦平 酸瀉
之復 酸寒 佐 甘辛 甘緩 酸瀉
陰 在泉 注于內 治以 辛涼 苦甘 甘緩 辛散
司天 風 注所勝 平以 辛涼 以 苦甘 甘緩 酸瀉

火位之氣 甘瀉 鹹補
之客 鹹補 甘瀉
少之勝 辛寒 佐 苦鹹甘瀉
之復 鹹寒 苦辛甘瀉 酸收 辛苦發 鹹軟
陰 在泉 注于內 治以 鹹寒 甚 酸收 苦發
司天 熱 注所勝 平以 酸寒 以 苦甘 酸收

土位之主 苦瀉 甘補
之客 甘補 苦瀉
太之勝 鹹熱 苦熱 佐 辛甘 苦補 補一作瀉
之復 注于內 治以 苦熱 以 酸辛 苦燥 淡泄
陰 在泉 注所勝 平以 苦熱 酸淡 苦燥 淡泄
司天 濕 在而熱 治以 苦濕 佐以 甘辛 以燥爲故而止

金位之主 辛瀉 酸補
之客 酸補 辛瀉
陽之勝 酸溫 辛溫 佐 辛甘 苦瀉
之復 明 在泉 注于內 治以 苦溫 以 苦甘 苦泄 苦下 鹹補
司天 燥 注所勝 平以 苦溫 以 酸辛 苦下
司地 酸溫 苦甘 辛本
風 清反勝之治以 佐
化天 酸溫 苦甘

水位之主 鹹瀉 苦補
之客 苦補 鹹瀉
太之勝 苦熱 佐 辛酸 鹹瀉
之復 鹹熱 甘辛 苦堅
陽 在泉 注于內 治以 甘熱 以 苦辛 鹹瀉 辛潤 苦堅
司天 寒 注所勝 平以 辛熱 苦甘 鹹瀉

熱 司地 甘熱 苦辛 鹹平之
火 甘熱 苦辛 鹹平之
寒反勝之治以 佐以
熱 化天 甘溫 苦辛
火 甘溫 苦辛

七方

大 君一臣三佐九制之大也
遠而奇偶制大其服也大則數少少則二之
腎肝位遠服湯散不厭頓而多
小 君一臣二制之小也
近而奇偶制小其服也小則數多多則九之
心肺位近服湯散不厭頻而少
緩 補上治上治以緩緩則氣味薄
治主以緩緩則治其本
急 補下治下制以急急則氣味厚
治客以急急則治其標
奇 君一臣二奇之制也君二臣三奇之制也
陽數奇
偶 君二臣四偶之制也君二臣六偶之制也
陰數偶
複 奇之不去則偶之是爲重方也
十劑
宣 可以去壅蘊橘之屬是也

通　可以去滯木通防已之屬是也
補　可以去弱人參羊肉之屬是也
瀉　可以去閉葶藶大黃之屬是也
輕　可以去實麻黃葛根之屬是也
重　可以去怯磁石鐵漿之屬是也
滑　可以去著冬葵子榆白皮之屬是也
澁　可以去脫牡蠣龍骨之屬是也
燥　可以去濕桑白皮赤小豆之屬是也
濕　可以去枯白石英紫石英之屬是也

只如此體皆有所屬凡用藥者審而詳之則靡所失矣陶隱居云藥有宣通補瀉輕重滑澁燥濕此十劑今詳之惟寒熱二種何獨見遺今補二種以盡厥旨

寒　可以去熱石膏矾硝之屬是也
熱　可以去寒附子官桂之屬是也

湯液本草卷中

江陰朱氏校刊本

元　趙州王好古類集

草部

防風

純陽　性溫　味甘辛　無毒

足陽明胃經

足太陰脾經乃二經之行經藥

太陽經本經藥

象云治風通用瀉肺實散頭目中滯氣除上焦風邪之仙藥也誤服瀉人上焦元氣去蘆并鈒股用

珍云身去身半已上風邪梢去身半已下風邪心云又去濕之仙藥也風能勝濕爾

本草云主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痹煩滿脇痛脇風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內痙

東垣云防風能制黃芪黃芪得防風其功愈大又云防風乃卒伍卑賤之職隨所引而至乃風藥中潤劑也雖與黃芪相制乃相畏而相使者也

本草又云得澤瀉藥本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風殺附子毒惡乾薑藜蘆白蘞芫花升麻

氣平　味苦甘　微苦微寒味薄氣厚陽中之陰也無毒

陽明經本經藥

亦走手陽明經太陰經

象云能解肌肉間熱此手足陽明經傷風之的藥也去黑皮并腐爛者用若補脾胃非此為引用不能補若

得葱白白芷之類亦能走手足陽明太陰

心云發散本經風邪元氣不足者用此於陰中升陽氣上行

珍云脾痺非此不能除

本草云主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡

東垣云升麻入足陽明若初病太陽證便服升麻葛根發出陽明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可解必傳陽明矣投湯不當非徒無益而又害之也

朱氏云瘀血入裏若衄血吐血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相遠不同何以代之蓋以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明耳

仲景云太陽病若發汗若利小便重亡津液胃中乾燥因轉屬陽明其害不可勝言又云太陽兀兀無汗者葛根湯發之若兀兀自汗者表虛也不宜用此朱氏用升麻者以表實無汗也

訣云主肺痿欬唾膿血能發浮汗

羌活

氣微溫　味苦甘平　苦辛氣味俱輕陽也無毒

足太陽經厥陰經藥

太陽經本經藥也

象云治肢節痛利諸節手足太陽經風藥也加川芎治足太陽少陰頭痛透關節去黑皮并腐爛者用

心云氣溫濕風

珍云骨節痛非此不能除

液云若藥也非無爲之主乃卻亂反正之主太陽經頭痛肢節痛一身盡痛非此不治又云是治足太陽厥陰少陰藥也與獨活不分二種後人用羌活多用鞭節者用獨活多用鬼眼者羌活則氣雄獨活則氣細故雄者入足太陽細者入足少陰也又錢氏瀉青丸用此壬乙同歸一治也或問治痛者何答曰巨陽經從頭走足惟厥陰與督脈會於巔逆而上行諸陽不得下故令頭痛也

獨活

氣味與羌活同無毒　氣厚味薄升也苦辛

足少陰腎經行經之藥腎足少陰

本草云上風寒所擊金瘡止痛賁豚癇痓女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新也

液云獨活細而低治足少陰伏風而不治太陽故兩足寒濕痺不能動止非此不能治

象云若與細辛同用治少陰經頭痛一名獨搖草得風不搖無風自搖去皮節用

心云治風須用又能燥濕經云風能勝濕

珍云頭眩目暈非此不能除

柴胡

氣平　味微苦　微寒氣味俱輕陽也升也純陽無毒

少陽經厥陰經行經之藥三焦手胆足少陽經絡手肝足厥陰

象云除虛勞定熱解肌熱去早晨潮熱婦人產前後必用之藥善除本經頭痛非他藥能止治心下痞胸脇痛去蘆用

心云少陽經分之藥引胃氣上升苦寒以發表熱

珍云去往來寒熱膽痺非此不能除

本草云主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪逆五臟間遊氣太腸停積水腹及濕痺拘攣亦可作浴湯久服輕身明目益精半夏爲之使惡皂莢畏女苑藜蘆入足少陽主東方分也在經主氣在臟主血證前行則惡熱御退則惡寒惟氣之微寒味之薄者故能行經若佐以三稜廣茂巴豆之類故能消堅積是主血也婦人經水適來適斷傷寒雜病易老俱用小柴胡湯主之加以四物之類并秦艽牡丹皮輩同爲調經之劑

衍義云柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者凡此誤世甚多嘗原病勞有一種真臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也須當斟酌用之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳服之無不效

日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者取而用之不亡何待註釋本草一字亦不可忽蓋後世所誤無窮也苟有明哲之士自可處制中下之士不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治寒熱往來如瘧用柴胡正合其宜

圖經云治傷寒有大小柴胡湯柴胡加龍骨牡蠣柴胡加芒硝等湯故後人治傷寒熱此爲最要之藥

東垣云能引清氣而行陽道傷寒外諸藥所加有熱則加之無熱則不加又能引胃氣上行升騰而行春令是也欲其如此又何加之

海藏云能去臟腑內外俱乏既能引清氣上行而順陽道蓋以少陽之氣初出地之皮爲嫩陽故以少陽當之

葛根

氣平　味甘　無毒

陽明經引經藥大腸手胃足陽明

足陽明經行經的藥胃

象云治脾虛而渴除胃熱解酒毒通行足陽明經之藥去皮用

心云止渴升陽

珍云益陽生津勿多用恐傷胃氣虛渴者非此不能除

本草云主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脇風痛生根汗寒治消渴傷寒壯熱花主酒酒粉味甘大寒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱痢以葛根浸搗汁飲之良

東垣云葛根甘平溫世人初病太陽證便服葛根升麻湯非也

朱奉議云頭痛如欲破者連鬚蔥白湯飲之不已者葛根蔥白湯

易老云用此以斷太陽入陽明之絡即非太陽藥也故仲景治太陽陽明合病桂枝湯內加麻黃葛根也又有葛根黃芩黃連解肌湯是知葛根非太陽藥即陽明藥

食療云葛根蒸食之消毒其粉亦甚妙其粉以水調三合能解鴆毒

衍義云治中熱酒渴病多食行小便亦能使人利病酒

及渴者得之甚良
易老又云太陽初病未入陽明頭痛者不可便服葛根發之若服之是引賊破家也若頭顱痛者可服之葛根湯陽明自中風之仙藥也
本草又云殺野葛巴豆百藥毒
葳靈仙
氣溫　味苦甘　純陽
象云主諸風濕冷通五藏去腹內痕滯腰膝冷痛及治傷損鐵刷者佳去蘆用
心云去大腸之風
本草云忌茗
細辛
氣溫　味大辛　純陽　性溫氣厚於味陽也無毒
少陰經藥
手少陰引經之藥
象云治少陰頭痛如神當少用之獨活為使為主用去蘆頭并葉華州者佳
珍云主少陰經頭痛
心云止諸項頭痛諸風通用之味辛熱溫陰經散水寒以去內寒
本草云主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胸中除喉痺鼻鼽鼻風癲癇疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽通精氣久服明目利九竅
東垣云治邪在裏之表故仲景少陰證用麻黃附子細辛湯也

易老云治少陰頭痛太陽則羌活少陰則細辛陽明則白芷厥陰則川芎吳茱萸少陽則柴胡用者隨經不可差細辛香味俱細而緩故入少陰與獨活頗相類
本草又云會青棗根為之使得當歸芍藥白芷川芎牡丹蘗本甘草共療婦人得決明鯉魚膽汁青羊肝共療目痛惡狼毒山茱萸黃芪畏消石滑石反藜蘆
衍義云治頭面風痛不可缺也
白芷
氣溫　味大辛　純陽　無毒　氣味俱輕陽也
陽明經引經藥
手陽明經本經藥行足陽明經於升麻湯四味內加之
象云治手陽明頭痛中風寒熱解利藥也以四味升麻湯加之
珍云長肌肉散陽明之風
心云治風通用去陽經風熱
本草云主女子漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侯目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐唾兩脇滿風痛頭眩目痒
日華子云補胎漏滑落攸宿血補新血乳癰發背一切瘡疥排膿止痛生肌去面皯皰瘢痕明目其氣芳香治正陽陽明頭痛與辛夷細辛同用治鼻病內托用此長肌肉則陽明可知矣又云當歸為之使惡旋覆花
川芎
氣溫　味辛　純陽　無毒
入手足厥陰經
少陽經本經藥

象云補血治血虛頭痛之聖藥姙婦胎不動數月加當歸二味各二錢水二盞煎至一半服神效
珍云散肝經之風貫芎治少陽經苦頭痛
心云治少陽頭痛及治風通用
本草云主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛腳風痛溫中除內寒
日華子云能除鼻洪吐血及蠱血破癥結宿血養新血
易老云上行頭目下行血海故清神四物湯所皆用也入手足厥陰經
衍義云頭面風不可缺也然須以他藥佐之若單服久服則走散真氣既使他藥佐之亦不可久服中病即便已
東垣云頭痛甚者加蔓荊子項與腦痛加川芎若頭痛者加藁本諸經皆頭痛加細辛若有熱者不能治別有青空之劑為緣諸經頭痛須用四味
本草又云白芷為之使畏黃連
麻黃
氣溫　味苦甘而苦　氣味俱薄陽也升也甘熱純陽無毒
手太陽之劑
入足太陽經
走手少陰經陽明經藥
象云發太陽少陰經汗去節煮三二沸去上沫否則令人心煩悶
心云陽明經藥去表上之寒邪甘熱去節解少陰寒散

表寒發浮熱也

珍云去榮中寒

本草云主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止厥逆上氣除寒熱破癥堅積聚

液云入足太陽手少陰能泄衛實發汗及傷寒無汗欬嗽根節能止汗夫麻黃治衛實之藥桂枝治衛虛之藥桂枝麻黃雖爲太陽經藥其實榮衛藥也以其在太陽地分故曰太陽也本病者即榮衛肺主衛心主榮爲血乃肺心所主故麻黃爲手太陰之劑桂枝爲手少陰之劑故傷寒傷風而嗽者用麻黃桂枝即湯液之源也

藥性論云君味甘平治瘟疫

本草又云厚樸爲之使惡辛夷石韋

藥本

氣溫　味大辛　苦微溫氣厚味薄陽也升也純陽無毒

太陽經本經藥

象云太陽經風藥治寒邪結鬱於本經治頭痛腦痛大寒犯腦令人腦痛齒亦痛

心云專治太陽頭痛其氣雄壯

珍云治巔頂痛

本草云主婦人痼瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪蟬叟金瘡可作沐藥面脂實主流風四肢惡菌茹此與木香同治霧露之氣與白芷同作面脂藥治療

仲景云清明已前立秋已後凡中霧露之氣皆爲傷寒

又云清邪中於上焦皆霧露之氣神芎白芷湯內加

木香藥本擇其可而用之此既治風又治濕亦各從其類也

桔梗

氣微溫　味辛苦　陽中之陽　味厚氣輕陽中之陰也有小毒

入足少陰經

入手太陰脈經藥

象云治咽喉痛利肺氣去蘆米泔浸一宿焙乾用

珍云陽中之陰謂之舟楫諸藥有此一味不能下沉治鼻塞

心云利嗌咽胸膈之氣以其色白故爲肺辛甘微溫治寒嘔若咽中痛桔梗能散之也

本草云主胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療咽喉痛下蠱毒

易老云與國老並行同爲舟楫之劑如將軍苦泄峻下之藥欲引至胸中至高之分成功非此辛甘不居譬如鐵石入江非舟楫不載故用辛甘之劑以升之也

衍義云治肺熱氣奔促欬逆肺癰排膿

本草又云節皮爲之使得牡蠣遠志療恚怒得硝石石膏療傷寒畏白芨龍眼龍膽

鼠黏子

氣平　味辛　辛溫

象云主風毒腫利咽膈吞一枚可出癰疽瘡頭

珍云潤肺散氣

秦艽

氣微溫　味苦辛　陰中微陽

手陽明經藥

象云主寒熱邪氣風濕痺下水利小便治羌活骨蒸治口禁及腸風瀉血去蘆用

珍云去手陽明經下牙痛口瘡蒡去本經風濕

本草云菖蒲爲之使

天麻

氣平　味苦　無毒

象云治頭風

本草云主諸風濕痺四肢拘攣小兒風痫驚氣利腰膝強筋力其苗名定風草

黑附子

氣熱　味大辛　純陽　辛甘溫大熱有大毒通行諸經引用藥

入手少陽經三焦命門之劑

象云性走而不守亦能除腎中寒甚白朮爲佐名朮附湯除寒濕之聖藥也濕藥中少加之通行諸經引用藥也治經閉慢火炮

珍云治脾濕腎寒

本草云主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踝躄拘攣膝痛腳痠冷弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下利赤白堅肌骨強陰陰脂爲百藥之長

液云入手少陽三焦命門之劑浮中沉無所不至附子味辛大熱爲陽中之陽故行而不止非若乾薑止而不行也非身表涼而四肢厥者不可僭用如用之者以其治四逆也

本草又云地膽爲之使惡蝦蟆畏防風黑豆甘草黃芪

人參冬月採爲附子春月採爲烏頭

烏頭

氣熱　味大辛　辛甘大熱　有大毒行諸經

象云治風痺血痺半身不遂行經藥也慢火炮折去皮用

本草云主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胸上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視墮胎其汁煎之名射罔殺禽獸

液云烏附天雄側子之屬皆水浸炮裂去皮臍用之多有外黃裏白劣性尚在莫若乘熱切作片子再炒令表裏皆黃內外一色劣性皆去卻爲良也世人罕如此製之

縮砂

氣溫　味辛　無毒

入手足太陰經陽明經太陽經

足少陰經

象云治脾胃氣結滯不散主勞虛冷瀉心腹痛下氣消食

本草云治虛勞冷瀉宿食不消赤白泄痢腹中虛痛下氣

液云與白檀豆蔻爲使則入肺與人參益智爲使則入脾與黃蘗茯苓爲使則入腎與赤白石脂爲使則入大小腸

華澄茄

氣溫　味辛　無毒

本草云主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食

蓽撥

氣溫　味辛　無毒

本草云主溫中下氣補腰腳殺腥氣消食除胃冷陰痼痃癖

衍義云走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多服走泄真氣令人腸虛下重

香附子

氣微寒　味甘　陽中之陰　無毒

本草云除胸中熱充皮毛久服利人益氣長鬚眉後世人用治崩漏本草不言治崩漏

圖經云膀胱兩脇氣妨常日憂愁不樂飲食不多皮膚瘙痒癮疹日漸瘦損心忪少氣以是知益血中之氣藥也方中用治崩漏是益氣而止血也又能去凝血是推陳也與巴豆同治泄瀉不止又能治大便不通同意

珍云快氣

草豆蔻

氣熱　味大辛　陽也辛溫無毒

入足太陰經陽明經

象云治風寒客邪在胃口之上善去脾胃客寒心與胃痛麵包煨熟去麵用

珍云益脾胃去寒

本草云主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣下氣脹滿短氣消酒進食止霍亂治一切冷氣調中補胃健脾亦能消食

衍義云性溫而調散冷氣力甚速虛弱不能飲食宜此與木瓜烏梅縮砂益智麴蘗鹽草薑也

白豆蔻

氣熱　味大辛　味薄氣厚陽也　辛大溫

無毒

入手太陰經

珍云主積冷氣散肺中滯氣寬膈止吐逆治反胃消穀下氣進食去皮用

心云專入肺經去白膜翳膜紅者不宜多用

本草云主積聚冷氣止吐逆反胃消穀下氣

液云入手太陰別有清高之氣上焦元氣不足以此補之

延胡索

氣溫　味辛　苦辛溫無毒

入手足太陰經

象云破血治氣月水不調小腹痛煖腰膝破癥瘕碎用

液云治心氣痛小腹痛有神主破血產後諸疾因血爲病者婦人月水不調腹中結塊崩漏淋露暴血上行因損下血

茴香

氣平　味辛　無毒

入手足少陰經太陽經藥

象云破一切臭氣調中止嘔下食炒黃色碎用

本草云主諸癥霍亂及蛇傷又能治腎勞癩疝氣開胃下食又治膀胱陰痛腳氣少腹痛不可忍

液云茴香本治膀胱藥以其先丙故云小腸也能潤丙燥以其先戊故從丙至壬又手足少陰二藥以開上下經之通道所以壬與丙交也

紅藍花

氣溫　味辛　辛而甘溫苦　陰中之陽　無毒

象云治產後口噤血暈腹內惡血不盡絞痛破留血神效搓碎用

心云和血與當歸同用

珍云入心養血謂苦爲陰中之陽故入心

本草云主產後血暈胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血其苗生搗傅遊腫其子呑數粒主天行瘡子不出其胭脂主小兒脣耳滴耳中仲景治六十二種風兼腹中血氣刺痛用紅花一大兩分爲四分酒一大升煎强半頓服之

良薑

氣熱　味辛　純陽

本草云治胃中冷逆霍亂腹痛反胃嘔食轉筋瀉痢下氣消宿食

心云健脾胃

黃芪

氣溫　味甘　純陽　甘微溫　性平　無毒

入手少陽經

足太陰經

足少陰命門之劑

象云治虛勞自汗補肺氣入皮毛瀉肺中火如脈弦自汗脾胃虛弱瘡痒血脈不行內托陰證瘡瘍必用之去蘆用

珍云益胃氣去肌熱諸痛必用之

心云補五臟諸虛不足而瀉陰火去虛熱無汗則發之有汗則止之

本草云主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病婦人子臟風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦腹痛泄痢益氣利陰氣有白水芪赤水芪木芪功用皆同惟木芪莖短而理橫折之如綿皮黃褐色肉中白色謂之綿黃芪其堅脆而味苦者乃黃蓍根也又云破癥癖腸風血崩帶下赤白痢及產前後一切病月候不調消渴痰嗽又治頭風熱毒目赤骨蒸生蜀郡山谷白水溪中今河東陝西州郡多有之芪與桂同功特味稍異比桂但甘平不辛熱耳世人以黃蓍根代之呼爲土黃芪但味苦能令人瘦特味甘者能令人肥也頗能亂眞用者宜審

治氣虛盜汗并自汗即皮表之藥又治膚痛則表藥可知又治咯血衆脾胃是爲中州藥也又治傷寒尺脈不至又補腎臟元氣爲裏藥是上中下內外三焦之藥今本草圖經只言河東者沁州綿上是也故謂之綿芪味甘如蜜兼體骨柔軟如綿世以爲如綿非也別說云黃芪本出綿上爲良故圖經所繪者憲水者也與綿上相鄰蓋以地產爲綿若以柔韌爲綿則僞者亦柔但以乾脆甘苦爲別耳

東垣云黃芪人參甘草三味退熱之聖藥也靈樞曰衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔黃芪既補三焦實衛氣與桂同特益氣異耳亦在佐使桂則通血也能破血而實衛氣通內而實外者數桂以血言一作色求則芪爲實氣也惡鱉甲

蒼朮

氣溫　味甘

入足陽明太陰經

象云主治同白朮若除上濕發汗功最大若補中焦除濕力小如白朮也

衍義云其長如大拇指肥實皮色褐氣味辛烈須米泔浸洗再換泔浸二日去上麤皮

東垣云入足陽明太陰能蓬胃安脾

本草但言朮不分蒼白其蒼朮別有雄壯之氣以其經泔浸火炒故能出汗與白朮止汗特異用者不可以此代彼

海藏云蒼白有止發之異其餘主治並見圖經

白朮

氣溫　味甘　苦而甘溫　味厚氣薄陰中陽也

無毒

入手太陽少陰經

足陽明太陰少陰厥陰四經

象云除濕益燥和中益氣利腰臍間血除胃中熱去諸經之濕理胃

潔古云溫中去濕除熱降胃氣蒼朮亦同但味頗厚耳下行則用之甘溫補陽建脾逐水寒淫所勝緩脾生津去濕渴者用之

本草在木條下無蒼白之名近多用白朮治皮間風止汗消痞補胃和中利腰臍間血通水道上而皮毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血

潔古又云非白朮不能去濕非枳實不能消痞除濕利水道如何是益津液

當歸

氣溫　味辛甘而大溫　氣味俱輕陽也　甘辛陽中微陰　無毒

入手少陰經

足太陰經厥陰經

象云和血補血尾破血身和血先水洗去土酒製過或火乾日乾入藥血病須用去蘆用

心云治血通用能除血刺痛以甘故能和血辛溫以潤內寒當歸之苦以助心散寒

珍云頭止血身和血梢破血治上酒浸治外酒洗糖色嚼之大辛可能潰堅與菖蒲海藻相反

本草云主欬逆上氣溫瘧寒熱洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之溫中止痛及腹病除客血內寒中風痓汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五臟生肌肉氣血昏亂服之即定有各歸氣血之功故名當歸

雷公云得酒浸過良若要破血即使頭節硬實處若要止痛止血即用尾若一時用不如不使

易老云用頭則止血用尾則行血若全用則一破一止則和血也入手少陰以其心主血也入足太陰以其脾裹血也入足厥陰以其肝藏血也頭能止血身能養血尾能行血用者不分不如不使若全用在參芪皆能補血在牽牛大黃皆能破血佐使定分用者當知從桂附柴萸則熱從大黃芒硝則寒諸經頭痛俱在細辛條下惟酒蒸當歸又治頭痛以其諸頭痛皆屬木故以血藥主之

藥性論云臣畏生薑惡濕麪

經云當歸主欬逆上氣當歸血藥如何治胸中氣

藥性論云補女子諸不足此說蓋當歸之用矣

芍藥

氣微寒　味酸而苦　氣薄味厚陰也降也

陰中之陽有小毒

入手足太陰經

象云補中焦之藥得炙甘草爲佐治腹中痛夏月腹痛少加黃芩如惡寒腹痛加肉桂一錢白芍藥三錢炙甘草一錢半此仲景神方也如冬月大寒腹痛加桂二錢半水二盞煎一半去皮用

心云脾經之藥收陰氣能除腹痛酸以收之扶陽而收陰氣泄邪氣扶陰與生薑同用溫經散濕通塞利腹中痛胃氣不通肺燥氣熱酸收甘緩下利必用之藥

珍云白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經止中部腹痛

本草云主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脈緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱

衍義云芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉者山中者佳花葉多則根虛然其根多赤色其味澁有色白粗肥者亦好餘如經然血虛寒人禁此一物古人有言減芍藥以避中寒誠不可忽今見花赤者爲赤芍藥花白者爲白芍藥俗云白補而赤瀉

東垣云但澁者爲上或問古今方論中多以澁爲收今本經有利小便一句者何也東垣云芍藥能停諸濕而益津液使小便自行本非通行之藥所當知之又問有緩中一句何謂緩中東垣云損其肝者緩其中又問當用何藥以治之東垣云當用四物湯以其內有芍藥故也赤者利小便下氣白者止痛散氣血入手足太陰經大抵酸澁者爲上爲收斂停濕之劑故主手足太陰經收降之體故又能至血海而入於九地之下後至厥陰經也後人用赤瀉白補者以其色

在西方故補色在南方故泄也

本草云能利小便非能利之也以其腎主大小二便既用此以益陰滋濕故小便得通也

難經云損其肝者緩其中即調血也沒藥烏藥雷丸爲之使

本草又云惡石斛芒硝昆碪石鱉甲小薊反藜蘆

液云腹中虛痛脾經也非芍藥不除補津液停濕之劑

熟地黃

氣寒　味苦　陰中之陽　甘微苦

陰中陽氣薄　陰中陽也　無毒

入手足少陰經厥陰經

象云酒澀蒸如烏金假酒力則微溫大補血衰者須用之善黑鬚髮忌蘿蔔

珍云若治外治上酒製

心云生則性大寒而涼血熟則性寒而補腎

本草云主折跌絕筋傷中逐血痺塡骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不足通血脈益氣力利耳目生者尤良得清酒麥門冬尤良惡貝母畏菰黃

東垣云生地黃治手足心熱及心熱入手足少陰手足厥陰能益腎水而治血脈洪實者宜此若脈虛則宜熟地黃地黃假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景製八味丸以熟地黃爲諸藥之首天一所生之源也

湯液四物以治藏血之臟亦以乾熟地黃爲君者經乙同歸一治也蒸搗不可犯鐵若犯鐵令入腎消

陳藏器云蒸乾即溫補生乾則平宣

機要云熟地黃臍下發痛者腎經也非地黃不能除補腎益陰之劑二宜丸加當歸爲補髓

生地黃

氣寒　味苦　陰中之陽　甘苦大寒　無毒

入手太陽經少陰經之劑

象云涼血補血補腎水眞陰不足此藥大寒宜斟酌用之恐損胃氣

珍云生血涼血

本草云主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜腕折瘀血留血衄鼻吐血皆搗飲之

液云手少陰又爲手太陽之劑故錢氏瀉丙與木通同用以導赤也諸經之血熱與他藥相隨亦能治之溺血便血亦治之入四散例

心云苦甘陰中微陽酒浸上行外行生血涼血去熱惡

貝母畏蕪荑

山藥

氣溫　味甘平　無毒

手太陰經藥

本草云主補中益氣除熱強陰主頭面遊風頭眩眩下氣充五臟長肌肉久服耳目聰明輕身耐老延年不飢手太陰藥潤皮毛燥涼而能補與二門冬紫芝爲之使惡甘遂

東垣云仲景八味丸用乾山藥以其涼而能補也亦治皮膚乾燥以此物潤之

麻仁

味甘平　無毒

入足太陰經

手陽明經

本草云主補中益氣中風汗出逐水利小便破積血復血脈乳婦產後餘疾長髮可爲沐藥久服肥澤不老

液云入足太陰手陽明汗多胃熱便難三者皆燥燥而亡津液故曰脾約約者約束之義內經謂燥者潤之故仲景以麻仁潤足太陰之燥及通腸也

薏苡仁

氣微寒　味甘　無毒

本草云主筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身益氣其根能下三蟲仲景治風濕燥痛日晡所劇者與麻黃杏子薏苡仁湯

甘草

氣平　味甘　陽也　無毒

入足厥陰經太陰經少陰經

象云生用大瀉熱火炙之則溫能補上焦中焦下焦元氣和諸藥相協而不爭性緩善解諸急故名國老去皮用甘草梢子生用爲君去莖中痛或加苦楝酒煮

玄胡索爲主尤妙

心云熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒經曰甘以緩之陽不足補之以甘中滿禁用寒熱皆用調和藥性使不相悖炙之散表寒除邪熱去咽痛除熱緩正氣緩陰血潤肺

珍云養血補胃梢子去腎中之痛胸中積熱非梢子不能除

本草云主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡尰解毒溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脈利血氣解百藥毒爲九土之精安和七十二種石一千二百種草故名國老

藥性論云君忌猪肉

內經曰脾欲緩急食甘以緩之甘以補脾能緩之也故湯液用此以建中又曰甘者令人中滿又曰中滿者勿食甘卽知非中滿藥也甘入脾歸其所喜攻也

或問附子理中調胃承氣皆用甘草者如何是調和之意答曰附子理中用甘草恐其僭上也調胃承氣用甘草恐其速下也二藥用之非和也皆緩也小柴胡有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫其中用甘草者則有調和之意中不滿而用甘爲之補中滿者用甘爲之泄此升降浮沉也鳳髓丹之甘緩腎溫而生元氣亦甘補之意也經云以甘補之以甘瀉之以甘緩之本草謂安和七十二種石一千二百種草名爲國老雖非君而爲君所宗所以能安和草石而解諸毒也於此可見調和之意夫五味之用苦直行而泄辛橫行而散酸東而收斂鹹止而軟堅甘上行而發如何

本草言下氣蓋甘之味有升降浮沉可上可下可內可外有和有緩有補有泄居中之道嘉矣入足厥陰太陰少陰能治肺痿之膿血而作吐劑能消五發之瘡疽每用水三椀煑火熬至半椀去柤服之消瘡與黃芪同功黃芪亦能治腫毒癰疽修治之法與甘草同

本草又云尤乾漆苦參爲之使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻四物

白前

氣微溫　味甘　微寒　無毒

本草云主胸脇逆氣咳嗽上氣狀似白薇牛膝輩

衍義云白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但粗而脆不似細辛之柔若以溫藥相佐使則尤佳仲景用

白薇

氣大寒　味苦鹹平　無毒

本草云主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時療傷中淋露下水氣利陰氣益精近道處處有之狀以生陟白前而短小療驚邪風狂痓病

液云局中方多有用之治婦人以本經療傷中下淋露故也

本草又云惡黃芪大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗

前胡

氣微寒　味苦　無毒

本草云主痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精半夏爲使惡皂莢畏藜蘆

木香

氣熱　味辛苦　純陽　味厚於氣陰中陽也　無毒

象云除肺中滯氣若治中下焦氣結滯須用檳榔爲使

珍云治腹中氣不轉運和胃氣

心云散滯氣調諸氣

本草云治邪風辟毒疫瘟鬼强志主淋露療氣劣肌中偏寒主氣不足消毒瘟瘧蠱毒行藥之精

本經云主氣劣氣不足補也通達氣導一切氣破也安胎建脾胃補也除痃癖塊破也與本條補破不同何也易老以爲破氣之劑不言補也

知母

氣寒　味大辛　苦寒味厚陰也降也苦陰中微陽　無毒

入足陽明經

手太陰腎經本藥

象云瀉足陽明經火熱補益腎水膀胱之寒去皮用心云瀉腎中火苦寒涼心去熱

珍云涼腎腎經本藥上頭行經皆須用酒炒

本草云主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人泄

東垣云入足陽明手太陰味苦寒潤治有汗骨蒸腎經氣勞瀉心仲景用此爲白虎湯治不得眠者煩躁也煩者肺也躁者腎也以石膏爲君主佐以知母之苦寒以清腎之源緩以甘草粳米之甘而使不速下也

經云胸中有寒者瓜蒂散吐之又云表熱裏寒者白虎湯主之瓜蒂知母味皆苦寒而治胸中寒及裏寒何也答曰成無已註云卽傷寒寒邪之毒爲熱病也讀者要逆識之如論語言亂臣十人書言唯以亂民其能而亂四方亂皆治也乃治亂者也故云亂民亂四方也仲景所言寒之一字舉其初而言之熱病在其中矣若以寒爲寒冷之寒無復用苦寒之劑兼言白虎證脈尺寸俱長則熱可知矣

貝母

氣平微寒　味辛苦　無毒

本草云主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直咳嗽上氣止煩渴出汗安五臟利骨髓

仲景寒實結胸外無熱證者三物小陷胸湯主之白散亦可以其內有貝母也別說貝母能散胸中鬱結之氣殊有功

本草又云厚樸白薇爲之使惡桃花畏秦艽礬石莽草反烏頭

海藏祖方下乳三母散牡蠣知母貝母三物爲細末用猪蹄湯調下

黃芩

氣寒　味微苦苦而甘　微寒味薄氣厚陽中陰也陰中微陽大寒無毒

入手太陰經之劑

象云治肺中濕熱療上熱目中赤腫痰肉盛必用之藥泄肺受火邪上逆於膈上補膀胱之寒不足乃滋其其化源也

心云瀉肺中之火

潔古云利胸中氣消膈上痰性苦寒下痢膿血稠粘腹疼後重身熱久不可著與芍藥甘草同用

珍云除陽有餘涼心去熱通寒格陰中微陽酒炒上行主上部積血非此不能除肺苦氣上逆急食苦以泄之

本草云主諸熱黃疸腸癖洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火傷療痰熱胃中熱小腹絞痛脅穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛

東垣云味苦而薄中枯而飄故能泄肺火而解肌熱手太陰劑也細實而中不空者治下部妙

陶隱居云色深堅實者好又治奔豚臍下熱痛驅與實高下之分與枳實枳殼同例黃芩其子主腸癖膈血

本草又云得厚樸黃連治腹痛得五味子牡蠣牡蠣令人有子得黃芪白斂赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨爲之使惡蔥實畏丹砂牡丹藜蘆

張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黃芩以其去諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止有葛根黃芩黃連湯亦主姙娠安胎散內多用黃芩今醫家常用有效者因著之千金方巴郡太守秦加減三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者久服之得行及奔馬甚驗

陶隱居云黃芩圓者名子芩仲景治雜病方多用之

黃連

氣寒　味苦　味厚氣薄陰中陽也升也　無毒

入手少陰經

象云瀉心火除脾胃中濕熱治煩惡心鬱熱在中焦兀兀欲吐心下痞滿必用藥也仲景治九種心下痞五等瀉心湯皆用之去鬚用

心云瀉心經之火眼暴赤腫及諸瘡須用之苦寒者主陽有餘苦以除之安蚘通寒格療下焦虛堅腎

珍云酒炒上行酒浸行上頭

本草云主熱氣目痛眥傷泣出明目腸癖腹痛下痢婦人陰中腫痛五臟冷熱久下泄澼膿血上消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘

液云入手少陰苦燥故入心火就燥也然瀉心其實瀉脾也爲子能令母實實則瀉其子治血防風爲上使黃連爲中使地榆爲下使

海藏祖方令終身不發痤瘡煎黃連一口兒生未出聲時灌之大應已出聲灌之痤雖發亦輕古方以黃連爲治痢之最

衍義云治痢有微血不可執以黃連爲苦燥劑虛者多致危困實者宜用之

本草又云龍骨理石黃芩爲之使惡菊花芫花玄參白蘚皮畏欵冬花勝烏頭解巴豆毒

大黃

氣寒　味苦大寒　味極厚陰也降也無毒

入手足陽明經

酒浸入太陽經

酒洗入陽明經

餘經不用酒

象云性走而不守瀉諸實熱不通下大便滌蕩腸胃間熱毒治不大便

心云滌蕩實熱

珍云熱注於內以苦泄之酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒

本草云主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結

液云味苦寒陰中之陰藥泄漏推陳致新去陳垢而安五臟謂如戡定禍亂以致太平無異所以有將軍之名入手足陽明以酒引之上至高巔以舟楫載之陶中可浮以苦泄之性峻至於下以酒將之可行至高之分若物在巔人迹不及必射以取之也故太陽陽明正陽陽明承氣湯中俱用酒浸惟少陽陽明爲下經故小承氣湯中不用酒浸也雜方有生用者有麩裹蒸熟者其製不等

衍義云損益前書已具仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足矣而不用補心湯更用瀉心湯何也荅曰若心氣獨不足則須當不吐衄也此乃邪熱因心氣不足而客之故令吐衄以苦泄其熱就以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用之無不效惟在量其虛實而已

本草又云惡乾漆

連翹

氣平　味苦　苦微寒氣味俱輕陰中陽也

無毒

手足少陽經陽明經藥

象云治寒熱瘰癧諸惡瘡腫除心中客熱去胃蟲通五淋

心云瀉心經客熱諸家須用瘡家聖藥也

珍云諸經客熱非此不能除

本草云主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫瘻瘤結熱蠱毒去寸白蠱

液云手足少陽治瘡瘍瘤氣癭起結核有神與柴胡同功但分氣血之異耳與鼠黏子同用治瘡瘍別有神功

連翹

氣寒　味苦

本經不見所註但仲景古方所註云即連翹之根也方言熬者即今之炒也

人參

氣溫　味甘　甘而微苦微寒氣味俱輕陽也陽中微陰無毒

象云治脾肺陽氣不足及能補肺氣促短氣少氣補以緩中瀉脾肺胃中火邪喜治短氣非升麻為引而不能補上升之氣升麻一分人參三分為相得也若補下焦元氣瀉腎中火邪茯苓為之使

心云補氣不足而瀉肺火甘溫而補陽利氣脈不足者是亡血也人參補之益脾與乾薑同用補氣裏虛則腹痛此藥補之是補不足也

珍云補胃喘嗽勿用短氣用之

本草云主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胸脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脈破堅積令人不忘

液云味既甘溫調中益氣即補肺之陽泄肺之陰也若便言補肺而不論陰陽寒熱何氣不足則誤矣若肺受寒邪宜此補之肺受火邪不宜用也肺為天之地即手太陰也為清肅之臟貴涼而不貴熱其象可知若傷熱則宜沙參沙參味苦甘微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臟補中人參補五臟之陽也沙參苦微寒補五臟之陰也安得不異

易老云用沙參代人參取其味甘可也

葛洪云沙參主卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞自汗出欲死細末酒調服方寸匕立差

日華子云治惡瘡疥癬及身瘙排膿消腫毒

海藏云今易老取沙參代人參取其甘也若微苦則補陰甘者補陽經雖云補五臟亦須各用本臟藥相佐使隨所引而相輔一臟也不可不知

沙參

味苦甘　微寒　無毒

治證附前人參條下

半夏

氣微寒　味辛平　苦而辛　辛厚苦輕陽中陰也生微寒熟溫有毒

入足陽明經太陰經少陽經

象云治寒痰及形寒飲冷傷肺而欬大和胃氣除胃寒進食治太陰痰厥頭痛非此不能除

心云能勝脾胃之濕所以化痰渴者禁用

珍云消胸中痞去膈上痰

本草云主傷寒寒熱心下堅下氣咽喉腫痛頭眩胸脇逆腸鳴止汗消心腹胸脇痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫腫胎瘕痰黃悅澤面目生令人吐熟令人下用之湯洗去滑令盡用生薑等分製用能消痰涎開胃建脾射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦艽鼠甲反烏頭

藥性論云半夏使長半血海藻飴糖柴胡為之使俗用為肺藥非也止吐為足陽明除痰為足太陰小柴胡中雖為止嘔亦助柴胡能主惡寒是又為足少陽也

又助黃芩能去熱是又為足陽明也往來寒熱在表裏之中故用此有各半之意本以治傷寒之寒熱所以名半夏經云腎主五液化為五溫自入為唾入肝為泣入心為汗入脾為涎入肺為涕有涎曰嗽無涎曰欬欬者因欬而動脾之濕也半夏能泄痰之標不能泄痰之本泄本者泄腎也欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以為流濕潤燥也

五味子

氣溫　味酸　陰中陽也微苦　味厚氣輕陰中微陽　無毒

入手太陰經

入足少陰經

象云大益五臟

孫真人云五月常服五味子以補五臟氣遇夏月季夏之間困乏無力無氣以動與黃芪人參麥門冬少加黃蘗煎湯服使人精神須加兩足筋力湯出生用

珍云治欬嗽

心云收肺氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則以此藥與乾薑同用治之

本草云主欬逆上氣勞傷羸瘦補不足益氣強陰益精養五臟除熱

言華子云明目暖水臟治風下氣消食霍亂轉筋疼痛奔豚冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨五味皮甘肉酸核中辛苦都有鹹味故名五味子仲景八味丸用此為腎氣丸述類象形也

孫真人云六月常服五味子以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎故入手太陰足少陰也

甘遂

氣大寒　味苦甘　甘純陽　有毒

本草云主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破堅消

積利水穀道下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿

瓜蔕爲使惡遠志反甘草

液云可以通水而其氣直透達所結處

衍義云此藥專於行水攻決爲用入藥須斟酌用之

珍云若水結胸中非此不能除

大戟

氣大寒　味苦甘　陰中微陽有小毒

本草云治蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛

吐逆頸腋癰腫頭疼發汗利大小腸此澤漆根也

液云與甘遂同爲泄水之藥濕勝者苦燥除之反甘草

與芫花黃藥子等分水糊爲丸桐子大每服十丸傷

風寒蔥白湯下傷食陳皮湯下或十五丸微加至止

亦可芫花別有條海藏十棗湯同用

珍云瀉肺損眞氣

薨花

氣微寒　味苦辛　有毒

本草云主傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌

腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道療痰飲欬嗽

衍義云仲景以薨花治利者以其行水也水去則利止

其意如此用時斟酌不可太過與不及也仍察其須

有是證方可用之仲景小青龍湯若微利去麻黃加

薨花如雞子熬令赤色用之蓋利水也

海藻

氣寒　味鹹

本草云主瘿瘤氣項下核破散結氣癰腫瘙瘕堅氣腹

中上下鳴下十一水腫瘙皮間積聚暴癭留氣熱結

利小便

珍云洗去鹹泄水氣

商陸根

氣平　味辛酸　有毒

本草云主水腹滿痠痺殺除蠱腫殺鬼精物治中邪

氣水腫痰癖腹滿洪直疏五臟散水氣如人形者有

神

珍云辛酸同用導腫氣

旋覆花

氣溫　味鹹甘　有小毒

本草云主補中下氣消堅軟痞消胸中痰結唾如膠漆

脅下膀胱留飲利大腸通血脉發汗吐下後心下痞

隱氣不除者宜此

仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除旋覆代赭湯

胡洽治痰飲兩脇脹滿旋覆花丸用之尤佳

澤瀉

氣平　味甘　甘鹹寒味厚陰也降也陰中微陽

入手太陽經少陰經

象云除濕之聖藥治小便淋瀝去陰間汗無此疾服之

令人目盲

心云去舊水養新水寒水氣須用

珍云滲瀉止渴

本草云治風寒濕痺乳難消水養五臟益氣力肥健補

虛損五勞除五臟痞滿起陰氣止泄精消渴淋瀝逐

膀胱三焦停水

扁鵲云多服病人眼

衍義云其功尤長於行水

仲景云水搐煩渴小便不利或吐或瀉五苓散主之方

用澤瀉故知其用長於行水本經又引扁鵲云多服

病人眼誠爲行去其水故也仲景八味丸用之者亦

不過接引桂附等歸就腎經別無他意凡服澤瀉散

人未有不小便多者小便既多腎氣焉得復實今人

止泄精多不敢用

本經云久服明目扁鵲謂多服昏目何也易老云去胞

中留垢以其味鹹能泄伏水故去留垢即胞中久陳

積物也入足太陽少陰仲景治太陽中風入裏渴者

五苓散主之

紅豆

氣溫　味辛　無毒

本草云主腸虛水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解酒毒

不宜多令人昏亂不能飲食

液云是高良薑于用紅豆復用良薑如用官桂復用桂

花同意

肉豆蔻

氣溫　味辛　無毒

入手陽明經

本草云主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷疰

嘔沫冷氣消食止泄小兒傷乳霍亂

甘松

氣平　味甘溫　無毒

本草云主惡氣卒心腹痛滿治黑皮黯黯風疳齒蠹

蜀漆

氣微溫　味辛　純陽　辛平　有毒

珍云破血

心云洗去腥與苦酸同用導膽

本草云主瘧及咳逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰療胸中邪結氣能吐出之

成無已註火邪錯逆加曷蔘之辛以散之

蒲黃

氣平　味甘　無毒

本草云主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血又云治一切吐衄唾血崩瀉撲瘀帶下等血並皆治之并療痲通月候墮胎兒枕急痛風腫鼻洪下乳止泄精血利如破血消腫則生用補血止血則炒用

天門冬

氣寒　味微苦　苦而辛　氣薄味厚陰也甘平大寒無毒陽中之陰

入手太陰經

足少陰經

象云保肺氣治血熱侵肺上喘氣促加人參黃芪爲主用之神效

心云苦以泄滯血甘以助元氣及治血妄行此天門冬之功也

本草云主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便令面能補久服延年多子孫能行步益氣入手太陰足少陰經榮衛枯澀濕劑所以潤之二門冬人參北五味子枸杞子同爲生脈之劑此上焦獨取寸口之意

日華子云貝母爲使鎮心潤五臟益皮膚悅顏色補五勞七傷治肺氣并嗽消痰及風痺熱毒遊風煩悶吐血去心用

麥門冬

氣寒　味微苦甘　微寒陽中微陰也無毒

入手太陰經

象云治肺中伏火脈氣欲絕加五味子人參三味爲生脈之劑補肺中元氣不足

珍云行經酒浸湯浸去心治經枯

心云補心氣不足及治血妄行補心不足

本草云主心腹結氣傷中傷飽胃絡脈絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈瘦麗強陰益精消穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健美顏色有子地黃車前子爲之使惡款冬花苦瓠畏苦參青蘘入手太陰

衍義云治肺熱之功爲多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服治心肺虛熱及虛勞麥門冬地黃麻仁阿膠潤經益血復脈通心二門冬五味子枸杞子同爲生脈之劑

蕎麥

氣平　味甘　無毒

本草云主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛皆煩淚出久服去面黑斑

心云潤肺除熱

茵陳蒿

氣微寒　味苦平　陰中微陽　無毒

入足太陽經

象云除煩熱主風濕邪結于內去枝梗用葉

本草云治風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏痰入足太陽

仲景茵陳梔子大黃湯治濕熱也梔子栢皮湯治燥熱也如苗澇則濕黃苗旱則燥黃濕則瀉之燥則潤之可也此二藥治陽黃也韓祇和李思訓治陰黃茵陳附子湯大抵以茵陳爲君主佐以大黃附子各隨其寒熱也

珍云治傷寒發黃

艾葉

氣溫　味苦　陰中之陽　無毒

本草云止下痢吐血下部瘡瘡辟風寒令人有子灸百病重午日日未出時不語採

心云溫胃

白頭翁

氣寒　味辛苦　無毒有毒

本草云主溫瘧狂易音洋寒熱瘕瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡鼻衄

心云下焦腎虛純苦以堅之一名野丈人一名胡王使者

百合

氣平　味甘　無毒

本草云主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫膨脹痞滿寒熱邊身疼痛及乳難喉痺止涕

仲景治百合病百合知母湯百合滑石代赭石湯有百合雞子湯百合地黃湯或百合病已經汗者或未經汗下吐者或病形如初或病變寒熱並見活人書治傷寒腹中疼百合一兩炒黃爲末米飲調服

孫眞人云治百合陰毒煮百合濃汁服一升

蕤蕊

氣溫　味甘鹹酸　無毒

本草云主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止痢久服輕身

液云命門相火不足以此補之

玄參

氣寒　味苦鹹　無毒

象云足少陰腎之君藥也治本經須用

本草云主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱肢滿狂邪忽忽不知人溫瘧酒酒血痕下寒血除胸中氣下水止煩渴

易老云玄參乃樞機之管領諸氣上下肅清而不濁風藥中多用之故活人書治傷寒毒玄參升麻湯治汗下吐後毒不散則知爲肅清樞機之劑以此論之治空中氤氳之氣無根之火以玄參爲聖藥

款冬花

氣溫　味甘辛　純陽　無毒

珍云溫肺止嗽

本草云主款逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱邪氣消渴喘息呼吸杏仁爲之使得紫菀良薑皂莢硝石玄參貝母辛夷麻黃黃芪黃芩黃連青箱

藥性論云君主療肺氣心促急熱之勞款連連不絕涕唾稠黏肺痿肺癰吐脓

日華子云潤心肺益五臟除煩補勞劣消痰止嗽肺痿吐血心虛驚悸

衍義云有人病嗽多日或教以燃款冬花三兩枚於無風處以筆管吸其煙滿口則嚥之數日效

時習云仲景射干湯用之

紫參

氣微寒　味苦辛　無毒

本草云主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精

仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩水五升煎紫參取二升卻內甘草煎取半升分溫三服

苦參

氣寒　味苦　氣沉　純陰

心云除濕

本草云主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五臟定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部蜃平胃氣令人嗜食輕身

衍義云有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連胸脛臂腹近陰處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參末爲丸如梧桐子大食後溫水下二十丸至三十丸次日便愈

時習云苦參揩齒久能病腰

蘆根

氣寒　味甘

本草云主消渴客熱止小便金匱玉函治五噎膈氣煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉水三斗煮二斗去粗服無時

射干　又名烏扇

氣平　味苦微溫　有毒

本草云主款逆上氣喉閉咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胸中熱氣

衍義云治肺氣喉痺奏住

仲景治咽中動氣或閉塞烏扇湯中用

時習云仲景射干湯用之

心云去胃癰

敗醬

氣微寒平　味苦鹹　無毒

入足少陰經

手厥陰經

本草云主暴熱火瘡赤風疥瘙疽痔馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛

仲景治腹癰有膿者薏苡仁附子敗醬湯薏苡仁十分附子二分敗醬五分三物爲末取方寸匕以水二升煎取一升頓服之小便當下愈

敗蒲

氣平

本草云主筋溢惡瘡

藥性論云亦可單用主破血取蒲黃赤芍藥當歸大黃礜硝同服治跌撲瘀血

陳藏器云聖惠方治霍亂

葶藶

液云同蘆菪大耳

防己

氣寒　味大苦辛　苦陰也　平無毒

通行十一經

象云治腰以下至足濕熱腫盛脚氣補膀胱去留熱通行十二經去皮用

本草云主風寒溫瘧熱氣諸痼除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止泄散癰腫惡結諸蝎疥癬蟲瘡通膀理利九竅

藥性論云漢防己君又云木防己使畏女菀菌藻去血中濕熱

牽牛

氣寒　味苦　有小毒黑白二種

本草云主下氣療脚滿水腫除風毒利小便

海藏云以氣藥引之則入氣以大黃引之則入血

張文懿云不可躭嗜脫人元氣余初亦疑此藥不可躭嗜後見人有酒食病痞多服食藥以導其氣及服藏用神芎丸及犯牽牛等丸如初服即快藥過再食其病痞依然依前又服其痞隨藥而效藥過後病復至以至久服則脫人元氣而猶不知悔戒之惟當益脾建胃使元氣生而自能消磨水穀其法無以加矣

心云瀉元氣去氣中濕熱凡飲食勞倦皆血受病若以此藥瀉之是血病瀉氣使氣血俱虛損所傷雖去瀉元氣損人不知也經所謂毋盛盛毋虛虛毋絕人長命此之謂也用者戒之白者亦同

羅謙甫云牽牛乃瀉氣之藥試取嚐之便得辛辣之味久而嚼之猛烈雄壯漸漸不絕非辛而何續注味苦寒果安在哉又曰牽牛感南方熱火之化所生者也血熱瀉氣差誤已甚若病濕勝濕氣不得施化致大小便不通則宜用之耳濕去其氣周流所謂五臟有邪更相平也經所謂一臟未平以所勝平之火能平金而瀉肺氣者即此也然仲景治七種濕證小便不利無一藥犯牽牛者仲景豈不知牽牛能瀉濕利小便爲濕病之根在下焦是宜分中氣病不可用辛辣氣藥瀉上焦太陰之氣故也仲景尚不敢輕用如此世醫一槩而用之可乎又曰牽牛辛烈瀉人元氣比諸辛藥尤甚以辛之雄烈故也

三棱

氣平　味苦　陰中之陽　無毒

象云治老癖癥瘕結塊婦人血脉不調心腹刺痛須炮用

珍云破積氣損眞氣虛者勿用

液云又治氣脹血脉不調補五勞通月經消瘀血色白破血中之氣

莪茂

氣溫　味苦辛　無毒

象云治心膈痛飲食不消破痃癖氣最良炮用

本草云治婦人血氣丈夫賁豚治心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒飲食不消酒研服

液云色黑破氣中之血入氣藥發諸香雖爲泄劑亦能益氣故孫用和治氣短不能接續所以大小七香丸集香丸散及湯內多用此也

草龍膽

氣寒　味大苦　氣味厚陰也　無毒

珍云純陰酒浸上行

心云除下焦之濕及翳膜之濕

象云治兩目赤腫睛脹瘀血高起疼痛不可忍以柴胡爲主治眼中疾必用之藥也去蘆

瓜蔞根

氣寒　味苦　味厚陰也

本草云主消渴身熱煩滿大熱補虛安中通月水消腫毒瘡血及熱狂

心云止渴行津液苦寒與辛酸同用導腫氣

珍云苦純陰若心中枯渴者非此不能除

地榆

氣微寒　味甘酸　苦而酸氣味俱厚陰也

本草云主婦人乳產七傷帶下月水不止血崩之疾除惡血止疼痛腸風泄血

象云治小兒疳痢性沉寒入下焦治熱血痢去蘆

心云去下焦之血腸風下血及瀉痢下血須用之

珍云陽中微陰治下部血

紫草

氣寒　味苦　無毒

本草云主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道治腹脹滿去土用茸

茜根

氣寒　味苦　陰中微陽　無毒

珍云去諸死血

藥性論云主治六極傷心肺吐血瀉血

日華子云止鼻洪月經不止

菊花

苦而甘寒　無毒

心云去醫膜明目

珍云養目血

藥性論云使治身上諸風

日華子云治四肢遊風利血脉心煩胸膈壅悶

葶藶

氣大寒　味苦辛　無毒

本草云主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣及皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱痺痒利小便久服令人虛又云療肺壅上氣欬嗽定喘促除胸中痰飲

液云苦甜二味主治同仲景用苦餘方或有用甜者或有不言甜苦者大抵苦則下泄甜則少緩量病虛實用之不可不審本草雖云治同甜苦之味安得不異

榆白皮爲之使惡殭蠶石龍芮仲景葶藶大棗瀉肺湯用之

王不留行

味苦　陽中之陰甘平　無毒

珍云下乳引導用之

藥性論云治風毒通血脉

日華子云治遊風風疹婦人月經不勻

通草

氣平　味甘辛　陽也　無毒燈草同

象云治陰竅不利行小水除水腫閉治五淋生用

珍云瀉肺利小便甘平以緩陰血

日華子云明目退熱催生下胞下乳

木通

氣平　味甘　甘而淡性平味薄陽也　無毒

象云主小便不利導小腸熱去皮用

心云通經利竅

本草云除脾胃寒熱通利九竅血脉關節令人不忘散

癰腫諸結不消隨胎去蟲

瞿麥

氣寒　味苦辛　陽中微陰也

象云主關格諸癃結小便不通治癰腫排膿明目去翳破胎下閉血逐膀胱邪熱用穗

珍云利小便爲君主之用

本草云出刺夾癰腫明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮

車前子

氣寒　味甘鹹　無毒

象云主氣癃閉利水道通小便除濕痺肝中風熱衝目赤痛

本草云主氣癃止痛利水道通小便除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目治目熱赤痛輕身耐老

東垣云能利小便而不走氣與茯苓同功

石韋

此一條與本經無一字同恐別是一物有誤姑存之名遠墨子血見愁疸經草也

時習云今一種作青苔蔕名蟻子槐作血見愁又隰州鼓角樓上一種名血見愁俱能破瘀血時習補或人言紫花似旋風草但花不白又有一種花黃葉似槐結角如菉豆俗呼夾竹梅

局方本草石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡風益精氣

藥性論云使治勞及五淋胞囊結熱不通膀胱熱滿

日華子云治淋遺溺杏仁爲之使得菖蒲良生華陰又有生古瓦屋上者名瓦韋用治淋亦佳

白附子

微溫

珍云主血痺行藥勢

本草云主心痛血痺面上百病行藥勢

胡盧巴

苦純陰

珍云治元氣虛冷及腎虛冷

馬兜鈴

苦陰中微陽　味苦寒　無毒

珍云去肺熱安肺氣補肺

本草云主欬嗽痰結

藥性論云平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連連不止

本草云得槐香子桃仁治膀胱甚效腹脇脹滿面色青黑此腎虛證也

日華子云治痔瘻瘡以藥瓶中燒熏病處入藥炙用是土青木香獨行根子也

聖惠方治五腫蠱毒

圖經云辛名土青木香實主蠱病根治氣下膈止刺痛

白芨

苦甘　陽中之陰　味辛苦平微寒　無毒

珍云止肺溢白歛治證同

本草云主癰腫惡瘡敗傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱緩不收白癬疥蟲

藥性論云使治熱結不消主陰下痿治面上黑皯

天南星　味苦辛　有毒

珍云治同半夏

陳藏器云主金瘡傷折瘀血取根擣傅傷處

日華子云味辛烈治撲損瘀血主蛇蟲咬傅疥癬毒瘡

鬱金　味辛苦　純陰

珍云涼心

局方本草鬱金味辛苦寒無毒主血損下氣生肌止血

破惡血血淋尿血金瘡

藥性論云單用亦可治婦人宿血結聚溫醋磨服

經驗方云尿血不定蔥白相和煎服效

本草云生蜀者佳胡人謂之馬蓯亦啖馬藥用治脹痛

破血而補

佛耳草　氣熱　味酸

象云治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣少用欵冬花爲

使過食損目

蛇床　味苦辛甘平　無毒

本草云主婦人陰中腫痛男子陰瘙濕痒除痺氣利關

節癲癇惡瘡溫中下氣令婦人子臟熱男子陰强久

服輕身好顏色令人有子一名蛇粟蛇米五月採陰

乾惡牡丹巴豆貝母

湯液本草卷中終

木部

桂 桂心肉桂 桂枝附　柏子仁 側柏葉

柏皮 槐實　槐花 蔓荊子

大腹子 酸棗　胡椒 川椒

吳茱萸 山茱萸　益智 厚樸

丁香 沉香　乳香 薰香

檳香 蘇合香　檳榔 槐子

黃蘗 枳實　枳殼 牡丹皮

地骨皮 猪苓　茯苓 茯神

烏藥 乾漆　皂莢 竹葉

竹茹 淡竹葉　苦苦茶 秦皮

桑白皮 梓白皮　桑葚 即凌霄花 訶黎勒

杜仲 琥珀　郁李仁 巴豆

芫花 蘇木　川楝子 金鈴子

沒藥 梧桐淚　桑東南根

果部

大棗 生棗　陳皮 青皮

桃仁 杏仁　烏梅 木瓜

甘李根白皮

菜部

荆芥穗 生薑　乾薑 薄荷

蔥白 韭白　薤白 瓜蔕

冬葵子 蜀葵花　香薷 炊單布

米穀部

粳米 赤小豆　黑大豆 大麥蘖

小麥 神麯　酒 苦酒一名醋一名酢

餂 即膠飴 香豉

玉石部

石膏 滑石　磠硝 盆硝 即芒硝

硝石 玄明粉　硫黃 雄黃

赤石脂 禹餘粮　代赭石 鉛丹

硃砂 硇砂　東流水 甘澗水

禽部

雞子黃

獸部

龍骨 麝香　牛黃 犀角

阿膠 猪膚　猪膽汁 獺肝

猳鼠糞 人尿

元 趙州王好古類集
江陰朱氏校刊本

木部

桂 桂心 桂枝 桂枝附

氣熱 味甘苦 有小毒

入手少陽經

桂枝入足太陽經

本草云主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆能墮胎堅骨節通血脈理疎不足宜導百藥無所畏久服神仙不老生江陽二月八月十月採皮陰乾有菌桂牡桂本桂筒桂肉桂板桂桂心官桂之類用者罕有分別衍義所言不知何緣而得官之名予考本草有出觀賓宜部欽諸州者佳世人以筆畫多而懶書之故只作官也如寫黃蘗作黃栢蓋作姜同意菌桂生交趾山谷牡桂生南海山谷本桂生桂陽從嶺至海處有桂樹惟柳州象州最多本草所說菌桂牡桂板桂厚薄不同大抵細薄者為枝為嫩厚脂者為肉為老處其身者為中也不必色黃為桂心但不用皮與裏止用其身中者為桂心不經水而味薄者亦名柳桂易老用此以治虛人使不生熱也衍義謂桂大熱素問謂辛甘發散為陽故張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也又云療寒以熱故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經謂甘辛大熱正合素問辛甘發散為陽之說尤知菌桂牡桂不及也然本經止言桂而仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮也其

本身麤厚處亦不中用諸家之說但各執一已見終無證據今又謂之官桂不知何緣而立名虛後世以為別物故於此書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也別說交廣商人所販者及醫家見用惟陳藏器之說最是然菌桂厚實氣味厚重者宜入治臟及下焦藥輕薄者宜入治眼目發散藥本經以菌桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒發汗用桂枝桂枝者桂條也非身榦也取其輕薄而能發散一稀柳桂乃小嫩枝條也尤宜入上焦藥仲景湯液用桂枝發表用肉桂補腎本乎天者親上本乎地者親下理之自然性分之所不可移也一有差易為效彌遠歲月既久習以成弊宜後世之不及古也桂心通神不可言之至於諸桂數等皆大小老壯之不同觀作官也本草所言有小毒亦從類化與黃芩黃連為使小毒何施與烏附為使止是全得熱性若與有毒者同用則小毒既去大毒轉甚與人參麥門冬甘草同用能調中益氣則可久服可知此藥能護榮氣而實衛氣則在足太陽經也桂心入心則在手少陰也若指榮字立說止是血藥故經言通血脈也若與巴豆硇砂乾漆川山甲水蛭虻蟲如此有毒之類同用則小毒化為大毒其類化可知矣湯液發汗用桂枝補腎用肉桂小柴胡止云加桂何也藥象謂肉桂大辛補下焦熱火不足治沉寒痼冷及治表虛自汗春夏二時為禁藥

珍云秋冬治下部腹痛非桂不能止也

心云桂枝氣味俱輕故能上行發散於表內寒則肉桂補陽則柳桂桂辛熱散經寒引導陽氣若正氣虛者以辛潤之散寒邪治奔豚

無證據今又謂之官桂不知何緣而立名虛後世以為別物故於此書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也別說交廣商人所販者及醫家見用惟陳藏器之說最是然菌桂厚實氣味厚重者宜入治臟及下焦藥輕薄者宜入治眼目發散藥本經以菌桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒發汗用桂枝桂枝者桂條也非身榦也取其輕薄而能發散一稀柳桂乃小嫩枝條也尤宜入上焦藥仲景湯液用桂枝發表用肉桂補腎本乎天者親上本乎地者親下理之自然性分之所不可移也一有差易為效彌遠歲月既久習以成弊宜後世之不及古也桂心通神不可言之至於諸桂數等皆大小老壯之不同觀作官也本草所言有小毒亦從類化與黃芩黃連為使小毒何施與烏附為使止是全得熱性若與有毒者同用則小毒既去大毒轉甚與人參麥門冬甘草同用能調中益氣則可久服可知此藥能護榮氣而實衛氣則在足太陽經也桂心入心則在手少陰也若指榮字立說止是血藥故經言通血脈也若與巴豆硇砂乾漆川山甲水蛭虻蟲如此有毒之類同用則小毒化為大毒其類化可知矣湯液發汗用桂枝補腎用肉桂小柴胡止云加桂何也藥象謂肉桂大辛補下焦熱火不足治沉寒痼冷及治表虛自汗春夏二時為禁藥

珍云秋冬治下部腹痛非桂不能止也

心云桂枝氣味俱輕故能上行發散於表內寒則肉桂補陽則柳桂桂辛熱散經寒引導陽氣若正氣虛者

栢子仁

氣平 味甘辛 無毒

本草云主安五臟除風濕痺益氣血能長生令人潤澤美顏色耳目聰明用之則潤腎之藥也

藥性論云栢子仁君惡菊花長羊蹄草能治腰腎中冷膀胱冷膽宿水與陽道益壽去頭風治百邪鬼魅主小兒驚癇栢子仁古方十精丸用之

側栢葉

氣微溫 味苦 無毒

本草云主吐血衄血及痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑

藥性論云側栢葉苦辛性溫治冷風歷節疼痛止尿血與酒相宜

栢皮

本草黑字栢皮主火灼爛瘡長毛髮

根實

味苦酸鹹寒 無毒

珍云與桃仁治證同

藥性論云治大熱難產皮煮汁淋陰囊墜腫氣瘤又槐白皮治口齒風疳

日華子云槐子治丈夫女人陰瘡濕痒催生吞七粒皮洗中風皮膚不仁喉痺洗五痔產門痒痛及湯火瘡煎膏止痛長肉消癰腫

槐花

苦薄陰也

珍云涼大腸熱

別錄云槐花味苦無毒治五痔心痛眼赤殺腹臟蟲及熱治皮膚風腸風瀉血赤白痢八月斷槐大枝作生嫩蘖煮汁釀酒療大風瘙痺甚效槐耳主五痔心痛女人陰中瘡痛景天爲之　槐膠主一切風化痰治肝臟風筋脈抽掣急風口噤四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰膝强硬槐葉平無毒煎湯洗小兒驚痫肚熱疥癬丁毒皮莖同用良

蔓荊子

氣清　味辛溫苦甘　陽中之陰　太陽經藥

象云治太陽經頭痛頭昏悶除目暗散風邪藥胃虛人勿服恐生痰疾揀淨杵碎用

珍云涼諸經血止頭痛主目睛內痛

本草云惡烏頭石膏

大腹子

氣微溫　味辛無毒

本草云主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈酷心並以薑鹽同煎時習謂是氣藥也

孫眞人云先酒洗後大豆汁洗仲景用

日華子云下一切氣止霍亂通大小腸建脾開胃調中酸棗

氣平　味酸　無毒

本草云主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺煩心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健久服安五臟輕身延年

胡洽治振悸不得眠人參白朮白茯苓甘草生薑酸棗仁六物煮服

聖惠方膽虛不眠寒也酸棗仁炒香竹葉湯調服

濟衆方膽實多睡熱也酸棗仁生用末茶薑汁調服

胡椒

氣溫　味辛　無毒

本草云主下氣溫中去痰除臟腑中風冷向陽者爲胡椒向陰者爲蓽澄茄胡椒多服損肺味辛辣力大於漢椒

衍義云去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥佐之

川椒

氣熱溫　味大辛　辛溫大熱有毒

象云主邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目利五臟須炒去汗

心云主汗辛熱以潤心寒

本草云主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸癖下痢泄精女子宇乳餘疾散風邪痕結水腫黃疸鬼疰蠱毒耐寒暑開腠理閉口者殺人惡栝蔞防葵長雌黃

吳茱萸

氣熱　味辛苦　氣味俱厚陽中陰也

辛溫大熱　有小毒

入足太陰經少陰經厥陰經

象云食則令人口開目瞪寒邪所隔氣不得上下此病不已令人寒中腹滿膨脹下利寒氣諸藥不可代也洗去苦味曰乾杵碎用

心云去胸中逆氣不宜多用辛熱恐損元氣

珍云溫中下氣溫胃

本草云主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五臟入足太陰少陰厥陰震坤合見其色綠

仲景云吳茱萸湯當歸四逆湯大溫脾湯及脾胃藥皆用此也

衍義云此物下氣最速陽虛人服之愈甚蓽澄爲之使惡丹參消石白蘞畏紫石英

山茱萸

氣平微溫　味酸　無毒

入足厥陰經少陰經

本草云主溫中逐寒濕痺强陰益精通九竅止小便久足少陰厥陰

聖濟經云滑則氣脫澁劑所以收之山茱萸之澁以收其滑仲景八味丸用爲君主如何澁劑以通九竅

雷公云用之去核一斤取肉四兩緩火熬用能壯元氣秘精核能滑精故去之

珍云溫肝

本經云止小便利以其味酸也觀八味丸用爲君主其性味可知矣

藥性論亦云補腎添精

日華子亦云暖腰膝助水臟也

蓽澄茄

氣熱　味大辛　辛溫無毒

主君相二火手足太陰經

足少陰經

本是脾經藥

象云治脾胃中受寒邪和中益氣治多唾當於補中藥

內兼用之勿多服去皮用

本草云主遺精虛漏小便遺瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎之入鹽同煎服有神效

液云主君相二火手足太陰足少陰本是脾藥在集香丸則入肺在四君子湯則入脾在大鳳髓丹則入腎脾肺腎互有子母相關

厚樸

氣溫　味辛　陽中之陰　苦而辛　無毒

象云能治腹脹若虛弱雖腹脹皆斟酌用之寒脹是大熱藥中兼用結者散之神藥誤用脫人元氣切禁之紫色者佳去皮薑汁製微炒

珍云去腹脹厚腸胃

心云味厚陰也專去腹脹滿去邪氣

本草云主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止泄痢淋露除驚去留熱心煩消厚腸胃

本經云治中風傷寒頭痛溫中益氣消痰下氣厚腸胃去腹脹滿果泄氣乎果益氣乎若與枳實大黃同用則能泄實滿本經謂消痰下氣者是也若與橘皮蒼朮同用則能除濕滿本經謂溫中益氣者是也與解利藥同用則治傷寒頭痛與痢藥同用則厚腸胃大抵苦溫用苦則泄用溫則補

衍義云平胃散中用之最調中至今盛行既能溫脾胃又能走冷氣

海藏云加減隨證如五積散治療同

本草又云乾薑爲使惡澤瀉寒水石硝石

丁香

氣溫　味辛　純陽　無毒

入手太陰經

足陽明經少陰經足陽明胃足少陰腎

象云溫脾胃止霍亂消痃癖氣脹反胃腹內冷痛壯陽暖腰膝殺酒毒

珍云去胃中之寒

本草云主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫牙齒痒蠱能發諸香能療反胃腎氣奔豚氣陰痛壯陽暖腰膝消痃癖除冷勞

液云與五味子廣茂同用亦治奔豚之氣能泄肺能補胃大能療腎

沉香

氣微溫　陽也

本草云治風水毒腫去惡氣能調中壯陽暖腰膝破癥癖冷風麻痺骨節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢止轉筋吐瀉

東垣云能養諸氣上而至天下而至泉用爲使最相宜

珍云補右命門

乳香

氣味微溫　無毒

珍云定諸經之痛

藿香

氣微溫　味甘辛　陽也甘苦純陽　無毒

入手足太陰經肺脾

象云治風水去惡氣治脾胃吐逆霍亂心痛去枝梗用葉

心云芳馨之氣助脾開胃止嘔

珍云補衛氣益胃進食

本草云主脾胃嘔逆療風水毒腫去惡氣療留亂心痛溫中快氣酒口臭上焦壅煎湯漱口入手足太陰入順氣烏藥則補肺入黃芪四君子湯則補脾

檀香

氣溫　味辛熱　無毒

入手太陰經

足少陰經

通行陽明經

本草云主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲又云治腎氣諸痛腹痛消熱腫

東垣云能調氣而清香引芳香之物上行至極高之分最宜橙橘之屬佐以薑棗將以葛根豆蔻縮砂益智通行陽明之經在胃膈之上處咽嗌之中同爲理氣之藥

珍云主心腹霍亂中惡引胃氣上升進食

蘇合香丸

味甘溫　無毒

本草云主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癎癡去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中臺川谷

禹錫云按梁書云中天竺國出蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也

檳榔

氣溫　味辛苦　味厚氣輕陰中陽也　純陽

無毒

象云治後重如神性如鐵石之沉重能墜諸藥至於下
極杵細用
心云苦以破滯辛以散邪專破滯氣下行
珍云破滯氣泄胃中至高之氣
本草云主消穀逐水除痰癖下三蟲去伏尸療寸白蟲

梔子

氣寒　味微苦　味苦性大寒味薄陰中陽也
無毒
入手太陰經
象云治心煩懊憹而不得眠心神顛倒欲絕血溺小便
不利杵細用
心云去心中客熱除煩燥與豉同用
珍云止渴去心懊憹煩躁
本草云主五內邪氣胃中熱氣面赤酒齄皶鼻白癜赤
癩瘡瘍療曰熱赤病胃心大小腸大熱心中煩悶胃
中熱氣
仲景用梔子治煩胃為至高之分也故易老云輕浮而
象肺也色赤而象火故能瀉肺中之火本草不言吐
仲景用此為吐藥梔子本非吐藥為邪氣在上拒而
不下故令上吐邪因得以出經曰其高者因而越之
此之謂也或用梔子利小便實非利小便清肺也肺
氣清而化膀胱為津液之府小便得此氣化而出也
本經謂治大小腸熱辛與庚合又與丙合又能泄戊
其先入中州故也入手太陰梔子豉湯治煩躁煩者
氣也躁者血也氣主肺血主腎故用梔子以治肺煩
用香豉以治腎躁躁者懊憹不得眠也少氣虛滿者
加甘草若嘔噦者加生薑橘皮下後腹滿而煩梔子

厚樸枳實湯下後身熱微煩梔子甘草乾薑湯梔子
大而長者染色不堪入藥皮薄而圓七稜至九稜者
名山梔子所謂越桃者是也
衍義云仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠者劇者
必反覆顛倒心中懊憹以梔子豉湯治虛煩故不用
大黃以有寒毒故也梔子雖寒無毒治胃中熱氣既
亡血亡津液臟腑無潤養內生虛熱非此不可降又
治心經留熱小便赤澁去皮用梔子火煨大黃亦是
甘草炙等分末之水煎三錢七服之無不效
仲景傷寒論及古今諸名醫治發黃皆用梔子茵陳香
豉甘草四物等分作湯飲之又治大病起勞復皆用
梔子鼠矢等湯並利小便而愈其方極多不可悉載
用仁去心胷中熱用皮去肌表熱

黃蘗

氣寒　味苦　苦厚微辛陰中之陽降也
無毒
足太陽經引經藥
足少陰經之劑
象云治腎水膀胱不足諸痿厥腳膝無力於黃芪湯中
少加用之使兩膝中氣力湧出痿即去矣蜜炒此一
味為細末治口瘡如神癱瘓必用之藥
珍云瀉膀胱之熱利下竅
心云太陽經引經藥瀉膀胱經火補本經及腎不足苦
寒安枕療下焦虛堅腎經曰苦以堅之
本草云主五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止泄痢女子漏
下赤白陰傷蝕瘡療鵝氣在皮間肌膚熱赤起目熱
赤痛口瘡久服通神

液云足少陰劑腎苦燥故腎停濕也梔子黃芩入肺黃
連入心黃蘗入腎燥濕所歸各從其類也活人書解
毒湯上下內外通治之惡乾漆

枳實

氣寒　味苦酸鹹　純陽　無毒
象云除寒熱破結實消痰癖治心下痞逆氣脇痛麩炒
用
心云潔古用去脾經積血故能去心下痞脾無積血則
心下不痞治心下痞散氣消宿食苦寒炙用破水積
以泄裏除風
珍云去胃中濕
本草云主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢
長肌肉利五臟益氣輕身除胷胷脇痰癖逐停水破結
實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止瀉泄
明目生河內川澤商州者佳益氣則佐之以人參乾
薑白朮破氣則佐之以大黃牽牛芒硝此本經所以
言益氣而復言消痞也非白朮不能去濕非枳實不
能除痞殼主高而實主下高者主氣下者主血主氣
者在胷脇主血者在心腹仲景治心下堅大如盤水
飲所作枳實白朮湯主之枳實七枚朮三兩水一斗
煎取三升分三服腹中軟即消
衍義云枳殼枳實一物也小則性酷而速大則性詳而
緩故仲景治傷寒卒之病承氣湯中用枳實此其
意也皆服其疎通決泄破結實之義他方但導敗風
壅之氣可常服者故用枳殼故胷中痞有結便枳殼
湯心下痞有枳實白朮湯高低之分易老詳定為的
也

枳殼

氣寒　味苦　苦而酸微寒　味薄氣厚陽也

陰中微陽　無毒

象云治脾胃痞塞泄肺氣麩炒用

心云利胃中氣勝濕化痰勿多用損胃中至高之氣

珍云破氣

本草云主風痒麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胃脹痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛

藥性論云枳殼使味苦辛治遍身風疹肌中如麻豆瘙痒殼高主皮毛胃脹之病實低主心胃之病其主治大同小異

牡丹皮

氣寒　味苦辛　陰中微陽辛苦微寒　無毒

手厥陰經

足少陰經

象云治腸胃積血及衄血吐血必用之藥

珍云凉骨蒸

本草云主寒熱中風痰痰痓驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五臟療癰瘡除時氣頭痛客熱五勞之氣腰痛風痺癲疾

易老云治神志不足神不足者手少陰志不足者足少陰故仲景八味丸用之牡丹乃天地之精華花之首葉爲陽發生花爲陰成實丹爲赤即火故能瀉陰中之火牡丹皮手厥陰足少陰治無汗骨蒸地骨皮足少陰手少陽治有汗骨蒸也

地骨皮

氣寒　味苦　陰也大寒　無毒

足少陰經

手少陽經

象云解骨蒸肌熱主風濕痺消渴堅筋骨去骨用根皮

心云主肌熱及骨中之熱

珍云凉血凉骨

本草云主五內邪氣熱中消渴周痺風濕下膈筋氣客熱頭痛補內傷大勞嘘吸堅筋骨強陰利大小腸

藥性論云根皮細剉麩拌熟焙呑之主腎家風益精氣

衍義云枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實實微寒皮寒根大寒

猪苓

氣平　味甘苦甘寒　甘苦而淡甘重於苦陽也

無毒

入足太陽經少陰經足太陽膀胱足少陰腎

象云除濕此諸淡滲藥大燥亡津液無濕證勿服去皮用

心云苦以泄滯甘以助陽淡以利竅故能除濕利小便

珍云利小便

本草云主痎瘧解毒蠱疰不祥利水道能療妬娠淋又治從脚上至腹腫小便不利仲景少陰渴者猪苓湯入足太陽少陰

衍義云行水之功多人服必損腎氣昏人目果欲久服者便宜詳審

茯苓

氣平　味淡　味甘而淡陽也　無毒

白者入手太陰經足太陽經少陽經

赤者入足太陰經手太陽經少陰經

象云止渴利小便除濕益燥和中益氣利腰臍間血爲主治小便不通溺黃或赤而不利如小便利或數服之則大損人目如汗多人服之損真氣天人寶醫云赤瀉白補上古無此說去皮用

心云淡能利竅甘以助陽除濕之聖藥也味甘平補陽益脾逐水濕淋所勝小便不利淡味滲泄陽也治水緩脾生津導氣

珍云甘純陽滲泄止渴

本草云主胷脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口燥舌乾利小便止消渴好唾大腹淋瀝消腫中痰水腫淋結開胃腑調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神守中

液云入足少陰手足太陽色白者入辛壬癸赤者入丙丁伐腎邪小便多能止之小便澁能利之與車前子相似雖利小便而不走氣酒浸與光明硃砂同用能祕眞味甘平如何是利小便

茯神

陽也　味甘　無毒

珍云治風眩心虛非此不能安

藥性論云君主驚癇安神定志補虛之主心下急痛堅滿人虛而小便不利者

烏藥

氣溫　味辛　無毒

入足陽明經少陰經

本草云主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹中諸蟲又云去猫涎極妙烏藥葉及根嫩時採作茶片

炙醋煎服能補中益氣偏止小便滑數

乾漆

氣溫平　味辛　有毒

本草云主絕傷補中續筋骨塡髓腦安五臟治五緩六急風寒濕痺療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子痼瘕利小腸去蚘蟲生漆去長蟲半夏爲之使畏雞子忌油脂

皂莢

氣溫　味辛鹹　有小毒

引入厥陰經藥

本草云主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅療腹脹滿消穀除欬嗽治聾縮婦人胞不落明目益精可爲泳藥不入湯

日華子云通關節除濕風消痰殺勞蟲治骨蒸開胃破堅瘕腹中痛能墮胎栢實爲之使惡麥門冬畏空青人參苦參

仲景治欬逆上氣唾濁但坐不得卧皂莢丸主之杵末一物蜜丸桐子大用棗湯服一丸日三夜一

活人書治陰毒正陽散內用皂莢引入厥陰也用之有蜜炙酥炙燒灰之異等分依方

竹葉

氣平　味辛又苦大寒　辛平無毒

本草云主欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲除煩熱風痙喉痺嘔吐仲景竹葉湯用淡竹葉

心云除頂熱緩皮而益氣

珍云陰中微陽涼心經

竹茹

氣微寒　味苦

本草云主嘔噦溫氣寒熱吐血崩中溢筋

淡竹葉

氣寒　味辛平

本草云主胃中痰熱欬逆上氣

藥性論云淡竹葉主吐血熱毒風壓丹石藥毒止渴

日華子云淡竹及根消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風並懷孕婦人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇天弔草藥同用見局方本草今錄附於此

茗苦茶

氣微寒　味苦甘　無毒

入手足厥陰經

液云飲茶是也清頭目利小便消熱渴下氣消食令人少睡中風昏憒多服不醒宜用此入手足厥陰茗苦茶苦甘微寒無毒主瘻瘡利小便去痰熱渴治陰證湯藥內用此去格拒之藥及治伏陽大意相似茶苦經云苦以泄之其體下行如何是清頭目

秦皮

氣寒　味苦　無毒

液云主熱利下重下焦虛經云以苦堅之故用白頭翁黃蘗秦皮苦之劑也治風寒濕痺目中青翳白膜男子少精婦人帶下小兒驚癇宜作湯洗目俗呼爲白蘚木取皮清水浸出青藍色與紫草同用以增光彩尤佳大戟爲之使惡吳茱萸

桑白皮

氣寒　味苦酸　甘而辛　甘厚辛薄　無毒

入手太陰經

藥云主傷中五勞羸瘦補虛益氣除肺氣止唾血熱渴消水腫利水道

心云甘以固元氣辛以瀉肺氣之有餘

本草云治傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可縫金瘡出土者殺人續斷麻子桂心爲之使忌鐵鉛

梓白皮

氣寒　味苦　無毒

本草云主熱去三蟲治目中疾生河內出谷今近道皆有之木似梧桐

紫葳 即凌霄花

氣微寒　味酸　無毒

本草云主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎莖葉味苦無毒主痤瘡利小便去痰熱渴治陰證

日華子云根治熱風身痒遊風風疹治痰血帶下花葉功用同又云凌霄花治酒齄熱毒風刺婦人血瘕遊風崩中帶下

衍義云木也紫葳花是也畏鹵鹹

訶黎勒

氣溫　味苦　苦而酸性平　味厚陰也降也

藥云主腹脹滿不下飲食消痰下氣通利津液破胃脘結氣治久痢赤白腸風去核搗細用

心云經曰肺苦氣上逆急食苦以泄之以酸補之苦重瀉氣酸輕不能補肺故嗽藥中不用俗名訶子隨風

子

本草云主冷氣心腹滿下食仲景治氣痢以訶黎勒十枚麪裹煨灰火中煨之令麪黃熟去核細研爲末和粥飲頓服

衍義云氣虛人亦宜緩緩煨熟少服此物能澁腸而又泄氣蓋其味苦澁故爾其子未熟時風飄墮者謂之隨風子

杜仲

味辛甘平溫　無毒　陽也降也

本草云主腰脊痛補中益精氣堅筋骨强志除陰下濕痒小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕身耐老惡蛇脫皮玄參

日華子云駿治腎勞腰脊變入藥炙用

琥珀

氣平　味甘　陽也

珍云利小便清肺

本草云安五臟定魂魄消瘀血通五淋杵細用

藥性論云君治產後血疹痛

日華子云療蠱毒壯心明目磨臀止心痛癲邪破癥結

郁李仁

味苦辛　陰中之陽　辛苦陰也

珍云破血潤燥

本草云郁李仁主齒斷腫齲齒堅齒去白蟲

藥性論云根治齒痛宜結氣破積聚

日華子云根涼無毒治小兒發熱作湯浴風蚛牙澀煎之

巴豆

氣溫　味辛　生溫熟寒　有大毒

本草云主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩滌五臟六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰癢殺斑猫毒健脾開胃易老云斬關奪門之將大宜詳悉不可輕用

雷公云得火則良若急治爲水穀道路之劑去皮心膜油生用若緩治爲消堅磨積之劑炒烟去令紫黑研用可以通腸可以止泄世所不知也仲景治百病客忤備急圓主之巴豆杏仁例及加減寒熱佐使五色并條例並見元戎

珍云去胃中寒濕

芫花

氣溫　味辛苦　有小毒

本草云主欬逆上氣喉鳴喘急咽腫短氣蠱毒鬼疰腫脹痞殺蟲魚消飲中痰水喜唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛仲景治太陽中風脇下痛下逆者可攻十棗湯主之

液云胡洽治痰癖飲癖加以大黃甘草五物同煎以相反主之欲其大吐也治之大略水者肺腎胃三經所主有五臟六腑十二經之部分上而頭中而四肢下而腰臍外而皮毛中而肌肉內而筋骨脉有尺寸之殊浮沉之異不可輕瀉當知病在何經何臟隨用則害深然大意泄濕內云五物者即甘遂大戟芫花大黃甘草也

蘇木

氣平　味甘鹹　甘而酸辛性平

甘勝於酸辛　陽中之陰也無毒

本草云主破血產後血脹悶欲死者排膿止痛消癰腫瘀血婦人月水不調及血聲口噤

心云性平甘勝於酸辛去風與防風同用

珍云破死血

川楝子

氣寒　味苦平　有小毒

本草云治傷寒大熱煩躁殺三蟲疥瘍利小便作細用

珍云入心主上下部腹痛

金鈴子

酸苦　陰中之陽

珍云心暴痛非此不能除即川楝子也

沒藥

味苦平　無毒

本草云主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中臀暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊大小不定黑色

梧桐淚

味鹹

珍云療瘧非此不能除

本草云味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差

日華子云治風蚛牙齒痛殺火毒并麪毒

海藥云主風痟蠱齒牙疼痛骨髓風勞能軟一切物多服令人吐也又爲金銀銲藥

桑東南根

時習云根朕無毒研汁治小兒天弔驚痫客忤及傅瘡

口瘡大效

果部

大棗

氣溫　味甘　氣厚陽也　無毒

珍云味甘補經不足以緩陰血

液云主養脾氣補津液强志三年陳者核中仁主腹痛惡氣卒痓忤治心懸經云助十二經脉治心腹邪氣和百藥通九竅補不足氣生者多食令人腹脹注泄蒸熟食補腸胃肥中益氣中滿者勿食甘甘者令人中滿故大建中湯心下痞者減飴糵與甘草同例

生棗

味甘辛

多食令人多寒熱羸瘦者不可食葉覆麻黃能令出汗生河東平澤殺烏頭毒

陳皮

氣溫　味微苦　辛而苦　味厚陰也　無毒

象云能益氣加青皮減半去滯氣推陳致新若補脾胃不去白若理胃中肺氣須去白

心云導胃中滯氣除客氣有白朮則補脾胃無白朮則瀉脾胃然勿多用也

珍云益氣利肺有甘草則補肺無甘草則瀉肺

本草云主胃中痰熱逆氣利水穀下氣止嘔欬除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀氣衝胃中吐逆霍亂止瀉去寸白蟲能除痰解酒毒海藻治酒毒

葛根陳皮茯苓甘草生薑湯手太陰氣逆上而不下宜以此順之陳皮白桓爲之使其芳香之氣清奇之味可以奪橙也

青皮

氣溫　味辛　苦而辛性寒氣厚陰也

足厥陰經引經藥

又入手少陽經

象云主氣滯消食破積結膈氣去穰

心云厥陰經引經藥也有滯氣則破滯氣無滯氣則損眞氣

液云主氣滯下食破積結及膈氣或云與陳皮一種青皮小而未成熟成熟而大者橘也色紅故名紅皮日久者佳故名陳皮如枳實枳殼一種實小而青未穰殼大而黃漿色已穰故殼高而治胸膈實低而治心下與陳皮治高青皮治低同意又云陳皮青皮二種枳實枳殼亦有二種

桃仁

氣溫　味苦甘性平　苦重於甘陰中陽也

無毒

入手足厥陰經

象云治大便血結血祕血燥通潤大便七宜丸中專治血結破血以湯浸去皮尖研如泥用

心云苦以泄滯血甘以生新血故凝血須用又去血中之熱

本草云主瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血通月水止痛破血入手足厥陰

衍義云老人虛祕與柏子仁大麻仁松子仁等分同研

鎔白蠟和丸如桐子大以少黃丹湯下仲景治中焦畜血用之

杏仁

氣溫　味甘苦冷利　有小毒

入手太陰經

象云除肺燥治風燥在胃腑間麩炒去皮尖用

心云散結潤燥散肺之風及熱是以風熱嗽者用之

本草云主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心賁豚驚癇心下煩熱風氣往來時行頭痛解肌消心下急殺狗毒破氣入手太陰王朝奉治傷寒氣上喘衝逆者麻黃湯內加杏仁陳皮若氣不喘衝逆者減杏仁陳皮知其能瀉肺也

東垣云杏仁下喘用治氣也桃仁療狂用治血也桃杏仁俱治大便祕當以氣血分之晝則難便行陽氣也夜則難便行陰血也大腸雖屬庚爲白腸以晝夜言之氣血不可不分也年虛人大便燥祕不可過泄者脉浮在氣杏仁陳皮脉沉在血桃仁陳皮所以俱用陳皮者以其手陽明病與手太陰俱爲表裏也賁門上主往來魄門下主收閉故王氏言肺與大腸爲通道也

烏梅

氣平　味酸　酸溫陽也　無毒

藥云主下氣除熱煩滿安心調中治痢止渴以鹽爲白梅亦入除痰藥去核用

心云收肺氣

本草云主肢體痛偏枯不仁死肌去青黑惡肉除惡疾止下痢好唾口乾去骨間熱又方治一切惡瘡肉出以烏梅燒爲灰杵末傅上惡肉立盡仲景治吐蚘下痢烏梅丸

木瓜

氣溫　味酸
入手足太陰經
本草云治脚氣濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止益肺而去濕和胃而滋脾
衍義云木瓜得木之正故入筋以鉛白霜塗之則失酸味受金制也此物入肝故益筋與血病腰腎脚膝無力此物不可缺也
東垣云氣脫則能收氣滯則能和
雷公云調榮衛助穀氣是也
甘李根白皮
時習云根皮大寒主消渴止心煩氣逆奔豚仲景奔豚湯中用之
茱部
荆芥穗
氣溫　味辛苦
本草云碎邪毒利血脉通宣五臟不足氣能發汗除勞渴杵和醋封毒腫去枝梗手搓碎用治產後血暈如神動渴疾多食薰五臟神破結氣
生薑
氣溫　味辛　辛而甘微溫　氣味俱輕陽也
無毒
象云主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐治痰嗽生與乾同治與半夏等分治心下急痛鍼細用
心云能制半夏厚樸之毒發散風寒益元氣大棗同用辛溫與芍藥同用溫經散寒嘔家之聖藥也辛以散之嘔爲氣不散也此藥能行陽而散氣
珍云益脾胃散風寒久服去臭氣通神明

孫眞人云爲嘔家之聖藥
或問東垣曰生薑辛溫入肺如何是入胃口曰俗所以心下爲胃口者非也咽門之下受有形之物係胃之系更爲胃口與肺同處故入肺而開胃口也又問曰人云夜間勿食生薑食則令人閉氣何也曰生薑辛溫主開發夜則氣本收斂反食之開發其氣則違天道是以不宜食此以平人論之可也若有病則不然
薑屑比之乾薑不熱比之生薑不潤以乾生薑代乾薑者以其不偕故也
本草云秦椒爲之使殺半夏萆岩毒藤黃芩黃連天雄
糞
乾薑
氣熱　味大辛　辛大熱　味薄氣厚陽中之陰也　辛溫無毒
象云治沉寒痼冷腎中無陽脉氣欲絕無附子爲引用水煎二物名薑附湯亦治中焦有寒水泛慢火炮
心云發散寒邪如多用則耗散元氣辛以散之是壯火食氣故也須以生甘草緩之辛熱散裏寒散陰寒肺寒與五味同用治嗽以勝寒此正氣虛者散寒與人參同補藥溫胃腹中寒其平以辛熱
珍云寒性所勝以辛散之經炮則味苦
本草云主胃滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下利寒冷腹痛中惡霍亂腹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良主胃滿溫脾燥胃所以理中其實主氣而泄脾
易老云乾薑能補下焦去寒故四逆湯用之乾薑本味辛及見火候稍苦故止而不移所以能治裏寒非若附子行而不止也理中湯用此者以其四順也
或云乾薑味辛熱人言補脾今言泄而不言補者何也東垣謂泄之一字非泄脾之正氣也是泄脾中寒濕之邪故以薑辛熱之劑燥之故曰泄脾也
薄荷
氣溫　味辛苦　辛涼　無毒
手太陰經厥陰經藥
象云能發汗通骨節解勞乏與雞相宜新病瘦人勿多食令虛汗出不止去枝梗搗碎用
心云上行之藥
陳士良云能引諸藥入榮衛又生風氣與併
蔥白
氣溫　味辛　無毒
入手太陰經
足陽明經
液云以通上下之陽也活人書傷寒頭痛如破連鬚蔥白湯主之
心云通陽氣辛而甘氣厚味薄陽也發散風邪
本草云蔥實主明目補中不足其莖白平可作湯主傷寒寒熱出汗中風面目腫傷寒骨肉痛喉痺不通安胎歸目除肝邪氣安中利五臟益目精殺百藥毒蔥根主傷寒頭痛蔥汁平溫主溺血解藥毒
韭白
氣溫　味辛微酸　無毒
本草云歸心安五臟除胃中熱利病人可久養子主夢泄精溺白根養髮陰中變爲陽
薤白

氣溫　味苦辛　無毒

入手陽明經

本草云主金瘡瘡敗輕身不饑耐老除寒熱去水氣溫中散結利病人諸瘡中風寒水腫以此除之下重者氣滯也四逆散加此以泄氣滯

心云治泄痢下重下焦氣滯泄滯氣

瓜蔕

氣寒　味苦　有毒

本草云治大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆上氣及食諸果病在胸腹中者皆吐下之去胸中息肉癡黃疸鼻中出黃水除偏頭痛有神頭目有濕宜此瓜蔕苦以治胸中寒與白虎同例俱見知母條下炙廚香細辛同爲使治久不聞香臭仲景鈴方瓜蔕一十四箇丁香一箇黍米四十九粒爲末合水搗一字取下

冬葵子

氣寒　味甘　無毒

本草云主五臟六腑寒熱羸瘦五癃利小便療婦人乳難內閉久服堅筋骨長肌肉輕身

衍義云性滑利不益人患癰癤毒熱內攻未出膿者水吞三五粒遂作發膿出

蜀葵花

冷陰中之陽

珍云赤者治赤帶白者治白帶赤治血燥白治氣燥

香薷

味辛微溫

本草云主霍亂腹痛吐下散水腫

欽單布　江陰朱氏校刊本

液云仲景治墜馬及一切筋骨損方中用時習補入

米穀部

粳米

氣微寒　味甘苦　甘平無毒

入手太陰經少陰經

液云主益氣止煩止渴止泄與熟雞頭相合作粥食之可以益精強志耳目聰明本草諸家共言益脾胃如何白虎湯用之人肺以其陽明爲胃之經色爲西方之白故入肺也然治陽明之經即在胃也色白味甘寒入手太陰又少陰證桃花湯用此甘以補正氣竹葉石膏湯用此甘以益不足

衍義云平和五臟補益胃氣其功莫逮然稍生則復不益脾過熟則佳

赤小豆

氣溫　味辛甘酸　陰中之陽　無毒

本草云主下水排膿寒熱熱中消渴止泄利小便吐逆卒澼下脹滿又治水腫通建脾胃赤小豆食之行小便久食則虛人令人黑瘦枯燥赤小豆花治宿酒渴病即腐婢也花有腐氣故以名之與萬花末服方寸匕飲酒不知醉氣味平辛大豆黃卷是以生豆爲蘖待其芽出便曝乾用方書名黃芩皮產婦藥中用之性平

黑大豆

氣平　味甘

本草云塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛解烏頭毒除胃中熱痺傷中淋露逐水服下療血久服令人身重炒令黑烟未斷熱投酒中治風痺癱瘓口噤產後諸風食罷生服半掬去心胸煩熱明目鎮心不忘惡五參能膽得前胡烏喙杏仁牡蠣良

大麥蘖

氣溫　味甘鹹　無毒

象云補脾胃虛寬腸胃先杵細炒黃取麪用

本草云能消化宿食破癥結冷氣去心腹脹滿開胃止霍亂除煩去痰治產後祕結鼓脹不通大麥蘖并神麯二藥氣虛人宜服以代戊己腐熟水穀與豆蔻縮砂木瓜芍藥五味子烏梅爲之使

小麥

氣微寒　味甘　無毒

本草云除熱止燥渴咽乾利小便養肝氣止漏血唾血

青囊散有小麥百粒治大人小兒骨蒸肌熱婦人勞熱

神麯

氣暖　味甘

入足陽明經

象云消食治脾胃食不化須於脾胃藥中少加之微炒黃用

珍云益胃氣

本草云療臟腑中風氣調中下氣開胃消宿食主霍亂心腹氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷氣除腸胃中塞不下食令人好顏色落胎下鬼胎又能治小兒腹堅大如盤胃中滿胎動不安或腰痛搖心下血不止火炒以助天五之氣入足陽明

酒

氣大熱　味苦甘辛　有毒

本草云主行藥勢殺百邪惡毒氣能行諸經不止與附子相同味辛者能散味苦者能下味甘者居中而緩也為導引可以通行一身之表至極高之分若味淡者則利小便而速下大海或凝惟酒不氷三人晨行遇大寒一人食粥者病一人腹空者死一人飲酒者安則知其大熱也

苦酒一名醋一名醯

氣溫　味酸　無毒

液云斂咽瘡主消癰腫散水氣殺邪毒余初錄本草苦酒條本經一名醯又一名苦酒如為一物也及讀金匱治黃疸有水黃醇酒湯右以美清酒五升煮二升苦酒也前治黃汗有黃芪芍藥桂枝苦酒湯

飴即膠飴

氣溫　味甘　無毒

入足太陰經藥

液云補虛乏止渴去血以其色紫凝如深琥珀色謂之膠飴色白而枯者非膠飴即餳糖也不入藥用中滿不宜用嘔家切忌為足太陰經藥仲景謂嘔家不可用建中湯以甘故也

香豉

氣寒　味苦　陰也無毒

象云治傷寒頭痛煩躁滿悶生用

珍云去心中懊憹

本草云主傷寒頭痛寒熱傷寒初覺頭痛內熱脉洪起一二日便作此加減蔥豉湯蔥白一虎口豉一升綿裹以水三升煎取一升頓服取汁若不汗加葛根三兩水五升煮二升分二服又不汗加麻黃三兩去節

玉石部

石膏

氣寒　味甘辛微寒大寒　無毒

入手太陰經少陽經

足陽明經

象云治足陽明經中熱發熱惡熱燥熱日晡潮熱自汗小便滑赤大渴引飲肌肉壯熱苦頭痛之藥白虎湯是也善治本經頭痛若無餘証勿用

心云細理白澤者良甘寒胃經大寒藥潤肺除熱發散陰邪緩脾益氣

珍云辛甘陰中之陽止陽明經頭痛胃弱不可服下牙痛須用香白芷

本草云主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中膈氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯

太上云石膏發汗辛寒入手太陰也

東垣云微寒足陽明也又治三焦皮膚大熱手少陽也

仲景治傷寒陽明証身熱目痛鼻乾不得卧身已前胃之經也胃胃肺之室邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺所以號為白虎湯也雞子為之使惡莽草

馬目毒公

藥性論云石膏使惡巴豆唐本註療風去熱解肌

滑石

氣寒　味甘大寒　無毒

入足太陽經

象云治前陰不利性沉重能泄上氣令下行故曰滑則利竅不可與淡滲同用白者佳杵細水飛用

本草云主身熱洩澁女子乳難癃閉利小便蕩腸胃積聚寒熱益精氣通九竅六腑津液去損結止渴令人利中入足太陽滑能利竅以通水道為至燥之劑猪苓湯用滑石與阿膠同為滑利以利水道蔥豉生薑同煎去柤澄清以解利淡味滲泄為陽解表利小便也若小便自利不宜以此解之

衍義云暴吐逆不下食以生細末二錢七溫水調服後以熱麵壓之

礫硝

氣寒　味辛苦

象云除寒熱邪氣逐六腑積聚結痼血癖胃中食飲熱結去血閉停痰痞滿消毒採細生用

盆硝即芒硝

氣寒　味鹹

心云去實熱經云熱淫于內治以鹹寒此之謂也

珍云純陰熱淫于內治以鹹寒

本草云主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中瘀實結轉通經脉及月水破五淋消腫毒療天行熱病

藥性論云使味鹹有小毒通月閉癥瘕下瘰癧黃疸主漆瘡散惡血

愚方治伐指用芒硝煎湯淋漬之愈

硝石

氣寒　味甘辛　作苦辛大寒無毒又云微又云甜甜微綏於鹹

液云硝石者硝之總名也但不經火者謂之生石礫硝

經火者謂之盆硝芒硝古人用辛今人用鹹辛能軟
燥鹹能軟堅其意皆是老弱虛人可下者宜用芒硝
此者以玄明粉代尤佳本經謂利小便而墮胎傷寒
姙娠可下者用此兼以大黃引之直入大腸潤燥軟
堅瀉熱子母俱安經云有故無殞亦無殞也此之
謂歟以在下言之則便溺俱陰以前後言之則前氣
後血以腎言之總主大小便難溺澁祕結俱爲水少
經云熱注於內治以鹹寒佐以苦故用芒硝大黃相
須爲使也

玄明粉

氣冷　味辛甘　無毒

液云治心熱煩躁五臟宿滯癥瘕明目逐膈上虛熱消
腫毒註中有治陰毒一句非伏陽不可用若止用此
除陰毒殺人甚速牙硝條下太清鍊靈砂輔注謂陰
極之精能化火石之毒

仙經云陰中有陽之物

硫黃

氣溫大熱　味酸　有毒

本草云主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭痒療心腹
積聚邪氣冷癖在脇欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻
衄惡瘡下部䘌瘡止血殺疥蟲

液云如太白丹佐以硝石來復丹用硝石之類至陽佐
以至陰與仲景白通湯佐以人溺猪膽汁大意相同
所以去格拒之寒兼有伏陽不得不爾如無伏陽只
是陰證更不必以陰藥佐之也硫黃亦號將軍功能
破邪歸正返滯還清挺出陽精消陰化魄生魂

雄黃

氣溫寒　味苦甘　有毒

本草云主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌療疥蟲蠹瘡目痛
鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡
腹痛鬼疰

赤石脂

氣大溫　味甘酸辛　無毒

本草云主養心氣明目益精療腹痛泄癖下利赤白小
便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久
服補髓好顏色益志不饑輕身延年五色石脂各人
五臟補益

東垣云赤石脂白石脂並溫無毒畏黃芩芫花惡大黃

本經云澁可去脫石脂爲並溫無毒畏黃芩芫花惡大
以下之赤入丙白入庚

珍云赤白石脂俱甘酸陽中之陰固脫
心云甘溫篩末用去脫澁以固腸胃

局方本草云青石脂養肝膽氣明目黑石脂養腎氣強
陰益陰蝕瘡黃石脂養脾氣除黃疸餘與赤白同功
禹餘糧

氣寒　味甘　無毒

本草云主欬逆寒熱煩滿下痢赤白血閉癥瘕大熱

本草云重可去怯禹餘糧之重爲鎮固之劑

本草註云仲景治傷寒下痢不止心下痞硬利在下焦
者赤石脂禹餘糧湯主之赤石脂禹餘糧各一斤並
碎之以水六升煎取二升去粗分二服

雷公云看如石輕敲便碎可如粉也兼重重如葉子雖
黃此能益脾安胃

代赭石

氣溫寒　味苦甘　有毒

本草云主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌療疥蟲蠹瘡目痛
鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡
腹痛鬼疰

赤石脂

氣大溫　味甘酸辛　無毒

本草云主養心氣明目益精療腹痛泄癖下利赤白小
便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久
服補髓好顏色益志不饑輕身延年五色石脂各人
五臟補益

東垣云赤石脂白石脂並溫無毒畏黃芩芫花惡大黃

本經云澁可去脫石脂爲並溫無毒畏黃芩芫花惡大
以下之赤入丙白入庚

珍云赤白石脂俱甘酸陽中之陰固脫
心云甘溫篩末用去脫澁以固腸胃

局方本草云青石脂養肝膽氣明目黑石脂養腎氣強
陰益陰蝕瘡黃石脂養脾氣除黃疸餘與赤白同功
禹餘糧

氣寒　味甘苦　無毒一名須丸出姑幕者名須
丸出代都者名代赭

入手少陰經
足厥陰經

本草云主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女
子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不出墮胎養血除
五臟血脉中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰
痿不起

聖濟經云怯則氣浮重則所以鎮之怯者亦驚也

鉛丹

氣微寒　味辛黃丹也

本草云主吐逆反胃驚癇癲疾除熱下氣止小便利除
毒熱筋攣金瘡溢血又云鎮心安神止吐血

本草云澁可去脫而固氣

成無已云鉛丹收斂神氣以鎮驚也

藥性論云君治消渴煎膏止痛生肌

白粉

本草云一名胡粉一名定粉一名瓦粉仲景猪膚湯用
白粉非此白粉即白米粉也黃延非治胷中寒是治
胷中寒誤寫作寒字

藥性論云胡粉使又名定粉味甘辛無毒能治積聚不
消焦炒止小兒疳痢

陳藏器云主久痢成疳粉和水及雞子白服以糞黑爲
度爲其殺蟲而止痢也

紫石英

氣溫　味甘辛　無毒

入手少陰經

足厥陰經

本草云主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤久服溫中輕身延年得茯苓人參芍藥共療心中結氣得天雄菖蒲共療癲亂長石爲之使畏扁青附子不欲能甲黃連麥冬

衍義云仲景治風熱痰癎風引湯紫石英白石英寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣甘草滑石等分右㕮咀以水一升煎去三分食後量多少溫呷之不用查立效

伏龍肝

氣溫　味辛

時習云主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫

衍義云婦人惡露不止鹽沙一兩炒伏龍肝半兩阿膠一兩同爲末溫酒調空心服三二錢以止爲度

藥性論云單用亦可鹹無毒

日華子云熱微毒治鼻洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞衣小兒夜啼一云治心痛及中風心煩

胸隱居云此竈中對釜月下黃土也

白礬

氣寒　味酸　無毒

本草云主寒熱泄瀉下痢白沃陰蝕惡瘡消痰止渴除痢熱治咽喉閉目痛堅骨齒

藥性論云使有小毒生含嚥津治急喉痺

硃砂

味甘

珍云心熱者非此不能除

局方本草云丹硃味甘微寒無毒養精神安魂魄益氣明目通血脉止煩渴

藥性論云君有大毒鎮心抽風

日華子云涼微毒潤心肺惡磁石畏鹹水

硇砂

味鹹

本草云破堅癖獨不用入藥除用之味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血癥胎止痛下氣療蚘蟲宿冷去惡肉生好肌柔金銀可爲銲藥

藥性論云有大毒畏漿水忌羊血味酸能腐壞人腸胃生食之化人心爲血能除冷病大益陽事

日華子云北庭砂味辛酸暖無毒畏一切酸補水臟脉子宮消冷癖瘀血宿食氣塊痃癖及婦人血氣心痛血崩帶下凡修製用黃丹石灰作匱煅赤使用無毒柔金銀驢馬藥亦用

東流水

味甘　無毒

時習云千里水及東流水主病後虛羸揚之萬過煮藥收禁神效二者皆堪蕩滌邪穢此水潔淨誠與諸水不同爲雲母所謂鍊雲母粉用之

甘爛水

時習云揚之水上成珠者是也治霍亂及入膀胱治奔豚藥用之殊勝

禽部

雞子黃

氣溫　味甘

本草云陰不足補之以血若咽有瘡雞子一樣云黃苦酒傾殼中以半夏入苦酒中取殼置刀環上熬微沸去沓旋旋呷之又主除熱火瘡痢瘧可作琥珀神物黃和恒山末爲丸竹葉湯服治久瘧不差黃合鬚髮煎消爲水療小兒驚熱下痢

獸部

龍骨

氣平微寒　味甘陽也　無毒

本草云主心腹鬼疰精物老魅欬逆泄痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘息陽煩內疸陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五臟

本經云澁可去脫而固氣

成無已云龍骨牡蠣鉛丹皆收斂神氣以鎮驚凡用燒煅赤爲粉長石膏

珍云固大腸脫

麝香

氣溫　味辛　無毒

本草云主癖惡氣殺鬼精物療溫瘧蠱毒痼疾去三尸蠱療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎

牛黃

氣平　味苦　有小毒

本草云主驚癇寒熱熱盛狂痓惡鬼除邪療小兒百病諸痼熱口噤不開大人癲狂又墮胎久服令人不忘

又云磨指甲上黃者爲眞又云定魂魄人參爲使得牡丹菖蒲利耳目惡龍骨能膽地黃畏生漆

犀角

氣寒　味苦酸咸微寒　無毒

象云治傷寒溫疫頭痛安心神止煩亂明目鎮驚治中風失音小兒熱豆風熱驚癇鎖用

本草云主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣能治一切痞腫破血

液云升麻代犀角說並見升麻條下易老療吐血分三部上焦吐血犀角地黃湯中焦吐血桃仁承氣湯下焦吐血抵當湯凡凡但緩於湯耳三法的當後之用者無以復加

阿膠

氣微溫　味甘辛　無毒　甘辛平

味薄氣厚升也陽也

入手太陰經

足少陰經厥陰經

象云主心腹痛內崩補虛安胎堅筋骨和血脈益氣止痢炮用

心云補肺金氣不足除不足甘溫補血出東阿得火良

本草云主心腹內崩勞極洒洒如瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足腳酸不能久立養肝氣益肺氣肺虛極損欬嗽唾膿血非阿膠不補仲景猪苓湯用阿膠滑以利水道活人書四物湯加減例姙娠下血者加阿膠

猪肩

氣寒　味甘

入足少陰經

液云猪皮味甘寒猪水畜也其氣先入腎解少陰客熱是以猪膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷痢

猪膽汁

氣寒　味苦鹹苦寒

液云仲景白通湯加此汁與人尿鹹寒同無熱劑合去格拒之寒又與醋相合內穀道中酸苦益陰以潤燥瀉便

本經云治傷寒熱渴又曰猪蹄可用雜青色者不可食療疾亦不可

心云與人尿同體補肝而和陰引置陽不被格拒能入心而通脉

獺肝

味甘　有毒

本草云主鬼疰蠱毒却魚骾止久嗽燒灰服之

猳鼠糞

治傷寒勞復經言牡鼠糞兩頭尖者是或在人家諸物中遺者

人尿

時習云療寒熱頭疼溫氣童男子者尤良

衍義云人尿須用童男者產後溫一杯壓下敗血惡物久服令人反虛氣血無熱尤不可多服此亦性寒故治熱勞方中亦用也

日華子云小便涼止勞渴嗽潤心肺療血悶熱狂燥損瘀血暈絕及蛇犬等咬以熱尿淋患處雖產胞衣不下即取一升用薑葱煎乘熱飲即下

蟲部

牡蠣

氣微寒　味鹹平　無毒

入足少陰經

象云治傷寒寒熱溫瘧女子帶下赤白止汗止心痛氣結澁大小腸治心脇痞燒白竹細用

珍云能軟積氣之痞經曰鹹能軟堅

心云鹹平熬泄水氣

本草云主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚悸怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱往來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澁大小腸止大小便療泄精喉痺瘰嗽心脇下痞熱能去瘰癧一切瘡腫入足少陰鹹爲軟堅之劑以柴胡引之故能去脇下之硬以茶引之能消結核以大黃引之能除股間腫地黃爲之使能益精收澁止小便本腎經之藥也久服強骨節殺邪鬼延年貝母爲之使得甘草牛膝遠志蛇床子良惡麻黃吳茱萸辛夷

藥性論云君主之劑治女子崩中止血及盜汗除風熱定痛治溫瘧又和杜仲服止盜汗爲末密丸服三十丸令人面光白永不值時氣又治鬼交精出病人虛而多熱如用之弁地黃小草

陳士良云牡蠣搗粉粉身治大人小兒盜汗和麻黃根

蛇床子乾薑爲粉粉身去陰汗衍義意同

文蛤

氣平　味鹹　無毒

本草云主惡瘡蝕五痔欬逆胸痺腰痛脇急鼠瘻大孔出血崩中漏下能利水治急痢蝕口鼻數日欲死燒灰膩猪脂和塗之堅瘡軟堅止渴收濕固澁蛤粉

也鹹能走腎可以勝水文蛤尖而有紫斑

蚤蟲

氣微寒　味苦平　有毒

本草云主目中赤痛眥傷淚出瘀血血閉寒熱酸齧無子炒去翅足

水蛭　一名馬蟥

氣微寒　味鹹苦平　有毒

本草云主逐惡血瘀血目閉破血癥積聚無子利水道墮胎炒用長鹽苦走血鹹勝血仲景抵當湯用虻蟲水蛭鹹苦以泄蓄血故經云有故無殞也雖可用之亦不甚安莫若四物湯加酒浸大黃各半下之極妙

蠐螬

微寒微溫　味鹹　有毒

本草云主惡血血瘀痺氣破折血在脇下堅滿痛月閉目中淫膚青腎白膜吐血在胃中不去及破骨踝折血結金瘡血塞產後中寒下乳汁仲景治雜病方大黃蠐螬丸中用之以其主脇下堅滿也續傳信方治喉痺取蟲汁點在喉中下即喉開也時習補入

蜜

氣平微溫　味甘　無毒

本草云主心腹邪氣諸驚癇痓安五臟諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩飲食不下止腸澼饑中疼痛口瘡明耳目

液云凡鍊蜜必須用火熬開以紙覆經宿紙上去蜂蓋再熬色變不可過度令熟入藥

蜣蜋

氣寒　味酸　有毒

本草云治小兒驚風痰癡腹脹寒熱大人頭疾狂易手足端寒支滿奔豚

日華子云墮胎治疰忤和乾薑傅惡瘡出箭頭

圖經云心主丁瘡

衍義云大小二種一種大者爲胡蜣蜋身黑光腹翼下有小黃子附母飛行晝不出夜方飛至人家戶庭中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不出今當用胡蜣蜋以其小者研三十枚以水灌牛馬腸結佳

蠶甲

氣平　味鹹　無毒

本草云主心腹癥瘕堅積寒熱去鼻間瘜肉陰蝕痔惡肉療溫瘧血瘕腰痛小兒脇下堅

衍義云治勞瘦除骨蒸極佳

蛇蛻

心云去翳膜用之取其意也

日華子云止嘔逆小兒驚悸客忤催生癮疹白癜風煎汁傅入藥炙用

蟬蛻

心云治同蛇蛻

藥性論云使治小兒渾身壯熱驚癇兼能止渴人云其蛻殼頭上有一角如冠狀謂之蟬花最佳味甘寒無毒主小兒天弔驚癇痰癡夜啼心悸

白殭蠶

味鹹平　無毒

本草云主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑斑令人面色好男子陰瘍病女子崩中赤白產後餘病滅諸瘡瘢長生顯川平澤四月取自死者勿令中濕濕中有毒不可用

斑蝥

味辛甘　有毒

本草云主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死肌破石癃血積傷人肌墮胎畏巴豆

烏蛇

無毒

本草云主諸風癮疹疥癬皮膚不仁頑痺諸風用之

炙入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善不噬物江東有黑稍蛇能纏物至死亦是其類生商洛山

五靈脂

味甘温　無毒

本草云主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也

絳帛

液云主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取露蜂房鬱頭棘刺爛草節二寸許亂髮燒末作膏主丁瘡腫又主小兒初生臍未落時腫痛水出燒爲末細研傅之又五色帛主盜汗拭乾訖棄五道頭仲景治墜馬及一切筋骨損方中用

湯液本草卷下終

參譜

黃叔燦輯

參譜序

余於庚寅之歲館鄞城俞氏主人鬻參者也暇時論及參之地產品目種種不同眞僞相淆未有專書以資攷訂有同里唐君某老于斯業言余向見一書論參之品產高下鑒別甚精蓋參家私爲秘術今不可復見然猶能記憶其說第詞不文君可稍潤色之並以今昔相殊精有心得可補未備者口授于余遂筆之于書名曰參譜雖不若陳氏之菌譜韓氏之橘錄可稱博雅而于參之品產形色高下眞僞可以區別亦不無小補云海成黃叔燦書

參譜

昭文黃叔燦牧村

參貨出數多寡價值天淵論

康熙初年到蘇之參連泡丁及參鬚等共計有幾二百擔每斤價只四五十兩歷年來出數日少而價日昂延至雍正九年統參價長至二百兩繼至乾隆九年秋統參至六百兩有零十九年分價抵于金由此有長無跌比年來尋至千六七百不等迄今遂長至二千以外然同業者反視爲尋常誠所謂物能自貴未可料也近來每歲計來統參泡丁鬚等不及二十擔而世道囂浮人體怯薄每一沙病靡不參苓生之者寡食之者衆是以價昂無底止逾金埒珠貴無極矣

參性生殺酌用勿忽論

夫參性和平味甘苦補中益氣生津助神功難殫述然亦能殺人會有風寒不清暑熱未盡火毒正熾經此補彌諸患敝過不舒其害可勝言哉故曰用蓄通神用誤立禍其生殺之權唯醫家是問病家亦不得不察也蓋可以忽乎哉

論參形質優劣

夫參之高者有十等 蔘 鮮 矮 壯 光 圓 文 笨 熟 橋也下者亦有十等曰 潮 暈 長 瘦 癟 瘍 武 尖 生 粳是也

統蔘之一字而論談何容易當知參本草根固非金石之質一經于潮則色變而性移有殊于本來面目耳故列於首而揭之 鮮 妍也凡物皆類於色如婦女之綠鬢紅顏忽變而爲雜皮鶴髮孰爲美耶 矮 系天性自然之形非短可喻短可長而敝作之也故列其中 壯 乃氣充神備然猶肥人也 光 是熟貨上外塗一種彩澤表裏可燭 圓 體渾不偏若珠之可旋轉者也 文 亭亭獨立旁無小枝秀美迥長宛如繭茧 笨 上下停勻無釘頭鼠尾之誚 熟 色潤而紅精發神越然務在結爲臧間有熟而空蠹者或本質薄經製失宜或因製時火力過旺至犯此病 糯 如米之秔糯也 至于下等之潮暈兩字相聯潮無不暈暈必因潮特易明耳 長 形佻也 瘦 體細也 橋 內肉而外皮之謂種類甚夥擇皮細色黃而肉紅者爲上表粗色白裏鬆者次之 瘍 形委質劣而不盈兼有呵吸者 武 經枝雜沓荊棘並舉 尖 形如錐上細下巨 生 蘇其不明潤也非不經製而成生竟有未製者即今之粉參云 粳 體剛而態倔者也品彙高下大率如此茲爲此論惟知者審之或以千言不忒

塔廠有無鉛塞本末辨

近業於此者輒議曰塔貨無鉛廠貨有鉛之說乃囫圇或世語也嘗知吉林以內爲裏山其參出土早質薄體鬆飢夫漁利乘其辟時揷以鉛條鐵珠柳木牛筋玉竹等物或以條參實於中謂之塞肚其參中有鉛者謂之揷鉛捨鉛外而雜揷者皆曰塞肚也鉛塞二字豈堪統而言之哉如吉林以外爲外山所出之參即塔貨也因其出土遲而質厚體固猶人之壯實者外邪無敢侵入飢夫雖欲營之烏可得也

塔所出之參乃塔貨近俗槩稱臺貨竟以此臺字書名幾失其本色面目矣是以辨其本末云

今昔平色不齊論

昔日參多之時以十八兩作勅爲大秤漸以價昂將秤

頭目增法令加至廿四兩爲斤合平秤六折算最
曰參紋元絲九五兌曰漸低毛雖曰九一兌其實九零
五矣向之定例以大秤直銀無非貿易中詭譎之道以
惑四遠各販耳今各販悉知底裏其自愚也夫向之行
店參紋銀色相等茲則不然行規九一兌店規八八兌
尚無禿淨元絲不過以此作限惟憾人心不齊自相矛
盾者多雖有規名而無規實也嗟嗟

各省銷參多寡異同說

產參惟奉天一省而外銷行非徧天下也銷之最盛者
爲兩浙其次江南江西又次則三楚兩粵八閩耳直隸
惟京師尚銷近來山左之太原山右之濟南晉行至于
雲貴川陝中州等省土人絕不識用或有商于此者帶
去不過各署交易會各署中不離江浙朋友耳參中最
低之貨曰鑲鳳白熟紅丁鬚蘆等東洋日本國頗銷其
西南洋之暹羅大泥呂宋呷喇叭馬辰安南東京諸國
惟安南銷行餘皆不用不知者似乎參之物普天率土
無處不銷者故特表而出之

各路銷行貨色

諸省銷參最高者首推浙江之塘西其新市蕭山兩處
第來大而光不拘文矮者也其外海寧平湖嘉興硤石
等處惟銷光熟而已如江南之松江毘陵諸郡縣只行
光熟淮揚所銷全倚鹽商其商欵專事奢侈參必取乎
大雖晷帶皮亦錄閩中惟興化南鑑駛舌反行光頂熟
參是誠不解也而寧紹銷參雖多于諸郡祇行低貨不
但蹬鑼可行抑且色黑不懼其三楚八閩兩粵江右等
處盡銷蹬參熟反嫌其油而不用我蘇乃天下大都會
并是聚處自泰山至于邱垤靡不行銷也

看統參法

凡統參必先分地道次論乾潮皮毛色澤身分大小糙
熟多寡有病無病并不求上大下小專取停勻只要中
身縝密然後灑分地道不論塔廠只要十股合價者爲
上何曰十股能分出頭層尖頂熟三層二頂光熟四層
二股次頂揀熟下身中小二股留有條小糙三股頂糙
一而統糙二并要皮肉紅結實不鬆爲妙則成十股隨
市價合之方得總值也至有十股之外者皆次統也比
年來貨短價長就此論之高統百無二三矣

論地道鳳凰城塔貨爲上廠與棧道嘎河老城東山廠
皇城諸處高下有差其塔貨膩體長橋熟結者多而鬆
怯者少糙則皮紅顯而實并無鉛塞之疵蓋因出土遲
而力足也廠貨體態類塔而糙溢者衆間有病也棧道
參粳武爲君嘎河多產于石坳中體實而皮老形扁而
質巨別無他嫌老城者素質短壯糙則皮粗熟則色紫
東山之貨形亦矮肥糙皮粗細俱備熟者光潤不觖鳳
皇城參身尖佻而色白空鬆多而結緊少光熟間有而
色嫩昔年鉛重今則殊前惟老城鉛塞最重東山其次
也至于成貨時折鉛以及揀出糖溢假參等雖曰末事
亦不可忽并折鉛分洒闊枝爲至公萬勿自恃眼力或
嬾于從事隨衆附和愚行家經手撥擱鉛至有大虧
耗者要知萬馬于軍烏能盡識其性設或折少折多各
由天命將無悔焉然塔廠等貨不可以名目論高下或
有塔低于廠豈無廠勝于塔者耶猶禾中之有莠稗草
中之有靈芝也看貨規模情狀難以枚舉今姑摘其綱
領以勉後學云勿以予言爲瑣瑣

看泡丁法

看泡丁以塔者爲上首論以紅白分明宜乎條多糙泡
少其條貴在長熟北直糙宜細結色黃泡求白淨無紋
成枝忌碎黑者曰泡渣此中之厭物也至于船廠老城
等條則生糙曲細者衆泡糙則皮粗色滯且有鉛塞等
患其鳳皇城條熟色嫩而體鬆糙色白而空形多釘頭
鼠尾泡特勝于塔廠蓋因其質白合東洋去路耳至于
泡丁中紅內有條小宮熟太參等名白內有鏡鳳白熟
強糙小糙片料之目另有細述茲不復載惟是物貴堅
生近于泡丁內提其上或統貨內剔其下合而爲一曰
拗色抜另有泡丁則名實異矣拗色之與不過數載皆
由北方之夾辦子名化出貢誠之客不辨此狡獪之行
然而藝推磨轉東長西塌其實皆什一也不過貿弄有
家私若有變通耳烏能昧于識者耶

看參鬚法

看鬚亦論塔者爲高色貴乎黃亮熊宵乎長佻條多蘆
少其塔鬚備焉廠等則皮色粳滯短縮蘆重鳳皇城者
蘆或稍輕然色白條寡凡進此務取色黃長熟蘆輕不
少條之多寡在次近亦因值貴上層之條在地頭已經
揀出剩然成規故有拔毛條子之名將此拔毛條擯入
泡丁內耳除塔鬚外蘆中亦有揷鉛之患間有塊鬚四
角中布置鉛段并有假鬚蘆浸等弊臨辨時當細審之
毋忽

統參泡丁原鬚分揀出各名目說

尖頂熟　尖頂者統參中之魁首也枝以錢外至有二
三錢者光熟文糙可當其名近年尖頂少有
無實

塔西熟　乃乾鮮矮壯光圓文筆熟糙十字俱全之參

也本應列于諸參之首因其枝小故實其二焉其爲枝只有三分至五分者再大則不能有矣試看其容紅于琥珀黃于蜜臘一點星蕊表裡通徹飄飄然有玉樹臨風之態見其蘊藉可稱巨擘眞參中特品也

光頂熟　六分至七八分枝者光矮文糯兼之乃頂熟二頂中拔其尤者

頂熟　以一錢起至錢外惟文熟而不光者也

統頂　八九分至錢外熟而長武畧帶糠皮結練者

二頂　二其頂也以七分枝爲度只熟欠光長武皆備如矮文者雖五六分枝亦可入其列

光熟　二分起至四分左右者因其枝差于光頂故另分其名

次頂　數以四分外至五六分者熟猺文糯爲上反是者次之

揀熟　乃貨中之中身三分外至四分外者名之取文矮者爲上揀武長者爲統揀熟也

中熟　二分外至三分者合式亦以熟糯爲君

小熟　分四五釐至二分熟短而頭尾全爲眞小熟細挑者即條小矣

條小　一分至四五釐枝間有二分枝者長佻而熟形如條故有是名

宮熟　宮即空也因其名劣而更優其目也外熟內空一二分至五分者爲宮熟六分至八分外者皆曰宮頂雖時間地頗行呼之曰建尖纖因蜀銷而又曰川庄泡丁中亦有之但其色

淡紅竟空而無鬆紅者

短熟　即對科分外枝至二分者短而熟可對接成枝又名對科也

頂糙　糙中之魁也取細皮顯紅結實不鬆枝以八九分至二三錢者亦以文糯爲佳即今之兼皮頂也昔尚有尖糙茲盡入頂熟中矣古名糙重即此

揀糙　較頂糙枝小五六七分爲率即今之兼皮熟也

統糙　拔去頂揀刪去小糙乃其中也粗皮長武鬆結兼備曲直俱全大小俱備以統而名之即今之廣糙也因其廣東可銷即將此分配包封赴曾也

次糙　本在揀糙之下小糙之上者今盡入于統糙中不另揀出如色黑堅結名紹糙山會大行故名其目泡丁中亦有之

小紅糙　枝頭在二三四分不等糙中之至小者也統參中顯紅結練者多泡丁中兩塗矣

以上皆統參中分出間有泡丁中者註明附覽此亦大綱耳惟知者審之

頂太參　取有頭尾六七釐至分外者短而熟自成小參之形始稱其名今則不然以壯短條參亦雜入而冒其名矣

太參　頂太之小者三四五六釐枝亦熟爲貫短條更易入

辯條　頭尾停勻文熟而光圓八九釐至一二釐者水客以數枝辯成一枝擅入揀熟次頂包中

惑人匪正道也

太揀條　五六釐至近分者取其長熟壯直而已

統條　三四釐至一分者糙熟皆備屈曲不倫故名曰統條也

中條　不可計枝但求熟長爲主建寧最銷

短條　求其壯熟如細小者即曰米條碎者曰箱底

統糙　前已載及不複書因列泡丁中各名目不得不署其中耳

小糙　全前

強糙　如糙而皮浮似肥而不實一錢起至二三錢者貴乎皮嫩色白文物無鐵線紋者水客以絹紫紅竟目頂熟出售大獲奇利但可隨辦隨銷久則色變形露矣五六七八月未可辦

強泡　較強糙皮更鬆而浮朴亦裏黑紋惟紫是用

鑲鳳　昔以白嫩細長彷彿乎鳳皇城白貨而有此名今則只擇泡糙中色白者不論粗細長短盡爲之較先年之白棍小如也其鳳皇城白貨以冒高麗京參今又以此射之誠假中之假可發一笑

白熟　向以統糙中揀出色白細皮而內空者泡丁中分出者次之近之白熟即曰泡成入其內皆緣鑲鳳白熟泡頭等貨此東洋銷行福建人辨此最爲草率是以今之分揀者與前大迥異也

泡頭　泡者輕也謂其無肉外皮而朴入水浮白者爲佳黑者名泡渣矣向揀泡頭之面爲白棍今入鑲鳳中矣

片料　以糙觸有肉可切者曰片料顯紅者爲上白鬆者下之杭寧紹三郡爲特銷

糙條　片料中揀出細長無可切片者條中削出有皮者故曰糙條即洋條也亦是日本去路

以上皆泡丁內分出近之拗色分出者稍勝之

鬚中條　較鬚條畧肥較泡丁內中條畧細者

鬚條　原鬚中揀出畧圓壯如針者今之鬚條實昔之淨鬚也亦要紅熟

泡條　色白泡鬚較糙條無肉近取其緊紅沖入鬚條發賣

淨鬚　原鬚中揀出如髮如絲其性只補四肢因其附蘆而質薄也物雖小然亦求熟次糙求紅莫白爲妙

蘆管條　蘆上長白嫩條也壯者可鑲入泡頭內

蘆頭　蘆乃參之根也歲久則節多清氣上浮而爲參濁氣下散而爲鬚其性上行利于肱肱正本草載參去蘆用則可知其無補益也味至苦中辛惟南昌樟樹鎮農家服之爲節參不名蘆舍此惟東洋二國銷行誠所謂天下無棄物也近將蘆內揀出長大白色者做在鑲凡上曰拖蘆更分細長嫩紅者曰子蘆閩人將此潮軟撚直沖入鬚條內赴日本發賣向日所無皆因利源變通也

以上乃原鬚中分出者亦表而出之

鉛糖滿灌蠟溜漿論

夫鉛塞之弊皆刨夫利慾蔽心而舞之也其鉛之輕重塞之多寡非一例使然乃刨夫隨意營之而已者鉛之法以蘆上蘆傍有微隙爲鉛門又于稍管上極枝邊覘其損痕破跡而擬之然重鉛之參入手即曉將指掂播上垂下墮沉墜不靈形倔體强迥出異常參之活潑斯可驗矣如鉛輕者一如草蛇灰線隱隱覺之非比重鉛之參有諸內而形諸外也若參成觔兩而估之譬如有參一宗先點其枝數度其分兩若干舉數稱之不止估數餘皆鉛焉籌而計之便可別其加一加二等鉛數矣習此業者必先錄就估枝約數之術臨此庶免乎棘手一塞肚參不死其內而祇論其外者蓋因其形質呆木[illegible]之參糙熟皆有之熟者尚少而糙者重因其皮厚故能多揷也泡丁中之鉛較統參更重以其鉛性重而參質小骨浮于肉其有子勝于母者常有諸也

一灌蠟之參油光發越于外一嗅便明

一溜漿參糙者稀熟者衆間有之物皆因刨夫法制之時火力過旺其中精液流溢遂至實化爲虛矣惜乎

一糖滿之參其大旨觀其形狀則神枯色滯隱然體鮮白膚單外如自中生障柔軟如綿入手發粘雖經風燥之時而不以礦灰窖之者仍然委靡不振矣此等不倫之參入藥中猶可設用之于煎劑九料中恐無益也

一假參之形態不一本草有著荒亂參之說或即此耶假參亦糙者多色木而無神間有小白不心者無心者亦有乾者難詳潮者易辨或視其形色動疑則折其稍入爐焚之

嗅其氣味或火辣或羊羶氣者的是假參十年前實有一友從蜀中歸挈參數枝皆三四分枝初看竟如異熟參色紅而光細察其中微露木心咀之味羶大破疑竇

一假條鬚乃野蘿蔔根爲之我蘇支硎山裏帶邨有產竟有喪心病狂之徒購製愚人但求漁利罔顧天良報應自不爽也凡事細心究研悉能洞弊都因鬚之爲物小而忽之也若審其神色迥異於眞附蘆者鮮矣以上諸品茲不過其大畧刻畫難盡惟學者留意揣摩心領神會三昧可盡得至于糖滿灌蠟假參等事奉勸業于此者勿吝小而專射利恐有關于陰隲也惟聽是幸

人參總歌

人參乃是草中王價昂金珠利萬方論質品材規範巨光文矮矯最稱長壯大熟結列次等細小糙鬆力不長更有梗空與昏翳堪同凡草值平常刨夫漁利將鉛揷又把牛筋玉竹藏并置鐵砂共柳木糖滿銷蠟任情裝此物補中益精氣功能起死返生鄉用之不富常傷命殺七生三須究詳尚有齊芪亂眞相看時務在細忖量泡丁大旨分明白鬚擇長苗色亮黃最惜溜漿神氣洩中空外實性微茫營於此者須明察庶可芳名斯道揚

各帮參客銀期例殊說

天地間事宜中道而行否則太過則有不及就參業銀期向例均三兌然南北東西四路不同前東規有三十日一兌之促後即西局九十日一兌均五兌之寬數年前定南規在九十日一兌北客隨之西規八十日東規七十日近年南北以七十日一兌爲期東西以兩月一兌爲例其廣參之期則有九十日至百二十日等期皆情應變無常例也在客只圖利厚之末不顧始終之本人以長期實爲害人之謀往往害人人自害非天理昭彰乎誠堪噴飯也

南規　秤以六六又折爲大秤合廿四兩數值銀八折
算行紋再九零五折至元絲北粮零亦同是規
漸至九零二三兌矣
西規　每叅百十兩作百兩含九零九一折再七三折
作大秤值銀亦八折算行紋九八五兌近只九
八三兌矣
東規　每叅百兩外加五兩七折作大秤值銀亦八折
算行紋再八折九八五扣至元絲遞來已毛兩
小色
[illegible]統叅泡子同例
原續各粮規並一銀爲叅元九三兌秤隨時講前有八
三秤至八五八八九三五等秤亦請未可卒定也又小
市東規秤以九五扣銀以九八折元絲現銀不扣西零
亦宗此規也
人叅之品自本草所載外惟唐氏文房肆攷中著有
論說然秖得其大畧不能道其詳也先君館郡城時
嘗有叅譜一書所言皆得于鬱叅者之口其于叅之
形狀色味一一詳載較唐氏說爲備若霽先生捜訪
秘書出以相質一見欣賞許付剞劂惜此本爲鑑藏
時所錄副中多訛字原稿歲久失去無從轉勘今于
其顯誤者畧加校定餘則姑仍其舊云嘉慶戊辰正
月男廷鑑謹識

叅譜終

人參考

唐秉鈞纂

刻人參說序

曩者嶽父竿齋君之奉命教諭鍼科於甲斐州實寵政丁巳年也先是州之府未會有醫舍之設也君乃丐創學館聚生徒典教事且於館側賜地三千弓想藥圃自宮醫以及城市草莽之醫皆趣館而肆其業走圃以辨識草蘇草莢俱皆君督之蓋多紀永壽院之議而鎮臺丞見近藤二公之所申諭云當時本州之業醫者皆投刺納謁爭蟻附蝟集於其門矣有神津宗益者齡過肉帛一日來請問曰野老往寬保延享間宦於京師坊間沽得朝鮮刊東醫寶鑑一部歸舍披閱得字紙若干葉於其間以質諸人卽是彼邦製人參之傳缺也嘗聞之昔豐公之征韓也先鋒將陷王城俘一書庫載歸想豈是此之遺歟先生方令創開藥圃種藝方蕃他日又必應植參以充世用此法若得一有用於世賣野老之幸出以贈之君受而謝焉厥後召遷進侍醫敘法服后文政己卯丐會津侯得人參數十根乃依法製之又製秋田參津輕參不一而已尙且安排鍊習竟能得其要訣君嘗曰此若干葉字紙乃是吾人寶珠船而他日必應有大裨益矣後無幾果有賴此製參再三拯得兒孫於痘瘡危篤中則知君之言亦不虛矣文政己丑秋遂命試製野州參一百餘根以上進之其體之圓色之光質熟而肉潤氣味全存監諸船貨上品中難復爲軒輊矣是乃予之曾以受其秘訣而常親炙製法事而所知也抑人參神草而王氣鍾靈之邦必生之其於調生養病古來爲復論也但憾世未得其製法夫參而不焦參用亦從參耳故有事輒必仰之外邦是以其價年貴一年百年以來上頂者唯富貴有力家得用之如寒素貧賤者雖粗惡下等品皆不能致也劣得疑似贋物徒費餘財夫既如此則雖有眞參醫亦不能親用常試其氣味效驗有時用之亦不過一匕一撮之微太類小兒游戲塵飯土羹以相獻酬噫嘻一杯水於一車薪何有哉是以至其使用品題等皆茫乎不分玉石徒主張藥鋪妄說欺人欺已剩其收藏之不知誤事者甚多矣淸唐衡銓青年蚤已有人參攷之著其書特能辯地道出山之蚤暮貨市形色之高下等歷歷可指擿至其辯行戶店家多立名稱以眩惑人者又可謂頗精且實也雖零星冊子不亦足以傳乎世人讀此畧得辯識其眞贋不第不爲賈醫奸僧所瞞便免於其襲燕石市禍害之誚已竊惟我日域精英鍾靈之地享保以還生人參沿道已夥矣若能廣製此聽於世用令醫常用而咨驚使長使人人調生養病以無憾則此書之爲筌蹄亦固所不辭也乃拔此書於文房肆考中校而授梓岩文政庚寅歲孟秋東都樣圖石阪圭宗珪

人參攷 目錄

參當辨識防害　新產今昔異地
鳳凰城　船廠
奏貢　蘇行分等
蘇行秤兒　店家名色
大參還年頗少庫貨還年不蛀
收藏參法　防霉時候
名同參類　形似於參
眞僞摸證　諸參總較

人參攷

錄水唐秉鈞衡銓纂

參當辨識防害

人參價貴我等士人寒素者多濟泊自甘南以人參爲常食之物然或有時進以奉親有時自需調攝或入場科舉携備不時事所必有物非常用偶見難分玉石向有以短接長者謂之接貨以小併大者謂之合貨必先用水潮過原汁已出又用粉膠粘紮蒸烘做成其力薄而易變固不待言又有薄夫以參湯泡自啜乃晾乾烘燥做色復舊謂之湯參究不失爲眞參尙無大碍還年價日昂貴漸致以僞雜售若不辨識眞贋不第被欺誆財且恐貽害非細故特攷人參之地道出山之早晚貨市之時候形色之高下霉蛀之收拾及市肆之多立名稱以眩惑人目畧列於後

所產今昔異地

人參前明時心州高麗郡鄆百濟澤州箕州并州幽州嬀州易州平州並產參而上黨山谷出者爲最上黨卽今路州也太行紫團山所出者爲紫團參紫色稍扁百濟參白堅且圓名曰條參俗名羊角參高麗參近紫體虛新羅參亞黃味薄肖人形者神類鷄腿者力大高麗百濟新羅三國今屬朝鮮其參有子十月下種如種菜法春生苗多於深山背陰處初生小者三四寸一莖五葉四五年後生兩莖未有花莖十年後生三莖年深者四莖葉各五中心生一莖俗名百尺杵三四月有花細如粟蕊如絲紫白色秋後結子如大豆七八枚

生者堅實春夏宋蔡虛軟本朝獨重遼參以人參乃神草於王氣鍾靈之處生者味勝力洪故也

鳳皇城

鳳皇城貨雖地道所出不一大暑早出白秀體鬆而瘦長者皆名曰鳳皇城土人採取出山甚早五六月即可掘采九十月賈人便至蘇城開價矣故其質不堅皆由未經霜雪行根未久統貨糙多熟少此種低貨惟行銷於洋廣江西一過年春風透時熟則變糙糙則更變爛皺不堪矣糙音別枯病也

船廠

去鳳皇城三四千里名曰船廠其地多巨木屋宇道路橋梁皆巨木所建相傳係關海禁時曾於是地造洋船出洋故名船廠其處二百里內外所產較鳳皇城稍堅實且紅潤可觀但其中空黑者確不少土人并以鉛條等插肉以圖利大約六七月采取出山冬初亦至蘇矣鉛條之由蓋土人採參者不過藏糙於袋以充食鉛壺貯酒以供飲酒器即剪壺作條以插參耳其貨稍遜臺貨其價市當並驅

臺貨

臺貨者當古臺所出之貨也地處極北去船廠五千餘里地極厚天極寒深秋之時霜雪即已載道總在八九月採歲終方至蘇城其體質皆由地土既厚出山又甚遲晚所以堅實圓湛熟多糙少即或間有糙皮而肉必紅結并無藏鉛之弊夫鳳廠臺三處此蓋總羅六地之名而言其各有所屬一關必須憑貨品題難以懸擬大要以色光體圓質熟肉湛四項兼者為上耳

蘇行分等

經商至蘇在行發店其行規店規不同凡客貨到行規時主將客貨分作三等揀堅結紅大熟多糙少者名統貨其色次紅癟皺糙多熟少者名拗色又次色浮白微紅質薄肉少者加入條參者名曰泡丁

蘇行秤兒

行秤輕店秤以貨二十四兩二錢四分作一斤以行秤行貨一百換合作店平店貨六十換故交行貿易每兩作九七折作大秤算

店家名色

參至店家必逐一細揀分等次第以定價值各自多立名色取五六十名以眩人移步換形難以執論總在自己眼力辨別其曰拔頂熟紅潤圓綻全乎是肉每枝重一錢至四五錢者參之最紅熟者不拘大小塘西所行故最高熟參謂之塘西貨揚州之行熟參反次塘西

統頂細紅皮肉圓湛六七分至八九分一錢者

二頂細紅皮肉或色滯稍較頂熟身瘦怯六七八分者

次頂細紅皮肉稍癟皺或色滯或瘦長或武相五六七分者

大揀熟細紅皮肉圓湛短肚四五分

揀熟細紅皮肉或色滯身長三四五分者

中熟細紅皮肉圓湛二三分成枝者

小熟細紅皮肉一分四五釐至二分以外者

條小熟細紅皮肉身長圓瘦有頭尾一分以外者

短中細紅圓湛成枝一分上下者

大脩尖細紅皮肉不成枝數皆大貨枝稍脩下二三四釐而如戟梗粗細者其力甚薄而可生津止渴調理常病或係蘆頭上橫生者其性橫行指臂無力者宜之

二修尖比大修尖稍細形則同

太參細紅短小自成枝數比短中更小或瘦三四釐至一分外者然其短緊堅實其力不下大參

頂條細紅皮肉身細長無頭尾七八釐至一分外者

大條細紅皮肉細長五六釐至一分者

短條細紅若大條斷者不成釐頭

短丁細紅如蜂蝶足粗細者俗名蝸蜢腿是也

中條細紅長短不拘寸如蜂蝶小足細者

光頂熟光潤色明如粉粧成頭尾渺無粗皮短圓文靜罪枝挺湛或有旁枝而不歧六七分至一錢者

光二頂光細圓湛或稍長武四五六分成枝較頂熟少減一等

光揀熟光圓紅湛而文三四分成枝較二頂又小一等

光中熟較光揀又小一等二三分成枝者體色亦如之

光大條光圓而長瘦無頭尾一分外者

光小條光圓而長一分內者

頂兼皮形體如頂熟而有細白皮紅肉者輕重同之

大兼皮形體如次二頂而有細白皮紅肉者輕重亦同之

中兼皮形體如中揀而瘦長有細白皮紅肉者輕重同中揀中熟

小兼皮形體如小熟而長短不分有細白皮紅肉者輕重同中小熟

頂糙形類兼皮而粗白皮頭內亦白肉不實稍頭露紅而體大質輕

揀糙形類大兼而粗白皮者質亦輕

次糙形類中兼而色滯癟長者

小糙形類小兼而粗皮者如色紅即名曰小紅糙體質總輕

解糙形類兼皮不拘大小粗紅皮而有肉質紹興王將故名曰紹糙兼皮亦有紹兼即兼皮之皮紅細結者不拘大小去路同

鳳參質大如頂揀中熟而細白糯皮稍頭有紅暈而中如敗絮者東洋必需

鑲鳳質輕大小如鳳參細白皮不糯微有鐵線紋者亦洋去白棍質益輕皮泡色黃白不一形大如頂熟

鳳稍質如鳳參而細長如條小形者稍有紅暈可接入鑲鳳

片料質輕中而有肉者皮色粗細黃白不一浙人備以湖透切片貿易頗似熟參奸商邪儈往往鑲節眩人然尚勝於偽者

糙條皮糙皺而細長如頂條者

泡頭皮色不拘黃白黑質輕重如白棍商人備以軟接入混糙

泡條形如中條而泡白者

鑲條細紅如柴心者

淨鬚紅潤細如髮

參蘆乃參之蘆頭發苗之處也色多白每以體鬆糙貨斷以

雜之

空紅細紅皮而色嬌中空而熟者不拘大小

白熟細糯而白皮嬌嫩中空若兼皮者不拘大小

箱底乃是零星渣末惡劣不堪之物俱入其中貨中之至底至賤者也都中稱爲雜末間有落存大段於內若到蘇城一經市商之手大者好者俱已揀去矣

大參遇年頗少庫貨地年不蛀

人參年遠一年日低一日此皆採取之勤不使其年久滋養長大耳昔之庫貨因貯庫年遠及至發出故有蟲蛀近年皇上聖明鑒惜臣民氣體孱弱生齒日繁需參日眾隨收隨發賜臣工而散天下故庫貨與客貨一樣新鮮

人參易於蛀蛀頻見風日則蠹生矣惟用盛過麻油磁瓶淨焙乾與華陰細辛相間納盛於中密封經年不壞一法用淋過篩灰晒乾罐收亦可今蘇州店家光熟參皆包貯茶葉之中此法最便

防霉時候

人參變色最怕黃梅時節桂花黃候大暑不使其傷熱淫雨不使其受濕濕則烘之熱則風涼之不時啟看勿使蟲嚙光熟參至夏月每遍身白點謂之起霜常以軟布用新涼水擦濕揀去無碍蓋經焙其色易老再焙色皆黑紫矣

同名參類

太子參雖細却短緊堅實其力不下大參

珠參苦而微甘宜於治火味厚體重形如芡實

防風黨參根有獅子盤頭者眞硬紋者僞

黨參今肆中所賣者種類甚多無所攷據皆不敢用惟白黨之味雖甘甚淡功力之不及防黨可知

粉沙參出於江浙去皮淨煮極熟陰乾即名紅黨

西洋參形似白泡糙參煎之不香嚼之苦多宜於治火

北沙參色白形如戟梗鮮時折之多白汁故俚人呼爲羊婆奶秋采者白而實春采者微黃而虛小人亦每蒸壓實以亂人參花如鈴鐸故稱鈴兒草

南沙參形稍瘦小而短色稍黃功同北參力遜近有一種味空沙參即薺苨又名甜桔梗

形似於參

僞造者或以形似於參之物造作亂之如防風沙參薺苨桔梗之類是也江浙間出一種土人參苗葉與桔梗相似根亦如桔梗而柔氣香味甘美較參稍淡亦薺苨也又有野氣菊根宛然是人參以山梔甘草等次第煮味於中一時殊難辨別惟色澤不甚光亮煎之湯無香味渣不肯爛惟脹胖耳

眞僞攢疊

參日價貴奸惡之徒巧於網利恐以全假之貨求售被人覷破反罹罪戾故或以糯接熟或以假鑲眞或用豎相雜以攢簇或用層相間以節疊做成枝椏一色宛如無縫天衣一時眩惑人目難以識別名曰金鑲玉嵌必須細心審察庶不受欺也

諸參總較

人參黨參土人參洋參薺苨桔梗多相似人參體實有心而味甘微帶苦自有餘味煎之易爛而渣少防黨體實而味甘土人參體實有心而味甘淡洋參雖似糯參而氣味不香沙參體虛無心而味甘桔梗體堅有心而味苦

人參攷 終

[illegible]

而增減如貧人藥舖稱弦人參者用以代人參不眞人參亦有效雖有不厭參價之貴者痢之始起欲用參則俗醫病家俱拒之故先盡力用弦人參其功雖不及人參取效不少也藥舖稱本須者其色有黃有白潤實肥大有餘味者爲佳今藥舖通稱朝鮮者大概上半須也非眞朝鮮藥舖稱碎人參者數品其稱枝碎肉碎大碎中碎蘆頭鬚者僞雜尤多宜辨也近來參價日貴故以薩摩小人參賣製者混之彷彿難以分別用之無益唯人參鬚細小黃潤難混以薩摩小人參予數試用於貧人得效又曰稱朝鮮碎或先碎者櫃中細小者藥舖僞作其形狀賣之朝鮮渡來之眞也者近來稀又曰近年延亨年間也藥舖稱唐大者此以參蘆片爲皮以糊造作物而不堪用也其單股唐大者種種其名亦不一價亦貴其功能肉碎大碎等遠不及也云云其書志併刻和漢人參考前後編而前編其父謙齋者與朝鮮聘使筆談人參形狀所出之地方者而後編則玄順自繼尾而疊引填說繁復雖似無益然於本邦未產人參之前能辨別店家名色與淸國朝鮮二品參類僞造者試諸病者而分說其勝劣實開悟後學使人沛然飽滿者亦不少也思其書既刊於延享戊辰何其見地之太相似也彼我之偶然出於同一揆間或如此者今茲宗圭板渦唐兼鈞人參攷因聊錄其所記併書嘗所賦古詩一篇以代跋

[illegible]

[illegible]

[illegible]

劉涓子鬼遺方

龔歷宣撰

劉涓子鬼遺方卷第一 并序

南北朝 龔慶宣撰

昔劉涓子、晉末、於丹陽郊外照射、忽見一物高二丈許、射而中之、如雷電聲若風雨、其夜不敢前追、詰旦率門徒子弟數人尋蹤至山下、見一小兒提罐、問何往、爲我主被劉涓子所射、取水洗瘡、而問小兒曰、主人是誰人、云黃父鬼、仍將小兒相隨還來、至門、開擣藥之聲、比及進、見三人、一人開書、一人擣藥、一人臥鼾、乃齊唱叫突、三人並走、遺一卷癰疽方、并藥一臼、時從宋武北征、有被瘡者、以藥塗之即愈、論者云聖人所作、天必助之、以此天授武王也、於是用方爲治、千無一失、姊適余從叔祖、涓子寄姊書、具敍此事、并方一卷、方是丹陽白薄紙本寫、今手跡尚存、從家世能爲治方、秘而不傳、其孫道凝與余鄰居、情款異常、臨終見語、家有神方、兒子幼稚、苟非其人、道不虛行、尋卷診候、兼辨藥性、欲以相傳屬、余既好方術、受而不辭、自得此方、於今五載、所治皆愈、可謂天下神驗、劉氏昔寄鈔方、故草寫、多無次第、今輒定其前後、類相從、爲此一部、流布鄉曲、有識之士幸以自防、齊永元元年、太歲己卯、五月五日撰、道凝曰、王祖母劉氏有此鬼方一部、道凝祖考相承、謹按處治、萬無一失、舅祖涓子兄弟自寫、寫稱云無紙、而用丹陽錄、永和十九年、賫財不薄、豈復無紙、是以此別之耳。案永和紙十二年、且去宋武甚遠、疑元嘉之誤。

黃父曰、夫言癰疽何以別之、岐伯答曰、榮衞稽留於經脈之中、久則血澀不行、血澀不行、則衞氣從之不

通、壅遏不得行、火不止、熱勝、熱勝則肉腐爲膿、然不能陷膚於骨髓不爲燋枯、五藏不爲傷、故曰癰。黃父曰何爲疽、岐伯曰熱氣浮盛、當其筋骨、良肉無餘、故曰疽、疽上皮肉以堅、上如牛領之皮、癰者薄以澤、背其候也。黃父曰、及如所說、未知癰疽之性名、發起處所、診候形狀、治與不治、死活之期、願一一聞之。

岐伯曰、癰疽圖曰、

赤疽發額、不寫十餘日死、其五日可刻也、其膿赤多血、死、未有膿可治、人年　二十五、三十一、六十、九十五者、在額不可見血、見血者死。

禽疽、發如軫者數十數、其四日腫合、牽核痛、其狀若犢、十日可刻、其肉發身核塞、齒如噤、欲搖、如是者十五日死。

杼疽發頂、若兩耳下不寫、十六日死、六日可刻、其色黑、見膿而癰者死不可治、人年　十九、二十三、三十五、三十九、五十一、五十五、六十一、八十七、九十九、百神在耳下、不可見血、見血者死。

丁疽發兩肩比起、有所逐、惡結血流、內外榮衞不通、發爲丁疽、三日、身腫痛甚、口噤如蟹狀、十一日可刻、不治二十日死。

蜂疽發脾背、起心腧、若連肩骨、二十日不治死、八日可刻、其色赤黑、膿見青者、死、不可治、人年　一十八、二十四、三十五、六十七、七十二、九十八者、百神在肩、不可見血、見血者死。

陰疽發脾、若陰股、始發腰強、內不能自止、數飲不能多、五日盛脹、不治、三歲而死。

刻疽發起肺腧、不寫、二十日死、其八日可刻、發而赤、其上肉如椒子者死不可治、人年　十九、二十五、二十九、三十九、五十七、六十、七十三、八十一、九十七、百神在背、不可見血、見血者死。

脈疽發頸項、如痛身隨而熱、不欲動、悄悄、或不能食、此有所大畏恐駭、而不精、上氣嗽、其發引耳不可以腫、二十日可刻、不刻八十日死。

龍疽發背、起胃俞、若腎俞、二十日不寫死、九日可刻、不刻、其上赤下黑、若青膿黑死、發血膿者不死

首疽發熱八十日、一方云八九日、大熱汗、頭引血盡、如嗽、身熱同同如沸者、皮顏腫、淺、刻之、不刻、二十日死。

榮疽發脅、起若兩肘頭、二十五日不寫死、九日可刻、膿多赤白、而可治也、人年　一歲、十六、二十六、三十二、四十八、五十八、六十四、八十、九十六、百神在脅、不可見血、見血即死。

行疽、發如腫、或後合相從、往來不可、要其所在刻之、即愈。

勇疽發股、起太陰、若伏鼠、二十五日不寫死、其十日可刻、勇疽發膿青黑者死、白者尚可治、不可治、人年

十一、十五、二十、三十一、三十三、
神背在尻尾、不可見血、見血者死。
擲疽發背、熱同、耳聾後六十日腫、如漿水、其狀若如此者可刺之、但出水後、及有血出、即除、愈也、不可治、人年　五十七、六十五、七十三、八十一、九十七者、百神在背、不可見血、見血者死。
瘡疽發足跗、若足下、三十日不寫、死、其十二日可刺、瘡疽者白膿不太多、其痂上痒赤黑者死、不可治、人年　十三、二十九、三十五、六十一、七十三、九十三、百神在足、不可見血、見血者死、
衝疽發小腸、痛而振寒熱、四日五日悄悄、六日而變、刺之、五十日死。
救疽發兩指頭、若五指頭、七八日不寫死、其四日可刺、其發而黑擁者不堪、未過指節、可治。一方不呼發救疽、恐是刺寫、明鑒引爲敗疽。
疥疽發腋下、若兩臂兩掌中、振寒熱而噦乾者、飲多即嘔、心煩悄悄、六十日而漸合者、如此可有汗、如無汗者死。一方云床疽、明鑒亦引爲床發。
筋疽、背發脊兩邊大筋、其色蒼、八日可刺、若有膿在肌腹中、十日死。
陳乾疽發兩臂、三四日痛不可動、五十日身熱而赤、六十日可刺、如刺無血、三四日病愈。
搔疽發手足五指頭、起節、其色不變、十日之內可刺、過時不刺、後爲蝕、有癰在脈腋、三歲死。
叔疽發身腫、牽核、而身熱、不可以行、不可以屈申、成膿、刺之以除。
白疽發脾、若肘後、痒、自痏傷、乃身熱多汗、五六處有者、死、心主癰疽、在股脛六日死、發膿血六十日死。
黑疽、發腫、居背大骨上、八日可刺、過時不刺、爲骨疽。
骨疽、膿出不可止、壯熱、碎骨、六十日死、脇少陽、有癰腫在頸、八日死、發膿血者十日死。
倉疽、發身、痒後痛、此故傷寒氣入藏、篤爲倉疽、九日可刺之、不刺、九十日死矣。
腰太陽脈有腫、交脈屬於陽明、在頸、十日死、發腫七十日死。
尻太陽脈有膿腫、癰在足心少陽、八日死、發膿血六十日死、或八十日死。
頭陽明脈有腫、癰在尻、六日死、發膿血六十日死。
股太陰有腫、癰在足太陽、十七日死、發膿血百日死。
肩太陽脈有腫、癰在頸、八日死、發膿血百日死。
足少陽脈有腫、癰在脇、八日死、發膿血、六百日死。
手陽明脈有腫、癰在腋淵、一歲死、發膿三歲死。
黑疽發腋淵死。

黑疽發耳中如米大、此疽不治死。
黑疽發肩死、黑疽發缺盆中、名曰伏疽、不治死。
赤疽發於脾、半夜可治、出歲死。
黑疽發肘上下、不死、可治。
脾解除指本黑頭赤、死。
黑疽發掌中、不死、可治。
赤疽發陰股、軟可治、堅死。
赤疽發肥腸、死。
黑疽發腰髀、軟可治、堅不可治。
赤疽發掌中、不可治。
黑疽發趺上、堅、死。
足下久腫、癰色赤、死。
癰高而光者、不大熱、用薄雞、其肉平平無異、而紫色者、不須治、但以黃耆并淡竹葉湯申其氣耳、癰平而痛、用八物黃耆湯、大癰七日、小癰五日、其自有堅強色診、掌生破、發背及發乳、若熱、手近不得者、令人之熱熱、先服王不留行散、外散、外癰發背大黃膏、若背生破無膿在乳者、熟之候、手按之、若隱手起、便是熟、針法要膿者、以意消息之、留背不可過一寸、針良久不得膿、即以食肉膏散差、瘡頭肉、癰口中入體熱氣歇、服木瓜散、五日後癰欲差者、排膿內寒散。
凡破癰之後、病人便連綿欲死、內寒熱、腫自有、似癰而非者、當以手按腫上、無所連、是風毒耳、勿針、可服昇麻湯、外癰膏破癰口當合流下三分、近一分針、唯令極熱、便不痛、破癰後敗壞不差者、作猪蹄湯洗之、日再下湯、二日故可用、瘥六七日、湯半劑、亦可用、胸中斷氣、斷氣者當入閤中、以手按左眼視右眼、見光者、胸中結癰、若不見光者、爆疽內發、針傷脈、血不出、住實不寫、留成癰、腎脈來者大、漸小陰結、若肌肉痒、癰癤爲發、寸口如此來大、如未漸小矣。
有黑色者、是石留黃毒。　有赤色者、是丹砂毒。　有青色者、是礜砂毒。　有似鹽顆者、是鍾乳毒。　有黃水者、是杏桃人毒。　有白水者、是附子乾薑毒。　有膿者、熱肉麵等毒。　礜砂發。　白雞鴨頂上血一合、已來、取黑鉛湯一茶椀、調服之、解。　鍾乳發。　雄雞肘上血一合、將鐵粉湯一茶椀、調服之、解。　附子發。　取附子皮三半、豉半升、相和、以水一升煎、約一茶椀、服之、解。　丹砂發。　取黑鉛、黃耆、防風、伏龍肝、各半兩、水一升、煎半茶椀、去滓、服之、解。

劉涓子鬼遺方卷第二

治金瘡止血散方
治金瘡血肉瘦蝙蝠散方
治金瘡肉瘦蒲黃散方
治金瘡箭肉中不出白蘞散方
治金瘡中腸出小麥散方
治金瘡腸出欲入礪石散方
治金瘡煩悶止煩白芷散方
治金瘡先有散石消石散方
治金瘡痛不可忍當歸散方
治金瘡弓弩所中悶絕琥珀散方
治金瘡弓弩所中筋急弩筋散方
治金瘡肉傷蛇銜散方

治金瘡中筋骨續斷散方
治金瘡煩疼麻黃散方
治金瘡煩滿白薇散方
治金瘡去血當歸散方
治金瘡去血多虛蕤蓉散方
治金瘡內塞澤蘭散方
治金瘡內塞黃耆散方
治金瘡中茵藥藍子散方
治金瘡大渴麻麥散方
治被打腹中瘀血蒲黃散方
治蘿疽金瘡止痛生肉膏方
治蘿疽金瘡生肉甘菊膏方
治蘿疽金瘡生肉膏方
治金瘡腹內瘀血烏雞湯方
治金瘡內有瘀血未及得下烏雞湯方
治金瘡有瘀血桃核湯方
治金瘡驚悸狍心湯方
治金瘡蘿疽生肉膏方
治被打有瘀血白馬蹄散方
治金瘡止血散方

烏韋根三兩　白芷一兩　鹿茸二分燒灰　當歸一兩　芎藭一兩　乾地黃一兩切　續斷一兩

右七味搗篩令調著血出處即止

治金瘡血肉瘦蝙蝠消血散方

蝙蝠三枚燒令煙盡沫下絹篩之

右以水服方寸匕一日服令盡當下如水血消也

治金瘡肉瘦蒲黃散方

七月七日麻勃一兩　蒲黃二兩

右二物擣篩爲散，溫酒調服一錢匕，日五服，夜再兩服。

治金瘡箭肉中不出，出箭，白斂散方

白斂二兩　半夏三兩，湯洗七遍，生薑浸一宿，慈過

右二味爲末，調水服方寸匕，日三服，若輕淺瘡，十日出，深二十日出，終不停住肉中。

治金瘡中腹，腸出不能內之，小麥飲噴瘡方

取小麥五升，水九升，煮取四升，去滓，復以綿度漉之，使極冷，傍舍噴之，瘡，腸自上漸漸入，以冷水噴其背，不中多人見，亦不欲令傍人語，又不可病人知，或晚未入，取病人席四角，令病人舉搖，須臾腸便自入，十日之內不可飽食，頻食而宜少，勿使病人驚，驚則煞人。

治金瘡腸出欲入，聽石散方

聽石三兩　滑石三兩

右二物下篩，理令調，飲日方寸匕，日五服，夜再服。

治金瘡煩悶，止煩，白芷散方

白芷二兩　芎藭二兩　甘草二兩，炙

右三味，熬令變色，擣爲散，水調服方寸匕，日五服，夜再服。

治金瘡先有散石，煩悶欲死，大小便不通，止煩消血，解散消石散方

消石　澤瀉　白斂　芍藥　寒水石　菩薩　已上各一兩

右六味，擣篩爲散，水服方寸匕，日夜各一服，或未通，稍增之。

治金瘡不可忍，煩疼不得住，止痛，當歸散方

當歸　甘草炙　藁本　桂心　木占斯　已上各一兩

右五味，合擣篩，令調，水服半方寸匕，日三服，夜一服。

治金瘡弓弩所中，悶絕無所識，琥珀散方

琥珀隨多少，擣篩，以竹子小使服之，乃熟，不過三服便差。

治金瘡弓弩所中，筋急屈伸不得，敗弩散方

乾地黃十分　乾棗三枚　杜仲二分　當歸四分　附子四分，炮　故敗弩筋燒灰，取五分

右七味，合擣篩，理令勻，溫酒服方寸匕，日三服，夜一，增一至三。

治金瘡內傷，蛇銜散方

蛇銜　甘草炙　芎藭　白芷　當歸各一兩　續斷　黃芩　澤蘭　乾薑　桂心各三分　烏頭炮，五分

右十一味，合擣篩，理令勻，酒服方寸匕，日三服，夜一服。

治金瘡中筋骨，續斷散方

芎藭一兩半　地黃二兩　蛇銜二兩　當歸一兩半　蓯蓉一兩半　乾薑三分，炮　續斷三兩　附子三分，炮　漢椒三分，出汗，去目　桂心三分　人參一兩　甘草一兩，炙　細辛二分　白芷三分

右十四味，擣篩理令勻，調溫酒服之方寸匕，日三服，夜一服。

治金瘡煩疼，麻黃散方

麻黃六分，去節　甘草五分，炙　乾薑三分　附子三分，炮　當歸三分　續斷三分　黃芩三分　芎藭三分　桂心三分　芎藭三分　白芷三分

右十一味，擣篩，理令勻，調溫酒，服方寸匕，日三服，夜一服。

治金瘡煩滿，疼痛不得眠睡，白薇散方

白薇　菩薇　枳實炙　辛夷去毛　甘草炙　石膏已上各一兩　厚朴二分，炙　酸棗二分，炙

右八味，爲末，調溫酒，服方寸匕，日三服，夜一服。

治金瘡去血多，虛竭，內補，當歸散方

當歸三分　芎藭五分　乾薑三分　辛夷去毛二分　甘草三分，炙

右五味，擣篩，理令勻，調溫酒服方寸匕，日三服，夜一服。

治金瘡去血多，虛竭，內補，蓯蓉散方

蓯蓉　當歸　甘草炙　芎藭　黃芩　桂心各一兩　黃耆　獨椒去目，閉口，三分，出汗　人參

右十四味，篩理令勻，調溫酒服方寸匕，日三服，夜一服。

治金瘡內塞，澤蘭散方

澤蘭　防風　蜀椒去目并口閉口　石膏炙　附子炮　乾薑

細辛　辛夷去毛各二兩　芎藭三分　當歸三分炒　甘草四分炙

右十一味，篩理令勻，調溫酒服方寸匕，日三夜一，膿多倍甘草，渴加苦蔞二分，煩加黃芩二分，腹滿氣短，加厚朴二分，瘡中血瘀，加辛夷一倍。

治金瘡內塞黃耆散方

黃耆三兩　芎藭　白芷　當歸　麻黃去節　鹿茸　黃芩

細辛　乾薑　芍藥　續斷　桑蟲屎巳上各一兩　附子半兩炮　山茱萸一兩

右十四味，擣篩理勻，調溫酒服方寸匕，日三服，夜一服，漸可至二匕。

治金瘡中藥解毒藍子散方

藍子五合　升麻八兩　甘草四兩炙　王不留行四兩

右四味，擣篩理令勻，調冷水服二方寸匕，日三夜二，及以方寸匕，水和勻，塗瘡上，毒即解去矣。

治金瘡大渴內補，巴麥散方

巴麥　芎藭　當歸　甘草炙　乾薑　桂心　續斷

厚朴炙　白斂　蜀椒去目閉口并汗　辛夷去毛　牡蠣末　芍藥　桔梗

乾地黃　防風各三分　細辛二分　苦蔞一分　人參三分

右十九味，擣篩理令勻，調溫酒服方寸匕，日三夜一，或筋骨斷，更加續斷三分。

治被打腹中瘀血，蒲黃散方

蒲黃一升　當歸二兩　桂心二兩

右三味，擣篩理勻，調酒服之方寸匕，日三夜一，不飲酒，熟水下。

治癰疽金瘡，續斷生肌膏方

續斷　乾地黃　細辛　當歸　芎藭　黃耆　通草

芍藥　白芷　牛膝　附子炮　人參　甘草炙各二兩　臘月猪脂四升

右十四味，㕮咀，諸藥內膏中，漬半日，微火煎三上，候白芷色黃膏即成，傅瘡上，日四五，膏中是猪脂煎，治金瘡癰疽，止痛生肌，甘菊膏方

兩草　芎藭　甘草炙　防風　黃芩　大戟巳上各一兩　生地黃四兩

芍藥半一兩　細辛　大黃　蜀椒去目閉口并汗　杜仲　黃耆各半兩　白芷一兩

右十四味，㕮咀，以臘月猪脂四升，微火煎五上下，白芷候黃成膏，一方添甘菊二兩，以傅瘡上，日易兩次。

治癰疽金瘡生肌膏方

大黃　芎藭　芍藥　黃耆　獨活

當歸　白芷巳上各一兩　薤白二兩別方一兩　生地黃一兩別方二兩

右九味，合薤，㕮咀，以猪脂三升，煎三上下，白芷黃膏成，絞去滓，用膏之多少隨其意。

治金瘡腹內有瘀血，烏雞湯方

烏雌雞一隻　大黃三兩　細辛三兩　人參一兩　甘草一兩炙　地黃三兩　杏人一兩去皮尖雙人

白蟲一兩　當歸二兩　芍藥一兩　黃芩一兩　桃人二兩去皮尖碎　大棗二十枚

右十三味，理烏雞如食法，以水二斗，煮雞，取一斗，㕮咀諸藥，內雞汁中，更煮，取三升，絞去滓，適寒溫，傷出困甚者，初服五合，以一日二夕盡，湯便應下，食之粥，慎食他物。

治金瘡內有瘀血，未及得出，面反成膿，烏雞湯方

烏雞一隻　白芷　麥門冬去心　甘草炙

芍藥　當歸巳上各一兩　桂心二兩　瓜蔞二兩

右八味，先理雞如食法，以水二斗，煮取七升，㕮咀諸藥，內汁中，更煮，取三升，去滓，服七合，日三夜勿食。

治金瘡有瘀血，桃核湯方

䗪蟲三十枚熬　虻蟲各三十枚熬　桂心二分　大黃五兩　桃核五十枚去皮切

右六味，酒水各五升，㕮咀，合煮取三升，去滓，服一升，日三服。

治金瘡驚悸，心中滿滿如車所驚怛，狍心湯方

狍心一具　人參　桂心　甘草炙　乾地黃

桔梗　石膏末　芎藭各一兩　當歸二兩

右九味，細切，剉，諸藥㕮咀，先以水二斗，煮心，取汁八升，內諸藥，煮取一升，一服八合，一日令盡。

治金瘡癰疽生肉膏方

黃耆　細辛　生地黃　蜀椒（去目汗閉口）　當歸
芎藭　薤白　芎藭　獨活　徳蓉
白芷　丹參　黃芩　甘草（已上各一兩）　臘月猪脂（二斤半）

右十五味，㕮咀，以苦酒一升，合清諸藥，夏一夜，冬二夜，泛，以微火煎三上，候苦酒氣成膏，用之。

治被打腹中瘀血，白馬蹄散方

白馬蹄燒令煙盡，擣篩，溫酒服方寸匕，日三夜一，亦治婦人血疾，消爲水。

劉涓子鬼遺方卷第三

治強壯熱癰疽，大黃湯方
治發癰疽，兼結實，淡竹葉湯方
治發背發乳癰疽，生地黃湯方
治乳癰已服前湯，又淡竹葉湯方
治癰疽，虛熱，生地黃湯方
治癰疽內虛熱大渴，黃耆湯方
治背生地黃湯方
治癰疽內虛，黃耆湯方
治癰疽，五味竹葉湯方
治癰疽發背乳，遠志湯方
治發背乳下復住，白石脂湯方
治發癰疽取痢，竹葉湯方

治發癰疽痢小便，竹葉湯方
治發癰疽痢後，小竹葉湯方
治發背癰兼味竹葉湯方
治發背已潰白石脂湯方
治發背大去膿汁，黃耆湯方
治癰疽內虛，生地黃湯方
治發背，黃耆湯方
治炎疽，枳實湯方
治腸癰，大黃湯方
治背上欲有瘡，大黃湯方
治婦人妬乳，辛夷湯方
治婦人乳結腫，黃耆湯方
治癰腫熱盛，黃耆湯方
治發癰疽去膿血多內補，黃耆湯方
治癰疽去膿多虛滿，竹葉湯方
治癰腫增損竹葉湯方
治癰壞後，黃耆湯方

治年四十已還強壯，常大患熱癰無定處，大小便不通，大黃湯方

大黃（三兩）　梔子（五十個）　升麻（二兩）　黃芩（三兩）　芒消（一兩，別方二兩）

右五味，切，以水五升煮取二升四合，去滓，下消，絞調分溫三服，快利爲度。

治發癰疽，兼結實，大小便不通，寒熱，已服五癰湯，吐出，不得下，大渴煩悶，淡竹葉湯方

淡竹葉（切四升，去尖）　苦蔞（四兩）　通草　前胡　升麻　伏苓
黃芩　知母　甘草（炙）　石膏（末，已上各二兩）　生地黃（十兩）　芎藭（一兩）
大黃（三兩）　黃耆（三兩）　當歸（一兩半）　人參（一兩）

右十六味，先以水一斗六升，煮竹葉，去葉，取九升，內諸藥，後煮取三升二合，分四服，日三夜一，快利便止，不必盡湯，湯盡不利，便合取利。

治發背發乳，四體有癰疽，虛熱大渴，生地黃湯方

生地黃十兩　竹葉四升　黃芩　黃耆　甘草炙　茯苓　麥門冬去心，已上各三兩　升麻　前胡　知母　芍藥各二兩　菩蔞四兩　大棗二十枚，去核　當歸一兩半　人參一兩

右十五味，先以水一斗五升，煑竹葉，取一斗，去葉，內諸藥，煑取三升六合，分爲四服，日三夜一。

治發背乳癰，已服生地黃湯，取利後，服此淡竹葉湯方

淡竹葉四升　麥門冬去心，已上各三兩　黃耆　芍藥　乾地黃　生薑已上各三兩　前胡

右十三味，先以水一斗八升，煑竹葉及小麥一斗，去滓，內諸藥，再煑取三升，分溫三分。小麥非也。

右語煑竹葉小麥，恐是麥門冬也，是

治癰疽虛熱，生地黃湯方

生地黃五兩　人參　甘草炙　黃耆　當歸　芎藭　黃芩　通草各二兩　大棗二十枚　淡竹葉切成三升　芍藥　茯苓各三兩

右十二味，先以水二斗，煑了水，取一斗五升，去滓，復諸藥，再煑取四升八合，一服八合，日三夜再，能頓服爲佳。

治癰疽內虛熱渴甚，黃耆湯方

生地黃八兩　竹葉切成三升　小麥二升　黃耆　黃芩　前胡　芎藭各三兩　菩蔞四兩　通草　芍藥　升麻　茯苓　甘草　知母各二兩　人參　當歸各一兩

右十六味，先以水二斗，煑竹葉及小麥，取一斗二升，去滓，復煑諸藥，取四升，分四服，日三夜一，小便利。除通草，茯苓，加麥門冬，腹滿，加石膏三兩，熱盛，去人參當歸。

治背生地黃湯方

生地黃八兩　人參　甘草炙　芍藥各二兩　通草　茯苓

黃耆　黃芩各三兩　淡竹葉切二升　大棗二十枚　當歸　芎藭各一兩

右十二味，先以水三斗，煑竹葉，取一斗，去滓，內諸藥，再煑四升，一服八合，日三夜再，若能每服一升佳。

治癰疽內虛，黃耆湯方

黃耆　人參　甘草炙　芍藥　當歸　生薑各三兩　大棗二十枚　乾地黃　伏苓各二兩　白朮一兩　遠志一兩半

右十一味，以水一斗三升，煑取四升，去滓，分溫四服。

治癰疽，五味竹葉湯方

竹葉切二升　五味子　前胡　當歸　乾地黃　人參各二兩　小麥二升　黃耆　黃芩　麥門冬去心，各三兩　生薑各三兩　甘草一兩半炙　升麻一兩　大棗十四枚　桂心半兩

右十五味，先以水二斗，煑竹葉小麥，取一斗，去滓，內諸藥，煑取三升，分溫四服，日三夜一。

治癰疽發背乳大去膿後，虛惙少氣欲死，服此，遠志湯方

遠志去心　當歸　甘草炙　桂心　芎藭各一兩　人參　麥門冬去心，各三兩　伏苓二兩　乾地黃二兩　生薑五兩　黃耆　大棗十四枚

右件十三味，以東流水一斗，煑取三升二合，分溫四服，日三夜一。

治發背乳，下復住，服此，白石脂湯方

白石脂四兩　龍骨三兩　當歸　桔梗　女萎　黃連去毛　甘草已上各二兩　白頭翁一兩　乾薑三兩

右九味，以水九升，煑取三升二合，分四服，下住便止，不必盡服，當下未即來日止。

治發癰疽，取利，熱小便退，不用食物，竹葉湯方

淡竹葉切三升　小麥二升　乾地黃　人參　黃芩　升麻各二兩　麥門冬去心　生薑　黃耆　芍藥各三兩　前胡　大棗十四枚

桂心半兩　遠志半兩去心　當歸一兩　甘草炙

右十六味切。先以水一斗入升。煑竹葉小麥。取一斗。去滓。內諸藥。又煑。取三升。分二服。羸者分四服。日三夜一。

治雞疸取下後熱少退。小便不利。竹葉湯方

淡竹葉切一升　小麥三升　乾地黃四兩　黃耆　石膏末　通草　升麻　黃芩　人參　甘草炙　前胡各二兩　大棗十四枚　麥門冬三兩去心

右十四味。先以水一斗六升。煑竹葉小麥取九升。去滓。內諸藥。煑取三升二合。強。卽分三服。羸卽四服。日三夜一。

治雞疸取利後。熱。小便不利。竹葉湯方

竹葉切三升　小麥二升　人參　黃芩　前胡　芍藥　甘草炙　乾地黃　當歸　桂心各二兩　黃耆三兩　麥門冬三兩去心　龍骨三兩碎　牡蠣一兩末　赤蛸蠟三十枚炒　大棗十四枚去核

右十六味。以水二斗。煑竹葉小麥取一斗。去滓。內諸藥。煑取四升。分四服。日三夜一。

治發背雞及發乳。兼味竹葉湯方

淡竹葉切三升　小麥三升　黃耆　黃芩　五味子　人參　前胡　乾地黃　當歸各二兩　大棗十四枚　麥門冬二兩去心　升麻一兩　桂心半兩　甘草一兩炙　生薑三兩

右十五味。以水二斗。煑竹葉小麥。取一斗。去滓。內藥。煑取三升。分溫三服。一日服。

治發背已潰。而下不住。白石脂湯方

白石脂四兩　龍骨三兩　當歸二兩　桔梗二兩　女萎　白頭翁各四兩　黃芪二兩　乾薑三兩

右八味。以水九升。煑取三升三合。去滓。服八合。日三夜一。

治發背已潰。大雞汁。虛懶少氣力。內補黃耆湯方

黃耆三兩　乾地黃　人參　茯苓各二兩　當歸　芍藥　芎藭

桂心　遠志去心各一兩　甘草一兩半　麥門冬去心三兩　生薑五兩

右十三味。以水一斗。煑取三升二合去滓。分溫四服。日三夜一。

治雞疸內虛熱。生地黃湯方

生地黃五兩　人參　甘草炙　芍藥　伏苓　芎藭　通草　黃芩　當歸各二兩　大棗二十枚　竹葉切三升

右十二味。以水三斗。煑竹葉。取半。去滓。內諸藥。煑取四升。分五服。日三夜二。能服一升可佳。

治發背。黃耆湯方

黃耆　黃芩　遠志　麥門冬去心各二兩　乾地黃　人參　芎藭　甘草炙　芍藥　當歸各一兩　大棗二十枚　生薑五兩

右十四味。以水一斗先煑。取四升五合。一服九合。日三服。夜一服。

治炙疸。枳實湯方甘林所論不得。

枳實炙　夜干　升麻　乾地黃　黃芩　前胡各三兩　犀角一兩半　大黃二兩半　麝香半兩　雞鼠屎二具勿去皮　桑螵蛸十四枚炙　一方。用甘草二兩。

右九味。㕮咀。以水九升。煑取。分溫三服。須差也。

治腸雞。大黃湯。雞之爲病。診小腹腫痞堅。按之則痛。或在膀胱左右。其色或赤或白。堅大如掌。熱。小便欲調時。色色汗出時復惡寒。其脈遲堅者。未成膿也。可下之。當有血脈數。膿成不可服此方。

大黃四兩　牡丹三兩　芥子半升　消石三合　桃人五十枚去皮炒切之

右五味。㕮咀。以水六升五合。分爲兩服。臍下無者。下血大良。

治背上初欲作瘡。便服此。大黃湯方

大黃三兩　梔子一百枚去皮　升麻　黃芩　甘草炙各三兩

右五味。以水九升。煑取三升半。分爲三服。得快下。數行便止。不下更服。

治婦人妬乳。辛夷湯方。

辛夷一升去毛　大棗三十枚　桂長一尺　防風二分

白芷　甘草一尺炙　生薑二分　澤瀉一升切

右八味，切，以水一斗，煮取三升，分溫三服。

治婦人客熱，乳結腫，或潰，或作癰，內補，黃耆湯方

黃耆　茯苓各三兩　芍藥二兩　麥門冬三兩去心　甘草二兩炙

厚朴一兩炙　人參三兩　生薑四兩　乾地黃三兩

右九味，切，以水一斗二升，煮取三升，分五服，日三夜一。

治癰腫患熱盛，黃耆湯方

黃耆　麥門冬三兩去心　黃芩六分　梔子十四枚

芍藥二兩　苦蔞二兩　乾地黃二兩　升麻一兩

右八味，剉，以水一斗，煮取三升，分溫三服。

治發癰疽，腫痛，去膿多，裏有虛熱，內補，黃耆湯方

黃耆二兩　茯苓　桂心　人參各二兩　麥門冬三兩去心

生薑一兩　遠志二兩去心　當歸二兩　五味子四兩　大棗二十枚　甘草六分炙

右十一味，切，以水一斗，煮取四升，分六服，日四夜二。

治癰去膿多，虛滿上氣，竹葉湯方

竹葉一升切　半夏二兩洗　甘草二兩炙　厚朴三兩炙　小麥四升

當歸一兩　麥門冬一兩炙　人參　桂心各一兩　黃芩三兩　生薑五兩

右十一味，切，以水一斗半，先煮竹葉小麥，取九升去滓，又煮諸藥，取二升，分溫三服。

治癰疽腫，煩熱增損，竹葉湯方

竹葉一握切　當歸　茯苓　人參　黃芩

桂心　芍藥各二兩　甘草三兩炙　大棗二十枚　小麥一升　麥門冬一升去心

右十二味，切，以水一斗六升，煮竹葉小麥，取一斗一升，去滓，內諸藥，煮取三升，分服，日三夜，重加黃耆二兩，胃中惡，加生薑六兩，下者減芍藥黃芩各六分，如體強羸者，以意消息之。

黃耆　生薑　石膏末　甘草炙　芍藥

知母　茯苓各一兩　桂心六分　麥門冬二兩去心　大棗十四枚　升麻　乾地黃一兩　人參已上各二兩

右十三味，切，以水一斗二升，煮取四升，分溫四服，日三夜一。

劉涓子鬼遺方卷第四

九江黃父癰疽論

釋癰疽色診

相癰疽知是非炙法

相癰疽知有膿可破法

治癰疽腫松脂帖方

治癰疽腫松脂帖方

治癰疽松脂帖腫方

治癰疽升麻薄橘冷方

治癰疽白斂薄方

治癰疽始一二痏，猪膽薄方

治癰疽腫熱盛，除熱，黃耆湯方

治客熱，鬱積在內，或生瘡，黃耆湯方

治癰未潰黃耆湯方
治癰內補竹葉湯方
治補度冷下赤石脂湯方
治取冷過塞下溫中湯方
治斷下補胃附子湯方
治癰反惡瘡猪蹄湯洗方
治癰腫壞多汗猪蹄湯方
治肘疽方
治癰最膿增損散方
治癰消膿木占斯散方
治發背婦人發房木占斯散方
治諸癰腫未潰猥麥散方
治瘡食惡肉散方
治癰疽食惡肉散方
治癰疽見膏方
治食宾青龍膏方
治癰疽金瘡生肌膏方
治癰發壞出膿血黃耆膏方 缺
治熛疽侵淫瘡膏方 缺
治熛疽或如桃核雞子瘡熱擣湯方 缺
治熛諸疽十指瘡熱猪蹄湯方 缺
治熛疽多汁浸大粉散方 缺
治丹癰疽始發瘡熱擣湯方

黃父癰疽論

九江黃父問於岐伯曰。余聞腸胃受穀。上焦出氣以溫分肉。而養骨節。通腠理。中焦出氣如露。注谿谷。而燥經脈。津液和調。變化而赤爲血。血和則乘脈先滿。乃注經絡。經絡皆益。乃注於經絡。和有脫誤。陰陽已張。因息乃行。行有經紀。周有道理。與天合同。不得休止。切而調之。從虛去實。寫則不足。疾則氣留。去虛補實。則有餘。血氣已調。形神乃持。余已知血氣平與不平。未知癰疽之所從生。成敗之時。死生之期。期有遠近。何以度之。可知聞乎。

岐伯曰。經脈流行不止。與天同度。與地同紀。故天宿失度。日月薄蝕也。經始紀冰道流溢。壅遏不成。五穀不植。經路不通。民不往來。菴聚邑居。別離異處。血氣猶然。則言其故。夫血脈榮衛。周流不休。上應星宿。下應經數。寒客於經絡之中。則血泣。泣則不通。不通則歸之不得復反。故癰腫與寒氣化爲熱。熱勝則肉腐。肉腐期爲膿。膿不寫。則爛筋。筋爛則傷骨。骨傷則水髓消。不當骨肉。不寫。筋枯空虛。筋骨肌肉不得相親。經脈敗漏。薰於五藏。五藏傷。故死矣。

黃父曰。願聞於癰疽之形。與其期日。

岐伯曰。略說癰疽極者。一十八種。癰發於嗌。名曰猛疽。猛疽不治。則化爲膿。膿塞其咽。半日死。其爲者寫。則已。舍豕膏無冷寫。三日而已。一方無冷食。發於頸者。名曰天疽。其狀癰大而赤黑。不急則熱氣下入淵腋。腋前。傷任脈。內薰肝脈。十餘日死。陽氣大發。消腦。名曰腦漏。其色不樂。項痛如刻。以藏頭乘心者不治。本作留字。發於肩及臑者。名曰臂癰。其狀赤黑。急治之。此令人汗出。至足不害五藏。發於腋下赤堅者。名曰米疽。治之砭石。欲細長疏。或云塗豕六汗。日以勿裹。其疽堅而不潰者。馬刀夾纓。乃治之。

發於胷者。名曰井疽。其狀如大豆。三四日起。不早治。下人腹。不治。十日死。

發於胷者。名曰甘疽。其狀如穀實菱芡。常寒熱。急治之。去其寒。十歲。缺。死。死後。膿自出。

發於脅者。名曰改發。改發者女子之病也。久之其疾大癰膿。治之。其中乃有生肉。大如赤小豆。到陵麻草。陵根。各一升。水六升。煮之。竭爲二升。卽強飲。厚衣坐釜上。令汗出至足已。

發於股陽明。名曰股瘻疽。其狀不甚變。而癰膿附骨。不急治。四十日死。

發於股陰。名曰赤施疽。不急治。六日死。在兩股之內。不治六日死。一方云。十六日死。發於尻。名曰兌疽。其狀赤堅大。急急治之。不速治。三十日死。

發於膝。名曰雌疽。其狀癰色不寒熱而堅。勿破。破之死。須以手緩柔之。乃破。

諸疽發於節。而相應之者。不可治之也。

發於陽者。百日死。

發於陰者。四十日死。

發於腦。名曰蕈蓋。其狀疾赤至骨。急治之。不治。殺人。

發於踝。名曰走緩。其狀癰也。急不變。灸而止。其寒熱不死。

發於足上。名曰四淫。其狀如癰。不急治之。百日死。

發於足。名曰脚疽。其狀初小指發。急治之。去其黑者。不輒益。不治百日死。發於足指。名曰脫疽。其狀赤黑不死。治之不衰。急漸去之。治不去。必死矣。

夫癰疽者。初發始微。多不爲急。此實奇患。惟宜速治之。急治不苦速。成病難救。以此致禍。能不痛哉。其速所懷以悟後賢。謹按黃父癰疽論。所著緩急之處。生死之期。如有別癰之形色。難易之治。如左僧納私撰。是用非是先賢。恐後高雅。故記之名字。令惑之耳。

發皮宍淺。腫高之。赤即消。不治亦愈。

發筋宍深。腫下之堅。其色或青或黃白黑。或復微熱而赤。宜急治之。或消中半。發附骨者。或未覺肉宍。肉宍已殃者。癰疽之甚也。肉宍肉宍俱誤。按宍即肉字也。

凡發背外。皮薄爲癰。皮堅爲疽。如此者多現先兆。宜急治之。皮堅甚大者。多致禍矣。

夫癰壞後有惡宍當者。以猪蹄湯洗其穢。次傅食宍膏散。惡宍盡。乃傅生肌膏散。乃摩四邊。令善宍速生。當須絕房室。慎風冷。勿自勞動。須筋脈復常。乃可自勞耳。不爾。新宍易傷。則重發。便益潰爛。慎之愼之。

相癰疽知是非可灸法

癰疽之甚。未發之兆。肥渴爲始。始發之始。或發日疽疊。似若小瘤。或復大痛。皆是微候。宜善察之。欲知是非。重按其處。是便隱復按四邊。比方得失。審定之後。即灸。第一。便灸其上二三百壯。又灸四邊一二百炷。小者灸四邊。中者灸六處。大者灸八處。壯數處所。不思多也。亦應即枯即薄。令得所即消。內服補髮湯散。不已。服冷藥。外即冷薄。不已。用熱枯。枯之法。開其口泄熱氣。

相癰知有膿可以破未

癰大堅者未有膿。半堅薄半有膿。當上薄者。都有膿。便可破之。所破之法。應在下逆上破之。令膿得易出。用排針。膿深難見。上宍厚而生宍。火針。若外不別有膿。可當其上。數按之。內便隱痛者。宍殃。堅者未有膿也。按更痛於前者。內膿已熟也。膿泄去熱氣。不爾長速。速即不良。

治癰疽腫。松脂枯方。

黃蘗　芎藭　白芷　白斂
黃芩　防風　芍藥　茵草
當歸　大黃各一兩　細辛二分　膃脂三兩　黃耆
白蠟　松脂二斤

右十六味。切曝乾極燥。微火煎三上下。手不得離。布絹絞去滓。枯之。

治癰疽腫松脂枯方

當歸　黃耆　黃連　芎藭
黃芩

大黃　臘蜜　芎藭各一兩　松脂一斤中陳　膃脂一合半

右十味。細切合煎。微火三上下。膏成。綿布絞去滓。向火。塗紙上。貼之。

治癰疽松脂貼腫方

松脂一斤　大黃三分　膃脂一兩　細辛半分　黃芩一分半　防風半分　白芷　白斂　芎藭　當歸
芎藭　黃連　白蠟　黃蘗各一分

右一十五味。細切曝令極燥。先煎脂蠟。下松脂洋盡。內諸藥二上。下。候色足。絞以綿布。水中以新竹片上火炙之。施紙上貼之。此藥大祕。實有奇效。不妄傳之。

治癰疽升麻薄極冷方

升麻一兩　大黃一兩　白斂六分　黃耆一兩　黃芩六分
白及一分乾者　牡蠣二分粉　龍骨一兩　甘草二分炙　芎藭一兩

右十味。篩和。以猪膽調塗布傅之癰上。燥。易之。

治癰白斂薄方

白斂　大黃　黃芩各等分

右三味。搗篩。和雞子白。塗布上。薄癰上二。燥輒易之。亦可治。又以三指撮。置三升水中。煮三沸。綿注汁。拭腫上數十過。以寒水石沫。塗腫上。紙覆之。燥復易。一易。輒以煮汁拭之。晝夜二十易之。

治癰疽始一二日。痛微。內薄令消。猪膽薄方

黃耆　龍骨　青木香　梔子人　羚羊角
升麻　白斂　大黃　黃蘗　黃芩
赤小豆　麻黃去節　黃連　犀角一兩　乾地黃
芎藭

右十六味。各等分。搗篩。以猪膽調令如泥。以故布開口。如小豆大。以泄熱氣。

治癰腫。熱盛口燥思渴。除熱止渴。黃耆湯方

黃耆　芎藭　乾地黃　升麻各二兩

麥門冬三兩去心 梔子三十枚 芍藥三兩 黃芩一兩半

右八味以水一斗煮取三升分溫三服

治客熱鬱積在內或生瘡黃耆湯方

黃耆二兩 人參一兩 芎藭 當歸 遠志去心 乾地黃各二兩 大棗二十枚 生薑五兩 甘草炙各一兩 麥門冬去心五兩

右十味切以水一斗二升煮取三升分溫三服

治癰未潰黃耆湯方

黃耆四兩 甘草二兩炙 桂心三兩 芍藥 半夏 生薑各八兩 飴一斤

右七味以水七升煮取三升飴化分三服

治癰內補竹葉黃耆湯方

竹葉切一升 黃耆四兩 甘草二兩 芍藥四兩 黃芩一兩 人參二兩 桂心一兩知冷用半兩 大棗十二枚 乾地黃二兩 升麻三兩 茯苓 生薑各一兩

右十二味以水二斗煮竹葉澄清取九升內諸藥更煮取三升分溫三服

治補虛冷下赤石脂湯方

赤石脂 人參 甘草炙 乾薑各二兩 龍骨一兩碎 附子大者一枚炮

右六味切以水八升煮取二升半去滓分溫三服如人行十里進一服

治取冷過寒下飴見出溫中湯方

甘草六分炙 乾薑六分 附子炮去皮破六分 蜀椒二百四十粒去目者出汗

右四味切以水六升煮取二升分溫三服

治斷下補胃附子湯方

附子二分炮 當歸 人參 黃連 甘草炙各一兩 乾薑 桂心 芍藥各二分 蜀椒去汗目閉口半分

右九味以水五升煮取一升五合去滓分溫二服

治癰瘡及惡瘡有惡宾猪蹄湯洗方

猪蹄一具治如食法 白斂二兩 白芷二兩 黃連一兩 狼牙二兩 芍藥二兩 黃芩 獨活 大黃各一兩

右九味以水三斗煮猪蹄一斗五升去蹄內諸藥又煮取五升洗瘡日四次甚良

治癰疽腫壞多汁猪蹄湯方

猪蹄一具治如食法 芎藭 甘草炙 大黃 黃芩各二兩 芍藥三兩 當歸兩

右七味先以水一斗五升煮蹄取八升去蹄內諸藥更煮取三升更去滓及溫洗瘡上日三亦可以布內湯中薄瘡腫上燥復之

治肘疽方

黃連 皂莢各等分炙去皮子

右二味搗下和以淳苦酒調令如泥塗滿肘以綿厚薄之日三易良

治癰疽最膿增損散方

黃耆五分膿多倍之 小豆一分熬口乾倍之 芎藭二分肉未生倍之 白斂三分有膿者不合倍之 苦蔞三分若小便利倍之

右六味搗篩令細酒調溫服方寸匕日三

治癰消膿木占斯散方

木占斯 桂心 人參 細辛 敗醬 乾薑 厚朴 甘草炙 防風 桔梗已上各一兩

右十味搗篩酒服方寸匕入咽覺流入瘡中若癰及疽亦之不能發壞者可服之瘡未壞去敗醬已發膿內入敗醬此藥時有化癰疽成水者方正桂爲異故兩存焉案正桂卻似誤

治發背及婦人發房幷腸癰木占斯散方

木占斯 厚朴炙 甘草炙 細辛 菁蔞 防風 乾薑 人參 桔梗 敗醬已上各一兩

右十味搗篩酒服方寸匕日七夜四以多爲善敗醬草名也病在上者當吐在下者當下膿血此謂腸癰之屬也諸病在裏惟服此藥即覺有力及癰疽便即復痛長服治諸瘡及疽痔瘡已潰便即早愈凡俗流醫不知用此藥發背有不善面渴便勃服之若藥力行覺渴心便消散若雖服壞終無苦但喜夜服勿懈也發此藥消散不覺便去時即愈或長服即去敗醬偏治婦人乳腫諸產疵速愈良又云惟

腰有異，始覺背有不善之也。

治諸瘡疽已潰未潰，瘡中疼痛，膿血不絕，䵋麥散方

䵋麥　白芷　黃耆　當歸　芍藥　薏苡人　芎藭　赤小豆（束脩一兩）　細辛

右九味，先以清酒小豆出於銅器中，熬令乾，復濃，濃後復熬，五過止，然後治末，合搗篩，溫酒服方寸匕，當夜各五，三日後痛瘥者，肌肉也。又方用苦酒漬小豆，多痛，倍䵋麥，瘡口未開，倍白芷，多膿，倍黃耆，薏苡人，芎藭等。

治瘡食惡肉散方

蜀椒（一分中）　真珠（一分中）　石硫黃　雄黃　麝香（各三分）　馬齒　礬石（燒）　漆頭　蘆茹（各三分）

右九味，篩搗粉瘡上，亦可為膏和傅瘡上。

治瘡疽食惡肉散方

雄黃（一兩）　礬石（一分燒）　蘆茹（一兩）

右三味，搗篩，稍著之，隨用多少，不限一兩。

治瘡疽兌膏方

當歸　芎藭　白芷　松脂（各二兩）　烏頭（一兩）　猪脂（二升）　巴豆（十枚去心皮）

右七味，㕮咀，內膏中，微火合煎三沸已，內松脂，攪合相得，以綿布絞之，去滓，以膏著綿絮兌頭丈作兌，兌之瘡雖深淺，兌之膿就兌盡，即善肉，瘡淺者不足，兌著瘡中日三，惡肉盡則止。

治食肉膏龍膏方

白礬（二兩火燒末之）　熟梅（二升去核）　鹽（三合）　大錢（二十七枚）

右四味，於銅器中猛火投之，摩滅成末，乃和猪脂，搗一千杵，以塗瘡上，甚痛勿怪，此膏食惡肉盡，復著，可傅蛇銜膏塗之，令善肉復生。

治瘡中金瘡生肉膏方

大黃　芍藥　黃耆　獨活　白芷

芎藭（各一兩）　當歸（一兩）　蓯白（二兩）　生地黃（三兩）

右九味，㕮咀，以盛煎猪膏三升，煎三上下，以綿布絞去滓，用兌膏，多少隨意常用之。

治丹瘡疽始發，熱燙淫，長成瘡湯方

升麻　黃芩（各三兩）　黃連　大黃（各二兩）　當歸（一兩）　甘草（一兩炙）　芎藭（二兩）　芒消（三兩）　羚羊角屑（各一兩）

右九味，㕮咀，以水一斗三升，煮取五升，絞去滓，鍋中內芒消，上火，攪合成，沸盡，滓稍分，適冷熱，貼瘡上，數過，其熱隨手消散，王練甘林所祕，不傳此方。

劉涓子鬼遺方卷第五

治瘡疽敗壞，生地黃膏方
治瘡疽瘡生肌，黃耆膏方
治發背乳急痛，丹參膏方
治瘡疽腫痛堅強不消，黃芩膏方
治瘡疽止痛，鵝脂膏方
治瘡疽金瘡，續斷膏方
治瘡疽金瘡，止痛，甜竹葉膏方
治瘡疽敗壞，生肉，芎藭膏方
治瘡疽敗壞膿爛，蛇銜膏方
治瘡疽食肉膏方
治瘡疽食肉大黃膏方
治瘡疽食惡肉蘆茹膏方

治癰疽始作便敗壞膏方
治久病疥癬膏方
治瘡疽惡疥癬五黃膏方
治瘡疥癬散熱水銀膏方
治面野皰麝香膏方
治面瘡皰木蘭皮膏方
治瘡皰鷄屎膏方
治髮頭生髮膏方
治婦人乳腫丹參膏方
治頭白頭經年五味子膏方
治疽漏瘡疥惡瘡膏方
治久瘡疽諸瘡野葛膏方
治丹砂膏三首
赤膏治百病方
治熛疽丹砂膏方
治熛疽麝香膏方
治釘腫芎藭膏方
治熛疽始發丹砂膏方
治風溫病疽諸惡瘡膏方
治瘡疥諸惡瘡丹砂膏方
治小兒頭瘡紫草膏方
治小兒熱瘡水銀膏方
治火瘡相皮膏方
治熛疽淩溼廣大羊髓膏方
治熱毒瘡升麻膏方
治熱瘡生地黃膏方
治諸瘡爛雄黃膏方
治瘡疥疽漏水銀膏方

治癰瘡瘡白芷膏方
治皮膏中熱癰瘡白斂膏方
治熱瘡生地黃膏方
治濕熱諸瘡黃連膏方
治熱瘡蛇床子膏方
治熱瘡木蘭膏方
治熱瘡黃連膏方
治炙瘡甘草膏方
治諸癰破大去膿黃耆膏方
治癰疽已潰白芷膏方
治諸疽瘡膏方
治鼻中塞白芷膏方
治竹本所刺手腳羊屎膏方
治湯淚人肉爛壞尤膏方
治火燒爛壞栢皮膏方
治久病瘡疽惡瘡蘆茹膏方
治婦人妬乳生瘡雄黃膏方
治惡瘡磨香膏方
治頭瘡骨疽牛屎薰方
治諸傷六物滅瘢膏方
治瘡疽敗壞生肉地黃膏方

生地黃一斤　辛夷　獨活　當歸　大黃　芎藭　黃耆　蕤白　白芷　芍藥　黃芩　綿斷各二兩

右十二味，切，以臘月猪脂四升，微火煎白芷，色黃，膏成，絞去滓，傅，日四。

治癰疽瘡生肉黃耆膏方

黃耆　細辛　生地黃　蜀椒去目閉口，汗　當歸　芎藭　蕤白　白芷　丹參　甘草炙　茯苓　獨活　黃芩已上各一兩　臘月猪脂一斤半

右十四味，細切，以苦酒一升二合，夏即漬一日，冬二夜，微火煎三上下，酒氣盡，成膏，傅之，極良。

治發背乳口已合皮止急痛生肉膏方

丹參　防風　白芷　細辛　芎藭　黃芩
甘草炙　黃耆　牛膝　槐子　獨活　當歸

右十三味，切，以臘月脂五升，微火煎三上下，白芷黃，膏成，病上摩，向火，日三四。

治雞腫堅強，不消，不可用傅貼處，黃芩膏方

黃耆　黃芩　芎藭　白斂　防風　茵草
白芷　芎藭　大黃　細辛　當歸已上各一兩

右十一味，㕮咀，以豬脂四升，微火上煎，一沸一下，白芷黃，即成膏，傅之，堅硬者，日可十易。

治雞疽止痛生肌鵝脂膏方

松脂七兩　芎藭　當歸　芎藭　黃芩各一兩　鵝脂七兩　白蠟五兩

右七味，㕮咀，以臘月豬脂二升二合，微火煎一沸一下，三十過成，以摩於瘡上。

治雞疽金瘡續斷生肉膏方

續斷　乾地黃　細辛　當歸　芎藭　黃耆　通草
芎藭　白芷　牛膝　附子熬　人參　甘草炙，已上各兩　臘月豬脂升，四

右十四味，㕮咀，著銅器中，下膏，諸藥漬之半日，微火煎三上下，白芷候黃，膏成，傅之瘡上，日四五過，良。

治雞疽瘡止痛生肉甜竹葉膏方

甜竹葉五兩　生地黃四兩　大戟二兩　臘月脂四升　當歸　續斷
白芷　茵草　芎藭　防風各二兩　甘草一兩半炙　芎藭一兩半
蜀椒牛兩，去目，汗閉口　細辛　大黃　杜仲各半兩　黃耆半兩

右十七味，㕮咀，以豬脂微火煎五上下，候白芷黃，膏成，傅瘡上，甚良。

治雞疽敗壞生肉茵草膏方

茵草　當歸　蘧白　黃芩
生地黃五兩　白芷三兩　大黃四兩　甘草炙，各二兩　續斷一兩

右九味，㕮咀，以豬脂三升，微火煎三沸，三上下，白芷黃，膏成，傅瘡，良。

治雞疽臘爛，并小兒頭瘡，牛領馬鞍革，及腸中諸惡耳聾痛風，腫脚疼，金木水火毒螫所中，桑瘡百瘻，無所不治，蛇銜膏方

蛇銜　大戟　大黃　芎藭　附子熬　當歸　獨活
茵草　黃芩　細辛　芎藭　蜀椒去目閉口汗　蘧白已上各一兩

右十三味，㕮咀，以苦酒漬之，淹一夜，以豬脂二升半，微火煎三上下，膏成，綿布絞去滓，病在內，酒下彈丸大。

治雞疽食瘜肉膏方

松脂五兩　雄黃研，別　雌黃　野葛皮各二兩　豬脂一斤　漆頭蘆茹三兩　巴豆一百枚，去皮膜心

右七味，先煎松脂，水氣盡，下諸藥，微火煎三上下，膏成，絞去滓，內雄雌二黃，攪調，以膏著兌頭內，瘡內口，方六七勿字兼新故，初用病更腫赤，但用如節度，瘜肉盡止，勿使過也。

治雞疽大黃食肉膏方

大黃　附子　茵草　芎藭　雄黃　眞珠末各一兩
白斂　礬石　黃芩　漆頭蘆茹各二兩　雌黃一兩

右十一味，㕮咀，六物，以豬脂一升四合，微火煎三上下，末蘆茹，下，煎成膏，中，以塗兌頭，傅瘡中，須瘜肉盡，勿使過也。

治雞疽食瘜肉蘆茹散方

漆頭蘆茹　礬石　硫黃　雄黃已上各二分

右四味，擣篩，攪令著兌頭內瘡口中，瘜肉盡止，勿使過也。

治雞疽始作便敗壞，發瘡膏方

羊髓一兩　甘草二兩　胡粉五分　大黃一兩　猪脂二升

右五味，切，合脂髓，煎二物令泮，內甘草大黃三上下，去滓，內胡粉，攪令極調，傅瘡上，日四五。

治久病疥癬，瘜瘡膏方

丹砂　雄黃　雌黃　亂髮洗　松脂
白蜜已上各一兩　蘆茹漆頭者，三兩　巴豆十四顆，去皮心　臘月猪脂三升

右九味。先煎亂髮汁。盞內松脂。煎三上下。成膏。絞去滓。末茹。內膏中。煎。攪極調。傅瘡上。日三易之。

治久病疥癬諸惡瘡毒。五黃膏方

雌黃　雄黃　黃連　黃蘗　黃芩

青木香　白芷各二兩　亂髮一團如手大　雞舌香一兩　狼牙子四十枚

右十味。㕮咀。以苦酒半升漬諸藥。一夜。以臘月脂三升。先煎髮一沸。內諸藥。三五沸止。絞去滓。成膏。傅瘡上。日五易之。

治病疥癬惡瘡。散熱水銀膏方

水銀　礬石　蛇床子　黃連已上各一兩

右四物。兩度篩。以臘月猪脂七合和。并水銀。攪令調打數萬過。不見銀。膏成。傅瘡。若膏少。益取。并小兒瘡。良。[illegible]

治面齄皰。麝香膏方

麝香二兩　當歸　附子　芎藭

白芷　芍藥已上各一兩　細辛二合　杜衡二分

右八味。㕮咀。以臘月猪脂一升二合。煎諸藥三上下。絞去滓。別末研麝香。安膏中。攪令調。傅皰上。日三易之。

治面皰。木蘭膏方

木蘭　防風　白芷　青木香　牛膝

獨活　藁本　當歸　芍藥　杜衡

辛夷　芎藭　細辛各一兩　麝香一分　附子二分炮

右十五味。㕮咀。諸藥。以臘月猪脂一升。微火煎三沸。三上下。去滓。末下。攪令調。膏成。傅皰上。日三。

治查皰。鷄鷄屎膏方

右取鷄鷄屎一升。搗篩。臘月猪脂調和。傅之。

治頭禿生髮。白芷膏方

白芷　蔓荊子　附子　防風

細辛　黃芩　當歸　獨椒各一兩去汗閉口　芎藭　茵草

大黃一兩　馬髮膏五合為所用多無

右十二味。切。以臘月猪脂三升。合諸藥。微火煎三上下。白芷色黃。膏成。洗頭澤髮。勿近面。

治婦人乳腫痛。丹參膏方

丹參　芍藥各二兩　白芷一兩

右三味。以苦酒漬一夜。猪脂六合。微火煎三上下。膏成傅之。

治頭白禿瘡髮落。生白痂。經年不差。五味子膏方

五味子二分　兎絲子五分　菟蓉二分　雄黃一分　松脂二分

蛇床子　遠志去心各三分　雄黃　白蜜各一分　雞屎半分

右十味。以猪膏一升二合煎。先內雌黃。次內雞屎。次內蜜。次內松脂。次內諸藥。並先各自末之。膏成。先以桑灰洗頭後。傅之。

治疽瘡痂疥諸惡瘡。連年不差。并小兒頭瘡。悉治之。膏方

藜蘆　附子　蘆茹　桂心　天雄　蛇床子　野葛皮

雄黃　亂髮洗　白芷　半夏洗湯　礬石　細辛　杏人

芎藭　芍藥　白蘞　烏頭各二兩　黃連　當歸　藁本已上各二兩

班猫　茵草　巴豆去皮心　黃蘗　吳茱萸　蜀椒各一兩去目閉口汗

右二十七味。㕮咀。以苦酒漬一夜。以臘月猪脂四斤。微火煎。令酒氣盡。膏成。日四五傅。用多妙。

治久瘡疽諸瘡。治葛膏方

治葛皮　黃連　細辛　杏人　茵草　芍藥　藜蘆

附子　亂髮　蘆茹　芎藭　白芷　蛇床子　桂心

藁本　烏頭　白蘞　吳茱萸　雌黃　礬石　天雄

當歸已上各二兩　班猫　巴豆去皮心　蜀椒去目汗閉口　黃蘗各一兩

右二十六味。㕮咀。各搗篩。以猪脂五升。於銅器內。微火煎諸藥七沸上下。絞去滓。更煎。攪勻。成膏。以傅瘡上。日四五。

丹砂膏方三首

丹砂五兩　芎藭三兩　大黃二兩　獨椒二兩去目出汗　白芷二兩　麝香三兩　升麻二兩

治葛皮二兩　麻黃五兩去節　丹參五兩　巴豆二升去皮心　桂心二兩　附子十二枚　皂莢二兩去皮子

右十四味，以豬脂六升，春夏共用，調合，在後方消停。

又方

丹砂三兩　萵藭三兩　大黃二兩　蜀椒去目閉口汗二兩　白芷二兩　麝香六兩　芎二兩　附子十二枚　乾薑五分　治葛二兩　丹參六兩　細辛二兩　巴豆三升去皮心

右十三味，秋冬共用，亦在年中有所宜，以煮消息，藥各擣羅之，巴豆細切，以苦酒漬一夜，盡足，不須覆之，明旦，以豬脂成六升，鐺中微火煎，三上下膏成，勿使傍人及雞犬貓見，其膏同治，其餘此方，須是細意專持。

又方

丹砂二兩末　蜀椒去目閉口汗　大黃　白芷　甘草炙，已上各二兩　巴豆三升去皮心　麝香　芎藭各二兩　附子二枚　升麻二兩　冶葛皮　犀角　當歸　烏頭各二兩　丹參一斤

右十五味，切，以苦酒漬之一夜，以豬脂六升，微火煎三上下，膏成，絞去滓，用之，此膏是四時常用，日三。

此方無比。

丹砂膏，鈹治百病，傷寒溫毒熱疾，服如棗核大一枚，鼻塞，取半棗大，內鼻中，縮氣，令人聰裏。若耳聾，取如兩棗核大，洋之，如水，內其耳中，三五年聾可差。或寒癖腹滿堅脹，及蒸尸惡毒楚痛，溫酒服，雖亂當成，未成，已吐，未痛，白湯服棗核大，若已痛，一兩行，而腹煩痛，更服之。眼中風膜膜或痛，常下泪，取如粟大，注眼中，自當下，止，或半目痛，便愈。

又胸背喉頸痛，靡足，口中亦稍稍令常聞有膏氣，人體自有不同者，易爲藥，當服取利爲度，老小增減，服膏之法，得利若不利，如人行十五里，可與熱飲發，當預作白薄粥，令冷，若過利要止者，多進冷粥，便住，若能忍待藥勢盡，自止，更佳。

赤膏，治百病方　治痢同丹砂膏用之。

冶葛皮一兩　白芷一兩　蜀椒二升去目閉口汗　大黃　芎藭各二兩　巴豆三升去皮心　附子十二枚　丹參一斤　豬脂六升

右九味，㕮咀，以苦酒漬一宿，合，微火煎三上下，白芷黃，即膏成，絞去滓，用傷寒鼽鼻，溫酒服如棗核大

一枚。

賊風，靡疽腫，身體惡氣，久溫痺，骨節疼痛，向火靡之。膏擠諸惡瘡，以帛薄之。鼠瘻疽瘡下血，身體腫軫，痒極成瘡，汁出，馬鞍牛領，以藥傅之即愈。腰背手足流腫，拘急，屈申不快，以膏傅之，日三。婦人產乳中風，及難產，服如棗核大，并以膏靡腹立生。如食魚骨，日五服愈。如耳聾，以膏如小豆大，著耳中，忠愈。肉，以膏內鼻中愈。眼齒痛，以膏如粟注管中，白蘆管當蓋子視以膏如粟注管，愈。

治慄疽，丹砂膏方

丹砂末　犀角　夜干　大黃　芎藭　麝香末　黃芩各二兩　生地黃十兩切　升麻　前胡　沈香各三兩　青木香一兩

右十二味，㕮咀，以苦酒漬淹一宿，以豬脂五升，微火煎三上下，絞去滓，內丹參麝香末，攪調，稍稍服之。

治慄疽，麝香膏方

麝香末　凝水石　黃芩　丹砂末　芎藭　雞舌香　茵草三兩　升麻三升　羚羊角　夜干　大黃　羊脂各三兩　訶木香各二兩

右十四味，切，以苦酒漬一夜，用豬脂六升，微火上煎三上下，絞去滓，內麝香丹砂末，攪令調，膏成，以麝病上，甚良。

治丁瘡，生芎藭膏方

生芎藭汁一升　丹砂二兩　生地黃二斤　白芷三兩　大黃三兩　麝香末三兩　甘草三兩炙　當歸二兩　升麻二兩　雁白八兩

右十味，㕮咀，以苦酒漬一夜，豬脂五升，微火煎三上下，膏成，塗於瘡上。

治慄疽，始發，未曾治，宜速服，丹砂膏方

丹砂末　犀角二兩　夜干三兩　生地黃十兩　大黃三兩　升麻三兩　芎藭三兩　麝香二兩　前胡三兩　沈香二兩　黃芩三兩　青木香一兩

右十二味，㕮咀，以豬脂五升，微火煎三上下，止，絞去滓，入麝香丹砂末，攪令調，溫酒下，如棗核大，日三服。

治風溫爲疽諸惡瘡，經年不差，其著胸膈背日大不可視之，恐見肺肺髓者，皆主之，傳當火須以益用之，丹砂膏方

丹砂 末、 雄黃 末、 附子 天雄 乾地黃 大黃
當歸 秦膠 各二兩、 烏頭 桂心 黃連 松脂

右十八味、咬咀、十六味、以苦酒一斗、漬一夜、以猪脂六升、微火煎三上下、藥色黃成、絞去滓、內二石末、攪令調、傅瘡有口、亦可兌瘡口、此脂多治合卽隨多少、苦酒不必盡一斗、以意量用之、

治瘡疥癬諸惡瘡、丹砂膏方

蜀椒 三升、去目汗、 丹砂 細辛 桂心 各二兩、 附子 三十枚、 前胡
白芷 各一升、切 莨菪 切、 白朮 吳茱萸 各一升、 當歸 一兩、

右十一味、咬咀、諸藥唯椒茱萸不擣、以苦酒漬一夜、令淹、以猪脂不中水者、十斤、細切、合諸藥於銅器內、煎三上下、白芷黃成膏、以綿布絞去滓、如患風溫腫不消、服如彈丸大一枚、若鼻塞不通、以膏著鼻中、若膏肓風目爛眥、痒痛、茫茫不見細物、以綿裹筋頭、注膏中、以傅兩眥、至臥時再傅之、齒痛亦如耳聾、亦准之、諸惡瘡皆治之、金瘡牛領馬鞍瘡、亦可傅之、治下疳、腹中有蟲、并瘧疾在外、卽摩之、在內卽服之、如彈丸大一枚、日三服、此膏無所不治、

治小兒頭瘡、并惡紫草膏方

紫草 三兩、 黃連 女青 白芷 各一兩、 礬石 三兩、燒令汗出、 苦酒 五合、 生地檢根 一兩、

右七味、內三味、礬石紫草黃連爲末、入諸藥煎、白芷黃、膏成、傅瘡上、

治小兒熱瘡、水銀膏方

水銀 二兩、 胡粉 二兩、 松脂 二兩、 猪脂 四升、

右四味、煎松脂水銀氣出、下三物、攪令不見銀、放冷、以傅瘡上、

治火瘡、相皮膏方

右皮去黑皮、用白肉、以猪脂少多、煎去滓、候凝、隨意使之、

治漂疽、浸淫廣大、赤黑爛壞成瘡、羊髓膏方

羊髓 二兩、 大黃 二兩、 甘草 一兩、 胡粉 二分、

右四味、咬咀、以猪脂二升半、并胡粉、微火煎三上下、絞去滓、候冷、傅瘡上、日四五、

治熱毒、并結、及腫、成瘡、升麻膏方、

升麻 三兩、 白朮 一兩、 牡蠣 三分、 白芨 二兩、 白斂 二兩、
茵草 二分、 夜干 二兩、 大黃 二兩、 黃連 二兩、

右九味、咬咀、以猪脂三升、微火煎、膏成、絞去滓、以傅瘡上、日四五、

治熱瘡、生地黃膏方

生地黃 白斂 白芷 黃連 升麻 黃芩 大黃 已上各十兩、

右七味、咬咀、以猪脂一升半、微火煎成膏、絞去滓、傅瘡、日四五、

治惡瘡皆爛、雄黃膏方

雄黃 礬石 末、 藜蘆 當歸 黃連
附子 各二兩、 茵草 芎藭 白芨 各一兩、 巴豆 六十枚、去皮心、

右十味、咬咀、以猪脂二升、微火煎、膏成、絞去滓、內石末、攪調、傅瘡、日四五、

治瘡疽癰、水銀膏方

水銀 二兩半、 胡粉 二兩、 松脂 二兩、 猪脂 四升、

右四味、先煎松脂、水氣盡、下胡粉、攪令水銀盡不見、可傅瘡、日三、亦治小兒瘡熱瘡、頭瘡、

治瘡瘻瘡、白斂膏方

白斂 三兩、 白芨 三兩、 芎藭 大黃 黃連 各二兩、
當歸 三兩、 黃蘗 二兩、 豉 八合、炒、 羊脂 三兩、 猪脂 二升、

右十味、咬咀、以二脂合煎、內諸藥、微火煎、膏成、去滓、候凝、傅之、

治皮膚中熱瘡瘻瘻、白斂膏方

白斂 黃連 各二兩、 生胡粉 一兩、

右三味、擣篩、溶脂、調和傅之、

治熱瘡、生地黃膏方

生地黃 四兩、 黃連 四兩、 大黃 三兩、 黃蘗 甘草 炙、 白斂 升麻 各二兩、

右七味、咬咀、以猪脂二升半、微火合煎、膏成、絞去滓、候凝、可傅之、

治熱瘡、生地黃膏方

生地黃四兩　黃連五兩　白斂　芍藥　白芨各二兩　苦參　升麻各三兩

右七味。㕮咀。以猪脂二升半。內諸藥。同煎。膏成。去滓。候凝。傅之。

治溫熱諸瘡。黃連膏方

黃連　白斂　白芷各二兩　生胡粉一兩

右四味。細篩。用猪脂調塗之。

治熱瘡。虵床子膏方

虵床子二兩　乾地黃二兩　苦參一兩　大黃二兩　通草二分　白芷　黃連各一兩　狼牙二分

右八味。搗篩爲細末。用猪脂。以意調和塗之。

治熱瘡。木蘭膏方

木蘭一兩　白芷　黃連各三兩　黃蘗二兩　芍藥一兩　梔子二十一枚　黃芩二兩　狼牙二兩　夜干一兩　虵床子一兩

右十味。㕮咀。以猪脂二升。合諸藥。微火煎。膏成。去滓。塗傅之。

治熱瘡。黃連膏方

黃連　生胡粉各三兩　白斂二兩　大黃二兩　黃蘗二兩

右五味爲末。用猪脂。以意調和塗之。

治炙瘡。甘草膏方

甘草一兩　當歸一兩　胡粉半兩　羊脂一兩半　猪脂三兩

右五味。㕮咀。以猪羊脂。幷諸藥。微火煎成膏。絞去滓。候凝。傅之。

治諸癰破後。大膿血極虛。黃耆膏方

黃耆　附子　白芷　甘草　防風　大黃　當歸　續斷　芍藥各一兩　蓯蓉一分　生地黃五分　細辛三分

右十二味。切。以猪脂三升。內諸藥。微火慢煎。候白芷黃色。膏成。絞去滓。候凝。塗瘡。摩四邊。口中。日四過。

治癰疽已潰。白芷膏方

白芷三分　甘草三分　烏頭三分　雞白十五枚　青竹皮如雞子大一塊

右五味。以猪脂一升。合煎。候白芷黃。膏成。絞去滓。塗四邊。

治諸疽瘡膏方

蠟一兩　亂髮　礬石各一兩　松脂一兩　猪脂四兩

右五味。先下脂。煎令消。下髮。髮消。下礬石。礬石消。下松脂。松脂消。下蠟。蠟消。膏成。過。候凝。塗傅之。

治鼻中塞利鼻。白芷膏方

白芷　通草　桃核各一分　薰草二絲　羊髓八絲　當歸一分

右六味。以清酒煉羊髓二過。㕮咀諸藥。煎膏成。絞去滓。用小豆大。內鼻中。日三。

治竹木所刺入手足壯不出。臚瘡痛。羊屎膏方

右取乾羊屎搗篩。用猪脂和。以塗之。瘡口立出。

治湯淚人宍爛壞。虻膏方

虻二兩　附子二枚大者炮　甘草二兩　羊脂五兩　松脂雞子大一塊　猪脂五兩不入水者

右六味。微火上。煎猪脂後。內羊脂。幷諸藥。又煎。膏成。絞去滓。候凝。塗瘡上。日三。

又方

栢樹皮四兩去黑處　甘草三兩細切　淡竹葉二兩切

右三味。以不中水猪脂一升二合。入藥煎。膏成。絞去滓。塗瘡上。日三。

又方

麻子一合取人　栢皮一兩取白　白芷一兩　生柳皮一兩去白

右四味。㕮咀。以脂一升。同藥煎。膏成。濾去滓。候凝。傅瘡。日三。

治癰疽疥癬。及惡瘡。蘆茹膏方

蘆茹三兩連頭者　雄黃　雌黃末各一兩　丹砂研一兩　亂髮半兩洗

右五味。搗篩。合調。煎以先用猪脂二升半。煎髮。取盡。內諸藥。微火更煎。候膏成。不令他人雞狗犬見。傅瘡上。日三。

治婦人妬乳生瘡。雌黃膏方

雌黃　白斂　雄黃　漆頭蘆茹各一兩　亂髮一團如雞子大

右五味，各研，擣篩，以不中水猪脂二升，先煎亂髮令盡，下諸藥，再微火煎，候膏成，放凝，塗瘡上，日三四。

治諸惡瘡，麝香膏方

麝香　冷石　雄黃　丹砂各五分

右四味，各細研，如粉，以臘月猪脂，量其多少，調和，如塗傅瘡時，先用大黃湯，放溫洗了，淹乾，然後塗膏。

治頭瘡惡瘡骨疽等牛屎薰方

取苦瓠，截除底，斷其鼻，取牛屎，著地上，燒以無底瓠籠屎上，引煙，從瓠空中出，以瘡著煙上薰之，自然止，過三度即除。

六物滅瘢膏方

衣中白魚　雞屎白　鷹糞白　芍藥　白斂　白蜂蜜各分

右藥研如粉，以乳汁和塗瘢上，日三良。

小品滅瘢方

雞矢白一兩　辛夷人四分　白附子二分　細辛二分

右四味，酒浸一宿，以羊脂六合，微火煎三上三下，去滓，傷瘢，以甘草湯洗訖，敷之。一方有桂心二分。

又方

鹿屎白一兩，研，白蜜和塗瘢上，日三。

秘製大黃清寧丸方

孫思邈撰

其證驗云。五松居士書。時辛未歲二月九日。

製大黃丸方序

內府傳有十五製大黃丸方。家大人每歲如法製成。以施病者。不論何疾。一服輒愈。適刊素女方。因附于後。以廣其傳。昔家真人思邈少嬰羸疾。博究醫術。撰千金方、千金翼方。集醫學之大成。皇衍亦病俗醫不學。喜搜羅醫方古書。訂證神農本經三百六十種。刊宋本華氏中藏經。然試之治疾。惟製大黃最神效。大黃于本草爲下品。而無毒無所畏。本經稱其主下瘀血血閉寒熱。破癥瘕積聚。留飲宿食。蕩滌腸胃。推陳致新。通利水穀。調中化食。安和五藏云云。張仲景治傷寒多用之。宋人法帖載唐張旭草書云。忽肚痛不可堪。不知是冷熱所致。永（一作若）服大黃湯。冷熱皆有益。據此則知大黃不獨治熱病。今俗以塞疾不宜服大黃者非也。古人以單方治疾。或以數十種藥合作丸散。兼治各種疾。如華陀書所載萬應圓。或用湯液。則出於伊尹。及張仲景。必有一藥爲之君。配以臣佐及使分量。按五行之數。俾行五藏。今人既不解診脈。不知疾在何所。因試之以藥十餘種。輕重任意。不得主宰。不按古方。疾既委頓。乃復以藥治藥。故漢人有不服藥爲中醫之論。豈不然乎。病有汗吐下三法。而汗吐輒耗元氣。致損食啖。惟下之逐愈。而大黃奏效尤神。陶隱居謂其有將軍之號。且經十五製。其性已化。多從小便下達。不致瀉利。是以塞外求大黃。比于中原之求人蔘。而此製大黃方。亦自都下通行海內。但俗醫惡其速效。遏抑之。率稱不可服。因爲考古敍錄文大黃數十斤。或十斤。用布拭去毛。以米泔水浸半日。切片晒乾。每斤入無灰好黃酒半斤。浸三日。取出。晒大半乾。（用好陳酒浸更佳。）

秘製大黃清寧丸方

（係內府所傳。過錄般病症。每用不過三錢。神效無比。但藥材要好。炮製須照原方各隨症加引。方見奇功。仁人君子。倘修合廣施。實陰騭之一助。）

第一次。用側栢葉。鋪墊甑底。並蓋藥上。將大黃蒸至一炷香久。取出晒乾。（每葉置盤蒸過不用。）

第二次。用桑苴熬濃汁。將大黃拌透。蒸一炷香久。取出晒乾。（自從每次拌汁蒸晒。俱照前法。）

第三次。用大麥熬濃汁。（凡桑豈、大麥、黑豆等豈。每大黃一斤。約用二三合熬汁。拌透蒸晒。）

第四次。用馬料豈熬濃汁。

第五次。用槐葉熬濃汁。

第六次。用桑葉熬濃汁。

第七次。用桃葉熬濃汁。

第八次。用鮮車前葉熬濃汁。

（以上四藥大黃一斤。每藥約用二三兩熬汁。拌透蒸晒。）

第九次用厚朴煮濃汁。
第十次用陳皮煮濃汁。
第十一次用半夏煎汁。
第十二次用白芷煎汁。
第十三次用香附煎汁。
第十四次用黃芩煎汁。（以上諸藥每大黃一斤各用一兩煎汁拌透如前蒸晒）
第十五次每大黃一斤用無灰好陳酒一斤拌透晒乾再蒸三炷香時取出晒乾磨爲細末每藥末一斤用黃牛乳（如無以練過熟蜜二兩代之）眞童便姜汁各二兩拌勻用木杵搗千餘下（如天時乾燥須將練過好白蜜漸加漸搗使乾濕得所爲佳）丸如桐子大晒乾盛貯磁器中蓋好勿使泄氣每服大人三錢小兒一錢俱照後症用引煎湯送下累試累効至神至奇

清寧丸治諸症湯引

一頭痛牽連兩眉稜骨者（俗撰火）姜皮燈心湯下左邊痛者柴胡湯下右邊痛者桑白皮湯下兩太陽痛者白芷石膏桑本各三錢煎湯下頭頂作痛者桑本三錢升麻一錢煎湯下

一頭腦雖痛身不發熱口中發渴（亦係換火）用薄荷湯下

一時時頭暈（亦係換火）燈心湯下

一眼痛初起逐漸異常先用羌活白芷甘菊花（各一錢二分）川芎大黃（各一錢）紅花（三錢）枳殼陳皮（各八分）甘草赤芍（各四分）葱頭（三個）水二碗煎熱服次日方服此丸用菊花煎湯下無不効

一眼害久不愈歸身（一錢）菊花（二錢）煎湯下

一過勞碌兩眼即痛內見黑花飛眼肉（七枚）煎湯下

一鼻上生紅瘡紅點（心火上炎攻灼肺經所致）用桑白皮燈心煎湯下非服二三十次不能奏效

一鼻孔生瘡枇杷葉（三錢）煎湯下

一耳暴聾燈心湯下

一耳內作癢燈心湯下

一耳鳴（心腎不足痰火生之故）淡鹽湯下

一口舌生瘡（是胃火上升）竹葉燈心湯下（冬月用竹葉）

一口唇腫根茯苓燈心湯下

一口唇腫硬生瘡生甘草（三錢）煎湯下

一咽喉腫痛津液難嚥桔梗甘草湯下

一牙齒痛石膏升麻（各三錢）煎湯下

一老年人牙齒常疼（虛火）燈心湯下

一單雙乳蹇牛膝煎湯下

一嗽血麥冬湯下

一吐血紅花（一錢）煎湯入童便半杯下

一吐紫血成塊（名爲蓄血）用紅花歸尾甘草稍（各三錢）同煎入童便半杯無灰好陳酒半杯服

一鼻血不止燈心湯下

一左瀉右瘓桑芎（三錢）生姜（一片）煎湯下

一從高墜下跌傷身體蓄血在內不思飲食蘇木（五錢）煎湯入童便好陳酒各半杯每服五錢

一溺血管中疼痛者麥冬湯下

一溺血或身體壯實平日喜食熏炙者燈心湯下

一溺血或年老體弱者（膀胱蓄熱腎水不行之故）宜早服六味丸晚服此丸淡鹽湯下

一溺血于盆中少頃如魚如蝦如絮如石（因自泰不調心腎不足所致）牛膝（一兩）水二碗煎至一碗服此丸三錢

一大便糞前下血者歸身（二錢）生地白芍川芎（各一錢）煎湯下

一大便糞後下血者槐花地榆（各一錢）煎湯下

一大便或純血帶紫色者紅花湯下

一大便純鮮血者當歸湯下

一遺精者淡鹽湯下

一白濁燈心湯下

一淋症燈心湯下

一淋症痠痛者。海金沙三錢。煎湯。濾清下。
一胸膈有痰火。燈心湯同姜汁下。
一胸中時痛時止。口吐酸水。橘餅半個。煎湯下。
一胸膈飽脹及作酸。姜湯下。
一胃脘作痛。飲食減少。姜湯下。
一傷寒發熱解散出汗後。尚有餘熱未盡。白滾湯下。
一傷寒後。胸膈不寬。百藥無效者。用多年陳香櫞一個。搗碎。取長流水二碗。煎至一碗。去渣。露一宿服。
一嘔吐。煨姜煎湯下。
一吐痰涎。姜汁沖湯下。
一乾嘔。姜湯下。

一傷風久嗽者。姜湯下。
一久嗽無痰乾咳者。麥冬湯下。
一傷風咳嗽。發汗後餘熱已退。仍咳嗽不止者。姜湯下。
一咳嗽吐黃痰者。姜湯下。
一咳嗽吐白痰者。紫蘇湯下。
一久嗽有痰。諸藥不效者。陳酒或姜皮一錢三五分煎用。姜湯下。
一久嗽聲啞者。柯子麥冬湯下。
一發熱久不退。柴胡湯下。
一煩渴思飲不休。燈心湯下。
一痢疾初起。或純白者。姜湯下。
一痢疾初起。或純紅者。檳榔紅花湯下。
一紅白相間者。姜皮燈心湯下。
一久痢不止者。炙甘草湯下。
一噤口痢不止。飲食不進。陳米湯下。
一胸中作酸。姜湯下。
一胸中作嘈。姜皮湯下。
一濕痰流注初起者。姜湯下。孕婦忌服。
一五臟停痰。姜汁沖湯下。

一胸膈飽滿。姜汁沖湯下。
一背心常作痛。又作冷。雖伏天亦怕冷者。此乃五飲留蓄。腸多有停痰。煨姜煎湯下。
一肥人素善飲。無病。忽然昏沉。如醉如癡。或蹲地不起。眼生黑花者。痰也。姜湯下。
一傷酒。甘菊花煎湯下。
一眼睚下忽如煤色者。痰也。姜汁沖湯下。
一水腫。麥冬赤芍煎湯下。久病脾虛者不宜。
一噎膈。姜湯下。若有至五十日不治者。此丸能救之。用四物湯服。川芎。生地。白芍。當歸。
一中暑者。姜皮燈心湯下。
一中熱者。香薷湯下。
一暑瀉。香薷湯下。
一寒伏暑霍亂者。姜湯下。
一暑伏寒霍亂者。姜皮湯下。
一陰陽不和霍亂者。姜湯下。
一哮喘。大腹皮湯沖服。
一肥人多痰。姜汁下。
一盜汗。浮小麥煎湯下。
一自汗。浮小麥湯下。久用圓眼湯。
一驚悸怔忡症。石菖蒲汁沖湯下。
一夜不能寐。炒酸棗仁煎湯下。
一大便結燥。當歸湯下。
一小便不通。燈心湯下。
一癲狂病。燈心湯下。
一老年痰火。夜不能寐。氣血不和。廣皮三錢。煎湯。磨木香五分。沖服。
一身體時時作癢。癜塊如紅雲。風熱也。久則成癘風。菊花湯下。
一眼目歪邪。出言無緒。罵詈不堪。頃刻又好。心胸經絡有痰。遇火熾。痰入心竅。故昏迷狂言。少頃心火下降。仍復清明。用茯苓三錢。湯下。非數服不能愈。

一、咳嗽吐痰，腥臭如濃血，胸中作痛者，蘆薈也、苡仁一錢，煎湯下。

一、大腸難，肛門墜痛，或登厠，並無蕊出，但有紅白水，如痢疾者，槐米湯下。

一、小腸難，腹中疼痛，臍內出膿水，小便短少者，燈心湯下。

一、四肢無力，遍身筋骨疼痛異常，反側艱難者，木通一兩，水二碗，煎至一碗，下四錢，三服立愈。

一、年老，大便結燥，當歸四錢，煎湯下。

一、黃疸，皮膚兩眼如黃金色者，茵陳三錢，煎湯下。

一、鼻衄，大腹皮湯下。

一、跌打損傷，蓄血不行，不思飲食，蘇木湯，加童便服。

女科諸症

一、骨蒸發熱，地骨皮湯下。

一、潮熱盜汗，浮小麥湯下。

一、胸有痰涎，姜湯下。

一、胸膈不寬，香附三錢，煎湯下。

一、胃脘時時作痛，良姜湯下。

一、常常噯氣，不思飲食，悶悶不樂，有憂鬱之狀，香附五錢，姜三片，同煎下，餘症與男子同。

行經

一、經水不調，用四物湯，川芎當歸白芍生地各一錢，煎服。

一、凡行經時，血氣紫，腹中作痛，薑水三錢，同煎，入姜汁三點下。

一、行經時身痛，益母草湯下。

胎前

一、孕婦小便不通，燈心湯下。

一、孕婦通身發腫，大腹皮湯下。

產後

一、產後惡露不盡，腹中作痛，益母草五錢，煎湯，入煎便半杯服。或加薑水三錢，與益母草同煎亦可。

一、產後小便不利，木通湯下。

一、產後頭暈目眩，四物湯下，川芎、當歸、白芍、生地。

一、產後大便不通，肛門墜脹，蘆薈三錢，紅花一錢，同煎服。

一、產後發熱，四物湯加益母草三錢，同煎服。

一、產後嘔吐不止，藿香湯下。

一、乳汁不通，王不留行煎湯下。

小兒諸症

一、小兒初生胎穢未出，急將口中污血拭淨，用甘草五錢，煎湯，研丸為末，七錢，調稠，灌下，能去一切胎毒。

一、小兒吐乳，姜湯下。

一、小兒夏日中暑，藿香湯下。

一、胎黃，茵陳湯下。

一、小便不通，燈心湯下。

一、大便結燥，蜜三匙，沖湯下。

一、暑瀉，燈心湯下，爽瀉忌服。

一、慢慢風，人參三分，勾藤一分，煎湯下。

一、急慢風，勾藤薄荷各一錢，煎湯下。

一、天吼，薄荷勾藤湯下。

一、喘症，痢症，燈心湯下。

一、黃疸，燈心湯下。

一、重舌，燈心湯下。

一、霍亂，藿香湯下。

一、痰疾，檳榔蘇葉煎湯下。

一、嘔吐，姜湯下。

一、鼻血不止，白茅根搗爛，絞汁，沖湯下。

一、傷風熱退後，嗽，薄荷湯下。

一、痧後，嗽，嗽不止，枇杷葉湯下。

一、痧後，發熱不退，用銀柴胡三錢，煎湯下。

一、中風，腫痛，蒼朮三錢，煎湯下。

一、小兒幼時不知人事，久兩乍晴，蹲在地上頑耍，致濕氣浸入，睡臥不安，夢中啼哭，勾藤薄荷各三錢，煎湯服。

一小兒身上如紅雲。外以朴硝大黃等分。研末。雞蛋白調敷。再用燈心。服此丸。

一小兒肝疳。面青體瘦。目黃性急。發熱不止。小便黃赤。喜食酸物。銀柴胡湯下。

一脾弱。面黃體瘦。大便泄瀉。唇口生瘡。喜食甜物。多食無厭。或好吃泥土。喜睡。炙甘草錢。一元胡錢。一煎湯下。

一腎疳。面黑體瘦。頭髮直豎。小便多熱。不食。喜食鹹物。桑白皮湯下。

一肺疳。面白體瘦。小便如米湯色。鼻流清涕。周身毫毛直豎。馬料豆煎湯下。

一心疳。面紅舌赤。發熱。體瘦。小便短少。喜喫辛物。茯苓錢。一燈心五錢。煎湯下。

一小兒痢疾諸症。俱照大人所用引服。月內小兒。每服分作三次服。

千金寶要

孫思邈 集

於藩署之濟性堂

重刻千金寶要序

千金寶要十七卷，附論，及千金須知爲十八卷，宋宣和時，郭學士思，從孫徵君思邈所撰千金方，擇要刻石華州公署，自明正統景泰間，俱有木石刻本，至隆慶六年，秦王守中復刊石耀州眞人祠，四庫書未及收錄，余遊關中，得其搨本，藏笈中，按徵君生於後周，卒於唐永淳之代，葉夢得避暑錄話，稱其作千金前方時，已百餘歲，後三十年，作千金翼，段成式酉陽雜俎，則謂昆明池龍宮有仙方三千首，徵君以救龍得之，因上帝不許妄傳，復著千金方三十卷，每卷入一方，千金方本與千金翼方爲二書，是以舊唐書本傳，止載千金方三十卷，晁公武陳振孫書目，則云各三十卷，今俗本千金翼方九十三卷，不知何人更其次第，千金前方竟不可別，此宜和時擇要本，當從前方錄出者，龍宮仙方在其內，眞世間祕異之書，不可不廣其傳，以公同志，書中謂今俗稱豆瘡爲小兒丹毒，又有反花瘡，元人奇效良方，始謂之痘疹，可證俗人謂此疾出於近代者非也，縊死人可救，落水死人經一宿猶可活，倉卒間不知其方，書備其術，尤爲濟人之仁術，世之從政者，不師查公獄市勿擾之言，惟株累鍛鍊之是務，設一切積貯水利農田學校利益於人之事，於不問，以致損傷元氣，感召災祲，誠不如尋覽方書，胸中常有活人之念，爲善最樂，在此不在彼矣，嘉慶十二年七月三日，賜進士及第授通奉大夫，署山東布政使，督糧道，加四級，陽湖孫星衍撰

刻千金寶要序

千金寶要者，宋徽欽間直學士郭思，按唐孫眞人先生所集千金方中，纂要者也，宣和六年，思曾刻石于華州公署，我明正統八年，華州知州劉整重刻，景泰六年，和州楊勝賢，以石刻冬月不便摹印，易刊木板，往年春，予得之，喜其方之簡便，藥之近易，醫不煩而取效速，信有切于人之實用，迺珍如拱璧，不容自祕，已命壽之梓矣，竊惟寶要纂自眞人千金方中，天下之遊耀州眞人洞者，歲無虛日，日無虛時，顧獨不立石于眞人洞前，非所以廣其傳也，因刻于洞前云，隆慶六年歲在壬申春三月上吉，秦王守中識，

千金寶要目錄

婦人第一
小兒第二
中毒第三
飲食中毒第四
解百藥毒第五
蛇蝎等毒第六
噤牽金瘡第七
瘡疽癰腫第八
霍亂吐瀉第九
虎犬馬傷第十　針折入肉附
舌耳心目等大小便第十一
中風大風水氣第十二

瘧痢瘴等第十三
顫風吐逆第十四
疫癘濁淋第十五
頭面手足瘙癢瘡癤第十六
痔第十七
論
千金須知

千金寶要卷之一

唐　孫思邈集

婦人第一

妊娠難產燒車缸脂內酒中服亦治腹中痛并欬嗽

妊娠忽苦心腹痛燒鹽令赤熱三指撮酒服之立產

又方吞槐子二七箇

又方蒐絲子或車前子以酒或米汁服方寸匕即生

又方水或酒服家中黑塵

子死腹中及小難橫生倒生難生者半夏白斂各二兩末之服方寸匕亦可加代赭罌粟各二兩佳小難一服橫生二服倒生三服子死四服

又方榆白皮細切煮三升服之

子死衣不出上搶心者急取蟻垤土三升熬之令熱盛盛熨心良

又方末麻突中墨三指撮水或酒服之

乳無汁者。土瓜根末之。一服半錢匕。日三。
衣不出。及橫生逆生者。小麥小豆煮濃汁飲。立出。
產三日不出者。燒大刀鐶。以酒一盞沃之。頓服。
又方。燒藥杵令赤。內酒中飲之。救死不分娩者。
產乳暴絕者。擣了半夏一兩。末之。丸如大豆。內鼻孔中。愈。
又方。神麯末。水服方寸匕。
又方。含醋漬麵。
子死腹中。牛屎塗母腹上。立出。
胎死腹中。服水銀三兩。立出。
未足月而胎死者。以苦酒濃煮大豆。一服一升。死胎立出。
妊娠時疾。子不下。竈中黃土水。或酒。或泔。清調。塗臍方寸。乾再上。
又方。酒服車轄脂。
又方。蒸白一把。水三升。煮熟。食蒸令盡。亦安胎。胎死者即出。
妊娠中蠱。燒敗鼓皮。酒服方寸匕。
妊娠傷寒。蒸白十莖。生薑二兩。切。水三升。煮去半。服取汗。
產後血不盡。煩悶。搗生藕取汁。飲二升。良。
產後腹脹痛者。煮黍粘根。煮飲。一服即愈。
五色帶下者。煮飯帶汁。服一盃。良。
月水不斷。灸內踝下。白肉際。脈上。隨年壯。
又方。服地黃酒。良。或大豆。服亦佳。
月水不利。及無子。灸四滿三十壯。穴在丹田兩邊。相去各一寸半。丹田在臍下二寸。
漏下。積年困篤者。取鵲重巢。燒灰。末之。服方寸匕。日三服。三十日愈。重巢者。經二年。鵲產其上者是。
產後月水往來多少不定。或不通。痛。小腹急。腰身重。白馬尿一升服之。良。
逆生橫生者。竈下黃土三指撮。酒服。立出。

小兒第二

凡小兒生下不啼者。取兒臍帶向身。卻捋之。仍呵之百度。亦可以蒸白雞之。
落新生兒。以猪膽一箇。汁入湯中。令兒無瘡疥。
小兒生瓠死者。便覆兒口中。懸雍前上腭有胞者。急以指摘取頭。決令瀉去血。勿令血入咽。入咽即殺兒。

慎之。
小兒臍不合。燒蜂房灰末傅之。
小兒中風口噤。雀屎如麻子。丸之。飲下。即愈。
兒生三日內。朱蜜多則生陰癇。朱蜜三日內通得用。三豆許。朱蜜後。與牛黃。
可與米飲。研米作厚飲。如豆大。與兒。三豆許。止。日二。七日後方哺乳。
小兒解顱。熬蛇脫皮末之。和猪頰車中髓。傅頂上。日三四。
小兒肚皮卒然青黑。以酒和胡粉傅上。若不急治。須臾便死。
又方。灸臍左右上下各半寸。並鳩尾骨下一寸。凡五處。各三壯。
小兒暴腹欲死。半夏隨多少。微炮之。爲末。酒丸如粟米大。日三。
小兒丹毒。搗慎火草。絞取汁。塗之。
小兒赤遊腫。若徧身。入心腹。殺人。搗伏龍肝爲末。以雞子白和。傅之。乾。易之。
又方。白豆末。水和。傅之。勿令乾。
又身赤腫起者。熬米粉令黑。以唾和。傅之。
小兒偏發黃。搗土瓜根汁。三合。服之。
又方。搗青麥汁服之。
又方。搗韭根汁。澄清。滴兒鼻中。如大豆許。即出黃水差。
小兒霍亂。研屎滓。乳上服之。
又方。牛涎。灌口中一合。
小兒客忤。吞麝香大豆許。立愈。
又方。以母月衣覆兒上。大良。
又方。取牛鼻津服之。
又方。取牛口沫。傅乳頭。飲之。
又方。取熱馬屎一丸。絞取汁。飲兒。下便愈。亦治嘔噦面青腹強者。
小兒誤吞針。取磁石如棗核大。吞之。或含之。其針立出。
誤吞鐵物等。艾莖一把。剉。以水五升。煮取一升半。服之。即下。
誤吞髮。亂髮燒灰。酒服一錢。
吞錢。艾蒿五兩。以水五升。煮取一升。頓服之。即下。
又方。末火炭。酒服方寸匕。水服亦得。

又方服蜜二升即出。

吞金銀鈆銅白糖二斤一頓漸漸食之多食益佳。

又方吞水銀一兩再服之。

吞銅及指環燒膠毛二七箇末服鵝毛亦得。

吞鈆錫韭令萎蒸熟勿切食一束即出或生麥葉筋縷如韭法皆可用但力意多食自消。

吞銅鐵而哽燒銅鬃牙令赤內酒中飲之立愈。

吞釘針及箭鏃等但多食脂肥肉令飽自褰出。

吞針取懸針磁石末飲服方寸匕即下。

小兒尿瘡丹初起兩股八臍陰頭皆赤者水二升桑皮切二升煮取汁浴之良。

又方燒李根爲灰以田中流水和傅之良。

小兒朱田火丹一日夜即成瘡先從背漸徧身如棗大赤者澁煮棘根洗之已成瘡者赤小豆末傅之。

小兒野火丹徧身皆赤者用油塗之。

小兒菜莢丹初起背徧身如綫一宿成瘡者煮赤小豆作末以傅之。

小兒廟瘡火丹初起足趺正赤色者以棗根煮汁沐浴五六度自愈。

小兒風瘡隱疹心迷悶巴豆二兩以水七升取煮三升故帛染汁拭之大人加減用之。

又方礬石二兩末之酒三升清令消帛染拭病上。

又方吳茱萸一升酒五斤煮取一升半帛拭病上。

小兒隱疹入腹體強舌乾蘇菁子末酒服方寸匕日三。

又方蠶沙二升水二升煮去渣洗之。

又方鹽湯洗了以蓼子挼傅之。

又方車前子作末傅之。

諸丹毒渠中藥菜細切熟搗傅丹上厚三分乾易之。

又方芸臺菜熟搗厚封之隨手即消如餘熱氣未愈但三日內封之使醒醒好差止。

五色油丹細母猪枕頭臥之良。

又方牛屎塗之乾則易之。

赤流腫搗火麻子水和傅之。

又方以羊脂煎了磨之赤黑丹起徧身者殺人。

小兒瘡初起爆發似火瘡熟搗桃仁以豹脂和傅之亦治徧身赤腫。

小兒身體頭面生瘡榆白皮隨多少擣合乾末之醋和塗蘇以傅瘡上蘇自出。

小兒丹毒馬齒莧一握搗取汁飲之以滓傅之。

又方搗赤小豆五合水和取汁飲之一合良滓塗五心。

又方澁煮大豆汁塗之良差亦無瘢痕。

又方臘月猪脂和釜下土傅之乾則易之。

小兒五色丹搗蒴藋葉傅之。

又方薤白一把豉一升以水三升煮取二升分三服。

又方柏葉一升麻子末一升以水五升煮三沸百日兒每服三合。

又方搗石榴汁服之。

又方亂髮灰鹿角灰等分三歲兒以水和服三錢匕日二。

小兒赤白痢單服生地黃汁一合。

小兒熱痢煮木瓜葉飲之。

小兒冷痢蓼葉搗汁量大小飲之一作芥菜。

又方搗蒜傅兩足下。

小兒暴痢赤小豆末酒和塗足下日三油和亦得。

小兒蠱毒痢藍青汁一升二合分爲四服飲之。

小兒渴痢搗木瓜汁飲之。

小兒頭不生髮椒葉搗汁傅之。

小兒瘡瘡冢中石灰厚傅之。

小兒浸淫瘡以蠶下黃土髮灰等分末之以猪脂和傅之。

小兒疥瘡以臭酥和胡粉傅之。

小兒濕癬煎馬尿洗。

小兒斑瘡入眼浮萍陰乾爲末以生羊子肝半箇入盞內以杖子刺碎泛水半合絞取肝汁食後調下不甚者一服已傷目者十服見效大人亦可用。

小兒赤熱腫目川大黃白礬朴硝等分爲末冷水調作掩子貼目上。

小兒重舌腫起舌下以朴硝研水敷咽喉外其內用成塊者含涎出乃平。

又方地蜂蟲和薄荷研汁帛包蘸舌下腫起重舌。

極證用指去爪先于舌下筋上擦至根漸深深擦如此三次又用指蘸水取項後燕窠小坑中筋自上趨

下至小瘡深深擦入三次小兒若飲乳勝前則病去矣。

小兒禿瘡及惡瘡以苦練皮燒灰以猪脂調傅大人惡瘡亦可用。

小兒卵腫偏墜防風牡丹皮等分爲末每服二錢匕溫酒調服鹽湯亦可。

小兒卒客忤以竈中黃土蚯蚓糞等分研細水調塗兒頭上及五心良。

又方米粉鹽等分炒變色腹上摩之。

小兒頭瘡經年不差者取屋塵末和油瓶下滓以皁角湯洗傅之。

小兒頭瘡胡粉一兩黃連二兩末之洗瘡去痂拭乾傅之即差再發再傅之。

禿瘡蕈蘑子細末先洗傅之。

小兒惡瘡熬破令黃末之傅瘡上不過三傅愈。

小兒手足及身腫者以小便溫煖清之即愈。

又方巴豆五十枚去心皮以水二升煮取一升以緜內湯中拭病上隨手消并治蹙蹇。

小兒脫肛灸頂上旋毛中三壯即入。

又方灸尾翼骨三壯。

又方灸臍中隨年壯。

小兒疳瘡嗽麻子傅之日六七度。

小兒濕瘡濃煮地榆汁洗浴日兩度。

小兒尿血燒鵲巢灰井花水服之亦可治尿淋。

小兒解顱猪牙頰車臨傅顱上差。

小兒風瘙瘮瘮牛膝末酒服方寸匕漏瘡多年不差搗末傅之亦治骨疽頭疾瘙癢絕妙。

小兒胎寒喔喑驚癇腹脹不嗜食大便青黃并大人虛冷或有實不可吐下者馬齒莧一斤燒半日以漿膏和大人服如梧子二丸日三小兒以意減之以腹內溫爲度。

小兒五色丹猪槽下爛泥傅之乾則易之以愈爲度。

又方服黃龍湯二合并傅瘡上。

小兒赤丹芸薹葉汁服三合滓傅上。

小兒赤丹斑駁蜂和胡粉從外向內傅之良。

又方燒鐵屎爲末以猪脂和傅之。

又方屋塵以臘月猪脂和傅之。

小兒火丹赤如朱走皮中酢和豉研傅之即愈。

又方搗荏子傅之。

又方猪屎水和絞取汁服少許。

小兒天火丹赤如丹大如手徧身或痛或癢生麻油塗之。

小兒火丹其瘡見骨者搗小蒜厚封之着屋裸者是。

小兒殃火丹每着兩脇及腋下者伏龍肝末和油傅之乾則易之若入腹及陰則以鎮火草取汁服之

小兒夜啼不已醫所不治者取狼糞中骨燒作灰末水服如黍米大二枚其啼即已。

又方取馬骨燒灰傅乳上飲兒即止。

小兒吐痢燒特猪屎水解取汁少少服之良。

小兒大小便不通灸口兩吻各一壯。

又方搗白花胡葵子末煮汁服之。

又方雞屎白服一錢匕。

又方灸臍下一寸三壯又灸橫紋百壯又灸口兩吻各一壯。

小兒溫瘧鹿角末先發時便服一錢匕。

又方灸兩乳下一指三壯。

小兒洞注下痢蕪荑子二升搗汁溫服以差爲度。

又方木瓜搗汁飲之。

又方炒倉米末飲服之。

又方酸石榴燒灰服半錢匕日三。

又方炒豉令焦水淋汁服之神驗冷則酒淋服。

小兒赤白帶下薤白一把豉一升以水三升煮取一升分三服。

又方柏葉一升麻子末一升以水五升煮取三沸百日兒每服三合。

又方搗石榴汁服之。

又方亂髮灰鹿角灰等分三歲兒以水和服三錢匕二。

中毒第三

凡卒死無脈無佗形候率牛臨鼻上二百息牛氣必差牛不肯氣鹽汁塗面上即牛肯氣。

又方牛馬屎絞取汁飲之無新者水和乾者亦得一法以人溺解之。

又方炙熨斗熨兩脇下又治尸厥。

凡死慎燈火勿令手動率牛臨其鼻上即甦。

又方搗韭汁灌鼻孔中劇者灌兩耳一云灌口中。

鬼魅不悟。末伏龍肝吹鼻中。

又方末皁角少大豆許吹鼻中噏則氣通起死人亦治中惡。

又方灸兩足大指端毛中二七壯亦救卒死中惡。

中惡菉心黃刺鼻孔中血出愈一云入七八寸無苦使目中血出差一云男左女右。

又方使人尿其面上愈。

中惡并蠱毒冷水調伏龍肝如雞子大服之必吐。

又方溫二升猪肪頓服之。

又方車軎脂如雞子大酒服之。

又法中惡灸胃管五十壯愈。

卒忤中惡也鹽八合以水三升煮取一升半分二服得吐即愈若小便不通篰頭七枚燒作灰末水調服即通。

又方牆子屎半盞酒三升煮服之亦治霍亂一云治鬼擊又云大牛屎亦可用。

又方青墨末之水服一錢匕。

又法卒忤死灸手十指爪下各三壯又灸人中三壯又灸肩井百壯又灸閭七壯又灸巨闕百壯。

卒中鬼擊及刃兵傷血漏腹中煩滿欲絕雄黃粉酒服一刀圭一日三服血化爲水。

鬼擊之狀卒着人如刀刺胸腹絞痛或吐血或口鼻血出或下血雞屎白如聚大青花麻一把以酒七升煮取三升熱服須臾發汗不汗熨斗盛火灸兩肋下熱汗出愈。

又方艾如雞子大三枚以水五升煮取二升頓服。

又方吹酢少許鼻中。

救自縊死極須按定其心勿截繩徐徐抱解之心下尚溫者以氈薦覆口鼻兩人吹其兩耳立活。

又方低臥以物塞兩耳竹筒內口中使兩人痛吹之塞口榜勿令氣出半日死人即噫噫即勿吹也。

又方搗皁角細辛屑如胡豆大吹之兩鼻中。

又方搗藍青汁灌之。

又方刺雞冠血出滴之口中即活男雌女雄。

又方雞血塗。

又方雞屎白如聚大酒半盞灌口及鼻中佳。

又方蓽茇吹皁角末兩鼻中逆出更吹乃可。

又方梁上塵如大豆各內一小竹筒子中四人各捉一筒同時吹兩耳兩鼻中即活。

又方屏鼻口眼耳中并捉頭髮如筆管大一撮舉之立活。

又方自縊死灸四肢大節陷大指本文名曰地神各七壯。

熱喝著熱死者取道上熱塵以壅心上若少冷即易氣通即止。

又方仰臥喝人熱土壅臍上令人尿之臍中溫即愈。

又方可飲熱湯亦可內少乾薑橘皮甘草煮飲之稍稍咽勿使飽但以熱土及熱灰土壅臍上佳。

又方濃煮蓼取汁三升飲之即愈如不愈再飲。

又方地黃汁一盞即愈。

又方水半盞和麴一大抄服之。

又方張死人口令通以暖湯徐徐灌口中小舉死人頭令湯入腹須臾即蘇。

又方灌地漿一盞即愈。

又方使人嚏其心令暖易人爲之。

又方抱狗子或雞著心上熨之。

又方麗上兩畔瓦熱熨心冷易之。

救落水死者以甑中灰布地令厚五寸以甑側著灰上令死人伏于甑上使頭少垂下抄鹽二方寸匕內竹管中吹下孔中即當吐水水下因去甑下死人着灰中壅身使出鼻口即活。

又方掘地作坑熱數斛灰內坑中下死人覆灰溼徹即易之勿令大熱燙人灰冷更易半日即活。

又方取大甑傾之死人伏其上令死人口臨甑口然草火二七把燒甑中當死人心下令煙出小入死人鼻口中鼻口中水出盡則活火盡則復益之常以手候死人身及甑勿令甚熱當令火氣能使死人心下足得暖卒無甑者于岸側削地如甑空下如甑燒令暖以死人着上亦可用車轂爲之勿令暖其頭。

令死人低頭水得出并炒灰數斛令暖以粉身溼更易溫者。

又方但埋死人暖灰中頭足俱沒惟開七孔。

又方倒懸死人以好酒灌鼻中又灌下部又醋灌鼻亦得。

又方篩裹皁角內下部中須臾水出。

又方裹石灰內下部中水出盡則活。

又方熬沙覆死人面上下有沙但出鼻口耳沙冷溼即易。

又方倒懸解去衣去臍中垢掩吹兩耳起迺止。

又方甑中灰二石埋死人從頭至足出七孔即活。

又方。屬兩脚著生人兩肩上。死人背向生人背。即負持走行。吐出水。便活。

又方。落水死。解死人衣。灸臍中。凡落水經一宿。猶可活。

令日落水凍。四肢直。口噤。有微氣者。以大器中熬灰使暖。盛以囊。薄其心上。冷即易。心暖氣通。目得轉。口通開。可溫尿粥。稍稍呑之。即活。若不先溫其心。便持火灸身。冷氣與火爭。即死。

卒中惡風。心悶煩毒欲死者。急灸足大指下橫文。隨年壯。即愈。

上件病。若筋急不能行者。內踝筋急。灸內踝上四十壯。外踝筋急。灸外踝上三十壯。立愈。

卒中惡風。眼藏睛。灸目兩眥後二七壯。

上件病。若不識人者。灸季肋頭七壯。

卒中惡。心痛。苦參三兩。㕮咀。以好醋一升。取八合。強人。頓服。老小二服。

又方。桂心八兩。㕮咀。以水四升。煮取一升半。分作二服。

飲食中毒第四

凡諸食中毒。飲黃龍湯。及犀角汁。無不治也。飲馬尿。亦良。

又方。食百物中毒。擬地坑中著水。取以飲之。

又方。含貝子一枚。須臾吐食物差。

又服生羽汁數升。亦得。

中毒煩悶。苦參三兩。㕮咀。以酒二升半。煮一升。頓服之。取吐。愈。

食六畜肉中毒。各取六畜乾屎末。水服之。佳。

食自死六畜肉毒。服黃藥末方寸匕。須臾復出。

又方。燒小豆一升。末。服三方寸匕。

又方。水服竈底黃土方寸匕。

食生肉中毒。掘地深三尺。取下土三升。以水五升。煮土五六沸。取上清。飲一升。立愈。

食牛肉中毒。狼牙灰水服方寸匕。一作猪牙。

又方。溫湯服猪脂良。

又方。水煮甘草汁。飲之。

食馬肉血洞下。欲死。豉二百枚。杏仁二十枚。㕮咀。蒸之。五升米下飯。熟搗之。再服令盡。

又方。蘆根汁飲。以浴。即解。

食猪肉中毒。燒猪屎末。服方寸匕。犬屎亦佳。

食百獸肝中毒。頓服猪脂一斤。佳。

食陳肉毒。方同上。

食馬肝中毒。牝鼠屎二七枚。兩頭尖者是。以水研飲之。不差。更作。

食野菜馬肝肉諸脯肉毒。取頭垢。如棗核大。呑之。可起死人。

又方。燒狗屎灰。水和。絞取汁。飲之。立愈。

又方。燒猪骨末之。水服方寸匕。日三。

茅屋漏水沾脯上有毒。搗韭汁服之。良。大豆亦得。

肉閉在密器中者。名鬱肉。有毒。燒狗屎末。水服方寸匕。凡生肉熟肉。皆不藏蓋。不泄氣。皆殺人。又肉汁在器中密蓋。氣不出。亦殺人。

脯在黍米中有毒。麴一兩。水一升。鹽兩撮。煮服之。

食中射罔脯毒。末貝子。水服如豆。佳。不差。又服。

食餅臘中毒。方同上。

以肉作餅臘。食多吐下。服犀角末方寸匕。甚良。

食鵝鴨肉成病。胸滿面赤。不下食者。服秫米泔。大良。

食中魚毒。煮橘皮湯。停極冷。飲之。其效甚大。

食中魚毒。及中鱧魚毒。剉蘆根。舂取汁。多飲。良。亦可取蘆葦芽汁飲之。

蟹毒。方同上。又冬瓜汁服二升。亦可食冬瓜。

山中木菌毒。人屎汁服一升。良。

食魚脍不消。燒魚鱗。水服方寸匕。

食諸鮑魚中毒。方同上。

食牛馬肉中毒。飲人乳汁。良。

酒病。豉。葱白各一升。以水四升。煮取二升。頓服之。

飲諸中毒。煮大豆三沸。飲汁三升。

又方。酒漬乾柹汁。服之。

酒醉不醒。葛根汁一斗三升。飲之。取醒止。又治大醉連日。煩毒不堪。

千金寶要卷之二

解百藥毒第五

凡解百藥毒甘草薺苨大小豆汁藍汁藍實汁藍根汁並解。
雄黃毒防己解。
礬石毒大豆汁解。
金銀毒服水銀數兩即出鴨屎解水和雞屎汁煮蒜汁並解。
鐵粉毒磁石解。
防葵毒葵根汁解。
桔梗毒白粥解。
甘遂毒大豆汁解。
芫花毒防己防風甘草桂汁並解。
大戟毒甜酒汁解。
蜀椒毒葵子汁桂汁豉汁人尿冷水土漿蒜雞毛燒吸煙及水調服解。

斑貓芫青毒猪脂大豆汁或鹽藍汁鹽湯煮猪骨並解。
賜刀毒消水解。
杏仁毒藍子汁解。
野芋毒土漿人糞汁解。
諸菌毒掘地作坑以水沃中攪之令濁澄清飲之名地漿解。
解烏毒及一切毒藥不止者甘草蜜四兩粟米粉一升以水五升煮甘草取二升去滓歇大熱內粉湯中攪令勻調內白蜜更煮令熟如薄粥適寒溫飲一升最佳。
解一切毒母猪屎水和服之又水三升三合和米粉飲之。
野葛毒已死口禁者取青竹去兩節桂兩肋臍上內冷水注之吸即易之須臾口開開即服藥立活惟須數易水。
石藥毒白鴨屎人糞汁並解。
食蕈菌悶亂如卒中風者飲甘草汁藍青汁即愈。
中鈎吻毒欲死者蕎苨八兩㕮咀以水六升煮取三升冷如人體服五合日三夜二凡蕎苨惟濃佳。
又方煮桂汁飲之。
又方嚥蔊菹。
諸毒方同上。
中蠱菌根藕荷根各三兩㕮咀以水四升煮取二升頓服。
又方槐樹北陰白皮一大握長五寸水三升煮取一升空腹服即吐蠱出。
中蠱下血方同上。
諸熱毒或蠱毒口鼻血出取人屎尖七枚燒作火色置水中研之頓服即愈亦解百毒時氣熱病之毒服巳溫覆取汗勿輕此方極神驗。
諸服藥過劑悶亂者飲藍汁水和胡粉地漿藕荷汁水和葛粉粳米漬乾羌黃連飴糖豉汁並解。
瘡中水毒炭白灰胡粉等脂調塗瘡孔上水出則痛止。
瘡中水腫方同上。
卒刺手足中水毒搗韭及藍青塗上以火灸熱徹即愈。
破傷風腫厚塗杏仁膏然麻燭遍灸之。

蛇蝎毒等第六

凡蛇毒消蠟注瘡上不差更消注之又以母猪耳中垢傅之牛耳垢亦可。

蝮蛇毒、令婦人尿瘡上。

又方、令婦人騎度三過、又令坐上。

又方、末羌傅之、乾則易。

又方、以射罔塗腫上、血出即愈。

又方、生麻楮葉合搗、以水絞去滓、漬之。

衆蛇毒、乾羌雄黃等分、末和射罔、著竹澗中、有急用之。

又方、雄黃末傅瘡上、日一。

又方、用銅青傅瘡上。

又方、搗大蒜和胡粉傅之。

又方、雞屎二七枚、燒作灰、投酒服之。

又方、以麻團上、令童男尿其中、燒熾令赤、投中、冷復燒著、二三度、盡。

又方、口嚼大豆葉塗之。

又方、猪脂和鹿角灰塗之。

又方、鹽四兩、水一斗、煮十沸、定、以湯浸、冷易之。

又方、搗紫苑取汁、飲一升、以滓封瘡、以少水灌之。

又方、梳中垢如指大長一寸、尿和傅之。

又方、炙梳、汗出、熨之。

又方、取合口椒胡荽苗等分、搗傅之、無不差。

又方、灸整處三七壯、無艾、以火頭稱瘡孔大小、蘸之。

蛇嚙人尿厚塗、帛裹即消。

腫中蛇入口挽不出、以刀破蛇尾、內生椒三兩枚、裹著、須臾即出。

又方、艾灸蛇尾即出。

又方、以刀周匝割蛇尾、截令皮斷、仍將皮倒脫、即出。

蛇入口並七孔者、割母猪尾頭、瀝血著口、即出。

又方、以患人手中指等截三歲大猪尾、以器盛血、傍蛇、瀉血口中、拔出之。

卒爲蛇繞不解、以熱湯淋之。

又方、令人尿之。

蛇蝎螫、服小蒜汁、滓傅上。

又方、熟搗葵取汁、服。

又方、取齒中殘飯傅之。

又方、猪脂封之。

又方、射罔封之。

又方、硇砂和水塗上、立愈。

又方、若着手足、冷水浸、水微暖則易之、若餘處、冷水浸、故布搨之、小暖則易。

又方、生烏頭末、唾和傅之。

射工毒、不治、七日能殺人、鬼臼葉一把、內苦酒中、漬之、熟搗絞汁、服一升、日三爲妙。

又方、取生吳茱萸葉一握、斷去前後、擣中熟搗、以水二升、煮取七合、頓服之、立愈。

又方、取葫切貼瘡、灸七壯。

又方、赤苑葉、搗絞取汁、一服一升、日四五服。

又方、白雞屎取白頭者三枚、湯和、塗中毒處。

已有瘡者、取荠子熟搗、苦酒和、厚塗瘡上、半日、痛便止。

又方、取狼牙葉多取根、搗之、令熟、口口中處、又飲汁四五合。

蛛蠅入耳、炒胡麻搗之、以葛裝盛、傾耳枕之、即出。

又方、以牛酪灌之、滿耳即出、出口口消、若入腹中、空腹、食好酪一二升、即化爲黃水而出、不盡、更服、于真人白云、手用神効。

水毒、凡山水有毒蟲、人涉水、中人似射工而無物、其診法、初得之、惡寒、微似頭痛、目眶塚、心中煩懊、四肢厥、腰背百面皆強、兩膝痛、或翕翕而熱、但欲睡、且醒寡劇、手足逆冷、至肘膝、一三日腹中生蛊、食人下部、肛中有瘡、不痛不癢、令人不覺、不急治、過六七日、下部出濃潰、蛊上食人五臟、熱盛毒煩、下利不禁、八九日良醫不能治矣、不過二十日殺人、欲知是中水與非者、當作五六升湯、以小蒜五升、㕮咀、投湯中、消息、勿令大熟、去滓以浴之、是水毒、身體當發赤斑、無異者非也、治中水毒、取栴若桃葉、搗絞、取汁三升許、或乾、以少水絞取汁、飲之、小兒不能飲、以汁傅乳頭與喫。

又方、搗瘡耳汁、服一升、又以緜裹杖、沾汁、導下部、日二過即愈。

又方、蔘一把、搗、以酒和、絞取汁一升、服之、不過三服、一作藥葉。

又方、藍一把、搗、水解、以塗浴面目身體令遍。

又方、搗蛇莓根末、水飲之、并導下部、生者用汁、凡夏月行、當多畫此藥屑、入水、以方寸匕投水上流、無所畏、又能辟射工、凡洗浴、以少許投水盆中、即無毒。

人忽中水毒，手足指冷，或至肘膝者，浮萍暴乾，末之，酒服方寸匕。

八九月中，刺手足，犯惡露，腫，殺人，生桑枝三枝，內煻灰中，推引之，令極熱，斫斷，正以頭柱瘡口上，熱盡，即易之，盡三枝，則瘡自爛，仍取薤白搗，絲裹，着熱灰中，使極熱，去絲，取薤白，傅瘡上，以布帛急裹之，若有腫者，便作之，用薤白第一佳。

竹木刺皮中不出，羊糞燥者燒爲灰，和猪脂塗刺，若不出，再塗，一云用乾羊屎末。

又方，服玉不留行，即出，兼取根末，貼之。

又方，瓷山藥麥汁，飲之，日三，差止。

又方，用牛膝根莖生者，併搗以薄之，即出，瘡雖合猶出。

又方，嚼白梅塗之。

又方，白茅根燒末，以醋和塗之，亦治瘡因風致腫。

又方，燒鹿角末，以水和塗之，立出，久者不過一夕。

又方，頭垢傅之，即出。

惡刺，苦瓠開口，內兒尿，煮三兩沸，浸病上。

又方，濃煮大豆汁，漬取差。

又方，莨菪根，亦煮浸之，冷復易。

喉痺金瘡等第七

喉痺，桂心末如棗核大，綿裹，着舌下，即破。

又方，荊瀝，稍稍咽之。

又方，只將頸上近頭心髮直上，作力提之，其喉痺，剝然一聲，塗破，最奇。

墮落車馬，及車轅木打已死者，以死人安着，以手袖掩其口鼻眼上，一食頃活，眼開，與熱小便二升。

凡墮落傷損，欲死，取淨土五升，蒸之，令溜，分半，以故布數重，裹之，以熨病上，勿令大熱，恐破肉，冷則易之，取痛止則已，凡有損傷，以此法治之，神效，已死不能言者，亦活，三十年者亦差。

腕折骨損者，以大麻根葉，擣汁，飲一升，無生麻，煮乾麻汁服。

腕折四肢骨碎，及筋傷蹉跌，生地黃不限多少，熟擣，用薄所損處，又云，爛擣，熟之，以裹傷處，以竹編夾裹令遍，縛令急，勿令轉動，一日可十易，三日差，若血聚在折處，以刀子破去血。

四肢骨碎，筋傷蹉跌，豉三升，水三升，漬取汁，服之。

頭破腦出，中風口噤，大豆一斗，熟去腥，勿使太熟，擣末，熟蒸之，氣徧合甑下，以酒一斗淋之，溫服一升，覆取汗，傅杏仁膏於瘡上。

凡被打損血悶，搶心，氣絕不能言，可關開口，尿其中，令下咽，即醒。

卒中毒矢，擣藍汁一升飲之，并薄瘡上，若無藍，取青布漬絞汁飲之，并淋瘡中。

又方，內鹽臍中，灸之。

又方，煎地黃汁作丸，服之，百日，矢當出。

又方，煮蘆根汁，飲三升。

又方，多飲葛根汁，并治一切金瘡。

又方，末雄黃傅之，當沸汁出愈。

又方，末貝齒，服一錢匕，大良。

又方，搗葛根汁飲之，葛白屑，熬黃，傅瘡止血。

金瘡破腹腸突出，欲令入，取人屎乾之，以粉腸即入矣。

又被傷，腸出不斷者，作大麥粥，取汁，洗腸內之，當研米粥飲之，二十日，稻稍作強糜，百日後乃可差耳。

金瘡煩滿，赤小豆一升，以苦酒漬之，熬令燥，復漬，滿三日，令色黑，服方寸匕，日三。

箭鏃及諸刃刃在咽喉胸膈諸隱處，不出者，牡丹皮一分，白蠟二分，一方作白歛，二味治下篩，以酒服方寸匕，日三出。

又方，取苦蔞汁，塗箭瘡上，即出。

又方，酒服菖蒲方寸匕，日三，差。

卒爲弓弩矢所中，不出，或肉中有聚血，取婦人月經布，燒作灰，屑酒服之。

又方，白歛半夏等分，治下篩，酒服方寸匕，日三，淺瘡十日出，深瘡二十日出。

金瘡血出不止，桑根十淅，服一升，即止。

又方，柳絮封之。

又方，搗車前汁傅之，血即絕，速根用，立效。

又方，飲人尿三升，愈。

又方，以蜘蛛幕，貼之。

金瘡腹中瘀血，大麻子三升，大蒜白二七枚，使數人各搗，令熟，用九升水，煮取一升半，如服之，若血出不盡，腹中有濕血，更令服，當吐膿血耳。

金瘡內漏，還自取瘡中血，着杯中，水和服。

又方，七月七日麻物一兩，蒲黃六兩，酒服一錢匕，日五夜二。

又方，牡丹皮爲散，水服三指撮，立尿，出血。

金瘡若痛，楊木白皮，熬令燥，末之，服方寸匕，日三。又末傅瘡愈。

金瘡若刺瘡痛不可忍，百治不差者，蒜一把，以水三升，煮數沸，演洗瘡，止痛良。

傷墜車馬及諸物隱體肉斷者，以酢和麪塗之。

筋骨傷，初破時，以熱馬尿傅之，無瘢。

又方，大豆二升，水五升，煮取二升，以醇酒六七升合，和豆升，服之，一日盡，如湯沃雪，用小豆亦佳。

落車墜馬及木崩血，腹滿短氣，大豆五升，以水一斗，煮取二升，去豆，一服令盡，劇者不過三作。

金瘡便以石灰厚傅，無石灰，只灰亦可，裹之，止痛又速愈，若深，未宜速合者，內少滑石，令瘡不時合也。

針灸瘡血出不止，燒人屎灰傅之。

金瘡出血多，其人必渴，當忍之，噉燥食，并肥脂之物，以止渴，慎勿鹹食，若多飲粥及漿，犯即血動，溢出，殺人，又忌嗔怒，大言笑，思想陰陽行動作勞，多食酸鹹，飲酒，熱羹臛，瘡差後，猶須如此，出百日半年，乃可復常也。

又方，燒乾梅作炭，搗末傅之，一宿即差，亦治被打傷。

又方，磁石末傅之，止痛斷血。

又方，桑白汁塗，桑白皮裹，或石灰封之，妙。

又方，麻葉三升，以水三升，煮取三升半，為一服。

又方，飲麻子汁數升，亦治毒箭所傷。

又方，蚯蚓屎，以水服方寸匕，日三。

又方，杏仁石灰細末，猪脂和，封，亦主犬馬金瘡。

又方，搗蒜子傅之。

瘡疽癰腫第八

發背，亂髮灰，酒服方寸匕，亦治瘋疽。

又方，飲鐵漿二升，取利。

又方，三年醋滓，微火煎令稠，和牛脂傅上，日一易。

又方，猪脂傅上，日四五，亦治發乳。

又方，猪羊脂，切作片，冷水浸，貼上，暖則易之，五六十片差，初貼少許，即寒，寒定，好眠，甚妙。

又方，燒鹿角灰，醋和傅之，日四五。

瘡疽，手足眉背，累累如赤豆，劖之，汁出，蕪荑子熬搗，帛裹，展轉傅上，良。

又方，以麻子熬作末，糜其上，良。

又方，酒和麪傅之。

又方，剝去瘡痂，溫醋泔清洗之，以胡燕巢，百日男兒屎，如膏，傅之。

又方，亂髮灰，服方寸匕，日三，亦治發背。

又方，炙芸薹葉，取汁一升，服之，并食乾熟芸薹數頓，少與鹽醬，冬月，用其子，水和服之。

又方，以猪膽傅之良。

又方，枸杞根，葵根葉，炙汁，煎如膠，服之，隨意。

又方，鵲月糖，壺夜浸之，數日乃愈。

疽潰後，鹽湯洗，拭了，燒皁角灰粉之良。

又方，以牛耳中垢傅之良。

又方，以生麻油滓，踈裹，帛瘡上，蟲出。

又方，以沸湯灌瘡中三四徧。

疽似癰而小有異，今日去膿了，明日還滿，膿如小豆汁者，芸薹熟，搗，濕布袋盛之，堝熱灰中，更互熨之，即快，得安，不過再三即差，多用乾者。

又方，皁角煎湯洗，拭乾，以藥皮末傅，勿令作痂。

一切腫毒痛不可忍者，取草麻子，搗傅之，即差。

惡毒腫，一宿可殺人者，茴香草，搗取汁，飲一升，日三四服，滓傅腫上，冬中根亦可用，起死神方。

魚臍丁瘡，不大痛者，殺人，以寒食餳傅之良，又硬者燒灰塗貼，即差。

又方，先以針刺瘡上四畔，作孔，搗白苣，取汁，滴瘡孔內。

丁腫忌見麻物，見即死者，以針刺四邊及中心，塗雄黃末，立愈，一云塗黃土。

又方，鼠新坌土和小兒尿傅之。

又方，鐵衣末和人乳汁傅之，立可。

又方，小豆花為末傅之，差。

又方，人屎尖傅之，立差。

又方，以四神丹一枚，當頭上安，經宿，則根出矣，四神丹方在第十二卷中。

凡腫病，須百方內外攻之，生商陸一斤，猪脂一斤，煎，可得二升，二味如煎，令黃，去滓，以磨腫處，亦可服少許，并塗以繒漬之，燥輒傅之，不過三日差。

因瘡腫者，皆中水及中風寒所作，其腫入腹，則殺人，溫桑灰汁，漬之，冷，復溫之，常令熱，神祕。

治癰，芫花為末，膠和如粥，傅之。

瘡發心胸以下者，武都雄黃松脂各三兩，和爲塊，刀子刮爲散，飲服方寸匕，日三，不差更合。

石癰，堅如石不作膿者，生商陸根，搗傅之，乾則易之，取軟爲度，又治濕瘡諸癰。

又方，蜀桑根白皮，陰乾，搗末，炷膠，以酒和藥傅腫，即拔出根。

又方，醋和蕓苔子末傅頭上，即拔出根。

又方，蛇脫皮貼之，經宿差。

又方，梁上塵，葵根莖灰等分，醋和傅之，即差。

又方，楪子一枚，以醋于青石上磨之，以塗腫上，乾更塗，不過十度，即愈。

又方，富上炙之百壯，石子當碎出，如不出，灸壯乃佳。

癰腫痛煩悶，生楸葉十重貼之，以帛包，令緩急得所，日二易，止痛，兼消腫，蝕膿，其良勝于衆物，如冬月，先收乾者，用時，鹽泥之亦可，薄消楸皮用之。

始覺腫，令消，以蕓苔末三指撮，水和服之，日三，神良。

已結膿，使聚，苦藝根末之，苦酒和傅上，燥則易，赤小豆亦佳。

癰腫，芥子末湯和傅紙上，貼之。

又方，白蘞石末，蒜和搗傅上，差。

又方，馬鞭草搗傅上，即頭出。

又方，灸兩足大拇指奇中立差，仍隨病左右。

痈無頭者，吞葵子一枚，不得多服。

又方，燒蔦蔓灰封上，自消，牛糞灰亦佳。

又方，鼠粘根葉貼之。

又方，水和雀糞傅之。

又方，生椒末，釜下土等分，醋和，塗之，一法，有麩末。

癰有膿，令消，雞羽三七枚，燒末，服之，即潰。

又方，人乳和麪傅上，比睡，膿血出，并蓋，不用近手。

又方，箔繩，燒灰末，臘月猪脂和傅下畔，即潰，不須針灸。

膿潰後，瘡不合，熟嚼大豆傅之。

又方，炒烏麻令黑，熟搗傅之。

又方，牛糞傅之，乾則易。

又方，燒破蒲席灰，臘月猪脂和，內孔中。

癰久不差，馬齒莧搗汁，煎傅之。

癰瘡潰後膿不斷，及諸物刺傷，瘡不差者，石硫黃粉一兩，筋一片，搥頭碎，少濕，內硫黃中，以刺瘡孔，瘡差爲度。

癰肉中如眼，諸藥不效，犯丁瘡，蕪菁根，鐵生衣等分，和搗，以大針刺作孔，復削蕪菁根如針大，以前藥生衣塗上，刺孔中，又塗所搗者，封上，仍以方寸匕，緋帛塗貼之，有膿出，易之，須臾，拔根，立差，忌油膩生冷，醋滑，五辛，陳臭，粘食。

又方，刺瘡頭及四畔，令汁極出，搗生栗黃傅上，以麪圍之，勿令黃出，從旦至午，根即拔矣。

又方，以麪圍瘡，如前法，以針亂刺瘡，銅器裝醋，令沸，瀉麪圍中，令容一寸，冷則易之，三度，即拔根出。

又方，取蛇脫皮如雞子大，以水四升，煮三四沸，去滓，頓服，立差。

又方，取岱耳苗，搗取汁一二升，飲之，滓傅上，立差。

一方，灸掌後橫文後五指，男左女右，七壯。

癰肉中如眼，諸藥不效，取附子，削令如棊子，安腫上，以唾貼，以火灸之，令附子欲焦，復唾濕，復以火灸之，如是三度，令附子熱氣徹內，即差。

一切毒腫疼痛，取莖麻子，熟搗傅之，即差。

脚腫，向上，至腹，即殺人者，赤小豆一斗，以水三斗，煮令爛，出豆，以汁浸脚，至膝，每日一度，差止，若已入腹，不須浸，但煮豆食之，忌鹽菜米麪等，渴飲汁，差乃止。

瘡久不差，差而復發，骨從孔出，名骨疽，以猪脂和楸葉搗，封之。

又方，搗白楊葉傅之。

又方，蕪菁子搗傅之，帛裹，一日一易。

又方，穿地作坑，口小裹大，深三尺，取乾雞屎二升，以艾及荆葉搗碎，和雞屎，令可燃火，坑中燒之，令煙出，將疽就坑口熏之，以衣擁口，勿泄氣，半日，當有蟲出，甚效。

附骨疽，榆皮燒灰，飲服方寸匕。

又方，灸四使後一寸，隨年壯，立差。

一切丁腫，齊耳根莖苗子，但取一色，燒爲灰，酢泔淀和，如泥，塗上，乾則易之，不過十度，即拔根出，神良。

又方，取鐵漿，每飲一升，立差。

又方，麪和臘月猪脂，封上，立差。

又方，蕎麥子一升，燒灰，醋和，封上，經宿便差，或針破頭，封上，更佳。

又方，皁角子取仁，作末，傅之，五日內差。

又方。艾蒿一擔燒作灰。于竹筒中淋取汁。以一二合和石灰。如麪漿。以針刺瘡中。至痛。即點之。點三遍。其根自拔。

赤眼丁。熬白粉令黑。蜜和傅之良。

又方。以新瓷鼠壞水和塗之。熱則易之。

又方。搗馬牙齒末。臘月猪脂和傅之。可拔根出。亦燒灰用。

火燒瘡。慎不得以冷水洗。熱得冷。更深入骨。壞人筋骨。□□初被火燒。急更向火炙。雖大痛。強忍之。一食久。即不痛。神驗。

又方。家中一女子。火燒手。且浸浸至掌。急以酸酢升餘浸之。出酢。尙痛時不痛止。不瘡。不膿。不瘢。神妙神妙。

又方。未熬油麻。和梔子仁。塗之。惟厚爲佳。

又方。已成瘡者。燒白糖灰粉之。即燥。立差。

因瘡而腫痛劇者。數日死。或中風寒。或中水。或中狐尿。刺燒黍穰。若牛馬屎。若生桑條。燒取多煙。以熏之。汗出愈。如無生桑條。取得多煙之物燒熏。汗出愈。

又方。熱蠟內瘡中。新瘡亦善。

又方。以鼻公英草。根莖白汁塗之。惟多塗爲佳。大神効。此草蜀中名耳瘢菜。關中名荷乳。乳奴狗切。

腸癰。雉雞頂上毛。并屎。燒作末。空心酒服。

又方。截取檐頭尖少許。燒作灰。水和服。當作孔出膿血。愈。

又方。瓜子三升末之。以水三升煮。取一升五合。分三服。

又方。死人冢上土。作泥。塗之。

內癰未作頭者。服雞屎即差。

又方。腸癰。屈兩肘正。灸肘頭銳骨各百壯。則下膿血。即差。

婦人妬乳。取葵莖灰末之。飲服方寸匕。日三□□法爲末。不爲灰。

又一方。取研米槌二枚。灸令熱。以熨及故帛搨乳上。以槌更互熨之。差止。

乳癰。以水磨盛酢泔清。燒石令熱。內中。沸止更燒。如前。少熱。內乳演之。冷更燒石。內演。不過三燒石即愈。

又一方。取蒺藜白搗傅之。并絞汁一升。頓服。即愈。

又方。柳根削取上皮。搗令熟。熬令溫。盛練袋中。熨乳上。乾則易之。一宿即愈。

又方。鹿角治下篩。以猪脂上清汁。服方寸匕。不過再服。亦可以醋漿水服。

千金寶要卷之三

霍亂吐瀉第九

霍亂轉筋。蓼一把。去兩頭。以水二升。煑取一升。頓服之。一方作梨漿。

又方。燒故木梳灰末之。酒服一枚。小者永差。

又方。車轂中脂。塗足下。差。

又方。作極鹹鹽湯。千槽中煖漬之。

又方。以醋煑青布搨之。冷復易之。

轉筋不止。若男子。以手挽其陰牽之。女子。挽其乳近左右邊。

轉筋在兩臂及胸中者。灸手掌白肉際七。又灸臂中中府。巨闕。肩髆。尺澤。并治筋拘踡足。皆愈。

霍亂引飲。飲輒乾嘔。生薑五兩。㕮咀。以水五升。煑取二升半。分二服。高良薑大佳。

霍亂。暴利心煩。脉數。欲得冷水者。新汲井水。頓服一升。立愈。先患胃口冷者。勿服之。

霍亂吐下腹痛。以桃葉煎汁。服一升。立止。冬用皮。

走哺轉筋。灸踝踝。白肉際。各三七壯。又灸小腹下橫骨中央。隨年壯。

轉筋四厥。灸兩乳根黑白際各一壯。

轉筋。灸湧泉穴七壯。在足心下當拇趾大筋上。又灸足大趾下約中一壯。

又方。轉足踝聚筋上白肉際七壯立愈。

轉筋入腹。痛欲死。四人持手足。灸脾上一寸十四壯。自不動。勿復持之。又灸股裏大筋。去陰一寸。

霍亂轉筋。令病人合面正臥。伸兩手著身。以繩橫量兩肘尖頭。依繩下夾脊骨兩邊相去各一寸半。灸一百壯。無不差。

霍亂已死。有煖氣者。灸承筋。取繩量圍足。從趾至跟。更捻取等折一半。以度。令頭至跟踏地處。別縛上至踝。即是穴。灸七壯。起死人。又以鹽內臍中。灸二七壯。

霍亂洞下不止。艾一把。水三升。煮取一升。頓服之良。

又方。香茅一把。水四升。煮取一升。頓服之。青木香亦佳。

蠱毒。宿食不消。霍亂。極鹹鹽湯三升。熱飲一升。刺口令吐。宿食使盡。不吐。更服。吐訖。復飲。三吐乃住。此法大勝諸治。俗人以爲田舍淺近法。鄙而不用。守死而已。凡有此病。即須先用之。

又方。蠶豆一升。香薷一升。以水六升。煮取二升。分服。單用亦得。

胞轉小便不通。亂髮急讀如兩拳大。燒末。醋四合。和二方寸匕。服之訖。即炒熟黑豆葉。蹲坐其上。

又方。阿膠三兩。水二升。煮取七合。頓服之。

又方。豉五合。以水三升。煮數沸。頓服之。

又方。麻子煮取汁。頓服之。

又方。迦柳燒灰。水服之。

又方。鉈頭燒灰。水服之。

又方。灸玉泉七壯。穴在關元下一寸。大人從心下處取八寸。是玉泉穴。小兒斟酌取之。

又法。灸第十五椎五十壯。

又法。灸臍下一寸。隨年壯。一日四寸。

吐逆霍亂吐血。灸手心主五十壯。

吐血。生地黃肥者五升。搗以酒一升。煮沸。三上三下。去滓。頓服之。

又方。服桂心末方寸匕。日夜可二十服。亦治下血。

忽吐血。熟艾三雞子許。水五升。煮取二升。頓服。

又方。燒亂髮灰。水服方寸匕。日三。亦治舌上忽出血如簪孔者。亦治小便出血。

中蠱下血日數十行。苦瓠一枚。以水二升。煮取一升。稍稍服之。當下蠱。及吐蝦蟆科斗之狀。一月後乃盡。

又云苦瓠瘡。當臨時量用之。又云。用苦酒一升煮。

虎犬馬傷第十　針折入肉附

虎咬瘡。煮葛根令濃。以洗之。十遍。飲汁。及搗爲散。以葛根汁服方寸匕。日五。甚者夜二。

又方。青布急卷爲繩。止一物。燒一頭。然內竹筒中。注瘡口。蘇之妙。

又方。煮豉令濃。洗瘡。

又方。嚼栗子塗之良。

剝死馬骨傷人。瘡攻欲死。便取馬腸中屎塗之。大良。

又方。取其屎燒灰。服方寸匕。

狂犬咬人。毒有七日一發。百日內殺人者。每到七日。搗韭汁飲一二升。當終身禁食犬肉蠶蛾。若犯則死不可救。瘡未愈之間。禁食生魚及諸肥膩冷食。但于飯下蒸魚。及于肥器中食。便發。不宜飲酒。過一年乃佳。

獗犬嚙人。搗地榆。絞汁塗瘡。無生者。取乾者以水煮汁飲之。亦可。末之。服方寸匕。日三。

又方。搗韭絞汁飲一升。日三。瘡愈止。

又方。以豆醬清塗之。日三四。

又方。刮虎牙或骨。服方寸匕。

獗犬毒。燒虎骨傅瘡。及熨。又微熬杏仁。搗研。取汁。服之良。又取燈蕊殘油。滴瘡口。此皆禁生菜豬肉魚酒。

又方。用韭根。故梳二枚。以水二升。煮取一升。頓服。

又方。桃東南枝白皮一握。水二升。煮取一升。分二服。吐出犬子。

又方。服莨菪子七枚。日一。

又方。梅子末。酒服。

獗犬所齧。惡血未盡。灸上一百壯。以後當日灸一壯。若不血出。刺出其血。百日灸乃止。禁飲酒猪犬肉。

舌耳心目等大小便第十一

舌卒腫滿口溢出。須臾不治。殺人。急以指刮破舌兩邊。去汁即愈。

又方。取釜下墨。以酢厚傅舌上下。脫去。更傅佳。

又方。半夏十二枚。洗熟。以酢一升。煮取八合。稍稍含漱之。吐出。加生薑一兩佳。

又方。滿口含醋酢少許時。熱通即止。

舌上出血如泉。燒鐵鎚。熟烙孔中。良。

舌強不語。礬石桂心等分爲末。安舌下。立差。

耳中有物不可出。以弓弦從一頭令散。傅好膠。注耳中物上。停之。令相著。徐徐引之。

耳聾乾耵聹不可出。三年酢漬之。最良。緩塞之。半日許。必有物出。

百虫入耳。末蜀椒一撮。以酢半升。調漬耳中。行二十步。即出。

又方。桃葉火熨卷之。口塞耳。立出。

又方。車脂傅耳孔。自出。肘後。以療聹耳膿血。

又方。以蒜粥灌耳中。虫即出。亦治耳聾。

齒斷間血出不止。生竹茹二兩。醋煮含之。

又方。溫童子小便半升。取三合含之。其血即止。

九孔出血。搗荆葉取汁。酒服二合。一即荆芥。

九竅心痛。取當太歲上新生槐枝一握。去兩頭。㕮咀。以水三升煮。取一升。頓服。

又方。桃白皮煮汁。空腹。以意服之。

婦人心痛。布裹鹽如彈丸。燒作灰。酒服。

又方。燒矾鍊。投酒中服。佳。

又方。炒大豆。投酒中服。佳。

產後卒心腹痛。桂心三兩。酒三升。煮取二升。去滓。分三服。日三。

又腹中苦痛。生牛膝五兩。酒五升。煮取二升。去滓。分二服。若乾牛膝根。即酒浸一宿。方可煮。

奔豚氣急。作湯以浸兩手足。數數易之。

又方。灸章門百壯。一名長平。一穴在大橫外。直臍肋端。

又方。灸氣海百壯。穴在臍下一寸半。

又方。灸關元百壯。在臍下三寸。

又方。灸中極五十壯。在臍下四寸。

又方。灸期門百壯。直乳下第二肋端。傍一寸五分。

又方。灸四滿二七壯。穴夾丹田兩傍。相去三寸。即心下八寸。臍下橫文。是也。

奔豚腹中與腰痛。灸中府百壯。穴在兩乳上三肋間。

耳聾有膿不差。有虫。先以鹿絲去耳中汁。以礬石末粉耳中。次以石鹽末粉其上。食久乃起。不過再。永差。

聹耳。桃仁熟搗。以故絹裹。內耳中。日三易。以差爲度。

治底耳。黃礬燒。緩塞內耳中。不過三日。愈。或以葦管吹耳中。

治虫心痛。鶴蝨末之。密和梧子大。服四十丸。日三。蜜湯下。加至五十丸。慎酒肉。

又方。鶴蝨一兩。末之。空腹。溫酢一盞。和服之。虫當吐出。

又方。服漆一合。

熱鬚漫眦。以羊筋漱口。熟嚼。夜臥。開目納之。即閉目睡。去膜。明日差。亦治昧目。

眼暗。以銅器盛大酢三四升。煎七八日。覆器澤地。取銅青一合。以三月杏白仁一升。取汁。和銅青傅之。日不過三四度。大良。

又方。含黃蘗一爪甲許。使津。盥掌中。拭目訖。以水洗之。至百日眼明。此法乃可終身行之。永除眼疾。神良。

崔日知令崔日人至黃昏時。看崔宿處。打令驚起。崔飛。乃咒曰。紫公紫公。我還汝盲。汝還我明。如此日日咒。三過作之。眼即明。什試有驗。

大小便不通。葵子末一升。淸竹葉。以水二升。煮五沸。頓服。

又方。葵子一升。榆皮一升。水五升。煮取二升。分三服。

又方。葵子一升。以水三升。煮取一升。去滓。納猪脂一升。空腹。分二服。

又方。瓠瓢煮取汁。和蒲黃方寸匕。日三服。

又方。猪脂一升。以水二升。煮三沸。飲汁。立通。

又方。灸臍下一寸三壯。

失欠頰車蹉。一人以手指牽其頤。以漸推之。則復入矣。推常疾出指。恐慢齒傷人指也。

又方。消蠟和水傅之。

目眯不出。以鹽沙一粒吞之。即出。

卒食物入鼻。有入腦。羊脂如指大。內鼻中。吸上。物隨脂下。

鼻中出血不止。搗楮葉汁。飲三升。大良。

齒痛。蚯蚓糞。水和。作稠泥團。以火燒之。令極赤如粉。以臘月猪脂和。傅齒上。日三兩度。水差。

又方。馬齒菜一把。嚼之。即差。

齒根動欲落。生地黃。緩裹。着齒上。咋之。及㕮咀。以汁漬齒根。日四五。并嚼汁。十日。大佳。

大便難。好膠三寸。蔥白一把。以水四升。煮取一升半。頓服之。即下。

又方。葵子汁和乳汁等分。服之。立出。

大便失禁。不拘老人小兒。灸兩脚大指。去甲一寸。三壯。又灸大指奇間。三壯。

小便不通，水四升，洗飯帶，取汁，煮葵子，取二升半，分三服。
又方，胡燕糞，豉各一合，和搗丸如梧桐子大，服三丸，日三。
又方，髮去垢，燒末一升，葵子一升，以飲服方寸匕，日三。
又方，石槽塞灰土，井花水服之，日三。
又方，服車前子末，方寸匕，日三，百日止。
卒不得小便，車前草一把，桑白皮半兩，㕮咀，以水三升煎，取一升，頓服之。
婦人卒不得小便，煮杏仁二七枚，熟末，服之，立通。
又方，紫菀末，井花水服三指撮，立通，血出四五度，服之。
大小便不利，葵子二升，消石二兩，以水五升煮，取二升，分再服。
小便不利，大便數，注灸風骨端五十壯。
胃反，食則吐，搗粟米作麪，水和作丸，如楮子大，七枚，湯煮，內酢中，細細吞之，得下便已，麪亦得用之。
胃反，食即吐出，上氣，蘆根，茆根各二兩，細切，以水四升煮，取二升，頓服之，得下，良。
又方，飲白馬尿，即止。
又方，淘小芥子，暴乾爲末，酒服方寸匕，日三。

又方，灸兩乳下各一寸，以差爲度。
上氣，上酥一升，鵝頭蒜五顆，先以酥煎蒜黃出之，生薑汁一合，共煎令熟，空腹，溫服方寸匕。
上氣嘔吐，芥子二升，末之，蜜丸，寅時以井花水服，如梧子大，七丸，日二，亦可作散，酒浸服，治脾下絞痛。
脚氣入腹，困悶欲死，吳茱萸六升，木瓜兩箇，切，以水一斗三升煮，取三升，分三服，如人行十里久，再進一服，或吐或汗，或利，或大熱悶，即差，此起死人方。
卒啘，滿口煮蜜食之，即下。
又方，刮楮柞頭細糠，含之，即下。
又方，老牛涎，張核大，水中飲之，終不復啘。
齲齒及虫痛，切白馬鬃蹄如米許，以緜裹，著痛處孔中，不過三度。
又方，家中法以煮酒蠟少許，任在虫孔子中，以熱火筯烙之，令蠟融于孔，立愈。
熱病後眼暗失明，以羊膽傅之，旦暮各一。
明目令髮不落，牛膽中漬槐子，陰乾，百日，食後吞一枚，十日身輕，三十日白髮再黑，百日通神。
明目，小黑豆，每日空心吞二七粒。
又方，三月三日，採蔓菁花，陰乾，治下篩，空心，井花水服方寸匕，久服，可夜讀細書。

目赤及腦，烏賊骨，鉛丹，大小等分，合研細，和白蜜如泥，蒸之，半食久，冷，著眼四眥，日一。
治三十年聾，故鹽三十斤，以水七斗，浸三宿，取汁，入麴釀米七斗，如常造酒法，候熟，取磁石一斤，研末，浸酒中，三日乃可飲，取醉，以緜裹磁石，內耳中，好覆頭臥，酒醒去磁石，即差。
耳聾鳴，汁出，一二十年不差，礬石少許，以生菖蒲根汁，和，點入耳中。
耳聾，巴豆十四箇，成鍊，松脂半兩，合治，丸如黍米大，緜裹，以醬頭著耳中，一日一易藥，如硬，微火炙之，以汁出乃愈，妙。
又方，菖蒲附子等分，末之，以麻油和，以緜裹，內耳中。
又方，芥子，搗碎，以男兒乳和，緜裹，內之。
又方，作一坑，可容二升許，著炭火其中，坑似窖形，以磚覆口上，磚上作一孔，可容小指，磚孔上，著地黃一升，以木盆覆之，以泥泥盆下，勿泄，盆底上鑽一小孔，可容筯，其孔上著三重布，以耳孔當盆上，熏久，若悶，去黃水，髮裹鹽塞之，不過二三度，神効。
又方，酒三升，浸牡荊子二升，碎之，浸七日，去滓，任性服，盡三十年聾，亦差。
又方，硫黃雄黃各等分，末之，緜裹，內耳中，數日，聞人語。

中風大風水氣第十二

大風半身不遂，鹽沙兩石，熱蒸，作直袋三枚，各受七斗，熱盛一袋，著患處，如冷，即取餘袋，一依前法，數數易，百不禁差止，須羊肚釀粳米，蓽白，蓽撥，椒，豉等爛煮，熱喫，日食一枚，十日止，千金不傳。
百種風，灸腦後項大椎平處，兩廂，並二寸三分，各灸百壯，得差，須取病人指寸量。
卒病惡風欲死，灸第五椎，名曰鬼輸，一百五十壯，三百壯，便愈。
中風口僻眼急，諸藥不能差者，枳實上膏，刮取末，欲至心止，得茹五升，微火炒，去澤氣，以酒一斗漬，微火煖，令得藥味，隨性飲之，大驗，治緩風急風並佳。
中風口噤，炒大豆三升，令焦，以酒三升，淋取汁，頓服之，口噤不開，亦治。
又方，大皁角一兩，去皮子，下篩，以三年大醋和，左噤塗右，右噤塗左，乾，更塗之。
卒氣短，搗韭汁，服一升，立差。
大風疾，煉松脂，投水中二十徧，蜜丸，服二兩，飢便服之，日三，忌桂蒜雞者，二百日服之差，斷鹽及雜食房室。
又方，天門冬酒服，百日愈。
大風，灸百會七百壯。
腎寒，灸腎輸百壯。

中風口喎，灸手交脈三壯，左灸右，右灸左，其炷如鼠屎，橫安之，兩頭下火。

風勞骨痛，腰痛，急，桃仁一升，研，如常法，以酒三升，攪和，頓服之，厚衣蓋令汗，不過三劑。

猛退風，草麻子脂一升，酒一斗，銅鉢盛，着酒中，一日，煮之令熟，服之。

失音，濃煮桂汁，服一升，覆取汗，亦可，末桂着舌下，漸漸咽汁。

又方，濃煮大豆汁含，亦佳，無豆用豉。

歷節風，松脂一升，酒三升，浸七日，服一合，日再，數劑愈。

冷氣，氣短，蜀椒五兩，絹袋盛，以酒一斗，浸之，三七日，服之，任意多少。

卒上氣鳴急，便欲死者，搗韭汁服一升，良。

乏氣，枸杞葉，生薑各二兩，㕮咀，以水三升，煮取一升，頓服。

心腹冷痛，熬鹽一斗，熬，熬鹽沙，燒磚石，蒸熨，取其暖，止，蒸土亦大佳。

虛勞浮腫，灸太衝百壯，又灸腎俞。

虛勞不得眠，酸棗仁葉等分，末之，蜜丸如梧子大，每服十五丸，日再。

又方，乾薑四兩，末，湯和，頓服，覆取汗，愈。

一切虛羸，鹿骨一具，碎，枸杞根，切，二斤，二味各以水一斗，別器各煎汁五升，去滓，澄清，仍合一器，共煎，取五升，日二服，盡好，將慎，皆用大斗。

補虛羸，九月十日，取生薑，枸杞子一斗，酒六升，煮五沸，出，取研之，熟，濾取汁，令其子極淨，絞子令乾，搗末，合前汁，微火煎，令可丸，酒服，二方寸匕，日二，加至三方寸匕，亦可加至五十丸。

腹脹滿繞臍結痛，堅不能食，灸中守百壯，穴在臍上一寸，一名水分。

脹滿氣聚，寒冷，灸胃管百壯，三報，穴在鳩尾下三寸。

脹滿，寒聚，滯下冷，瘕，灸氣海百壯，穴在臍下一寸，忌不可針。

脹滿氣如水腫狀，小腹堅如石，灸膀胱募百壯，穴在中極，臍下四寸。

脹滿，腎冷，寒聚，洩利，灸天樞百壯，穴在臍傍相對橫去臍兩傍各二寸。

諸冷極，馬菌子丸，升淨，治去土，空腹服一合，日三，飲及酒下之，服訖，須臾，以食壓之，取差乃止。

骨蒸，天鑑蓋如梳大，灸令黃，碎，以水五升，煮，取二升，分三服，起死人神方。

又方，取人屎灰，以酒服方寸匕，日三。

走疰，燒車釭令熱，暫入水，以溼布裹熨之。

三十年氣疰，跋心，半升，生椒一合，以水二升，煮，取半升，適寒溫，用竹筒縮取汁，令病者側臥，以手壁大孔射灌之，少時當出惡物，此法垂死悉治，得差百千，不可具述。

欬嗽，胸脇支滿，多唾，上氣，酒一升半，浸肥皁莢兩挺，經宿，煮，取半升，分三服，七日忌如藥法，若吐多，以酢飯三四口止之。

又方，蜜汁一升半，沙糖五合，煎蜜汁，減半，內糖，更煎，服之。

又方，白糖五分，微煖令消，內皁莢末方寸匕，利相得，先食服，如小豆二丸。

又方，服芥子七丸，以油酒下之。

上氣，欬嗽，乾羌末三兩，膠飴一斤，二味和令調，蒸五升米下，以塊大含，稍稍咽之，日五夜二。

卅年嗽，百部根二十一斤，搗取汁，煎如飴，服方寸匕，日三。

又方，白蜜一斤，生羌三斤，取汁，二味先煎銅銚秤知斤兩，訖，內蜜，復秤知數，次內羌汁，以微火煎，令羌汁盡，惟有蜜斤兩在，丸如棗大，含一丸，日三，禁一切雜食。

又方，紫菀二兩，款冬花二兩，末之，食後，以飲服方寸匕，日三，七日差。

久水腹大如鼓，烏豆一斗，熬令香，勿令大熟，去皮，爲細末，餳粥皆得，服之，初服一合，稍加之，若初服多，後卽嫌臭，服盡卽更造，取差止，不得食肥膩，渴則飲藕汁，愼酒肉猪雞魚生冷酢滑房室，得食漬粥，牛羊兎鹿肉，此讓大飢渴時食之，可忍，亦勿食也，此病難治，雖諸大藥丸散湯膏，當時雖差，過後復發，惟此散差後不發，終身服之，終身不發矣，其所禁食物，常須少噉，莫過鹹物諸雜食等。

又方，葶藶末二寸匕，蒼耳子灰二寸匕，調和，水服之，日二。

又方，椒目沉水者，取熬之，搗如膏，酒服方寸匕。

又方，水煮馬兜零服之。

水腫利小便，葶藶四兩，生，用桂心一兩，末之，蜜飲下，梧子大七丸，日二，以知爲度。

又方，牽牛子末之，水服方寸匕，日一，利止。

又方，郁李仁末，麪各一升，和作餅子，七枚，燒熟，空腹熱食四枚，不知更加一枚，加至七枚。

大水，頭面徧身腫，服苦瓠白穰實，捻如大豆，以麪裹，煮一沸，空腹吞七枚，至午當出水□升，三四日，水自出不止，大瘦乃差，三日內愼口味也，苦瓠須好，無厥，緻細理，研□□□有毒，不堪用，崔氏用子作餅，飩服，二七枚，若恐虛者，牛乳服之，如此，隔日作服，漸加至三七枚，以小便利爲度，小便若太多，卽二日停止。

水通身腫，煎猪椒枝葉如餳，空腹服一匕，日三，痊，以汁洗之。

又方，苦瓠膜二分，葶藶子五分，熬，搗爲丸，如小豆大，服五丸，日三。

又方，單服牛尿，大良，凡病水無不差，服法先從少起，得下爲度。

又方，大棗肉七枚，苦瓠膜如棗核大，搗丸，一服三丸，如行十五里久，又服三丸，水出，更服一丸，卽止。

又方。煎人尿。令可丸。如小豆大。日三服。

又方。羊蹄桃仁各等分。皆熟。合搗爲丸。服之。利小便。一日。用杏仁。

又方。搗生羊蹄子。酢和服。以小便數爲度。

又方。燒蠶石令赤。內黑牛尿中。令熱。服一升。日一。

又方。灸足第二趾上一寸。隨年壯。又灸兩手大指縫頭。七壯。

凡卒中風口喎。以葦簡長五寸。以一頭塞耳孔中。四畔。以麵密塗之。勿令泄氣。一頭內大豆一顆。并艾燒之。令然。灸七壯。即差。患右灸左。患左灸右。耳病亦灸之。若不能語者。灸第三指上百壯。若服反口噤。腹中切痛。灸陰蹻下第一橫理。十四壯。人卒死者。灸法同之。

破傷風腫。厚塗杏仁膏。燒麻燭。遙灸之。

刺傷中風。水刮箭羽下漆。塗之。

又方。服黑牛熱尿一服。二升。三服。即止。

又方。煮韭熱揭之。

又方。蠟一兩。熱灸。熨。薄裹其上。水出愈。

千金寶要卷之四

瘧痢癰等第十三

凡下痢。熱烏梅一升。黃連一斤。金色者。末之。蜜和如梧子大。二十丸。日三。夜二。

積久三十年常下痢。赤松皮去上粗皮。切一斗。爲散。麪粥和一升。日三服。百日差。

下血。日夜百七八十行。黃連黃蘗各四兩。㕮咀。醇酢三升。煮取一升半。分再服。

赤白帶下。亂髮燒灰大燒末。水服。不過三。

下冷膏下。攪痛。赤石脂乾薑各十兩。丸如豌豆。服十丸。日三。加至二十丸。

卒下痢。黃連五兩。生薑一斤。㕮咀。以水五升。煮取一升。頓服。米止更服。

久冷白痢。日夜五六十行。大小腹痛不可忍。好麴末五升。微熬。令和。溫清酒令熱。和麴末一升。空腹頓服。

日三服。若至食時。搗蒜一升。令至熟。下薑椒調和。如常食法。惟須稠。勿加鹽。以水和麴二升作索餅。極

爛。煮之。乾漉。熱內蒜齏臼中。相和。一頓食之。少與餘食。至飢時仍準前食麴末酒。比至瘥不過兩日。

久冷或痢或不痢。但患腰腹苦冷者。上等新蜀椒三升。用酢宿漬之。以麴三升。和椒一升。緊拌。煮作粥。空

腹頓服之。加蒜豉鹽。任性調和。不差更作。以差爲限。不過三升。椒。即愈。此不但治冷。大治諸虛損冷。極

有所益。久當自知耳。

瘧。或間日。或夜發者。燒黑牛尾頭毛。作灰。酒服方寸匕。日三。

又方。撫問新久者。小便一升半。蜜三匕。同煮。三沸。頓服。每發日平旦時服。自至發勿食。重者漸退。不過三服差。

一切瘧。撫問遠近。正仰臥。以線量乳間。中屈。從乳向下灸度頭。隨年壯。男左女右。

五臟諸瘧。灸尺澤七壯。穴是肘約上動脈。

觀瘧法。未發前。抱一大雄雞。時時驚動。令雞作大聲。立差。

卒暴瘧。腹中有物。堅如石。痛如斫刺。晝夜啼呼。不治。百日必死。牛膝二斤。㕮咀。暴之令乾。以酒一升浸之。密塞氣口。煎取半。服半升。一服便吐。去宿食。神効。

又卒暴瘧。取商陸根。搗碎。蒸之。以新布藉腹上。以藥鋪布上。以衣物覆藥上。冷。復易之。數日勿息。

凡所食不消。取其餘類。燒作末。酒服方寸匕。便吐。去宿食。即差。如食桃不消者。以時無桃。就樹間得槁桃。燒服。亦可。

卒食不消。欲成瘧積者。煎艾汁如飴。取半升。作一服。便利。吐去宿食。神良。

又方。白艾五尺圍一束。蓋莖根一大把。二味煎服。

食魚肉等成瘧結。并諸毒氣。狗屎五升。燒末。餘裹之。以酒一斗。浸再宿。濾取清。分十服。日三服。三日使盡。

隨所食便出矣。

雜中食瘧實不消。心腹堅痛。以水三升。煮白鹽一升。令消。分三服。自吐。亦治暴瘧。

患瘧結病。及爪病。似爪形。日月形。或在臍左右。或在臍上下。若緊在左右肋下。或當心如合子大。先針其足。以椒熨之。取一新大盆。受一斗者。盆底鑽一百二十孔。孔上着椒三合。上着一重紙。紙上着冷灰一升。灰上着熱灰半升。上着赤炭火一斤。繼一食頃。盆底熱。微當病上。初安氈一重。即安火盆。火盆大熱。以漸更加一重。若火更熱不可忍。加至三重。暫歇一口冷飲。還上火。消二分許。則停。經三日。□□及至七日。決得頓差。然後食美食自補。若小不差。作蠚宿丸。服之。方在第十六卷中。

緊瘧。腹堅硬。腫起大如盆。眠臥不得。取藍一斤。搗水三升。絞取汁。合一升。日二。

又方。蒲盛根。白芨一撮。研取汁。水和服之。

食□得病。爲緊瘧。在心下堅強。雞屎一升。炒黃。取五合。以酒一升。浸。半爲末。以所浸酒。服方寸匕。日二三日中作一劑。

蛟龍病。開皇六年三月八日。有人食芹得之。其人病發。似顛癇。面色青黃。因食飛食餳。過多。便吐出蛟龍。有頭及尾。從蓋有人患此疾。令服寒食餳二斗。大驗。

米癥常欲食米若不得米則胸中清水出雞屎一升白米五合合炒令米焦擣末以水二升頓服取盡須臾吐出病如研米若無米當出痰自此永憎米不復食

頭風吐逆第十四

凡食後吐酸水乾薑茱萸各二兩治篩酒服方寸匕日二宵冷服之立驗

嘔噦蘆根切三升以水一斗煮取四升分四服

乾嘔吐逆涎沫出者半夏乾薑等分㕮咀以漿水一升半煮取七合頓服之日三

乾嘔酒浸馬屎一宿取汁服之

又方灸心主尺澤亦佳

又方灸乳下一寸三十壯

乾嘔不止粥食湯藥皆吐不停灸手間使三十壯若四厥脉沈絕不至者灸之便通此起死人法

治噦煮豉三升飲汁佳

又方空腹飲蜜汁一升

又方濃煮蘆根汁飲之

又方灸承漿七壯炷如麥大又灸齊下四指七壯

惡心苦飢穀幷子一升碎以酒水三升煮穀一升頓服須臾吐下如蝦蟆衣三升

又方服小便百日佳

又方麻子一升熬令香熟搗取酒三升熟研濾取一升飲盡日二服藥□石差一切病自能食飲不能測者任性多少

食飲輒吐頓服生熟湯三升即止

吐逆食不住灸胃管百壯三報

吐逆飲食卻出灸脾募百壯三報章門也

咽痛逆氣不能食麻子一升熬令黑以酒一升淋取汁空心一服一升漸至二升多汗好愛勿觸風冷此方發理產婦及丈夫中風如角弓反張口噤不開

治婦人氣平旦服烏牛屎日一止

腰痛以酒單服鹿茸與角方寸匕日三

腰脊痛導引法正東坐收手抱心一人于前據蹈其兩膝一人後持其頭徐垂令偃臥頭到地三起三臥止便差

腰痛灸法宜針決膝腰句尺一中脊赤脉出血便差

又方灸脚跟上橫文中白肉際十壯良

又方灸足巨陽七壯巨陽在外踝下

又方灸腰自腎七壯在尻上約左右

又方灸八髎及外踝上骨約中

腰卒痛灸窮骨上一寸七壯左右各一寸七壯

頭風大豆三升炒令無聲先以一斗二升瓶盛清酒九升乘豆熱即傾酒中密泥頭七日溫服之

又方服荊瀝不限多少取差止

又方搗蒴藋根一升酒二升漬服汗出止

又方末蔓荊子二升酒一升絹袋盛浸七宿溫服三合日三

又方臘月烏雞屎一升炒黃末之絹袋盛以酒三升浸溫服任意常令醺醉

又方七月七日麻勃三升麻子一石末相和蒸之沸湯一石五斗三徧淋之煮取一石神麯二十斤漬之令發以黍米兩石五斗釀之熟封三七日服清一升百日身中澀皮入風胸臆五臟骨髓伏風百病悉去之

頭風沐方摩麝子黃沐不過三四度愈

又方喝椒二升以水煮取汁沐髮良

白髮以桑灰汁沐頭去白屑神良

白髮還黑烏麻九蒸九曝末之以豬肉丸久服之佳

又方隴西白芷旋覆花秦椒各一升桂心一尺治下篩以井花水服方寸匕日三三十日白髮還黑終身室

千金寶要卷之五

疫癘渴淋第十五

令瘟不相染人汲水瓶上繩長七寸盜着病人臥席下良。

又方以繩度所住戶中壁屈繩則斷之。

又方桃木蠹屎末之水服方寸匕。

又方木豉等分酒漬服之妙。

又方正旦吞麻子赤小豆各三七枚又以二七枚投井中。

又方新布袋盛大豆一升內井中一宿出服七枚。

又方松葉末之酒服方寸匕日三。

又方常以七月七日合家向日吞赤小豆二七枚。

又方常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆二七枚。

又方正旦取東行桑根大如指長七寸以丹塗之挂門戶上又令帶之。

又方常以月望日細剉東引竹枝煮湯浴。

疽氣蒜五子拌皮碎之豉心一升以三歲男兒尿二升煮五六沸去滓服之良。

又方青竹茹二升以水四升煮取三升分三服汗不止者白芷末作飲方寸匕日飲口盜汗韭根四十九枚水二升煮一升頓服。

又方豉一升以酒二升漬三日若服不差更合服不過三劑。

消渴甘草乾薑各二兩㕮咀水三升煮取升半去滓分二服又法有大蛆十二箇。

渴利生栝蔞根三十斤切以水一石煮取一斗半去滓以牛脂五合煎水盡以溫酒食如雞子大日三服。

渴口便利復非淋檢白皮二斤切以水一斗煮取五升一服三合日三。

又方小豆藿一把擣取汁頓服三升。

又方薔薇根水煎服之佳。

又方三年重鵲巢燒末以飲服之。

又方桃膠如彈丸含之咽津。

又方蠟如雞子大以酢一升煮二沸適寒溫頓服之。

熱渴頭痛壯熱及婦人血氣上衝悶不堪者茅根切三升擣取汁渴即飲之令盡。

消渴病百日以上者不得灸刺。

消渴乾浮萍栝蔞根等分末之以人乳汁和丸如梧子空腹飲服二十丸日三三年病者三日愈治虛熱大佳。

治渴黃連一斤生地黃一斤又云十斤絞地黃取汁浸黃連出燥曝之燥復內之令汁盡乾之擣末蜜丸如梧子每服二十丸日三食前後無在亦可為散以酒服方寸匕。

大渴深掘大栝蔞根厚削皮至白處以寸切水浸一日夜易水經五日取出爛擣研之以絹袋濾之如出粉法乾之水服方寸匕日三四亦可粥乳酪中食之不限多少取差止又云水和栝蔞散服方寸匕亦可蜜丸如梧子大每服三十丸。

又方取七家井索近桶口結燒作灰井花水服之不過三服差。

又方取豉漬汁任性多少飲之。

又方澱粉竹根取汁飲之以差止。

又方以青粱米煮取汁飲之以差止。

消中日夜尿七八升者蒐角炙令焦以酒服五分匕日三漸加至方寸匕。

又方海蛤汁服一升佳。

又方蕓根如五升盆大兩束又云五六斤以水五斗煮取三斗宿不食平旦每服三升。

石淋。車前子二升。絹袋盛。水九升煮。取三升。頓服之。石即出。先經宿不得食。

又方。取浮石使滿一手。治下篩。以水三升。酢一升。煮取二升。澄清。服一升。不過三服。石出。亦治嗽。醇酒煮之。

又方。桃膠。聚許大。夏以三合冷水。冬以三合湯和。一服。日三。當下石子如豆卵。石盡止。亦治小便出血。

又方。灸水泉三十壯。足大敦是也。

又方。搗荊葉取汁。酒服二合。

又方。酒三升。煮蜀當歸四兩。取一升。頓服。

又方。煮車前根葉子。多飲之。佳。

又方。刮滑石末。水和傅。繞小腹。仍繞陰際。佳。又治小便不通。

又方。酒服亂髮灰。一云水服。

又方。酒服葵莖灰方寸匕。日三。

頭面手足瘰癧瘡漏第十六

凡口吻瘡。以經年葵根欲爛者。燒作灰。熱傅之。佳。

燕吻瘡。白楊枯枝。鐵上燒取汁。及熱傅之。佳。

唇上瘡。經年不差。八月藍取汁。洗三日。差。

諸瘡因風致腫。燒白芋灰。湯調之。傅上。厚三分。乾即易。不過五度。差。

又方。楪根皮三十斤。剉。水三斛。煮令熟。下鹽一把。令的的然熱。以浸瘡。當出濃血。日日爲之。差止。

反花瘡。并積年諸瘡。取牛蒡根。一云牛蒡根。熟搗。和臘月猪脂。封上。差止。

又方。馬齒菜搗封。差止。

醬淋。細白沙三升。熬令極熱。以酒三升。淋取汁。服一合。

淋痛。蒲黃滑石等分。末之。酒服方寸匕。日三。

氣淋。船底胎如鴨子大。水三升。煮取二升。頓服。

又方。水三升。煮豉一升。一沸。去滓。內鹽一合。頓服。亦可單煮豉汁。服。

又方。水一斗。煮比輪錢三百文。取三升。澄服之。

又方。搗葵子末。溲服方寸匕。

又方。空心。單茹蜀葵一滿口。止。

又方。熱鹽熨。熨小腹。冷復易。亦治小便血。

又方。臍中着鹽。灸三壯。

熱淋。葵根一升。冬用子。夏用苗。切。大棗二七箇。以水三升。煮取一升二合。分二服。熱。加黃芩一兩。出難。加滑石末二兩。血者。加茜根三兩。痛者。加芍藥二兩。加藥水亦如之。

又方。白茅根。切。四斤。以水一斗五升。煮取五升。服一升。日三。夜二。

又方。常煮冬葵根飲之。

血淋。生大麻根十箇。以水五升。煮取二升。頓服之。亦治小便出血。

又方。大豆葉一把。水四升。煮二升。頓服之。

又方。葵子一升。水三升。煮取汁。日三服。亦治虛勞尿血。

又方。灸丹田。隨年壯。又灸伏留五十壯。又云隨年壯。

五淋。灸懸泉十四壯。穴在內踝前一寸。斜行脈上。是市封之別名。

又方。灸大敦三十壯。

卒淋。灸外踝尖七壯。

小便血。胡麻三升。搗細末。以東流水二升。漬一宿。平旦。絞去滓。煮兩沸。頓服之。

小便出血。龍骨。細末之。溫水服方寸匕。日五六服。一云。酒服。

惡露瘡。搗薤菜傅瘡口。以大艾炷灸藥上。令熱氣入內。即差。

惡瘡。燒扁竹灰。和楮白汁。塗之。

又方。羊屎、麻根。燒煙斷。齊和封。有汁。乾傅。

惡瘡似火燃。白馬屎暴乾。以河水調。煮十沸。絞取汁。洗之。

身瘡頭瘡。莨菪末傅上。日三。夜二。

惡瘡十年不差。似癩。蛇脫皮一枚。燒末之。猪脂調傅。酷調。亦得。

又方。苦瓠一枚。咬咀。煮取汁。洗瘡口。日三。又煎以塗。辭甚良。皆先以泔。洗。三日。差。

又方。鹽湯洗。搗地黃葉貼之。

又方。燒猥猪屎。傅之。

又方。燒蓖麻子末。傅之。

諸瘡久不差。并六畜瘡。狼毒三升。水三斗。煮取一斗半。數洗。取愈。

代指。甘草二兩。咬咀。水五升。煮取一升半。漬之。若無。用芒硝代之。

又方。以唾調白礜砂。搜麪。作椀子。盛唾。著礜砂如棗大。以爪指着中。一日差。

又方。以毛雞黃土作泥。泥指上。令厚五分。內糠灰中煨。令熱可忍。泥乾易。數度。差。

又方。刺指。熱飯中二七徧。愈。

又方。以麻沸湯漬之。即愈。

又方。單煮地榆湯。漬之半日。差。

又方。先刮去臘血。炙魚鮮皮。令溫。以纏裹周匝。痛止。便愈。

又方。蜀椒四合。水一升。煮三沸。以漬之。

又方。取蒌黃莨菪。煮湯漬之。

指痛欲脫。猪脂和鹽煮令消。熱內其中。食久住。千金翼作和乾薑。

手足指擊痛。醬漬和蜜溫塗之。

又方。灸指端七壯。

手足指逆臘。此緣厠上搔頭。還坐厠上。以指倒搔二七下。即差。

凍指。馬屎三升。以水煮令沸。漬半日。愈。

人脚冬夏常拆裂。雞屎一升。水二升。煮數沸。停小冷。漬半日。差。亦用馬糞。

又方。羊膠。膠乾故帛貼上。

九漏成瘻。松脂末之。塡瘡孔令滿。日三四度。七日差。

又方。馬齒莧陰乾。臘月燭燼。等分。末之。以臘月猪脂調。先以暖泔淸洗瘡。拭乾傅之。日三。

又方。乾牛屎。乾人屎。搗。先幕縣于瘡上。縣上着屎。蟲聞屎香出。若瘡。即舉縣去之。更取縣着屎如前。蟲出盡乃至。

又方。苦瓠四枚。大如甖者。各穿一孔。如指大。置湯中。煮十數沸。取一竹筒長一尺。內一頭瓠孔中。一頭注瘡孔上。冷則易之。徧止。

又方。煮鹽花以麪擁病上。內鹽花麪匡中。厚二寸。其下。以桑葉三重藉鹽。候冷熱得所。可忍。冷則無益。熱則肉破。一日一度。候病根勢消。則止。若已瘡者。搗穀殼末。粉之。

又方。擣北陰白皮三十斤。剉之。以水一石煮。取一斗。去滓。煎如糖。又取都厠上雌雄鼠糞。各十四枚。燒令汁盡。末。內煎中。溫酒一升。投煎中。合攪之。鼠人五合。服之。當有蟲出。

漏作瘡孔。末。蜂房。臘月猪脂。調傅孔上。

瘡因風致腫。糜木根皮一斤。濃煮。入鹽一把。漬之。

灸瘡不差者。每日于上。別灸六七壯。自差。

灸瘡中風冷腫痛。但向火灸之。瘡得熱則瘡快。至痛止。日六七灸。愈。

諸漏。霜下瓠花。曝乾。末傅之。

又方。搗土瓜根。薄之。燥則易。不限時節。

又方。故布裹鹽如彈丸。燒令赤。末。酒服。

又方。服白馬屎汁一升。

又方。正月雄狐屎。陰乾。末之。水調服。

又方。鹽豉和。燒灰傅之。

又方。水研杏仁服之。

又方。猪脂一升。酒五合。煎沸。頓服之。

漏下。槐子燒末。酒服方寸匕。日三。立差。

一切冷瘻。燒人吐出蜘蛛爲末。先以甘草湯洗瘡。後着灰。厭不差者。愼口味。

鼠漏瘡差復發。以不經水猪脂。咬咀。生地黃。內脂中。令足相淹。和煎。六七沸。桑灰汁洗瘡。去惡汁。以此膏傅。日一易。

鼠漏腫。核未成膿。以柏葉着腫上。熬鹽着葉上。熨之。令熱氣下。即消。

蠮螉瘻。搗葉灰。先以泔淸煮搗葉。取汁。洗。拭乾。以灰內瘡中。

蜂瘻。瘡漸大者。熬鹽熨之。三宿。四日不差。至百日成瘻。其狀大如四五寸石。廣二寸。中生蜂作孔。乃有數百。以石硫黃鹽多少。然燭燒令汁出。着瘡孔中。須臾間見蜂數十。惟蜂盡。差。

又方。人屎。蛇脫灰。臘月猪膏。調傅之。

又方。蜂窠灰。臘月猪脂。調傅孔中。

瘰癧瘻。雄雞屎灰。臘月猪脂。調封之。

蜣蜋瘻。牛屎灰。和臘月猪脂。傅之。

又方。蜣蜋所推丸。末。傅之。

又方。乾牛屎末。傅瘻。則撥卻。更厚封。差止。

又方。熱牛屎。塗之。數數易。應有蜣蜋出。

蚯蚓瘻。蚯蚓屎。雞屎。末之。用社猪下頷腦。和傅之。

蝸瘻。五六孔相通者。搗茅根汁。着孔中。

蛇瘻。蛇脫皮灰。臘月猪脂。和封之。

顛鬻瘻。搗土瓜根。傅至差。愼口味。

雀瘻。取母猪屎灰。和臘月猪脂。傅瘡。蟲出如雀形。

鼈瘻。桃花末。和猪脂封之。佳。

石癰兩頭出。令人寒熱。搗槐子和井花水封之。

灸淋法。葶藶子二合。豉一升。搗令極熟。作餅。如大錢厚二分許。取一枚。當瘡孔上。作大艾炷如小指大。灸餅上。三炷一易。三餅九炷。隔三日復一灸之。如是頭瘡不可灸。葶藶氣入腦殺人。

又方。七月七日未出時。取麻花。五月五日取艾。等分。合搗作炷。用灸瘡上百壯。亦灸瘰癧。

九漏。灸肩井二百壯。

又方。灸鳩尾骨下。宛宛中。七十壯。

又方。遶四畔灸差。

諸惡瘡。中冷息肉。灸足內踝上三壯。二年六壯。

瘰癧。白蘞蠶。治下篩。服五分匕。日三。十日差。

又方。故鞋底替燒末。五匕。和酒一升。平旦向日服之。行須臾。吐鼠三。朝服。

又方。狼屎末。傅之。

又方。五月五日。取一切種種雜草。煮汁洗。

一切瘰癧。及觸處但有肉結癡。似作瘻及癰節者。以獨頭蒜。截兩頭。留心大。作艾炷。隨蒜大小。貼癰子上。灸之。勿令上破肉。但取熱而已。七壯一易。日日灸之。取消止。

瘻癧。灸兩髀裏。思癧處。宛宛中。日一壯。七日止。神驗。

又方。灸五里。人迎。各三十壯。

又方。灸背兩邊。腋下後文上。隨年壯。

又方。灸耳後髮際直脈上。七壯。

去面黯黯。皮鍊松脂為末。溫酒服三合。日三。服盡三升。無不差。

又方。白附子末。酒和傅之。即落。

脚氣腫已入。胜至小腹脹。小便澀。少取烏特牛尿一升。一服。日二。取消乃止。又云。羸瘦人二分尿。一分牛乳。合煮乳。結服。

口中瘡久不差。入胸中。並生瘡。三年已上。不差者。濃煎薔薇根汁。含之。又稍稍咽之。日三夜一。冬用根。夏用莖葉。

又方。角蒿灰傅之。一宿知。二宿差。有汁。吐不得咽也。

癬。搗蒜汁服之。又服地黃汁佳。又燒蛇脫一具。酒服。又服驢尿良。又搗裏荷根。蜜和傅之。一無根字。

又方。熱搗煎餅。不限多少日。一徧薄之良。

又方。醋煎艾塗之。

又搗羊蹄根。和乳塗之。

瘰。昆布二兩。洗切。如指大。酢漬。含咽汁盡。愈。

又方。海藻一斤。又云三兩。小麥麩一升。以三年酢一升。麩末。絞乾。往反酢盡。搗為散。酒服方寸匕。日三。忌努力。

瘰。上氣短氣。灸肺俞百壯。

瘰。上氣胸滿。灸雲門五十壯。

肉瘤勿治。治則殺人。又云。不得針灸。

陰類。取楊柳枝脚指大。長三尺。二十枚。水煮令極熟。以故布及氈掩腫處。取熱。柳枝更互柱之。如此取差。

浸淫瘡。以煎餅乘熱搨之。亦治瘮癬。

又方。猪牙車骨。年久者。椎破。燒令脂出。熱塗之。

又方。取苦練皮。或枝。燒作灰。傅。乾者。猪膏塗。并治小兒禿瘡。諸惡瘡。

瘮瘡。酢一升。溫令沸。以生薤一把。內酢中。封瘡上。差止。

又方。妙臘月糟薄之。

又方。燒故履系末。傅之。

又方。燒松根。取脂。塗之。

燥瘮瘡。酢和灰塗之。又熱牛尿塗之。

瘮疥瘡。瘙不可堪。羊蹄根。淨去土。細切。熟煮。以酢和。熟搗。淨洗瘡。傅上。一時間。以冷水洗之。日一。又陰乾作末。瘙時搔汁出。以粉之。又以生菰根。揩之。

又方。灸足大指奇間二七壯。灸大指頭。亦佳。

白殿。平旦以手掉取韭頭。擣塗之。極效。

痔第十七

痔。以蒲黃水服方寸匕。日三。良。又取桑耳作羹。空腹。飽食之。三日食。佳。

痔下血。及新產漏下。好磐石一兩。附子一兩。末之。白蜜丸如梧子大。酒服二丸。日三。稍加。不過數日。便斷。

百日服之。終身不發。一方。有乾薑一兩。

五痔。十年者。塗熊膽。取差止。一切方皆不及此神良。

又方。七月七日。多採槐子。熟搗。取汁。內銅器中。重罨密蓋。著宅中高門上。暴之。二十日已上。煎成。如鼠屎大。內穀道中。日三。亦主瘻及百種瘡。

又方。痔下血及新產漏下。常食萬竹葉。及煮羹粥。大佳。

又方。虎頭犀角末之如雞子大。和不經水猪脂大如雞子。塗瘡上取差。

五痔。取槐根煮洗之。

又方。取桃根煮洗之。

痔出膿血。有蟲。傍生孔竅。槐白皮一擣。到內釜中煮。令味極出。盛大盆中。適寒溫。坐其中。如浴狀。蟲悉出。冷又易之。不過二三。即差。

久冷五痔便血。灸脊中百壯。

五痔便血失屎。灸回氣百壯。穴在脊窮骨上。

肛出女萎一升。以器中燒。坐上熏之。即時入。

脫肛。蒲黃二兩。以猪脂和。傅肛上。內之。二三。愈。

腸隨肛出者。生栝蔞根。取粉。以猪脂爲膏。溫。塗。隨手抑按。自得縮入。

冷痢脫肛。枳實一枚。石上磨。令滑澁。鑽。安柄。蜜塗。炙令煖。熨之。冷。更易之。取縮入止。

又方。鐵精粉。內上。按令入。即愈。

又方。生鐵三斤。以水一斗煮。取五升。出鐵。以汁洗口。再。

因寒冷脫肛。灸臍中。隨年壯。

又灸橫骨百壯。

又方。灸龜尾七壯。即後窮骨是也。

千金寶要卷之六

千金論曰。上醫。醫未病之病。中醫。醫欲病之病。下醫。醫已病之病。患以謂知病于未病之前者。此上智之所能也。知病于欲病之初者。此中智之所及也。若夫已病而求醫。則常情同然。不必論其智不智也。孫氏曰。聖人設教。欲家家自學。人人自曉。尊親有疾。不能療之者。非忠孝也。斯言可謂切至矣。

氣不調。百病自生。乘病積聚。皆起于虛。又曰。虛生百病。藥石有相欺者。入人腹中。遂相鬬爭。力甚刀劍。言不知性氣者不可服也。凡服食藥餌。須量自己性理所宜。不可見彼得力。我便服之。人患瘡痍未瘳。不得合陰陽。

婦人妊娠。食羊肝。令子多厄。食山羊肉。令子多病。食驢肉。延月。食兎犬肉。令子無音聲。并缺唇。食騾肉。產難。食雞子及乾鯉魚。令子多瘡。食雉并鴨子。令子倒出。食雀肉并豆醬。令子面多黯黑子。食雀肉。飲酒。令子心淫惰亂。不畏廉恥。食鱉。令子短項。食冰漿。絕胎。多經大驚者。生子患顛。向非常地大小便。必半產。殺人。穢汚。死喪家人來看視產婦。則難產。傷兒。不依產圖。令子母多妨。產乳若在反支月者。浣濯水以澡盥。出此忌月方覆之。產婦人乘看。則難產。臨產憂惱。則難產。兒已生。不得自視。穢汚便利于懸廁之上。成十二瘡疾。產後百日內。勿行房。大忌上牀。只室中上盆。住。外月產臥。忌取涼。百日忌服轉瀉藥。月經不去。

大忌合陰陽。生十二疾。臥濕冷地。大忌合陰陽。生十二疾。以冷水洗浴合陰陽。生十二疾。小兒初生。不以鮮裹揩拭口中青泥惡血。則入腹。生百病。初生舉之遲。則中寒。臍帶。隔衣咬斷之。不得以刀子截。臍帶留至足跌。短則中寒下痢。斷臍後浴者。水入臍。令兒腹痛。臍帶中多有蟲。不去之。則入腹成疾。臍留六寸。長則傷肌。短則傷臍。臍不以時截。及授汁不盡。則寒生。臍風。兒生。男以父。女以母。故衣裹之。過厚。皮膚嫩血脈。發雜瘡而黃。新生兒衣暖大厚。令筋骨緩弱。解脫。兒臍。及換衣。如多月。須閉戶。生三日。朱蜜食多。則脾胃冷。腹脹。喜陰痢。氣急變噤。而乖。臍帶猶未愈。數洗浴。令兒悪陰。頹。兒太飽則吐。及風中臍。夏不去。熱乳。令兒嘔逆。多不去。寒乳。令兒欬痢。母新房。以乳兒。令兒羸瘦。變脛不能行。母有熱。以乳兒。令變黃不能食。母怒以乳兒。令喜驚發氣疝。又令上氣。顛狂。母新吐下。以乳兒。令兒虛羸。母醉以乳兒。令兒身熱。腹滿。乳兒當極按散其熱氣。勿令奔出。乳兒不得用宿乳。母欲寐。則不得乳兒。恐失飢飽。及填兒口鼻也。浴兒水不冷熱得所。則令兒驚。亦致五臟病。（兒多不可）兒多不可久浴。久浴則傷熱。數浴背冷。則發癇。小兒不浴。又令兒毛落。衣暖至汗出。卻外風入腹。為病。因驚怖大啼。多為病因。先不哺乳。吐而變熱者。為癇。新生無病。懼不可逆。針灸。衣甚薄。則乳食不消。大便酸臭。此欲為癖也。乳哺食節。作疾。新生一歲兒。外人來。氣息忤之。則為客忤。病。雖是家人。或別房異戶。從外還者。不避之。為客忤。雖是乳母。及父母。從外來。亦能令兒為客忤。一應親戚。及外來人。有衣服。經履鬼神。蠱魅。異氣。或牛馬之氣。并能令兒為客忤。一應人執作喘息。及乳母乳氣未定者。并能為客忤。乳母過醉。及房勞。喘。後。乳兒。最剛。能殺兒。凡諸乘馬行。得馬汗氣息。未盥洗。易衣裝。而便向兒邊者。令兒中馬客忤。一歲兒。勿見馬來。及聞馬鳴。驚。能令兒作客忤。兒衣。布帛。縑中。及履中。不得有頭髮。白衣。不得用青帶。青衣。不得用白帶。皆能為客忤。凡非常人。及諸物。從外來。亦驚小兒。致病。欲防之法。當將兒避之。若不避者。當燒牛屎。令常有煙氣。當戶前。則善。秋初夏末。晨夕暴冷。不避之。多患。胜熱下痢。小兒解着。傷風。亦作傷寒病。尋常晚夜。及陰雨夜。小兒衣物。不得在露地。有鈞星鬼。衙。喜落毛羽于人中庭。盜兒衣中。便令兒作癇病。必死。七八月。尤忌。兒生。未能行。而母再有娠。使兒飲此乳。作魃病。小兒飲食過度。不知自止。作疾。小兒夏月。積冷。洗浴過度。及乳母亦將冷水洗浴。以冷乳飲兒。兒壯熱。忽值暴雨涼。即令兒病痢等。夏月暴寒。小兒不避之。入胃則變病。中客忤。心腸脹滿刺痛。口噤。氣急停屍。卒死者。服張仲景備急丸。人失明之本。有十六件事。生食五辛。接熱飲食。熱食麪食。飲食不已。房室無節。極目遠視。數看日月。夜視星火。夜讀細書。月下看書。抄寫多年。雕鏤細作。博奕不休。久處煙火。泣淚過多。刺頭出血過多。又由馳騁田獵。冒涉風霜。迎風追獸。日夜不息之所致也。

地因寒暑風濕。皆作蒸氣。人足履之。謂之風毒。名為脚氣。婦人產後。尤宜慎此。四時之中。不得久立久坐。濕冷之地。令人作脚氣病。酒醉汗出。脫衣靴襪。當風取涼。皆成脚氣。患脚氣人。忌大怒。忌房室。忌牛羊肉

蒜。菽。菜。菰。菜。蓼。蓍。瓠子。酒。麪。酥。油。乳。酪。猪。雞。鵝。鴨。不得犯之。一方用鯉魚。外魚亦忌。又忌生果酸酢之食。宜食生牛乳。與生果子。及粳粱粟米。薯。芋。蓽。茇。蓽。茇。椒。蓽。橘皮。

病有三患。一患髖。狼。悉。傲。三患。狐。疑。不決。犯之多。枉傷性命。故曰法為信者施。不為疑者設。欲臨近亡人。宜將少金牙。散塗鼻孔耳門。及視疾者亦然。亦宜帶絳。一方寸匕。男左女右。

新食。畢取風者。令人患胃風。因醉取風者。令人患漏風。新沐浴。畢取風者。令人首風。新房室。畢取風者。令人患內風。尊貴人骨弱肌膚盛。因疲勞汗出。偃臥不時動搖。被微風所及。得血痺疾。凡常之日。忽然暴熱。頓取涼快意。生病亦然。暴寒亦然。

冬時嚴寒。最宜周密。若觸冒之者。為傷寒。四時之氣。皆能為病。其傷寒尤重。以其殺厲之氣故也。辛苦之人。春多患溫病。以冬時多觸冒寒冷所致。時行之氣。犯之多病。所謂時行之氣者。春時應暖而反大寒。夏時應熱而反大冷。秋時應涼而反大熱。冬時應寒而反大溫。凡熱病。大病。新差之後。食猪肉。及羊血。肥魚油膩等物。必大下痢。醫所不能治。食餅飯。棗。黍。飴。哺。餳。炙。蕈。果。諸果物。脚。脛。及堅實難消之物。胃氣尚虛弱。不能消化。必更結熱。下之則大痢難禁。不下之必死。下之復危。皆難治也。不可不慎。但得食糜粥。寧少食。令飢。勿飽。不得他有所食。引日轉久。可漸食羊肉白糜。若羹汁。雉。兔。鹿肉。不可食猪狗肉。當靜臥。勿早起。梳頭洗面。非但不可體勞。雖言語亦不得多。亦不得生心用意煩勞。凡上氣非。並令人勞復。女勞當舌吐數寸而死。凡差未滿百日。氣力未平復。而以房室者。略無不死。未滿五日。食一切肉麪。病更發。大困。食生魚鮮。下痢必不止。食生菜。令人顏色。終身不平復。病新汗解。飲冷水者。損心胞。令人血。補不復。食生棗及羊肉者。必腸上作熱。蒸食犬羊等肉者。骨中蒸熱。食魚肉與瓜生菜。令人身熱。食鱠者。病發必大困。早起勞多。及美飲食過多。致發欲死。

穀疸者。由失飢大食。胃氣衝熏所致。酒疸者。由大醉當風。入水所致。女勞疸者。由大勞大熱。而交接。畢入水所致。黃疸。有人以竹筒。使人極吹。病人鼻中者。無不死。大慎之。

夏傷暑。至秋作瘧。冬中于風寒氣。藏于骨髓中。至暑有所用力。腠理開。又中邪氣。能作瘧。肺有熱。因有所作。用力。腠理開。能令作瘧。

交接損。令人卵縮筋緩。

食生物。令蟲卵生。入腹者。成蟲蛆。及魚鱉。勞倦。或飲食過當。作吐血。

服藥吐利後。常須閉口少語。于無風處。溫牀暖食將息。

凡人執作。汗出當風。因以房室。過度醉飲。飽滿行事。令心氣逼迫。短氣。脈悸。得風癲病。

熱沐髮而濕結之。腦汗未止。得濕癲病。

因大驚。及當風。從高墜下。致喜悲。善恐怖。如有鬼物患。

有所鑿仆若醉飽入房汗出當風則必傷脾。

凡患痢服止藥初出痢須轉劇恐人不能便不服其藥此誤也但服不過再三服之痢病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪酥乾脯醬粉鹽所食諸食皆須大熟爛爲佳亦不得傷飽。

凡疳鹽醬酢酥油麋皆忌惟白飯豉苜蓿苦苣蕪荑不在禁限。

凡日月蝕時忌食飲腹中生蠱蟲及房室生子不具足必患月蝕瘡日月蝕不得與兒乳日月生後乃不忌令人口臭齒齗宣露常有血出吞上生瘡。

飲酒當風入肺膀氣妄泄即令人目背氣喘酒客勞倦當風喜怒氣含于肺面目黃腫即頭眩欬逆上氣時忽忽欲絕心下弦急不能飲食或吐膿血胸痛引背支滿欲嘔。

七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣此七種氣積聚堅大如杯若拌在心腹中疾痛不能飲食時來時去每發欲死如有禍祟。

尸疰鬼疰者即五尸之中尸疰也又挾諸鬼邪爲害者也其大略令人寒熱淋瀝沉沉嚖嚖不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至于死死後復注易傍人乃至滅門覺如此候宜急療之。

人有九蟲其蟲凶惡人之極患也常以白莖草沐浴佳椒葉皆可用既是香草又尸蟲所惡也凡服補藥及治諸病皆須先去諸蟲并痰飲宿癖醒醒除盡不爾必不得藥力脾勞熱有蟲在脾中令人好嘔肺勞熱生蟲在肺腎勞熱四肢腫急有蟲曰蟯蟲如菜中蟲在腎人得傷寒及天行熱病腹中有熱及人食少腸胃空虛若齒齗無色舌上蓋白甚者唇裏有瘡四肢沉重忽忽喜眠當數看其上唇內有瘡唾血唇內如粟瘡者心內懊憹痛悶者此有三蟲在上蝕其五臟下唇內生瘡者其人喜眠此蟲在下蝕其下部人不能知可服蝕蟲藥不爾當蟲殺人熱病蛣蝨令人喜寐不知痛處而面赤如醉下利膿血當數視其人下部大小之孔稷稷然亦則是蠱蟲也劇能殺人。

若有所用力舉重若入房過度汗出如浴水則傷腎人因身勞汗出衣裏冷濕久而得腎著之病身體重腰以下如帶五千錢腰中冷如冰又其人本來不吃忽然遂吃而好嗔恚反常性此腎之傷也取寒眠地臥冷濕地氣所傷則腰痛墜墮傷腰則腰痛房室後用則腰痛肝傷善夢心傷善忘脾傷善飲肺傷善瘖腎傷善唾骨傷善飢肺傷善嗽遠思強慮傷人憂悲悲哀傷人喜樂過度傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人戚戚所患傷人寒暄失所傷人。

五勞七傷有小腹急痛膀胱虛滿手足逆冷食飲苦吐酸痰嘔逆泄下少氣目眩耳聾口焦小便自利者。

虛損少氣腹脹內急拘引小腹至冷不得屈伸不能飲食寒熱頭痛手足逆冷大小便難或復下痢口乾。

夢中泄精或時吐逆恍惚面色枯瘁又復微腫百節酸疼者。

五勞七傷虛羸不足面色黎黑手足疼痛久立腰疼起則目眩腹中雷鳴急而口絕傷外引四肢者。

虛勞寒口飲在脇下決決有聲飲已如從一邊下決決然也有頭並衝皮起引兩乳內痛裏急善夢失精氣短目眩眩忽忽多忘者。

五勞七傷小腹急臍下膨亨兩脇脹滿腰脊相引鼻口乾燥目眩眩憒憒不樂胸中氣急逆不下飲食堂中策痛小便黃赤尿有餘瀝夢與鬼神交通去精甚恐虛乏者。

凡男女有因積勞損或大病後不復常苦四體沉滯骨肉酸疼吸吸少氣行動喘悸或小腹拘急腰背強痛心中虛悸咽乾唇燥面體少色或飲食無味陰陽虛弱悲憂慘戚多臥少起者。

有大勞虛劣寒熱嘔逆下焦虛熱小便赤痛客熱上蒸頭痛目疼骨肉痛口乾者。

有虛勞不足四肢煩疼不欲食食則脹汗出者。

有虛勞少氣胸心淡冷時時驚惕心中悸動手脚逆冷體常自汗腸鳴風濕者。

有虛勞損羸乏欬逆短氣四肢煩疼腰背引痛耳鳴面黎黑骨間熱小便赤黃心悸目眩者。

有大虛不足小便數嘘吸焦燥引飲膀胱滿急者。

有左脇氣衝脇上滿頭上有風如蟲行手足漬痺鼻塞脚轉筋兩目時腫痛者。

有虛損短氣咽喉凝唾不出如膠塞咽喉者。

有五勞六絕其心傷者令人善驚妄怒無常者。

有五勞六絕其脾傷者令人腹滿喜噫食竟欲臥面目痿黃者。

有五勞六絕其肺傷者令人少精腰骨痛四肢厥逆者。

有五勞六絕其肝傷者令人少血面黑者。

有五勞六絕其腎傷者有積聚少腹腰背滿痺欬唾小便難者。

六絕之爲病皆起于大勞脉虛外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷者。

有五勞六絕腹中雷鳴時時泄痢者。

有五勞六絕或閉或痢面目腫心下憒憒不欲語惚聞人聲者。

有五勞七傷八風十二痺無有冬夏悲憂憔悴者凡是病皆須服之者。

有虛勞百損者。

有五勞六極七傷虛損者。

男子女人虛損傷絕頭目眩骨節煩痛飲食微少羸瘦百病者。

有虛勞腎氣不足腰痛陰痿小便數驚冷濕尿有餘瀝精自出陰痿不起忽忽悲喜者。

有五勞七傷六極強力行事舉重重病後骨髓未滿而行房室所食不消胃氣不平者。

有五勞七傷每舉不如意者。

有陰下濕癢，汗出，或生瘡，莖中痛者。
有溺血者。
有膀胱冷，欬唾有血，喉鳴喘息者。
有膀胱腎冷，坐起欲倒，目眩，氣不足，骨痠者。
有膀胱寒，小便數，漏精稠厚如白米泔者。
有胞屈僻，津液不通者。
有尿白濁者。
有胞轉者。
有上焦熱，腹滿而不欲飲食，或食先吐而後下，肘攣痛者。
有上焦欲食下胃，汗出面背，身中皆發熱者。
有上焦冷，下痢，腹內不安，食好注下者。
有上焦閉塞，乾嘔，噦而不出，熱少冷多，好吐白沫，青涎，吞酸者。
有中焦實熱閉塞，上下不通，隔絕關格，不吐不下，腹滿澎澎喘急者。
有中焦熱，水穀下痢者。

有中焦寒，洞泄下痢，或因宿亂後，瀉黃白，無度，腹中虛痛者。
有下焦熱，大小便不通者。
有下焦熱，或下痢濃血，煩悶恍惚者。
有下焦熱，毒痢，魚腦雜痢，赤白，臍下小腹絞痛，不可忍，欲痢不出者。
有膀胱三焦津液不下，大小腸中寒熱，赤白泄痢，及腰脊痛，小便不利，及婦人帶下者，有下焦虛寒，津液不止，短氣欲絕者。
有下焦虛寒損，或見血後便轉，此為亡血，或利或不利。
有下焦虛寒損，或先便轉，後見血，此為遠血，或利或不利，好因勞冷而發者。
有三焦虛損，或上下發泄，吐唾血，皆從三焦起，或熱損發，或因酒發者。
有手足厥冷，脈絕者。
有下焦虛寒損，腹中瘀血，令人喜悲，不欲聞人語，胸中噎塞而短氣者。
有吐下汗出，而小便復利，或下利清穀，裏外熱，脈微欲絕，或發熱惡寒者。
凡霍亂，務在溫和將息，若冷則逼體轉筋，此病定一日不食為佳，仍須三日，少少喫粥，三日已後，可依常食息，七日勿雜食為佳，所以發脾氣也。

有霍亂吐下服滿，食不消，心腹痛者。
有霍亂吐利止，而身體痛不休者。
有霍亂轉筋，血冷，汗出，嘔吐者。
有霍亂吐利已斷，汗出而厥，四肢拘急不解，脈微欲絕者。
有霍亂已服理中四順，熱不解者。
有婦人霍亂，嘔逆，吐涎沫者，慎不可下。
有年老霍亂，羸劣，冷柔，惡心，食飲不化，心腹虛滿，拘急短氣，嘔逆，四肢厥冷，心煩氣悶而須汗者。
有毒冷霍亂，吐利煩嘔，轉筋，肉冷，汗出，手足指甲，唇悉，唾死絕，語音不出者。
有霍亂蠱，宿食不消，積冷，心腹煩滿，鬼氣者。
有霍亂，洞下不止者。
有霍亂引飲，飲輒乾嘔者。
有先服石人，因霍亂吐下，服諸熱藥，吐不得止，因即變虛，心煩，手足熱，口乾燥，欲得水，嘔逆迷悶，脈急數者。
有時行熱病後，毒未盡，因霍亂吐下，仍發熱，心煩欲裂者。

有霍亂，皆因飲食，非關鬼神，因飽食臛膾，復餐乳酪，海陸百品，無所不噉，眠臥冷席，多飲寒漿，胃中諸食結而不消，所致，思謂此說止為貴者言，若貧下此症，亦以瓜李生冷不慎，致然。
霍亂人，忌與米飲，胃中得米，即吐不止，但與厚朴葛根飲，若冬瓜葉飲，但沾漬咽喉，而不可多與，若服湯時，隨服吐者，俟吐定乃止，診脈絕不通，以桂合葛根，為吐下，心煩肉熱，汗不出，不轉筋，脈急數者，可犀角合葛根為飲，吐下不止，發熱心煩，欲飲水，可少飲米粉汁為佳，若不止，可與葛根薔薇飲服之。
婦人霍亂，嘔吐者。
霍亂四逆，吐少嘔多者。
霍亂久，將遠行預備者。
霍亂，永不發丸者。
中熱霍亂，暴利心煩，脈數，欲得冷水者。
陰陽二氣，擁而反昊，陽氣欲升，陰氣欲降，陰陽乖隔，變成吐利，頭痛如破，百節如解，遍體諸筋皆為回轉。論症雖小，卒病之中，最為可畏，雖臨深履危，不足以喻之。
人生放恣者，乘盛壯之時，不自慎惜，快情縱慾，極意房中，稍至年長，腎氣虛竭，百病滋生，時服石散，真氣既盡，石氣孤立，惟有虛耗，唇口乾焦，精液自洩，或小便赤黃，大便乾澀，所食之物，皆化作小便，此皆由房

室不節之所致也。

熱結中焦則爲堅。

下焦熱則爲溺血。令人淋閉不通。

氣淋之爲病。溺難澀。常有餘瀝。

石淋之爲病。痠中痛。溺不得出。

膏淋之爲病。尿似膏自出。

勞淋之爲病。勞倦即發。痛引氣衝下。

熱淋之爲病。熱即發。甚則尿血。

下焦結熱。小便赤黃不利。數起出少。痠痛。或血出。溫病後餘熱。及霍亂後當風。取熱。過度。飲酒房勞。及行步冒熱冷飲。逐熱。熱結下焦作淋。及散石熱動關格。小腹堅。胞脹如斗。諸有此淋。悉治之立驗。

錄忌如左

麋孝。　產乳。　音樂。　一切魚。　一切肉。

諠戲。　房室。　酢滑。　生冷。　蒜。

粘食。　米豆。　油膩。

右並忌不得食及不得用心。其不禁者。並具本方之下。再發。若不爾。若雖差復發。復發不可治。

婦人產後。飲水不即消。三焦決漏。小便不利。仍相結。漸漸生漿。遂流諸經絡。故也。

忌腹上出水。出水者一月死。大忌之。

第一唇黑。傷肝。

第二缺盆平。傷心。

第三臍出。傷脾。

第四背平。傷肺。

第五足下平滿。傷腎。熱結爲淋者。

人氣急。積久不差。成水病者。

有患水腫細。腹堅如石。小勞苦。足脛腫。小飲食。便氣急。此終身疾。不差。服丹參。亦可愈。

酒客有虛熱。當風飲冷水。腹脹。陰復脹滿者。

水病有通身洪腫者。流腫者。百藥治不差。而欲死者。有大腫。眼合不欲開。短氣欲絕者。

男子女人新久腫。得暴風入腹者。

婦人新產上廁。風入臍腹中。如馬鞭者。嘘吸短氣。欬嗽者。

省藥萬病丸

牛黃。麝香。犀角。一方云。一錢。今各一分。桑白皮。茯苓。乾薑。桂心。當歸。芎藭。芍藥。甘遂。黃芩。蜀椒。細辛。桔梗。巴豆。前胡。紫菀。蒲黃。葶藶。防風。各一分。蜈蚣。三節。石蜥蜴。人參。一寸。朱砂。雄黃。黃連。大戟。芫花。禹餘糧。芫青。七枚。

右三十一味。並令精細。牛黃。麝香。犀角。朱砂。雄黃。禹餘糧。巴豆。別研。餘者。合搗。重絹下篩。以白蜜和。更搗三千杵。密封下。破除日平旦空腹。酒服三丸。如梧子大。取微下。三升惡水。爲良。若卒暴病。不拘平旦早晚皆可服。但以吐利爲度。若不吐利。更加一丸。或至三丸。五丸。須吐利爲度。不得限丸數。病強藥少。即不吐利。更非他故。若其發遲。以熱飲汁投之。若吐利不止。即以醋飯三兩口。止之。服藥忌陳臭。生冷。醋滑。粘食。大蒜。猪雞。魚狗。牛馬驢肉。白酒。行房。七日外始得。一日服二日補之。得食新米韭。骨汁作羹粥臛食之。三四頓。大良。亦不得全飽。產婦勿服。吐利以後。常須閉口少語。于無風處溫牀暖室。將息。若旅行卒暴無飲。以小水送之爲佳。若一歲以下小兒有疾者。令乳母服兩小豆。亦以吐利爲度。近病及卒病。皆用。多積久疾病即少服。常取微泄利爲度。崔氏無黃芩。桑白皮。桔梗。防風。爲二十七味。

萬病丸。治症開錄如左。

卒病欲死

蠱毒吐血腹痛如刺。

卒中惡口噤

五疰鬼刺客忤

猫鬼□□□

瘧病未發前一日

諸有病欲

患冷癖

宿食不消

癥瘕積聚

拘急。心腹脹滿。心痛。

上氣喘逆。胸滿不得臥。

傷寒時行

大病

疳瘧

水病
頭痛惡寒
小便不通
大便不通
耳聾聤耳
鼻衄
癰腫
疔腫
犯疔腫血出
胸背腰脇腫
癲癇用萬病丸傅之。
瘧瘧
痔瘡
冷瘧積年不差者。
癰瘡
惡刺
蝮蛇螫
蝎螫
蜂螫
婦人諸疾胎衣不下。
小兒客忤
小兒驚癇
小兒乳不消心腹脹滿。

仙人玉壺丸
雄黃　藜蘆　丹砂　礬石一作礬石　巴豆　八角附子各二兩
右六味。先搗巴豆三千杵。次內礬石。又搗三千杵。次內藜蘆三千杵。次內附子三千杵。次內雄黃三千杵。次內丹砂三千杵。內蜜。又搗萬杵。若不用丹砂。內珍珠四兩。無在每內藥。輒治五百杵。內少蜜。恐藥飛揚。治藥用王相吉日良時。童子齋戒。焙良天晴明日無雲霧。白瓷器成。封密器中。勿泄氣。著淨潔處。大人服丸如小豆。欲下病者。宿勿食。平旦服二丸。不知者。以粥飲發之。令下。下膈下利。或但噫氣即已。若欲漸除。及將服消病者。如麻子大三丸。卒中強開口灌喉中。鬼疰病百種不可名。漿水服二丸。日再。

玉壺丸治症開錄如左。
男女與鬼交通。歐哭無常。
腹中若有蟲欲鑽脇出狀。急痛一止一作。
憂悲氣結在胸。心若逆噎。及欬。胸中刺痛。
心腹切痛。及心中熱。
癖飲。痰飲。
諸疝
卒上氣。氣但出不入。并逆氣衝喉。胷中暴積聚。
癥結。堅痞。
積寒。熱痞。
食肉不消。腹堅脹。
腹中三蟲
下痢重者
卒關格不得大小便。欲死。
瘧已發未發。
卒霍亂心腹痛。煩滿。吐下。手足逆冷。并寒熱往來。
傷寒救濟。時氣熱病。
淋瀝。疲瘦。百節酸疼。
頭卒風腫
癰疽瘡瘍。及欲作瘡。
風瘙
中水毒
齒痛
耳聾。鼻血汁出。及卒聾。
風目赤或瘙。視物漠漠。淚出爛。

中蠱毒，吐血，腹內如刺。
中蛇蝮諸毒
獗犬所咋
狂馬所咋
婦人產後餘疾，及月水不通，往來不時。
婦人胸中苦滯，氣息不利，小腹堅急，繞臍絞痛。
小兒百病，驚癎痞塞，及有熱。
小兒大腹，及中熱惡毒，食物不化，結成積聚。
小兒寒熱頭痛，呼熱，及吐哯。
小兒羸瘦，丁奚，不能食，食不化。
欲問人孝，省人病，先服之，及繫頭上。
頭上繫玉壺丸，辟百鬼。
獨宿山澤，冢墓，廟社，叢林之中，燒一丸，百鬼走去。以蠟和一丸，如彈丸，著絳囊，繫臂，男左女右。山精鬼魅皆畏之。

服金石藥爲服石。
度者，捉也。
濟者，沒也。
和者，調也。
傅者，塗也。
暴者，曬也。
㕮咀者，粗細切也。
三兩者，今之一兩。
三升者，今之一升。
方寸匕者，正方一寸，散子以不落爲度。
錢匕者，五銖銅錢上全抄也。
錢五匕者，今五銖錢邊五字者，以抄之，令不落爲度。
半錢匕者，一錢抄取一邊。
梧桐子大者，以二大豆準之。
刀圭者，如梧桐子大。
一撮者，四刀圭。
如彈丸，如雞子者，十梧桐子準之。
一升者，取平升爲正。
一把者，二兩。
草一束者，三兩。
桂　尺者，削去皮半兩。
甘草一尺者，二兩。
蜜一斤者，有七合。
猪脂一斤者，二升二合。
半夏一升者，洗最五兩。
椒一升者，三兩。
吳茱萸一升者，五兩。
菟絲子一升者，九兩。

千金須知
中惡，驚，爲陰黮。
緩縱爲痱。
淋爲癃。
黃爲萉。
強直爲痓。
喘嗽爲欬逆。
隔氣爲淳盲。
熱死爲喝。
征忡爲悸。
利爲滑下。
臟毒爲痢之蠱毒。
腸風爲腸滑下血。
噦逆爲噦逆。

蓽茇子一升者四兩。
蛇牀子一升者三兩半。
地膚子一升者四兩。
巴豆以枚計者去皮心二分準豆六枚。
附子烏頭以枚計者去皮半兩準二枚。
枳實以枚計者去穰二分準二枚。
棗三枚準一兩。
生薑一塊半兩。

此書初得華州石刻，舛譌最多，繼得華州木刻及蜀中及郭武定木刻，其譌猶華之石刻也，其門類錯亂者，茲皆類明，拾遺一段，茲皆附之各類，小兒兩類，併而爲一，爲其便于檢閱也，其間有字句之譌，可以意會者，乃敢更之，中有文字高古不能讀者，不敢輒易，乃仍從焉，自千金論起，至若有所舉面段止，似欲人知所避忌也，自五勞七傷有小腹急痛起，至婦人新產上廂段止，既無治法，又無令人避忌之意，自五勞段，數至第二十二段，中有凡是病者，皆須服之之句，後淋閉論末，又云悉服之立驗，或亦萬病玉壺，各有所主也，因併及之。

委官李海立　生員謝沽書　鍛刻鄭鳳皐刻

蘇沈良方

撰括沈 軾蘇

蘇沈良方。宋蘇軾沈括二人所集方書也。括博學善文。史稱其於醫藥卜算無所不通。皆有所論著。其見於宋藝文志者。有靈苑方二十卷。良方十卷。而別出蘇沈良方十五卷。注云沈括蘇軾所著。今考陳振孫書錄解題。有蘇沈良方。而無沈存中良方。尤袤遂初堂書目亦同。晁公武讀書志則二書並列。而于沈存中良方下云。或以蘇子瞻論醫藥雜說附之。蘇沈良方下亦云。括集得效方。成一書。後人附益以蘇軾醫藥雜說。所言二書體例。約略相似。而永樂大典又載有蘇沈良方原序一篇。亦括一人所作。且自言予所著良方云云。當即存中良方之序。疑此書即括原本。後人以蘇軾所編方書附入其間。而別題此名者耳。案明晁瑮寶文堂書目有蘇沈二內翰良方一部。是正嘉以前。傳本未絕。其後不知何時散佚。今據永樂大典所載。掇拾編次。蓋為八卷。宋世士大夫類通醫理。而軾與括尤博洽多聞。其所徵引。于病證治驗。皆詳著其狀。確鑿可據。其中如蘇合香丸、至寶丹、鐵石丸、椒朴丸等類。已為世所常用。至今神效。即有奇祕之方。世不恆見者。亦無不精妙絕倫。足資利濟。洵為有用之書。固不僅以其人傳也。

原序

予嘗論治病有五難。辨疾、治疾、飲藥、處方、別藥、此五也。今之視疾者。惟候氣口六脈而已。古之人視疾。必審其聲音顏色舉動、腠理情性嗜好。問其所為。致其所行。已得其大半。而又徧診人迎氣口十二動脈。疾發于五臟。則五色為之應。五聲為之變。五味為之偏。十二脈為之動。求之如此其詳。然而猶懼失之。此辨疾之難一也。今之治疾者。以一二藥。審其服餌之節。授之而已。古之治疾者。先知陰陽運歷之變。故山林川澤之氣發。而又視其人老少肥瘠貴賤居養。性術好惡。變喜勞逸。順其所宜。逆其所不宜。或藥或火。或刺或砭。或湯或液。燔易其故常。捭闔其性理。搖而索之。投幾順變。間不容髮。而又調其衣服。理其飲食。異其居處。因其情變。或治以天。或治以人。五運六氣。冬寒夏暑。陽雨屯蒙。鬼靈脈蠱。甘苦寒溫之節。後先勝復之用。此天理也。盛衰強弱。五臟異稟。循其所同。督其所偏。不以此形彼。亦不以一人例衆人。此人事也。言不能傳之于書。亦不能喻之于口。其精過于承蜩。其察甚于刻鏤。目不捨色。耳不捨聲。手不釋脈。猶懼其差也。授藥遂去。而希其十全。不其難哉。此治疾之難二也。古之飲藥者。煮煉有節。飲藥有宜。藥有可以久煮。有不可以久煮者。有宜熾火。有宜溫火者。此煮煉之節也。宜溫宜寒。或緩或速。或雜飲食喜怒。而飲食喜怒為用者。有遂飲食喜怒。而飲食喜怒為敵者。此飲藥之宜也。而水泉有美惡。操藥之人有勤惰。如此而責藥之不效者。非藥之罪也。此服藥之難三也。藥之單用為易知。藥之複用為難知。世之處方者。以

一藥爲不足。又以衆藥益之。殊不知藥之有相使者。相反者。有相合而性易者。方書雖有使佐畏惡之性。而古人所未言。人情所不測者。庸可盡哉。如酒于人。有飲之踰石而不亂者。有濡吻則顛眩者。漆之于人。有終日摶漉而無害者。有觸之則瘡爛者。焉知藥之于人。無似此之異者。此稟賦之異也。南人食猪魚以生。北人食猪魚以病。此風氣之異也。水銀得硫黃而赤如丹。得鍛石而白如雪。人之欲酸者。無過于醋矣。以醋爲未足。又益之以橙。二酸相濟。宜其甚酸。而反甘。巴豆善利也。以巴豆之利爲未足。而又益之以大黃。則其利反折。蟹與柿。嘗食之而無害也。二物相遇。不旋踵而嘔。此色爲易見。味爲易知。而嘔利爲大變。故人人知之。至于相合而犯他藏致他疾者。庸可易知耶。如乳石之忌參朮。觸者多死。至于五石散。則皆用參朮。此古人處方之妙。而世或未喻也。此處方之難四也。醫誠難也。方誠難也。用之中節也。而藥或非良。奈何哉。橘過江而爲枳。麥得濕而爲蛾。雞踰嶺而黑。鸜鵒踰嶺而白。月虧而蚌蛤消。露下而蚊蝱斥。此形器之易知者也。性豈獨不然乎。予觀越人惡茶。畦稻。一溝一隴之異。遠不能數步。則色味頓殊。況藥之所生。秦越燕楚之相遠。而又有山澤膏瘠燥濕之異。稟。豈能物物盡其所宜。又素問說。陽明在天。則花實戕氣。少陽在泉。則金石失理。如此之論。採掇者固未嘗斷也。抑又取之有早晚。藏之有焙暴。風雨燥濕。動有槁暴。今之處藥。或有惡火者。必日之而後咀。然安知採藏之家。不常烘煜哉。又不能必。此辨藥之難五也。此五者大概而已。其微至于言不能宜。其詳至于書不能載。豈庸庸之人而可以易言醫哉。予治方最久。有方之良者輒爲疏之。世之爲方者。稱其治效。常喜過實。千金肘後之類。尤多溢言。使人不復敢信。予所謂良方者。必目覩其驗。始著于篇。聞不預也。然人之疾。如向所謂五難者。方豈能必良哉。一覩其驗。即謂之良。殆不異乎刻舟以求遺劍者。予所以詳著其狀于方尾。疾有相似者。庶幾偶值云爾。篇無次序。隨得隨註。隨以與人。拯道貴速。故不暇待完也。沈括序。

蘇沈良方目錄

卷一

鍊丹砂法　穀子煎法
陽丹訣　陰丹訣
記松丹砂說

卷二

治風氣四神丹　四味天麻煎方
左經丸　燒肝散
烏荊丸　天麻煎丸
養肝散　烏頭煎丸方二
辰砂散　諸風上攻頭痛方
四生散

卷三

聖散子方　小柴胡湯
服茯苓餌　木香散
秋石方　伊祁丸
服威靈仙法
通關散
側子散
麻黃丸

治暴喝悶絕方
加減理中丸
紫金丹
金液丹
木香丸
五積散
七氣散
枳殼湯
順元散
發熱法

卷四

治消渴方
黑神丸
進食散
椒朴丸
烏頭散
槐花散
酒磨丸
木香散
神保丸
壓氣散
無礙丸
茱萸丸
紫粉丸
硇砂煎丸 附法四方
小建中湯
訶子丸
陰陽二聖散
治噎方
軟紅丸

卷五

桂香散
礞石丸
治腹中氣塊方
明月丹
何首烏散
羌活散
翻珠丹
引氣丹
褐丸
梔子湯
火角法
經效阿膠方
治肺喘方
至寶丹
沈麝丸
神聖香霜散
蘇合香丸
丸寶散
灸咳逆法
硃砂膏

卷六

四神散
龍膽丸
治諸目疾法
治眼齒論
硫黃丸
刺蒺散
灸牙疼法
逐氣散
倉卒散
千緡湯
治內障眼方
點眼熊膽膏
鯉鳩丸
葫蘆巴散
治鼻衄不止欲絕方三
服松脂法
二蠶散
斷弓弦散
白雪丸
遊晴神明酒
縣實散
偏頭痛方
治鼻齆
綠雲膏
水氣腫滿法
川楝散
治小便數方

治小便不通方
暴下方
芎藭散
健脾散
療寸白蟲方
茯苓散
治濕痺方
療痢血方
濕痺腹痛方

卷七

小還丹
白礬
雲母膏
治瘡瘡不遠方
地骨散
火府丹
治陰瘡二方
治甲疽方
筋斷須續法
火燒瘡方
作葉湯 附傳藥方
治癰疽方
治疽發背方
柴胡湯二方
治瘰方
療久瘡方
治癬方
續骨丸
治骨鯁簽刺喉中法
毒蛇僞方
麥煎散
大黃散
黑神丸
小黑膏
辰砂丸
牛黃煎
小硃砂丸
治小兒熱嗽
療血毒癰疽法
治癰疽久不合方
小硃散 附法藥方
祛風丸
治遠年臁瘡方
治瘡疥方
繁瘤法
神授散
治諸鯁方
白芷散
澤蘭散
青金丹
治痘瘡法
走馬牙瘡方
吳婆散
妙香丸
治小兒瘡肥瘡
香薷散
四神散
椿根散
治腸痔下血法

蘇沈良方卷一

宋 蘇軾 沈括 著

鍊丹砂法

王倪丹砂無所不主。尤補生益精血、愈痰疾、壯筋骨、久服不死。王倪者、丞相遐十二代孫。文明九年、爲淪州無棣令。有桑門善相人、知其死期無不驗。見倪曰、公死明年正月乙卯。倪以爲妄。因之復令驗邑人。其言死者數千皆信。倪乃出桑門謝之。且爲死計。忽有人不言姓名、謂倪曰、知公憂死。我有藥可以不死。公能從我授乎。倪再拜稱幸。乃出鍊丹砂法授之。倪餌之。過明年正月、乃復召桑門視之。桑門駭曰、公必遇神藥。而有異色。且不死。開元元年、倪妻之弟亦遇異人。授以杏丹法曰、吾聞王倪能鍊丹砂。頗以此易之。倪以杏丹賜其子弁。而倪與授杏丹者後皆仙去。刺史李休光表聞。賜其第爲道觀。開元十二年、上東封太山。拜弁左散騎常侍。隱遁不知所終。此舊傳也。

光明辰砂二十八兩、甘草 遠志去心 檳榔 訶黎勒皮各二大兩、壁洲 紫肉桂八大兩、桂一中、智鍊丹砂時拍碎、再復搗。

右廿草等四味、剉、以水二大斗、【案】此下疑有脫字。後用細布囊、盛丹砂、懸于釜中、著水和藥、挾火煮之。第一日、晝夜用陰火、水紋動。第二日、晝夜用陽火、魚眼沸。第三日、晝夜用木火、動花沫沸。第四日、晝夜用火火、汩汩沸。第五日、晝夜用土火、微微沸。第六日、晝夜用金火、乍緩乍急沸。第七日、晝夜用水火、緩調調沸。先期泥二釜、常緩水周添水煮藥。釜水酒、即添。煖水、常令不減二斗。七日滿、即出丹砂于銀盒中蒸。其盒中布肉桂一兩、拍碎、即匀布丹砂。又以餘桂一兩覆之、即下盒。置甑中、先布糯米、厚三寸、乃置盒。又以糯米擁覆上、亦令上米厚三寸許。桑薪火蒸之。每五日換米換桂。其甑蔽可用完竹子爲之。不爾蒸久甑墮、下釜中也。甑下側開一小孔。常煖水用小竹子注添釜中、勿令水減。第一五日、晝夜用春火、如常炊飯。第二五日、晝夜用夏火、猛于炊飯。第三五日、晝夜用秋火、似炊飯乍緩乍急。第四五日、晝夜用冬火、緩于炊飯。依五行相生、用文武火助之。藥成、即出丹砂、以玉槌力士鉢中研之。當下稀如麪、即可服之。以穀子煎丸如桐子大。每日食上服一丸。每日三食、服三丸。非頓服三丸。鍊成丹砂二十兩爲一月劑。二年服盡、盡後每十年、即鍊服三兩。仍取正月一日起、服一月使盡。既須每十年三兩、不可旋合。當宜預鍊。取一劑藏貯、隨時服之。其硃砂須是上等丹砂。【案】文云、二十兩爲一月劑。二年服盡、則合自正月一日起、服至三十日止。當日服三錢三分有零。計十年應鍊服一百兩。乃合前二年之數。文又云、盡後每十年即鍊服三兩、仍取正月一日起、服一月使盡、則又是每日止服一丹矣。多少太相懸絕。蓋兩每十年、十字疑是一字之誤。餘文亦有錯脫。又案病方云、辰砂二十八兩、此云二十兩。文亦互異。豈多經裏鍊、蓋能變輕然耶。

穀子煎法

取赤穀子、熟時絞汁、煎如稠餳、可用和丹砂。如無穀子、穀皮亦得。凡服丹砂、忌一切魚肉、陳宿生冷、蒜、尤忌生血物及見血穢。江陰葛侍郎中年病足幾廢、久治不瘥。得此服、遂愈。而輕健過于少時。年八十歲、飲啖視聽不衰。實此方未嘗傳人。予治平中、咸足病、萬端求得之。然遊宦竟今未曾得爲之。有太醫孫用和亦嘗得此方。仁宗時表獻之。其大概雖相似、然甚粗略、非真方也。

服茯苓說

茯苓自是仙家上藥。但其中有赤筋脈。若不能去、服久不利人眼。或使人眼小。當削去皮、切爲方寸塊、銀石器中、清水煮、以酥軟解散爲度。入細布袋中、以冷水揉擺。如作葛粉狀、澄取粉、而筋脈留布袋中。棄去不用。其粉以蜜和、蒸過食之。尤佳。胡麻但取純黑脂麻、九蒸九曝、入水爛研、濾取白汁。銀石器中熬、如作杏酪湯。更入去皮核研爛棗肉、與茯苓粉一處溲和、食之。尤有奇效。

陽丹訣

冬至後、齋居、嘗吸鼻液、漱煉令甘、乃嚥下丹田。以三十磁器、皆有蓋、瀉其中已、隨手蓋之。書識其上、自一至三十。量淨室、選謹樸者守之。滿三十日開視。其上當結細砂如浮蟻狀、或黃或赤、密絹帕濾、取新汲水淨淘澄、無數、以穢氣盡爲度。淨瓷瓶合貯之。夏至後取細研棗肉丸如桐子大、空心酒吞下、不限丸數。三五日後取盡。夏至後仍依前法採取。却候冬至後服。此名陽丹陰煉。須淸淨絕慾。若不絕慾、真砂不結。

陰丹訣

取首生男子之乳、父母皆無疾恙者、并養其子。善飲食之。日取其乳一升。只半升亦可。以硃砂銀作鼎與匙。如無硃砂銀、山澤銀亦得。慢火熬煉、不住手攪。令如淡金色可丸。即丸如桐子大、空心酒吞下。亦不限丸數。此名陰丹陽煉。世人亦知服秋石。然皆非淸淨所結。又此陽物也。須復經火。經火之餘、皆其糟粕。與燒鹽無異。世人亦知服乳。乳陰物、不經火煉、則冷滑而漏精氣也。此陽丹陰煉、陰丹陽煉、蓋道士鑑智妙用沉機捷法。非其人不可輕泄。慎之慎之。

秋石方

凡世之煉秋石者、但得火煉一法而已。此藥須兼用陰陽二石。方爲至藥。今具二法于後。凡火煉秋石者、鍋中之陰、故得火而凝。入水則釋然消散。歸于無體。蓋質去但有味在。此離中之虛也。水

煉秋石。陰中之陽。故得水而凝。遇暴濕千載不變。味去而質留。此坎中之實。二物皆出于心腎二臟。而流于小腸。水火二臟。騰蛇元武正氣。外假天地之水火。凝而爲體。服之還補太陽相火二臟。上爲發命之本。具方于後。

陰煉法　小便三五石。夏月雖腐敗亦堪用。分置大盆中。以新水一半以上相和。旋轉攪數百市。放令澄淸。撇去淸者。留濁脚。又以新水同攪。水多爲妙。又澄去淸者。直候無臭氣。澄下秋石如粉。卽止。絞乾刮下。如膩粉。光白粲然可愛。都無臭氣爲度。再研。取用產男之乳和如膏。烈日中絞乾。如此九度。須揀好日色乃和。蓋假太陽眞氣也。第九度卽丸如桐子大。絞乾。每服三十丸。溫酒下。

陽煉法　小便不計多少。大約兩桶爲一擔。先以淸水按好皂角濃汁。以布絞去滓。每小便一擔。入皂角汁一盞。用竹篦急攪。令轉百千遭乃止。直候小便澄淸。白濁者皆定底。乃徐徐撇去淸者不用。只取濁脚。併作一滿桶。又用竹篦子攪百餘市。更候澄淸。又撇去淸者不用。十數擔。不過取得濃脚一二斗。其小便須先以布濾過。勿令有滓。取得濃汁。入淨鍋中熬乾。刮下擣碎。再入鍋。以淸湯煮令化。乃于箬筐內布紙筋紙兩重。傾入箬筐紙內。滴淋下淸汁。再入鍋熬乾。又用湯煮化。再依前法滴淋。如熬乾。色未潔白。更准前滴淋。直候色如霜雪卽止。乃入固濟沙盒內。歇口火煅成汁。傾出。如藥未成窩。更煅一兩遍。候瑩白玉色卽止。細研入沙盒內。固濟頂火四兩。養七晝夜。久養火尤善。再研。每服二錢。空心溫酒下。或用塩肉爲丸。如桐子大。每服三十丸。亦得。空心服陽煉。日午服陰煉。各一服。廣南有一道人。惟與人煉秋石爲業。謂之還元丹。先大夫曾得瘦疾且嗽。凡九年。萬方不效。服此而愈。郎侍郎節帥南海。其室病。夜夢神人告之曰。有沈殿中攜一道人。能合丹。可愈汝疾。宜求服之。空中擲下數十粒。曰。此道人丹也。及旦。臥席上得藥十餘粒。正如夢中所見。及先大夫到番禺。郎首問此丹。先大夫乃出丹示之。與夢中所得不殊。其妻服之遂愈。又予族子常病頭眩腹鼓。久之漸加喘滿。凡三年。垂困。亦服此而愈。皆只自火煉者。時予守宣城。亦大病踰年。族子急以書勸服此丹。云皆再生人也。予方合煉。適有一道士。又傳陰煉法。云須得二法相兼。其藥能洞人骨髓。無所不至。極秘其術。久之。道士方許傳。依法服之。又驗此藥不但治疾。可以常服。有功無毒。予始得之甚艱難。意在救濟人。理不當祕。火煉秋石。世人皆能之。煎煉時。須大作爐鼎。煎煉數日。臭達四鄰。此法極省力。只一小鍋。便可煉。體如金石。永不變潤。與常法功力不侔。久疾人只數服便效。

記松丹砂　祥符東封。有扈從軍士。晝臥東嶽眞君觀古松下。見松根去地尺餘。有補罅處。偶以所執兵攻刺之。罅者動。有物如流火自罅下出。遁走入地中。軍士以語觀中人。有老道士拊膺曰。吾藏丹砂于是三十年矣。方卜日取之。因掘地數丈不復見。道士恨恨成疾。竟死。其法用硃砂精良者。鑿大松腹。以松氣鍊之。自然成丹。吾老矣。不暇爲此。當以山澤銀爲鼎。有蓋。擇砂之良者二斤。用以松明根節縣胎裹之。傍置沙瓶。煎水。以補耗。滿百日。取砂玉槌研。七日投入蜜中。通油瓷瓶盛。日以銀匕取少許。蒸酒攪湯飲之。當有益也。

蘇沈良方卷二

治風氣四神丹

熟乾地黃　元參　當歸　羌活各等分。

右擣爲末。和蜜丸桐子大。空心酒服。丸數隨宜。列仙傳有山圖者。入山采藥折足。仙人教服此四物而愈。因久服。遂度世。余以問名醫康師孟。師孟大異之云。醫家用此多矣。然未有專用此四物如此方者。師孟遂名之曰四神丹。洛下公卿士庶爭餌之。百病皆愈。藥性中和。可常服。大略補虛益血治風氣。亦可名羣還丹。

四味天麻煎方　世傳四味五兩天麻煎方。蓋古方本以四時加減。但傳藥料耳。春肝旺多風。故倍天麻。夏伏陰。故倍烏頭。秋多瀉痢。故倍地榆。冬伏陽。故倍元參。此方常服。不獨去病。乃保身延年。與仲景八味丸並驅矣。

木香散　治偏風癱瘓脚氣等疾。

羌活一兩。　麻黃去節。水煮少時。去沫。二兩。　防風三分。　木香　槟榔　附子炮。去皮。　白朮　川烏頭炮。去皮。　草豆蔻和皮用。　陳橘皮去瓤。　牛膝酒浸一宿。　杏仁生。去皮尖。　當歸酒浸一宿。　人參　茯苓　甘草炙。　川芎　官桂不得見火。各半兩。

右十八味。剉如麻豆。每服一兩。水一碗。薑七片。煎至一盞。去滓。得七分。溫服。大腸不通。加大黃末。每服一錢。以老少加減。如久不通。加至三五錢不害。心腹脹。加蓽澄茄、滑石末。每服各一錢。如上。膈壅滯。痰嗽氣急。加半夏、升麻、天門冬、知母末。各二錢同煎。其藥滓兩合爲一服。用水一碗半。煎至一盞服。此藥福唐陳氏者。鬻以自給。郡人極神之。未有得其方者。一日爲其親戚據得與予。予作官處。即合以施人。如法煮服。以衣覆取汗。不過三五服。輒瘥。所至人來求藥者無窮。其驗如神。

左經丸　治小兒筋骨諸疾。手足不隨。不能行步運動。

草烏頭（肉白者。生。去皮臍。）　木鼈子（去殼。別研。）　白膠香　五靈脂（各三兩半。）　班貓（一百箇。去足翅。少醋煮熟。）　當歸（一兩。）

右爲末。用黑豆去皮。生。杵粉一斤。醋煮。糊爲丸。如鷄頭實大。每服一丸。酒磨下。筋骨疾但不曾針灸傷筋絡者。四五丸必效。予鄰里胡生者。一女子。膝腕軟。不能行立。已數年。生因遊淨因佛寺。與僧言。有一僧云。能治。出藥中丸十枚。以四枚與生曰。服此可瘥。生如其言與服。女子遂能立。生再求藥于院。僧曰。非有愛也。欲留以自備。必欲之。須合一料。生與錢一千。辭不受。止留百錢。後數日得藥。并餘錢十餘。悉歸之。同院僧佐其理藥。乃劃得此方。予至嘉興。有一里巷兒。年十歲。雙足不能行。以一丸分三服服之。盡四五丸。遂能行。自此大爲人所知。其效甚著。此藥能通榮衛。導經絡。專治心腎肝三經。服後小便少淋瀝。乃其驗也。

燒肝散　治三十六種風。二十四般冷。五勞七傷。一切痼疾。脾胃久虛。不思飲食。四肢無力。起止甚難。小便赤澀。累年口瘡。久醫不瘥。但依此法服之必愈。

茵陳　蒻角　石斛　柴胡　芎藭　白芷（各半兩。）　乾薑　防風　桔梗　紫參　人參　胡椒　官桂（去皮。）　白蒺藜　吳茱萸（各一兩。）

右共十五味。同爲末。以羊肝一具。如無。即以豬肝代之。分作三分。淨去血脈脂膜。細切。用末五錢。葱白一莖。細切相和。以濕紙三五重裹之。掘地坑。納以火。燒令香熟。早晨生薑湯嚥下。大段冷勞。不過三服見效。廬州刁參軍。病洩。痼日久。黑瘦如墨。萬法不瘥。服此一二服。下墨汗。遂安。

伊祁丸　治鶴膝風及腰膝風緩。

伊祁（頂題全者。）　桃仁（生。）　白附子　阿魏（酒二升。銅器內熬。令膠。）　乳香（三分。）　當歸　北漏蘆　牛膝　芎藭　地骨皮（去土。）　威靈仙　羌活（各一兩。）

右爲丸如彈丸大。空心煖酒化下一丸。胡楚望博士病風疰。手足指節皆如桃李。痛不可愈。

烏荊丸　治風。

川烏頭（一兩。炮。去皮。）　荊芥穗（二兩。）

右醋糊丸。如桐子大。每服二十丸。或酒或熟水下。有疾。食空時日三四服。無疾。早晨一服。少府郭監丞少病風。瘮搐。頸頷寬緩不收。手承頷然後能食。服此六七服。即瘥。遂長服之。已五十餘年。年七十

餘。強健。鬚髮無白者。此藥療腸風下血尤妙。余所目見服此而瘥者。一歲之內已數人。

天麻煎丸　治風氣不順。骨痛。或生赤點隱疹。日久不治。則加冷痺。筋骨緩弱。（案此方原缺。今從主意博濟方補入。）

五靈脂　附子　白朮　赤小豆　乾蠟（炒。）　羌活　防風（各一兩。）　天麻（半兩。）

右先以沈香二兩。酒一升。煎爲膏。毋犯鐵器。入藥。擣千下。爲丸。桐子大。空腹下二十丸。過五日。加至三十丸。秋夏宜荊芥湯。春冬宜荊芥酒。春末夏初生赤根白頭瘡。服之瘥。

服威靈仙法　服威靈仙有二法。（別一帖云。以威靈仙雜牛膝服之。補氣虛實加減。牛膝。丸散皆可。丸即以酒煮糊。）一法。淨洗陰乾。擣以酒浸焙乾。二物皆爲末。丸散皆可。

羅爲末。糯酒浸牛膝末。或蜜丸。或爲散。酒調。牛膝之多少。視己氣之虛實而增減之。此眉山一僧患脚氣至重。依此服半年。遂永除。一法。取藥粗細得中。寸截之。七寸作一帖。每歲作三百六十帖。置床頭。五更初。面東。細嚼一帖。候津液滿口嚥下。此牢山一僧。年百餘歲。上下山如飛。云得此藥方。二法皆以得真爲要。真者有五驗。一味極苦。二色深黑。三折之脆而不韌。四折之微塵如胡黃連狀。五斷處有黑白紋。謂之鵝鴨眼。無此五驗。則蓋本根之細者耳。又須忌茶。（別一帖云。但忌茶。若常服此藥。當以皂角浸牙爲茶。取極濃者。湯中略煮一沸。便取出。布裹壓乾。入煙。以軟熟火焙乾。與飲茶無異。）以槐芽皁角至嫩者。依造草茶作。或只取外蓋祕要代茶飲子方常合服。乃可。

蓋肝散　治肝瘮脚弱及傷寒。手足乾小不隨。

蜜苑　桔梗　蒼朮　芎藭（各等分。）

右爲末。每服四錢。羊肝半具。大竹刀切。勿犯水。勿令血散。入鹽、醋、葱、薑、酒、同煮熟。空腹食前日三服。

穀熟尉宋鈞傷寒病差後。雙足但有骨。不能立。服此散。見其肉生。一兩日間。生復如舊。

烏頭煎丸　治風毒氣攻眼。久成內外障。痛楚。努肉赤脹等病。十年者。皆可療。

黑豆（二兩。小者。）　川烏頭（一兩。去皮。生。）　青橘皮（半兩。去瓤。同烏頭爲末。以水一升三合。浸一宿。纏火煎成膏子。）　牛膝　枸杞子　荊芥穗　川芎　羌活　地龍（去土。）　白蒺藜　當歸　乾薄荷（各半兩。）　甘菊花（一兩。）

右將前青皮煎和。爲丸。如桐子大。每服二十丸。空心茶酒任下。蜜湯下亦得。先君因失少女。感傷哭泣。忽目瞑不見物。治之踰月復明。因盛怒。呵一罪人。目復瞑。踰年得此。服不盡一劑。目復如故。

又方

羌活　防風（酒浸一宿。）　黃耆　木賊　附子（炮。）　蛇蛻（一條。青竹瘋。）　蟬殼　荊芥穗　甘草　甘菊花　白蒺藜（去角。）　旋覆花　石決明（泥裹。燒赤。別研。）

右等分。除附子、蛇蛻、決明、皆剉碎。新瓦上焙令燥。爲散。每二錢。第二米泔煎熟。調下。空心日午夜臥各一服。予少感目疾。踰年。人有以此方見遺。未暇爲之。有中裘兒許復。嘗苦目昏。後已都瘥。問其所以瘥之由。云服此藥。遂合服。未盡一劑而瘥。自是與人莫不驗。

通關散　治大人小兒諸風傷寒。

旌德烏頭（四兩。鞭皮。有靈知肌肉者。）　藁本　防風　川芎藭　當歸　天南星　白芷　乾薑　雄黃（研。）　桂（各半兩。鞭皮。剉近火。）

右爲細末，煨葱酒下一字或半錢。癖痰加牛黃、麝香。小兒減半，薄荷酒下。此散余目見醫數人，今聊記其一二。曾在江南見市門有队者，問之，乃客販，因病偏風，醫之，遂至病困，爲邸家所委。時伯氏爲令，使人舁到令舍，調藥飲之，又與十服，數日，伯氏出市，有一人扶倚牀而呼曰：昔日臥者，今能扶杖而行矣。藥盡，頗少徙之。伯氏又與十服，服訖，能起。又一吏病瘖而瘻，踰歲月臥矣，伯氏與散二錢匕，爲八服，更釋以爲一服，服已，僵眩嘔吐，幾困，將殆。數日瘖瘻悉除，大抵中風瘻施治之，須先去涎，去已，乃用續命湯發汗之，末乃用此爲宜。蓋風病多挾熱，若未發散，便投烏頭輩，或不相當也，更消息治之必驗。

辰砂散　治風邪諸癇，狂言妄走，精神恍惚，乍歌乍哭，飲食失常，疾發仆地，吐沫戴目，魂魄不守，醫禁無驗。

辰砂（一兩，須光明，有塊隨者。）　酸棗仁（微炒。）　乳香（光瑩者，各半兩。）

右盡所患人飲酒幾何，先令恣飲沈醉，但勿令吐，靜室中服藥訖，便安置床枕令睡，以前藥爲一服，溫酒一盞調之，頓服令盡，如素飲酒少人，但隨量取醉，病淺人一兩日，深者三五日，睡不覺，令家人潛伺之，覺即神魂定矣，慎不可驚觸使覺，一爲驚痛，更不可治。上樞吳公少時病心，服一劑，三日方瘥，遂瘥。

治諸風上攻頭痛方

地龍殺精草爲末，同乳香，火餅上燃，以紙筒盛烟，鼻聞之，即瘥。

側子散　治筋脈抽掣，疼痛不止。

側子（炮裂，去皮臍。）　赤箭　漏蘆　芎藭　棗仁（微炒。）　海桐皮（各一兩。）　桂心　五加皮　仙靈脾　牛膝　木香　枳殼（麩皮炒，去穰，各半兩。）

右爲末，每服一錢，溫酒調下，不計時候服。此藥尤治目赤痛，服用每驗。蓋攻治肝風，凡目赤皆主于風。余于四生散論之甚詳，此方主療亦四生散之類也。

四生散　治腎臟風，治眼，治癬。

白附子（腳生瘡，用黑附子。）　沙苑蒺藜　羌活　黃芪

右等分，皆生爲末，每服二錢，鹽酒調下，空腹。猪腎中煨服尤善。予爲河北察訪使時，病赤目四十餘日，黑睛傍蹙赤成瘡，晝夜痛楚，百療不瘥，郎官邸革相見，問予病目如此，曾耳中痒否？若耳中痒，即是腎家風，有四生散療腎風，每作二三服即瘥，閱里號爲聖散子。予傳其方，合服之，午時一服，臨臥一服，目反大痛，至二鼓時乃能眠，及覺，目赤稍散，不復痛矣，更進三四服，遂平安如常。是時孫和甫學士帥鎮陽，聞余說，大喜曰：吾知所以自治目矣，向久病目，嘗見呂吉甫參政云，頃目病久不瘥，因服透水丹乃瘥，如其言修合，試服二三十服，遂愈，乃知透水丹亦療腎風耳。凡病目人常記一事，予在河北病目時，曾治滑县洛州守閻君，授見訪云，目赤不可浴，浴湯驅體中熱併集頭目，目必甚，又轉運判官李長卿亦云然。予不信，卒浴，浴畢，目赤遂大作，行數程，到鉅鹿，見陳達升學士，以病目廢于家，問其病目之因，云頃年病目赤，飲酒歸，過同舍林億邀同太學浴，達升舊知赤目不可浴，堅拒之不得，僅免一浴，浴已，幾失明，後治之十餘年，竟不瘥，此亦以爲戒也。又予之門人徐搆病癖，久不瘥，服四生散，數日都除。

蘇沈良方卷三

聖散子　昔予覽千金方三建散云，于病無所不治，而孫思邈特爲著論，謂此方用藥節度，不近人情，至于救急，其驗特異，乃知神物效靈，不拘常制，至理開惑，智不能知。今予得聖散子，殆此類也。自古論病，惟傷寒爲急，表裏虛實，日數證候，應汗應下之類，差之毫釐，輒至不救，而用聖散子者，一切不問陰陽二感，或男子女人相易，狀至危篤，迎飲數劑，而汗出氣通，飲食漸進，神守完復，更不用諸藥，迎服取差，其餘輕者，心額微汗，正爾無恙，藥性小熱，而陽毒發狂之類，入口便覺清涼，此藥殆不可以常理而詰也。若時疫流行，不問老少良賤，平旦輒煮一釜，各飲一盞，則時氣不入。平居無事，空腹一服，則飲食快美，百疾不生。真濟世衛家之寶也。其方不知所從出，而故人巢君穀世寶之，以治此疾，百不失一。余既得之，謫居黃州，連歲大疫，所全活者不可勝數。此方指松江水爲督盟，不得傳人，予竊憐之，乃以傳蘄水龐君安時，龐以醫聞于世，又善著書，故以授之，且使巢君名與此方同不朽也。　主疾功效非一，去春杭州民病，得此藥全活者不可勝數，所用皆中下品藥，略計每千錢即得千服，所濟已及千人，由此積之，其利甚溥。凡人欲施惠，而力能自辦者，猶有所止，若合衆力，則人有善利，其行可久。今募信士就楞嚴院修製，自立春後起施，直至來年春夏之交，有入名者，徑以施送本院，昔薄拘羅尊者，以訶梨勒施一病比丘，故獲報身，身常無衆疾，施無多寡，隨力助緣，疾病必相扶持，功德豈有限量。仁者惻隱，當崇善因。（陳無擇三因方云：此藥以治寒疫，因東坡作序，大

下通行，幸未早，水穀滋養，體容者不可藥散，資等疏通行，其間偶中，獲未知方士有所傷宜，幸可考也，東坡嘗謂與三法散同賦，一切不問，鋼太不近人情，失藥效，亦自能發狂，蓋陰能發陽，論能知脈，知極則反，理之常然，不可不知。今錄以備標寒疫用者，宜審究其藥進二錢，無使無效也。

聖散子方

草菅（去皮，炮，一兩）　木猪苓（去皮）　石菖蒲　高良薑　獨活（去蘆頭）　附子（炮製，去皮脐）　麻黃（去根）　厚朴（去皮，薑汁炒）　藁本（去蘆，汁炒）　芍藥　枳殼（去瓤，麩炒）　柴胡　澤瀉　白朮　細辛　防風（去蘆頭）　藿香　半夏（薑汁製）　茯苓（各半兩）　甘草（炙，一兩）

右剉碎如麻豆大，每服五錢，清水一鍾半，煎取八分，去滓，熱服，餘滓兩服合爲一服，重煎，空心服下。

小柴胡湯　治解傷寒諸症。

柴胡（二兩）　黃芩　人參　甘草（炙）　生薑（各三錢）　半夏（湯洗，二兩半）　大棗（十二枚，破）

右剉如麻豆大，以水三升，煎取一升半，去滓再煎，取九溫服，日三服，此古法也，今可作粗散，每服三錢，棗三枚，薑三片，水一盞半，煎至八分，溫服，氣實疾勢盛者，加至四五錢不妨，並去滓，此張仲景方，余以今秤量改其分劑，孫兆更名黃龍湯，近歲此藥大行，患傷寒不問陰陽表裏，皆令服之，此甚誤也，此藥治傷寒雖主數十證，大要其間有五證最的，服之必愈，一者身熱，心中逆，或嘔吐者，可服，若因渴飲水而嘔者，不可服，身體不溫熱者，不可服，二者寒熱往來者，可服，三者發潮熱可服，四者心煩骨下滿，或渴或不渴，皆可服，五者傷寒已瘥後，更發熱者，可服，此五證但有一證，更勿疑，便可服，服之必瘥，若有三兩證以上，更的當也，其餘證候須子細詳論，及脉候相當方可用，蓋世人但知小柴胡治傷寒，不問何證便服，不徒無效，兼有所害，故備論于此，使人了然易曉，本方更有加減法，雖不在此五證內，用之亦屢效，今亦載于此，若胸中煩而不嘔，去半夏，加人參，合前成一兩，若腹中痛者，去黃芩，加芍藥三分，此一證最有驗，常時腹痛亦療，若脅下痞鞕，去大棗，加牡蠣一兩，若心下悸，小便不利，去黃芩，加茯苓一兩，若不渴，外有微熱者，去人參，加桂三分，溫覆微汗愈，若咳，去人參大棗生薑，加五味子半兩，乾薑半兩，元祐二年時行，無少長皆咳，服此皆愈。

麻黃丸　治傷寒解表，止頭痛，兼治破傷風及一切諸風。

麻黃（六兩，去節，沸湯泡，去黃水，焙乾）　烏頭（水浸三日，逐換水，去皮，乾炮，去臍）　天南星（別研，以上各四兩）　白芷（三兩）　甘草（炙，一兩）　龍腦（半兩，只用降木龍腦，但製數散，不必用番龍腦）

右爲末，水煮天南星爲丸如小彈子大，每服一丸，煎茶或茶酒嚼下，薄荷亦得，連二三服，此本予家白龍丸，已編入鑑苑，後又加麻黃作六兩，寒水石用石膏末爲衣，治傷寒至佳，小小傷風，服之立瘥，解表藥中，此尤神速。

治暑喝逆巡悶絕不救者。

道上熱土　大蒜

右各等多少，爛研，冷水和，去滓，飲之即瘥，此方在徐州沛縣城門上板榜揭之，不知何人所施，治暑

傷，肌膚多瘡爛，或因搔成瘡者，林才中嘗暑中臥病，肌膚多瘡爛，汁出，有一乳姥曰，此易愈，取乾壁土搗細末，傅之，隨手即瘥。

木香丸　治瘧。

鷄心檳榔　陳橘皮（去白，各二兩）　青木香　大附子　人參　厚朴　官桂（去皮，味若薑）　光活　荊三稜　獨活　乾薑（炮）　甘草（炙）　芎藭　川大黃（剉，微炒）　芍藥（各半兩）　牽牛子（一斤，淘去浮者，搗拭，熟搗，取末四兩，餘滓不用）　肉豆蔻（六枚，去殼，止溫方用）

右十五味爲末，磁器盛之，密封，臨服，用牽牛末二兩，藥末一兩，同研令勻，煉蜜爲丸，如桐子大，心腹脹滿，一切風勞冷氣，臍下刺痛，口吐清水白沫，酷心痰癖氣塊，男子腎臟風毒攻刺四體，及陽毒脚氣，目昏頭痛，心間嘔逆，及兩脇堅滿不消，臥時橘皮湯下三十丸，以利爲度，此後每夜二十丸，女人血痢、下血、刺痛、積年血塊、胃口逆、手足心煩熱、不思飲食，蜜湯下三十丸，取利，每夜更服二十丸，小兒五歲以上，疳氣、腹脹氣喘、空心溫湯下五七丸，小者減丸數服，凡胸腹飽悶不消、脾泄不止、臨臥溫酒下，取利，食毒、癰疽發背、山嵐瘴氣、鬱冒頭痛、背脚拘緊，便宜服之，快利爲度，常服可以不染瘴疾，凡瘴疾皆因脾胃實熱所致，常以涼藥解脇上壅熱，并以此藥通利，彌善，此丸本治嵐瘴，及瘟瘴大效，李校理敦裕嘗爲傳，剉石于大庾嶺，蒙效者不可勝數，予伯氏任閩中，嘗擁兵捕山寇，過漳浦，軍人皆感瘴，用此治之，應時患愈，予在江南時，值歲發瘧，以此藥濟人，其效如神，皆以得快利爲度，記，凡久瘧，服藥訖，乃灸氣海百壯，又灸中脘三十壯，尤善。

枳殼湯　治傷寒痞氣，胸滿欲死者。

枳殼（麩炒，去穰，各一兩）　桔梗

右細剉如米豆大，用水一斗半，煎減半，去滓，分二服，傷寒下早，則氣上膨胸，世俗即謂之結胸，多更用巴豆粉、葶藶粉下之，下之十有七八死，此蓋瀉其下焦，下焦虛，則氣愈上攻胸膈，多致不救，凡胸膈病只可瀉膈，若按之堅硬而痛，此是結胸，如胸有水，須用大黃甘遂葶藶下之，陷胸丸之類是也，若按之不甚硬，亦不甚痛，此名痞氣，正虛氣熱鼓脹，只可用黃芩黃連大黃之類化之，嘗有人患胸脹已危困，作結胸痞氣治，皆不瘥，更大夫以此湯飲之，下黃水一升，遂瘥，予得此法，用之如神，若是痞氣，莫不應手而消，凡傷寒胸脹，勿問結胸痞氣，但先投此藥，若不瘥，然後別下藥，緣此湯但行氣下膈耳，無他損，又西晉崔行功方，傷寒或下或不下，心中結滿，胸脅痞塞，氣急厥逆，欲絕，心胸高起，手不能近，二三日輒死，用瀉心大小陷胸湯皆不瘥，此當是下後虛逆，氣已不理，而毒復上攻，氣毒相搏結于胸中，氣毒相激，故致此病，療之當用加減理中丸，先理其氣，次療諸疾。

加減理中丸

人參　白朮　茯苓　甘草（炙，各二兩）　乾薑（炮，一兩半）　枳實（十六片，麩炒，或炙）

右爲末，蜜丸彈子大，一丸不效，再服，予時用此神速，下喉氣即相接續，復與之，不過五六彈丸，胸中

豁然失。渴者。更加栝蔞二兩。下痢者。加牡蠣二兩。余以告領軍韓康伯。右衛毛仲祖。光祿王道預。並郎顧君苗著作殷仲堪。並悉用之。咸歎其應速。于時枳實乃爲之貴。緣此病由毒攻于內。多類少陰。泄痢之後。理應痞結。雖已泄痢。毒尚未除。毒與氣爭。凝結于胸。時或不痢。而毒已入于胃。胃中不通。毒必上衝。或氣先不理。或上焦痰實。共相衝結。復成此患。大抵毒之與氣。相干不宣。關津壅遏。逆從不通。故瀉心療滿而不療氣。雖復服之。其瘥莫由。療毒氣結。莫過理中丸。解毒通氣。落自消釋。然乾薑性熱。故減其分。茯苓通津。栝蔞除渴。牡蠣止痢。誰謂其宜。無不得矣。家人黃珍者。得病如上。其弟扶就叔尚書乞藥。余曰。可與理中丸。坐中數客皆疑不可。余自決。于箱中取一彈丸與之。竺法太調余曰。此人不活。君微有緣矣。與時合暝。許比至三籌。扶又來。便叩頭自搏。四坐愕然。謂亟更劇。叔問何如。扶答向藥一服。便覺大佳。更復乞耳。余謂竺法太曰。上人不疑作緣。但恐後更來乞。失人眠耳。果爾如何。余復與數彈丸。明日便愈。叔遂至今用之。護軍司馬劉元寶妾病。亦如此。叔復與之二丸。服盡便瘥。叔以此施之。遂多蠲救濟。傷寒難療。故詳記焉。此行功自敘也。予以此丸與枳殼湯參服。理無不驗。理中丸所用枳實。只是枳殼。古人只謂之枳實。後人方別出枳實一條。

五積散

蒼朮二兩十　桔梗十兩　陳橘皮六兩　白芷　甘草各三兩　當歸二兩　川芎半兩　芍藥　白茯苓　半夏湯洗各一兩　麻黃春夏二兩秋冬三兩　乾薑春夏一兩半秋冬二兩　枳殼麸炒去穰四兩以下三物可別擣　肉桂春夏三兩秋冬四兩　厚朴二兩薑炙

右前十二味爲麤末。分六服。大鍋內緩火炒令微赤。香熟即止。不可過焦。取出。以淨紙藉板牀上。令冷。入後三物和之。爲丸。每服三錢。加薑棗煎至六分。去滓服。傷寒手足逆冷。虛汗不止。脈沉細。而胷嘔逆。加順元散。一錢同煎。熱服。產婦陣疎。難產。經三兩日不生。胎死腹中。或產母氣乏委頓。產道乾澀。加順元散。水七分。酒三分。煎。相繼兩服。氣血內和。即產。胎死者。不過三服。當下。其順元散多量產母虛實。傷寒發熱。脅內寒者。加葱白二寸。殷七粒。同煎。相繼三兩服。當以汗解。

順元散

烏頭二兩　附子炮　天南星炮各一兩　木香半兩

右予叔祖得此方于民家。故吳中至今謂之沈氏五積散。大抵此散能溫裏外。但內外感寒。脈遲細沉伏。手足冷。毛髮怕慄。傷寒裏證之類。大驗。三兩杯。當手足溫。或汗。乃愈。今世名醫多用此散治氣。極效。和一切氣。通血絡。無出此藥。人病脾瘧。用紫金丸逐下。乃服此散。數服多愈。

紫金丹

硫黃　鍼沙各三錢　鐵粉　鳳粉各五錢

四味炒爲末。粟米飯丸如彈子大。乳香湯下一丸。氣實。服一丸半至二丸。

七蟲散　治脾寒瘧疾。

川烏頭大者一個。炮。良久。移一處再炮。凡七處。炮滿。去皮臍。爲細末。都作一服。用大棗七個。生薑十片。葱白七寸。水一碗。同煎至一盞。疾發前。先食裹。次溫服。只一服瘥。元祐二年兩浙瘧疾盛作。常州李使君舉家病瘧甚久。萬端醫禁不效。過客傳此方。一家服之。皆一服瘥。又長興賈耘老傳一方。與此方同。只烏頭不炮。却用沸湯泡。以物蓋之。候溫。更泡。滿十四遍。去皮切焙乾。依上法作一服。耘老云。施此藥三十年。治千餘人。皆一服瘥。

葱熨法　治氣虛陽脫。體冷無脈。氣息欲絕。不省人。及傷寒陰厥。百藥不效者。

右以葱用索纏如蠶許大。切去根及葉。惟存白。長二寸許。如大餅餤。先以火脅一面令通熱。又勿令灼人。乃以熱處搭病人臍。連臍下。其上以熨斗滿貯火熨之。令葱餅中熱氣鬱入肌肉中。須預作三四餅。一餅墮不可熨。又易一餅。良久。病人當漸醒。手足溫。有汗。即瘥。更服四逆湯。溫其內。萬萬無疑。予伯兄病。傷寒。冥昧不知人事八日。四體堅冷如石。藥不可復入。用此法瘥。集賢校理胡完夫用此方。拯人之危。不可勝計。

金液丹【案】原方缺。今從王袞博濟方補入。

硫黃十兩。精瑩者。研碎。入罐子。及八分爲度。勿大滿。石龍芮兩握。又云狗蹄一握。水鑑草兩握。稻田中生。一蓋四花如田字。亦名水田草。獨蓋生。以黃土一掬同擣爲泥。只用益母草并泥擣亦得。

右固濟藥罐子。約厚半寸。置平地。以瓦片覆罐口。四面炭五斤擁定。以熱火一斤自上燃之。候罐子九分赤。口縫有碧焰。急退火。以濕灰三斗覆。至冷。剖罐取藥。削去沈底滓濁。准前再煅。通五煅爲足。藥如熟鷄卵氣。并取罐埋潤地一夜。又以水煮半日。取藥。柳木槌研。頓滴水。候揚之無滓。更研。令乾。每藥一兩。用蒸餅一兩化。同擣丸之。纍乾。金液丹舊方主病甚多。大抵治氣虛。凡久疾虛困。久吐痢不瘥。老人臟祕。傷寒脈微陰厥之類。皆氣虛所致。服此多瘥。大人數十丸至百丸。小兒以意裁度多少。皆粥飲下。虛甚者化灌之。小兒久吐痢垂困。藥乳皆不入。委頓待盡者。併與數十丸。往往自死得生。少與即無益。予親見小兒吐痢極已氣絕。藥之在地。知其不救。試灌與服之。復活者數人。

蘇沈良方卷四

治消渴方　眉山有楊顯臣者，長七尺，健飲啖，偶傑人也。忽得消渴疾，日飲水數斗，食倍常而數溺，服消渴藥逾年，疾日甚，自度必死。治棺衾，囑其子于人，蜀有良醫張元隱之子，不記其名，爲診脈，笑曰：若幾誤死矣。取麝香當門子，以酒濡之，作十許丸，取枳椇子爲湯，飲之，遂愈。問其故，張生言消渴消中，皆脾衰而腎敗，土不能勝水，腎液不上泝，乃成此疾。今診顯臣，脾脈極熱，而腎不衰，當由果實酒過度，虛熱在脾，故飲食象人，而多飲水，既多，不得不多溺也。麝香能敗酒，瓜果近輒不植，而枳椇子亦能勝酒，屋外有此木，屋中釀酒不熟，以其木爲屋，其下亦不可釀酒，故以此二物爲藥，以去酒果之毒也。宋玉云枳椇來巢，枳音句，里切，椇音矩，以其實如鳥乳，故能來巢，今俗謂謂之雞距子，亦謂之癩漢指頭，蓋取其似也。嚼之如乳，小兒喜食之。

木香散　治臟腑冷極，及久冷、傷憊、口瘡、下泄、穀米不化、飲食無味、肌肉瘦顇、心多煩悲、婦人產後虛冷下泄、一切水泄冷痢。

木香　破故紙　高良薑　砂仁　厚朴（薑汁炙，各三分）　赤芍藥　陳橘紅　肉桂　白芷（各半兩）　胡椒　吳茱萸（湯洗，去黑水，各一分）　肉荳蔻（四枚）　檳榔（一箇）

右爲散，每服三錢，不經水猪肝四兩許，去筋膜，剮爲薄片，重重掺藥，置一鼎中，入漿水一碗，餡一茶

脚許，蓋覆，煮肝熟，入鹽一錢，葱白三莖，細切，生薑彈子許，槌碎，同煮，水欲盡，空心爲一服，冷食之，初服微瀉不妨，此是逐下冷氣，少時自止，經年冷痢滑瀉，只是一服，渴即飲粥湯下，忌生冷油膩物，如不能食冷，即少添漿水暖服。張簡夫職方，嘗久瀉，忽有人召食，以疾辭不往，主人曰：吾有良藥，一服可瘥，煮藥而召之，簡至，先服藥，使就席，熟醉而歸，竟不復瀉，簡夫得此方，與人服，莫不神應，嘉興謝醫得此方，惡其煩，只用漿水煮猪肝，爲丸如桐子大，每服五十丸，粥飲下，其效亦同。若暴瀉痢，只是一服，唯熱痢熱瀉不住，須加服。

礞砂煎丸　治一切積滯，化氣消食，補益真氣，產後逐敗血，補虛損，至善。

礞砂（擣篩，別研，令如粉）　當歸（無灰酒浸一宿，焙乾，切，洗片子，焙）　肉蓯蓉（無灰酒浸一宿，切作片子）　穿心巴戟（無灰酒浸一宿，去心用）　楂棗（黑附子（天雄，用無灰酒煮五七百沸，候軟，剮去皮）　木香　沉香　舶上茴香（微炒，以上各一兩）　金鈴子（三兩，洗過，切破四面，無灰酒浸一宿，候軟，以刀剮下肉，去皮核不用）　阿魏（半兩，米飯蒸成膏，入諸藥）

右爲細末，以無灰酒煮白麪糊丸如桐子大，每服三十丸，空心日午溫酒下。此方家家有，予家婦嘗病腎中下痢，日久甚困篤，百方不瘥，士人李潛善醫，曰：腎中下痢，與他痢不同，常痢可用苦澀藥止之，腎中痢生于血不足，投澀藥則血愈不行，痢當更甚，爲予作礞砂法，云此藥最能治產後痢，先以桂圓方小下之，次投礞砂丸，日九十丸，痢頓減半，次日遂愈，礞砂丸，產後雖無疾，亦宜服之，能養血去積滯，桂圓方今附于後。

礞砂（研）　肉桂　甘遂　巴豆（去心皮，勿去油）　丁香　木香　芫花（醋炒，各一兩）

右等分，擣篩，麪糊爲圓，小麻荳大，每服二圓，三圓，溫水下，加減更量虛實，潛名醫也，云此圓攻積最勝，不論久近皆能化。

黑神丸

漆（六兩，中生，中用熟，令香）　神麯　茴香（各四兩）　木香　椒紅　丁香（各半兩）　楂棗（四枚，除核外，五物皆半生半炒）

右圓如彈丸，取茴香末十二兩，鋪蓋陰地，麻乾，候外乾，并茴香收器中，極乾，乃去茴香，食腎餘育腸、膀胱痃癖、七疝、下墜、五膈、血崩、產後、諸血滿下、白赤、並圓分四服，死胎一圓，皆無灰酒下，難產，炒葵子四十九枚，擣碎，酒煎，下一圓，諸疾不過三服，元氣十服，（產前產後，隔氣癥癖，五服，血瘕三圓，常攜，予族子婦病，腹中有大塊如杯，每發痛不可堪，時予婦已貴，京下善醫者悉投方藥，愈陳應之曰：此血瘕也，投黑神丸，盡三圓，杯氣消盡，終身不復作。

神保丸

木香　胡椒（各一分）　巴豆（十枚，去皮心，研）　乾蝎（七枚）

右湯釋蒸餅，丸麻子大，硃砂爲衣，每服三丸，心膈痛，柿蔕燈心湯下，腹痛，柿蔕煨薑煎湯下，血痛，炒薑醋下，小便不通，燈心湯下，血痢臟毒，楮葉湯下，肺氣喘者，白礬蛤粉各三分，黃丹一分，同研爲散，煎桑根白皮糯米飲調下三錢，小嚢止，用桑皮糯飲下，腎氣脅下痛，茴香酒下，大便不通，蜜湯調楮

檳榔末一錢下。氣噎、木香湯下。宿食不消、茶酒漿飲任下。予三十年前客金陵。醫人王琪傳此方。琪云。諸氣惟膀胱氣。脅下痛最難治。獨此丸輒能去之。無尊中。予病項筋痛。諸醫皆以爲風。治之數月不瘥。乃流入背脅。久之又注右脅。轉痛甚苦。憶琪語方。向已編入鑑苑。取讀之。有此一驗。乃合服之。一投而瘥。後脅再發。又一投而瘥。

小建中湯　治腹中切痛。

官桂　生薑切三分各　甘草炙半兩　大棗十二枚　白芍藥半兩　膠飴二兩

右以水二升。煮取九合。去滓內飴。更上火微煮令化。溫服三合。日三服。嘗有人患心腹切痛不可忍。累用良醫治之。皆不效。灸十餘處亦不瘥。士人陳丞善醫。投一藥遂定。問之。乃小建中湯也。此藥偏治腹中虛寒。補血。尤止腹痛。常人見其藥性溫平。未必信之。古人補虛止用此。體而藥不須附子硫黃承用。此藥治腹痛如神。然腹痛按之便痛。重按却不甚痛。此止是氣痛。重按愈痛而堅者。當自有積也。氣痛不可下。下之愈痛。此虛寒證也。此藥尤相當。按外臺。虛勞腹中痛。夢失精。四肢酸痛。手足煩熱。咽乾口燥。婦人少腹痛。宜服。　張仲景傷寒論。陽脈濇。陰脈弦。法當腹中急痛。先與此不差者。小柴胡湯主之。此二藥皆主腹痛。予已于小柴胡湯敍之。若作散。卽每服五錢匕。生薑五片。棗三箇。大者。飴一粟大者。若疾勢盛。須作湯劑。散服恐力不勝病。元豐中。丞相王鄆公病少腹痛不止。宣差太醫。攻治備至。皆不效。凡藥之至熱。如附子硫黃五夜叉丸之類。用之亦不瘥。附馬張都尉令取婦人油頭髮燒爲灰。細研篩過。溫酒服二錢。卽時痛止。婦人用男子頭髮。如前類用方。

進食散

陳皮去瓤　甘草炙　肉桂去外皮　高良薑濃切炒各一分　川烏頭一箇。泡去皮臍　草荳蔻三箇　訶子煨去核。五箇

右每服一錢。水一中盞。生薑二片。煎七分。食空時服。此廬州李潛方。治脾胃虛冷不思食。及久病人脾虛全不食者。只一二服便頓能食。潛名醫也。予目見在眞州治賈使君女子。已五十餘日。病脾多嘔。不進食。久醫絕無驗。潛投此藥。一服。遂食蒸餅半枚。明日百味皆思。潛云。此藥進食極神速。余疑此藥太熱。潛云不然。用之三十年無不效也。

壓氣散　止逆定喘。治氣乏控上脘者。

木香　人參　白伏苓　藿香　陳橘皮　枳殼　附子炮　甘草炙各等分　已上

右一大盞。煎紫蘇木瓜生薑湯。再入銀盞。重湯煎。五七沸。通口服。

訶子丸　消食化氣。

訶子皮三兩。洗淨　木香　白荳蔻　檳榔各一兩　桂　人參　乾薑　茯苓各二兩　甘草炙　麥芽大者　牽牛子炒

右酒煮麵糊爲丸。桐子大。每服十五丸至二十丸。如有氣疾發動。喫食過多。築心滿悶。爛嚼茶酒任

下。陸子履學士知蔡州平輿縣。值石曹南遷。子履得此方。嘗喫物極多。常致憤悶成疾。服此輒愈。予問子履求得之。家中常合食飽脹滿。及氣膨胸脇。只一服。如人手按下。極有驗也。

椒朴丸　治脾胃虛冷。歲久不思飲食。或發虛腫。或曰漸羸瘦。四肢衰倦。吐痢無節。一應脾虛候狀。皆可服。

漢椒去目　厚朴去麤皮剉　茴香　青鹽淘去沙土取淨

右各二兩。以水二升。煮令乾。焙燥。擣爲末。麵糊丸如桐子大。每服三四十丸。空心溫米飲及鹽湯下。病深者日三服。予中表許君病脾逾年。通身黃腫。不能起。金不嗜食。其甥爲本道轉運使。曰道良儒治之。不效。有傳主簿傳此方。服十許日。漸安。自爾常服。肌膚充預。嗜飲食。年六十餘。日行數十里。強力如少年。椒朴丸。博濟及諸集中多載。有加附子者。有加薑皮者。皆不快捷。此方得其精要。與病相當。如神。愼勿增別藥以致不驗。

無礙丸　此丸傳自湖州處士劉某。其叔父病喘。手足背腫。殆不能起。劉君夢神謂之曰。君叔父病脾病。橫泄四肢。非他也。子有隱德。吾能愈之。乃疏方授之。曰無礙丸。且戒勿服他藥。劉君得方。以餌其叔父。三餌而疾間。君先迎醫于錢塘。後數日醫至。曰此肺逆。當治肺。藥入口。疾復作。君諭曰。神人預皆戒我。急謝醫。復投無礙丸。遂瘥。

大腹皮炙二兩　莽草炙三錢。皆溫經藥　檳榔生一分　木香煨爛一分　牽牛子半兩

右爲末。炒麥糵擣粉爲糊。丸如桐子大。每服二十丸。生薑湯下。

陰陽二勝散　治久患翻胃。及小兒驚吐諸吐。

好硫黃半兩。細研　水銀一分。與硫黃研。無星

右同研。如黑煤色。每服三錢。生薑四兩。取汁。酒一盞。同薑汁煎熟。調藥。空心服。衣被蓋覆。當俟足指間汗出。遍遍遍身汗出。卽差。常有人病翻胃。輒吐出。午後卽發。經三年不瘥。國醫如孫兆輩。皆治療無驗。消耗殆盡。有守庫卒季吉者。見之曰。此易治也。一服可瘥。始都不信。一日試令合藥。如法服之。汗出。皆如膠腥。穢不可近。當日更不復吐。遂瘥。楚人田醫善治小兒諸吐。亦用此藥。益兒長少。服一錢至一分。冷水調下。吐立定。此散極浮難調。須先滴少水。以至緩緩研殺。稍稍增湯。使令調和。若頓入湯酒。盡浮泛不可服。又予舊官屬陳宣德之妻。病翻胃。亦彌年。得一烏頭散服之。一服瘥。又楚人孫生有一茱萸丸。亦療翻胃。其人自有傳。今皆附于此。予校此三方。惟田季有陰陽理。故自勝捷。烏頭茱萸二方皆性熱。用者量其臟寒溫投之。

烏頭散

烏頭三兩。炮去皮　川楝子一兩半　檳榔　木香各一兩

右爲末。每服二錢。水一盞。煎至七分。鹽一捻。溫服。

茱萸丸　孫生傳曰。年深腸氣翻胃。飲食之物。至晚皆吐出。悉皆生存不化。腸上常有痰涎。時時嘔血。胸

中多酸水，吐清水無時，日漸羸瘦，腹中痛楚，時復冷滑，或即閉結，候狀不可盡述。自患此疾六年，百方無驗。因遇此法，服及兩月，諸疾悉瘥，嘗願流傳救人。具方如左。

吳茱萸（三分，瓦上焙出油）　胡椒　人參　當歸（各五錢）　甘草（半兩，一半生，一半紙裹五七重，醋浸，火內慢煨乾，再浸，如此七遍）　半夏（一兩，用薑四兩，研汁，入砂罐子內，用薑汁非水煮，候破，看存二分白心，取半夏切為膏子，半兩炒令，存性一分）

右為末，半夏膏丸如稍硬，添薑汁丸如桐子大。每服七丸，桑柳條各三十莖，上等銀器內煎湯吞下。日三服。忌諸毒物，惟可食油猪胰脾軟飯。此孫生自敍如此。

治噎方　廣五行記：治噎疾，永徽中，絳州有僧病噎數年，臨死，遺命令破喉視之，得一物，似魚而有兩頭，徧體悉是肉鱗，致鉢中跳躍不止。時寺中刈藍作淀，試取少淀放鉢中，此蟲繞鉢長遊，須臾蟲化成水。世人以淀治噎疾始此。張果醫說：病噎吐蛇，華佗行道，見一人病噎，嗜食而不得下，家人車載欲往就醫。佗聞其呻吟，駐車往視，語之曰：向來道傍有賣餅家，蒜虀大酢，從取三升飲之，病自當差。即如佗言，立吐蛇一條，縣之車邊，欲造佗，佗尚未還。佗家小兒戲門邊見自和謂曰：客車邊有物，必是逢我公也。疾者前入，見佗壁北縣此蛇，搖以十數。食飴至噎，吳廷紹為太醫令，烈祖因食飴喉中噎，國醫皆莫能愈。廷紹尚未知名，獨謂當進楮實湯一服，疾失去。羣醫默識之。日取用皆不驗，或扣之，答曰：噎因甘起，故以楮實湯治之。

槐花散　治熱吐

皂角（去皮，煨）　白礬（煅沸定）　槐花（炒黃黑色）　甘草（炙）

右等分為末，每服二錢，白湯調下。嘉興李使君曾病嘔，每食訖輒吐，如此兩月，服翻胃藥愈甚，或謂有痰，飲投半夏散服之，亦皆不驗。幕下藥判官授此服之，即時瘥。又有一老青衣，久病嘔，與服之，又瘥。大凡吐多是膈熱，熱且生痰，此藥能化胃膈熱涎，特有殊效。

紫粉丸　治吐

針砂醋浸一夜，劈破，便帶醋炒，直候銚子紅色無煙乃止，候冷，細研，更用醋糊火燒銅杵，取候冷，再研極細，糊丸如桐子大，每服四十丸，粥飲下，服訖便覆一盞許粥，已不吐。如未定，再服決定。小兒小丸之，隨兒大小與。此藥極神異，然吐有多端，良方中有數法，皆累驗者，可參用之。

軟紅丸　止吐

辰信（強各五分）　山脂（一錢）　巴豆（取霜七個）

右銘少許，入油三兩，和濃藥為劑，以油單裹之，大人如蕓豆，小兒如芥子。濃煎槐花甘草湯，放溫，下一丸。忌熱食。止藥療人吐，只一服止，嘗與人一丸，偶兩人病，分與兩人服，兩人皆愈。

酒磨丸　治吐逆粥藥不下者，万俟迹中濟急經驗單，用生薑丸彈子大，服法同。

五靈脂，狗膽汁和丸如雞頭實大，每服一枚，煎熱，生薑酒磨化，再湯令極熱，先煮溫粥半升，持在手，令病人乘熱頓飲，以粥送下。

蘇沈良方卷五

桂香散　治脾胃虛弱，并婦人脾血久冷。

高良薑（剉，炒香熟）　草豆蔻　甘草　白朮　縮砂肉　厚朴（去粗皮，剉，各一兩）　青橘皮（去瓤，炒黃）　訶子肉（各半兩）　肉桂（一分）　生薑（切）　乾肉（各一兩，二味，同厚朴一處，用水一碗，煮令乾，同杵為細末，焙乾用）

右同為末，每服二錢，入鹽少許，沸湯點，空心服。此藥偏療腹痛，天台呂使君自來有腹痛，疾發即悶絕，連日不差，有一道士點此散飲之，一服遂定，自後每發，即飲數服，痛如失去，子得之，累與人服，莫不神驗。治冷瀉尤妙。腹痛最難得藥，此方只是溫脾藥耳，特工止痛，理不可知。

引氣丹　理一切滯氣。

硃砂（研）　安息香（研）　麝香（研，各一分）　白荜茇（三百六十粒，炒）　大戟末（一錢七）　牛黃（研入）　牽牛末（一錢七）　五靈脂（研入）　乳香（研入）　沒藥（研入，各一錢）　斑猫（二十七箇，去翅頭足，研入）　巴豆（十七箇，研出油，助使快）

右件都研令勻，用紅米飯為丸如麻子，臨時湯下之。太醫潘環帶藥中常貯此藥，倉猝疾，多用之。

沈麝丸　治一切氣痛不可忍。

沒藥　辰砂　血竭　麝香　沈香（各一兩）　木香（半兩）

右皆生用，銀磁器熬生甘草膏，丸皁莢子大，薑煎湯嚼下。血氣，醋湯嚼下。松滋令萬君擬寶此藥，精

人血痛不可忍者。只一丸。萬君神祕之。每有人病。止肯與半丸。往往亦差。

礦石丸　治諸痰

硇砂一兩、水煮三九化、　巴豆霜二兩中、以上先煮、　青礦石半兩、　三稜一兩、醋煮一宿、以上次煮、　大黃一兩半、分三分煨、又次煮、　木香　檳榔　肉荳蔻　猪牙皁角去皮、炒、　肉桂　乾薑炮　丁香　蓬莪茂各一兩、　芫花醋浸一宿、炒微黃焙、　青橘皮　白荳蔻　墨燒八分油、各半兩、　胡椒　粉霜研、各一分、　麵二兩、酒半鍋化、又次煮、

以硇砂、醋、合巴豆煮兩食久。投礦石三稜。又投酒麵。又投大黃相去皆半食久。乃入衆藥。熬圓菉豆大。每服三五圓。酒飲雜下。凡癥積飲食所傷。氣凝穀食不化。皆能愈。

竭丸　消食化氣。止泄瀉。腹中諸冷疾。

烏頭炮、去皮、　桂　香附子微炒、　乾薑炮、　陳橘皮微炒、

右先用川巴豆取肉。麻油內。慢火煎。自旦及午。候巴豆如皁子色即止。淨拭。冷水中浸兩日。日再換水。又拭乾。研如油極細。須研一日方可用。以鐵匙刮起。薄攤新瓦上。如一重紙厚。候一伏時。以鐵匙刮下。再研。極細。每巴豆霜一兩。即諸藥各五兩為細末。水調成膏。與巴豆同研千萬匝。再用絹羅過。更研令勻。用陳米一升半。為細末。水調成膏。直候微酸臭。即煮為硬糊。細研。令無塊硬處。乃與衆藥為丸。如巴豆大。每服五七丸。隨湯使下。此只是食藥。然食藥方至多。無如此方者。能和脾、消氣、進食、止瀉、去積。凡食物藥隨服之即消。腹中不平。脾胃諸疾。服之莫不康泰。蘇州有人賣一銖砂丸食藥。無所不治。其效如神。以此致巨富。服其藥者徧天下。人無有得其真方者。後有親人竊得。乃與此一同。但加硃砂為衣耳。人家宜常合。長少皆可服。

神聖香薷散　治胃氣虛。霍亂吐瀉。轉筋腹痛。[原注]出奏藥五編。

香薷穗一兩半、新厚朴取心、川黃連各二兩、白扁豆炒、一兩

右先用薑汁四兩。一處杵黃連厚朴二味。令細。炒成黑色。入香薷扁豆二味。都為末。每服五錢。水一盞。酒一盞。共兩至一盞。入磁瓶內。蠟紙封。沈入井底。候極冷。一併服。二服。至死者亦活。京師有人賣此藥。一服三百錢。

治腹中氣塊方

大黃　鼈甲等分、生用、

右蜜丸梧子大。麝香水下二三十丸。空心服。日三服。貴州守李承議得嵐瘴。夫婦兒女數人相繼而死。有二子歸蜀北。皆病腹中有塊如瓜。瘦若欲死。陳應之與此方服。及三十服。氣塊皆消。應之云。此寒熱相雜。所當以寒熱二物攻之。

梔子湯　治胸痺切痛。

梔子二兩、　附子一兩、炮、

右每服三錢。水一大盞。薤白三寸。同煎至五分。溫服。泗州有人病歲餘。百方不效。服此二服。頓愈。

蘇合香丸　治肺痿、客忤、鬼氣、傳屍、伏連、硇礫等疾。又治心痛、霍亂、吐痢、及諸瘧、瘧血、月閉、痞癖、丁肥、驚痫、邪氣、狐媚、癲癇等疾。

蘇合香　白朮　硃砂　沉香　訶子肉　丁香　木香　香附子　白檀香　乳香　蓽撥　烏犀屑　安息香各一兩、　麝香　龍腦各半兩、

右為末。煉蜜丸如鷄頭實大。每服一丸。溫酒嚼下。人參湯亦得。此方人家皆有。恐未知其神驗耳。本出廣濟方。謂之白朮丸。後人編入外臺千金等方。其宗朝嘗出蘇合香酒賜近臣。又賜蘇合香丸。自此方盛行于世。此藥大能安氣血。卻外邪。凡疾自內作。不曉其名者。服此往往得效。惟治氣疰、氣厥、氣逆、氣不和、吐痢、榮衛壅塞、尤有神功。予所親見者。嘗有淮南監司官謝執方。因嘔血且久。遂奄奄而絕。計無所出。惟研蘇合香丸滌之。盡半兩。遂蘇。又有某船工病傷寒。日久而死。但心尚暖。不忍棄而不救。試與蘇合香丸滌之。四丸乃省。遂瘥。又友人為兩浙提點刑獄。嘗病大瀉。目視天地皆轉。諸藥不效。服蘇合香兩丸。頓覺輕爽。腹瀉亦止。予目覩救人于將絕者不可勝計。人家不可無此藥。以備急難。瘟疫時服之尤驗。倉猝求人參不得。只白湯亦佳。勿用酒。古方雖云用酒下。多不效。切宜記之。東陽劉使君少時嘗病瘧。日漸羸削。至于骨立。肌熱盜汗不止。人有勸服此藥。凡八九兩。即瘥。一方有牛黃半兩。古方無之。乃後人加也。

明月丹　治諸瘧。

兔屎四十九枚、　礜砂如兔屎相類大者、四十九枚、

右用生蜜為丸。以生甘草半兩碎。浸一夜。取汁。五更初下七丸。勿令病人知之。藥下後。頓看。若有蟲。急打殺。以桑火油煎使焦。棄惡水中。三日不下。更服。須月三日以後。望前服之。忌見喪服、色衣、婦人、貓、犬之類。後服治瘧補氣藥。取瘥。威懿孫元規藏此方。數能活人。江陰萬融病瘧。四體如焚。垂困。一夜夢神腹擁一月。大如盤。明爛不可正視。逼人心骨皆寒。已而悸寤。俄有人扣關。乃威懿使人遺之藥。服之遂瘥。問其名。則明月丹也。始悟向之所夢。大抵此藥最治熱瘧。又云傷寒頑燥骨熱皆治。

火角法　治久冷痰咳嗽及瘧嗽。服藥無效者。

雄黃蓮明不夾石者、半兩、　雌黃不夾石者、半兩、二味、同研極細、　蠟三兩、

右先鎔蠟令汁。下藥末攪勻。候凝。刮下。用紙三五段。每段闊五寸。長一尺。鎔藥蠟。塗其一面令厚。以竹筯卷成筒子。令有藥在裏。幹令相著。乃拔去筯。臨臥。熨斗內盛火。燃筒子一頭。令有烟。乃就筒子長引氣吸取烟。陳米飲送下。又吸。每三吸為一節。當大咳。咯出冷涎。即以衣覆臥。良久汗出。若病三五年者。二三吸即瘥。十年已上。瘦甚。咳聲不絕。胸中常有冷痰。服藥寒溫補瀉俱無效者。日一為之。不過五七日良愈。先君病痰嗽。胸中常如冰雪。三年而伯父繼咸嗽。又六年。羸瘠殆困。百方治之。皆莫愈。用此二三為之。皆瘥。

九寶散　治積年肺氣。

大腹皮（并皮用）　肉桂　甘草（炙）　乾紫蘇　杏仁（去皮尖）　桑白皮（各一兩）　麻黃（去根）　陳橘皮（炒）　乾海荷（各二兩）

右擣爲麄末，每服一錢匕，用水一大盞，煎子小便半盞，烏梅二箇，薑錢五片，同煎至一中盞，濾去滓，食後臨臥服。兩浙張大夫病喘二十年，每至秋冬輒劇，不可坐，百方不差。後得臨平僧法本方，服之遂瘥。法本凡病喘三十年，服此藥半年乃愈，永不復發。凡服此藥，須久乃效。

何首烏散　治脚氣流注，頭目昏重，肢節痛，手足冷，重熱，拘攣，浮腫，麻痺，目生黑花。

何首烏（水浸一日，切厚半寸，黑豆水拌勻，令溫，何首烏黑豆相間，蒸豆爛，去豆，陰乾，各半斤）　仙靈脾葉　牛膝（以上各酒浸一宿）　烏頭（水浸七日，入鹽二兩半，炒黃色，以上各半斤）

右每服二錢，酒下，或粥飲調下，日三服，空心食前。久患者半月效，先君同官王綽有女子病足攣拘二歲，得此方半月愈。予老姨亦病手足骨髓中痛，不能堪，久治不瘥，亦得此愈。

經效阿膠方　治嗽，并嗽血唾血。

阿膠（蛤蟆炒）　卷柏（去壓土）　生乾地黃　乾山藥　大薊（獨根者更佳，日影乾）　五味子（淨，各一兩）　柏子（別研）　茯苓　百部　遠志（去心，各五錢）

右擇好藥材，依方修製，擣羅爲末，煉蜜丸如彈子大，不拘時候，用濃煎小麥，并麥門冬湯嚼下半丸，加至一丸。若覺氣虛，空心不用服。

灸咳逆法　予族中有病蛔亂吐痢垂困，忽發咳逆，半日之間，遂至危殆。有一客云，有灸咳逆法，凡傷寒久疾得咳逆，皆爲惡候，投藥皆不效者，灸之必愈。予遂令灸之，火至肌，咳逆已定。元豐中，予爲鄜延經略使，有幕官張平序病傷寒已困，一日官屬會飲，通判延州陳平裕忽言，張平序已屬纊，求往見之。予問何遽至此，云咳逆甚，氣已不屬。予忽記灸法，試令灸之，未食頃，平裕復來，喜笑曰，一灸遂瘥。其法乳下一指許，正與乳相直骨間陷中，婦人即屈乳頭度之，乳頭齊處是穴。艾炷如小荳許，灸三壯，男灸左，女灸右，只一處，火到肌即瘥，若不瘥，則多不救矣。

光活散　止咳逆（案三因方有丁香一兩）

光活（附子（炮））　茴香（微炒，各半兩）　木香　乾薑（炮去土，各一兩）

右每服二錢，水一盞，鹽一捻，同煎一二十沸，帶熱服，一服止。

治肺喘方

游頭葉（蔓似紫藥，尤柔脆，背白，假熱羊皮，經冬不凋，花正如丁香，擣細如絲，綿裹之，風吹則搖搖然，冬末生花，子春乃熟，實，一如山茱萸，味酸可喫，疾甚爲熱，其木甚大，吳人名牛舍，江南名宋，京師名紙錢樹，蜀漢名黃蠟樹）

右一物爲末，每服二錢，或溫水調下，發時服，有患喘三十年者，服之皆愈。疾甚者，其疾即瘥，一方用人參等分。

硃砂膏　鎮心安神，解熱及損嗽血等疾。

硃砂（別細研）　生犀　琥珀　眞珠末　蘇合香（用油和藥，亦可）　銀鼎粉（各一兩）　牛黃　麝香　生腦子（研）　新羅人參　甘草（微炒，各一兩）

蘇沈良方卷六

硃砂　琥珀（別研）　羚羊角　安息香（酒蒸，去沙石，別研，各半兩）　遠志（去心）　茯苓（各半兩，下四味同擣）　金末（一分，用箔子，研）

右都爲細末，拌和，煉蜜，破蘇合油劑諸藥爲小錠子，更以金箔裹之，磁器內密封，每用一皂子大，食後含化。衛尉藥丞得效，并阿膠丸相雜服，此藥治血安神，更勝至寶丹。

蘇珠丹　鎮心空腦，去人邪氣及婦人血攻寒熱等疾，但驚憂成病皆主之。

辰砂（一兩二分，鳳尾草一握，水研，煮砂一食久，水洗乾，別研）　桃仁（四十九枚，生）　牛黃（一分）　麝香（二錢）　阿魏（湯浸切，微炙）　木香（各半兩）

右丸如豆大，五七至十圓，婦人桃仁酒湯下，丈夫桃仁鹽湯下，侍郎郎簡之妻，因悲憂病，腹中有兩塊，皆如拳，每相衝擊，則悶絕，堅不可破，臥蓐餘，服此藥，兩塊皆失所在。

至寶丹　本池州醫鄭感慶，曆中爲予處此方，以其屢效，遂編入鹽苑。

生烏犀　生玳瑁　琥珀　硃砂　雄黃（各一兩）　牛黃　龍腦　麝香（各一分）　安息香（一兩半，酒浸，蒸令化，濾去滓，約取一兩淨）　金箔（五十片）

右丸如皂子大，人參湯下一丸，小兒量減。傷說主疾甚多，此丸專療心熱血凝，心膽虛弱，喜驚多涎，眠中驚悸，小兒驚熱，女子憂勞，血瀝血厥，產後心虛怔忪，尤效。血病，生薑小便化下。

蘇沈良方卷六

四神散　治血氣心腹痛。

當歸　芍藥　川芎（各一兩）　乾薑（半兩，炮）

右每服二錢，煖酒調下，予每作以療婦人氣痛，常以一服瘥。

千緡湯　急下涎。

濟州半夏（七又，病裂，四破之）　皂角（去皮，炙，一寸半）　甘草（一寸）　生薑（兩指大）

右同以水一椀煮，去半頓服，沈待制與宗常病痰喘不能臥，人扶而坐數日矣，客有見之者，曰，我曾如此，得藥一服瘥，我以千緡酬之，謂之千緡湯，可試爲之，與宗得湯一啜而愈。

白雪丸　治痰涎，胷膈，嘈逆，及頭目昏眩，困倦眼痛。

天南星（炮）　烏頭（炮，去皮）　白附子（生）　半夏（洗，各二兩）　滑石（研）　石膏（研）　龍腦（研）　麝香（研，各一分）

右麵和爲丸，梅核爲妙，如菉豆大，每服三十丸，薑蘆茶或薄荷茶下，予每遇頭目眩困，精神惛昏，胷中痰逆，憒憒如中酒，則服此藥，良久間，如睡去，重裘，豁然清爽，頓覺夷暢，食後服爲佳。

龍膽丸　解暴熱，化涎，涼膈，清頭目。

草龍膽　白礬（燒令定，各四兩）　天南星　半夏（各二兩半，以水浸，切作片，用礬水雪水蒸半，同煮三五沸，焙乾，取各秤二兩）

右爲末，麪糊爲丸，極稀爲妙。如桐子大，每服三十丸，蠟茶清下，食後臨臥服。應痰壅腦熱，頭目昏重，服之嚥清，嚥有痰毒，纏繞意思昏悶，速服便解。咽喉腫痛，口舌生瘡，凡上壅熱涎諸證，悉可服。小兒尤良。

治內障眼　本草云：熟乾地黃、麥門冬、車前子、楊傳治久患內障眼有效，屢試之信然。其法細擣，羅蜜丸如桐子大，每服溫酒熟水任下。然三藥皆潤，難擣，旋焙，旋擣和合，最當甘香，眞奇藥也。

還睛神明酒

黃連五兩　石決明　草決明　硝石　生薑　石膏　蕤仁　秦皮　山茱萸　當歸　黃芩　沙參　朴硝　甘草炙　芍藥　澤瀉　桂心　麝子　車前子　淡竹葉　柏子仁　防風　川烏頭　辛夷　人參　川芎　白芷　蕤麥　桃仁去皮尖雙仁　細辛　地膚子已上各三兩　龍腦三錢　丁香半兩　真珠生二十五粒

右㕮咀，練鑊盛，用好酒五斗，甕中浸之，春秋十四日，夏七日，冬二十一日。食後服半合，勿使醉吐。稍稍增之，百日後，明目如舊。忌熱麪、酢漿、穢臭、五辛及豬魚鷄鴨驢肉、生冷、粘滑、入房、悲怒、大勞、大憂愁、大寒熱、悉慎之。惟不療枯睛損破者。但白睛不枯損，服此藥更生瞳子，平復如故。出五符漢司空倉元明。兩目盲，經十五年，兩瞳子俱損，翳出如雲，赤白膚肉如乳頭，服此酒未滿百日，兩目還得清淨，夜任針，勝如未患時十倍。晉大夫子公失明，經二十餘年，不辨明夜，兩目俱損，無瞳子，身年七十，服此酒一百日，萬病除，兩目明，見物益明。予表親有病目者，服此酒十餘日，翳皆消盡。

治諸目疾

用盛熱湯酒器，銅器尤佳，以手掬熨眼，眼緊閉勿開，亦勿以手揉眼。但掬湯冷即已。若有疾，一日可三四爲之，無疾，日一兩次，沃令眼明。此法最治赤目及臉瞤痒。予自十八歲因書小字病目，楚痛凡三十年，用此法，遂永瘥。楊密郡興宗苦目昏，用此法，踰年後，遂能燈下觀細字。大率血得溫則榮，榮目。目全要血養，若衝風冒冷，歸即沃之，極有益于目。

點眼熊膽膏

古銅錢二十一枚，完用　菊花四兩　黃連　鬱金　黃蘗各二兩，以上搗花搗碎，黃連以下三物細剉，用水二升，銀石器中慢火熬十一升，新布濾去滓，入後藥　鉛丹　玄精石　井泉石　龍骨　不灰木　蕪荑去皮　蕤仁去殼　代赭石各半兩　滑石　烏賊魚骨去殼處，各一兩，以上細研成膏粉，入蜜六兩，井南頭汁和勻，銅器中，重湯煮六時，再以新絹絞濾去滓，入後藥　硼砂　鯉鱗燒　沒藥　青鹽　銅青各半兩　川牙硝一兩　乳香分　麝香　生龍腦各一錢　水銀粉二錢　熊膽半　雄雀粉七粒　硇砂一錢半

右並細研，羅過，再研，如麪，入前藥內，再用重湯煮如稀餳，如要爲丸，即便熬，可丸即丸如梧桐子大。每用一丸，水化，並以銅筯點兩眥。此本舒州甘露山儀長老方，治目疾殊聖。久患瘜肉、瞼爛、諸疾，點此無不差者。裹赤目、風痒，只點三兩次，即差。有人瘜肉滿眼，用此亦消盡。清明如未病時，熬藥須用銀器，皆須上品藥，洗澄揀擇極細，方有效。

蘗實散　治眼。

蘗麻子，以柳木製磑子磨之，馬尾篩取黃肉，其烏殼棄不用。每十兩可得四兩精肉，非柳木磑不能去殼碾爲末。取豬豬肝薄切，裹藥中，令相著，用綫火炙肝熟，爲末，臨臥，陳米飲調下二錢。一法，煎醋酸醋爲丸，每服二十丸。一法取蘗實內囊蒸一次，纔乾爲末，或散或蜜丸，溫水下。予親家女子兒童時病翳，一日中五翳，病十五年，治之莫愈，醫者皆以爲不可療之疾。試用炙肝散十許日，一翳消盡。

治眼齒　前日與歐陽叔弼、晁無咎、張文潛、同在戒壇。余病目昏，數以熱水洗之。文潛曰：忌點洗，目有病，當存之。齒有病，當勞之，不可同也。治目當如治民，治齒當如治軍。治民當如曹參之治齊，治軍當如商鞅之治秦，頗有理，故追錄之。

鷄鳩丸　治內障、青盲、翳瞳、及時暫昏暗、一切眼疾。

花鳩一隻，去毛腸嘴爪，炙熟　羊肝一具，炒　細辛　防風　肉桂　黃連　牡蠣　甘菊花　白蒺藜各五兩　白茯苓　瞿麥各四兩　羌活三兩　蓽菁子二升，蒸三炊　蕤仁半升　決明二合

右煉蜜丸如桐子大，每服二十至三十丸，空心日午臨臥茶酒下。半月見效，忌房事、五辛、豬、雞、魚、蒜。楚醫陳中立雙盲數年，服此，親物依舊。

偏頭痛方

裕陵傳王荊公偏頭痛方云：是禁中祕方，用生萊菔汁一蜆殼，仰臥注鼻中，左痛注右，右痛注左，或兩鼻皆注亦可。數十年患皆一注而愈。荊公與僕言，已愈數人。

硫黃丸　治頭痛。

硫黃二兩，細研　硝石一兩

右水丸指頭大，空心嚼茶嚥下。予中表兄病頭風二十餘年，每發，頭痛如破，數日不食，百方不能療。醫田滋見之曰：老母病此數十年，得一藥遂效，就求得之十丸，日服一丸，十餘日後，滋復來云：頭痛平日食何物即發，答云：最苦飲酒食魚，滋取魚酒令悉食云，服此藥十枚，豈復有頭痛耶？如其言食之，竟不發。自此遂瘥。予與滋相識數歲，臨別以此方見遺。陳州懷醫有此藥，丸如梧桐子大，每服十五丸，暑暍惱冒者，冰冷水服，下咽即豁然清爽。傷冷，以沸艾湯下。

葫蘆巴散　治氣攻頭痛。

葫蘆巴微炒　三棱煨，醋浸一宿，炒乾各一兩　乾薑炮，一分

右爲末，每服二錢，溫生薑湯或酒調下。凡氣攻頭痛，一服即瘥，萬法不愈。頭痛如破者，服之即愈。尤利婦人。姻家有病，瘧差後頭痛，號呼十餘日，百方不效，用一服，如失。小小頭痛更捷。

治鼻衄

取河陽石炭心，如無，只用光明者爲末，新水下，立止。又法：鼻左衄，用綿塞右耳；右衄，塞左耳，神應。余

亦曾用之。

刺薊散　治鼻衄。

大薊根一中用，相思子用。

右每服十錢，水一盞，煎至七分，去滓，放冷服。王朝散女子大衄，一日已昏不識人，舉家發哭，用藥皆無效，有人傳此方，一服止。

治鼻衄不可止，欲絕者。

用茅花，無即以根代。每服一大把，剉，水兩椀，煎濃汁一椀，分二服。林次中御史在楚中，皆訪一故人，久之不出，或問之云，子婦衄血垂盡，方救視，未及延客。坐中一客云，適有藥，急令掇茅花一大把，煎濃汁一椀，帶滓中取一小紅丸三粒，茅花煎湯吞下，一服即瘥，而不言其方。後有人聞之曰，此止是茅花之功耳，試復問之，其人大笑曰，儻如此，紅丸乃含香硃砂丸，恐不信茅花之功，以此爲記耳。予在鄜延，一將官卒病衄甚困，以此療之即瘥。又徐德沾救衄者，急灸項後髮際兩筋間宛宛中三壯，立定，蓋血自此入腦注鼻中，常人以線勒頸後，尚可止衄，此灸決效無疑。

又方　用清蜜納鼻中，即止。

又方　治鼻衄久不止，昏晕。

櫻櫚皮不以多少燒灰。

右隨鼻左右搐之。

綠雲膏　治口瘡。

黃蠟半兩，螺子黛二錢。

右同研如碧玉色，臨臥，置舌根下一字，嚥津無妨，連朔差。凡口瘡不可失睡，一夜失睡，口瘡頓增。

灸牙疼法

隨左右所患眉尖微近後骨縫中，小舉臂取之，當骨解陷中，灸五壯，予自觀灸數人皆愈，灸畢，項大痛，良久乃定，永不發。予親病齒，百方治之皆不驗，用此法灸，遂瘥。

服松脂法

松脂以真定者爲良，細布袋盛，清水百沸湯煮，浮水面者以新竹罩籬掠取，投新水中，久煮不出者，皆棄不用。入生白茯苓末不製，但削去皮，擣羅細末耳，拌勻，每日早取三錢匕，著口中，用少熱水攪漱，仍以指如常法熱揩齒畢，更以熱水嚥之，仍以漱吐如常法，能牢牙駐顏烏髭也。

水氣腫滿法　張微之嬢驗，聖濟總錄，名南陸豆湯。

生商陸切作麻豆，赤小豆如商陸之多，鯉魚三枚，去鱗，存腸。

右二物，實魚腹中，取益線縛之，水三升，緩煮，赤豆爛，取去魚，只取二物，空腹食之，以魚汁送下，不汗利即差，甚者二日再爲之，不過三劑，微之家乳姥病水飲，一劑愈。

遂氣散　博濟治氣。

白商陸根去粗皮，薄切，陰乾，或曬乾。

右爲末，黃顙魚三尾，大蒜三瓣，蓽茇一合，水一升，同煮，以茇爛爲度，先食茇，飲汁送下，又以汁下藥末二錢，水化爲氣，內消，省郎王中病水氣，四體悉滿，不能坐臥，夜倚壁而立，服一劑即愈。

二蓽散　治小腸氣。

高良薑　乾薑等分，炮八分，檳榔二分，椎。

右一大錢，用綿裹子去皮，細研，紙裹出油，取白粕八一字，將熱酒一盞，入豬膽汁十數滴，同調下，一服瘥。

川楝散　治小腸氣，下元閉塞不通。

川楝子一兩，和皮破爲四片。　巴茇一兩，井殺連令碎。

右用帶殼巴茇一兩，槌令碎，同和勻，入銚內，炒令紫色，取出，去巴茇，只取川楝子，淨刷，去末，每服一錢，先炒茴香，秤一錢令香，用酒一盞沖，更煎三五沸，去滓，調川楝子末，連進一服，得下泄立瘥，此方同治遠年裏外臟痛，方于建安軍中人吳美得之。

倉卒散　治小腸氣。

山梔子四十九枚，燒半過。　附子一枚，炮。

右每服二錢，酒一盞，煎至八分，入鹽一捻，溫服，脾腎氣攣急極痛，不可屈伸，腹中冷重如石，痛不可忍，自汗如瀉，手足冰冷，久不差，臥欲死者，服此藥一劑甚者兩服瘥，余自得效，亦屢以治人，皆驗。

斷弓弦散　治小腸氣。

五靈脂　蒲黃等分。

右二物，先用醋酷一合，熬藥成膏，以水一小盞，煎至六七分，熱呷，此又名失笑散，療婦人血氣尤驗，曾有婦人病心腹痛欲死，十餘日百藥不驗，服此亦愈。

治小便數方　并治渴。

取純糯米糕一手大，臨臥炙令軟熟，嚼之，以溫酒送下，不飲酒人，溫湯下，多嚼彌佳，行坐良久，待心間空，便睡，一夜十餘行者，當夜便止，予嘗以爲戲術，與人賭物，用之如有神聖，或言假火氣溫水送，不然也，大都糯稻工縮水，凡人夜飲酒者，是夜輒不尿，此糯米之力也，又記一事，予故人劉正夫罷官閬州，次建溪，叩一大家求舍，閉門不納，既而使人謝云，其父有甚病，不能延客，劉問其狀，曰，疾渴，殆死矣，劉許爲其營藥，俄而其子弟輩至，求治其父，劉即燒藥與之，明日來謝云，飲藥一杯，是夜飲水減七八分，此劉君目擊者，其方用糯稻稈，斬去穗及根，取其中心，淨器中燒作灰，每用一合許，湯一碗，沃浸良久，澄去滓，嘗其味如薄灰汁，乘渴頓飲之，此亦糯米縮水之一驗也，故因附此。

又方　治小便不通

琥珀研成粉，每服二錢，煎萱草根濃汁調下，空心服。予友人付小腸閉甚成淋，每旋只一二滴，痛楚至甚，用惡藥逐之，皆不通。王郇公與此藥一服遂通。人有病痔腸脫，因不能尿，候如淋疾，他藥不能通，惟此法可治。

茯苓散　治夢中遺泄。

堅白茯苓爲末，每服五錢，溫水調下，空心食前臨臥服。一日四五服，方審言夢泄，皆云腎虛，但補腎澁精，然亦未嘗有驗。予驗之，此疾有三證，一者至虛，腎不能攝精，心不能攝念，或夢而泄，或不夢而泄，此候皆重，須大服補藥，然人病此者甚少，其餘皆只是心虛，或心熱，因心有所感，故夢而泄，此候差輕。人之患者，多是此候，但服茯苓散自差。予累以拯人，皆良驗。又有少年氣盛，或餘夫道人，極制情欲，因念而泄，此爲無病，腎及攝生家多言夢寐甚于房勞，此殆不然。予嘗驗之，人之病天行未復，而犯房勞者，多死，至于夢寐，則未嘗致因，此決然可知。但夢寐自有輕重耳。

香薷散　治久患脾泄。

生薑四兩，黃連一兩。

右剉如荳大，慢火一處炒令薑乾脆深赤，去薑，取黃連爲細末，每服二錢，空腹蠟茶清下，不過二服，即愈。

藥下方

歐陽文忠公嘗得藥下，國醫不能愈，夫人云，市人有此藥，三文一貼，甚效。公云，吾輩臟腑與市人不同，不可服。夫人使以國醫藥雜進之，一服而愈。公召賣者厚遣之，求其方，久之乃肯傳，但用車前子一味爲末，米飲下二錢匕云。此藥利水道而不動氣，水道利則清濁分，穀臟自止矣。

治瀉痢方

肉荳蔻刻作甕子，入通明乳香少許，復以末塞之，不蓋，即用麪和少許，裹荳蔻煨熟，焦黃爲度，三物皆研末，仍以茶末對烹之。

四神散　治痢。

乾薑　黃連　當歸　黃柏皆炒，各等分。

右爲末，烏梅一箇，煎湯調下二大錢，水瀉等分，赤痢，加黃藥，白痢，加薑，後重腸痛，加黃連，腹中痛，加當歸，並空心食前服。予家常作此藥，夏月最獲用，大凡瀉痢，宜食酸苦，忌甘鹹，蓋酸收苦堅，甘緩鹹滯，不可不知也。

芍藥散　治痢。

茱萸炒，半兩，　黃連炒，　赤芍藥各一兩。

右三味，水煎服。

陳廉之藥痢血方

丞相曾魯公痢血百餘日，國醫無能療者，廉之取鹽水梅除核，研一枚，合蠟茶，加醋湯沃服之，一服而瘥。又丞相莊肅梁公亦痢血，廉之曰，此授水穀，當用三物散，亦數服而愈。三物散用胡黃連、烏梅肉、竈下土等分爲末，蠟茶清調下，食前空腹溫服。

楝根散　治水瀉，裏急後重。

楝根皮一兩，　枳殼一兩，　甘草一錢。

右粥飲下二錢，食前一服止。

健脾散　治胃虛洩瀉，老人臟泄，尤效。

烏頭三分，地，　厚朴薑汁炙，　甘草炙，　乾薑地，各一分。

右服一錢，水三合，生薑三片，煎至二合，熱服，并二服止。予家嘗貯此藥，治脾泄極驗。

憲宗賜馬總治瀉痢腹痛方

生薑和皮，切碎如粟米，用一大盞，并草茶，相對煎服。元祐二年，歐陽文忠公得此疾，百藥不效，予傳此方而愈。

治腸痔下血如注，久不差者。

用市河中水，每遇更衣罷，便冷沃之，久沃爲佳，久患者皆瘥。予始得于信州侯使君，曰沃之兩次即瘥。予用之亦再沃而瘥，并與數人用皆然，神奇可驚，不類他藥，無河水，井水亦可。

療寸白蟲

錫沙作銀浣者，即以黃丹代，油和桐子大。　蘗茗　槟榔二物等分爲末。

右煎石榴根濃汁半升，下散三錢，丸五枚，中夜服，旦日下。予少時病白蟲，始則遺粳米，數歲之後，遂長寸餘，古說蟲長盈尺，人即死，以藥攻之，下蟲數合，或如帶，長尺餘，蠕蠕如豬腦，熠熠而動，其末寸斷輒爲一蟲，去病少已，後數月復如初，如是者數四，後得此方服之，蟲悉化爲水，自此永斷。

蘇沈良方卷七

小還丹、治背疽難瘥，一切膿腫。

胭粉　水銀　硫黃同研，各一分。　大巴豆肉四十粒。

右將巴豆罩覆排銚底，以三物按上巴豆，令平，以瓷蓋蓋之，四面濕紙封，慎勿令氣洩，炭火四兩緩燒，時于水中蘸銚底，少時又燒，頻蘸為善。其蓋上底內滴水一點，如大豆，乾則復滴，以三滴乾為度。候冷，研陳米飲丸作二十三丸，熱水吞下，疏下惡物，以白粥補之。吳中往往用此活人，曾無失者。

柞葉湯　治發疽。

柞木葉乾，荷葉乾，各四兩。　萱草根乾，甘草節生，各一兩。　地榆一兩。

右細剉，每服半兩，水二椀，煎去半，分二服，早晚各一服。二服滓併煎作一服，有膿血在內自大腸下，未成者自消，忌一切毒物，有瘡者，貼後藥。

通明牛皮膠水半升，熱令化。　黃丹入膠中，煮三五沸，各一兩。

右放溫冷，以鵝羽傅瘡口，瘡即斂，未成瘡者，塗腫處即內消。丞相王荊公疽發背，醫攻之，皆不效，漸覺昏懵不省人事，上元縣朝奉郎梁湜章有藥，自言其效如神，荊公服之，利下惡物一升許，遂甦，乃以方獻丞相，予從丞相得之，此藥常人服之，並不疏轉，但逐膿血耳。

療腫毒難瘥，未潰令消，已潰令速愈。

草烏頭屑，水調，鵝羽掃腫上，有瘡，先以膏藥貼定，無令藥著瘡，人有病瘡腫甚者，塗之，坐中便見皮皺，稍稍而消，初塗病人覺冷如冰，瘡乃不痛。

白膏　登州孫醫方，善消腫及鑿擊所傷。

柳白皮半兩，洗。　白蠟四錢。　黃丹二錢。　胡粉　當陸根各三兩。　油四兩，熱三兩八錢。

右先熱油，入柳皮，候變色，去滓，入諸藥，數攪，良久下。

治雞疽方

忍冬嫩苗一握。　甘草半兩，生用。

右忍冬爛研，同甘草入酒一觔半，砂瓶中，塞口，煮兩食頃，溫服，予在江西，有醫僧鑒清善治發背疽，得其方，用老翁鬚，余頗神秘之，後十年過金陵，問醫王琪亦善治瘍，其方用水楊藤，求得觀之，乃老翁鬚也，又數年，友人王子淵自言得神方，嘗活數人，方用大蘇蕷，又過歷陽杜醫者治瘍，嘗以二萬錢活一人，用千金藤，過宣州，寧國尉王子駁傳一方，用金銀花、海州士人劉純臣傳一方，用金釵股，此數君皆自神其術，求其草視之，蓋一物也，余以本草攷之，乃忍冬也，古人但為補藥，未嘗治疽，其用甘草煮飲之法，製方皆同，若倉卒求不獲，只用乾葉為散，每服三方寸匕，甘草方寸匕，酒煮服之，亦可，然不及生者。　忍冬葉尖莖圓，生莖葉皆有毛，田野籬落處處有之，兩葉對生，春夏新葉，梢尖而色嫩綠柔薄，秋即堅厚，色深而圓，得霜則葉卷而色紫，經冬不彫，四月開花，極芬芳可愛，似茉莉瑞香，初色白，數日變黃，每黃白相間，故一名金銀花，花開曳蕊數莖如絲，故一名老翁鬚，一名金釵股，冬間葉圓厚似蘇蕷，故一名大蘇蕷，可移根庭檻間以備急。

治雞疽瘡久不合方

僕嘗讀本草，露蜂房、蛇蛻皮、亂髮、各燒灰，每味取一錢匕，酒調服，治瘡久不合，神驗，僕屢試之，燒灰略存性。

雲母膏

雲母光明者，薄揭，先煮。　硇石研。　甘草各四兩。　槐枝　柏葉遠道者不堪。　柳枝、桑白皮各二兩。　陳橘皮一兩。

桔梗　防風　桂心　蒼朮　菖蒲　黃芩　高良薑　柴胡　厚朴　人參　芍藥　胡椒子　芎藭　白芷　白芨　白斂　黃芪　芎藭　茯苓　夜合花　附子地，各半兩，炮上。　乾，各半兩，炮。　已上為末。　松脂　當歸　木香　麒麟竭　沒藥　麝香　乳香各半兩。　黃丹十四兩。　鹽花五錢。　水銀二兩。

右先煉油令香，下雲母，良久，投附子，已上藥，候焦黃，住火令冷，以絹濾去滓，始下末，皆須緩火，常以柳木篦攪，勿停手，濾畢，再入鐺中進火，下鹽花，至黃丹急攪，須臾色變，稍益火煎之，青色凝黑，少取滴水上，凝結不粘手，即下火，先炙一磁器令熱，傾藥在內，候如人體溫，以絹袋子盛水銀，手彈在膏上，如針頭大，以蠟紙封合，勿令風乾，可三二十年不損。發背，先以敗蒲一觔，水三升，煮三五沸，候如

人體溫，將洗瘡帛拭乾，貼藥。又以藥一兩，分三服，取溫酒下。未成膿者，即差。更不作瘡，瘡癢骨疽毒穿至骨者，用藥一兩，分三服，溫酒下。甚者，即下惡物，兼外貼。腸癰以藥半兩，分五服，甘草湯下。未成膿者，常時消。已有膿者，隨藥下膿。膿出後，每日酒下五丸，桐子大。膿止即住服。風眼，貼兩太陽，脅癰，并傷折痛不可忍者，酒下半兩。老少更以意加減。五日一服。取盡。外貼包裹。當時止痛。箭頭在肉者，外貼，每日食少爛豉豆，箭頭自出。虎豹所傷，先以甘草湯洗，後貼。每日一換，不過三貼。蛇狗傷，生油下十丸桐子大，仍外貼。難產，三日不生者，溫酒下一分便下。血暈欲死，以薑汁和小便半升，溫酒下十丸桐子大，死者復生。胞死在腹，以榆白湯下半兩，便生。小腸氣，茴香湯下一分，每日一服。血氣，當歸酒下一分，每日一服。中毒，溫酒洗汗穢汁，每日一服，吐瀉出惡物為度。一切癰疽瘡癤，並外貼，急羊肉。

國史補言有白岑者，療發背甚驗，為淮南節度使高適脅取其方，然不甚效。岑後至九江，為虎食。驛吏于囊中得其真方，太原王昇之寫以傳布。後魯國孔南得岑方，為王傳號靈方。今具于後。【案原方缺】

呂君子西華，洛陽人，孤貧無家，著作郎韋顯與其先有舊，以其子妻之。應秀才，五舉不第，與同志張元伯入王屋山，時莫知者。俄西華疽發背，膿血被身，筋骨俱見。告元伯曰：吾將死矣，幸扶至水傍。俟天命而已。元伯無可奈何，因從其言。露臥數宿，忽有一胡僧振錫而至，視其瘡曰：膜尚完，可治也。乃出合中藥，塗于軟帛上，貼四五日，生肌。八九日肉乃平。飲膳如故。僧云：吾將去，他時慮發此疾，無藥療，因示其方，約令秘之。西華頓首曰：微吾師，遺骸丘畝矣，無力未能報，願少仲區區，可遽言別乎。僧曰：始以君病而來，今愈吾去矣，安用報為。乃去，數步之間，不復見。西華歸，以事白韋。韋因請其方，西華不與，韋知其終不可得，乃白于致功裴輝，卿員外，請以名第略而取之。裴如其言，西華對曰：恐修文以求名，不法方以求進，竟下第而返。後河南尹聞之，餉韋曰：有一計取之。韋曰：何計。曰：陷于法禁，免其罪而購之。逾月，果罹其罪，獄成，引決。親喻之，令出其所秘方，可以免害。西華守死無求免之色，尹無奈何，乃釋之。西華知失致功之旨，又見薄于外舅，雖苦目甚，而文趣轉疎，如是經五稔。見黜于春官，乃罷去，薄遊梁宋間，值姨弟李潛尉封丘，淹延半歲，以酒食過盡，疽復發，既篤，欲以前方療之，懼人知之，憂疑阻喪，久不能決。潛知意，乃喻之曰：聞兄神授名方，今病亟矣，奈何懼潛見方之故，忍死而不治，豈保生承繼之意耶。西華不得已，乃口授之。潛欲審其意，皆三反而復之。及藥成，潛親傅之，尋疾平，乃遊荊蠻，不知所之。潛于是手疏五十本，遍遺親識，以焉。西華之靈，前潤州金壇縣尉得其方，嘗遊西蜀，活將死者五六人，每欲傳其事，貽于後，以家故衍役，未諧此意。貞元十年冬十月，偶于秋浦，與張愿同詣周南宅，夜話既久，言及方書，遂授之于周南，令志之。

方曰：此發背者，自內面出外者也。熱毒中腦，上下不已，蒸背上盧處，先三五日，隱脈妨悶，積漸成腫，治出皮膚，結聚成膿也。其方如後。【案】此節文義不甚可解，疑有錯落。

白麥飯石（色黃，類麥飯，若尤佳。炭火燒，取出，醋中浸十遍。）　白斂末　鹿角（二三寸，燒之，不用白脫者，元參幅竹者，炭火燒，煙盡為度，杵為末，各等分。）

右並搗細末，取多年米醋于銚中煎，並令魚眼沸，即下前件藥末，調如稀餳，以篦子塗傅腫上，只當瘡頭留一指面地，勿令合，以出熱氣。如未膿，當內消。若已作頭，當撮小，若日久瘡甚，肌肉損爛，筋骨出露，即布上塗藥貼之。瘡上乾即再換，但以膿中不穴，無不差。瘡切忌觸手，宜慎之。劉夢得傳信方亦有，不及如此之備。

小硃散　治癰瘡久不瘥，每發，或先心腹痛，痰嗽麻痺，筋脉不仁。

成塊赤土（有砂石者不可用。）　當歸（各等分。）

右冷酒調下二錢，日三服，兼用塗藥。

護火草（大葉者，又名炎天。）　生薑（和皮不洗，等分，研。）　鹽（量多少。）

右塗癰痒處，如遍身癰瘡，塗發甚處，餘處自消。

治發瘡瘡不透，膏伏危困者。

以人牙齒三五枚，炙令黃，為末。乳香湯調下。余目見兩人用之，皆一服差。一方燒過，溫酒下，亦可服。

訖片時瘡便透。

柴胡湯　治瘰癧。

柴胡　荊芥穗　秦艽　知母　當歸　官桂　藿香　甘松　敗龜（燒。）　川烏頭　地骨皮　白膠香　白芍藥（以上各半兩。）　京芎藭（一兩。）　葶根（減稱二兩。）

右藥並淨洗曝乾，搗羅為末，每服二錢，水一盞，入薑三片，大棗一箇，同煎七分，去滓服，早午食後夜睡各一服。三服滓又煎一服。忌一切魚麵等毒，仍忌房事。不善忌口及諸事者，服此藥無驗。又用貼瘡藥，石行根，不以多少，為細末，用蜜調如膏藥，用貼瘡口，兩三日一看，頻易之。此二方得于華亭陶中夫宰君。中夫先得柴胡一方，用之如神。又于里巷醫處得此貼藥方，相須冥若神契。中夫在華亭半年之間，治二十餘人皆愈。此予寓秀州所目見者。

人方

取鯽魚，長三寸者，去腸，以和皮巴豆塡滿腹，麻皮纏，以一束稈草燒，烟盡，研，硬米粥丸菉豆大，菉飲下一丸，未利，加一丸，以利為度。每日以此為準。常令小利，盡劑乃安。甚者破者效尤速。忌豬肉動風物。

祛風丸　治風毒瘰癧。

皁莢（三十枚，十枚大燒過，十枚塗麻，炙，去皮子，十枚，水浸，細去滓。）　何首烏（蒸。）　乾薄荷　元參（各四兩。）　精羊肉（半斤。）

右以皁莢水煮肉使爛，細研，和藥為丸，梧桐子大。每服二十丸，空心溫酒下。薄荷湯亦可。伯父吏部病瘰癧，百療不差，得此乃愈。梁氏老嫗，頸下有瘡如垂漿，閻侍郎嘉履病瘰癧，服之皆半月愈。此皆予

地骨皮一物。先刮去浮皮。別收之。次取浮皮下二白粉爲細散。其白粉下。堅赤皮細剉。與浮皮一處。爲麄末。麄末細散各貯之。每用麄皮一合許。煎濃汁。乘熱洗瘡。直候藥湯冷。以軟絲囊乾。乃用細散傅之。每日洗貼一次。以瘥爲期。梓州路轉運判官張君。曾當胸下鋭骨端。隱隱微痛。後月餘。漸有小瘰子如豆粒。久之愈大如栗。遂潰膿成瘡。痛楚不可臥。每夜倚物而坐至曉。如此三年不瘥。國醫仇鼎沈遇明。皆治之。都不驗。後赴梓州。行次華陰道中。有舊相識華山道士武元亨來迎。就客亭中見之。元亨曾問胸瘡如何。張答以未瘥。元亨曰。嘗得一藥。效驗無比。久欲寄去。不值使人。聞常道過華陰。特來此奉候。已數日。今日方欲還山。而公適至。殆此疾當瘥矣。遂手授此方。張如法用之。始用藥洗。極覺暢。適異常。淋至夜深。方用散傅瘡。遂不痛。是夜得睡至曉。自此每夜一次洗貼。瘡不復痛矣。然尚未敢。間或一夜不洗貼。則復發痛。自此用之。便不敢闕。凡四箇月。瘡雖尚在。而起居飲食如常。一旦瘡忽痛。通夕不寐。淋之亦痛不止。使人視之。瘡中一肉顆如石榴子。痛已漸定。數日間瘡口肉已合。自此遂瘥。太學博士馬君希孟之弟。亦嘗患瘡于胸腹間。久不瘥。瘡透腹見膜。醫皆罷手。得此散用之。即瘥。揚州士人李君在太學。手掌心生一瘡。日久掌穿透。惟有筋骨。謁假歸廣陵。值張梓州。得方服之。遂瘥。此藥曾用未差。切不可住。要在勤志不怠。乃見奇驗。小疔瘡腫疼痛。只以枸杞根生剉。煎濃汁熱淋。亦效。

治癩方

苦胡麻中分。　天麻二兩。　乳香三分。

右荊芥蠟茶下三錢。忌鹽酒房事。動風物。凡一百二十日。服半月後。兩腰眼灸十四壯。此丞相長安公家方。醫人無數。若頭面四體風瘡。瘙痒多汁者。只七八服即瘥。予親試之。

治遠年裏外臁瘡不差者

榕樹　乾猪糞燒成性各半兩。　龍骨一分。　水銀粉少許。

右三物爲細末。入水銀粉研勻。先以鹽水洗瘡。熟絹蘸乾。以生油調藥如膏。貼瘡。三日一易。三五易。定瘥。忌食無鱗魚鮮熱麵。凡腔內外瘡。世謂裏外臁瘡。最難得藥。此方併可治小腸氣方。本建安軍人吳美者。後美犯僞印坐死。司理參軍王炳之憐其曉事。常加存恤。其人臨刑泣念曰。生平有兩方。治疾如神。常賣以自給。可惜死而不傳。遂以獻。炳之屢用有驗。予就炳之求得之。許孫二氏入方。用定粉。不用水銀粉。爰

火府丹　治下疰脚瘡。

甘遂肥實滿味者。一兩。沸切。絞布裹盛。　芎藭一塊。如豆。剉

右以紙罐香爐。令至密不漏烟。頂留一竅。懸甘遂。藥于竅間。其下燒芎藭一塊。令烟熏甘遂。燒過。更燃一塊。芎藭盡。取甘遂爲末。三十歲以上氣盛者。滿三錢。虛者平二錢半。羯羊腎一對。剜開。勻分藥末在內。淨麻纏定。炭火炙熟。無令焦。臨臥爛嚼。溫酒下。隨人酒量。能飲一斗者。可飲五升。以高物支

起雙脚。一服即瘥。

療久瘡

右用猪筒骨中髓。以膩粉和爲劑。復納骨中。泥裹。火煨香熟出。先以溫鹽水浴瘡。乃傅之。臨安陳令傅。極妙。

治瘡疥甚者

草烏頭一兩。每箇四破之。　大豆半。

右同入沙餅。煮極爛。每服一片豆少許。空腹下。予兄子病瘡。偏體拘攣。立不可臥。臥不可起。服此即瘥。

治陰瘡痒痛出水。久不瘥。

銅錢百枚。　烏梅七枚。　鹽二錢。

右水一椀半。煎至一椀。熱洗。

又方

蠟茶　五倍子等分。　膩粉少許。

右先以漿水葱椒煎湯洗。後傅之。未差。再爲之。二方相須用之。無不即驗。

治癬。久患用之即瘥。

決明子不以多少。

右爲末。加少水銀粉爲散。先以物擦破癬。上以散傅之。立瘥。

繫瘤法

右取稻上花蜘蛛十餘箇。並桃李枝上。候垂絲下。取束邊者。撚爲線子。繫定瘤子。七日。候換。瘤子自落。沈興宗待制家老姥。病瘤如掌。舉用此法。繫之。至三換。瘤子遂乾。一夜忽失所在。天明。于枕邊得之。如一乾栗。蠶當時方。瘤落後。以白花蛇頭。燒灰。和蠟粉傅之。

治甲疽。劈肉裹甲。膿血疼痛不瘥。

膽礬燒。

右先剔去肉中。【案】此句下。傳寫缺。　傅藥瘡上。縱有劈肉。一傅即乾落。

續骨丸

臘月猪脂五兩。　蠟中斤。以二洗煎。　鉛丹研。　自然銅　密陀僧各研細。各四兩。　白礬十二兩。　麒麟竭　沒藥　乳香　硃砂細研。各一兩。

右新鼎中先銘猪脂。次下蠟。出鼎于冷處下密陀僧、鉛丹、自然銅、緩火再煎。滴入水中不散。更出鼎于冷處下諸藥。用柳篦攪勻。瀉入罌盆內。不停住手攪至凝。丸如彈丸。且用筯皮之類觀之。極冷收。凡折傷用一丸。入少油。火上化開。塗傷痛處。以油單護之。其甚者。以燈心裹木夾之。更取一丸。分作

小丸。熱葱酒下。痛卽止。如藥力盡。再覺痛。更一服。痛卽止。骨折者兩上便安。牙疼甚者。貼之卽止。此方。小說所載。有人遇異人得之。予家每合以拯人。無不應驗。

神授散　治傷折內外損。

川當歸（洗淨別搗）　鉛粉（治粉最上者半兩）　硼砂（二錢）

右同研勻細。每服二錢。濃煎蘇枋汁調下。若損在腰以上。先喫淡麪半椀。然後取藥。在腰以下。卽先服藥。後喫麪。仍不住呷蘇枋汁。更以糯米爲粥。入沒藥三錢拌和。攤在紙上。或絹上。封裹損處。如骨碎。則更須用竹木夾定。外以紙或衣物包之。長安石使君。一日謁尹至閤門中。忽有人呼其姓。石顧之。稠人中不及識。明日過市。復聞其呼。顧其人近在馬後。問何以見呼。其人曰。我無求于人。以爾有難。特來救爾。昨日何以不躓。石辭謝之。欲下馬與語。其人止之曰。市中非下馬之所。褪衣領中。出一書授之曰。有難則用之。稠人中遂引去。石歸視之。乃此方也。石到京師。趨朝。立馬右掖門外。爲他馬所踢。折足墜地。又爲馬踏手臂折。舁至家。體氣絕。急合此藥服。且過半夜。痛遂止。後手足皆完復。石子爲朝官。知名。關中人往往聞此事。熙寧中。府界教保甲。時四方館使劉君提舉。每有墜馬。或擦刺所傷。皆與藥用之。卽瘥。好事者欲其方。賂主方者。竊得。止有兩物。而無當歸。湯悉同。後予見兩浙提點刑獄使者云。親得其方于石君。恐保甲主方者隱其一味耳。

筋斷須續者。

旋覆根絞汁。以筋相對。取汁塗而封之。卽相續如故。蜀兒如逃走。多刻筋。以此續之。百不失一。

治骨鯁。或竹木簽刺喉中不下。

右臘月取鯇魚胆。懸北簷下。令乾。有鯁。卽取一皁角子。再以酒一合煎化溫服。若得逆便吐。骨卽隨出。若未吐。更飲。以吐爲度。雖鯁在腹中日久移痛。黃瘦甚者。服者皆出。若卒求鯇魚不得。蠡魚鱖魚鯉魚皆可。然不及鯇魚胆。臘月收者最佳。常有倉卒食雞鯁在腹中。常楚痛。但食粥。每食卽如雞刺。如是半年。支離幾死。杖而後能起。與此一服。大吐。覺有一物自口出。視之。乃雞骨。首銳如劌。其尾爲鈎食所磨。盤滑如珠。

治諸鯁。

以木炭皮爲細末。研令極細。如無炭皮。堅炭亦可。粥飲調下二錢。日四五服。以鯁下爲度。此法。人家皆用。予在漢東。乃目覩其神。有劉晦士人鄰家一兒。誤吞一錢。以此飲之。下一物如大烏梅。剖之乃炭末裹一錢也。池州徐使君極寶此方。數數用之。未有不效者。近歲累有人言得此方之效。不復悉載。

火燒瘡方

北夢瑣言記云。孫光憲家人作煎餅。一婢抱孩子擁爐。不覺落火之上。遽以醋泥傅之。至曉不痛。亦無瘢痕。定知俗說。亦不厭多聞。

毒蛇所傷方

野狼或記用艾炷當嚙處灸之。引去其毒氣。卽瘥。其餘惡蟲所螫。馬汗入瘡。用之亦效。

蘇沈良方卷八

朱寶琥珀散　治婦人血風勞。

琥珀　沒藥　木香　當歸　芎藭　白芷　羌活　乾地黃　延胡索　川芎（各半兩）　土瓜根　丹皮　白朮　桂（各一兩）

右件爲末。每服二錢。水一盞。煎至七分。益酒三分。復煎少時。并滓熱服。重疾數服則知效。

麥煎散　治少男室女骨蒸。婦人血風攻注四肢。心胸煩壓。

鼈甲（醋炙）　大黃（濕紙裹煨熟）　常山　柴胡　赤茯苓　當歸（酒浸一宿）　乾漆　白朮　生乾地黃　石膏（各一兩）　甘草（半兩）

右每服二錢。小麥五十粒。水一盞。煎至六分。食後臥時溫服。有虛汗。加麻黃根一兩。此黃州吳官方。療骨熱黃瘦口臭肌熱盜汗。極效。麥煎散甚多。此方吳君寶之。如希世之至珍。其效可知。

白朮散　治婦人姙娠傷寒。

白朮　黃芩（等分。新瓦上炙黃）

右爲散。每服三錢。水一中盞。生薑三片。大棗一箇。擘破同煎至七分。溫服。但覺頭發熱。便可服。三二服卽瘥。惟四肢厥冷陰症者未可服。此方本常州一士人。此藥醫工皆論劒售去。行醫用之如神。無

人得其方，予自得此，治疾無有不效者。仍安胎益母子。

肉桂散　治產後衆疾，血氣崩暈，腫滿發狂，瀉痢寒熱等，惟瀉而吐者難瘥。

黑豆（炒熟去皮，二兩）　肉桂　當歸（浸）　芍藥　乾薑（炮）　乾地黃　甘草　蒲黃（各一兩）

右溫酒調下二錢，日三服，疾甚者三服瘥，無疾日二服，七日止。

大黃散　治產後血暈及傷折內損，婦人血癥血瘕。

羊脛炭（燒赤，酒淬十遍，五兩）　大黃（小便浸七日，且易，日足，溫水洗，焙乾，切焙）　巴豆肉（蠶水煮黃色，焙，各三兩半）　半兩錢（燒赤，米泔淬過，爲末，新水調）

右和研，一日每服半錢，當歸一分，便煎濃稍溫調下。產後血暈百病，且常逐血者，至甚乃服，口噤者，斡開灌下。後識人，更一服，累經生產，有血稽瘀癖塊，及敗血風勞寒熱諸疾，當下如爛豬肝片，永無他疾。墜擊內損，當歸酒下一字，有某墜下折脅，當折處陷入肌中，痛不可忍，服此藥，如人以手自內拓之，筋骨遂平。

澤蘭散　治婦人產乳百疾，安胎調氣，產後血暈、鬱血、血積虛勞、無子、有子即墮、難產、子死腹中、胎衣不下、血注遍身生瘡，經候不調，赤白帶下，乳生惡核，咳嗽寒熱，氣攻四肢，處女任脈不調等，常服益血，美飲食，使人安健有子。

澤蘭（嫩葉，九分）　石膏（八分研）　當歸　赤芍藥　川芎（微炒）　甘草（炙）　白蘞（各七分）　生地黃（六分）　肉桂（五分）　厚朴（薑炙）　桔梗　吳茱萸（炒）　卷柏并根　防風　白茯苓　柏子仁　細辛（各四分）　人參　白芷（炒）　白朮（米泔浸一宿，切焙，以黃色）　藁本　椒紅　乾薑（炒）　烏頭（炮）　黃芪　五味子（各三分）　白薇　丹參　阿膠（炒，各二分）

右爲細末，空心熱酒調下二錢。予家婦人子女，羸弱多疾者，服此藥悉瘥。

治襁中小兒臍風撮口，法每視小兒上下齒，當口中心處，若有白色如紅豆大，此病發之候也。急以指爪正當中掐之，自外遠內，令斷，微血出，亦不妨，又于白處兩邊頭，亦依此掐，令內外斷，只掐令氣脈斷，不必破肉，指爪勿令太銳，恐傷兒甚。予爲河北察訪使日，到趙郡，有老人來獻此法，云篤老惜此法將不傳，願以濟人。詢之趙人云，此翁生平手救千餘兒矣。環趙數邑人，皆就此翁治，應手皆愈。

黑神丸　治小兒急驚慢驚風。

膩粉（一錢半）　墨士　白礬　蘆薈（各一錢半）　麝香　龍腦　牛黃　青黛　使君子（去殼，麩裹，煨熟，各五分）

右麵和丸梧桐子大，每服半丸，薄荷湯研下，要痢即服一丸。楚州小兒醫王鑑賢此藥，致厚產鑑神之，未嘗傳人，予得之，乃當人家睡驚丸，小不同耳。治驚風極效，前後用之，垂死兒一服即差。

青金丹　治小兒諸風，諸瘧，諸痢。

青黛（三分研）　雄黃（研）　胡黃連（各二分）　硃砂（研）　膩粉　熊膽（溫水化）　白附子　薄荷（研，各一分）　麝香　蟾酥　水銀（各半字大）　鉛霜　龍腦（各一字）

右同入乳鉢內，再研令勻，用豬膽一箇，取汁，熬過，浸蒸餅少許，爲丸黃米大，曬乾，一歲可服二丸，量兒大小增之。驚風諸痢，先以一丸，溫水化，滴鼻中令嚏，藏目者當自下，驚癇亦定，更用薄荷湯下。

諸瘧，粥飲下。變蒸寒熱，薄荷湯下。諸瀉痢，米飲下。疳蚘咬心，苦楝子煎湯下。鼻下赤爛，口齒疳蝕，乳汁研塗，病疳眼雀目，白羊子肝一枚，竹劈開，納藥肝中，以麻縷綁，米泔蒸令熟，空腹服。乳母常忌毒魚、大蒜、雞、鴨、豬肉，此丸療小兒諸疳至良。予目見小兒病疳瘥，但粗有氣，服此，或下蟲數合，無不即瘥，而肥壯無疾，幾能再生小兒也。

桔梗散　治小兒風熱及傷寒時氣，瘡疹發熱等症。

桔梗　細辛　人參　白朮　括蔞根　甘草（炙）　白茯苓　芎藭

右等分爲末，每服二錢，水一盞，薄荷二葉，同煎，七分，三盞已下兒，作四五服，五歲已上，分二服。予家常作此藥，凡小兒發熱，不問傷寒風熱，先與此散服，往往輒愈，兼服小黑膏尤善。此桔梗散，與活人書方，同名惺惺散，孔氏家傳云，惺惺散，加鈎藤蟬蛻，與小兒喫甚妙，理上壅風熱。

小黑膏　治小兒傷寒風癇。

烏頭　天南星（大者燒過亦，入小瓶內，溫水密口，令火滅，取刮之，中心存白處，如皁莢子大爲度，須燒數枚，擇中度者可用，各一枚）　薄荷　元參（末，各五錢）

右蜜和葱白湯下豆許，須服，筋緩急，加乳香，同葱白煎湯，潤州傅醫賣此藥，累千金，余家小兒傷寒風發熱，與二三丸，令小睡，及寤則已涼矣。

治痘瘡欲發及已發而陷伏者，皆宜速治，不速，毒入臟，必致困，宜服此。

豬血（臘月取瓶盛，挂風處令乾）

右取半盞大，加龍腦大豆許，溫酒調下。潘醫加蔻豆、英粉、半盞塊，同研。病微有即消，甚則瘡發亦愈。予家小女病傷寒，但腹痛，晝夜號呼，手足厥冷，形症極惡，肘瘡倒發，予疑爲醫以藥伏，先不啗此藥，急就屠家買少生血，時盛暑，血至已敗惡，無可奈何，多以龍腦香和灌之，一服，遂得少睡，須臾一身皆瘡點而安，不爾幾至不救。痘瘡欲無瘢，頻揭去，勿令隱肌，乃不成瘢。縱揭傷有微血，但四面皆塗無苦也。瘡痂不可食雞鴨卵，食即盲，瞳子如卵色，甚應如神，不可不戒也。

治小兒豌豆瘡入目，痛楚，恐傷目。

用浮萍陰乾，每服一二錢，隨兒大小，以羊子肝半箇，入盞子內，以杖子輔碎爛，投水半合，絞取汁，調下，食後服，不甚者一服瘥，已傷目者，十服瘥。邢州杜醫用此藥，前後效者甚多。

辰砂丸　治小兒驚熱多涎，痰瘧，久痢，吐乳，午後發熱，驚癇等疾。

辰砂　粉霜　膩粉（各一分）　生龍腦（一錢）

右軟糯米飯爲丸，菉豆大，一歲一丸，甘草湯下，大人七丸。

治小兒走馬疳，唇齒瘡爛，遂巡狼狽，用此即瘥。

砒霜　粉霜（二物，先研，楊綿裹過）　石灰（淋過，次研）

右等分相合。左右轉研各千下。常極膩如麵。每以雞羽尖挑少許掃瘡上。其瘡即乾。慎勿多用。恐入腹中有大毒。愼之。海州東海縣民家賣此藥。每一日只一掃。如米許大。無不差者。

麝香散　治小兒走馬疳、牙齦腐爛、惡血、口臭、牙齒脫落。

黃連（水三錢）　銅綠　麝香（各二錢）　水銀（一錢，香藥一枚，研）

右漱口淨。以藥傅瘡上。蘭香葉覆之。內蝕爲坎者。一傅即生肉。

牛黃煎　治小兒諸疳、諸痢、食傷、氣脹、體羸、頭大、頭髮作穗、壯熱不食、多困、齒爛、蟲疳、等疾。

大蚵蛾（一枚，去皮骨，炙令末，無灰酒一盞，雞豬膽一枚，同研成膏）　訶子（炮）　使君子　胡黃連　蝟殼（不洗）　墨石子　蘆荟　蘇荑　熊膽　硃砂　夜明砂　雄黃（各一分，研）　木香　肉豆蔻（春夏各半分，秋冬各一分）　牛黃（二錢）　麝香（一錢）　龍腦（五分）

右爲丸如麻子大。飲下五七丸。驚疳、金銀薄荷湯下。肝疳腹脹、桃仁茴香湯下。疳蟲東引、石榴苦楝根湯下。五歲以上十丸。此藥尤治疳痢。腸熱而痢者不可服。

吳婆散　治小兒疳瀉不止。日夜通數不記。漸漸羸瘦。藥不效者。

黃柏（蜜炙）　黃連（減半）　桃根白皮　蘇荑（去皮，各一分）　木香　厚朴（薑汁炙）　丁香　檳榔（各一錢）　沒石子（一錢半）　楝根白皮（七分）

右爲末。每服一字。三歲以上半錢。五六歲一錢。用紫蘇木瓜米飲調下。乳食前一日三服。予家小兒曾有患瀉百餘日。瘦但有皮骨。百方不瘥。有監兵鍾離君見之。曰。何不服吳婆散。立可痊也。予因問吳婆散何藥。曰。古方也。人家多有之。乃問求方合。與兩三服便效。又一孫男。亦疳瀉。勢甚危困。兩服遂定。若病深者。服一兩日間決差。此藥若是疳瀉。無不驗者。藥性稍溫。暴熱瀉者。或不相當。

寒水石散　治小兒之病多因驚。則心氣不行。鬱而生涎。逆爲大疾。宜服常行小腸去心熱。兒自少驚。亦不成疾。

寒水石　滑石（水研如泔，揚去粗者，存細者，澄乾，更研無聲，各三兩）　甘草（一兩）

右量兒大小。熱月冷水下。寒月溫水下。凡被驚及心熱。不可安臥。皆與一服。加龍腦更良。

小硃砂丸　治小兒驚精。鎮心化涎。

硃砂（一分）　巴豆（三十粒，去皮膜，出惡油）　半夏（湯洗七遍爲末，炒，二錢）　杏仁（五枚，炮，去皮尖）

右麵和丸如菉豆大。二歲一丸。荊芥薄荷湯下。三歲二丸。五歲三丸。如驚伏在內。即行瀉。仍藥出。如無驚藥更不下。

妙香丸　治小兒虛中積。潮熱。寒熱。心腹脹滿。疼痛。

辰砂（一兩，研）　牛黃　生龍腦　麝香（各一分）　粉霜　膩粉（各一錢）　金箔（十四片）　蠟（二兩）　巴豆（一百二十箇，肥大者）

右丸。壅虛實加減。龍腦漿水下。夜半後服。臟虛即以龍腦米飲下。每服三丸如小荳大。藥勢緩即按令匾。疾堅者。加至十丸。皆以針刺作數孔。以行藥力。小兒取積丸如菉荳。治小兒吐逆。尤效。此藥最

下胸中煩及虛積。

治小兒臍久不乾。赤腫出膿及清水。

右用當歸焙乾爲末。研細。著臍中。頻用自差。予家小兒嘗病臍濕五十餘日。貼他藥不差。聖惠有十餘方。試之亦不效。至此方。一傅而乾。後因尿入瘡復病。又一貼愈。

治小兒熱嗽

馬牙硝　白礬（各半斤）　黃丹（一分）

右同研入合子。固濟。火燒令紅。趁潤地一夜。再研。加龍腦半錢。甘草湯下一字或半錢。

治小兒疳肥。疳多生頭上。浸淫久不差。及耳疳等。悉主之。

石蕊　白芷（等分）

右以生甘草洗瘡傅藥。一日愈。

蘇沈良方拾遺卷上

脈說

脈之難明。古今所病也。至虛有盛候。大實有羸狀。差之毫釐。疑似之間。便有死生禍福之異。此古今所[illegible]也。病不可不謁醫。而醫之明脈者。天下蓋一二數。馳驟不時有。天下未嘗徒行。和扁不世出。病者終不能死。亦因其長而濟其短。爾士大夫多祕所患以求診。以驗醫之能否。使索病於冥漠之中。辨虛實冷熱於疑似之間。醫不幸而失。終不肯自謂失也。則巧飾掩非以全其名。至於不救。則曰是固難治也。間有謹愿者。雖或因主人之言。亦復參以所見。兩存而難治。以故藥不效。此世之通患。而莫之悟也。吾平生求醫。蓋於平時默驗其工拙。至於有疾而求療。必先盡告以所患。而後求診。使醫了然知患之所在也。然後求之診。虛實冷熱。先定於中。則脈之疑似不能惑也。故雖中醫。治吾疾常愈。吾求疾愈而已。豈以困醫爲事哉。

蒼耳說

藥至賤而爲世要用。未有如蒼耳者。他藥雖賤。或地有不產。惟此藥不爲間。南北夷夏。山澤斥鹵。泥土沙石。但有地則產。其花葉根實皆可食。食之如菜。亦治病無毒。生熟丸散。無適不可。多食愈善。久乃使人骨髓滿。肌理如玉。長生藥也。雖療風痺癱瘓。瘙癢痒。不可勝言。尤治癰金瘡。一名鼠粘子。一名羊負來。詩謂之卷耳。疏謂之枲耳。俗謂之道人頭。海南無藥。惟此藥生舍下。多於荻棘。邂逅之幸也。己卯二月望日

書。

記菊

菊黃中之色。香味和正。花葉根實。皆長生藥也。北方隨秋之早晚。大略至菊有黃華乃開。獨嶺南不然。至冬至乃盛發。嶺南地暖。百卉遂作無時。而菊獨開後。考其理。菊性介然不與百卉盛衰。須霜降乃發。而嶺海常以冬至微霜故也。其天姿高潔如此。宜其通仙靈也。吾在海南蒸菊九晚。以十一月望。與客泛菊作重九。皆此爲記。

記海漆

吾謫海南。以五月出陸至藤州。自藤至儋。野花夾道。如芍藥而小。紅鮮可愛。樸樕叢生。土人云。倒紐子花也。至儋。則已紅。子如馬乳。爛紫可食。味甘美。中有細核。并嚼之。瑟瑟有聲。亦頗苦澀。兒童食之。或大便難。通葉皆白。如石葦之狀。野人夏秋剩下。食其葉輒已。取膠以代柿漆。卻愈於柿也。余久苦小便白膠。近又大腑滑。百藥不瘥。取倒紐子嫩葉。酒蒸焙燥爲末。酒糊丸。吞百餘。二腑皆平復。然後知奇藥也。因名之曰海漆。而私記之。以貽好事君子。明年子熟。當取子研濾。曬煮爲膏。以劑之。不復用糊矣。戊寅十一月一日記。（案蘇集。酒爲丸作餌。爲丸。曬煮作酒煮。）

記益智花

海南產益智花。實皆長穗。而分爲三節。其實熟否。以候歲之豐歉。其下節以候早禾。其中上亦如之。大吉則實。因歲皆不實。罕有三節並熟者。其爲藥。治氣止水。而無益於智。智豈求於藥者乎。其得名也。豈以知歲也耶。今日見偽耳圍儲黎子髻。言候之審矣。聊復記之。以俟好事者補註本草。

記食芋

岷山之下。因年以蹲鴟爲糧。不復疫癘。知此物之宜人也。本草謂芋土芝。云益氣充飢。惠州富此物。人食者不免瘴。吳遠遊曰。此非芋之罪也。芋當去皮。溼紙包。煨之火。過熟乃熱嚼之。則縱而膩。能益氣充飢。今惠人皆和皮水煮冷啖。堅頑少味。其發瘴固宜。丙子除夜前二日夜飢甚。遠遊煨芋兩枚見啖。美甚。迺爲書此帖。

記王屋山異草

王屋山有異草。制百毒。能於鬼手奪命。故山中人謂此草蓋頭回。蓋葉光託吳遠遊寄來。吾聞兵無刃。蠱無毒。皆不可任。若阿羅漢永斷三毒。此藥遂無所施耶。

記元修菜

蜀中有菜。如豌豆而小。食之甚善。耕而覆之。能肥瘠地。性甚熱。食之使人呀呷。若以少酒曬而蒸之。則甚益人。而不爲害。眉山巢穀元修。始以其子來黃州。江淮間始識之。此菜名巢菜。黃州人謂之元修菜。

記蒼耳

黃州山中蒼耳至多。就塹人買之。一斤數錢耳。此長生藥也。人以其易得。不復貴重。至以蒸蚊子。此亦可

以太息。舒州白朮。莖葉亦皆相似。特花紫耳。然至難得。三百一兩。其效止於和胃氣。去遊風。非神仙上藥也。

記流水止水

孫思邈千金方。人參湯。言須用流水煮。用止水卽不驗。人多疑流水止水無別。予嘗見丞相荊公喜放生。每日就市買活魚縱之江中。莫不洋然。惟鱧鮈入江水輒死。乃知鱧鮈但可居止水。則流水與止水果不同。不可不知。又鯽魚生流水中。則背鱗白而味美。生止水中。則背鱗黑而味惡。此亦一驗也。

論臟腑

古方言。雲母餌服。則著人肝肺不可去。如枇杷狗脊毛。皆不可食。食之射入肝肺。世俗似此之論甚多。皆謬說也。又言人有水喉、食喉、氣喉者。亦謬說也。世傳歐希範眞五臟圖。亦畫三喉。蓋當時驗之不審耳。水與食同嚥。豈能就口中遂分入二喉哉。人但有咽有喉。二者而已。咽則納飲食。喉則通氣。咽則嚥入胃脘。次入胃中。又次入廣腸。又次入大小腸。喉則下通五臟。爲出入息。五臟之含氣呼吸。正如冶家鼓韛。人之飲食藥餌。但自咽入腸胃。何嘗能至五臟。凡人肌骨五臟腸胃雖各別。其入腹之物。英精之氣味。皆能洞達。但滓穢卽入二腸。故人飲食及服藥。既入腹。爲眞氣所蒸。英精之氣味。以至金石之精者。如細研硫黃朱砂乳石之類。凡能飛走融結者。皆隨眞氣。洞達肌骨。猶如天地之氣。貫穿金石土木。曾無留礙。其餘頑石草木。則但氣味洞達爾。及其勢盡。則滓穢傳入大腸。潤澤滲入小腸。此皆敗物。不復能變化。惟當退泄耳。凡所謂某物入肝。某物入腎之類。但氣味到彼爾。其質豈能到彼哉。此醫不可不知也。

論君臣

舊說用藥有一君二臣。三佐五使之說。其意以謂藥雖衆。主病者專在一物。其他則節級相爲用。大略相統制。如此爲宜。不必盡然也。所謂君者。主此一方。固無定物也。藥性論乃以衆藥之和厚者定爲君。其次爲臣爲佐。有毒者多爲使。此謬論也。設若欲攻堅積。則巴豆雖豈得不爲君也。

論湯散丸

湯散丸各有所宜。古方用湯最多。用丸散者殊少。煮散古方無用者。惟近世人爲之。大體欲達五臟四肢者莫如湯。欲留腸胃中者莫如散。久而後散者莫如丸。又無毒者宜湯。小毒者宜散。大毒者須用丸。又欲速用湯。稍緩用散。甚緩者用丸。此大概也。近世用湯者全少。應湯者全用煮散。大率湯劑氣勢完壯。力與丸散倍蓰。煮散多者。一服不過三五錢極矣。比功較力。豈敵湯勢。然既力大。不宜有失。消息用之。要在良工。難可以定論拘也。

論採藥

古方採草藥。多用二八月。此殊未當。二月草已芽。八月苗未枯。採掇者易辨識耳。在藥則未爲良時。大率用根者。若有宿根。須取無莖葉時採。則津澤皆歸其根。欲驗之。但取煎服地黃罷觀。無苗時採。則實而沈。有苗時採。則虛而浮。其無宿根者。卽候苗成而未有花時採。則根生定而又未衰。如今紫草。未花時採。則

根色鮮澤。花過而採。則根色黯惡。此其驗也。用葉者。取其初長足時取。用莖者亦然本說。用花者取花初敷時採。用實者取成實時採。皆不可限以時月。緣土氣有早晚。天時有愆伏。如平地三月花者。深山中須四月花。白樂天遊大林寺詩云。人間四月芳菲盡。山寺桃花始正開。蓋常理者。此地勢高下之不同也。如筀竹筍有二月生者。有三四月生者。有五月方生者。謂之晚筀。稻有七月熟者。有八九月熟者。有十月熟者。謂之晚稻。一物同一畦之間。自有早晚。此物性之不同也。嶺嶠微草。凌冬不凋。并汾喬木。望秋先殞。諸越則桃李夏實。朔漠則桃李夏榮。此地氣之不同也。同畝之稼。則蓺溉者先芽。一坵之禾。則後種者晚實。此人力之不同也。豈可一切拘以定月哉。

論橘柚

本草注。橘皮味苦。柚皮味甘。此誤也。柚皮極苦。不可向口。皮甘者酒柑耳。

論鹿茸麋茸

按月令。冬至麋角解。夏至鹿角解。陰陽相反如此。今人用麋鹿茸作一種。殆疏也。又有刺麋鹿血以代茸。云茸亦血耳。此大謬也。竊詳古人之意。凡含血之物。肉差易長。其次筋。難長。最後骨。難長。故人自胚胎至成人二十年。骨髓方堅。惟鹿角自生至堅。無兩月之久。大者乃重二十餘斤。其堅如石。計一歲後須生數兩。凡骨之頓成。生長神速。無甚於此。雖草木至易生者。亦無能及之。此骨之至強者。所以能補骨血。堅陽道。強精髓也。豈可與血爲比哉。麋茸利補陽。鹿茸利補陰。凡用茸無須太嫩。世謂之茄子茸。但珍其難得耳。其實少力。堅者又太老。唯長數寸。破之肌如朽木。茸端如瑪瑙紅玉者。最善。又北方沙漠中有麋麌駝。麋極大而色蒼。鹿黃而無斑。亦鹿之類。角大有文。堅整如玉。其茸亦可用。

論雞舌香

予集靈苑方。論雞舌香以爲丁香母。蓋出陳氏拾遺。今細考之。尚未然。案齊民要術云。雞舌香。世以其似丁子。故一名丁子香。即今丁香是也。日華子云。雞舌香治口氣。所以三省故事。郎官含雞舌香。欲其奏事對答。其氣芬芳。此正謂丁香治口氣。至今方書爲然。又古方。五香連翹湯。用雞舌香。千金五香連翹湯。無雞舌香。卻有丁香。此最爲明驗。新補本草又出丁香一條。蓋不曾深考也。今世所謂雞舌香者。乳香中得之。大如山茱萸。剖開。中如柿核。略無氣味。以此治疾。殊極乖謬。

論金罌子

金罌子止遺溺。取其溫且澀也。世之用金罌者。待其紅熟時。取汁熬膏用之。大誤也。紅則味甘。熬膏則全斷澀味。都失本性。今當取半黃時採。乾擣末用之。

論地骨皮

枸杞。陝西極邊生者。高丈餘。大而作柱。葉長數寸。無刺。根皮如厚朴。甘美異於他處者。千金翼云。甘州者爲真。葉厚大者。是大體。出河西酒泉郡。其次。江池閑圩要上者。實圓如櫻桃。全少核。曬乾如餅。極膏潤有味。

論淡竹

淡竹對苦竹爲文。除苦竹外。悉謂之淡竹。不應別有一品謂之淡竹。後人不曉。於本草別疏淡竹爲一物。今南人食筍。有苦筍有淡筍。兩色淡筍。淡竹也。

論細辛

東南方所用細辛。皆杜衡也。又謂之馬蹄香。色黃白。拳局而脆。乾則作團。非細辛也。細辛出華山。極細而直。深紫。氣味極辛。嚼之習習如生椒。其辛更甚於椒。故本草云。細辛水浸令直。有杜衡僞爲之也。漢間又有一種細辛。極細而直。色黃白。乃是鬼督郵。亦非細辛也。

論甘草

本草注引爾雅云。蘧。大苦。注。甘草也。蔓延生。葉似荷。莖青赤。案程本云。葉似荷。色。今據步擢駁說改正。此乃黃蘗也。其味極苦。故謂之大苦。非甘草也。甘草枝葉悉如槐。高五六尺。但葉端微尖而糙澀。似有白毛。實作角生。如相思角。四五角作一本生。熟則角拆子如小扁豆。極堅。齒嚙不破。

論胡麻

胡麻。直是今油麻。更無他說。予已於靈苑方論之。其角有六稜者。有八稜者。中國謂之麻。是也。有實爲苴麻。無實爲枲麻。又曰牡麻。張騫始自大苑得油麻之種。亦謂之麻。故以胡麻別之。謂漢麻爲大麻也。

論赤箭

赤箭。即今天麻也。後人既誤出天麻條。遂指赤箭別爲一物。既無此物。不得已又取天麻苗爲之。滋爲不然。本草明稱採挼陰乾。安得以苗爲之。草藥上品。除五芝之外。赤箭爲第一。此神仙補理養生上藥。世人惑於天麻之說。遂止用之治風。良可惜哉。或以謂其莖如箭。既言赤箭。疑當用莖。此猶不然。至如鳶尾牛膝之類。皆謂莖葉有所似。用則用根。何足疑哉。

論地菘

地菘。即天名精也。世人既不識天名精。又妄認地菘爲火蔌。本草又出鶴蝨一條。都成紛亂。今案地菘。即天名精也。其葉似菘。又似蔓菁。名精。即蔓菁也。故有二名。鶴蝨即其實也。世間有單服火蔌法。乃是服地菘爾。不當服火蔌。火蔌本草名鼠蔌。即是豬膏莓。案李濂華淡作苗。俟攷定。後人不識。亦重複出之爾。

論南燭草木

南燭草木。記傳本草所說多端。今少有識者。爲其作青精飯色黑。乃誤用烏臼爲之。全非也。此木類也。又似草類。故謂之南燭草木。今人謂之南天燭者是也。南人多種於庭檻之間。莖如麻蕁。有節。高三四尺。處山有盈丈者。葉微似楝而小。至秋則實赤如丹。南方至多。

論太陰元精

太陰元精。生解州鹽澤大鹵中。潘渠土內得之。大者如杏葉。小者如魚鱗。悉皆六角。端正似刻。正如龜甲。其裙袖小攤。其前則下剡。其後則上剡。正如穿山甲相掩之處。全是鐵甲。更無異也。色綠而瑩徹。叩之則

直理而析，瑩明如鏡，析處亦六角如柳葉，火燒過則悉解，析薄如柳葉，片片相離，白如霜雪，平潤可愛，此乃稟積陰之氣凝結，故皆六角，今天下所用元精，乃絳州山中所出絳石爾，非元精也，楚州鹽城縣古鹽倉下土中，又有一物，六棱如馬牙硝，清瑩如水晶，潤澤可愛，彼方亦名太陰元精，然喜暴潤，如鹽鹵之類，惟解州出者爲正。

論稷米

稷乃今之穄也，濟晉之人謂穄皆曰穄，是其土音，無他義也，本草注云，又名糜子，糜子乃黍屬，詩云維秬維秠，維穈維芑，秬、秠、穈、芑皆黍屬，以色爲別，丹黍謂之糜，（糜音門）今河西人用糜字而音糜。

論苦躭

苦躭，即本草酸漿也，新集本草又重出苦躭一條，河西番界中，酸漿有盈丈者。

論蘇合香

今之蘇合香，如堅木，赤色，又有蘇合油，如糊膠，今多用之爲蘇合香，案劉夢得傳信方用蘇合香，云皮薄，子如金色，案之則小，放之則起，良久不定，如蟲動，氣烈者佳也，如此，則全非今所用者，更當稽考之。

論藿陸香

藿陸，即乳香也，本名藿陸，以其滴下如乳頭者，謂之乳頭香，銷塌在地上者，謂之塌香，如臘茶之有滴乳白乳之品，豈可各是一物。

論山豆根

山豆根味極苦，本草言味甘者，大誤也。

論青蒿

蒿之類至多，如青蒿一類，自有兩種，有黃色者，有青色者，本草謂之青蒿，亦恐有別也，陝西綏銀之間，有青蒿灘，其間時有一兩株，迥然青色，土人謂之香蒿，莖葉與常蒿悉同，但常蒿色綠，而此蒿色青翠，一如松梢之色，至深秋，餘蒿皆黃，此蒿獨青，氣頗芬芳，恐古人所用以此爲勝。

論文蛤海蛤魁蛤

按文蛤，即吳人所食花蛤也，魁蛤，即車螯也，海蛤，今不識其生時，但海岸泥沙中得之，大者如棋子，細者如油麻粒，黃白或赤相雜，蓋非一類，乃諸蛤之房，爲海水磨礪光瑩，都非舊質，蛤之屬其類至多，房之堅久瑩潔者，皆可用，不適指一物，故通謂之海蛤耳。

論漏蘆

今方家所用漏蘆，乃飛廉也，飛廉一名漏蘆，苗似苦菜，根似牛蒡，綿頭者是也，採時用根，今關中所用漏蘆，莖如油麻，高六七寸，秋深枯黑如漆，採時用苗，本草自有一條，正謂之漏蘆。

論赭魁

本草所謂赭魁，皆未詳審，今赭魁南中極多，廣黑肌赤，似何首烏，切破，其中赤白理如檳榔，有汁赤如赭，

南人以染皮製韓，閩嶺人謂之餘糧，本草禹餘糧注中所引，乃此物也。

論龍芮

石龍芮今有兩種，水生者葉光而末圓，陸生者其葉毛而末銳，入藥用水生者，陸生者亦謂之天灸，取少葉採繫臂上，一夜作大泡如火燒者是也。

論麻子

麻子，海東來者最勝，大如蓮實，出柘（案夢溪筆談作屯，俟攷）羅島，其次上郡北地所出，大如大豆，亦善，其餘皆下材，用時去殼，其法取麻子帛包，沸湯中浸，候湯冷，乃取懸井中一夜，勿令著水，明日日中曝乾，就新瓦上輕按，其殼悉解，簸揚取肉，粒粒皆完。

灸二十二種骨蒸法

崔丞相灸勞法，外臺秘要，崔相家傳方及王實臣經驗方悉編載，然皆差謬，昆陵郡有石刻最詳，余取諸本參校，成此一書，比古方極爲委曲，依此治人，未嘗不驗，往往一灸而愈，予在宜城久病虛羸，用此而愈。

唐中書侍郎崔知悌序

夫含靈受氣，稟之於五行，攝生乘理，降之以六疾，若岐黃廣記，蔚有舊經，攻灸兼行，頗著斯術，骨蒸病者，亦名傳屍，亦謂殭屍，亦稱復連，亦曰鬼擣，丈夫以癖氣爲根，婦人以血氣爲本，無問長少，多染此病，嬰孩之流，傳注更苦，其爲狀也，髮乾而聳，或聚或分，或腹中有塊，或腦後兩邊有小結，多者乃至五六，或夜臥盜汗，夢與鬼交，雖目視分明，而四肢無力，且上氣食少，漸就沈羸，縱延日時，終於殪盡，余昔忝洛州司馬，嘗三十日灸活一十三人，前後獲者數逾二百，至於經骨獺肝，徒聞說，金牙銅鼻，罕見其能，未若此方，扶危拯急，非止單攻骨蒸，又別療氣療風，或癡或勞，或邪或癖，或患狀既廣，灸活者不可具述，略陳梗槩，又恐傳受訛謬，以誤將來，今故具圖形狀，庶令覽者易悉，使所在流布，頗用家藏，未暇外請名醫，傍求上藥，還魂返魄，何難之有，遇斯疾可不務乎。

取穴法

先定穴，令患人平身立正，取一細繩攝之，勿令展縮，順腳底貼肉堅踏之，男左女右，其繩前頭與大拇指端齊，後頭令當腳根中心，向後引繩循腳肚貼肉直上至山根中大橫紋截斷，又令患人解髮分兩邊，令見頭縫，自顱門平分至腦後，乃平身正坐，取向所截繩一頭，令與鼻端齊，引繩向上，正循頭縫至腦後貼肉垂下，循脊骨引繩向下至繩盡處，當脊骨以墨點記之，（墨點不是灸處）又取一繩子，令患人合口，將繩子按於口上，兩頭至吻，卻拘起繩子中心，至鼻柱根下止，如此便齊兩吻截斷，將此繩展令直，於前來脊骨上墨點處，橫量取平，勿令高下，繩子先中摺，當中以墨記之，卻展開繩子橫量，以繩子上墨點正壓脊骨上，墨點爲正，兩頭取中，勿令高下，於繩子兩頭，以白圈記，白圈是灸穴也。

以上是第一次點二穴

次二穴，令其人平身正坐，稍縮膀胱，取一繩繞項向前雙垂，與鳩尾齊，鳩尾是心岐骨，人有無心岐骨者，

至從胸前兩岐頭下量取一寸，即是鳩尾也，即雙裁斷，卻背翻，繩頭向項後，以繩子中停取心正，令當喉咽結骨上，其繩兩頭夾項雙垂，循脊骨以墨點記之。墨點不是灸處。又取一繩子，令其人合口橫量，齊兩吻裁斷，還於脊骨上墨點橫量如法，繩子兩頭以白圈記之，白圈是灸穴處。

以上是第二次點穴，通前共四穴，同時灸，日別各七壯，至第二穴壯累灸至一百或一百五十壯爲妙。候灸瘡欲瘥，又依後法灸二穴。案日別二字疑誤。

又次二穴，以第二次量口吻繩子，於第二次雙繩頭盡處墨點上，當脊骨直上下豎點，令繩中停，中心在墨點上，於上下繩盡頭，以白圈兩穴，白圈是灸穴處。

以上是第三次點兩穴，謂之四花穴。灸兩穴各百壯，三次共六穴，各取離日量度，度訖即下火，唯須三月三日艾最佳。病瘥，百日內忌飲食房室，安心靜處，將息，若一月後覺未瘥，復初穴上再灸。

凡骨蒸候，所起辨驗有二十二種，並依上項灸之。

一、胞蒸小便赤。
二、玉房蒸男遺精失精，女月經不調。
三、腦蒸頭腦熱。
四、髓蒸體骨熱。
五、骨蒸髓。
六、筋蒸筋。
七、血蒸血。
八、脈蒸血脈不調。
九、肝蒸或時眼前昏暗。
十、心蒸舌焦，或痛，或時胸滿。
十一、脾蒸唇焦乾，或口瘡。
十二、肺蒸口乾生瘡。
十三、腎蒸耳乾焦。
十四、膀胱蒸右耳焦。
十五、膽蒸眼目失光。
十六、胃蒸舌下痛。
十七、小腸蒸下體不easy，乍寒乍熱。
十八、大腸蒸右鼻孔痛。
十九、三焦蒸別人覺熱，自覺冷澀。
二十、肉蒸皮生粟起。
二十一、皮蒸編身壯熱，不自安息。
二十二、氣蒸

用尺寸取穴法

凡孔穴尺寸，皆隨人身形大小，須男左女右，量手指中一節，兩橫紋中心爲一寸。

艾炷大小法

凡艾炷須令腳跟足三分，若不足三分，恐損孔穴，不偏穴中經脈，火氣不行，即不能抽邪氣引正氣，雖小兒，必以中指取穴爲準。

取艾法

端午日日未出，於艾中以竹求其似人者，輒擷之以灸，殊有效。幼時見一書云爾，忘其爲何書也。艾未有其似人者，於明暗間，苟以意命之而已，爲法皆安，無一異者，此何疑焉。

用火法

黃帝曰：松、柏、柿、桑、棗、榆、柳、竹等，依火用灸，必害肌血，慎不可用。凡取火者，宜敲石取火，或水晶鏡子於日得者，太陽火爲妙，天陰則以槐木取火亦良。灸後宜服治勞地黃丸。

具方

生地黃汁　青蒿汁　薄荷汁
童便　好酒已上各二升，煎成膏入。　柴胡去頭。
藍甲炙。　秦艽各一兩。　朱砂
麝香各半兩，研。

右五味爲末，入前膏，和爲丸如桐子大，每服十五丸至二十二丸，溫酒下，切忌生冷毒物。以上隨却本卷一。

蘇沈良方拾遺卷下

論風病

王旁元龍言，錢子飛治大風方極驗，常以施人。一日夢人自云天使，以此病人，君爲天怒，若施不已，君當得此病，藥不能救，子龍懼，遂不施。僕以爲天之所病不可療邪，則藥不應復有效，藥有效者，則是天不能病，當是病之祟，畏是藥，而假天以禁人爾。晉侯之病爲二豎子，李子豫赤丸亦先見於夢，蓋有或使之者。子飛不察，爲鬼所瞞，若予則不然，苟病者得愈，願代受其苦。家有一方，以傳皮膚，能下腹中蘊惡，在黃州試之，病良已，今當常以施人。以上脫刻本卷二。

服茯苓賦 并引

予少而多病，夏則脾不勝食，秋則肺不勝寒，治肺則病脾，治脾則病肺，平居服藥，殆不復能愈，年三十有二，官於宛邱，或憐而授之以道士服氣法，行之期年，疾良愈，蓋自是始有意養生之說。晚讀抱朴子書，言服氣與草木之藥皆不能致長生，古神仙眞人皆服金丹，以爲草木之性，雜之則腐，煮之則爛，燒之則焦，不能自生，於況能生人乎。予既汨沒世俗，意金丹不可得也，則試求之草木之類，塞者不能移，歲月不能敗，惟松柏爲然。古書言松脂流入地下爲茯苓，茯苓千歲舉則爲琥珀，雖非金玉，而能自完也，亦久矣。於是求之名山，層而治之，去其脈絡，而取其精華，庶幾可以固形養氣，延年而卻老者，因爲之賦以道之。

春而榮，夏而茂，憔悴乎風霜之前，摧折乎冰雪之後，閱寒暑以同化，委糞壤而衆朽，茲固百草之微縱，與衆木之凡陋，雖或效骨蔭於刀凡，盡性命於忤臼，解急難於根頃，破奇邪於邂逅，然皆受命淺狹，與時變遷，朝菌無日，蟪蛄無年，苟自救之不暇，矧他人之足延，乃欲攝根莖之微末，假臭味以登仙，是猶託疲牛於千里，駕鳴鳩以登天，則亦辛勤於澗谷之底，槁死於峰崖之顛，顧桑榆之縱暮，意神仙之不然者矣。若夫南澗之松，拔地千尺，皮厚犀兕，根堅鐵石，鬚髮不改，蒼然獨立，流膏脂於黃泉，乘陰陽而固結，像鳥獸之蹲伏，類龜蛇之閉蟄，外蹈黑以鱗皴，中結白而純密，上蔽非之不犯，下螻蟻之莫賊，經歷千歲，化爲琥珀，受雨露以彌堅，與日月而終畢，故能安魂魄而定心志，卻五味與穀粒，追赤松於上古，以百歲爲一息，顏如處子，綠髮方目，神止氣定，浮游自得，然後乘天地之正，御六氣之辨，以遊夫無窮，又何求而何食。以上

（鮑刻本卷四）

與霍東玉求地黃

焉，火也，故將火而夢焉，火就燥，燥而不已，則窮，故膏油所以爲無窮也，藥之膏油者，莫如地黃，喚老馬復爲駒，樂天詩云，與君喚老馬，可使照地光，今人不復能知此法，吾晚學道，血氣衰耗，如老馬矣，欲多食生地黃，而不可常致，近見人言循州興甯令歐陽叔向，於縣圃中多種此藥，意欲作畫干之而未敢，君與叔向故人，可爲致此意否，此藥以二八月採者良，如許，以此時寄惠爲幸，欲烹以爲煎也。以上脫刻本卷五。

問養生

余問養生於吳子，得二言焉，曰和，曰安，何謂和，曰子不見天地之爲寒暑乎，寒暑之極，至爲折膠流金，而物不以爲病，其變者微也，寒暑之變，晝與日俱逝，夜與月並馳，俯仰之間，屢變而人不知者，微之至和之極也，使此二極者相尋而狎至，則人之死久矣，何謂安，曰，吾嘗自牢山浮海逢於淮，遇大風焉，舟中之人，如附於桔槔，而與之上下，如蹈車輪而行，反逆眩氣不可止，而吾飲食起居如他日，吾非有異術也，惟莫與之爭而聽其所爲，顧凡病我者舉非物也，食中有蛆，人之見者必嘔也，其不見而食者，未嘗嘔也，請察其所從生，論八珍者，必嚥，言蓋饋者必唾，二者未嘗與我接也，唾與嚥何從生哉，果生於我乎，知其生於我也，則雖與之接而不變，安之至也，安則物之感我者輕，和則我之應物者順，外輕內順，而生理備矣，吳子古之靜者也，其觀於物也審矣，是以私識其言而時省觀焉。

論修養寄子由

任性逍遙，隨緣放曠，但喪凡心，別無勝解，以我觀之，凡心盡處，勝解卓然，但此勝解，不屬有無，不通言話，故祖師教人，到此便住，如眼翳盡，眼自有明，醫師只有除翳藥，何曾有求明藥，明若可求，卽還是翳，固不可翳中求明，卽不可言翳外無明，夫世之昧者，便將頹然無知，認作佛地，若此是佛，貓兒狗兒，得飽熟睡，腹搖鼻息，與土木同，當恁麼時，可謂無一毫思念，豈謂貓兒狗兒已入佛地，故凡學者，常觀妄除愛，自籠及細，念念不忘，實作一日，得無所除，弟所教我者是如此否，因見二偈警策，孔君不覺發然，更以問之，審至此，牆外有悍婦與夫相罵，罵飛灰火，如豬嘶狗嗥，因念他一點圓明，正在豬嘶狗嗥裏面，譬若江河，

鑒物之性，長在飛砂走石之中，尋常靜中推求，常患不見，今日閒裏，提得些子，如何，元豐六年。

養生說

已飢先食，未飽先止，散步逍遙，務令腹空，每腹空時，卽便入定，不拘晝夜，坐臥自便，惟在攝身，使如木偶，常自念言，我今此身，若少動搖，如毛髮許，便墮地獄，如商君法，如孫武令，事在必行，有死無犯，又用佛語及老君語，視鼻端目，數出入息，綿綿若存，用之不勤，數至數百，此心寂然，此身兀然，與虛空等，不煩禁制，自然不動，數至數千，或不能數，則有一法，其名曰隨，與息俱出，復與俱入，隨之不已，一息自住，不出不入，或覺此息，從毛竅中，八萬四千，雲蒸霧散，無始已來，諸病有除，諸障自滅，自然明悟，譬如盲人，忽言有眼，此時何用，求人指路，是故老人言盡如此。

續養生論

鄭子產曰，火烈者，人望而畏之，水弱者，人狎而玩之，翼奉論六情十二律，其論水火也，曰，北方之情好也，好行貪狼，南方之情惡也，惡行廉正，廉正故爲君子，貪狼故爲小人，予參二人之學，而爲之說曰，火烈而水弱，烈生正，弱生邪，火爲心，水爲腎，故五臟之性，心正而腎邪，腎無不邪者，雖上智之腎亦邪，然上智常不淫者，心之官正，而腎聽命也，心無不正者，雖下愚之心亦正，然下愚常淫者，心不官而腎爲政也，知此則知鉛汞龍虎之說矣，何謂鉛，凡氣之謂鉛，或趨或厭，或呼或吸，或執或擊，凡動物者皆鉛，肺實出納之，肺爲金，爲白虎，故曰鉛，又曰虎，何爲汞，凡水皆爲汞，唾涕膿血精汗便利，凡溼者皆汞也，肝實宿藏之，肝爲木，爲青龍，故曰汞，又曰龍，古之眞人論內丹曰，五行顚倒術，龍從火內出，五行不順行，虎向水中生，世未有知其說者也，方五行之順行也，則龍出於水，虎出於火，皆死之道也，心不官而腎爲政，聲色外誘，淫邪內發，壬癸之英下流爲人，或爲厲壞，是汞龍之出於水也，喜怒哀樂，皆出於心者也，喜則擺拏隨之，怒則鼓舞隨之，哀則擗踴隨之，樂則抃舞隨之，心動於內，而氣應於外，是鉛虎之出於火者也，汞龍之出於水，鉛虎之出於火，有能出於火，有能出於水，而復返者乎，故曰皆死之道也，眞人教之以逆行，龍從火出，虎從水生也，其說若何，孔子曰，思無邪，凡有思皆邪也，而無思則邪，無思而非土木乎，蓋必有無思之思焉，夫無思之思，端正莊栗，如臨君師，未嘗一念放逸，然卒無所思，如龜毛兎角，非作故無，本性無故，是謂之戒，戒生定，定則出入息自住，出入息住，則心火不復炎，在易爲離，離麗也，必有所麗，未嘗獨立，而汞其妃也，既不炎上，則從其妃矣，水火合，則壬癸之英，上流於腦，而溢於元英，若鼻液而不醎，非腎出故也，此汞龍之自火出者也，長生之藥，內丹之萌，無過此者矣，陰陽之始交，天一爲水，凡人之始造形，皆水也，故五行一曰水，從暖氣而後生，故二曰火，生而後有骨，故三曰木，骨生而日堅，凡物之堅壯者皆金氣也，故四曰金，骨堅而後生肉焉，土爲肉，故五曰土，人之在母也，母呼亦呼，母吸亦吸，口鼻皆閉，而以臍達，故臍者生之根也，汞龍之出於火，流於腦，溢於元英，必歸於根，心火不炎上，必從其妃，是火常在根也，故壬癸之英，得火而日堅，達於四肢，浹於肌膚，而日壯，究其極，則金剛之體也，此鉛虎之自水出者也，龍虎生而內丹成矣，故曰順行則爲人，逆行則爲道，道則未也，亦可爲長生不死之術矣，

書養生論後

東坡居士桑榆之末景，憂患之餘生，於後學道，雖爲達者所笑，然猶賢乎已也。以稽叔夜養生論，頗中予病，故手寫數本，其一以贈羅浮鄭師。

養生傷

閑邪存誠，煉氣養精，一存一明，一煉一清，清明乃極，丹元乃生，坎離乃交，藥物乃成，中夜危坐，服此四藥，一藥一至，到極則處，幾費千息，隔之廓然，存之卓然，養之郁然，煉之赫然，守之以一，成之以久，功在一日，何遲之有。（曷曰：閑邪存其誠，呼味此字，知邪中有誠，無非邪者，即亦邪也，至於無所閑，乃見其誠者，幻滅滅故，非幻不滅。）

寄子由三法

吳子野云：芡實蓋溫平耳，本不能大益人，然俗謂水底黃何也，人之食芡也，必枚嚼而細嚥之，未有多噉而頓嚥者也，舌頰齒齒終日嚅囁，而芡無五味，腴而不膩，足以致玉池之水，故食芡者，能使人華液流通，轉相挹注，積其力，雖過乳石可也，以此知人能濃食而徐飽者，當有大益，吾在黃岡山中，見牧羊者必臥之脅士，云草短而有味，羊得細嚼，則肥而無疾，羊猶爾，況人乎。（食芡法。）

養生之方，以胎息爲本，此固不刊之語，更無可議，但以氣若不閉，任其出入，則耐鼻洶湧，無卓然近效，待其兀然自住，恐終無此期，若閉而留之，不過三五十息，奔突而出，雖有微效，養下丹田，此一既於湯，決非度世之術，近日探思似有所得，蓋因看孫真人養生門中調氣第五篇，反覆尋究，恐是如此，其略曰：和神氣之道，當得密室閉戶，安牀暖蓐，枕高二寸半，正身偃臥，瞑目閉氣於胸臆間，以鴻毛著鼻上而不動，經三百息，耳無所聞，目無所見，心無所思，則寒暑不能侵，蜂蠆不能毒，毒三百六十蟲，此鄰於眞人也，此一段要訣，弟且靜心細意，字字研究，看既云閉氣於胸臆中，令鼻端鴻毛不動，則初機之人，安得持三百息之久哉，恐是元不閉鼻中氣，只以意堅守此氣於胸臆中，令出入息似動不動，氣氣縹緲，如香爐蓋上煙，湯瓶嘴中氣，自在出入，無呼吸之者，則鴻毛可以不動，若心不起念，雖過三百息可也，仍須一切依此本訣，臥而爲之，仍須眞以鴻毛黏著鼻端，以意守氣於胸中，過欲吸時，不免微吸，及其呼時，全不得平，但任其氣氣縹緲，微微自出，氣平則又微吸，如此出入元不斷，而鴻毛自不動，動亦極微，覺其微動，則又加意制勒之，以不動爲度，雖云制勒，然終不閉，至數百息，出者少，不出者多，則內守充盛，血脈通流，上下相灌輸，而生理備矣，兄悟此玄意，甚以爲奇，恐是夜夜燒香，神啓其心，自悟自體，適值痔瘻及熱甚，未能力行，亦時時小試，覺其理不謬，更俟疾平天涼，稍稍置力讀，見效當報，弟不可謂出意杜撰而輕之也。（胎息法。）

抱朴子云：古人藏丹砂井中而飲者，猶獲上壽，今但懸袋大丹，丹既不可望，又欲學燒，而藥物火候皆未必眞，縱使燒成，又畏火毒，而未能服，何不捨此且服生丹砂，意謂養過百日者，力亦不慢，草藥是覆盆子，亦神仙所餌，百日熟煉，草石之氣，亦相乳入，每日五更，以井花水服三丸，服竟，以意送至下丹田，心火溫養，久之意謂必有絲毫留者，積三百餘服，恐必有刀圭留丹田，致一之道，初若眇昧，久乃有不可量者，兄老大別無見解，直欲以拙守而致神仙，此大可笑，亦可取也。（磁丹砂法。）

（吾雖了了見此理，而實操履，害之者衆，恐未能成，子由端靜淳淑，使少加意，當先我得道，得道之日，必卻度我，故書此紙，爲異日符信，非虛語也，紹聖二年八月十七日居士記。）

上張安道養生訣

某近年頗留意養生，頗嘗延問方士多矣，其法百數，擇其簡易可行者，間或爲之，輒有奇驗，今此脂放益究其妙，乃知神仙長生非虛語爾，其效初不甚健，但積累百餘日，功用不可盡，比之服藥，其力百倍，久欲獻之左右耳，妙處非言語文字所能形容，然亦可道其大略，若信而行之，必有大益，其訣具左。

每夜以子時後（三更三四點，至五更以來皆可。）披衣起（只床上擁被坐亦得。）而東或南，盤足坐，扣齒三十六通，握固（以兩拇指掐第三指根，或以四指都握拇指，別手挂脈門。）閉息（閉息穩是道家要妙，先須閉目靜慮，掃滅妄想，使心源澄然，久久自然甘美，此是眞氣，不可棄之。）（不得令耳聞聲。）候出入息勻調，即以舌攪脣齒內外，漱煉津液，若有鼻涕，亦須漱煉，不嚥其餘，漱煉良久，自然甘美，此是眞氣，不可棄之。）未得嚥下，復作前法，閉息內觀，納心丹田，調息漱津，皆依前法，如此者三，津液滿口，即低頭嚥下，以氣送下丹田中，須用意精猛，令津與氣谷谷然有聲，徑入丹田，又依前法爲之，凡九閉息，三嚥津而止，然後以左右手熟摩兩腳心，（止湧泉穴，上徹頂門，氣訣之妙。）及臍下腰脊間，皆令熱徹，（徐徐摩之，微汗出不妨，不可驟促。）次以兩手摩熨眼面耳項，皆令極熱，仍案揉眞梁左右五七下，梳頭百餘梳，散髮而臥，熟寢至明。

右其法至簡易，惟在常久不廢，即有深功，且試行一二十日，精神自已不同，覺臍下實熱，腰腳輕快，面目有光，久久不已，去仙不遠，但常常習閉息，使漸能持久，以脈候之五至爲一息，某近來閉得漸久，每一閉百二十至而開，蓋已閉得二十餘息也，又不可強閉多時，使氣錯亂，或奔突而出，反爲害也，慎之慎之，又須常節晚食，令腹中寬虛，氣得回轉，晝日無事，亦時時閉目內觀，漱煉津液嚥之，摩熨耳目，以助眞氣，但清淨專一，即易見功矣，神仙至術，有不可學者三，一急躁，二陰險，三貪慾，公雅量濟德，無此三疾，竊謂可學，故獻其區區，若篤信力行，他日相見，復陳其妙者焉，方書口訣，多枝詞隱語，卒不見下手門路，今直指精要，可謂至言不煩，長生之根本也，幸深加寶祕，勿使淺妄者窺見，以泄至道也。（以上鮑刻本卷六。）

藥歌 并引

稽中散作幽憤詩，知不死矣，而卒韋乃曰採薇山阿，散髮巖岫，永嘯長吟，頤神養壽者，悼此志之不遂也，司馬景王既殺中散而悔，使悔於未殺之前，中散得免於死者，吾知其掃迹屏影於人間，如脫兎之投林也，採薇散髮，豈所難哉，孫眞人著大風惡疾論，神仙傳有數人，皆因惡疾而得仙道，何者割棄塵累，懷穎陽之氣，所以因禍而取福也，吾始得罪遷嶺表，不自意逾年無後命，知不死矣，然舊苦痔疾，至是大作，呻呼幾百日，地無醫藥，有亦不效，道士教吾去滋味，絕菲血，以清淨勝之，痔有蟲，館于吾後，滋味菲血，既以自養，亦以養蟲，自今日已往，旦暮食淡麪四兩，猶復念食，則以胡麻伏苓抄足之，飲食之外，不啖一麪物，主人枯槁，則客自棄去，尚恐習性易流，故取中散眞人之言，對症爲藥，使人誦之曰，東坡居士，汝忘逾年之髮，百日之苦乎，使汝不幸有中散之禍，伯牛之疾，雖願採薇散髮，豈可得哉，今食麥麻伏苓多矣，居士則以歌答之云，百事治兮，味無味之味，五味備兮，茯苓麻麥，有時而匱兮，有即食無即已者，與我無既兮。

嗚呼館客。終不以是爲擾。今本卷八。（以上脫刻）

雜記

洞冥志。唐貞觀中。張寶藏爲金吾衛士。嘗因下直歸樂陽。路逢少年敗獵。割鮮野食。倚樹歎曰。張寶藏身年七十。未嘗得一食酒肉。如此者可悲哉。傍有僧指曰。六十日內。官登三品。何足難也。言訖不見。寶藏異之。即時還京師。時太宗苦於氣痢。衆醫不效。即下詔問殿廷左右。有能治此疾者。當重賞之。寶藏曾困其疾。即具破乳煎蓽撥方。上服之立瘥。直下宰臣與五品官。魏徵難之。經月不進。擬上疾復發。問左右曰。吾前服乳煎蓽撥有功。復命進一劑。又平。因思曰。嘗令與進方人五品官。不見除授。何也。徵懼曰。奉詔之後。未知文武二吏。上怒曰。治得宰相。不妨已授三品官。我天子也。豈不及汝也。乃厲聲曰。與三品文官。授鴻臚寺卿。時正六十日矣。其方每服用牛乳半斤。蓽撥三錢匕。同煎減半。空心頓服。

馬提刑記。醫先祖忠肅公。天聖中以工部尚書知濠州。家有嫗病痛。蓋十餘年。一日老兵擣庭下。且言前數日過市。有醫自遠來。道瘡漏可治。特頃刻之力耳。嫗曰。吾更醫多矣。不信也。其黨有以白忠肅公者。即爲召醫視之。曰。可治無疑。須活鱉一。竹鍼五七枚。醫乃擲鱉於地。鱉因屈盤就盤。以竹鍼貫之。覆瘡。良久取視。有白蟲數十如鍼著鱉。醫即令置杯中。蠕動如線。復覆之。又得十餘枚。如是五六。醫者曰。蟲固未盡。然其餘皆小蟲。覓請以常用藥傅之。時家所有槐榔黃連爲散傅之。醫未始用藥。明日可以乾艾作湯。投白礬末二三錢。洗瘡。然後傅藥。蓋老人血氣冷。必假艾力以佐陽。而艾性亦能殺蟲也。如是者再。即生肌。不一月當愈。既而如其言。醫曰。瘡一月不治。則有蟲。蟲皆蠕動。氣血亦隨之。故瘡漏不可遽合。則結痛。實蟲所爲。又曰。人每有疾。經月不痊。則必憊虛勞。婦人則補脾血。小兒則防驚癇。二病則并治。嘗觀醫無名於世。而治病有效。亦良醫也。又其言有理。故并錄之。（案此條後數行。但有脫誤。）

子瞻雜記

男子之生也覆。女子之生也仰。其死於水也亦然。男內陽而外陰。女子反之。故易曰。坤至柔而動也剛。嘗曰。洗潛剛克。古之達者蓋知此也。秦醫和曰。天有六氣。淫爲六疾。陽淫熱疾。陰淫寒疾。風淫末疾。雨淫腹疾。晦淫惑疾。明淫心疾。夫女陽物而晦時。故淫則爲內熱蠱惑之疾。女爲蠱惑。世知之者衆。其爲陽物而內熱。雖良醫未之言也。五勞七傷。皆熱肝而蒸晦者。不爲蠱則中風。皆熱之所生也。醫和之語。吾嘗表而出之。蓋左氏春秋嘗此。

桑耳并根苗葉實。皆澀去沙土。懸陰乾淨。擣地上燒爲灰。湯淋取濃汁。泥連二甑煉之。灰汁耗。即旋取傍釜中已澄灰汁釜之。經一日夜不絕火。乃漸得霜。乾磁瓶盛之。每服。早晚臨睡酒調一錢匕。補腎去風駐顏。不可偏言。尤治皮膚風。令人膚革滑淨。每洗面及浴。取少許如澡豆用。尤佳。無所忌。昌黎之父從諫宜州文學。家居於邕。服此十餘年。今八十七。紅潤輕健。蓋專得此藥力也。杜甫詩有除蔞草一篇。今爲中謂之毛茨。毛芒可畏。觸之如蟲螫。然治風疹。擇最先者。以此草點之。一身皆失去。葉背紫者入藥。

僕有一相識。能治馬背腫。有富家翁買馬。直百餘千。以有此病。故以四十千得之。已而置酒飲人。求爲治之。酒未三行。而腫以正。舉座大笑。其方用烹豬湯一味。煖令熱浴之。其腫隨手即正。不復回。良久。乃以少冷水洗之。此物能令馬尾軟細。及治焦禿。頻以洗之。不月餘。效極神良。祕之。祕之。

馬肺損。鼻中出膿。醫所不療。云。肺藥率用涼冷。須食上飲之。而肺痛。畏草所制。不敢食草。若不食而飲涼藥。是速其死也。故不醫。有老卒教予以蘆菔根煮糜米作粥。入少許阿膠。啖之。馬乃敢食。食已。用常肺藥入阿梨勒皮飲之。涼藥爲訶子所澀於肺上。必愈。用其言信然。（以上脫刻本卷十。）

旅舍備要方

董汲撰

旅舍備要方提要

旅舍備要方一卷、宋董汲撰、陳振孫書錄解題、載有董汲小兒斑疹論、腳氣治法、不及此書、然宋史藝文志載之、卷帙亦同、蓋陳氏偶未見也、汲因客途猝病、醫藥難得、集經效之方、百有餘道、內如蚰蜒入耳、及中藥毒、最爲險急、而所用之藥、至爲簡易、其雜傷五方、古書中不少槩見、今亦罕傳、尤頗見奇特、蓋古所謂專門禁方、用之則神驗、至求其理、則和扁有所不能解、卽此知也、至於小半夏湯、五苓散、南方本於漢之張機、今以半夏湯治濕痰、仍其本法、至五苓散、本治傷寒汗後不解、及有水氣之病、今書中引爲通行利水之劑、殆亦變通用之、如河間益元散、本雙解半表半裏之傷寒、而後人取以醫暑熱、其治中暑一方、似卽李杲清暑益氣湯之藍本、其無比香薷散、與後來局方、稍有出入、蓋亦本古方爲加減、然云治南腳轉筋疼痛、而反去主治之木瓜、則不解其故矣、小兒一門、大槩與同時錢乙藥證眞訣相出入、第以柔脆之腸胃、而多用膩粉硃砂諸峻藥、古人氣厚、服之無妨、在後來亦未可槩施也、原本久佚、今從永樂大典收掇排纂、得方尙凑五十、仍舊目分爲一十有二類、其關寒心痛、厥風涎潮等證、有錄無書、無從較補、則亦闕焉、

原序

夫醫藥之來、皆原於農黃二帝之書、其奧博微妙、莫不符契陰陽五行消長之理、脗合君臣相與之道、則固非庸流俗輩所能鈎索之也、推聖人之心、蓋深切於救疴濟世、欲躋天下生靈於壽域而已矣、董君及之、少服儒術、嘗閱醫經、洞徹其簡切應用者近百餘方、可以備旅舍之應猝之用、編目成集、共爲一卷、號曰旅舍備要方、將鋟板以廣其傳、君可謂能推究聖人之所存心者哉、誠可嘉尙、余故輒爲之引云、孟震序、

自序

汲少小多病，因習醫藥，常思世人榮辱汩馳，喜怒妄作，飲食不節，興居無常，倏忽之間，疾起不測，迫於倉卒，不暇藥餌，以斯致困，可不惜哉。況宦遊南北，客涉道途，冒觸居多，邪氣易入，方藥備急，尤當究心，且如觸寒心痛，冒熱中暍，厥風涎潮，伏暑霍亂，急病急治，效奇方，計百餘道，證詳而法略，使覽之者曉然可用，目之曰旅舍備要方，爲一卷，庶幾道途疾病，治療有歸，不敢私隱，具錄如左，蓋汲序。

旅舍備要方

宋　董　汲　撰

斑疹

神仙紫雪　治大人小兒一切熱毒冒熱發斑，消豆瘡麻疹，及傷寒熱入胃，發斑，并小兒驚癇，涎厥，走馬急疳，黃瘦，喉痺，腫痛，及疳疹毒攻咽喉，水漿不下。

黃金一百兩　寒水石　石膏各三斤　犀角　羚羊角各十兩屑　元參一斤　沉香　木香　丁香各五兩　甘草八兩　升麻六兩

右㕮咀，以水五斗，煮金至三斗，去金，入諸藥再煎至一斗，濾去滓，投上好芒硝二斤半，微火煎，以柳木篦攪，勿停手，候欲凝，入盆中，更下研細硃砂，真麝香各一兩，急攪勻，候冷，貯於密器中，勿令見風，每服一錢，溫水化下，小兒半錢，一治咽喉危急，捻少許乾嚥之。

痰證

小半夏湯　治痰逆，粥藥不下，胸膈不快，停痰蓄水，手足厥冷，并天行病，嘔不止。

半夏（不計多少，淘洗七遍，切片焙乾）

右每服一錢，水一盞半，入生薑切片半錢，同煎至一盞，去滓，溫服。若腹鳴有水聲，每服加去瓤橘皮、去皮茯苓各半錢，煎如上法。

半夏化痰丸　治痰實惡心嘔吐，頭目昏重，心悸，背寒臂痛，涎嗽膈不快。

半夏（一兩，淘洗，去滑）　赤茯苓（半兩，去皮）　白礬（一分，枯）　鉛白霜（半兩）

右為末，取生薑自然汁，煮麵糊為丸，如梧桐子大，每服十五丸，生薑湯下。

枳實丸　治風痺，痰實，大便祕澀，頭旋眩暈，腹滿煩渴，傷寒，冒熱有燥屎，譫言狂亂，及結胸痛，痞，癖，瘧，瘕。

大黃（半兩）　牽牛（微炒取末半兩）　枳實（麩炒去瓤）　人參（一分）

右為末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服三十丸，溫水下，未動，再加丸數服之。

霍亂

論曰：陰陽不順，清濁相干，氣溷中焦，名為霍亂也。皆由飽食豚膾，復啖乳酪，海陸百忌，無所不食，多飲寒漿，眠臥冷席，風冷之氣傷於脾胃，諸食結而不消，陰陽二氣壅而不通，陽氣欲升，陰氣欲降，陰陽交錯，變成吐利不已，百脈昏亂，榮衛俱虛，冷入於筋則令轉筋，宜服無比香薷散，方見後。

丸方　治中暑霍亂吐瀉，米穀不化，臍腹疼痛，滑瀉色白，腳轉筋，手足冷，脾胃虛冷，不思飲食，腹脹不快，及胸痺，心痛，并傷寒陰經受病，不壯熱，大便清穀，脈虛弱而遲，及婦人新產內虛。

人參　白朮　乾薑　甘草（炙各一兩）

右細末，煉蜜和丸，如彈子大，每服一丸，湯化下，日十服。吐多利少者，取枳實三枚，炙，四破，水三升，煮一升，和一丸服。吐少利多者，取乾薑一兩，水二升，煮一升，和一丸服。頻吐利乾嘔者，取半夏半兩，湯洗去滑，水二升，煮取一升，和一丸服。若憒疼痛不可堪者，水三升，煮蜀三枚，取一升，和一丸服。若大吐利，轉筋者，以韭汁洗腹背，從胸至足踝，勿逆即止。若體冷，微汗，腹中寒，取附子一枚，炮去皮，四破，水二升，煮一升，和一丸服。吐利悉止，脈不出，體猶冷者，可服諸湯補之。

厚朴湯　治霍亂心煩。

厚朴（炙）　高良薑　桂心（各三兩）

右㕮咀，以水六升，煮取三升，分再服。

龍骨湯　治霍亂吐利嘔逆。

龍骨　黃連　乾薑　赤石脂　當歸（各一兩）　枳實（五枚，炙）　半夏（一升，洗）　附子（炮，去皮臍）　人參　桂心

甘草（炙，各二兩）

右㕮咀，以水九升，煮取三升，分三服。

大豉湯　治氣厥，嘔噦不得息，又主霍亂。

香豉（一升）　半夏（洗）　生薑（切，各二兩）　前胡（外臺方用柴胡）　桂心（外臺方無）　人參　甘草（炙，各一兩）

右㕮咀，以水五升，煮取二升，分三服，勿使冷。（外臺云：忌羊肉、餅、海藻、菘菜等。）

又方　治霍亂吐利，心煩不止。

猪蹄，如雞子大一枚，為末，以沸湯一升和之，如粥，頓服，良。不差更服。

又方

粟米粉五合，水一升半，和之如粥，頓服，須臾即止。

又方　治霍亂止吐。

丁香十四枚，以酒五合，煮取二合，頓服之，用水煮之亦佳。

無比香薷散　治非時霍亂吐利，心腹撮痛，大渴煩躁，四肢厥逆，汗自出，兩腳轉筋疼痛。

厚朴（去皮，二兩）　黃連（二兩，三味入生薑四兩同杵，炒令黃色）　香薷（秘半兩）

右為末，每服五錢，水酒各一盞，同煎至一盞，去滓，令極冷，頓服之。

五苓散　治中暑惡心，霍亂吐瀉，煩燥飲水，又治五淋，小便不利，臍下脹滿，及胞轉不得小便，小腹脹痛，又治疰氣瘟癘，不服水土，或吐或瀉，又治中酒惡心，嘔吐痰水，有入便吐，心下痞悶，又治黃疸，遍黃橘色，心中煩急，眼如金，小便赤澀，或大便自利。

猪苓（去黑皮，十八銖）　澤瀉（一兩）　白朮（十八銖）　茯苓（去皮，十八銖）　肉桂（去皮，半兩）

右為細末，每服二錢，溫水冷水隨意調下，若治黃疸，煎茵陳湯調下，日三服。

腰痛

論曰：腰痛之為疾，大法有四種，有腎虛，有腎著，有腎腰，有風氣下流，腎虛者、腰脊痛，小便淋瀝，當服八味丸；腎著者、腰中疼痛，如帶五千錢，腎著湯；腎腰者、腰痛，因俛仰腎墮而傷腰，當服藥棊子；風氣下流者、腰痛腳重，大便祕澀，當服神功丸，即愈。方如左。

藥棊子　治腎腰疼痛氣滯。

牽牛（一兩，半生半炒取半兩為末）

右研入硇黃末一分，再研勻，分三分，每一分，用白麵一二匙，以水攪，和前藥，切作棊子，於五更初，以水半盞煮熟，連湯溫食，差即止。初服未除，隔日再服。

神功丸　治三焦氣鬱，心腹痞悶，六腑風熱，大便不通，津液內枯，大腸乾澀，裏急後重，或下鮮血，痰唾稠黏，風氣下流，腰胯重，髀下脹痛，溺赤如金。（陳無擇三因方云：此藥當歸蘆薈加減，溫湯溫酒米飲皆可服，食後臨臥服。）

大黃（三兩，紙裹煨，名大腸子。）　人參（半兩）　訶子皮（炮，二兩）　麻子仁（五兩，另研。）

右為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服二十丸，溫水下，日三服，早起，日中，晚，以通為度。

眼

治傷寒時氣後，毒攻眼，疼痛赤腫方。

露蜂房（半兩）

右以水三盞，煎至二盞，露一夜，溫冷任洗之。

鴛肝湯　治肝熱目赤，羞明，隱痛，生翳膜，赤腫。

黃芩　黃連　防風　梔子仁（各一兩）　大黃　甘草（炙，各二兩）

右為散，每服三錢，水一大盞，入竹葉十片，同煎至八分，去滓，溫服。若入朴硝一錢同煎，取利即止，勿服。

治跋涉風土，或道路，誤為細塵昧目，隱痛不能視物，隨所眯目，以手分開，自以唾搽之，即愈。

耳

治蚰蜒入耳。

麝麝末一匙，以醋少許調灌之，須臾，蟲化為水。

口

赴筵散　治心脾勞熱，口舌生瘡，或赤或白，不下飲食。

廣土（即赤土。）　荊芥　朴硝（各一兩。）

右同研勻，新汲水調服一錢，小兒少與。

又方　治口舌唇吻等瘡。

黃蘗（炙，一錢。）　膩粉　麝香（少許。）

右研勻，貼之，日三四易。

齒

細辛散　治齒痛龈腫，風蟲攻蝕，疼痛不可忍。

細辛（去葉。）　芎藭　香白芷　甘松（各一兩。）

右為細末，每用半錢，擦牙，痛便止，或大痛不定，以藥二錢，入好雄黃末半錢，生川烏頭末半錢，拌勻，少少擦之，良久，以鹽湯漱之。

治腎虛齒少齒痛方

生地黃　川芎（各一錢。）

右為末，以濟齒根。

又方　治齒痛宜露，涎血臭氣。

川芎（一錢。）　竹葉（二十片。）　鹽（少許。）　細辛（一錢。）

右以水三大盞，煎兩盞，熱含漱，冷吐之。

治牙齒疼痛，腮腫龈痛，不能嚼物，風蟲疼痛。

附子角（八錢。）　巴豆（一兩，去皮。）　麝香（一兩。）

右研為末，蒸餅，水浸為丸，如黃米大，以綿裹，隨痛齒嚙之。

中毒

解中藥毒，并蠱毒，悶亂，吐血，煩躁。

甘草（一兩，生用。）　白礬（半兩，生。）　延胡索（一兩。）

右為細末，每服半錢，水一盞，煎至六分，去滓，放冷，細細呷之。

婦人科

萬安丸　治妊娠不足月損動，胎不安，或誤服藥，胎欲下，腹脹痛。

知母（一兩。）

右為末，用熟煅肉為丸，如彈子大，每服一丸，以秦艽糯米湯化下。

保安散　治因漏胎胞乾難產，橫逆不下。

蟬蛻（不計多少，燈下燒，存性。）

右人真麝香少許，研細，臨產時，淡醋湯調下半錢。

四物湯　治婦人產前後百病，崩中血不止，及妊娠胎漏，下血，腹痛，產後宜倍服，去宿血，養新血，療腰腳疼痛。

當歸　白芍藥　川芎　熟乾地黃（各一兩。）

右為散，每服三錢，水一盞，入生薑三片，同煎至七分，去滓，溫服。若漏胎及崩中，每服，入炙阿膠二片，熟艾半雞子大，同煎。若產後，每服入童子小便少許。

小兒科

麝香膏　治小兒諸風驚涎，寒熱發搐。（載幼幼新書。）

麝香（研。）　乳香（研。）　青黛（各半兩。）　防風（末。）　硃砂（研。）

龍腦（各三錢。）　甘草（炙，四兩。）　龍腦　膩粉（各一錢七。）　天南星（炮。）

墨燒各半錢

右研細拌勻蜜劑成膏每二歲兒服半皂子大薄荷湯化下

鈎藤飲 治小兒吐利後驚虛慢驚手足瘈瘲多睡眼上視乳食不進

鈎藤鈎二分 茜蒻 白僵蠶去嘴炒 蟬蛻去足翅各半兩

蛇皮 甘草炙各一分 蜣蜋五枚炙去頭翅足 附子炮去皮臍半兩

右爲末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫分三服急驚有熱證去附子不用

定命丹 治小兒急慢驚風天麻麝臍風撮口搐搦蠕痼壯熱

天麻 青黛各一分半 天南星炮 膩粉各一兩半 硃砂研

白附子炮各半兩 麝香二錢 蝎尾十四箇炮

右研細拌勻用燒粟米飯爲丸如菉豆大每服一丸薄荷湯化下急驚者水化滴入鼻中嚏即搐定

又方 治小兒急慢驚風手足搐搦日數十發搖頭弄舌百治百效垂困已上方並驚幼幼新書

蛇蛻皮一分 牛黃研一錢

右以水一盞先煎蛇皮至五分去滓調牛黃頓服五歲以以上倍服

利毒丸 治小兒痘疹欲出胃熟發溫氣蘊腹滿大小便赤澀睡中驚煩渴口舌乾手足微冷多睡時嗽涎脈實沉大滑數便宜服之

大黃中兩 膩粉炒二錢 大青一錢 龍腦 硃砂各半錢

檳榔 生牽牛各一錢半 黃芩 青黛各一錢別本作二錢

右研細末麵糊爲丸如黃米大每二歲兒服八丸生薑蜜水下不動再服量兒大小虛實加減

牛黃散 治小兒痘疹陽毒入胃使血日夜無節度腹痛啼哭已上二方並驚幼幼新書

牛黃一兩 鬱金一兩

右研細末每二歲兒服半錢以漿水半盞煎至三分和滓溫服最大小以此增減之日二服

紫草散 治小兒伏熱在胃經鬱發豆疱痘疹一切惡候出不快小便赤澀心腹脹滿續乙四癥數同

黃土湯 治赤疹瘙痒煩躁昏悶

伏龍肝即竈下黃土

右研極細每服二錢生薑蜜水調下

救生散 治小兒痘疹臟疱惡候危困陷下黑色

豬豬血量月內以新瓦罐盛掛竈上陰乾爲末 馬牙硝研各一兩 硃砂

牛黃 腦麝各一錢

右研極細每二歲兒取一錢新汲水調下大便下惡物瘡疱紅色爲度不透再服神驗無比

玳瑁散 治小兒痘疹熱毒內攻紫黑色出不快

生玳瑁水磨濃汁取一合 豬豬心一箇取中血皂子大

右合調勻溫煎紫草湯調服

瘡科

論曰大凡瘡癰本自畜熱或因服金石等藥或因父母服熱藥并飲酒消渴人多病此當以涼藥下之故孫真人千金方云病難疽入如道塗無藥可只以大黃下之者蓋攻其本也近人多不達此意至瘡癰既發而下之使毒內陷者失其旨矣宜切誌之

內治散 治一切癰疽惡瘡毒氣內攻五臟惡心煩躁

蕎豆粉一兩 乳香一分

右研細末每服一錢新汲水調下

神明膏 治癰疽瘡腫毒無頭疼痛或有數頭煩熱氣毒軟瘡久不效

五蠟脂不計多少微炒

右爲末新水調塗於故絹上貼之

論曰大凡傷瘡欲成痂時往往頻看及不時將護多中外風以至背急角弓反張有若瘋病之狀皆由風入瘡口傳逼四肢經絡故如是或者便以治風之法攻汗此大非也有瘡人慎不可犯水或曰痂時慎不可於風中看但以背指散貼之無不神效若瘡出血多其人必渴宜忍之并不可噉燥食鹽飲酒嗜羹只可食油及脂肥物爲佳不惟能禦外風定可不渴若犯諸忌即血溢殺人又忌嗔怒大笑思想陰陽行動極宜謹此

背指散 貼一切傷瘡血出瘡痛若貼不膿不痛

檳榔 黃連各一兩 木香中兩

右爲末有傷便貼之如研下指血未定速將藥裹定便得連接

治打撲腫痛傷折骨節蹉跌脫臼內有瘀血疼痛不可忍

硃砂 定粉 當歸 蘇木各半兩

右研細末每服一錢熱酒調下痛處熱爲效

雜傷

論曰大凡湯火誤傷害人最急始覺熱痛多用冷物沃之以救其熱切不可也蓋火氣本陽得水則陰氣內薄必皮肉膿潰仍久不成痂使陰陽交激微者致極熱氣鬱滯侵壞筋骨如過傷但以救痛散塗之無不即效

治火傷

被火燒處急向火炙之雖大痛強忍之少間不痛不腫

治犬馬蜇及馬骨刺傷人及馬血入舊瘡中方

取灰汁熱漬瘡常令汁搭有火數易其汁勿令爛入肉三數日漬之有膿者炙石令熱熨之日二消即止

治蛇咬久不效及毒氣內攻疼痛方

雄黃　白礬

右等分研就刀頭上爆令銘便貼咬傷處自瘥

治在道塗大醉仆地或取涼地臥多爲蛇入人竅方

見時急以手捻定用刀刻破尾以椒或辛物置破尾上以綿繫之少刻自出此蛇有逆骨慎不可以力拔之須切記

蠱鏡咬人立死治之方

檳榔不計多少

右燒灰存性先以醋淋洗後以醋調貼之

亦自不少。且以牛黃清心丸一方言之。凡用藥二十九味。寒熱調雜。殊不可曉。嘗見一名醫云。此方祇前八味至溫黃而止。自乾山藥以下、凡二十一味。乃補盧門中山芋丸。當時不知緣何誤寫在此方之後。因知不會改正。余因其說而考之。信然。如此之類、必多有之云云。是併不能無所舛誤矣。然歷代相傳、專門藥方、多在是焉。在用者詳審而已。必因噎而廢食。則又一偏之見矣。



四庫全書提要

太平惠民和劑局方十卷。指南總論三卷。舊本題宋庫部郎中提舉措置藥局陳師文等奉敕編。案王應麟玉海云。大觀中陳師文等、校正和劑局方五卷。二百九十七道。二十一門。晁公武讀書志云。大觀中、詔通醫刊正藥局方書。閱歲書成。校正七百八字。增損七十餘方。又讀書後志曰。太醫局方十卷。元豐中、詔天下高手醫、各以得效祕方進。下太醫局驗試。依方製藥。驗之。仍摹本傳於世。是大觀之本、實因神宗時舊本重修。故公武有校正增損之語也。然此本止十四門、而方乃七百八十八。考玉海又載紹興十八年閏八月二十三日。改熟藥所、爲太平惠民局。二十一年十二月十七日。以監本藥方頒諸路。此本以太平惠民爲名。是紹興所頒之監本、非大觀之舊矣。其中又有寶慶淳祐續添諸方。更在紹興之後。兼附用藥總論指南三卷。皆從醫經本草鈔撮增入。亦不知何時所加。陳振孫書錄解題、稱和劑局方。其後時有增補。殆指此類歟。戴良九靈山房集、有丹溪翁朱震亨傳曰。時方盛行。陳師文裴宗元所定大觀二百九十七方。翁窮晝夜是習。既而悟曰。操古方以治今病。其勢不能以盡合。苟將起度量、立規矩、稱權衡、必也素雜諸經乎。又稱震亨得羅知悌之學以歸。諸醫泥陳裴之學者、聞其言大驚而笑且排。及治許謙末疾良驗。笑且排者始皆心服。是此書盛行於宋元之間。至震亨局方發揮出、而醫學始一變也。又岳珂桯史白和劑局方、乃當時精集諸家名方。凡幾經名醫之手。至提領以從官內臣參校。可謂精矣。然其間差謬者、

敘

昔神農嘗百草之味。以救萬民之疾。周官設疾醫之政。以掌萬民之病。著在簡編。爲萬世法。我宋勃興。神聖相授。咸以至仁厚德。涵養生類。且謂札瘥瘼瘝。四時代有。救恤之術。莫先方書。故自開寶以來。蚤救近臣。嘗校本草。厥後纂次神醫普救。刊行太平聖惠。重定鍼艾俞穴。校正千金外臺。又作慶歷善救。備要濟衆等方、以惠天下。或範金揭石。或鏤板聯編。是雖神農之用心。成周之致治。無以過也。天錫神考。睿聖承統。其好生之德。不特見於方論而已。又設太醫局、熟藥所、於京師。其恤民疾。可謂勤矣。主上天縱深仁。孝述前烈。爰自崇寧增置藥局。揭以和劑惠民之名。俾夫修製給賣、各有攸司。又設收買藥材所。以革僞濫之弊。比詔會府咸置藥局。所以推廣祖考之德澤。可謂曲盡。然自創局以來。所有之方。或取於獨藥之家。或得於陳獻之士。未經參訂。不無舛訛。雖嘗鏤板頒行。未免傳疑承誤。故有藥味脫漏。銖兩過差。製作多不依經。祖襲問有僞妄。至於貼膀。謬戾尤多。殆不可以一二舉也。頃因條具、上達朝廷。繼而被命遴選通醫俾之刊正。於是請醫監之祕文。採名賢之別錄。公私衆本。搜獵殘遺。事關所從。無不研核。或端本以正末。或泝流以尋源。訂其訛謬。析其淆亂。遺佚者補之。重複者削之。未閱歲而書成。繕寫市畢。謹獻於朝。將見合和者、得十全之效。飲餌者、無纖芥之疑。頒此成書。惠及區宇。遂使熙豐惠民之美意。崇觀述事之洪規。本末互細。無不畢陳。納斯民於壽康。召和氣於穹壤。億萬斯年。傳之無極。豈不韙歟。

將仕郎措置藥局檢閱方書　陳承
奉議郎守太醫令兼措置藥局檢閱方書　裴宗元
朝奉郎守尚書庫部郎中提舉措置藥局　陳師文
謹上。

增廣太平惠民和劑局方目錄

卷一　諸風　附腳氣

至寶丹　靈寶丹　潤體圓　鳥犀圓
牛黃清心圓　摩羅圓　透冰丹　龍腦天麻煎
牛黃小鳥犀圓　麝香圓　龍虎丹　麝香天麻圓
龍腦芎犀圓　銀液丹　和太師牛黃圓　碧霞丹
雄硃丹　八風丹　牛黃生犀圓　辰砂天麻圓
青州白圓子　辰砂圓　牛黃金虎丹　防風圓
川芎圓　薄荷煎圓　天南星圓　犀角圓
皂角圓　小續命湯　防風湯　排風湯
大通聖白花蛇散　消風散　光活散　八風散
清神散　虎骨散　骨碎補圓
紹興續添方
烏荊圓　加減三五七散　太陽丹　如聖餅子

沒藥降聖丹　乳香沒藥圓　七聖散　白龍圓
活血應痛圓　四生散　通關散　追風散
鐵彈圓　四斤圓　急風散
寶慶新增方
大聖一粒金丹　乳香應痛圓　省風湯
乳香圓　黑神圓　拒風丹　慈氣圓
淳祐新添方
三生飲　大醒風湯　五痹湯　苦參圓
乳香寅經圓　黑神圓　追風散
卷二　傷寒　附中暑
人參敗毒散　小柴胡湯　林檎散　柴胡石膏散
麻黃湯　小青龍湯　聖散子　五積散
升麻葛根湯　葛根解肌湯　金沸草散　大柴胡湯
朮附湯　防己黃耆湯　蓋附湯　竹葉石膏湯
五苓散　四逆湯　大順散　白虎湯
香薷圓　香蘇散　枇杷葉散
紹興續添方
僧伽應夢人參散　香蘇散　加減三五七散　大已寒圓
太陽丹　和解散　正氣散　十華散
剉散　桂苓圓　消暑圓
寶慶新增方
辰砂五苓散　消風百解散　人參順氣散　保眞湯
解暑三白散　縮脾飲　柴胡升麻湯
淳祐新添方
人參養胃湯　參蘇飲　神朮散　葱白散
吳直閣增諸家名方
對金飲子　劫勞散　人參輕骨散　川芎茶調散
桂枝湯　黃龍圓　不換金正氣散
藿濕湯　冰黃散
續添諸局經驗祕方

神仙百解散　八解散　白朮散　三拗湯
荊芥散　來蘇散　十神湯　藿香正氣散
香蘇湯　水浸丹

卷三　一切氣　附脾胃　積聚

蘇合香圓　安息香圓　丁沉圓　大沉香圓
理中圓　和胃圓　紫蘇子圓　養脾圓
五膈圓　嘉禾散　理中湯　調中沉香湯
勻氣散　烏沉湯　五膈寬中散　膈氣散
建中散　平胃散　三和散　七氣湯
益智散　藿香半夏散　草豆蔻散　積氣圓
丁香圓　小丁香圓　三稜煎圓　青木香圓
消食圓　小獨聖圓　溫白圓　九痛圓
生氣湯　俞山人降氣湯　神保圓
紹興續添方　小烏沉湯　丁沉煎圓
如聖餅子　四柱散　大七香圓　小七香圓
撥氣阿魏圓　沉香降氣湯　分氣紫蘇飲　四倍散
感應圓　小理中圓　溫中良薑圓　蠟蜜圓
連翹圓　酒癥圓
木香餅子　草果飲
參苓白朮散　紅圓子
寶慶新增方　分心氣飲　奪命抽刀散
蘇子降氣湯　安中散　木香分氣圓　鐵刷湯
金露圓　祕傳降氣湯　白朮六乙湯　鹽煎散
燒脾散　新法半夏湯
神仙沉麝圓　治中湯
淳祐新添方　白沉香散
枳實理中圓　進食散
吳直閣增諸家名方　二蓋圓　蓋合圓
丁香煮散　鷄舌香散　蓬煎圓　守中金圓
順氣木香散　快氣湯

集香圓　異香散　肉豆蔻圓　化氣湯
如神圓　丁香脾積圓　五皮散
續添諸局經驗祕方　化痰玉壺圓　人參丁香散
分心氣飲　木香分氣圓　玉芝圓　木香流氣飲
千金大養脾圓　蟠葱散　大阿膠圓　木香檳榔圓
鹽煎散　參苓壯脾圓　華蓋散
巢肉平胃散　盧氏異方感應圓
十八味丁沉透膈湯　麝香蘇合香圓
人參木香湯　辰砂化痰圓
卷四　痰飲　附欬嗽　蘇子降氣湯　桔梗湯
倍朮圓　消飲圓　四君子湯　百部圓
金珠化痰圓　玉液圓　人參煮散　丁香半夏圓
胡椒理中圓　備急五嗽圓　二十四味流氣飲
款冬花散　鐘乳補肺湯　五香散
藿香散
紹興續添方　溫中化痰圓
二陳湯　溫肺湯　三稜散
寶慶新增方　溫中化痰圓
麻黃散　人參養肺圓　人參訶子圓　橘皮半夏湯
淳祐新添方　蒜白圓
新法半夏湯　丁香五奪圓　縮砂圓　新法半夏湯
破飲圓　人參款花膏　人參四七湯
吳直閣增諸家名方　人參清肺湯
溫中化痰圓　養中湯　人參定喘湯　何首烏圓
續添諸局經驗祕方　茯苓半夏湯
人參潤肺圓　定喘瑞應丹　杏子湯
人參定喘湯　細辛五味子湯
半夏圓　杏參散
卷五　補損虛　附骨蒸　金鈆石斛圓
腦肭臍圓　兎絲子圓

石南圓　八味圓　黃耆圓　茴香圓
五補圓　無比山藥圓　大山茱圓　定志圓
黃耆建中湯　人參黃耆散　威煉鍾乳粉　玉粉圓
預知子圓
紹興續添方
安腎圓　麝香鹿茸圓　妙香散
寶慶新增方
養氣丹　朴附圓　川練散
平補鎮心丹　十四味建中湯　雙和湯
木瓜圓　茱萸內消圓　思仙綻斷圓　黃耆六乙湯
淳祐新添方　青娥圓
接氣丹　事志膏　三仙丹　樂令建中湯
金鈴子圓
吳直閣增諸家名方
張走馬玉霜圓　降心丹　四神丹　十全大補湯
黃耆鱉甲散　秦艽鱉甲散　沉香鱉甲散　小兔絲子圓
續添諸局經驗祕方
沉香鹿茸圓　椒附圓　平補鎮心丹　青娥圓
威喜圓　遠志圓　小安腎圓　三建丹
伏火二氣丹　靈砂　上丹　鹿茸四斤圓
元兔丹　龍齒鎮心丹　羊肉圓　蓯蓉大補圓
十四友圓　鍾乳白澤圓　三建湯　十全飲
治痼冷　附消渴
二氣丹　崔氏烏頭圓　橘皮煎圓　附子理中圓　寶公卓鍾乳圓　金液丹
紹興續添方　北亭圓
沉香蓽澄茄散
寶慶新增方
精心蓮子飲　獨活寄生湯
淳祐新添方

人參養榮湯　鹿茸大補湯　發腎散
吳直閣增諸家名方
震靈丹　來復丹　養正丹
玉華白丹
續添諸局經驗祕方
金鎖正元丹　秘傳玉鎖丹　巴戟圓
正元散　茯菟圓
卷六　積熱
紫雪　紅雪通中散　涼膈散
八正散　龍腦飲子　妙香散
牛黃涼膈圓　抱龍圓　甘露圓
紹興續添方
甘露飲　桂苓圓
寶慶新增方
五淋散　消毒麻仁圓
淳祐新添方
導赤散
吳直閣增諸家名方
三黃圓　消毒犀角飲
續添諸局經驗祕方
碧雪　勝冰丹　導赤圓
麥門冬散　眞珠散　靈液丹
寫痢　附祕澁
鍾乳礞脾圓　朝真丹　駐車圓
大溫脾圓　黃連阿膠圓　神效胡粉圓
靈砂丹　不二圓　訶黎勒散
神功圓　麻仁圓　脾約麻仁圓
七宣圓　七聖湯　胃風湯
赤石脂散
紹興續添方

參香散　洗心散　訶黎勒圓
黑錫丹　龍腦鷄蘇圓　桃花圓
十補圓　五淋散　木香散
七聖圓
牢硫圓

純陽眞人養臟湯　感應圓
寶慶新增方
御米湯　地榆散
腸風黑散　斗門散
淳祐新添方
大斷下圓　狗頭骨圓
吳直閣增諸家名方
水煮木香圓　大香連圓
豆附圓　溫中圓
薯蕷湯　固腸散
縛虎圓　遇仙立效散
續添諸局經驗祕方
地榆散　祕傳斗門散
如神止瀉圓　神效參香散
卷七　眼目
錫塲圓　駐景圓
秦皮散　鎮肝圓
紹興續添方
菩薩散　撥雲散
寶慶新增方
草龍膽散　蟬花散
淳祐新添方
春雪膏
吳直閣增諸家名方
滌氣飲　洗肝散
續添諸局經驗祕方
蟬花無比散　明睛地黃圓
湯泡散　還睛圓
咽喉口齒
龍石散　如聖湯
大巳寒湯
金粟湯　育腸圓
水煮木香圓
戊己圓　痢聖散子
肉豆蔻散　神應黑玉丹
鵝兀圓　羅金丹
三神圓
丁香豆蔻散　萬金飲
黃耆湯
蜜蒙花散　羚羊角散
菊睛圓
菊花散　明睛散
洗眼紫金膏　草龍膽散
會青散　祕傳羊肝圓
鵬砂圓　磨膽散

紹興續添方
玉屑無憂散
寶慶新增方
如聖勝金鋌
淳祐新添方
鵬砂散
吳直閣增諸家名方
赴筵散　吹喉散
續添諸局經驗祕方
如聖勝金鋌　五香散　如神散
荆芥湯　細辛散
卷八　雜病
耆婆萬病圓　神應圓
解毒雄黃圓　尅效餅子　集效圓
立效散　必勝散　島梅圓
牡蠣散　法製熟艾　釣腸圓
紹興續添方
常山飲　對金飲子　清心蓮子飲
寶慶新增方
槐角圓
淳祐新添方
腸風黑散　神應紫玉丹
吳直閣增諸家名方
偏急圓　青解毒圓
續添諸局經驗祕方
茱萸內消圓　磨香大栽圓
治瘡腫傷折
蠻母膏　小犀角圓　玉池散
玉龍膏
紹興續添方
奪命丹　乳香圓
葫蘆巴圓　神效散
太嶽活血丹　石草散

化毒排膿內補十宣散
寶靈新增方
千金漏蘆湯　滑肌散
淳祐新添方
紅玉散　萬金膏
吳直閣增諸家名方
接骨散　急風散
拔毒散　琥珀膏
烏蛇膏　神仙太一膏
續添諸局經驗祕方
補損當歸散　排膿托裏散
卷九　治婦人諸疾
熟乾地黃圓　澤蘭圓
熟乾地黃散　安息活血丹
丙餘粮圓　逍遙散
保生圓　半夏茯苓湯
紹興續添方
黑神散　油煎散
淳祐新添方
琥珀黑龍丹
吳直閣增諸家名方
南燕魏夫人濟陰丹
續添諸局經驗祕方
琥珀圓　白堅丹
調中湯　旋覆湯
阿膠枳殼圓　失笑散
產後將護法　胎神遊方
卷十　治小兒諸疾
返魂丹　定命丹
鶴頂丹　至聖丹
沒藥降聖丹
神效托裏散
油調立效散　導滯散
丹參膏　神效當歸膏
升麻和氣飲　五香連翹湯
人參荊芥散　牡丹煎圓
吳茱萸湯　溫經湯
白薇圓　膠艾湯
茯苓圓　催生丹
安胎飲
人參養血圓　牡丹散
黑龍丹　當歸養血圓
增損四物湯　附產前將護法
催生符
八珍丹
五福化毒丹　太一銀硃丹
靈砂歸命丹

大戎府星圓　五疳保童圓　虎睛圓
進食丸　金箔鐵心丸　比金圓
開胃圓　沒石子圓　牛黃膏
潤肺散　惺惺散　清涼飲子
硃砂圓　太一丹　大驚圓
紹興續添方
蜂蜜丹　使君子圓　加減四君子湯
寶靈新增方
肥兒圓　換骨圓　急風丹
淳祐新添方
助胃膏　觀音散　小抱龍圓
吳直閣增諸家名方
蚵蛾圓　商陸丸散　鉤藤膏
厚朴散　柴胡散　白豆蔻散
豆蔻香連圓　龍骨圓　人參散
附子散　赤石脂散　白芨散
錢氏白朮散　金黃散
續添諸局經驗祕方
全蝎觀音散　鎮心至寶丹　五疳消食圓
參煎散　祕傳神仙消疳圓　磨積圓
龍膽圓　銀白散
諸湯　蛇頭圓
豆蔻湯　木香湯　桂花湯
玉真湯　聚湯　二宜湯
仙朮湯　茴香湯
寶靈新增方
檀香湯　縮砂湯　破氣湯
吳直閣增諸家名方　五味湯
調脾湯　小理中湯
續添諸局經驗祕方
消毒犀角飲

白梅湯　三倍湯　鹽刷湯　快湯
諸香
分積香　衙香　降真香　清遠香
附藥性總論上中下三卷

增廣太平惠民和劑局方卷一

虞山　張海鵬　校梓

諸風　附腳氣

【至寶丹】療卒中急風不語，中惡氣絕，中諸物毒，暗風中熱痰毒，陰陽二毒，山嵐瘴氣毒，蠱毒，水毒，產後血暈，口鼻血出，惡血攻心，煩躁氣喘，吐逆，難產悶亂，死胎不下，已上並用童子小便一合，生薑自然汁三五滴，入於小便內溫過，化下三圓至五圓，神効。又療心肺積熱伏熱，嘔吐，邪氣攻心，大腸風祕，神魂恍惚，頭目昏眩，眠睡不安，唇口乾燥，傷寒狂語，並皆療之。

生烏犀屑　生玳瑁屑　琥珀研　硃砂研細水飛，各一兩　龍腦　麝香各一分，研　牛黃半兩，研　雄黃研水飛，各一兩　安息香一兩半，爲末，以無灰酒浸澄飛過，濾去砂石，約取淨數一兩，慢火熬成膏。

銀箔五十片，研　金箔五十片，一半爲衣。

右件生犀玳瑁爲細末，入餘藥研勻，將安息香膏並湯煮蜜成膏，入諸藥中和，搗成劑，盛不津器中，重旋圓如桐子大，用人參湯化下三圓至五圓，又療小兒諸痼，盜汗，心熱卒中客忤，不得眠睡，煩躁，風涎搐搦，每二歲兒服二圓，人參湯化下。

【靈寶丹】有三名，一名歸命丹，一名還魂丹，入芒硝者，名破棺丹。治中風，手足不仁，言語蹇澀，或痛連骨髓，或痹襲皮膚，瘙痒如蟲行，頑痹如鐵石，或多痰好睡，或健忘多嗔，血脈不行，肉色乾瘦，或久在牀枕，起便須人，語澀面浮，惟覺不健，或偶縈疾苦，卒暴而終，並皆治之。

光明砂一兩半，打如皂角子大，絹袋子盛，以醋蒸灰汁，煮三伏時取出，細研如粉。

硫黃打如皂角子大，絹袋子盛，以無灰酒煮三伏時取出，細研如粉。

雄黃打如皂角子大，絹袋子盛，以米醋煮三伏時取出，細研如粉。

自然銅先搗碎，細研如粉，各一兩。

已上四味，用一有蓋磁瓶子，先以金箔三片，鋪於瓶子底上，便入硫黃，又以金箔兩片蓋之，次入雄黃，又以金箔兩片蓋之，次入硃砂，又以金箔兩片蓋之，次入自然銅，又以金箔三片蓋之，以瓶子蓋合，却不用固濟，於灰池內，坐瓶子令穩，以火發三日三夜，第一日用熟炭火半斤，圍瓶子三寸，第二日用熟火十兩，去瓶子二寸半，第三日用火一斤，去瓶子二寸，以火盡爲度，候冷取藥出瓶子，以紙三重裹，埋於淨濕土中，培至來且取出，更研令細。

磁石燒以醋淬二十遍，搗羅研如粉。　陽起石

紫石英已上研如粉，各三分。

已上四味，用一有蓋磁瓶子，先入磁石，次入陽起石，次入長理石，次紫石英，其所入金箔，一依前法，重重入之，以蓋子合其口不固濟，用火發三日三夜，第一日用熟炭火一斤，去瓶子三寸，第二日用火半斤，去瓶子二寸，第三日用火半斤，去瓶子一寸，一日至夜，任火自消，候冷取出藥，用紙裹入瓶土中，培至來且取出，更研令極細。

牛黃　龍腦　麝香　龍齒

腦肉臍酒刷微炙。　虎脛骨塗酒炙令黃，各一兩。

已上六味，搗羅爲末，更細研如粉。

鍾乳十兩，以絹袋子盛，先以長流水煮，半日後，棄其水，別用五斗煎取一斗，煮後草藥留鍾乳水三合，磨生犀角三分。　遠志去心。　巴戟　苦參

烏蛇酒浸去皮骨炙。　仙靈脾　天麻去苗土，各一兩一分。

已上六味，搗篩羅爲散，以前鍾乳水一斗煎至七升，用生絹濾去滓澄清。

肉桂去粗皮。　肉苁蓉去鱗。　鹿茸去毛塗酥炙微黃。　木香各一兩半。

延胡索　木胡桐律各三分。

已上六味，搗篩羅爲末，以前鍾乳汁七升煎至四升，用生絹濾去滓澄清。

半夏湯洗七遍，去骨。　當歸去蘆，各一兩。

已上二味，搗篩羅爲散，以前鍾乳汁四升煎至三升，用生絹濾去滓澄清。

皂莢子仁一兩半，搗羅研如粉。　生地黃汁　童子小便

無灰好酒各一升。

右件地黃汁等，合盛瓷器中，於靜室內，以文武火養至一升，下金石藥末，在內以柳木攪擾，勿令住手，看稍稠得所去火，然後入牛黃等六物，攪令極勻，即下皂莢仁末及麝香末，以絹濾過，入在藥內，然後鉢內以乳鉢令力士研三五千下，研訖，分為三分，內一分入芒硝一兩，更研勻，名破棺丹，圓如綠豆大。○凡治風病及撲傷肢節，不問程頃年月淺深，先以茶清調下紅雪通中散一二錢，須臾以熱茶投令宣瀉一兩行，便依法煎生薑黑豆湯下三粒，當以他人熱手更腳所患處，須臾熱徹，當覺肉內有物如火至病所，一二百日及一年內風疾下沫不得者，十服後便可行步，如患至重者，每利一度後，隔日服五粒，又住三五日即更利，不過三十粒，平復如故，若打撲損多年，每遇天陰疼痛動不得者，可五七服，如患風疾，及撲傷肢節，十年五載運動不能者，但依法服之，十粒便效，重者不過三十粒，有人患卒中惡暴亡者，但心頭未冷，取藥五粒以醋調塗腭中一手餘縫，當從齒四邊漸發，待眼開後，以熱醋研下十圓入口即活，如有中一切風牙關緊急及尸厥暴亡者，以熱醋研三兩圓，灌在口中，下得咽喉即活，如要常服，空心溫酒下二圓，服十粒許，毒腫之內，永無疾，此神驗，功非人智能測。

【潤體圓】治諸風，手足不隨，神志昏憒，語言蹇澀，口眼喎斜，筋脈攣急，骨節煩疼，頭旋眩暈，恍惚不寧，健忘恍惚，痰涎壅滯，及皮膚頑厚麻痹不仁。

南番琥珀別研如粉各半兩。　人參去蘆。　肉桂去粗皮，不見火。　牛黃　辰砂水飛。　沉香　檀香　丁香三香並不見火。　藿香葉　麻黃去根節。　白豆蔻仁　肉豆蔻仁　真珠末三分別研如粉　白茯苓去黑皮。　防風去蘆。　白附子炮。　芎藭各一兩半。　白龍腦　雄黃水飛。　乳香　麝香已上八味各別研如粉。

晚蠶蛾微炒。　羌活去蘆。　生犀角末　羚羊角末　木香　蔻子微炒。　黑附子炮去皮臍。　半夏水煮三十沸，薄切焙乾，入生薑汁炒。　乾蝎微炒各二兩。　白花蛇酒浸炙，去皮骨取肉。　獨活去蘆三分。　金箔六十片為衣。

右為細末，入研藥勻，煉蜜和圓，如鷄豆大，每服一圓，綿嚼，溫酒下，荊芥茶下，亦得，加至二圓，如破傷中風，脊強，手擯口噤，發搐，即以熱豆淋酒化破三圓，斡口開灌下，少時再服，汗出乃愈，若小兒驚風諸搐，每服半圓，薄荷湯化下，不拘時候。

【烏犀圓】治丈夫婦人卒中諸風，牙關緊急，腦上多涎，或語言蹇澀，口眼喎斜，用薄荷汁與酒各少許，化

三圓服之，良久再服，立有大效，又治癱瘓，暗風，癲病，手足潮搐，心神不安，遍身頑麻，腸風，痔瘻，腎藏風毒，上攻下疰，婦人血風，頭旋，吐逆，皮膚腫癢，遍身疼痛。

硫黃為末，用磁盞盛，慢火養成汁，入水銀急炒，如青泥，成砂，細研。　附子水浸炮，去皮臍。　川芎　石斛去根。　龍腦別研。　硃砂細研，水飛。　雄黃細研，水飛。　牛黃別研各半兩。　膩粉別研一分。　當歸去蘆，酒浸焙炒。　天南星湯浸薑自然汁煮軟，切片，焙乾，炒黃。　天麻酒浸，切焙。　川烏頭燒令通赤，留烟少許入坑內，以瓷器罩，用新土圍之，食頃取出。　陳皮湯浸去白，微炒。　白花蛇酒浸一宿，炙令熟，去皮骨用肉。　烏蛇酒浸一宿，炙令熟，去皮骨用肉。　白殭蠶去絲嘴，微炒。　半夏湯洗七次，薑汁浸三宿，炒黃。　羚羊角鎊。　乾蝎微炙。　獨活去蘆頭。　藿香葉去土。　草薢微炙。　肉桂去粗皮，不見火。　白附子微炮。　細辛去苗。　麻黃去根節。　防風去蘆頭及叉股。　槐膠　沉香不見火。　檀香已上各一兩。　麝香別研，各一兩。　木香不見火。　白朮米泔浸一宿，切焙微炒。　人參去蘆頭　厚朴去粗皮，薑汁塗，炙令熟。　茯苓去皮。　蠶本洗去土。　乾薑炮裂。　枳殼去穰，切麩炒。　敗龜酒醋塗，炙令黃。　虎骨酒醋塗，炙令黃，切焙。　丁香不見火。　白芷已上各三分。　何首烏米泔浸一宿，蒸過，狐一隻，入新瓦罐內，以瓦盆子蓋頭，用泥固濟，用炭火一秤，燒令通赤，待烟盡取出，候冷，研極細用。　狐肝三具，腊月採取，同烏鷄一隻，腊月採，取去毛，翅，足。

右件五十八味，並須如法修事，研令細，煉白蜜合和入臼，再搗三五千下，圓如皂角子大，常服一圓，不計時，薄荷湯或茶嚼下。

【牛黃清心圓】治諸風，痰癇不隨，語言蹇澀，心恍健忘，恍惚去來，頭目眩暈，胷中煩鬱，痰涎壅塞，精神昏憒，又治心氣不足，神志不定，驚悸恐怖，悲憂慘慼，虛煩少睡，喜怒無時，或發狂癲，神情昏亂。

牛黃一兩二錢，研。　麝香研。　羚羊角末　龍腦研各一兩。　當歸去蘆頭。　防風去苗叉枝。　黃芩　白朮　麥門冬去心。　白芍藥各一兩半。　柴胡去苗。　白茯苓去皮。　桔梗　杏仁去皮尖并雙仁者，麩炒黃別研。　芎藭各一兩二錢半。　肉桂去粗皮。　阿膠碎炒。　大豆卷碎炒各一兩七錢半。

蒲黃炒、　神麯研炒、　人參去蘆各二兩半、　雄黃八錢飛研、
甘草剉炒五兩、　白斂　乾薑各七錢半、　犀角末二兩、
金箔一千二百片內四百片爲衣、　大棗一百枚蒸熟去皮核研細成膏、
乾山藥七兩、

右除棗、香仁、金箔二角、及牛黃、麝香、雄黃、龍腦、別味外、爲細末、入餘藥、勻、煉蜜與棗膏爲圓、每兩作一十圓、用金箔爲衣、每服一圓、溫水化下、食後服、小兒減半、即酌度多少、以竹葉湯溫溫化下、

【摩挲圓】治中風癱瘓、半身不遂、口眼㖞斜、言語蹇澀、精神昏塞、步履艱難、或肌肉偏枯、手足彈曳、或筋脈拘攣不得屈伸、及氣痰并諸風身體疼痛、

薰陸香、研乳香別研、　辰砂細研、水飛、　生龍腦別研、　烏犀鎊屑別爲末、
雄黃光明者研飛、　自然銅煉赤醋淬、　天台烏藥　麝香別研各四兩、
天麻去苗洗一斤、　川烏炮製去皮臍尖、　丁香　地檢去苗、
黑參揀精者洗焙乾、　木香各八兩、　真珠末二兩研、

右爲細末研勻、煉蜜調如稀糊大、每服一圓、溫酒化下、不拘時候、服訖避風、蓋衣被令遍身汗尚未癒者、服一月、全安、輕者半月效、初患五七服可安、

【透冰丹】治一切風毒上攻、頭面腫焮、痰涎壅塞、心竹不利、口苦乾澀、風毒下注、腰脚沉重、腫痛生瘡、大便多秘、小便赤澀、及治中風癱瘓一切風疾、

益智子去皮、　川大黃去粗皮、　茯神去木、　仙靈脾葉
蔓荊子去白皮、　蔵靈仙去蘆洗焙、　天麻去苗、　白芷
山梔子去皮、　白茯苓各半兩、　香墨燒醋淬乾細研、　麝香研各一錢一分、
川烏二兩用河水浸半月三日一換水切作皮焙乾用鹽一兩炒黃去鹽、

右爲細末入研藥勻以煉蜜溲和如麥飯相似以眞酥塗杵臼搗萬杵如乾旋入蜜令得所和搗成劑每服旋圓如梧桐子大用薄荷自然汁同溫酒化下兩圓如卒中風涎潮昏塞煎皂莢白礬湯放溫化四圓溫之類緩風每日服三五圓漸覺有效常服一圓除風毒物、

【龍腦天麻煎】治一切風及癱緩風半身不遂、口眼㖞斜、語澀涎盛、精神昏憒、或筋脈拘攣、遍身麻痹、百節疼痛、手足頭掉、及腎藏毒風上攻、頭面腫、耳鳴重聽、鼻塞口乾、痰涎不利、下注腰脚、脚膝痿弱、腫痛生瘡、又治婦人血風攻疰、身體疼痛、面浮肌瘦、口苦舌乾、頭旋目眩、昏困多睡、或皮肉瘙痒、瘰癧疹生瘡、暗風、夾腦風、偏正頭疼、並皆治之、

甜瓜子淘洗淨、　地檢去苗、剉、別令淨、
黑參洗淨各五十兩、　天麻去苗百兩、　川烏炮去皮臍、　淨萍草揀洗淨、

已上爲末、用雪水白沙蜜各一十五斤、每一十兩、同化開、用絹袋濾過、銀石器內慢火熬成膏、

麝香研四兩、　生龍腦研八兩、

右爲細末、除龍麝外、用天麻、烏頭膏、和溲令勻、放冷入龍腦、再溲令勻、入臼內搗千百杵、搓爲餅子每服一皂莢子大、興薄荷同嚼、茶酒任下、不計時候、治癱緩風、併服見效、如被傷風、豆淋酒下、要發汗、用煨薑熱酒併服三服、效、常服亦得、

【牛黃小烏犀圓】治諸風筋脈拘急、手足麻痹、語言蹇澀、口面㖞斜、心怔恍惚、痰涎壅滯、頭目昏眩、肢節煩疼、及中風癱緩、暗風、癲病、腎風上攻、面腫耳鳴、下注腰脚、沉重疼痛、婦人血風、頭旋吐逆、皮膚腫瘙、遍身疼痛、

天麻去苗二十兩、　地檢去苗洗焙、　川烏炮去皮臍、　元參洗焙各十兩、
已上四味、爲細末、以木少許化蜜、同於石臼內、慢火熬攪成膏、放冷、次入後藥、

牛黃研、　麝香研、　龍腦研各一兩、　龍腦、薄荷葉、
浮萍草洗焙、　甜瓜子各十兩、　硃砂研飛、　生犀鎊各五兩、

右爲細末、與前膏子一處溲和、圓如鵝頭大、每服一圓、細嚼、荊芥葉下、溫酒亦得、不計時候、

【婁金圓】治諸風、神志不定、恍惚去來、舌強語澀、心怔煩悶、口眼㖞斜、手足彈曳、及風虛眩冒、頭目昏痛、或旋暈倒仆、涎潮搐搦、卒中急風、不省人事、小兒驚風諸癇、並皆治之、

白殭蠶去絲嘴、　黃耆去蘆、　藁本洗、　麻黃去根節、
羚羊角鎊、　羌活去苗、　甘草炙、　芎藭
白茯苓去皮、　犀角鎊各二兩、　白芷洗、　川芎各一兩半、
天竺黃、　牛黃別研、　龍腦研、　麝香、
白附子炮各一兩、　人參去蘆、　細辛洗、　防風去蘆、
天南星爲末、以牛膽汁和餅陰乾各一兩半、　甘菊去土四兩、　天麻去苗、
白花蛇酒浸去皮骨炙各三兩、　金箔一百片爲衣、　生地黃汁五升入蜜一兩、
酒二升、酥一兩半、慢火熬成膏放冷、

右爲細末、以地黃汁膏子溲和、每兩作五十圓、以金箔爲衣、每服一圓、細嚼、溫酒下、若中風涎潮、不語昏塞、甚者、加至三圓、用薄荷自然汁、同溫酒共半盞、化藥灌之、常服一圓、減兩人參湯嚼下、薄荷湯亦得、小兒每服皂莢子大、薄荷湯化下、

【龍虎丹】治丈夫、婦人、新得久患、急風、緩風、半身不遂、手脚筋挛、及風毒攻疰、遍身疼痛、頭風、多饒白屑、毒風、面上生瘡、刺風、狀如針刺、瘋風、急倒作聲、頑風、不認痛癢、癩風、頸生瘰疬、暗風、頭旋眼黑、癡風、面生赤黯、肝風、鼻塞眼瞤、偏風、口眼㖞斜、節風、肢節斷續、脾風、心多嘔逆、酒風、行步不前、肺風、鼻塞項疼、膽風、令人不睡、氣風、肉似蟲行、腎風、耳內蟬鳴、陰間濕痒、

何首烏去粗皮、　天麻去苗、　川芎洗、
天竺黃生研、　獨活去苗、　附子炮去皮臍、
藿香葉生、　柴胡去苗、　桔梗生、
黑牽牛末、　硫黃結砂、　龍腦研半、
白殭蠶去絲嘴炒、　菊花去土、　白芷生、
五靈脂生、　茴香去土、　肉桂去粗皮、
縮砂仁生各五兩、　防風去苗、　地龍去土焙、
白蒺藜炒、　硃砂研各三兩、　牙硝研、
真雄黃研飛、　麝香別研、
寒水石燒通赤研飛一斤、
右爲末煉蜜爲劑每服一圓鷄豆大薄荷酒嚼下日進一服連服三日後隨風亂道見物硃砂酒磨下蓋後身多瘡膿血風頻增昏沉身如針刺頭髮竪落面黃嘔逆並宜餌酒嚼下日進兩服治傷寒炒葱豉酒嚼下一二服發汗立愈小兒驚風薄荷酒化下少許大人急風口噤失音薄荷酒化灌下常服茶酒下不拘時候

【麝香天麻圓】治風痹手足不隨減少力顫掉血脈凝澁肌肉頑痹通身疼痛轉側不利筋脈拘攣不得屈伸

麻黃去根節二兩、　淨萍草紫背乾者去土四兩、　防風去蘆叉、
天麻各一兩並爲末、　安息香別研、　麝香研、　乳香研各一兩、
血竭別研細三兩、　槐膠別研一兩半、　硃砂研飛、　沒藥別研細各二兩、
右件藥除研藥外將硃出藥同研拌勻煉蜜白沙蜜與安息香同熬過搜成劑入臼搗杵熟爲圓如彈子大每服一圓溫酒或荆芥湯化下空心服忌風發汗爲效如不欲化服即圓如梧桐子大每服三十圓依前湯使下

【龍腦芎犀圓】消風化痰除心肺邪熱去頭面諸風治偏正頭痛心悸煩鬱面熱目闢鼻塞腦昏痰熱壅嗽腦不利

生龍腦別研、　山梔子去皮、　生犀屑各一兩、　石膏研、
川芎各四兩、　阿膠碎炒一兩半、　硃砂四兩一兩爲衣、　麥門冬去心三兩、
白茯苓去皮、　人參去蘆、　細辛去苗、　甘草炙各二兩、
右除別研後入外並爲細末煉蜜爲圓每服一圓至二圓細嚼茶酒任下食後服

【銀液丹】治諸風痰涎蘊結心膈滿悶頭痛目暈面熱心悸痰唾稠粘精神昏憒及風癇潮搐涎潮昏塞並宜服之

天南星爲末三分、　硃砂研飛半兩、　鐵粉　水銀結沙子各三兩、
脆粉研一兩、　黑鉛煉拾遍淨三兩與水銀結沙爲小塊同甘草十兩水煮半日候冷研、
右研勻麵糊圓梧桐子大每服二圓用薄荷蜜湯下生薑湯亦可微利爲度食後服如治風癇不計時候服

【和太師牛黃圓】治卒暴中風眩暈倒仆精神昏塞不省人事牙關緊急目睛直視竹膈喉中痰涎壅塞及諸癇潮發手足瘈瘲口眼相引項背強直並治之

石膽火燒醋淬九遍、　雄黃研飛、　蛇黃火燒醋淬九遍、　辰砂研飛、
磁石火燒醋淬九遍、　石綠研飛各一兩、　輕粉細研、　牛黃研飛、
粉霜研、　麝香細研各半兩、　金箔爲衣、　銀箔研各一百片
右件都研勻細用酒煮麵糊和圓如鷄豆大每服一圓煎薄荷酒嚼下老人可服半圓小兒十歲以下分爲四服蜜水調下內歲已下分爲五服未滿一歲可分爲七服如牙關緊急以物斡開灌之

【碧霞丹】治卒中急風眩暈倒仆痰涎壅塞心神迷悶牙關緊急目眼上視及五種癇病涎潮搐搦

石綠九度飛過十兩、　附子尖　烏頭尖　蝎梢各七十箇
右搗三味爲末入石綠令勻麵糊爲圓如鷄豆大每服急用薄荷汁半盞化下一圓更入酒半合溫服之須臾吐出涎然後隨證治如牙關緊急斡開灌之立效

【雄硃丹】治中風涎潮閉牆作聲目眩不開口眼喎斜手足不遂蓋是一切風疾並宜服之

雄黃別研、　硃砂別研、　麝香別研各一錢、
烏蛇去皮骨生、　白殭蠶去絲嘴生、　白附子生、　天南星洗各半兩、　龍腦別研、
右除研外餘皆爲末煉蜜爲圓如梧桐子大如中風涎潮牙關不開先用大蒜一瓣搗爛塗在兩牙關外腮上次用豆淋酒化一圓灌牙齒上即開讓用薄荷酒化下一兩圓如丈夫風氣婦人血風牙關緊急者只用豆淋酒化藥灌牙齒上即開如面風目眩喎斜眼黑欲倒者急嚼一兩圓薄荷酒服下

【八風丹】治諸風及痰熱上攻頭痛面赤目眩旋暈鼻塞喎乾頸項不利痰唾稠濁神情如醉百節疼痛耳鳴蟬鳴面上遊風口眼蠕動

寒水石火燒通赤研水飛過半斤、　龍腦
白殭蠶微炒、　白附子炮各半兩、　天麻酒浸焙、
半夏白礬製二兩、　麝香
右爲細末入研藥同研令勻煉蜜和圓如櫻桃大每服一圓細嚼溫荆芥湯下茶清亦得食後服

【牛黃生犀圓】治風盛痰壅頭痛目眩咽膈煩悶神思恍惚心怔面赤口乾多渴睡臥不安小便赤澀大便多祕

滑石研各一兩、

牛黃細研　生犀屑　龍腦細研各二兩半　半夏白礬製
牙硝細研　天麻去苗各二十兩　硃砂研水飛
水銀與鉛同結沙子各十兩　黃丹細研
雄黃研水飛　羚羊角鎊各五兩　風粉細研

右爲末，煉蜜圓，每兩作二十圓，每服一圓，溫薄荷湯化下，中風涎潮，牙關緊急，昏迷不省，用風粉一錢，藥三圓，生薑自然汁七點，薄荷水同化下，得吐或利，涎出痰涎即愈，小兒風熱驚搐，睡臥不安，上宜斤齒，每服半圓，如急驚風涎潮搐搦，眼目藏上，牙關緊急，用風粉半錢，生薑石菖蒲汁三五點，薄荷水同化下一圓，益歲數，加減服。

【辰砂天麻圓】治諸風痰壅，頭痛目眩，旋暈欲倒，嘔噦惡心，恍惚健忘，神思昏憒，肢體疼倦，頸項拘急，頭面癢瘙，手足麻痹，常服除風化痰，清神思，利頭目。

白附子炮五兩　天麻去苗十兩　天南星並汁浸切片子焙乾二十兩
麝香細研　白芷各一兩一分　硃砂細研水飛五兩一半入藥，一半爲衣
川芎二兩半

右爲細末，糊圓，如梧桐子大，每服二十圓，溫荊芥湯下，不拘時候。

【青州白圓子】治男子婦人半身不遂，手足頑麻，口眼喎斜，痰涎壅塞，及一切風，他藥所不能療者，小兒驚風，大人頭風，洗頭風，婦人血風，並宜服之。

天南星三兩　白附子二兩　半夏以水浸洗過，白好者用七兩

川烏頭去皮臍半兩，各生用

右爲細末，以生絹袋盛，用井華水攪，來出者，並以手搓令出，如有滓，更研，再入絹袋，攪濾爲度，放磁盆中，日中晒，夜露至曉，棄水，別用井華水攪，又晒，至來日早，再換新水攪，如此，春五日，夏三日，秋七日，冬十日，去水，攤乾，後如玉片碎，研，以糯米粉煎糊清爲圓，如綠豆大，每服五圓，加至十五圓，生薑湯下，不計時候，如腫痰風，以溫酒下二十圓，日三服，至三日後，溶當有汗，便能飲食，服經三五日，呵欠是應當，服十粒已來，永無風痰腦壅之患，小兒驚風，薄荷湯下兩三圓。

【辰砂圓】治諸風痰盛，頭痛惡心，精神昏憒，目眩心悸，嘔吐痰涎，牙腦煩悶。

天南星炮裂　白殭蠶去絲　白附子炮　蝎梢炮各一分
辰砂研細半兩　鵬砂細研　牛黃研各一錢　半夏湯洗七次一兩

右爲細末，同研令勻，水煮麵糊圓，如梧桐子大，每服二十圓，用生薑荊芥湯下，不拘時候。

【牛黃金虎丹】治急中風，身背強直，口噤失音，筋脈拘急，鼻乾面黑，遍身壯熱，汗出如油，目瞑唇青，心神迷悶，形體如醉，痰涎壅塞，胸腦喉中拽鋸聲。

牛黃細研二兩半　雄黃研水飛一百五十兩　金箔八十片爲衣　生龍腦研五兩

天南星爲末，用牛膽汁和作餅子，焙乾，如無牛膽，即用法酒浸七晝夜。　天竺黃研各二十五兩　白礬枯過　風粉研

右爲末，煉蜜調和，每一兩半，作十圓，以金箔爲衣，每服一圓，以新汲水化開之，扶坐使藥行化，良久，以薄荷白絲汁，更研化一圓灌之，立愈，肥盛體虛多涎有風之人，宜常服此藥，隨身備急，忽覺眼前昏暗，無心腦悶亂，有涎，欲倒，化藥不及，急嚼一圓，新汲水下，小兒急驚風，一歲兒服綠豆大一圓，薄荷白絲汁化開之，更益歲數，臨時加減，有孕婦人不得服。

【防風圓】治一切風及痰熱上攻，頭痛惡心，項背拘急，目眩旋暈，心怔煩悶，手足無力，骨節疼痹，言語澀澀，口眼瞤動，神思恍惚，痰涎壅滯，昏憒健忘，虛煩少睡。

天麻去苗，酒浸一宿　甘草炙　川芎洗　防風洗各二兩
硃砂半兩研爲衣

右爲細末，煉蜜爲圓，每兩作十圓，以硃砂爲衣，每服一圓，荊芥湯化服，茶酒嚼下亦得，不拘時候。

【川芎圓】消風壅，化痰涎，利咽膈，清頭目，治頭痛，旋暈，心悸，煩熱，頸項緊急，肩背拘倦，肢體煩疼，皮膚瘙痒，腦昏目疼，鼻塞聲重，面上遊風狀如蟲行。

川芎　龍腦薄荷葉去土各七十五兩
細辛洗五兩　防風去苗二十五兩　甘草炙三十五兩　桔梗一百兩

右爲細末，煉蜜調和，每一兩半分作五十圓，每服一圓，細嚼，茶清下，食後臨臥嚼。

【薄荷煎圓】消風熱，化痰涎，利咽膈，清頭目，治遍身麻痹，百節酸疼，頭昏目眩，鼻塞腦痛，語言聲重，項背拘急，皮膚瘙癢，或生瘮疹，及肺熱喉腥，脾熱口甜，膽熱口苦，又治鼻衄唾血，大小便出血，及脫着傷風，并沐浴後，並宜服之。

川芎三十兩　縮砂仁五兩　龍腦薄荷葉去土十斤　桔梗五十兩
甘草四十兩炙　防風去苗三十兩

右爲末，煉蜜圓，每兩作三十圓，每一圓細嚼，茶酒任下。

【天南星圓】治風化痰，精神爽氣，利胸膈，消酒毒，止痰逆，惡心，中酒嘔吐。

天南星一斤，每箇取一兩上下者，用溫湯浸洗，刮去表外浮皮，并虛軟處，令淨，用法酒浸一宿，用桑柴薪，不住添熱湯，令釜滿甑內氣盛，更不住酒酒，常令蒸過七伏時滿，取出，用銅刀子切開一箇大者，嚼少許，不麻舌爲熟，未即再炊，候熟，用銅刀切細焙乾。　麝香研

丁香各一兩　龍腦研一兩半　辰砂別研水飛二兩一半爲衣

右爲細末，入研藥勻，煉蜜并酒和圓，每兩作五十圓，硃砂爲衣，每服一圓，細嚼，溫熱生薑湯下，不計時候，酒後含化，除煩渴，止嘔逆。

【羚羊角圓】除三焦邪熱，疎一切風氣，治風盛痰實，頭目昏重，肢節拘急，痰涎壅滯，腸胃燥澀，大小便難。

犀角鎮　黃連去鬚各十兩　人參去蘆二十兩　黑牽牛一百二十兩炒別搗先取粉六十兩　大黃剉八十兩

右與牽牛粉合和爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓臨臥溫水下更量虛實加減

【皂角圓】治風氣攻疰頭面腫癢遍身拘急痰涎壅塞胷膈煩悶頭痛目眩鼻塞口乾皮膚瘙癢腰脚重痛大便風祕小便赤澀及欬嗽喘滿痰唾稠濁語澀涎多手足麻痹時風瘋病偏正頭疼夾腦風婦人血風攻疰遍身疼痛心忪煩躁癮疹瘙癢並宜服之

甘菊花去梗　半夏湯洗七次　白礬枯過　知母

蔵靈仙洗　貝母去心炒黃色　青皮不去白各一兩　槐角

乾薄荷葉　皂角各五兩細碎以水一十八兩六錢採取汁用蜜一斤同熬膏

牽牛子末二兩

右爲末以皂角膏和圓如梧桐子大每服二十圓食後生薑湯下痰實欬嗽給粉茶汁下手足麻痹生薑薄荷湯下語澁昏瞀茶清下偏正頭疼夾腦風薄荷湯下

【小緩命湯】治卒暴中風不省人事漸覺半身不遂口眼喎斜手足顫掉語言蹇澀肢體麻痹神情昏亂頭目眩重痰涎併多筋脈拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側若治脚氣緩弱久服差久病風人遇天色陰晦節候變更宜服以防痼疾及治諸風服之皆驗

麻黃去節　人參去蘆　黃芩　白芍藥

芎藭　甘草剉炙　杏仁去皮尖炒黃　防己

肉桂去皮各一兩　防風去蘆一兩半　附子炮去皮臍細切半兩

右除附子杏仁外搗爲粗散後入二味令勻每服三錢水一盞半薑五片煎去一盞去滓食前稍熱服

【防風湯】治風虛發熱項背拘急肢節不隨恍惚狂言來去無時不自覺悟亦治脚氣緩弱此藥溫和不虛人

防風去蘆　半夏湯洗七次切焙　獨活去蘆　秦艽去苗土

麻黃去根節各二兩　升麻　白芍藥　人參去蘆

甘草炙剉　遠志去心　防己　黃芩

石膏剉研　當歸去蘆

右爲粗末入半夏片子令勻每服四錢水二中盞生薑七片煎至一盞去滓取清汁六分入麝香末少許食前溫服熱服

【排風湯】治男子婦人風虛冷濕邪氣入腦狂言妄語精神錯亂肝風發則面青心悶吐逆嘔沫脇滿頭

眩耳重不聞人聲偏枯緊急曲拳而臥心風發則面赤翕然而熱悲傷瞋怒目張呼喚脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則面黑手足不隨腰痛難以俛仰痹冷骨疼若有此候令人心驚志意不定恍惚多忘

白茯苓去皮　獨活去蘆　麻黃去節各三兩　肉桂去粗皮

白鮮皮　芎藭　當歸去蘆酒浸一宿　防風去蘆又

白芍藥　甘草剉炒　杏仁去皮尖雙仁者麸炒令黃色

白朮各二兩

右爲粗散每服三錢水一盞半生薑四片同煎八分去滓溫服不計時候常服安心定志聰耳明目通腠腑除風疾並皆治之

【大通聖白花蛇散】大治諸風無問新久手足攣曳腰脚緩弱行步不正精神昏冒口面喎斜語言蹇澀痰涎壅盛或筋脈攣急肌肉頑痹皮膚瘙癢骨節煩疼或痛無常處遊走不定及風氣上攻面浮耳鳴頭痛目眩下注腰脚酸疼腿重腫癢生瘡並宜服之

白花蛇酒浸炙去皮骨用肉　天麻去苗　防風去蘆又錢

蔵靈仙去土　赤箭　厚朴薑汁製一宿炙　甘草炙剉

海桐皮去麤皮　藁本去土　草薢酒浸一宿　木香

乾山藥　肉桂去麤皮　杜仲剉炒　當歸去苗酒浸一宿

白附子炮　虎骨醋炙　白芷　乾蝎炒

郁李仁去皮別研　牛膝去苗　菊花

蒺藜子去白皮各一兩

右爲細末每服一二錢溫酒調下熱茅湯亦得空心服常服袪逐風氣通行榮衛久病風人尤宜常服輕可中風不溫二十服平復如常

【消風散】治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋轉耳鳴蟬鳴眼澀好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙癢癮疹又治婦人血風頭皮腫癢眉稜骨痛旋轉欲倒痰逆惡心

白茯苓去皮皮　芎藭　羌活去蘆　人參去蘆

荊芥穗　防風去蘆又　藿香葉　蟬殼去土微炒

白殭蠶炒去絲　甘草剉炒各二兩　厚朴去粗皮薑汁炙　陳皮去白焙各半兩

右爲細末每服二錢茶清調下如久病偏風每日三服便覺輕減如脫着沐浴感風寒頭痛脊重痠熱倦疼荊芥茶清調下溫酒亦得可併服之小兒慢驚風乳香荊芥湯調下半錢不拘時候

【羌活散】治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘急風邪塞壅頭疼項強鼻塞聲重肢節煩疼天陰風

雨預覺不安。

白茯苓去皮、　羌活去蘆、　菊花去梗葉、　川芎
荊胡去蘆、　黃芩、　細辛去苗、　枳殼去穰麸炒、
蔓荊子去白皮、　麻黃去根節、　防風去蘆叉、　石膏細研、
甘草剉焙、各一兩、

右爲末、入石膏令勻、每服二錢、水一大盞、生薑四片、薄荷三兩、葱白、鹽七分、去滓、稍熱服、不拘時候、

【八風散】治風氣上攻、頭目昏眩、肢體拘急、煩疼、或皮膚風瘙癢痛、及治塞鼻不聞、鼻塞聲重。

人參去蘆、　黃耆去蘆剉、　甘草剉炒、各二斤、　防風去蘆叉、
羌活去蘆、各三斤、　白芷、　荊胡去蘆、各一斤、　藿香葉半斤、

右爲細末、每服二錢、水一中盞、薄荷少許、同煎至七分、去滓、食後溫服、或茶清調一大錢亦得、小兒虛風、乳香服、茶清調服半錢、更量見大小加減、

【清神散】消風壅、化痰涎、治頭昏目眩、心忪面熱、頭痛耳鳴、鼻塞聲重、口眼瞤動、精神昏憒、肢體疼倦、頸項緊急、心膈煩悶、咽嗌不利。

薄荷去土、　荊芥穗各二十兩、　羌活去苗、　防風去苗叉、
人參去蘆、　檀香剉、各十兩、　細辛去苗洗、焙、五兩、　甘草炙、二十兩、

石膏別研、水飛、四十兩、

右爲末、每服二錢、沸湯點服、入茶末點服亦得、食後服、

【虎骨散】一名乳香趁痛散、治男子婦人、因氣血虛弱、風毒邪氣乘虛攻注、皮膚骨髓之間、與血氣相搏、往來交擊、痛無常處、遊走不定、晝靜夜甚、少得眠睡、筋脈拘急、不能屈伸。

虎脛骨酥炙、　敗龜去裙、炙、各二兩、　血竭細研、　沒藥研、
赤芍藥去蘆、　當歸去苗、　自然銅醋淬、細研、　白芷、
茺耳子微炒、去刺、　防風去蘆叉、　肉桂去粗皮、
白附子炮、各三分、　牛膝去苗、酒浸一宿、　骨碎補去毛、　沒藥研、
天麻去蘆、　檳榔各一兩、　五加皮去心、　羌活去蘆、

右爲細末、每服一錢、溫酒調下、不拘時候、

【骨碎補圓】治肝腎風虛上攻下注、筋脈拘攣、骨節疼痛、頭面浮腫、手臂少力、腰背強痛、脚膝痿弱、屈伸不利、行履艱難、並宜服之。

骨碎補剉去毛、炒、　自然銅醋淬九次、　川烏頭炮去皮臍、　藏靈仙去苗、
槐砂仁、　牛膝酒浸一宿、焙乾、　牛夏洗七次、各半兩、　萆薢酒浸一宿、切焙、
白附子炮、　荊芥穗各一兩、　地龍去土、微炒、　沒藥各二錢半、

右爲細末、酒煮糊圓、如梧桐子大、每服五七圓、溫酒下、婦人醋湯或當歸酒下、不計時候、孕婦不宜服。

紹興續添方

【烏荊圓】治諸風緩癱、手足不隨、口眼喎斜、言語蹇澀、眉目瞤動、頭昏腦悶、筋脈拘攣、不得屈伸、遍身麻痹、百節疼痛、皮膚瘙癢抓成瘡瘢、又治婦人血風渾身痛癢、頭疼眼澁、及腸風臟毒、下血不止、服之尤效、久服令人顏色和悅、力強輕健、鬚髮不白。

川烏頭炮、去皮臍、一兩、荊芥穗二兩、

右爲細末、酒糊糊圓、如梧桐子大、每服二十粒、酒或熱水下、有疾、食空時、日三四服、無疾、早晨一服、○有少府郭監丞、少病風慄搖、頭頸寬緩不收、手盛顫、終後能食、服此六七服、卻痊、遂長服之、已五十餘年、年七十餘、強健鬚髮無白者、此藥療腸風下血尤妙、屬有人得效、予所目見、下血人服此而痊者、一歲之內已數人矣、

【加減三五七散】治八風五痹、癱瘓、顫掣、口眼喎斜、眉角牽引、項背拘強、牙關緊急、心中憒悶、神色如醉、遍身發熱、骨節煩疼、肌肉麻木、腰膝不仁、皮膚瞤動、或如蟲行、又治陽虛頭痛、風寒入腦、目旋眩轉、有似舟船之上、耳內蟬鳴、或如風雨之聲、應風寒濕痹、脚氣緩弱等疾、並皆治之。

山茱萸、　茯苓去皮、　乾薑炮、各三斤、　防風去蘆四斤、
附子三十五箇、炮、　細辛一斤八兩、　一方、天雄、細辛各三錢、乾薑、山茱萸五錢、山藥、防風各七錢、

右爲細末、每服二錢、溫酒調下、食前服、即大三五積散、

【太陽丹】方見傷寒類、

【如聖餅子】方見一切氣類、

【沒藥降聖丹】方見傷折類、

【乳香沒藥圓】治男子婦人一切風氣、通經絡、活血脈、治筋骨疼痛、手足麻痹、半身不遂、暗風頭旋、偏正頭風、小中急風、手足疼痛、牙關緊急、四肢軟弱、腎臟風毒、上攻頭面、下注腰腳、生瘡遍體疼酸、並宜服之。

孕婦不可服。

鵝蹠花炒、　當歸洗焙、乾、炒、　木鱉子去殼、　藿香去枝梗、
五靈脂揀去沙、　殭蠶洗、去絲嘴、焙、　白膠香揀、　白芷各七十二兩、
撫芎一百單八兩、　草烏頭六百四十八兩、炒、　地龍一百四十四兩、　蔵靈仙二百二十二兩、洗、
何首烏二百四十四兩、洗、

右爲末、醋煮糊圓、如梧桐子大、每服五圓、不可多服、食後用薄荷茶送下、溫酒亦得、

【七聖散】治風濕流注、經絡間肢節緩癱不隨、或腳膝疼痛。

杜仲　續斷　萆薢　防風

獨活　牛膝酒浸一宿　甘草

右件各修事淨焙乾牛兩爲細末每服二錢溫酒調下

【白龍圓】治男子婦人一切風遍身瘡癬手足頑麻偏正頭疼鼻塞腦悶大解傷寒治頭風牙痛一切分作三服乾猪後鹽湯漱之更用葱茶嚼下

川芎　藁本　細辛　白芷　甘草各等分

右爲細末每四兩麵末入煨了石膏末一斤水搜爲餅每一兩作八圓每服一圓食後薄荷茶嚼下

【活血應痛圓】治風濕客於腎經血脈凝滯腰腿重疼不能轉側皮膚不仁遍身麻木上攻頭面虛浮耳內常鳴下注腳膝重痛少力行履艱難亦治項背拘攣不得舒暢常服活血脈壯筋骨使氣脈宣流

草烏頭一斤半炮　沒藥一十二兩別研　蔵靈仙二斤　蒼朮六斤

香附子去毳毛炒七斤半　狗脊四斤刮去毛　陳皮洗去瓤五斤炒

右爲細末用酒煮麵糊圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓溫酒或熱水任下不拘時候久服忌桃李鵝雀諸血物

【四生散】治男子婦人肝腎風毒上攻眼赤瘡痛不時羞明多淚下注腳膝生瘡及遍身風癬服藥不驗居常多覺兩耳中瘙正宜服此無不取效

沙苑蒺藜　川羌活　白附子　黃耆並生用

右件各等分爲細末每服二錢薄荷酒調下如腎藏風下注生瘡以膠子批開以藥末二錢合定紙裹以水潤過煨香熟空心細嚼以暖酒送下

【通關散】治中風傷寒發熱惡風頭痛目眩鼻塞聲重肩背拘急身體酸疼肌肉瞤動牙關緊急及久新頭風攻注眼暗並宜服之

川芎一兩　細辛半兩　甘草　川烏

白芷　撫芎各二兩　龍腦薄荷葉一兩半

右爲細末每服一大錢葱白茶清調下薄荷湯亦得

【四斤圓】治體虛氣弱風寒濕毒客於經絡血脈凝滯腰腿沉重筋骨緩弱四肢酸疼麻痹不仁間或腫痿腳膝無力隱痛拘攣不能履地一切久新諸腫腳氣悉治之

宣州木瓜去穰切焙乾　牛膝去蘆剉焙　萆薢洗淨切焙　天麻去蘆細剉各一斤

已上四味如前修事了用無灰酒五升浸春五日夏三日冬十日足取出焙乾再入

虎骨一兩　附子二兩炮去皮臍

右同爲細末用浸酒麵酒打糊糊爲圓如梧桐子大每服三五十圓或鹽湯吞下食前服此藥常服補虛除羸大壯筋骨

【鐵彈圓】治卒暴中風神志昏憒牙關緊急目睛直視手足瘈瘲口面喎斜涎潮語澀筋攣骨痛痰癱偏枯或麻木不仁或瘙癢無常應是風疾及打撲傷損肢節疼痛並皆治之通經絡活血脈

乳香　沒藥各一兩別研　五靈脂四兩爲細末　麝香一錢細研

川烏頭一兩半爲末

右先將乳香沒藥於陰涼處細研次入麝香次入藥末再研滴水和圓如彈子大每服一圓薄荷酒磨下食後臨臥服

寶麗新增方

【大聖一粒金丹】治男子婦人急患中風左癱右瘓手足瘈瘲口眼喎斜涎潮語澀遍身疼痛偏正頭風凡遇風疾並皆療之

白殭蠶炒去絲嘴　五靈脂去石研　白殭蠶炒去絲嘴各一兩細香墨磨汁

麝香淨肉研　白礬枯別研　沒藥別研　硃砂別研各半兩

大黑附子　大川烏頭各炮去皮尖　新羅白附子炮各二兩　金箔二百片爲衣

右黑附子川烏白附子白殭蠶五靈脂同爲末後研白礬沒藥麝香硃砂合和用井華水一盞研麝香爲度精漿汁搗和杵臼內搗五百下圓如彈子大金箔爲衣晾乾每服一粒食後臨臥生薑自然汁磨化入熱酒服再以熱酒隨意多少飲之就無風疾處臥去被蓋覆汗出即愈病少每粒分二服忌發風物孕婦不可服

【乳香應痛圓】治一切風氣左癱右瘓口眼喎斜半身不遂語言蹇澀精神恍惚痰涎壅塞筋脈拘攣或遍身頑痹走注疼痛腳膝緩弱行步艱難又治打撲傷損瘀血不散痛不可忍或行路勞傷腳膝浮腫疼痛或腎臟風虛上攻面腫耳鳴下注腳膝沉重及偏正頭疼攻注眼目並皆療之

白殭蠶炒去絲嘴　草烏頭炮去皮尖各十二兩　虎骨酥炙令黃

赤小豆生各六兩　龍骨四兩半　木鱉子七十箇　乳香六錢重研

全蝎七十箇去尾針　蜈蚣六條去尾針以薄荷葉裹煨熟　天麻去蘆洗

川牛膝去蘆酒浸　川當歸去蘆酒浸　白膠香煉過各三兩

右爲細末用醋糊圓如梧桐子大每服五圓至七圓冷酒香下或冷茶清下亦得不計時忌酒熱物一時辰久此藥但臨睡服尤妙忌風麵炙煿鮮補發熱動風等物

【省風湯】治卒急中風口噤全不能言口眼喎斜筋脈挛急抽掣疼痛風痰壅盛筋脈頑滿左癱右瘓手足麻痹骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憒應一切風證可預服之

天南星生用　防風去蘆各四兩　甘草生用　半夏米泔浸一宿

黃芩去粗皮各二兩

右㕮咀每服四大錢用水二大盞生薑十片煎至一中盞去滓溫服不拘時候

【追風散】治年深日近偏正頭痛。又治肝臟久虛。血氣衰弱。風毒之氣。上攻頭痛。頭眩目暈。心悸煩熱。百節酸疼。腦昏目痛。鼻塞聲重。項背拘急。皮膚瘙痒。面上遊風狀若蟲行。及一切頭風。兼治婦人血風攻注。頭目昏痛。並皆治之。常服清頭目。利咽膈。消風壅。化痰涎。又方見後。

川烏炮去皮臍尖　防風去蘆叉　石膏煅　川芎洗去土
甘草炙　荊芥去梗　白殭蠶炒去絲嘴各一兩　天南星炮
羌活洗去土　天麻去蘆　全蝎去尾針　白附子炮
地龍去土　白芷各半兩　草烏炮去皮尖　沒藥細研
乳香細研　雄黃研各一分

右為細末。每服半錢。入好茶少許同調。食後及臨睡服。

【乳香圓】治一切風疾。左癱右瘓。口眼喎斜。半身不遂。語言蹇澀。精神恍惚。痰涎壅塞。手足彈掣。筋脈拘攣。或逼身頑痹。走注疼痛。腳膝緩弱。行步艱辛。又治打撲傷損。瘀血不散。痛不可忍。或行路勞傷。腳膝浮腫疼痛。或腎臟風毒上攻。面腫耳鳴。下注腳膝沉重。並皆治之。

白附子炮　天南星炮　白芷剉　沒藥研
赤小豆　荊芥去梗　藿香洗去土　竹碎補去毛
乳香研各一兩　五靈脂去沙土　川烏炮去皮尖　糯米炒各二兩
草烏頭炮去皮尖　京墨煙各五兩　松脂半兩研

右為細末。酒煮糊圓。如梧桐子大。每服十圓至十五圓。冷酒吞下。茶酒亦得。不拘時候。忌熱物一時辰。

【黑神圓】治男子女人左癱右瘓。腳手頑麻。腰膝疼痛。走注四肢。百節皆痛。並宜服之。又方見後。

熟乾地黃洗　赤小豆　乾薑炮　藁本洗去蘆
麻黃剉去節。湯去沫　川芎洗各六兩　草烏一斤炮去皮尖　藿香洗去土
燒墨各半斤　白芷十二兩　川烏炮　甘草剉各十八兩
羌活不見火　甘松洗去土　當歸洗去蘆各三兩

右為細末。以水煮糊圓。如菉豆大。每服一二十丸。細嚼茶酒任下。如婦人血風腳手疼痛打撲傷損。亦宜服之。

【拒風丹】治一切風。尋常些小傷風。頭痛。鼻塞。項強筋急。皆可服之。

天麻去蘆　甘草各一兩　防風一兩半去蘆叉　川芎四兩
菖蒲半兩　細辛三錢半洗去土

右為細末。煉蜜圓。如綠豆大。每服一丸。細嚼荊芥湯或溫酒送下。亦得。食後服之。立效。

【急風散】治男子婦人偏正頭疼。夾腦風。太陽穴痛。坐臥不安。

生川烏炮去皮臍　辰砂研飛各二兩　生南星四兩洗去皮

右為細末。每用酒調塗痛處。兼治小兒傷風鼻塞清涕。酒調塗囟門上。不可服之。

淳祐新添方

【三生飲】治卒中昏不知人。口眼喎斜。半身不遂。咽喉作聲。痰氣上壅。無問外感風寒。內傷喜怒。或六脈沉伏。或指下浮盛。並宜服之。兼治痰厥氣厥及氣虛眩暈。大有神功。

南星生用一兩　川烏生去皮　附子生去皮各半兩　木香一分

右㕮咀。每服半兩。水二大盞。煎十五片。煎至八分。去滓。溫服。不拘時候。

【大醒風湯】治中風痰厥。涎潮昏暈。手足搐搦。半身不遂。及腰節痛。風筋脈緩急。並皆治之。

天南星生用八兩　防風生用四兩　獨活生用　附子生去皮臍
全蝎微炒　甘草生用各二兩

右㕮咀。每服四錢重。水二大盞。生薑二十片。煎至八分。去滓。溫服。不拘時候。日進二服。

【五痹湯】治風寒濕邪。客留肌體。手足緩弱。麻痹不仁。或氣血失順。痹滯不仁。並皆治之。

羌活　白朮　片子黃芪一兩洗去灰土
甘草微炙半兩

右㕮咀。每服四錢重。水一盞半。生薑十片。煎至八分。去滓。病在上。食後服。病在下。食前服。

吳直閣增諸家名方

【蠲氣圓】治鬱憂積氣。心受風邪。發則牙關緊急。涎潮昏塞。醒則精神若癡。大宜服之。

紫蘇子炒一兩　乾蝎去針。微炒一分　附子去皮臍生用　花蛇酒炙熟去皮骨
白殭蠶微炒　橘紅　天麻去苗　麻黃去根節
南木香　天南星洗浸薄切。薑汁浸一宿各半兩　硃砂一分半為衣

右為末。入腦麝少許。同研極停。煉蜜杵圓。如龍眼大。每服一粒。用金銀薄荷湯化下。溫酒亦得。○此方戊申年軍中一人犯法。讀衣膊受刃。得釋。神失如癡。與一粒服。乾而痒。及覺。病已失。江東提轄張戒揚妻。遭寇失心數年。授此方。不終劑而愈。又巡檢黃彥雲。狂躁瞋怒。不終劑而愈。蓋痰迷心竅。肝邪若多虛怒。肝邪太盛。鐵粉能制伏之。素問言陽厥狂怒。治以鐵落金粉木之意也。

【乳香宣經圓】治髓虛為風濕寒暑侵襲。四氣相搏。半身不遂。手足頑麻。骨節煩疼。足腰浮腫。惡寒發熱。漸成腳氣。肝腎不足。四肢拳急。遍身攻注。或閃肭打撲。內傷筋骨。男子疝氣。婦人經脈不調。常服活血止痛。補虛壯筋骨。

蔵靈仙洗去蘆　烏藥去木　茴香淘去沙土炒　川楝子剉炒
牽牛子炒　橘皮去白　草豆蔻微炙　防風各二兩

五靈脂　草烏烏豆一合同煮，竹刀切透，黑焙，去皮，焙　乳香各半兩

右為細末，酒糊為圓，如梧桐子大，每服五十圓，臨溫酒任下，婦人醋湯下。

續添諸局經驗秘方

【黑神圓】治一切風疾及瘫緩風，手足顫掉，渾身麻痹，肩背拘急，骨節疼痛，兼療婦人血風，頭旋眼暈，精神困倦。

牡丹皮　白芍藥　川芎　麻黃去根節各四兩

赤芍藥　甘草各十兩　草烏炮　荊芥各六兩

烏豆八兩　何首烏米泔浸，切焙，十二兩

右為細末，水糊為圓，如鷄頭大，每服一圓，細嚼茶酒任下，不拘時候，婦人血風流注，用黑豆淋酒下，小兒瘫風，煎金銀湯下，傷風咳嗽，酒煎麻黃下，頭痛，蔥茶下。

【追風散】治證與前追風散同。

白殭蠶微炒，去絲嘴，　全蝎　甘草炙，　荊芥各二兩，

川烏炮，去皮尖，　防風去蘆叉，　石膏別研，各四兩，　川芎三兩，

麝香一兩，研，

右為細末，每服半錢，好茶調下，食後臨風服，若服清頭目，利咽膈，消風化痰，

【苦參圓】治心肺積熱，腎臟風毒，攻於皮膚，時生疥癩，瘙痒難忍，時出黃水，及大風手足煩壞，眉毛脫落，

苦參三十二兩，　荊芥去梗，十六兩，

右為細末，水糊為圓，如梧桐子大，每服三十圓，好茶香下，或荊芥湯下，食後服，一切風疾，並皆治之。

增廣太平惠民和劑局方卷二

傷寒　附中暑

【人參敗毒散】治傷寒時氣，頭痛項強，壯熱惡寒，身體煩疼，及寒熱瘧嗽，鼻塞聲重，風痰頭痛，嘔噦寒熱，並治之。

人參去蘆，洗焙，　茯苓去皮，　甘草炙，　前胡去苗，洗焙，

芎藭　羌活去蘆，　獨活去苗　桔梗

柴胡去苗，洗焙，　枳殼水浸去穰，剉麩炒黃色，各等分，

右為細末，每服二錢，水一盞，生薑兩片，薄荷各少許，煎七分，去滓，溫服，不拘時，寒多，則熱服，熱多，則溫服。

【小柴胡湯】治傷寒溫熱病，身熱惡風，頸項強急，胷滿脇痛，嘔噦煩渴，寒熱往來，身面皆黃，小便不利，大便祕澀，或過經未解，或潮熱不除，及瘧後勞復發熱，疼痛，婦人傷風頭痛煩熱，經血適斷，寒熱如瘧，發作有時，及產後傷風頭痛煩熱，並宜服之。

柴胡去蘆，半斤，　黃芩　人參去蘆　甘草炙，各三兩，

半夏湯洗七次，焙乾，二兩半，

右為麄末，每服三大錢，水盞半，生薑五片，棗一個，擘破，同煎七分，去滓，稍熱服，不拘時，小兒分作二

圓，圓量大小加減。

【林檎散】治傷寒及時行疫癘，頭痛項強，壯熱惡寒，腰背四肢拘急煩疼，面赤咽乾，嘔逆煩渴。

山梔子去皮，　麻黃去節，　川大黃
蒼朮去皮，　肉桂去粗皮，　石膏各一兩半，　木通
當歸去蘆洗，　甘草炙，　瞿麥
前胡去蘆各一兩，　藿香葉　川烏頭炮裂去皮臍各半兩，

右爲麤散，每服二錢，水一盞，入林檎參十數片，無者亦得，煎七分，稍熱服，不拘時，相次再服，衣被蓋汗出爲度。

【柴胡石膏散】治時行瘟疫，壯熱惡風，頭痛體疼，鼻塞咽乾，心胸煩滿，寒熱往來，痰實欬嗽，涕唾稠粘。

桑白皮　黃芩各三十七兩半，　升麻二十五兩，　石膏
前胡去蘆，　赤芍藥　乾葛　柴胡去苗各五十兩，
荆芥穗去土三十七兩，

右爲粗末，每服二錢，水一盞，生薑三片，煎七分，去滓，稍熱服，小兒分作三服，量大小加減，不拘時候。

【麻黃湯】治傷寒頭痛，發熱惡風，骨節疼痛，喘滿無汗。

麻黃去節三兩，　杏仁七十枚去皮尖炒，別研如膏，　肉桂去粗皮二兩，
甘草炙一兩，

右爲麤散，入杏仁膏令勻，每服三錢，水一盞半，煎八分，去滓，溫服，汗出爲度，若病自汗者，不可服，不拘時候。

【小青龍湯】治傷寒表不解，心下有水氣，乾嘔，發熱，欬嗽微喘，又治溢飲，身體疼重，及欬逆倚息，不得安臥，或因形寒飲冷，內傷肺經，咳嗽喘急，嘔吐涎沫，並宜服之。

麻黃去根節，　芍藥　細辛去葉，
甘草剉炒，　肉桂去粗皮各三兩，　五味子二兩　乾薑炮，　半夏湯洗切二兩半，

右爲麤散，入半夏令勻，每服三錢，水一盞半，煎至一盞，去滓，食後溫服。

【聖散子】治傷寒時行疫癘，風溫濕溫，一切不問陰陽兩感，表裏未辨，或外熱內寒，或外寒內熱，頭項腰背拘急疼痛，發熱惡寒，肢節疼重，嘔逆喘欬，鼻塞身重，及食飲生冷，傷在胃脘，胃脘滿悶，腹脇脹痛，心下結痞，手足逆冷，腸鳴泄瀉，水穀不消，時自汗出，小便不利，並宜服之。

草豆蔻去皮，十箇，　石菖蒲　高良薑　猪苓去皮，
蒼朮　茯苓去黑皮，　芍藥　獨活去蘆
附子炮去皮臍，　麻黃去根節，　厚朴去粗皮薑汁炙，　藁本去土，

枳殼去穰麩炒，　柴胡去蘆，　澤瀉　防風去蘆，
藿香去土及大枝梗，　吳茱萸湯洗七次，　半夏湯洗七次薑汁製，　吳白朮各半兩，
甘草炙剉一兩，　細辛半兩，

右爲麤散，每服四錢，水一盞半，煎取一盞，去滓，溫服，不拘時，取溫身微汗即愈，時氣不和，空腹飲之，辟邪疫。

【五積散】調中順氣，除風冷，化痰飲，治脾胃宿冷，腹脇脹痛，胃脘停痰，嘔逆惡心，或外感風寒，內傷生冷，心腹宿悶，頭目昏痛，肩背拘急，肢體怠惰，寒熱往來，飲食不進，及婦人血氣不調，心腹撮痛，經候不勻，或閉不通，並宜服之。

陳橘皮去白，　枳殼去穰麩炒，　麻黃去根節各六兩，　白芍藥
川芎　當歸去蘆洗，　甘草炙剉，　茯苓去皮，
半夏湯洗七次，　肉桂去粗皮　白芷各三兩，　厚朴去粗皮，
乾薑炮各四兩，　桔梗去蘆十二兩，　蒼朮淨洗去皮二十四兩，

右除肉桂枳殼外，別爲麤末，外一十三味同爲麤末，慢火炒令色轉，與冷，次入肉桂枳殼末令勻，每服三錢，水一盞半，生薑三片，煎一中盞，去滓，稍熱服，如冷氣奔衝，心腹疼痛，加茴香，及瘧瘴瘧痢，膈胸小腹氣痛，即入煨生薑三片，鹽少許，同煎，如傷寒發時，頭痛體疼，惡風發熱，項背強痛，入蔥白三寸，豉七粒，同煎，若但覺惡寒，或身不甚熱，肢體拘急，或手足厥冷，即入炒麥黃七粒，鹽少許同煎，如寒熱不調，欬嗽喘滿，入葱煎，婦人產後，入醋一合同煎，並不拘時候。

【升麻葛根湯】治大人小兒時氣瘟疫，頭痛發熱，肢體煩疼，及斑疹已發及未發疑貳之間，並宜服之。

升麻　葛根　白芍藥　甘草炙各一十兩，

右爲麤末，每服三錢，水一盞半，煎取一中盞，去滓，稍熱服，不拘時候，日二三服，以病勢清涼爲度，小兒量歲數加減與服。

【葛根解肌湯】治傷寒瘟病，時行寒疫，頭痛項強，發熱惡寒，肢體拘急，骨節煩疼，腰脊強痛，胸膈煩悶。

葛根四兩，　麻黃去根節三兩，　黃芩
甘草炙各二兩，　肉桂去粗皮一兩，

右爲麤末，每服三錢，水一盞半，薑三片，棗一枚，煎至八分，去滓，稍熱服，不拘時候，取汗出爲度。

【金沸草散】治風化痰，除頭目昏痛，頸項強急，往來寒熱，肢體煩疼，胷膈滿悶，痰涎不利，欬嗽喘滿，涕唾稠粘，及治時行寒疫，壯熱惡風。

荆芥穗四兩，　前胡去蘆，　麻黃去根節，　旋覆花各三兩，
甘草剉炒，　半夏湯洗七次，薑汁浸，　赤芍藥各一兩，

右爲麤末，每服三錢，水一盞半，生薑三片，棗一枚，同煎八分，去滓，溫服，不拘時候，有寒邪，則汗出，如

蠱毒則解利。

【大柴胡湯】治傷寒十餘日，邪氣結在裏，寒熱往來，大便秘澀，腹滿脹痛，譫語，心中痞硬，飲食不下，或不大便五六日，繞臍刺痛，時發煩躁，及汗後如瘧，日晚發熱，兼臍脈實，脈有力者，可服之。

柴胡去蘆，半斤。　黃芩　赤芍藥各三兩。　大黃二兩。
半夏湯洗七次，切作片子，焙乾，二兩半。　枳實去瓤，麩炒，半兩。

右爲粗末，入半夏令勻，每服三錢，水一盞半，生薑五片，棗一枚，煎至一中盞，去滓溫服，食後臨臥，此藥治傷寒內熱裏實，若身體疼痛是表證未解，不可服之。

【朮附湯】治風濕相搏，身體煩疼，不能轉側，不嗜不渴，大便堅硬，小便自利，及風虛頭目眩，重甚者，不知食味。

白朮四兩。　附子炮，去皮臍，細切，一兩半。　甘草剉炒，二兩。

右爲麤末，入附子令勻，每服三錢，水一盞半，生薑五片，棗一枚，同煎一盞，去滓溫服，食前。○此藥腰肌緩中，助陽氣，止自汗。

【防己黃耆湯】治風濕相搏，客在皮膚，一身盡重，四肢少力，關節煩疼，時自汗出，濕涉惡風，不欲去衣，及治風水客搏，腰腳浮腫，上輕下重，不能屈伸。

防己四兩。　黃耆五兩。　甘草炙，二兩。　白朮三兩。

右爲粗末，每服三錢，水一盞半，生薑三片，棗一枚，煎至一盞，頭面一遍，稍熱服，不拘時候，蓋覆溫臥，令微汗瘥，即安靜，不喘，不渴，脈候沈微者，宜服之。又治暴中風冷，久積痰水，心腹冷痛，霍亂轉筋，一切虛寒，並皆治之。

乾薑爲粗末，一兩。　附子生去皮臍，細切，一枚。

右合勻，每服三錢，水一盞半，煎至一盞，去滓溫服，食前。

【竹葉石膏湯】治傷寒時氣，表裏俱虛，遍身發熱，心悸煩悶，或得汗已解，內無津液，虛羸少氣，胷中煩滿，氣逆欲吐，及諸虛煩熱，與傷寒相似，但不惡寒，身不疼，頭不痛，脈不緊數，即不可汗下，宜服此藥。

石膏一斤。　半夏湯洗七次，二兩半。　甘草炙，二兩。　人參去蘆，二兩。
麥門冬去心，五兩半。

右爲粗末，入半夏令勻，每服三錢，水二盞，入青竹葉生薑各五六片，煎至一盞半，去滓，入糯米百餘粒，再煎，米熟去米，溫服，不拘時。

【五苓散】治傷寒溫熱病，表裏未解，頭痛發熱，口燥咽乾，煩渴飲水，或水入即吐，或小便不利，及汗出表解，煩渴不止，又治霍亂吐利，躁渴引飲。

澤瀉二十五兩。　猪苓去皮。　赤茯苓去皮。　白朮去蘆，各十五兩。

肉桂去粗皮，十兩。

右爲細末，每服二錢，熱湯調下，不拘時，服訖多飲熱湯，有汗出即愈。○又治瘧熱在裏，身發黃疸，腹脹面頰黑，湯下，食前服，痼病發渴，及中暑引飲，亦可用水調服，小兒加白水少許，如發虛熱，加綠黃皆人參末少許。

【四逆湯】治傷寒自利，不渴，嘔噦不止，或吐利俱發，小便或澀或利，或汗出過多，脈微欲絕，煩躁，手足逆冷，及一切虛寒厥冷，並宜服之。凡傷寒有此證候，皆由陽氣虛，裏有寒，雖更煩頭痛體疼，發熱惡寒，四肢拘急，表證悉具者，未可攻表，先宜服此藥，助陽救裏。

甘草炙，二兩。　乾薑一兩半。　附子生去皮臍，半兩。

右以甘草乾薑爲粗末，入附子令勻，每服三錢，水一盞半，煎至一中盞，去滓，溫服，不拘時候，服滓暑氣，分水穀。

【大順散】治冒暑伏熱，引飲過多，脾胃受濕，水穀不分，淸濁相干，陰陽氣逆，霍亂嘔吐，臟腑不調。

甘草三十斤，剉寸長。　乾薑　杏仁去皮尖。　肉桂去粗皮，各四斤。

右先將甘草用白砂炒，及八分黃熟，次入乾薑同炒，令薑裂，次入杏仁又同炒，候杏仁不作聲爲度，用御篩淨後，入桂一處擣羅爲散，每服二錢，水一中盞，煎七分，去滓，溫服，如煩躁，井花水調下，不拘時，沸湯點亦得。

【白虎湯】治傷寒，大汗出後，表證已解，心胷大煩，渴欲飲水，及吐或下後，七八日邪毒不解，熱結在裏，表裏俱熱，時時惡風，大渴舌上乾躁而煩，欲飲水數升者，宜服之。又治夏月中暑毒，汗出惡寒，身熱而渴。

石膏二十五斤，洗研。　知母一百五十兩。　甘草炙，七十五兩。

右爲細末，每服三錢，水一盞半，入粳米三十餘粒，煎至一盞，去滓，溫服，小兒盡力與之，或加人參少許，同煎亦得，食後服，此藥立夏後立秋前可服，春月及立秋後，并亡血虛家，並不可服。

【香薷圓】治大人小兒傷暑伏熱，躁渴昏悶，頭目昏眩，胷膈煩滿，嘔噦惡心，口苦舌乾，肢體困倦，不思飲食，或發霍亂吐利，轉筋，並宜服之。

乾木瓜　紫蘇去粗梗。　香薷去土，各一兩。　白茯神去木。
藿香葉去土。　檀香剉。　甘草剉炙。　丁香各半兩。

右爲細末，煉蜜和勻，每一兩作三十圓，每服一圓至二圓，糯米溫湯下，或新汲水化下，小兒半圓，不拘時。

【香薷散】治脾胃冷熱不調，飲食不節，或食腥膩生冷過度，或起居不節，或露臥濕地，或當風取涼，而風冷之氣鬱於三焦傳於脾胃，脾胃得冷不能消化水穀，致令真邪相干，腸胃虛弱，飲食變亂於腸胃之間，便致吐利，心腹疼痛霍亂氣逆，有心痛而先吐者，有腹痛而先利者，有吐利俱發者，有發熱頭痛體疼，而復吐利虛煩者，或但吐利，心腹刺痛者，或轉筋拘急疼痛，或但嘔而無物出，或四肢逆冷而脈欲絕，或煩

悶昏塞而欲死者此藥悉能主之。

香薷去土一斤　白扁豆　厚朴去粗皮薑汁炙令黃各半斤

右爲粗末每服三錢水一盞酒一分同煎七分去滓水中沈冷連爽二服立效不拘時。○【治人畜方】不用白扁豆加黃連四兩剉生薑汁同研炒黃色名（黃連香薷散）。

【枇杷葉散】治冒暑伏熱引飲過多脾胃傷冷飲食不化胷膈痞悶嘔噦惡心頭目昏眩口乾煩渴肢體困倦全不思食或陰陽不和致成霍亂吐利轉筋煩躁引飲。

麥門冬湯洗去心　白茅根　木瓜　甘草炙各一兩

枇杷葉去毛淨炙　陳橘皮去白　丁香各半兩　香茹三分

厚朴去粗皮薑汁炙四兩

右爲細末每服二錢水一盞生薑二片煎七分去滓溫服溫水調亦得如煩躁用新汲水調下不拘時小兒三歲已下可服半錢更量大小加減

紹興續添方

【借伽應夢人參散】治傷寒體熱頭痛風痰嗽咯血等疾。

人參　白芷　乾薑　桔梗

青皮去瓤　白朮各等分

右爲細末每服二錢水一盞薑二片棗二箇煎七分通口服如傷寒入淡薑同煎熱漱神效不拘時候。

【香蘇散】治四時瘟疫傷寒。

陳皮二兩　香附子炒去毛　紫蘇葉各四兩　甘草一兩炙

右爲粗末每服三錢水一盞煎七分去滓熱服不拘時日三服若作細末只服二錢入鹽點服。○昔有白鑿老人授此與一富人家其家合藥當大疫城中病者皆愈其後疫鬼問富人富人具實告鬼曰此老教三人矣稽顙而退。

【加減三五七散】治證并方見諸風類。

【大已寒圓】治傷寒積冷臟腑虛弱心腹疼痛脇肋脹滿泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化陽氣暴衰陰氣獨勝手足厥冷傷寒陰盛神昏脈短四肢怠惰並宜服之。

高良薑　乾薑炮各六斤　肉桂去粗皮　蓽撥各四斤

右爲末水黃麵糊圓梧桐子大每服二十圓米飲下食前。

【太陽丹】治頭疼傷寒感風氣積偏正夾腦一切頭痛每服一粒薄荷茶嚥下風痰盛咽膈不利亦宜服之。

川烏大者炮去皮脐　川芎　白芷　甘草炙各一斤

石膏二斤別研細　腦子二兩

右爲細末蜜煉細糊爲圓每兩作一十八粒朱砂爲衣。

【和解散】治四時傷寒頭痛增寒壯熱煩躁自汗欬嗽吐利。

蒼朮去皮一斤　藁本　陳皮去白各四兩　桔梗

厚朴去皮薑汁炙

右爲麤末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚煎七分不拘時熱服。

【正氣散】治傷寒陰證惡寒正氣逐冷胷膈痞塞脇肋膨脹心下堅痞吐痢嘔逆酸水欬逆急惰嗜臥不思飲食。

白朮　陳皮　藿香去根各一兩　甘草炙七錢

半夏　厚朴同半夏各三兩爲末生薑四兩研細同爲餅子煨炒

右爲細末每服二錢生薑三片棗一枚水一盞煎七分食前稍熱服又治久患瘴疾腹痛心痛日進三服若服煎氣宽中呼除瘴癘。

【十華散】治丈夫五勞七傷渾身疼痛四肢拘急腰膝無力脾元氣虛不思飲食霍亂吐瀉四肢冷麻蒙解二毒傷寒瘧腳氣流注腫痛行步不得及虛勞等疾並治之。

五加皮　陳皮去白　乾薑炮　甘草炙各十六兩

大川烏三兩　附子六兩炮　桔梗炒　肉桂去粗皮

綿黃耆去蘆炒　蒼朮去皮　羌活各八兩八錢

右爲細末每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎六分不拘時熱嚼酒調服亦得。

【到散】治男子婦人五勞七傷風冷冒寒氣弱體虛多倦少力常服壯筋骨肢體輕健進食。

天仙藤　荊芥穗　前胡生薑製炒　乾葛

青葛子炒　桑白皮炒　麻黃去根節　桔梗

香附子炒　陳橘皮　柴胡　蒼朮炒各十斤

川芎炒　茴香炒　秦艽　半夏爲粗末薑汁製

白芷炒　黃耆　藁本　川芎各二斤半

厚朴去皮薑製　甘草炒　肉桂去粗皮各五斤

右爲麤末每服三大錢水一盞半入生薑烏梅棗兩至七分去滓溫服併兩滓作一服服。

【桂苓圓】大解暑毒。

肉桂去粗皮不見火　茯苓去皮各等分

右爲細末煉蜜爲圓每兩作八圓每服一圓用新汲水或熱水嚼下化下亦得。

【消暑圓】治傷暑發熱頭熱。

半夏曲五升炒乾　茯苓去皮　甘草生用各半斤

右爲細末，以生薑汁作糊爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，水下。○易簡方云：此藥合時，須用好醋煎黃半夏薑汁作糊，無見生水，臨忘修合，用之神效。中暑爲患，藥下即愈，傷暑發熱，頭疼，用之尤驗。夏月常服，止渴利便，雖多飲水，亦不爲患。蓋是暑熱，皆不及此。若冒飲停飲，宜用薑湯嚥下，入夏之後，不可闕此。

寶慶新增方

【辰砂五苓散】治傷寒表裏未解，頭痛發熱，心胷鬱悶，唇口乾焦，神思昏沉，狂言譫語，如見鬼神，及瘧瘧煩悶不省者。

木猪苓去黑皮　白朮洗，去蘆　澤瀉洗剉　赤茯苓去皮

辰砂研，各十二兩　肉桂去皮，八兩

右爲細末，每服二錢，沸湯點服，不拘時，如中暑發渴，小便赤澀，用新汲水調下，小兒五心煩熱，焦躁多哭，咬牙上搐，欲爲驚狀，每服半錢，溫熱水調下。

【消風百解散】治四時傷寒，頭疼項強，壯熱惡寒，身體煩疼，四肢倦怠，行步喘乏，及寒嗽咳嗽，鼻塞聲重，涕唾稠粘，痰涎壅盛，氣急滿悶，並宜服之。

荆芥　陳皮洗，去白　白芷　蒼朮

麻黃去節，各四兩　甘草炙，二兩

右爲末，每服二大錢，水一大盞，薑三片，烏梅一箇，煎七分，不拘時溫服，或用茶酒調下，仍欲發散風邪，入薄荷葱白三寸同煎。

【人參順氣散】治丈夫婦人風虛氣弱，榮衛不和，肢節疼痛，身體沉重，頭目旋暈，肩背拘急，手足冷麻，半身不遂，口眼喎斜，痰涎不利，言語蹇澀，或脾胃不和，心腹刺痛，胷膈痞滿，倦怠少力，霍亂轉筋，吐瀉不止，胎前產後，並宜服之。

川芎去蘆　白朮去蘆　麻黃去節　厚朴去粗皮，薑汁製

苦梗去蘆　陳皮去白　甘草炙　白芷各四兩

乾薑　人參各一兩　乾葛去粗皮，三兩半

右爲末，每服二錢，水一盞，薑三片，棗一枚，薄荷五葉，煎八分，不拘時，傷風感冷，頭疼體重，咳嗽鼻塞，加蔥白煎。

【保眞湯】治四時傷寒，不問陰陽二證，纏綿疾作，急服立效。

川芎　藁本去蘆，各四兩　甘草炙，二兩　苦朮剉，炒，十六兩

右㕮咀爲粗末，每服三錢，水一盞半，生薑三片，同煎七分，去滓，熱服，不拘時，神效不可具述。

【解暑三白散】治冒暑伏熱，引飲過多，陰陽氣逆，霍亂嘔吐，小便不利，臟腑不調，惡心頭暈，並皆治之。

白茯苓　白朮　澤瀉各等分

右㕮咀，每服半兩，薑，水一盞，薑五片，燈心十莖，煎八分，去滓，服，不拘時。

【縮脾飲】解伏熱，除煩渴，消暑毒，止吐利，霍亂之後，服熱藥太多致煩躁者，並宜服之。

白扁豆去皮　乾葛剉，各二兩　草果煨，去皮

縮砂仁　甘草炙，各四兩　烏梅肉

右㕮咀，每服四錢，水一大碗，煎八分，去滓，以水沈冷服，以解煩，或欲熱飲溫任意服，代熱水飲之極妙。

【柴胡升麻湯】治時行瘟疫，壯熱惡風，頭痛體疼，鼻塞咽乾，心胷煩滿，寒熱往來，痰盛咳嗽，涕唾稠粘。

桑白皮　黃芩去皮，各六兩半　升麻五兩　荆芥去梗，七兩半

赤芍藥　前胡去蘆　柴胡去蘆　石膏煅

乾葛各十兩

右㕮咀，每服三大錢，水一盞半，生薑三片，肢十條，同煎一盞，去滓，稍熱服，不拘時，小兒更量大小加減。

淳祐新添方

【人參養胃湯】治外感風寒，內傷生冷，增寒壯熱，頭目昏疼，肢體拘急，不問風寒二證，及內外之殊，均可治療。先用厚被蓋睡，逼進此藥，服以薄粥湯之類佐之，令四肢微汗濈濈然，俟汗乾，則徐徐去被，謹避外風，自然解散。若元有汗，亦須溫潤以和解之，或有餘熱，以參蘇飲款款調之，或倘頭疼，則濃煎生薑葱白湯下聖餅子三證既除，不必服藥，但節其飲食，適其寒溫，自然平治。大抵感冒，古人不敢輕發汗者，止由麻黃能開腠理，用或不能得宜，則導泄其氣，因而致虛，變生他證，此藥乃平和之劑，上能溫中解表，而已不致妄擾也，兼能辟山嵐瘴氣，四時瘟疫，常服尤佳。

厚朴去粗皮，薑汁製　蒼朮米泔浸一宿，炒　半夏洗七次，各一兩　藿香葉洗，去土

草蔻　茯苓去黑皮　人參去蘆，各半兩　甘草炙，二錢半

橘紅七錢半

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，薑七片，烏梅一箇，煎至七分，去滓，熱服，兼治飲食傷脾，發熱瘧瘧，或脾胃中脘虛寒，嘔逆惡心，皆可化之，或發寒熱寒疫及惡寒者，並加附子，名十味不換金散。

【參蘇飲】治感冒發熱，頭疼，或因痰，飲凝節，兼以爲熱，並宜服之。若因感冒發熱，亦如服養胃湯法，以表蓋臥，逼進數服，微汗即愈，尚有餘熱，更宜徐徐服之，自然平治。因痰飲發熱，但連日頻進此藥，以熱退爲期，不可預止，雖有前胡乾葛，但能解肌耳，既有枳殼橘紅，自能寬中快膈，不致傷脾，兼大治中脘痞滿，嘔逆惡心，開胃進食，無以踰此，毋以性涼爲疑，一切發熱，皆能取效，不必拘其所因也。小兒室女，亦宜服之。

陳皮去白　枳殼去穰麩炒　桔梗去蘆　甘草炙
木香各半兩　紫蘇用葉　半夏湯洗薑製　乾葛洗
前胡去苗　人參去蘆　茯苓去皮各三分

右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片棗一箇煎六分去滓微熱服不拘時易簡方不用木香只十味

【神朮散】治四時瘧疫頭痛項強發熱增寒身體疼痛及傷風鼻塞聲重咳嗽頭昏並治之

藁本去土　羌活去蘆　細辛去土葉　香白芷
川芎　甘草炙各一兩　蒼朮五兩

右爲細末每服三錢水一盞生薑三片棗白三寸煎七分溫服不拘時如兼傷風鼻塞只用葱茶調下

吳直閣增諸家名方

【對金飲子】治諸疾無不愈者常服固元陽益氣健脾進食和胃祛痰自然榮衛調暢寒暑不侵療四時傷寒極有效

陳皮去白炒黃半斤　蒼朮米泔浸去皮　厚朴去粗皮薑汁炙　甘草炙各二兩

右爲粗末每服三錢空心水一盞薑二片如茶法煎取八分滓再煎兩度盡服盡裹時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連鬚蔥白五莖豉三十粒同煎服數劑汗出得安如未得汗以稀粥投之厚蓋衣服取汗立愈五勞七傷脚手心熱煩躁不安肢節酸疼加柴胡去蘆同煎痰嗽發熱加薑製半夏煎本藏氣痛加藿香煎水氣脹滿加桑白皮煎婦人赤白帶下加黃耆煎酒傷加丁香食傷加萊菔子四時宣滯加肉豆蔻風疾加荊芥穗腿膝冷疼加牛膝溫身拘急及虛羸加地骨皮腿痛加菟絲子白痢加吳茱萸赤痢加黃連頭風加藁本霍亂轉筋加楠木皮已上助使止加一錢此藥不問老少胎前產後五勞七傷六極八邪耳鳴眼昏夢泄盜汗四肢沈重腿膝酸疼婦人宮藏久冷月水不調若能每日空心一服即出顏容豐肌體調三焦壯筋骨祛冷氣快心胸神效莫遇

【劫勞散】治五勞七傷四時傷寒山嵐瘴瘧時行疫癘心神煩悶口苦舌乾增寒壯熱頭疼鼻塞腰脚酸倦背脊強急渾身疼痛

當歸七兩三錢半　香附子砂去毛　蒼朮浸焙　甘草炙各三兩六錢
荊芥去梗　前胡各二兩七錢　肉桂去粗皮　橘紅各一兩三錢
川芎二兩二錢半　苦梗去蘆七兩二錢　天仙藤二兩半　地骨皮二錢半
麻黃去根節　白芷各四錢半　石膏九錢

右爲細末每服二錢水一盞烏梅半箇入薑同煎如要出汗加葱白並同煎連三服溫酒調熱鹽湯亦得

【人參輕骨散】解利四時傷寒頭痛壯熱項背拘急骨節煩疼增寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澀

嘔逆煩渴或傷風或寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫癘潮熱往來及療五勞七傷中脘氣滯心腹痞悶停痰嘔逆冷氣奔衝攻疰刺痛及婦人血氣撮痛經候不調

貝母去心　茯苓焙白者　半夏製各一兩　人參
白朮焙　白芷不見火　陳皮去白　赤芍藥
秦艽去蘆各二兩　桔梗去蘆　厚朴去皮薑製　甘草炙各四兩
麻黃去根節　柴胡去蘆各三兩　枳殼去穰炒二兩半　當歸去蘆焙
川芎　肉桂去皮　乾薑炮各一兩半　蒼朮六兩浸一宿

右爲末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分稍熱服身體倦怠加烏梅一箇咳嗽加棗二枚同煎不拘時

【葱白散】解四時傷寒頭痛壯熱筋背拘急骨節煩疼增寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澀嘔逆煩渴不思飲食又治傷風或寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫癘並皆治之

川芎　蒼朮米泔浸　白朮各二兩
甘草炙　石膏煅　乾葛各一兩　麻黃去根節三兩

右爲末每服二錢水一盞生薑三片蔥白二寸煎七分熱服不拘時如要出汗併煎三服被蓋出汗無度

【桂枝湯】治太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻乾乾嘔

甘草一兩　桂枝去皮　芍藥各三兩

右爲麤末每服二錢水一盞生薑三片棗三枚擘破同煎取七分去滓溫服不計時惟春初可行自春末及夏至以前可加黃芩半兩夏至後加知母半兩石膏二兩或升麻半兩若病人素虛寒者不用加減無汗休服

【黃龍圓】治丈夫婦人伏暑發熱作渴嘔吐惡心及年深著毒不瘥者

黃連去鬚三十二兩　好酒五升

右黃連以酒煮乾爲度研爲細末用麵水煮糊丸如梧桐子大每服三十圓熱水吞下又療傷酒過多成毒下血大便溏瀉用米飲吞下食前進一日兩服

【不換金正氣散】治四時傷寒瘴瘧時氣頭疼壯熱腰背拘急五勞七傷山嵐瘴氣寒熱往來五腑氣壅咳嗽痰涎行步喘乏或霍亂吐瀉臟腑虛寒下痢赤白並宜服之

厚朴去皮薑製　藿香去枝土　半夏製
蒼朮米泔浸　甘草炙各等分　陳皮去白

右爲細散每服三錢水一盞半生薑三片棗子二枚煎八分去滓食前稍熱服忌生冷油膩毒物若

四方人不伏水土，宜服之。常服能辟風氣，調和脾胃，美飲食。

【川芎茶調散】治丈夫婦人諸風上攻，頭目昏重，偏正頭疼，鼻塞聲重，傷風壯熱，肢體煩疼，肌肉瞤動，腦熱痰盛，婦人血風攻疰，太陽穴疼，但是感風氣，悉皆治之。

白芷　甘草炙　羌活各二兩　荊芥去梗
川芎各四兩　細辛去苗一兩　防風一兩半　薄荷葉不見火八兩

右為細末，每服二錢，食後茶清調下，常服清頭目。

【滲濕湯】治寒濕所傷，身重腰冷，如坐水中，小便或澀或出，大便溏泄，皆因坐臥濕處，或因雨露所侵，或因汗出衣衾冷濕，久久得之。腰下重疼，兩脚疼痛，腿膝或腫或不腫，小便利，反不渴，悉能主之。

苍朮　甘草炙
乾薑炮各二兩　橘紅
白朮各一兩　茯苓去皮
丁香各一分

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，薑一枚，棗三片，煎七分，食前溫服。

【冰黃散】治冒暑伏熱，頭目昏暈，嘔吐瀉痢，口乾煩渴，背寒面垢。

生地黃切碎，焙乾日乾　寒食麵各一斤　赤茯苓去皮　甘草生用各四兩

右為細末，每服二錢，新汲水或冷熟水調下，不拘時候。

續添諸局經驗秘方

【神仙百解散】一名神仙救傷，每四季加減百解散，治傷寒，遍身疼痛，百節拘急，頭目昏痛，肢體勞倦，壯熱增寒，神志不爽，感冒瘟疫，瘴氣，常服辟瘟疫，治勞倦。

山茵蔯　柴胡去蘆　前胡生薑汁製炒　升麻
白芍藥　防風去苗　蒼朮米泔浸剉炒　白朮
蓯香葉　藁本去苗　半夏薑汁製　羌活
獨活　人參去蘆　甘草炙　乾葛各一兩

立春已後不加減，立夏已後一料加。

赤茯苓　當歸各半兩　柴胡一分
立秋已後減柴胡一分，不用當歸茯苓只如。

麻黃去節半兩　肉桂去粗皮　乾薑炮各一分

立冬已後並無加減，一方無當歸，有黃芩，去薑半兩。

右為細末，每服三錢，水一盞半，薑三片，棗二枚，煎一盞，熱服，不計時，併進二服，如要表散，加蔥白三寸，淡豉三十粒同煎，服下以衣被蓋覆，汗出而愈。

【八解散】治四時傷寒，頭痛壯熱，感風多汗，及療勞傷過度，骨節酸疼，飲食無味，四肢疼倦，行步喘乏，面色萎黃，怠惰少力，咳嗽寒熱，羸弱自汗，胷膈不快，嘔逆惡心。

人參去蘆　陳皮去白　半夏湯洗七次
藁香去土　白朮　茯苓各一兩　甘草炙
厚朴二兩薑汁製

右為細末，每服二錢，水一盞，生薑三片，棗一枚，薄白三寸，同煎七分，溫服，不拘時。

【白朮散】治傷寒氣脈不和，增寒壯熱，鼻塞腦悶，涕唾稠粘，痰嗽壅滯，或冒涉風濕，增寒發熱，骨節疼痛，或中暑嘔吐眩暈，及大病後將理失宜，食復勞復，病證如初，又治五勞七傷，氣虛頭眩，精神恍惚，睡臥不寧，肢體倦怠，潮熱盜汗，脾胃虛損，面色萎黃，飲食不美，口吐酸水，臟腑滑泄，腹內虛鳴，反胃吐逆，心腹絞痛，久瘧久痢，及腦氣咽塞，上氣喘促，坐臥不安，或飲食所傷，胷膈痞悶，腹脇膨脹，婦人胎前產後，血氣不和，霍亂吐瀉，氣厥不省人事，常服辟四時不正之氣，及山嵐瘴疫，神效不可具述。

白朮四兩　乾薑炮二兩　山藥　桔梗
陳皮去白　茯苓去皮　甘草　白芷
青皮去白　香附子各三兩

右為末，每服二錢，水一盞，薑三片，棗一枚，木瓜乾一片，蔥白三寸，煎七分，食前服，若吐瀉，入白檀香嚼，入藿香白皮杏仁煎，傷寒勞復，入薄荷，腦氣，入木通三寸，麝香少許，中暑嘔逆，入香薷，產前產後血氣不和，入荊芥，霍亂，入藿香煎，氣厥，入薑湯調下。

【三拗湯】治感冒風邪，鼻塞聲重，語音不出，或傷風傷冷，頭痛目眩，四肢拘倦，欬嗽多痰，胷滿氣短。

麻黃不去節　杏仁不去皮尖　甘草生用各等分

右為粗末，每服五錢，水一盞半，薑五片同煎，至一盞，去滓，通口服，以衣被蓋覆睡，取微汗為度。

【荊芥散】治傷寒頭疼，鼻塞流涕，聲重咽乾，胸膈滿悶，頭痛如破者。

天南星　草烏頭　荊芥穗各半兩　石膏一兩

右為細末，每服三錢，陳茶末一錢，生薑自然汁半盞，薄荷二葉，水二盞，同煎八分，通口服。

【來蘇散】解利四時瘟疫傷寒，身體壯熱，頭痛增寒，項背拘急，渾身疼痛，煩渴悶亂，大小便澀，嗜臥少力，不思飲食，及諸氣疾，五勞七傷，山嵐瘴瘧，寒熱往來，並皆治之。

荊芥穗　肉桂不見火　桔梗　防風
五加皮各一兩　柴胡去蘆　甘草　乾薑各二兩
陳橘皮　麻黃去節各一兩半　芍藥半兩　黃耆一分，蜜浸炙

右為粗末，每服二錢，水一盞，薑三片，同煎八分，然取，不拘時，溫服，和順三焦，辟瘴氣，進飲食。

【十神湯】治時令不正，瘟疫妄行，此藥不問陰陽兩感，或風寒濕痹，皆可服之。

陳橘皮去白　麻黃去根節　甘草炙
香附子去毛　紫蘇去粗梗　川芎
赤芍藥各四兩　乾葛十四兩　白芷　升麻

右爲細末，每服三大錢，水一盞半，生薑五片，煎七分，去滓，熱服，不拘時，如發熱頭痛，加連鬚蔥白三莖，如中滿氣實，加枳殼數片，同煎，雖產婦嬰兒老人皆可服，如傷寒不分表裏，以此導引經絡，不致變証，功效非淺。

【藿香正氣散】治傷寒頭疼，增寒壯熱，上吐痰嗽，五勞七傷，八般風痰，五般膈氣，心腹冷痛，反胃嘔惡，氣瀉霍亂，臟腑虛鳴，山嵐瘴癘，遍身虛腫，婦人產前產後，血氣刺痛，小兒疳傷，並皆治之。

大腹皮　茯苓去皮　白芷　紫蘇各一兩，
陳橘皮　苦梗　厚朴去粗皮，薑汁製，
半夏麯　甘草炙各二兩，　藿香去土，三兩，

右爲細末，每服二錢，水一盞，薑三片，棗一枚，煎七分，熱服，如要出汗，衣被蓋，再服併服。

【香蘇湯】宣中和氣，調榮衛，治飲食不節，飢飽失時，或冷物過多，或硬物難駐，或食畢便睡，或驚疑悲怒，或勞役動氣，便欲飲食，致令脾胃不和，三脘痞滯，內感風冷，外受寒邪，增寒壯熱，遍體疼痛，胸膈滿悶，霍亂嘔吐，脾疼酗胃，中酒不醒，四時傷寒頭痛，併進三服，得汗即愈，常服，益脾胃，散宿痰，停飲，能進食，辟風寒、暑濕、霧露之氣。

香薷去土，二兩，　甘草炙，半兩　白扁豆炒　厚朴去皮，薑製，
茯神各一兩，

右爲末，每服二錢，沸湯入鹽點服，不拘時候。

【水浸丹】治伏暑傷冷，冷熱不調，霍亂吐利，口乾煩渴。

巴豆大，二十五箇，去皮殼，研細，取霜油如粉，　黃丹炒，研細過，取一兩一分，

右同研勻，用黃蠟溶作汁，別爲圓，如梧桐子大，每服五圓，以水浸少頃，別以新汲水吞下，不拘時候。

增廣太平惠民和劑局方卷三

一切氣　附脾胃　積聚

【蘇合香圓】療傳屍骨蒸，殭殮肺痿，疰忤鬼氣卒心痛，霍亂吐利，時氣鬼魅，瘴瘧，赤白痢利，瘀血月閉，痃癖丁腫，慈癩鬼忤中人，小兒吐乳，大人狐狸等疾。

蘇合香油入安息香內，熏陸香別研，　龍腦研，各一兩，　青木香
白朮　白檀香　丁香　朱砂研，水飛，
沉香　香附子炒，去毛，　烏犀鎊屑，　蓽撥
安息香別爲末，用無灰酒一升熬膏，　麝香研，　訶黎勒煨取皮，各二兩，

右爲細末，入研藥勻，用安息香膏，并煉白蜜和劑，每服旋圓梧桐子大，早朝取井花水，溫冷任意化服四圓，老人小兒服一圓，溫酒化服，亦得，並空心服，用蠟紙裹一圓，如彈子大，綿絹裹盛，當心帶之，一切邪神不敢近，去龍腦，名麝香蘇合香圓，治一切冷氣，胷膈噎塞，腹中虛鳴，宿飲不消，餘證並同。

【安息香圓】治一切氣冷，心腹疼痛，胷膈噎塞，脇肋膨脹，心下堅痞，腹中空鳴，噦逆惡心，噫氣不酸，胃中冷逆，嘔吐不止，宿飲不消，胷膈刺痛，時吐清水，不思飲食，並皆治之。

安息香酒半盞，化去砂石，入煉蜜中，　舶上茴香微炒，　蓽澄茄

蓬莪茂　荊三稜　硇砂用好酒半盞，化去石入鍋中，
槟榔炮，　香附子去毛，　芍藥各半兩，　白茯苓
肉豆蔻　縮砂仁　益智子去皮，　五味子微炒，
白豆蔻去皮，　川芎　乾薑炮，去皮，　舶上丁香皮
巴戟去心，麩炒，　川當歸湯洗切片焙乾，各一兩半，　高良薑
丁香　沉香　乳香別研，
胡椒各一兩，　肉桂去粗皮，二兩半，　木香
訶子四兩，炮，取皮二兩，　阿魏一分，細研，白麵少許
溲和作餅子，炙令香熟，

右除安息香硇砂外，並一處杵羅為細末，用蜜三十兩，入安息香硇砂於蜜中，煉熟，剛上件藥，杵一二千下為圓，如鷄頭肉大，每服一圓，細嚼，溫酒下，濃煎生薑湯下亦得，食前服。

【丁沉圓】治一切冷氣攻心腹，脇肋脹滿刺痛，胸膈噎塞，痰逆惡心，噫氣吞酸，不思飲食，胃中冷逆，嘔吐不止，及翻胃腸氣，宿食留飲，心痛霍亂，婦人血氣心腹痛，並皆治之。

肉荳蔻仁　丁香　木香　白荳蔻仁
沉香　甘草　青橘皮剉，微炒，　槟榔五兩，
白朮剉，微炒，四十兩，　訶黎勒煨，取皮，　人參去蘆，　茯苓去皮，各十兩，
肉桂去粗皮，　乾薑炮，各二兩半，　麝香一兩，別研，

右為細末，入麝香令勻，煉蜜和圓，如酸棗大，每服一圓，細嚼炒生薑鹽湯下，溫酒亦得，空心食前服。

【大沉香圓】治一切冷氣攻心腹刺痛，胸膈噎塞，嘔吐痰水，噫氣吞酸，口苦舌澀，不思飲食，及膀胱腎間冷氣攻衝，腰背拘急，臍腹絞痛，手足逆冷，小便澁數，又治卒暴心痛，霍亂吐利，痛脹氣痛，婦人血氣刺痛，並宜服之。

沉香　檀香　肉桂去粗皮，　豆蔻去皮，
乾薑炮，各二十兩，　甘草炙，　天台烏藥　甘松洗，曝，乾稱，
白芷各二斤半，　白荳蔻仁十兩　香附子炮，五斤

右為末，煉蜜溲和，每一兩作二十圓，每服一圓，嚼破炒生薑鹽湯下，元氣贏劣，炒茴香熱酒下，空心服。

【理中圓】理中焦不和，脾胃宿冷，心下虛痞，腹中疼痛，胸脇逆滿，噎塞不通，嘔吐冷痰，飲食不下，噫氣吞酸，口苦失味，怠惰嗜臥，全不思食，又治傷寒時氣，裏寒外熱，霍亂吐利，心腹絞痛，手足不安，身熱不渴，及腸鳴自利，米穀不化。

白朮　人參洗去蘆，　乾薑　甘草炙各二十兩，

右為末，煉蜜為圓，每一兩作一十圓，每服一圓，食前沸湯化下，嚼服亦得，或圓如梧桐子大服並得。

大病新愈，多嗜不止，及新產內虛，皆可服之，若服溫脾暖胃，消穀進飲，順三焦，進飲食，辟風寒暑冷邪氣。

【和胃圓】治脾胃不和，中脘氣痞，心腹脹悶，不思飲食，嘔吐痰逆，噫氣吞酸，面色萎黃，肌肉消瘦，腹脇刺痛，便利不調，少力嗜臥，體重節痛，又治虛勞，脾胃虛弱，飲食不化，心腹痞滿，並宜服之。

陳橘皮去白，　訶子炮，去核，各四兩，　人參去蘆，　枳殼去穰，麩炒，
青橘皮去白，炒，　京三稜炮，各三兩，　槟榔一兩半，　當歸去蘆，一兩半，
甘草炙，　芍藥各一兩，　赤茯苓去皮，　乾薑炮，各三分，
肉桂去粗皮，　白朮剉，炒，　神麯碎，炒，　麥蘖炒，各二兩，
厚朴去粗皮，二兩，薑汁炙，　半夏二兩，半用湯洗，薑微炒，半用薑汁製作餅，炙黃，

繁甲丸　助大者一枚，黃泥外固，以米醋二碗，化硇砂一兩，放繁甲內，慢火熬乾，取二兩研，

右為細末，蜜圓如小豆大，每服二十圓至三十圓，嚼破溫水吞下，不計時候，此藥老幼氣弱，皆可常服，能溫和脾胃，進飲食。

【紫蘇子圓】治一切氣逆，胷膈噎悶，心腹刺痛，脇肋脹滿，飲食不消，嘔逆欲吐，及治肺胃傷冷，痰嗽痞滿，或上氣奔急，不得安臥。

紫蘇子淨，　陳皮去白，各二兩，　人參去蘆頭，
肉桂去粗皮，各一兩，　高良薑炒

右為細末，煉蜜圓如彈子大，每服一圓，細嚼溫酒下，米飲亦得，不拘時，或作小圓服亦得，若食瓜瓠生冷，覺有所傷，噫氣生熱，欲成霍亂者，含化一圓，細細嚥汁，服盡腦時立愈，常有此藥，永不患疾，神妙。

【養脾圓】治脾胃虛冷，心腹絞痛，胷膈滿悶，脇肋虛脹，嘔逆惡心，噫氣吞酸，泄瀉腸鳴，米穀不化，肢體倦怠，不思飲食。

白茯苓去皮，　人參去蘆頭，　大麥蘖炒，各一兩，
乾薑炮，各二兩，　白朮半兩，　甘草炙，一兩半，　縮砂仁去皮，

右為細末，煉蜜和圓，每兩分作八圓，每服一圓，細嚼生薑湯送下，食前服，此藥養胃進食，

【五膈圓】治因憂愁思慮，飲食不節，動氣傷神，致陰陽不和，脂膩生病，結於胸膈，遂成憂膈、氣膈、飲膈、勞膈、食膈之病，若食生冷，其病即發，心胷痞滿，氣不得通，疼痛如刺，及引背脊，食即不下，心下堅痞，痛即欲吐，得吐即已，甚者手足逆冷，上氣欬逆，喘息短氣。

麥門冬去心，焙，　甘草炙，各五兩，　遠志去心，焙，
蜀椒去目及閉口者，微炒出汗，　附子炮，去皮臍，一兩半，　肉桂去粗皮，各三兩，
人參去蘆頭，四兩，　細辛去苗土，
乾薑二兩，炮，

右爲細末，煉蜜和圓，如彈子大，每服一圓，含化嚥之，胸膈喉中當熱，藥力稍盡，更服一圓，日三服，夜二服，服藥七日即愈，或圓如梧桐子大，溫酒下亦得，食後服。

【薏米散】亦名穀神散，治中滿下虛，五噎五膈，脾胃不和，胸膈痞悶，脇肋脹滿，心腹刺痛，可進飲食，或多痰逆，口苦吞酸，胸滿短氣，肢體怠惰，面色痿黃，如中焦虛痞，不任攻擊，臟氣傷塞，不受峻補，或因病氣衰，食不復常，羸受怯弱，不能多食，尤宜服之，常服育神養氣，和補脾胃，進美飲食。

枇杷葉去毛，塗蘆汁炙令香熟　縮砂仁　人參去蘆頭，

茯苓去皮各一兩，　薏苡仁微炒一兩，　木香　沉香

隨風子如無，煉小子實者亦可，　杜仲去皮，用蘆汁與酒合和塗炙令香熟微焦，　霍香葉　石斛細剉，用酒拌和微炒，

大腹子微炒，　白豆蔻微炒去皮，　青橘皮去穰，　陳皮去白，

各三分，

桑白皮微炒，　丁香　五味子微炒，　穀蘖微炒，

半夏用湯洗七遍，生薑一分，切作片子，與半夏同搗爛，做餅子，炙黃用，　檳榔炒各半兩，　神麯各一分，微炒，

白朮炒二兩，　甘草微炙黃一兩半，

右爲細末，每服二錢，水一盞，入生薑二片，肥棗三枚，同煎七分，溫服，不計時，及煎四時傷寒，能調治陰陽，使無變動，翹日得安，如療五噎，入乾柿一枚煎服，如療膈氣吐逆痛困，入蘆白三寸，棗五枚同煎，婦人亦可服。

【理中湯】治脾胃不和，中寒上衝，胸脇逆滿，心痛痞痛，痰逆惡心，或時嘔吐，心下虛痞，膈塞不通，飲食減少，短氣羸困，溫中逐水，止汗去濕，泄瀉注下，水穀不分，腹中雷鳴，傷寒時氣，裏寒外熱，霍亂吐利，手足厥冷，胸膈心痛，逆氣結氣。

人參去蘆，　白朮　乾薑炮，　甘草炙各等分，

右爲粗末，每服三錢，水一盞半，煎取一中盞，去滓，稍熱服，空心食前。

【調中沉香湯】調中順氣，除邪發正，治心腹暴痛，胸膈痞滿，短氣煩悶，痰逆惡心，飲食少味，肢體多倦，常服進飲食，和臟腑，悅肌膚，調顏色。

白豆蔻仁　木香各一兩，　沉香二兩，　麝香半錢，

生龍腦一錢，　甘草炙黃一分，

右爲細末，入研藥勻，每服半錢，用沸湯點服，或入生薑一片，鹽少許，亦得，酒食後服之大妙。

【勻氣散】治氣滯不勻，胸膈虛痞，宿冷不消，心腹刺痛，除脹滿噎塞，止嘔吐惡心，此藥常服調順脾胃，進美飲食。

白豆蔻用仁，　丁香　檀香　木香各二十兩，

藿香葉　甘草炙各五斤，　縮砂仁二斤半，

右爲細末，每服一錢，入鹽一字，沸湯點服，不計時候。

【烏沉湯】治一切氣，除一切冷，調中補五臟，益精壯陽，暖腰膝，去邪氣，治吐瀉轉筋，撮痧痧痛，風水毒腫，冷風麻痹，及主中惡心腹痛，蠱毒疰忤鬼氣，宿食不消，天行瘧疾，脇脹腎間冷氣攻衝，背膂俛仰不利，及婦人血氣攻擊，心腹刺痛，並宜服之。

天台烏一百兩，　人參去蘆頭，三兩，　沉香五十兩，

甘草炙四兩半，

右爲末，每服半錢，生薑三片，鹽少許，沸湯點，空心服。

【五膈寬中散】治因憂悲寒熱，動氣傷神，致陰陽不和，腑臟生病，結於胸膈之間，遂成五膈之病，一曰憂膈，胸中氣結，津液不通，飲食不下，羸瘦短氣，二曰悲膈，心下實滿，噎塞不通，噫聞食臭，四曰寒膈，心腹脹滿，欬嗽氣逆，腹上苦冷，雷鳴，繞臍痛，不能食肥，五曰熱膈，五心中熱，口中爛生瘡，四肢煩重，唇口乾燥，身體或熱，腰背疼痛，胸膈引背，不能多食，及一切氣疾，並皆治之。

白豆蔻去皮二兩，　青皮湯浸去白，　陳皮湯浸去白，　縮砂仁

丁香各四兩，　香附子去毛，一斤，　木香三兩，　甘草炙五兩，

厚朴去粗皮，生薑汁炙令熱，焙乾，稱一斤，

右爲末，每服二錢，並二片，鹽少許，沸湯點服，不計時。

【膈氣散】治五種膈氣，三焦痞塞，胸膈滿悶，背膂引痛，心腹膨脹，脇肋刺痛，食飲不下，噎塞不通，嘔吐痰逆，口苦吞酸，羸瘦少力，短氣煩悶，常服順氣寬中，消痰癖積聚，散憂悲氣。

京三稜炮，　蓬莪蓯炮，　檀槐　陳皮去白，

益智仁　枳殼去穰，麩炒，　肉桂去粗皮各十兩，　乾薑炮，

厚朴生薑製炒，　木香　甘草炙，　青橘皮去穰，

肉豆蔻各五兩，

右爲細末，每服二錢，水一盞，薑二片，棗半箇，煎七分，熱服，如不及煎，入鹽少許，沸湯點服亦得，不拘時。

【建中散】治脾胃不和，中脘氣滯，宿寒留飲，停積不消，心腹刺痛，脇肋膨脹，嘔吐痰逆，噫氣吞酸，腸鳴泄利，水穀不化，肢體倦怠，不思飲食。

陳皮去白，半斤，　厚朴去粗皮，薑汁製，　青州棗各一斤，　半夏湯洗去骨，

乾薑炮，　甘草各五兩，

已上六味，用水三斗，炙令水盡，焙乾，

白茯苓去皮，　人參去蘆頭，　白朮　訶子去核，

草豆蔻去皮，　藿香葉各一兩，

右為末，每服二錢，水一盞，生薑三片，煎至六分，去滓，空心溫服，妙。

【平胃散】治脾胃不和，可思飲食，心腹脇肋、脹滿刺痛，口苦無味，胸滿短氣，嘔噦惡心，噫氣吞酸，面色萎黃，肌體羸弱，怠惰嗜臥，體重節痛，常多自利，或發霍亂及五噎八痞，膈氣霧胃，並宜服之。

厚朴去粗皮，水浸一宿，剉，生薑汁製炒，五十兩　甘草剉炒，十兩　陳皮去白，五十兩

蒼朮去粗皮，米泔浸二日，焙乾，五斤炒

右為細末，每服二錢，水一盞，生薑二片，乾棗兩枚，同煎七分，去渣，溫服，食前入鹽一撮，沸湯點服亦得。常服調氣發胃，化宿食，消痰飲，辟風寒冷濕四時非節之氣。

【三和散】治五臟不調，三焦不和，心腹痞悶，脇肋脹脹，風氣壅滯，肢節煩疼，并治頭面虛浮，手足微腫，腸胃燥澀，大便祕難，雖年高氣弱，並可服之。又治背痛，脇痛，有妨飲食，及脚氣上攻，胸腹滿悶，大便不通。

槟榔麩煨，熟，去麩　甘草炙　木香　陳皮去白　芫荽去莖頭

芎藭　白朮各三兩　大腹皮炙焦黃

紫蘇葉去粗梗　宣州木瓜薄切，焙乾　沉香各一兩

右為粗末，每服二大錢，水一盞，煎至六分，去滓，溫服，不計時候。

【七氣湯】治虛冷上氣，及寒氣、熱氣、怒氣、恚氣、喜氣、憂氣、愁氣，內結積聚，堅牢如杯，心腹絞痛，不能飲食，時發時止，發即欲死，此藥主之。

半夏湯洗七次，切作片子，焙乾，五兩　人參去蘆頭　肉桂去粗皮

甘草炙，各一兩

右為粗末，入半夏合勻，每服三錢，水一大盞，生薑三片，煎至七分，去滓，稍熱服，食前。

【益智散】治傷寒陰盛，心腹痞滿，嘔吐泄利，手足厥冷，及一切冷氣弊衝，心脇臍腹脹滿絞痛。

益智去皮，二兩　乾薑炮，半兩　青皮去白，一兩　烏頭炮，去皮臍，四兩

右件為散，每服三錢，水二盞，入鹽一撮，生薑五片，棗二箇，擘破，同煎八分，去滓，溫服，食前。

【藿香半夏散】治胃虛中寒，停痰留飲，噦逆嘔吐，胸滿噎痞，短氣倦怠，不入飲食。

藿香葉一兩　丁香皮半兩　半夏湯洗七次，炒令微黃，二兩

右為散，每服二錢，水一盞，生薑七片，同煎至六分，去滓，食前溫服。

【草豆蔻散】治脾胃不調，胸膈滿悶，飲食不化，嘔逆惡心，或霍亂嘔吐，心腹刺痛，腹鳴泄利，水穀不分，夏月煎作熟水，常服調中止逆，除冷氣，消飲食。

草豆蔻去皮一斤　生薑切作片，二斤　甘草八兩

右件拌勻，入於銀器內，用水過三指許，以慢火熬令水盡，焙乾，杵為細末，每服一錢，沸湯點服，不計時候。

【積氣圓】治陰陽不和，臟腑虛弱，寒冷之氣，留滯於內，使氣積不散，胸脇支滿，食即氣噎，心腹膨脹，氣急

刺痛，宿食不化，心腹引痛，噎氣吞酸，停飲浸漬，惡心嘔逆，癖塊疼痛，臟腑不調，飲食不進，往來寒熱，漸攜羸瘦，以致著床面黃肌熱，精神困頓。

硃砂研飛，二錢半　肉桂去粗皮，二兩　巴豆一百箇，去皮心膜，出油，取霜三錢

桃仁去皮尖，麸炒，一兩半，別研　乾漆炒令煙盡，二兩　木香

鱉甲去裙襴，醋浸炙　大黃麩裹，煨去麩，切焙，別為末，各一兩　附子炮，去皮臍，半兩

京三稜煨熟，搗碎　硇砂研，二兩　米醋五升，以硇砂大黃同用慢火熬成膏

麝香別研，二錢半

右為細末，入研藥勻，以醋膏為丸，如梧桐子大，每服二丸，炒生薑湯溫下，木香湯亦得，食後臨服時，更益虛實加減，忌生硬冷物。

【丁香圓】治積滯不消，心腹堅脹，痰逆嘔噦，噫氣吞酸，脇肋刺痛，胸膈痞悶，或霍亂，胃惡心，飲食不下，氣上衝胸，痞噎不通，及食瘧酒癖，血瘕氣塊，時發刺痛，全不思飲食，並皆治之，如常服，消飲食，行滯氣。

丁香　木香　猪牙皂角去皮，炙焦黑　肉桂去粗皮

乾薑炮　京墨燒醋淬，各一兩　青皮去白，三兩

京三稜炮，搗碎　蓬莪蓯溫紙裹，慢火煨，令紙乾，去紙，細碎用　附子炮去皮臍

川大黃末　乾漆碎炒，令烟盡，各為細末，已上各二兩　黑牽牛炒

巴豆霜一錢半，先用研膏

硇砂研飛，二兩

右為末，同醋膏和圓，如綠豆大，每服一丸，圓，茶酒任下，如要取化，瘕癖塊，生薑湯下七圓，並食後服。

【小丁香圓】消積滯，生冷，留飲宿食，止痰逆惡心，霍亂嘔吐，治心腹脹悶，脇肋刺痛，胸膈痞滿，噎塞不通，常服，順脾胃，進飲食。

肉豆蔻仁，三十箇　丁香三兩　木香一兩半　五靈脂十二兩

巴豆去皮，出油，二百一十箇

右為細末，入巴豆霜，麵三兩，沸，下大黃膏，硇砂研，二兩

硇炒令熱，下巴豆霜，麵三兩，沸，下大黃膏，硇砂別研，二兩

右為末，同醋膏和圓，如綠豆大，每服一丸，圓，茶酒任下，如要取化，瘕癖塊，生薑湯下七圓，並食後服，如霍亂吐逆，煎桃葉湯放冷下，小兒吐逆不定，三歲兒服三箇，五歲已下服四箇，用生薑桃葉湯下。

【三稜煎圓】順氣寬中，消積滯，化痰飲，治中脘氣痞，心腹堅脹，脇下緊硬，胸中痞塞，噎滿短氣，噫氣不通，嘔吐痰逆，飲食不下，大便不調，或泄或祕。

京三稜生，細剉，牛肋，搗羅為末，以好酒三升，石器內熬成膏　青橘皮去白

杏仁湯浸去皮尖，炒令黃　蘿蔔子微炒　乾漆炒，各二兩

神麯碎炒　麥蘖炒，各三兩　硇砂研飛，一兩

右爲末，以三棱煮浪和，圓如梧桐子大，每服十五圓至二十圓，溫米飲下，食後服。

【訶木香圓】寬中利膈，行滯氣，消飲食，治胸膈噎塞，腹脇脹痛，心下堅痞，腸中水聲，嘔噦痰逆，不思飲食。

黑牽牛二百四十兩，炒香爲末，取一百二十兩　木香二十兩　補骨脂炒香

右爲細末，煉蜜和圓，如梧桐子大，每服三十圓，生薑湯下，食後服，漸漸加至五圓七圓。

【生氣湯】治男子婦人一切冷氣攻心，腹脇肋脹滿刺痛，噫酸吞酸，痰逆嘔吐，胸膈痞悶，飲食不美，又治五膈五噎，一切氣疾，常服除邪冷，生胃氣。

丁香　檀香各一兩半　甘草炙剉二兩　胡椒二錢半　乾薑炮

右七分，同搗碎，用慢火煨，令香熟，乘熱入瓷器內密封，候冷，碾羅作細末，密盛貯，勿令泄氣味，每服半錢至一錢，沸湯點服，不拘時。

紹興續添方

【如聖餅子】治男子婦人氣厥，上盛下虛，痰飲風寒，伏留陽經，偏正頭疼，痛連腦顖，吐逆惡心，目眩耳聾。

川烏頭炮，去皮尖　天南星洗炮　乾薑各一兩　甘草炙

川芎各二兩　天麻　防風去蘆叉枝　半夏生用各半兩

右爲細末，湯浸蒸餅和圓，如鵝頭大，捻作餅子，曝乾，每服五餅，同荊芥三五穗細嚼，茶酒任下，熱水亦得，不拘時候服，清頭目，消風化痰除胃。

【四柱散】治丈夫元臟氣虛，眞陽耗散，兩耳常鳴，臍腹冷痛，頭旋目昏，四肢倦怠，小便滑數，泄瀉不止。

人參　附子炮去皮尖　木香濕紙裹煨　茯苓各一兩

右爲細末，每服二錢，水一大盞，生薑二片，棗子一箇，鹽小許，煎七分，空心食前服，凡臟氣虛弱者，宜服之。

【俞山人降氣湯】治虛陽上攻，氣不升降，上盛下虛，腦漏痰實，喘滿，胸乾不利，煩渴引飲，頭目昏眩，腰脚無力，四肢倦怠，欬嗽，兼治風濕脚氣。

紫蘇子微炒　前胡去蘆　厚朴去麄皮，薑汁浸一宿，炒香　五加皮薑汁塗炙

半夏麴炙　甘草炙　橘皮去白　人參去蘆

當歸洗去蘆　桂心不見火　黃耆去蘆各一兩　乾薑炮各半兩

附子炮去皮尖　桔梗　羌活

右爲麤末，每服三錢，水一盞半，薑棗三葉，生薑三片，棗子一枚，同煎七分，去滓，食後服。

【神保圓】治心膈痛、柿蒂燈心湯下；腹痛、柿蒂煨，蓽煎湯下；血痛、炒蓽醋湯下；肺氣滯者、白蔻蛤粉各三分，黃丹一分，同研爲散，煎桑根白皮糯米飲調下三錢；氣小喘止，用桑白皮糯米飲下；腎氣脇下痛、炒茴香酒下；大便不通、蜜湯調槐榔末一錢下；氣噎、木香湯下；宿食不消、茶酒調飲任下；諸氣、惟膀胱氣、脇下

附子炮去皮臍，三兩，巴豆去皮心膜，炒乾，研一兩後取霜　吳茱萸湯洗七次，炒各一兩　狼毒炙香

人參去蘆　乾薑炮

右爲細末，煉蜜和圓，如梧桐子大，每服空心溫酒下一圓，卒中惡心腹脹痛口不能言者，服二圓立愈。

【消食圓】治脾胃俱虛，不能消化水穀，胸膈痞悶，腹脇時脹，連年累月，食減嗜臥，口苦無味，虛羸少氣，又治胸中有寒，飲食不下，反胃翻心，霍亂嘔吐，及病後新虛，不勝穀氣，或因病氣衰，食不復常，並宜服之。

小麥蘖炒黃，三兩　神麯末炒，六兩　二錢　烏梅去核，焙，四兩　烏梅去核，焙，四兩　乾薑炮，四兩

右爲細末，煉蜜和圓，如梧桐子大，每服十五圓，加至二十圓，米飲下，日二服，不計時候。

【小獨聖圓】治脾胃不和，飲食多傷，心腹刺痛，嘔噦惡心，噎痞吞酸，乾噫食臭，腹脇脹悶，不思飲食，常服化滯氣，利胸膈，止逆消食。

京三稜煨，搗碎　營歸去蘆頭　乾薑炮　舶上丁香皮

半夏湯洗七次　烏梅去核各四兩　硇砂研飛，一兩　肉桂去粗皮，一兩

巴豆連皮霜半兩，去皮心膜，炒熱三錢，研出油

右爲細末，入巴豆油砂匀，以水黃糊和爲圓，如麻子大，每服三圓至五圓，用溫水下，食後服。

【溫白圓】治心腹積聚，久癥癖塊，大如杯椀，黃疸，宿食朝起嘔吐，支滿上氣，時時腹脹，心下堅結上來抬心，傍攻兩脇，十種水病，八種痞塞，飜胃吐逆，飲食噎塞，五種淋疾，九種心痛，積年食不消化，或痞疾連年不瘥，及療一切諸風，身體頑痹，不知痛痒，或半身不遂，或眉髮墮落，及療七十二種風，三十六種遁尸疰忤，及癲癇，或婦人諸疾斷續不生，帶下淋瀝，五邪失心，愁憂思慮，意思不樂，飲食無味，月水不調，及腹中一切諸疾，有似懷孕，連年累月，羸瘦困弊，或歌或哭，如鬼所使，但服此藥，無不除愈。

川烏頭炮，去皮臍，二兩半

柴胡去蘆頭　厚朴去麄皮，生薑製　紫菀去苗葉及土　菖蒲

皁莢去皮子炒　茯苓去粗皮　吳茱萸用湯洗七次，焙炒　桔梗

巴豆去心皮膜，出油炒研　乾薑炮　黃連去鬚

蜀椒去目及閉口者，微炒去汗，各半兩　人參去蘆頭　肉桂去粗皮

右爲細末，入巴豆令勻，煉蜜爲圓，如梧桐子大，每服三圓，生薑湯下，食後臨臥服，漸漸加至五圓七圓。

【九痛圓】治九種心痛，一、蟲心痛，二、疰心痛，三、風心痛，四、悸心痛，五、食心痛，六、飲心痛，七、冷心痛，八、熱心痛，九、去來心痛，此藥悉主之，又治連年積冷流注心胸痛，並療冷衝上氣，落馬墜車，瘀血等疾。

痛、最難治。獨此藥輒能去之。有人病項筋痛。諸醫皆以爲風。治之數月不差。乃流入背脊。久之。又注右脇。擊痛甚苦。乃合服之。一投而差。後嘗再發。又一投差。

木香　胡椒各一分。　巴豆十粒去皮心研　乾蝎七枚。

右爲細末。湯浸蒸餅。圓如麻子大。每服三粒。湯使如前。

【撞氣阿魏圓】治五種噎疾。九般心痛。痃癖氣塊。冷氣攻刺。及脾胃停寒。胸滿膨脹。腹痛腸鳴。嘔吐酸水。丈夫小腸氣痛。婦人血氣血刺等疾。

茴香炒香。　陳皮去白。　青皮去白。　川芎。

丁香皮炒。　蓬莪蓯炮。　甘草炒各一兩。　縮砂仁。

肉桂去粗皮。　白芷炮各半兩。　生薑四兩切作片子。用鹽半兩。淹一宿。炒黑色。

胡椒二錢半。　阿魏二錢半。醋浸一宿。以麵同爲糊。

右爲末。用阿魏糊和。圓如鳥頭大。每藥圓一觔。用硃砂七錢爲衣。丈夫氣痛。炒鹽湯下一粒至二粒。婦人血氣。醋湯下。常服一粒。嚼碎。茶酒任下。

【沉香降氣湯】治陰陽壅滯。氣不升降。胸膈痞塞。心腹脹滿。喘促短氣。乾嘔煩滿。欬嗽痰涎。口中無味。嗜臥減食。又治胃痨留飲。噎酸閉酸。脇下支結。常發妨悶。及中寒欬逆。脾濕泄瀉。兩脇虛鳴。臍下撮痛。若能治之。患脚氣人。毒氣上衝。心腸堅滿。肢體浮腫。尤宜服。當服開胃消痰。散壅思食。

沉香一斤二兩半。　縮砂仁三斤。

香附子甘五斤。炒。去毛。

甘草七斤半。爲末。

右爲細末。每服一錢。入鹽少許。沸湯點服。渡且勞攪。空心服之。去邪惡氣。使無瘴疾。

【小烏沉湯】調中快氣。治心腹刺痛。

烏藥一兩。去心。　香附子沙盆內漫去皮毛。焙乾。二兩。　甘草一分。

右爲細末。每服一錢。鹽少許。或不著鹽。沸湯點。不拘時。

【丁沉煎圓】辟霧露寒邪。散膈脘凝滯。調順三焦。和養榮衛。治心胸痞悶。噫氣吞酸。嘔逆痰水。津液不收。兩脇刺痛。腹中堅滿。口苦無味。可思飲食。

白豆蔻仁九兩半。　丁香十二兩。　沉香二兩。　丁香皮一兩。

木香一錢半。

右爲細末。別用甘草煎膏爲圓。每一兩分作二百五十圓。每服一粒。含化。空心食前。常服養榮衛散滯氣。

【或應圓】治虛中積冷。氣弱有傷。停積胃脘。不能傳化。或因氣傷冷。因飢飽食。飲酒過多。心下堅滿。兩脇脹痛。心腹大疼。霍亂吐瀉。大便頻併。後重澀澀。久痢赤白。膿血相雜。米穀不消。愈而復發。又治中酒嘔吐。痰逆惡心。喜睡頭旋。胸膈痞悶。四肢倦怠。不欲飲食。又治妊娠傷冷。新產有傷。若久有積塞。喫熱藥不效者。並悉治之。又治久病形羸。荏苒歲月。漸致虛弱。面黃肌瘦。飲食或進或退。大便或祕或泄。不拘久新積冷。並悉治之。大病不過三服。便見痊愈。此藥溫無毒。並不燥熱。不損胃氣。亦不吐瀉。止是磨化積聚。消導溫冷。療飲食所傷。快三焦滯氣。旋圓如菉豆大。每服三五粒。量虛實加減。溫水呑下。不拘時候。常服進飲食。消酒毒。令人不中酒。又治小兒脾胃虛弱。累有傷滯。糞白鮮臭。下痢水穀。每服五粒。黍米大。乾薑湯下。不拘時候。前項疾證。連緜月日。用熱藥及取轉。並不成效者。不拘老幼虛實。心服餌。立有神效。

新揀丁香一兩半。　南木香去蘆頭。二兩半。　肉荳蔻去麩皮。用浮皮仁子二十箇。

巴豆七十箇。去皮心膜。研細。出盡油如粉。　川乾薑炮裂一兩。

百四十箇。去尖。湯浸一宿。去皮別研極爛如膏。　百草霜用村莊家鍋底下刮者。細研。篩二兩。

右七味。除巴豆粉。百草霜。香仁三味外。餘四味擣爲細末。與前三味同拌研令細。用好醋面和。先將蠟六兩銷化作汁。以重絹濾去滓。更以好酒一升。於銀石器內煮蠟錫滾數沸。傾出。候酒冷。其蠟自浮於上。取蠟解用。凡春夏修合。用清油一兩於銅內熬令水散香熟。次下酒煮蠟四兩。同化作汁。就銅內乘熱拌和前項藥末。秋冬修合。用清油一兩半同煎。煮熟作汁。和匀藥末成劑。分作小錫子。以油單紙裹之。旋圓服餌。此高殿前家方也。

【小理中圓】治三脘氣弱。中焦積寒。脾虛不磨。飲食遲化。喫物頻傷。胸膈滿悶。脇肋疼刺。嘔吐噦逆。噫酸惡心。腹脹腸鳴。心腹疼痛。噎塞膈氣。飜胃吐食。飲食減少。

草荳蔻煨。　京三稜煨。乘熱碎。　乾薑炮。　青皮　良薑炒各三斤。

陳皮淨洗。去瓤。　肉桂去麤皮各二兩。　牽牛炒。香熟。　阿魏三兩。醋化作泥。

蓬莪蓯煨。乘熱碎。　縮砂仁　紅豆各一斤。

右爲末。用水煮麵糊爲圓。如梧桐子大。每服三十粒。生薑橘皮湯下。溫湯亦得。不拘時。此藥無利性。不損氣。脾胃虛弱者。最宜服之。

【大七香圓】治男子婦人。脾元氣冷。胃氣虛乏。不思飲食。心膈噎塞。漸成膈氣。脾泄瀉痢。氣刺氣疰。中酒吐酒。冷痰飜胃。霍亂吐瀉。並皆治療。

丁香皮三百三十兩。　縮砂仁　甘草炒　陳皮洗。

肉桂去麤皮。　藿香葉各二百五十兩。　烏藥六十四兩。　香附子炒。一百九十二兩。

甘松揀。六十四兩。　麥蘗炒。一百兩。

右爲末。煉蜜爲圓。如彈子大。每服一粒。嚼酒雙湯嚥下。婦人脾血氣。如經月水不調。並用炒薑酒嚼下。醋湯亦得。大有神効。忌生冷肥膩之物。

【小七香圓】能溫中快膈。化積和氣。治中酒吐酒。嘔逆嗜酸。氣膈食噎。飲食不下。冷涎飜胃。腹脹脾疼。遠年茶酒食積。眼臉俱黃。赤白痢疾。脾泄瀉。婦人脾血氣。小兒痎氣疾。

丁香皮　香附子炒。去毛。　甘草炒各一百二十兩。　蓬莪蓯煨。乘熱碎。

縮砂仁各二十兩　甘松炒八十兩　益智仁炒六十兩

右為末，水浸蒸餅為圓如菉豆大，每服二十圓，溫酒薑湯熱水任下，或氣脹滿，磨烏藥水煎湯下，或酒食過度，頭眩悶心，胸膈滿悶，先嚼二十圓，後吞二十圓，生薑紫蘇湯下，此藥性溫平，不動臟腑。

【連翹圓】治男子婦人脾胃不和，氣滯積聚，心腹脹滿，乾嘔酸心，飲食不下，胸膈壅塞，脇肋疼痛，酒積面黃，四肢虛腫，行步不能，但是脾胃諸疾，並宜服之。

荊三稜炮二百四十九兩　連翹　陳皮洗各二百四十兩　肉豆蔻二十五兩　檳榔八十兩

青皮洗各一百六十兩　好墨一百六十兩煅　蓬莪蒳炮　肉桂去粗皮不見火　牽牛子二百二十兩合殼取細末

右為末，糊搗為圓如梧桐子大，每服三十圓，生薑湯下，久患赤白痢，及大腸風秘，脾胃虛弱，黃連湯過下，婦人諸疾，並酒調下，不拘時，孕婦莫服。

【酒癖圓】治飲酒過度，頭旋惡心，嘔吐不止，及酒積停於胃間，過飲即吐，久而成癖。

巴豆十五箇不去皮膜不出油　雄黃研如六箇皂角子大，蝎梢十五箇

右三味，同研細，入白麵五兩半，滴水和，如綠豆大，候稍乾，入麝內炒香，將一粒放水中，如麝粒浮於水上，即去麝不用，每服二粒，溫酒下，食後服，尋常傷酒，每服一粒，茶酒任下。

【分氣紫蘇飲】治男子婦人脾胃不和，胸膈噎塞，腹脇疼痛，氣促喘急，心下脹悶，飲食可思，嘔逆不止。

五味子去梗洗淨　桔梗剉　茯苓　大腹皮

陳皮洗淨　草菓仁　桑白皮炙剉　甘草炙各三兩

右八味，㕮咀為粗末二十兩，淨入鍋，微炒令黃，每服三片，入鹽少許，同煎至七分，去滓，空心服，常服，和胃進食。

【四倍散】治大人小兒脾氣不順，補虛進食。

白朮四兩　白茯苓二兩去皮　訶子用溫紙裹煨熟去核半兩

人參一兩

右各切為末，每服一大錢，水一盞，生薑三片，棗子一箇，煎至六分，空心溫服。

【木香餅子】治脾經虛冷，胃脘寒痰，胸膈噎塞，口淡舌澀，心腹撮痛，嘔逆宿水，脇下疼悶，喘滿氣急，倦怠少力，全不思食，常服，寬胸膈，散滯氣，消停寒，美飲食。

縮砂仁十二兩　甘松洗五兩　丁香四兩半　檀香四兩

蓬莪蒳十兩　木香二兩半

右為細末，別用甘草熬膏為圓，每兩作二百五十圓，並作餅子，每服三五餅，細嚼生薑湯下，溫酒亦得，不拘時。

【草菓飲】治脾寒瘧疾。

紫蘇葉　草菓仁　川芎　白芷

青皮去白炒　甘草炒　高良薑炒

右等分為末，每服二大錢，水一盞，煎至七分，去滓，熱服，二滓併煎，當發，日連進三服，無不效。

【溫中良薑圓】溫脾胃，順三焦，治寒痰聚結，氣壅不通，食即輒吐，咽膈噎悶，兩脇肋疼刺，嘔吐噦逆，噫酸惡心，中滿短氣，噎聞食臭，及療留飲腸鳴，濕泄冷瀉，注下不止，常服健脾胃，美飲食，辟寒邪，養正氣。

高良薑四斤炒　乾薑二斤四兩炮　白朮二斤四兩　甘草一斤半

肉桂去粗皮二十八兩

右為細末，煉蜜為圓，每一兩為一十二圓，每服一圓，細嚼生薑橘皮湯下，米飲亦得，空心服。

【煨薑圓】治本臟虛，飲食不化，或成痃癖，或發心痛，冷積水脾，結聚疼痛，一切冷氣等疾。

附子　硇砂　木香　生薑

右用大附子五十箇，各重半兩者，去皮臍，以尖刀子剜去心子，納容硇砂半錢實之，却以附子末和麵作餅子裹附子，用文武火煨令黃，用木香如附子之半，同為細末，以水為圓，如鴨頭大，復以生薑一塊，擣作兩片，以麵在內，濕紙裹令煨，候薑熟，白湯嚼下，空心服。

【參苓白朮散】治脾胃虛弱，飲食不進，多困少力，中滿痞噎，心忪氣喘，嘔吐泄瀉，及傷寒咳嗽，此藥中和不熱，久服養氣育神，醒脾悅色，順正辟邪。

白扁豆一斤半，薑汁浸，去皮微炒　人參去蘆　白茯苓

白朮　甘草炒　山藥各二斤　蓮子肉

桔梗炒令深黃色　薏苡仁　縮砂取仁各一斤

右為細末，每服二錢，棗湯調下，小兒量歲數加減服之。

【紅圓子】治丈夫脾積氣滯，胸膈滿悶，面黃腹脹，四肢無力，酒積不食，乾嘔不止，背胛連心胸及兩乳痛，婦人脾血積氣，諸般血癥氣塊，及小兒食積骨瘦，面黃肚脹，氣急不喜飲食，漸成脾勞，不拘老少，並宜服之。

荊三稜水浸軟，乾薑炮　青皮　蓬莪蒳　陳皮各五斤　胡椒各三斤

右為細末，用醋糊檳榔為圓，如梧桐子大，紅為衣，每服三十粒，食後薑湯下，小兒臨時加減服。

寶髮新增方

【蘇子降氣湯】治男女虛陽上攻，氣不升降，上盛下虛，膈壅痰多，咽喉不利，欬嗽喘煩引飲，頭目昏眩，腰疼脚弱，肢體倦怠，腹肚痞刺，冷熱氣瀉，大便風秘，澀滯不通，肢體浮腫，有妨飲食。

川當歸去蘆　甘草炙　厚朴去粗皮　前胡去蘆各二兩

陳皮去白　肉桂去粗皮各三兩　紫蘇子　半夏麴各五兩

右爲細末，每服二大錢，水一盞半，入生薑二片，棗子一箇，擣五寸匕，同煎至八分，去滓，熱服，不拘時候，常服清神順氣，和五藏，行滯氣，進飲食，去痼氣。

【安中散】治久年日近脾疼飧泄，胃口吐酸水，寒邪之氣，留滯於內，停積不消，胸膈脹滿，攻刺腹脇，惡心嘔逆，面黃肌瘦，四肢倦怠，又治婦人血氣刺痛，小腹連腰，攻疰重痛，並治。

甘草十兩，炒　延胡索去皮　良薑炒　乾薑炮

茴香炒　肉桂各五兩　牡蠣四兩，煅

右爲細末，每服二錢，熱酒調下，婦人淡醋湯調服，如不飲酒者，用鹽湯點下，並不拘時。

【分心氣飲】治男子婦人一切氣不和，多因憂愁思慮，怒氣傷神，或臨食憂慮，或事不隨意，使鬱抑之氣，留滯不散，停於胸膈之間，不能流暢，致心胸痞悶，脇肋虛脹，噎塞不通，噫氣吞酸，嘔噦惡心，頭目昏眩，四肢倦怠，面色萎黃，口苦舌乾，飲食減少，日漸羸瘦，或大腸虛祕，或因病之後，胸膈虛痞，不思飲食，並皆治之。

木香不見火　丁香皮　人參去蘆　厚朴去粗皮，薑汁製

大腹子炮　大腹皮炙　桑白皮炒　草果仁

桔梗去蘆，炒　麥門冬去心　白朮各半兩　香附子炒，去毛

紫蘇去梗　藿香去土　陳皮去白，各一兩半　甘草炙，一兩

右㕮咀，每服二錢，水一盞，生薑三片，煙心十莖，棗子一箇，擘破去核，煎至七分，去滓，溫服，不拘時。○又方見後。

【奪命抽刀散】治男子婦人脾胃積冷，中焦不和，心下虛痞，腹中疼痛，胸脇逆滿，噎塞不通，嘔吐冷痰，飲食不下，噫氣吞酸，口苦無味，不思飲食，婦人久患血氣刺痛不可忍者。

乾薑剉，入巴豆半兩，同炒至黑色，卽去巴豆　良薑各二十兩，入班毛一百箇同炒，卽去班毛。

石菖蒲二十二兩，不見火　糯米二十五兩，炒。

右爲淨爲細末，每服二錢，用鹽少許，沸湯點，不拘時，常服糯米進飲食，此藥大腸溫藥，空心服，或溫酒調尤佳。

【金露圓】治腹內積聚痞塊，久患大如盃，及黃瘦宿水，朝暮潮熱，積年冷氣，時復腹下，盤痛絞結，衝心及兩脇，徹背連心，痛氣不息，氣遶臍下，狀如蟲咬不可忍，又治十種水氣，反胃吐食，嘔逆，飲食多噎，五般痔瘻，腹氣走疰風，有似蟲行，手足煩熱，夜臥不安，睡語無度，又治小兒驚癇，婦人五邪，夢與鬼交，沉重不思飲食，昏昏如夢，不曉人事，欲死懼多，或歌或哭不定，月候不調，心中如狂，身體羸瘦，莫辨其狀，但服此藥，萬無失一，是病皆療，更不細述。

黃連剉，焙　草烏頭乘，各二兩　桂心不見火　乾薑炮，各一兩

生乾地黃洗淨，一兩，剉，焙　貝母去心　桔梗洗，去蘆，剉，焙

柴胡洗，去蘆，剉，焙　吳茱萸湯浸七遍　紫菀洗，去苗，剉，焙　菖蒲米泔浸一宿

芎藭洗，去蘆，剉，焙　人參洗，去蘆，切，焙　防風去蘆，剉，焙　白茯苓去皮，剉，焙

厚朴去粗皮，薑汁製　枳殼湯浸，去穰，麩炒　鱉甲米醋炙黃　蜀椒去目炒出汗

甘松淨洗，一方用甘草　甘草炙，各一兩　巴豆去心膜，醋煮三十沸，焙取一兩，不去油，用煮時須親自數三十沸，便傾出焙，若沸過，則藥無力。

右爲細末，以麵糊圓如梧桐子大，每服五圓，小兒兩圓，心中疾患，薑湯下，心痛酸，石榴皮湯下，口苦，蜜湯下，頭痛，石膏湯煮茶下，一切脾氣，橘皮湯下，水瀉氣滯，煮陳皮飲下，赤痢，甘草湯下，白痢，乾薑湯下，赤白痢，甘草乾薑湯下，胸膈壅閉，通草湯下，婦人血氣，當歸酒下，如不飲酒，當歸煎湯下亦得，痎氣風氣小腸氣，及下墜，附子湯下，常服，及鹿茸酒般疾患，只米飲茱萸酒任下，傷冷頭痛，酒食所傷，酒煎黃連，結氣痞塞，鳥藥，並鹽湯鹽酒下。

【秘傳降氣湯】治男子婦人上熱下虛之疾，凡飲食過度，致傷脾胃，酒色無節，耗損腎元，水土交攻，陰陽關隔，遂使氣不升降，上熱則頭目昏眩，痰實嘔逆，胸膈不快，咽喉乾燥，飲食無味，下弱則腰脚無力，大便祕澀，裏急後重，臍腹冷痛，治以涼，則脾氣怯弱，腸鳴下利，治以溫，則上焦壅熱，口舌生瘡，及脚氣上攻，與久痢不差，宜先服此藥，却以所主藥治之，無不效者。

五加皮酒浸半日，炒黃色　骨碎補去毛，剉，炒　地骨皮炒黃

桔梗炒黃　訶子炮，取肉，炒　半夏生爲末，生薑自絞汁爲餅，再蒸炒

草果去皮膜，淨洗，炒黃，各半兩　枳殼湯洗去穰，麩炒　柴胡去蘆，洗

陳皮去白，炒黃色　甘草嚼，各一兩　桑白皮二兩，剉，炒

右爲粗散，和勻，再就蒸一伏時，曬乾，每服二錢，紫蘇三葉，薑三片，水一盞，同煎至七分，食後通口服，常服調順榮衛，通利三焦，開鬱化痰，和五臟○痰嗽，加半夏，麻煎，心肺壅，加入桑皮，苦煎，上膈熱，加北黃芩煎，下部大段虛，加少許炮附子煎，如使附子，多加生薑，婦人血虛，加當歸。

【木香分氣圓】治一切氣逆，心胸滿悶，腹脇虛脹，飲食不消，乾嘔逆吐，胸膈痞滿，上氣痰嗽，冷痰氣不升降，並宜服之。

木香　甘松洗，去土，各一兩　香附子十六兩

蓬莪蓯煨，八兩　甘草炙，六兩

右爲細末，水糊爲圓，每服二十粒，煎生薑橘皮湯下，不計時，脾胃虛弱人，最宜常服，寬中順氣進食。○又方見後。

【鐵刷湯】治男子脾積心氣痛，婦人血氣刺痛，及治中酒惡心，一切痰痞氣疾，腸風下血，臟毒，滑腸，泄瀉。

蒼朮八兩，米泔浸一宿，良薑六兩，油炒　茴香炒，二兩

甘草炙，八兩半

右爲細末，每服二錢，生薑三片，鹽一撮，水一盞，煎至七分，溫服，或用艾酒調下亦得，如脾弱，用酒一

煎服。陳米飲時時進三服。能治四方之人不伏水土。小兒驚搐脫肛。並用蓖三片。棗子一枚。煎服。如四月暑伏熱。擣生薑冷水調下。若行路早起。棗子一個。去核包藥少許。同生薑三片嚼下。能辟四時非節疫癘邪氣等疾。

【燒脾散】治脾胃虛弱。久寒積冷。心氣脾痛。冷痰飜胃。臍腹刺痛。嘔吐惡心。不思飲食。及療婦人血氣攻刺。腹脇撮痛。服之立效。

赤芍藥　乾薑炮各六錢半。　良薑十兩。油炒。　甘草炙四兩。

右爲細末。每服二大錢。白湯點下。不拘時候。

【新法半夏湯】治脾胃不和。中脘氣滯。宿寒留飲。停積不消。心腹刺痛。脇肋膨脹。嘔吐痰水。噫氣吞酸。中酒吐酒。噦逆惡心。頭痛煩渴。倦怠嗜臥。不思飲食。

陳皮去白。　神麯炒。　乾薑炮各四兩。　丁皮

木香　白茯苓各七錢半。　甘草四錢半。　草蔻煨去皮。

半夏麯二兩三錢。炒。

右爲細末。每服一錢。薑湯點服。無時。常服溫平藥調開胃健脾。消酒進食。

【白朮六乙湯】治脾胃不和。心腹痞悶。脇肋膨脹。口苦無味。嘔噦惡心。可思飲食。面色萎黃。腸虛自利。肌體瘦弱。腸氣飜胃。

白朮六兩。去蘆。　甘草一兩。炙。

右爲細末。每服二錢。水一盞。煎至八分。空心服。或沸湯點服亦得。常服育神溫胃。湯進消撰。不拘四時。並宜服。

【蠶煎散】治男子婦人一切冷氣攻衝胸脇。及前後心。連背脊疼痛。轉項拘急。或脾胃虛冷。不思飲食。時發嘔吐。霍亂轉筋。臍腹冷疼。泄瀉不止。及膀胱成陣刺痛。小腸氣弔內外腎疼。又治婦人血氣刺痛。血積血瘕。繞臍撮痛。並治之。

草蔻仁去皮。焙。　茯苓去皮。　甘草　縮砂仁去殼。

大麥芽炒。　陳皮去白。　光活去蘆。　厚朴去粗皮。

肉豆蔻煨。　川芎洗剉。　蒼朮米泔浸二宿。　枳殼去穰。麩炒。

蓽澄茄　檳榔炮。　良薑油炒。　茴香炒各二兩。

右件碾爲細末。每服二錢。水一盞半。入鹽一點。同煎至八分。空心食前服之。○又方見後。

【神仙沉麝圓】出蘇沈祕方。治一切氣痛不可忍者。

木香半兩。　沉香剉。　麝香研。　血竭研。

辰砂研。　沒藥研各二兩。　甘草二兩。

右爲末。熬甘草爲膏。煮和每服一圓。用薑鹽湯嚼下。血氣藥湯下。松滋令溫行。擬賣此藥。婦人產後

血痛氣痛不可忍者。只一圓立效。萬君神驗之。每有人病止青典牛圓。往往亦效。神效不可盡述。

【治中湯】治脾胃不和。飲食不下。短氣虛羸。而復嘔逆。霍亂吐瀉。胸膈心痛。逆氣短氣。中滿虛痞。腸澼不通。或大病瘥後。胸中有寒。時加欬唾。並宜服之。

人參去蘆。　乾薑炮。　白朮剉。

青皮炒。　陳皮各一兩。洗。去白。　甘草炙。

右爲粗末。每服三錢。水一盞半。煎至一中盞。去滓。稍熱服。空心食前。或霍亂後。氣虛未蘇。煩躁者。尤宜服。

淳祐新添方

【枳實理中圓】理中焦。除痞滿。逐痰飲。止腹痛。大治傷寒結胸欲絕。心膈高起。實滿作痛。手不得近。

枳實麩炒二兩。　白朮　人參去蘆。

白茯苓去皮。　乾薑炮各二兩。　甘草炙。

右搗羅爲細末。煉蜜爲圓。如雞子黃大。每服一圓。熱湯化下。連進二三服。胸中豁然。不拘時候。

【進食散】治脾胃虛冷。不思飲食。及久病人脾虛全不食者。只一二服。便頓能食。

草果肉　川烏炮各三箇。　青皮去穰。

高良薑剉切。炒。　肉桂去外皮。　甘草炙各一分。　陳皮去白。

右爲末。每服二錢。水一大盞。生薑五片。煎七分。食前服。　訶子五箇。煨。去核。

【白沉香散】治一切冷氣。攻衝心腹。脇肋脹滿。噫醋吞酸。胸膈噎塞。飲食減少。常服。壓氣和脾胃。

川白薑炒。　半夏麯　白茯苓　附子炮熟。去皮。

訶子肉　白朮燒。　沉香　人參去蘆。

乾山藥　木香各一兩半。　丁香半兩。　甘草炙六錢。

右爲細末。每服二大錢。水一中盞。生薑三片。棗三枚。木瓜一片。煎至七分。食前服。

吳直閣增諸家名方

【丁香煮散】治脾臟伏冷。胃脘受寒。胸膈痞悶。心腹刺痛。痰逆惡心。吐逆。四肢逆冷。但是沉寒痼冷。無問久新。功效不可具述。

丁香不見火。　乾薑炮。　紅豆去皮。

甘草炙。　川烏炮。去皮臍。　良薑去蘆頭。

益智仁五兩半。　胡椒二兩。

右爲粗散。每服二錢。水一盞。生薑三片。鹽一撮。煎至七分。空心食前稍熱服。滓併服。

【鍾香香散】治男子女人陰陽不和。臟腑虛弱。中脘氣滯。宿寒留飲。停積不消。胸膈脹滿。心脾引痛。攻刺腹脇。有妨飲食。又治中酒吐酒。停飲浸淫。嘔逆惡心。噫氣吞酸。

天台烏去木　肉桂去粗皮不見火　香附子炒去毛　赤芍藥
高良薑去蘆頭用麻油炒各四兩　甘草炙半兩

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服不拘時候

【二薑圓】養脾溫胃去冷消痰大治心脾疼痛寬胸下氣進美飲食療一切冷物所傷並皆治之

良薑去蘆　乾薑炮

右件等分為細末麵糊為圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓食後橘皮湯下孕婦不宜服

【藿合圓】治男子婦人氣血虛弱久積陰冷留滯不化結聚成形心腹膨脹刺痛或陣上逆胸滿或脾胃久虛內傷冷物泄瀉注下腹痛腸鳴或久痢純白時下青黑腸滑不禁又治脾胃停痰嘔吐吞酸痞塞不通可思飲食身體沉重面色萎黃或久患心脾疼痛服之永除根本小兒有傷積服之神效此藥不損臟腑

肉荳蔻炮　白朮煨　厚朴去麤皮薑汁炙　陳皮去白
青皮去白各二兩　附子炮去皮臍二兩半　人參　丁香不見火
木香不見火各一兩　乾薑三兩炮

右為細末入硇砂八錢研同薑汁打麵糊為圓每兩作二十圓每一圓用薑一塊如拇指頭大切開作合子安藥在內用面紙裹慢火煨一頃餘久取出去紙和藥細嚼白湯下孕婦不得服小兒一粒分作四服

【順氣木香散】治氣不升降嘔逆惡心胸膈痞悶脇肋脹滿及酒食所傷噫氣吞酸心脾刺痛大便不調面黃肌瘦可思飲食兼療婦人血氣刺痛及一切冷氣

高良薑去蘆炒　乾薑炮　茴香炒
縮砂仁　肉桂去粗皮不見火　桔梗去蘆炒　陳皮去白
丁香皮不見火　荜茇米泔浸　甘草炙　厚朴去麤皮薑汁炙

右等分為細末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同煎八分稍熱服不拘時或入鹽少許沸湯點服常服寬中順氣和胃進食

【快氣湯】治一切氣心腹脹滿胸膈噎塞噫氣吞酸胃中痰逆嘔吐及宿酒不解可思飲食

縮砂仁去皮殼八兩　甘草炙兩半　香附子炒去毛三十二兩

右為末每服一錢鹽湯點下常服快氣美食進養神胃

【蓬煎圓】治脾胃虛弱久有傷滯中脘氣痞心腹膨脹脇下堅硬胸中祕塞噎氣不通嘔吐痰水可思飲食或心腹引痛氣刺氣急及療食噎酒癖血瘕氣塊時發疼痛嘔噦酸水面黃肌瘦精神困倦四肢少力又治女人血氣不調小腹疞痛並皆治之

舶上茴香炒　附子炮去皮臍　枳殼去穰麩炒　川楝子去核

檳榔　山藥各二兩　硇砂半兩
蓬莪蒁各四兩醋煮令透切焙為末　猪腰一具入硇砂并三稜莪蒁末同煮膏

右為末入膏內同醋麵糊為圓如梧桐子大每服十圓至十五圓生薑湯下婦人淡醋湯下不計時候更益虛實加減常服順氣寬中消積滯化痰飲

【守中金圓】理中焦不和脾胃積冷心下虛痞腹中疼痛或飲酒過多胸脇逆滿噎塞不通欬嗽無時嘔吐冷痰飲食不下噫氣吞酸口苦失味怠惰嗜臥不思飲食又治傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利心腹絞痛手足不和身熱不渴及腸鳴自利米穀不化

荜茇米泔浸　乾薑炮　桔梗去蘆　甘草炙各等分

右件為末煉蜜為圓如彈子大每服一圓食前沸湯嚼下又治脾胃留滯體重節痛面色萎黃肌肉消瘦常服溫脾暖胃消痰逐飲順三焦進美飲食辟風寒暴冷

【集香圓】治一切氣疾胸膈痛悶脇肋脹滿心腹疼痛噫氣吞酸嘔吐惡心可思飲食或因酒過傷脾胃不和並皆治之

白豆蔻仁　縮砂仁　香附子炒去毛
藿香各四兩　麝香八錢別研　甘草一十六兩二兩入藥一十四兩搗汁煎膏　木香不見火
丁香不見火六兩

右為細末入麝香拌勻用甘草膏煎和為圓如梧桐子大每服一二圓細嚼嚥津不拘時常服寬中順氣消宿酒進飲食磨積滯去痰塊

【異香散】治腎氣不和腹脇膨脹痞悶噎塞喘滿不快飲食難化噫氣吞酸一切氣痞腹中刺痛此藥能破癥瘕結聚大消宿冷沉積常服調五臟三焦和胃進食

蓬莪蒁煨　益智仁炮　京三稜煨　甘草炙各六兩
石蓮肉一兩　青橘皮去白　陳橘紅各三兩　厚朴二兩去皮薑製

右為細末每服一錢水一盞生薑三片棗一枚鹽一捻煎至七分通口服不計時鹽湯點或鹽酒調皆可服

【肉豆蔻圓】治氣瀉療脾胃氣虛弱飲食減少

肉豆蔻用仁　縮砂仁各一兩　木香
訶黎勒皮各三分　赤石脂　白礬枯過各半兩

右為末糯米飲和圓梧子大每服十圓米飲下不拘時

【三稜散】治酒食所傷胸膈不快腹脇脹滿嘔吐酸水醫胃脾疼及食積氣塊攻刺腹脇不思飲食日漸羸瘦又治年高氣弱三焦痞塞常登妨悶並宜服之

蓬莪蒁煨　京三稜煨　青皮去白
益智仁各二兩

白茯苓四兩，煅　甘草炙三兩，

右爲末，每服二錢，水一大盞，棗一枚，擘破，鹽少許，同煎至半盞，溫服，不拘時，常服寬胸利膈，消酒食和胃。

【如神圓】治一切冷氣熱氣，消蘇氣，和脾胃，補下元。

京三稜醋浸，炮，銼　附子炮，去皮臍　甘草炙，

天南星炮，　半夏湯洗七次，薑製，　乾薑炮，　光活　白芷

右等分爲末，醋煮麵糊圓，梧子大，每空心至薑鹽湯下二十圓至三十圓，忌酒二盞湯下三十圓，小兒赤麻，甘草橘皮湯下三圓至五圓，並歲數加減服，白痢，乾薑湯下。

【丁香脾積圓】治丈夫、婦人、小兒、諸般食傷積聚，胸脇脹滿，心腹膨脹，噫氣吞酸，宿食不化，脾疼羸瘠，婦人血氣刺痛。

蓬莪蒳三兩，　皁莢三兩，火燒存性，　丁香　木香各半兩，

京三稜三兩，　青皮一兩，洗，　高良薑已上同用米醋一升，於磁器內煮乾，焙蒳，三稜，面裹，蒸熟，切碎焙乾，　巴豆去殼，各半兩，

右入百草霜三匙，同爲末，麵糊圓，如麻仁大，每服五圓七圓，至十五二十圓止，食傷，隨物下，脾積氣，陳皮湯下，口吐酸水，薑湯下，醒胃，藿香甘草湯，丈夫小腸氣，炒茴香酒下，婦人血氣刺痛，淡醋湯下，嘔逆，吉蒲湯，小兒疳氣，麥芽湯下，更量虛實加減，如欲宣轉，可加圓數，五更初冷茶清下，利三五行後，以白粥補之，孕婦不可服。

續添諸局經驗祕方

【分心氣飲】治證與前分心氣飲同。

大腹皮　赤芍藥　木通去節，　半夏湯洗七次，

桑白皮微炒，　赤茯苓　肉桂去皮，　甘草炙，

陳橘皮去穰，　青橘皮去白，　羌活各一兩，　紫蘇去麤梗，四兩，

右爲麤末，每服三錢，水一盞，生薑三片，棗二枚，煎心五盞，向熟至七分，去滓，溫服，不拘時候，常服消化滯氣，升降陰陽，調順三焦，和脾進食。

【木香分氣圓】治證與前木香分氣圓同。

丁香皮　蓬莪蒳　木香　甘草

香附子炒，去毛，　縮砂仁各四兩，　檀香　甘松洗，

川芎黃　藿香葉各一兩，

右十味，曝乾不見火，搗羅爲末，水糊爲圓，如梧桐子大，每服二十圓至三十圓，生薑橘皮湯下，不計時，脾胃虛弱人，最宜服之，若服寬中順氣，進飲食，

【化氣湯】治一切氣逆，胸膈噎悶，偏脹膨滿，又治心脾疼痛，嘔吐酸水，丈夫小腸氣，婦人脾血氣。

沉香　胡椒各一兩，　縮砂去殼，　桂心去麤皮，

木香各二兩，　陳皮去穰，焙炒，　乾薑炮，　甘草炙，

茴香炒，　青皮去白，焙炒，　蓬莪煨，　丁皮各四兩，

右爲細末，每服二錢，薑鹽湯調下，婦人，淡醋湯下，

【蘇子降氣湯】治中脘不快，心腹脹滿，陰陽壅滯，氣不升降，胸膈噎塞，喘促短氣，乾嘔煩滿，咳嗽痰涎，口中無味，嗜臥減食，宿塞留飲，停積不消，脇下支結，常覺妨悶，專治脚氣上衝，心腹堅滿，肢體浮腫，有妨飲食。

半夏洗七次，　蘇子淨炒，各二兩半，　甘草炙二兩，　肉桂去麤皮，不見火，

前胡去蘆，　厚朴用薑汁製，　陳皮去白，各一兩，　當歸一兩半，

右爲㕮咀，每服三錢至三錢，水一大盞，生薑三片，煎至七分，去滓，溫服，不拘時，常服消痰飲，散滯氣，進飲食，

【千金大養脾圓】治脾胃虛弱，停寒留飲，膈氣噎塞，反胃吐食，心胸痞滿，脇肋虛脹，胸腹刺痛，牽引背脊，食少多傷，言微氣短，口苦舌澀，惡心嘔穢，喜睡吞酸，久病泄痢，腸胃虛滑，或大病氣不復常，飲食無味，形容憔悴，酒後多痰。

陳橘皮去白，　白薑炮，　枳殼　胡椒

白茯苓去皮，　三稜炮，　茴香　神麯

縮砂仁，　蓬莪炮，　木香　人參

益智仁，　甘草炙，　丁香　白朮

薏苡仁，　麥糵炒，　藿香　肉豆蔻

白扁豆微炒，　苦梗炒，　紅豆　良薑

右爲末，煉蜜圓如彈子大，每服一粒，細嚼白湯下，溫酒亦得，空心食前，常服溫養脾胃，美飲食，

【蟠葱散】治男子婦人脾胃虛冷，攻築心腹，連脇肋刺痛，胸膈痞悶，背膊連項，拘急疼痛，不思飲食，時或嘔逆，霍亂轉筋，腹冷泄瀉，膀胱氣刺，小腸及外腎腫痛，及治婦人血氣攻刺，撮塊硬，帶下赤白，或發寒熱，胎前產後，惡血不止，臍腹疼痛，應一切虛冷不思飲食，並宜服之。

蒼朮米泔浸，去皮焙，　甘草炙各半斤，　延胡索三兩，　肉桂去粗皮，

乾薑炮各二兩，　三稜炮，　青皮去白，　茯苓白者，去皮，

蓬莪各六兩，　縮砂去皮，　丁皮　檳榔各四兩，

右搗羅爲末，每服二錢，水一盞，連根葱白一莖，煎至七分，空心食前稍熱服，

【五皮散】治男子婦人脾氣停滯，風濕客搏，脾經受濕，氣不流行，致頭面虛浮，四肢腫滿，心腹膨脹，上氣促急，腹脇如鼓，繞臍脹悶，有妨飲食，上攻下注，來去不定，舉動促乏。

五加皮　地骨皮　生薑皮　大腹皮　茯苓皮各等分

右為麤末，每服三錢，水一盞半，煎至八分，去滓，稍熱服，不拘時候，切忌生冷油膩堅硬等物。

【四君子湯】治榮衛氣虛，臟腑怯弱，心腹脹滿，全不思食，腸鳴泄瀉，嘔穢吐逆。

人參去蘆　茯苓去皮　甘草炙　白朮各等分

右為末，每服二錢，水一盞，煎七分，通口服，不拘時，頭少許白湯點服，常服一和脾胃，進食飲食，辟寒邪，除霧氣。

【鹽煎散】治證與前鹽煎散同。

青皮去白，四兩　蒼朮去皮　良薑各十二兩　肉桂去粗皮

丁皮各二兩　縮砂去皮　茴香炒，各五兩　橘紅十兩

甘草炒，六兩　山藥半斤

右為末，每服二錢，水一盞半，鹽一點，煎八分，空心食前服。

【參苓壯脾圓】治脾胃虛弱，胸膈痞悶，脇肋脹滿，心腹刺痛，反胃吐食，口苦吞酸，胸滿短氣，肢體怠惰，面色萎黃，及中焦痞，不任攻擊，臟腑虛寒，不受峻補，或因病氣衰，食不復常，稟受怯弱，不能飲食，及久病泄痢，腸胃虛滑，並宜服之。

茯苓去皮　人參　乾薑　肉桂去粗皮，不見火

縮砂去皮　白朮　胡椒　麥麴微炒

白扁豆炒　山藥　神麯

右各等分為末，煉蜜圓如彈子大，每服一圓，細嚼白湯下，或溫酒空心食前，常服，育神養氣，和脾胃，進美飲食。

【人參丁香散】治大人小兒嘔吐不已，粥飲湯藥不下，凡嘔吐之病，皆因三焦不調，脾胃虛弱，冷熱失和，邪正相干，清濁不分，陰陽錯亂，停痰留飲，不能運化，胸膈痞滿，嘔逆惡心，腹脇脹痛，短氣噎悶，欬嘔痰水，噫酸吞酸，不思飲食，漸至羸瘦，及療女人妊娠胎病，心中煩懊，頭目眩重，悄悶食氣，嘔吐煩悶，顛倒不安，四肢困弱，不自勝持，多臥少起，又治久病羸弱，脾胃虛極，中滿嘔逆，全不入食，並宜服之。

白芍藥半斤　當歸去蘆　丁香　蓬莪

肉桂去粗皮　人參去蘆　丁皮各二兩　乾薑炮

甘草炒　茯苓去皮　香附子炒

山藥各四兩

右為末，每服五錢，水一盞，生薑三片，煎七分，空心食前溫服，小兒二歲可服半錢，水五分，盞生薑一片，煎四分已下，溫服，更宜量歲數加減與之，常服，和脾胃，進飲食。

【人參養脾散】治脾胃不和，中脘氣滯，心腹脹痛，不思飲食，宿寒留飲，停積不消，或因飲冷過度，內傷脾氣，嘔吐痰逆，寒熱往來，或時汗出，又治腸胃冷濕，泄瀉注下，水穀不分，腹中雷鳴，脇肋脹滿，兼療傷寒陰盛，四肢逆冷。

茯苓去皮剉　蒼朮去皮，各半斤　人參四兩　甘草炙，十兩

三稜煨，搗碎　青皮去白，各十二兩　芍藥一斤　乾薑炮

丁皮各六兩

右為末，每服二錢，水一盞，薑五片，棗三枚，煎七分，空心服。

【聚肉平胃散】治證與前平胃散同。

厚朴去粗皮，薑製炒　陳皮各三斤二兩　甘草剉，炒　紅棗

生薑各二斤　蒼朮去粗皮，米泔浸二日，炒，五斤

右件剉碎，拌勻，以水浸過面上半寸許，煮乾取出，焙燥，碾為末，每服二錢，用鹽湯點，空心食前，常服調氣暖胃，化宿食，消痰飲，辟風寒冷濕，四時非節之氣。

【盧氏異方感應圓】與和劑方大不同，但用修製須如法，分兩最要勻停，止是煖化，不可偏勝，此藥積殭不動臟腑，其功用妙處，在用蠟之多，切不可減，常服健脾進食，永無寒熱瀉痢之疾，蓋消磨積滯以漸，自然無疾，過酒食醉飽，尤宜多服，神效不可具述。

肉豆蔻麵裹煨　木香濕紙裹煨　乾薑炮

百草霜篩細　丁香煨乾　榧榔

蓽澄茄各一兩　乳香三錢，剉研　香仁七十枚，去皮尖研細，依巴豆法去油

真黃蠟十兩　巴豆百粒，去皮研為粉，用紙重裹，捶油盡，再易紙，至油減白霜為妙　片子薑黃

右除巴豆粉、百草霜、香仁、乳香外，餘並為細末，却同前四味拌和研勻，先將上項黃蠟十兩，於銀石器內鎔化作汁，用重篩濾去滓，以無灰好酒一升，於銀石器內煮蠟鎔，數滾取起，候冷，其蠟自浮於酒上，去酒不用，春夏修合，用清麻油一兩，秋冬用油一兩半，於大銀器內熬令香熟，次下酒煮蠟同化作汁，乘熱拌和前項藥末，十分均勻了，候稍凝，分作劑子，用罐子盛之，半月後方可服，如服旋圓，如鵝黃子大，任意服之，二三十圓，加至五十圓無礙，此藥以蠟多難磨，熱圓子盛細，其功盡博陶，睡須常服之，若欲治病，不拘時候。

【木香流氣飲】調順榮衛，通流血脈，快利三焦，安和五臟，治諸氣痞滯不通，胸膈膨脹，口苦咽乾，嘔吐少食，肩背脹脇，走疰刺痛，及喘急痰嗽，面目虛浮，四肢腫滿，大便祕結，水道赤澀，又治憂思太過，怔忪鬱積，脚氣風濕，聚結腫痛，喘滿脹急。

陳皮去白二斤　甘草炙　厚朴去麤皮薑汁製　紫蘇葉
青皮去白　香附炒去毛各一斤　木通八兩去節　大腹皮
丁皮不見火　檳榔　肉桂去粗皮不見火　草果仁
蓬莪煨切　藿香去枝梗　木香去麤皮各六兩　乾木瓜
人參去蘆　白朮　麥門冬去心　石菖蒲
赤茯苓去皮　白芷各四兩　半夏二兩湯洗七次切片焙乾

右爲細末每服四錢水一盞半生薑三片棗子二枚煎七分去滓熱服如傷寒頭痛機覺得疾入速根據白三寸煎服升降陰陽汗出立愈如風腑自利入粳米煎婦人血氣癥瘕入艾醋服並不拘時候

【廿四味流氣飲】方與木香流氣飲方同但無石菖蒲藿香有沉香枳殼大黃沉香六兩枳殼去穰麩炒四兩大黃麵裹煨去麵切二兩○出集驗方

【十八味丁沉透膈湯】治脾胃不和中塞上氣脇肋脹滿心腹疞痛痰逆惡心或時嘔吐飲食減少十膈五噎痞塞不通噫氣吞酸口苦失味並皆主之

肉豆蔻煨　木香　青皮洗　麥蘖
白豆蔻　丁香各半兩　白朮二兩　香附子
縮砂仁　人參各一兩　厚朴薑炒　藿香
陳橘皮　沉香各七錢半　神麯炒　半夏湯洗七次
草蔻各二錢半　甘草炙一兩半

右㕮匱每服四錢水二大盞生薑三片棗子一箇同煎八分去滓熱服

【辭香蘇合香圓】方與前蘇合香圓同

【木香槟榔圓】疎導三焦寬利胸膈破痰逐飲快氣消食通潤大腸

郁李仁去皮　皁角去皮酥炙　半夏麯各二兩　枳殼麩炒
青橘皮去白　杏仁去皮尖麩炒　木香不見火　槟榔各一兩

右爲細末別用皂角四兩用蜜水一碗慢慢熬膏更入熱蜜少許圓梧桐子大每服五十圓食後溫生薑湯下

【五香散】升降諸氣宣利三焦疎導壅滯發散邪熱治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似瘰癧而非使人頭痛惡心寒熱氣急

木香　丁香　沉香
藿香各等分　乳香

右爲麤末每服三錢水一盞半煎八分去滓食後溫服

【人參木香湯】順氣寬中治胸膈痞塞必腹刺痛脇肋脹滿飲食減少噫氣吞酸嘔逆噦悶一切氣疾並皆治之

青橘皮不去白　木香不見火各三兩　麥麵去土炒　薑黃各五兩
蓬莪煨刷洗四兩　甘草剉炒　鹽炒各十一兩

右爲末每服一錢沸湯點服不拘時候

增廣太平惠民和劑局方卷四

痰飲　附咳嗽

【倍朮圓】治五飲酒癖一曰留飲停水在心下二曰癖飲水癖在兩脇下三曰痰飲水在胃下四曰溢飲水溢在腸上五曰流飲水在腸間動搖有聲皆由飲酒冒寒或飲水過多所致並皆治之

白朮一斤　肉桂去粗皮　乾薑炮各半斤

右爲末蜜圓如梧桐子大每服二十圓溫米飲下加至三十圓食前日二服

【消飲圓】療酒癖停飲痰水不消滿逆嘔吐目暗耳聾脇下急痛腹中水聲

茯苓去皮　乾薑炮各三兩　白朮八兩　枳實麩炒半兩

右爲末蜜圓如梧子大每服五十圓溫水飲下不計時

【化痰玉壺圓】治風痰吐逆頭目眩胸膈煩滿飲食不下及咳嗽痰壅嘔吐涎沫

天南星　半夏薑生用各一兩　天麻半兩　頭白麵三兩

右爲細末滴水圓如梧桐子大每服三十圓水一大盞先服令沸下麵煮五七沸候麵浮即熟漉出放溫別用生薑湯下不拘時

【辰砂化痰圓】治風化痰安神定志利咽膈清頭目止咳嗽除煩悶

白礬枯過別研　辰砂研飛各半兩　半夏湯洗七次生薑汁同搗和作餅三兩

天南星炮一兩

右半夏餅白礬天南星爲末和勻生薑汁煮糊糊圓如梧桐子大用硃砂爲衣每服十圓生薑湯下食後服亦治小兒風痰壅嗽一歲兒一圓捏碎生薑薄荷湯下

【金珠化痰圓】治痰熱安神志除頭痛眩暈心悸恍惚胸膈煩悶涕唾稠粘痰實欬嗽咽喉不利

辰砂研飛二兩　生犀屑細研半兩　皂莢子炒黃色　白礬光明者於石器內熔汁靈效令　鉛白霜細研　天竺黃研各一兩　金箔爲衣二十片

半夏湯洗七次用生薑二兩去皮同搗細作餅炙微黃色四兩

右以半夏皂莢仁爲末與諸藥研勻生薑汁煮糊糊圓如梧桐子大每服十圓至十五圓生薑湯食後臨臥服

【玉液圓】治風痰化痰涎利咽膈清頭目除欬嗽止煩熱

半夏湯洗七次爲末　白礬枯過各十兩　寒水石燒通赤出火毒水飛過三十兩

右合研以白麵糊爲圓如梧桐子大每服十圓溫生薑湯下食後臨臥服

【玉芝圓】治風痰實頭目昏眩欬嗽煩滿咽膈不利嘔吐惡心神思昏憒心悸面熱痰唾稠粘

白茯苓去皮　人參去蘆　天南星用米泔浸一大時煨乾

乾薄荷葉　白礬枯過各三十兩　半夏湯洗七次爲末生薑汁和作麵六十兩

右爲細末用生薑汁煮麵糊爲圓如梧桐子大每服二十圓生薑湯下食後服如欲瀉線熱薄荷湯下

【桔梗湯】除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔噦心下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

陳皮去穰　半夏生薑汁製　桔梗細剉微炒各十兩　枳實去穰麩炒赤黃五兩

右爲末每服二錢水一中盞生薑五片同煎七分去滓溫服不計時候

【胡椒理中圓】治肺胃虛寒氣不宣通欬嗽喘急逆氣虛痞胸膈噎悶腹脇滿痛追寒短氣不能飲食嘔吐痰水不止

款冬花去枝梗　蓽撥　陳皮去白　乾薑炮

高良薑剉炒　甘草炙　細辛去苗　胡椒各四兩

白朮五兩

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫湯下溫酒米飲亦得不拘時日二服

【備急五嗽圓】治五種欬嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽三曰鹹嗽四曰冷嗽五曰邪嗽皆由肺受風寒氣不宣通所致無問久新輕重以至飲食不下語聲不出坐臥不安晝夜不止面目浮腫胸脇引痛並宜服之

皂莢去皮炙黃去子　肉桂去麤皮　乾薑炮各半斤

半夏湯洗七次生薑汁同搗和作麵三兩

右爲末和勻生薑汁煮糊糊圓如梧桐子大用硃砂爲衣每服十圓生薑湯下食後服亦治小兒風痰壅嗽一歲兒一圓捏碎生薑薄荷湯下

【金珠化痰圓】治痰熱安神志除頭痛眩暈心悸恍惚胸膈煩悶涕唾稠粘痰實欬嗽咽喉不利

辰砂研飛二兩　生犀屑細研半兩　皂莢子炒黃色　白礬光明者於石器內熔汁靈效令　鉛白霜細研　天竺黃研各一兩　金箔爲衣二十片

半夏湯洗七次用生薑二兩去皮同搗細作餅炙微黃色四兩

右以半夏皂莢仁爲末與諸藥研勻生薑汁煮糊糊圓如梧桐子大每服十圓至十五圓生薑湯食後臨臥服

【玉液圓】治風痰化痰涎利咽膈清頭目除欬嗽止煩熱

半夏湯洗七次爲末　白礬枯過各十兩　寒水石燒通赤出火毒水飛過三十兩

右合研以白麵糊爲圓如梧桐子大每服十圓溫生薑湯下食後臨臥服

【玉芝圓】治風痰實頭目昏眩欬嗽煩滿咽膈不利嘔吐惡心神思昏憒心悸面熱痰唾稠粘

白茯苓去皮　人參去蘆　天南星用米泔浸一大時煨乾

乾薄荷葉　白礬枯過各三十兩　半夏湯洗七次爲末生薑汁和作麵六十兩

右爲細末用生薑汁煮麵糊爲圓如梧桐子大每服二十圓生薑湯下食後服如欲瀉線熱薄荷湯下

【桔梗湯】除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔噦心下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

陳皮去穰　半夏生薑汁製　桔梗細剉微炒各十兩　枳實去穰麩炒赤黃五兩

右爲末每服二錢水一中盞生薑五片同煎七分去滓溫服不計時候

【胡椒理中圓】治肺胃虛寒氣不宣通欬嗽喘急逆氣虛痞胸膈噎悶腹脇滿痛追寒短氣不能飲食嘔吐痰水不止

款冬花去枝梗　蓽撥　陳皮去白　乾薑炮

高良薑剉炒　甘草炙　細辛去苗　胡椒各四兩

白朮五兩

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫湯下溫酒米飲亦得不拘時日二服

【備急五嗽圓】治五種欬嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽三曰鹹嗽四曰冷嗽五曰邪嗽皆由肺受風寒氣不宣通所致無問久新輕重以至飲食不下語聲不出坐臥不安晝夜不止面目浮腫胸脇引痛並宜服之

皂莢去皮炙黃去子　肉桂去麤皮　乾薑炮各半斤

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓溫酒下米飲亦得食前服

【百部圓】治肺氣不調咳嗽喘急胸膈煩悶唇乾口燥面目浮腫咽嗌不利積久不瘥咯唾膿血者亦宜服之

天門冬去心一斤　肉桂去麤皮四兩　瓜蔞根十六兩　五味子

馬兜鈴　紫菀去苗洗　紫蘇葉各二十二兩　黑參八兩　麥門冬

黃耆　杏仁湯浸去皮尖炒令黃色各六兩　百部根　丹參各半兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓煎烏梅甘草湯下食後服

【款冬花散】治寒熱相交肺氣不利欬嗽喘滿胸膈煩悶痰實涎壅喉中呀呀鼻塞清涕頭痛眩冒肢體倦疼咽喉腫痛

款冬花去枝梗　桑葉洗焙　知母去蘆各二十兩　貝母去心麩炒

杏仁去皮尖麩炒　半夏湯洗七次薑製　阿膠剉炒　甘草炙各二斤半

麻黃去節五斤

右爲麤末每服二錢水一盞薑三片煎七分食後溫服

【鍾乳補肺湯】治肺氣不足欬嗽上氣胸滿上迫喉咽閉塞短氣喘乏連唾不已寒從背起口中如含霜雪語無音聲甚者唾血腸炅乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛悴面色白

款冬花去枝梗　紫菀洗去土　人參去蘆　五味子練

白石英碎如米粒　肉桂去麤皮各二兩　麥門冬去心　桑白皮炙

鍾乳碎如米粒各三兩

右除白石英鍾乳外同爲麤末與白石英等同拌勻每服四錢水二盞生薑五片大棗一枚棘米三十粒煎至一盞用絹濾去滓食後溫服

【華蓋散】治肺感寒邪欬嗽上氣胸膈煩滿項背拘急聲重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呀有聲

麻黃去根節　紫蘇子隔紙炒　桑白皮炙　杏仁去皮尖炒

赤茯苓去皮、　陳皮去白各一兩、　甘草炙半兩、

右爲末、每服二錢、水一盞、煎至七分、去滓、食後溫服、

【丁香半夏圓】治脾胃宿冷、胸膈停痰、嘔吐惡心、吞酸噫氣、心腹痞滿、脇肋脹痛、短氣噎悶、不思飲食、

陳皮去白、　丁香　肉豆蔻仁　木香

人參各一分、　藿香葉半兩、　半夏湯洗七次、以生薑汁炒黃色三兩、

右爲細末、以生薑汁煮麵糊爲圓、如小豆大、每服二十圓、生薑湯下、不計時候、

【藿香散】溫脾胃、化痰飲、消宿冷、止嘔吐、治胸膈痞滿、脅肋脹痛、短氣噎悶、款嘔痰水、噫氣吞酸、嗽逆惡心、

半夏切作四片、薑汁浸一宿、以糯米炒黃、　厚朴去麤皮、薑汁製、　藿香葉

甘草炙各一兩、　陳皮去白半兩、

右爲麤散、每服二錢、水一盞、生薑三片、棗一枚、去核同煎七分、去滓、稍熱服、不計時日三服、及治山嵐瘴氣、

絡興續添方

【二陳湯】治痰飲爲患、或嘔吐惡心、或頭眩心悸、或中脘不快、或發爲寒熱、或因食生冷、脾胃不和、

半夏湯洗七次、　橘紅各五兩、　白茯苓三兩、　甘草一兩半炙、

右爲㕮咀、每服四錢、用水一盞、生薑七片、烏梅一箇、同煎六分、去滓、點服、不拘時候、

【溫肺湯】治肺虛久咳寒引、發則喘款、不能坐臥、嘔吐痰沫、可思飲食、

白芍藥六兩、　五味子去梗、炒、　乾薑炮、　肉桂去麤皮、

半夏湯熱焙、　陳皮去白、　杏仁去皮尖、　甘草炒各三兩、

細辛去苗、洗二兩、

右件剉麤散、每服三大錢、水一盞半、煎至八分、以絹濾汁、食後服、一方去白芍藥細辛二味、可加減用、

寶慶新增方

【麻黃散】治丈夫婦人久近肺氣、咳嗽喘急、上衝坐臥不安、痰涎壅塞、款唾稠粘、脚手冷痹、心脇疼脹、兼治傷風、咳喘、脇上不快、

麻黃十兩、去根節、　款冬花去苗枝梗、　訶子皮去核、　甘草炙各五兩、

□桂六兩、去皮、不見火、杏仁三兩、去皮尖、麸炒、

右爲細末、每服二錢、水一盞、入好茶一錢、同煎八分、食後夜臥遲口服、如半夜不能服、但以藥末入茶和勻、沸湯點、或含嚥亦得、忌魚酒炙煿搗肉麤鹹物、

【人參養肺圓】治肺胃供傷、氣奔於上、客熱熏肺、款嗽氣急、胸中煩悸、涕唾稠粘、或有鮮血、上氣喘急、不得安臥、肢體倦痛、咽乾口燥、飲食減少、漸至羸弱喘乏、或墜墮恐懼度水跌臥、或因叫怒醉飽房勞致傷肺胃、吐血嘔血、並治之、

人參去蘆、　黃耆去蘆密炙各一兩八錢、　白茯苓

瓜蔞根各六兩、　杏仁二兩四錢、去皮尖、麸炒、　半夏麸四兩炒

皂角子三百箇、炒、

右爲細末、煉蜜圓如彈子大、每服一圓、食後細嚼、用紫蘇湯送下、如喘急用桑白皮湯送下、

【人參訶子圓】治大人小兒上膈熱、或傷風、或冷、搏於肺經、語聲不出、痰涎不利、款嗽喘急、日夜不止、略睡稠粘、

訶子　龍腦薄荷葉、　藿香去梗、洗淨、　縮砂仁各一兩、

百藥煎　葛粉各八兩、　甘草五兩、　烏梅肉三兩、

右爲末、麵糊爲圓、每服一二圓、含化嚥津、食後臨臥、

【溫中化痰圓】治停痰留飲、胸膈滿悶、頭眩目暈、好臥減食、咳嗽嘔吐、氣短惡心、或飲酒過多、或引飲無度、或過傷生冷、痰涎併多、嘔噦惡心、並宜服之、又方見後、

良薑去蘆炒、　陳皮去白、　青皮去白、　乾薑炮各五兩、

右爲細末、醋打麵糊圓如梧桐子大、每服三五十粒、湯飲任下、不拘時、

淳祐新添方

【新法半夏湯】治脾胃氣弱、痰飲不散、嘔逆酸水、腹脇脹痞、頭旋惡心、不思飲食、

縮砂仁　草蔻仁　橘紅洗去白、　神麯炒各一兩

白豆蔻仁　丁香各半兩、　甘草生炙二兩、

大半夏四兩、湯浸洗七次、每箇切作兩片、用白礬末一兩、沸湯浸一宿夜、漉出、別用湯洗去礬、焙乾、一片切作兩片、再用生薑自然汁、於銀盞中浸一晝夜、却於湯中頓、令薑汁乾盡、以慢火焙爲細末、再用生薑自然汁浸成餅子、曝乾、或焙爛炙黃、勿令色焦、

右爲細末、每服一錢、先用生薑自然汁調成膏、入炒鹽少許、沸湯點服、

【丁香五香圓】治胃氣虛弱、三焦痞澀、不能宣行水穀、故爲痰飲、結聚胸膈之間、令人頭目昏眩、胸膈脹滿、款嗽氣急、嘔吐腹疼、伏於中脘、亦令臂疼不舉、腰腿沉重、久而不散、流入於脾、脾惡濕、得水則脹、脹則不能消化水穀、又令腹中虛滿而不食也、此藥主之、

天南星每箇切作數片、同半夏先用水浸三日、每日易水、次用白礬二兩、研、細水再浸三日、洗焙、　良薑

半夏切破各二兩、　乾薑炮、　白朮

茯苓各一兩、　青皮　陳皮　丁香

木香各半兩、

右爲細末，用神麯一兩，大麥蘗二兩，同碾取末，打糊和蒸爲圓，如梧桐子大，每服五十圓至七十圓，溫熱水下，不拘時候，常服溫脾胃，去宿冷，消留滯，化飲食，辟膈間風冷，山嵐毒氣，不正非時之氣，但是酒癖停飲，痰水不消，累服湯藥不能作効者，服之如神。

【縮砂圓】溫中散滯，消飲進食，治胸膈噎悶，心腹冷疼，大能煖化生冷果食，夏月不可闕此。

縮砂仁一兩　高良薑

右爲細末，生薑自然汁，煮麵糊爲圓，如梧桐子大，每服五十圓至七十圓，生薑湯下，不拘時候。

【涑白圓】治膈脘痰涎不利，頭目昏暈，吐逆涎沫。

生硫黃別研　天南星生　半夏生，各一兩　盆硝

元精石各半兩　附子一枚，六錢重者，生，去皮臍。

右爲細末，入糊麵三兩令停，水糊爲圓，如梧桐子大，每服三十圓，沸湯內煮令浮，漉出，生薑湯下，食後服。

【破飲圓】治一切停飲不散，時嘔痰沫，頭眩欲倒，膈脘不快。

旋覆花八兩　白朮一斤一兩　肉桂去麤皮

枳實麩炒，二兩　赤茯苓去黑皮，七兩

右爲末，麵糊圓，如梧桐子大，每服五十圓，熱水下。

吳直閣增諸家名方

【溫中化痰圓】治證與前溫中化痰圓同。

半夏煮　乾薑炮，各一兩　白朮煨，二兩　細辛去葉，洗

胡椒各半兩。

右爲細末，生薑汁打麵糊爲圓，如梧桐子大，每服三十圓至五十圓，湯飲任下，不拘時候。

【養中湯】治脾胃受寒，欬嗽多痰，胸滿短氣，語聲不出，晝夜不止，飲食減少，不以遠年日近，並皆治之。

罌粟殼去蒂萼，蜜蒸炙，二兩半　半夏麴八錢，炙　肉桂去麤皮

甘草炙，各半兩。

右爲細末，每服一大錢，水一盞，生薑四片，同煎至七分，通口服，不拘時候。

【人參欵花散】治肺胃虛寒，久嗽不已，咽膈滿悶，欬嗽痰涎，嘔逆惡心，腹脇脹滿，腰背倦痛，或虛勞冷嗽，及遠年日近一切嗽病，服諸藥不效者，並皆治之。

欵冬花去梗，　五味子去梗，炒，　紫菀去蘆，洗，　桑白皮去赤皮，

人參各一兩。

右爲細末，煉蜜爲圓，如鷄頭大，每服一圓，食後細嚼，溫薑湯送下，或每一大圓，分作四小圓，含化亦得。

【橘皮半夏湯】治肺胃虛弱，好食酸冷，寒痰停積，嘔逆惡心，涎唾稠粘，或積吐，粥藥不下，手足逆冷，目眩身重，又治傷寒時氣，欲吐不吐，欲嘔不嘔，昏憒悶亂，或飲酒過多，中寒停飲，喉中涎聲，乾嘘不止。

陳皮去白，　半夏煮，各七兩。

右爲麤散，每服三錢，生薑十片，水二盞，煎至一中盞，去滓，溫服，不計時候。

續添諸局經驗祕方

【人參潤肺圓】治肺氣不足，咳嗽喘急，痰涎不利，胸膈煩悶，涕唾稠粘，脣乾口燥，及療風壅痰實，頭目昏眩，精神不爽，或肺胃俱虛，久嗽不已，漸成虛勞，肢體羸瘦，胸滿短氣，行動喘乏，飲食減少，或遠年日近諸般欵嗽，並皆治之。

人參　欵冬花去枝梗，　細辛去葉，洗，　杏仁去皮尖，麩炒，

甘草炙，各四兩。　肉桂去麤皮，　桔梗各五兩，　知母六兩。

右爲細末，煉蜜爲圓，如鷄頭大，每服一圓，食後細嚼，溫薑湯送下，含化亦得。

【定喘瑞應丹】專治男子婦人，久患欵嗽，肺氣喘促，倚息不得睡臥，累年不瘥，漸致面目虛浮，一蟬蛻洗去土足，翅，炒，　杏仁去皮尖，炒，　馬兜鈴各二兩，　蝦蟆六錢。

右爲細末，蒸棗肉爲圓，如棗子大，每服六七圓，臨臥用薑茶清放冷下，服後忌熱物半日。

【人參清肺湯】治肺胃虛寒，欵嗽喘急，胸膈噎悶，腹肋脹滿，迫塞短氣，喜欲飲冷，咽喉隱痛，及療肺痿勞嗽，唾血腥臭，乾嘔煩熱，聲音不出，肌肉消瘦，倦怠減食。

人參　地骨皮　阿膠麩炒，　杏仁去皮尖，麩炒，

知母　桑白皮　甘草　罌粟殼

右等分，㕮咀爲麤散，每服三錢，水盞半，烏梅肆各一枚，同煎至一盞，濾去滓，食後臨臥溫服，兩滓併煎作一服。

【新法半夏湯】治脾胃不和，中脘氣滯，宿寒留飲，停積不消，心腹刺痛，臟腑膨脹，嘔吐痰水，噫氣吞酸，或中酒吐酒，噦逆惡心，頭疼煩渴，倦怠嗜臥，不思飲食，並宜服之。

青皮去白，　乾薑炮，各六兩，　陳皮去白，　桔梗炒，各一斤，

丁皮四兩，　甘草炒，十二兩，　半夏湯洗，薑汁製，二兩半，

右爲細末，每服一錢，入鹽一撮，沸湯點服，不拘時候，常服溫和三焦，開胃健脾，消宿酒，進飲食。

【人參定喘湯】治丈夫婦人，遠年日近肺氣咳嗽，上喘氣急，喉中涎聲，胸滿氣逆，坐臥不安，飲食不下，及治肺感寒邪，欵嗽聲重，語音不出，鼻塞頭昏，並皆治之。

人參去蘆，切片，　半夏麴　麻黃去節，　甘草炙，

阿膠炒，各一兩，　桑白皮　五味子各一兩半，　罌粟殼蜜炙，二兩。

右爲麤末，入人參片拌勻，每服三大錢，水一盞半，生薑三片，同煎七分，去滓，食後溫服，又治小兒久病肺氣喘急，喉中痰聲，胸膈不利，嘔吐痰涎，並量歲數加減服。

【細辛五味子湯】治肺經不足，胃氣怯弱，或冒風邪，或停寒有飲，欬嗽倚息，不得安臥，胸滿迫塞，短氣減食，乾嘔作熱，嗽唾結痰，或吐涎沫，頭目昏眩，身體疼重，語聲不出，鼻塞清涕，頭目脚膝時冷，虛浮，痰欬不止，痛引胸脇，不問新久，並宜服之。

北細辛去苗，　半夏湯浸洗，各一兩，　烏梅去核，　甘草炙，各一兩半，
罌粟殼去蒂萼，炒，　五味子各三兩，　桑白皮炒，二兩，

右爲麤散，每服三錢，水二盞半，生薑十片，煎至一盞，去滓，溫服，兩滓併煎。

【茯苓半夏湯】治停痰留飲，胸膈滿悶，咳嗽嘔吐，氣短惡心，以致飲食不下，並宜服之。

茯苓去皮，三兩，　半夏湯洗七次，五兩，

右爲麤末，每服四大錢，水一大盞，生薑七片，煎至七分，去滓，空心服。

【人參藿香湯】治男子婦人脾胃氣弱，嘔吐噦逆，飲食不下，手足逆冷，涎痰稠粘，又治似喘不喘，欲嘔不嘔，徹心憒憒，悶亂不安，或痰蠱諸疾，水漿粥藥入口便吐，服此立效，久病翻胃，服之百日安，此藥溫脾胃，化痰飲，消宿冷，止吐嘔。

人參二兩，切片，　藿香去梗，各六兩，　半夏湯洗七次，薑汁製，二兩半，

右爲麤末，入人參令勻，每服三錢，水一盞半，生薑十片，煎至一盞，去滓，通口服，孕婦忌。

【半夏圓】治肺氣不調，咳嗽喘滿，痰涎壅塞，心下堅滿，短氣煩悶，及風壅痰實，頭目昏眩，咽膈不利，嘔吐惡心，神思昏憒，心忪面熱，涕唾稠粘，並皆治之。

白礬枯過，十五兩，　半夏三斤，湯洗去滑，薑汁浸一宿，

右爲細末，生薑自然汁爲圓，如梧桐子大，每服二十圓，加至三十圓，食後臨臥時，生薑湯下。

【杏參散】除痰下氣，治胸脇脹滿，上氣喘急，倚息不得睡臥，神思昏憒。

桃仁　杏仁各去皮尖，麸炒，　桑白皮蜜炙微赤，用米泔浸一宿，焙乾，
人參去蘆，

右等分爲細末，每服二錢，水一盞半，生薑三片，棗一枚，煎七分，溫服，不拘時候。

【杏子湯】治一切咳嗽，不問外感風寒，內傷生冷，及虛勞咯血，痰飲停積，悉皆治療。

人參去蘆，　半夏湯洗七次，　茯苓去皮，　細辛去苗葉，
乾薑炮洗，　甘草炙，　官桂去皮，不見火，　芍藥去蘆，
五味子去苗，各等分，

右㕮咀，每服四錢，水盞半，杏仁去皮尖，麸五枚，薑五片，煎至六分，去滓，食前服，若感冒得之，加麻黃等分，如脾胃素實者，用棗肉殼去筋碎剉，以醋麸炒等分加之，每服添烏梅一箇煎服，其效尤驗，若

嘔逆惡心者，不可用此。○一法去杏仁人參，倍加麻黃，治芍藥如麻黃之數，乾薑五味子各增一半，名小青龍湯，大治久年咳嗽，痰涎壅盛，夜不得睡，仍專治卒暴氣喘急，此方雖用麻黃，既有官桂，不致於發汗，服之不妨。○一方加麻黃，甘草，五味子，杏仁，茯苓等分，橘紅倍之，尤爲切當。○一方用紫蘇葉，桑白皮，麻黃，青皮，五味子，杏仁，甘草等分，生薑七片，烏梅一箇，煎服，久年咳嗽，氣虛喘急，皆得其宜，二方中有麻黃，有汗人不宜服之。

【四七湯】治喜怒悲思憂恐驚之氣，結成痰涎，狀如破絮，或如梅核，在咽喉之間，咯不出，嚥不下，此七氣之所爲也，或中脘痞滿，氣不舒快，或痰涎壅盛，上氣喘急，或因痰飲中節，嘔逆惡心，並宜服之。

紫蘇葉二兩，　厚朴三兩，　茯苓四兩，　半夏五兩，

右㕮咀，每服四錢，水盞半，薑七片，棗一箇，煎至六分，去滓，熱服，不拘時候，若因暴虛過度，陰陽不分，清濁相干，小便白濁，用此藥下青州白圓子，最爲切當，婦人惡阻，尤宜服之，一名厚朴半夏湯，一名大七氣湯，局方有七氣湯，用半夏五兩，人參官桂甘草各一兩，生薑煎服，大治七氣，并心腹絞痛，結癖，太過，恐米必能止疼順氣。○一方治七情所傷，中脘不快，氣不升降，腹脇脹滿，用香附子炒半斤，橘紅六兩，甘草一兩，煎服尤妙，好事者謂其耗氣，則不然，蓋有是病服是藥也。

增廣太平惠民和劑局方卷五

補虛損　附骨蒸

【鹿腎膠圓】補虛壯氣，煖腎祛邪，益精髓，和脾胃，進飲食，悅顏色，治五勞七傷，真氣虛憊，臍腹冷痛，股體酸疼，腰背拘急，脚膝緩弱，面色黧黑，肌肉消瘦，目暗耳鳴，口苦舌乾，腹中虛鳴，脇下刺痛，飲食無味，心常慘戚，夜多異夢，漏少精神，小便滑數，時有餘瀝，房室不舉，或夢交通，及一切風虛痼冷，並宜服之。

鹿腎膠一對，慢火酒炙，令熟，　沉香　神麯炒，各四兩，
精羊肉一斤，熟細切碎，爛研，　羊髓取汁，一斤，　硇砂二兩，飛過，
無灰酒一斗，同上六味於銀器內慢火熬成膏，放冷，入下藥，　巴戟去心，
肉豆蔻去殼，煨，　木香煨，　丁香　人參去蘆頭，
補骨脂酒炒，　天麻去苗，　川芎　枳殼去穰，麸炒，
胡蘆巴　鍾乳煉成粉，　青皮去白，　茴香茴上者，炒，
紫蘇子炒，　陽起石用醋水煮一日，細研，飛過，煅乾，　蓽澄茄各二兩，
山藥一兩半，　肉蓯蓉四兩，淨洗切片子，焙乾，　蒺藜子炒，
肉桂去麤皮，　大腹子　檳榔各二兩半，　白豆蔻去殼，一兩，

大附子牛斤炮去皮臍用肯肉牛斤漿水一斗五升煮水令盡切焙乾

右爲細末入前膏內溲成劑於臼內搗千餘杵爲圓如梧桐子大每服二十圓空心溫酒下鹽湯亦得

【兔絲子圓】治腎氣虛損五勞七傷少腹拘急四肢酸疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝疼緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服塡骨髓續絕傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕身延年聰明耳目

兔絲子洗酒浸　鹿茸酥炙去毛剉　肉桂去粗皮　附子炮去皮臍
石龍芮去土　澤瀉各一兩　巴戟去心　防風去苗叉
肉蓯蓉酒浸切焙　杜仲去麤皮剉炒　茴香炒　沉香
白茯苓去皮　牛膝酒浸一宿　石斛去根　續斷
山茱萸去核　補骨脂炒　熟乾地黃酒蒸　萆薢各三分
桑螵蛸酒浸炒　五味子　覆盆子去根蔕　芎藭各半兩

右爲末以酒煮麵糊圓如梧桐子大每服二十圓溫酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下晚食前再服

【金鈴石斛圓】治腎氣不足元臟虛弱頭昏面腫目暗耳鳴四肢疲倦百節酸疼脚下隱痛步履艱難肌體羸瘦面色黃黑髮髮脫落頭皮腫痒精神昏困手足多冷心胸痞悶遺膏刺痛膝脛酸疼不能久立腰背拘急不得俛仰兩脇脹滿水穀不消腹痛氣刺發歇作時心懸噫酸嘔逆惡心口苦咽乾喫食無味恍惚多忘氣促喘乏夜夢驚恐心忪盜汗小便滑數或水道澀痛一切元臟虛冷之疾並皆治之常服補五臟和血脈駐顏色潤髮進食肥肌大壯筋骨

川烏頭炮去皮臍　金鈴子去核炒　石斛去根　茴香炒
赤小豆　馬蘭子酒炒　羌活去蘆各八兩　地龍去土炒
巴戟天去心　胡盧巴炒　川椒去目炒各四兩　荇朮去浮皮
烏藥各十六兩　青鹽二兩

右爲細末酒煮麵糊爲圓如梧桐子大每服二十圓溫酒下鹽湯亦得空心食前

【何首烏圓】補髮腑臟祛逐風冷利腰膝強筋骨黑髭髮駐顏容此藥性溫無毒久服輕身延年不老

牛膝一斤去苗剉　何首烏三斤用銅刀或竹刀切如棗子大木杵臼中搗

右以黑豆一斗淨洗曝乾用甑先以豆蒸鋪甑底然後薄鋪何首烏又鋪豆又薄鋪牛膝如此重重鋪令藥豆俱盡安於釜上蒸之令豆熟爲度去黑豆取烏藥曝乾又換豆蒸之如此三遍去豆取藥候乾爲末蒸棗肉和圓如梧桐子大每服三十圓溫酒下食前服忌鹽蔥蒜

【石南圓】治風毒脚弱少力脚重疼痹脚腫生瘡脚下隱痛不能踏地脚膝筋攣不能屈伸項背腰脊拘急不快風毒上攻頭面浮腫或生細瘡出黃赤汁或手臂少力或口舌生瘡牙齒宣爛齒搖髮落耳中蟬聲頭眩氣促心腹脹悶小便時澀大便或難

石南葉　當歸去蘆　蕤核仁
赤芍藥　麻黃去根節　陳橘皮　川芎
赤小豆　大腹皮連皮用　杏仁去皮尖及雙仁麩炒黃赤色各二兩　牽牛炒
五加皮　牛膝去苗各三兩　木瓜　獨活去蘆
杜仲剉炒　萆薢各四兩

右爲細末以酒浸蒸餅爲圓如梧桐子大每十圓至十五二十圓木瓜湯下早起日中臨臥各一服常服補益元氣筋骨壯健耳目聰明婦人血氣亦可服不拘時候

【八味圓】治腎氣虛乏下元冷憊臍腹疼痛夜多旋溺脚膝緩弱肢體倦怠面色黧黑可思飲食又治脚氣上衝少腹不仁及虛勞不足渴欲飲水腰重疼痛少腹拘急小便不利或男子消渴小便反多婦人轉胞小便不通並宜服之

白茯苓去皮　牡丹皮　澤瀉各三兩　熟地黃八兩酒蒸
山茱萸去核　山藥各四兩　附子炮去皮臍　肉桂去麤皮各二兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服十五丸至二十五圓溫酒空心食前日二服久服壯元陽益精髓活血駐顏強志輕身

【黃耆圓】治丈夫腎臟風虛上攻頭面虛浮耳內蟬聲頭目昏眩項背拘急下注腰脚脚膝生瘡行步艱難脚下隱疼不能踏地筋脈拘攣不得伸屈四肢少力百節酸疼腰腿冷痛小便滑數及癱緩風痹遍身頭痛又療婦人血風肢體痒痛脚膝緩弱起坐艱難並宜服之

川烏頭炮去皮臍　川楝子　地龍去土炒　茴香炒
杜蘇蘇炒去剉　赤小豆　防風去蘆頭　黃耆剉各一兩
烏藥剉二兩

右爲細末酒煮麵糊爲圓如梧桐子大每服十五圓溫酒下鹽湯亦得婦人醋湯下並空心服

【茴香圓】治丈夫元臟久虛冷氣攻衝臍腹絞痛腰背拘急面色萎黃飲食減少及膀胱小腹氣痛并腎臟風毒頭面虛浮目暗耳鳴脚膝少力腫痛生瘡婦人血臟虛冷食減力少肢體疼痛久服補虛損除風冷壯筋骨明耳目

蔵靈仙洗去土　防風去苗　川烏頭炮去皮臍　陳皮去白
川楝子　萆薢各三兩　烏藥銼剉去土五兩　川椒去目及閉口者微炒出汗二兩
赤小豆　茴香炒各八兩

地龍炒去土一兩

右為細末酒煮麵糊為圓如梧桐子大每服空心及晚食前溫酒下二十圓鹽湯亦得小腸氣痛炒生薑茴香酒下脚轉筋木瓜湯下婦人血臟虛冷溫醋湯下膝腹絞痛溫冷麝香湯下

【五補圓】補諸虛安五臟堅骨髓養精神

熟乾地黃　人參去蘆　牛膝去苗酒浸一宿焙乾

白茯苓去皮　地骨皮去土各等分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓溫酒下空心服加至五十圓日三服服至半月覺氣壓即服七宣細二三日覺氣散即還服五補圓久服去百病髮髭黑潤

【無比山藥圓】治丈夫諸虛百損五勞七傷頭痛目眩手足逆冷或煩熱有時或冷痹骨疼腰膕不隨飲食難多不生肌肉或少食而脹滿體無光澤陽氣衰絕陰氣不行此藥補經脈起陰陽安魂魄開三焦破積聚厚腸胃強筋骨輕身明目除風去冷

熟乾地黃酒浸　赤石脂煅　巴戟去心　茯神去皮木　山茱萸去核　牛膝剉酒炒　澤瀉各五兩　乾山藥二兩　五味子煉六兩　肉蓯蓉酒浸四兩　兔絲子酒浸研　杜仲去皮炒各三兩

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服二十至三十圓食前溫酒或溫米飲下服七日後令人身輕健體潤澤唇口赤手足煖面光悅身體安音聲響是其驗也十日後長肌肉此藥遇中入腦鼻必酸疼勿怪

【大山藥圓】治虛損五勞七傷肢體沉重骨節酸疼心中煩悸唇口乾燥面體少色情思不樂欬嗽喘乏傷血動氣夜多異夢盜汗失精腰背強痛脚膊弦急喜驚多忘飲食減少肌肉瘦瘁又治風虛頭目眩暈心神不寧及病後氣不復常漸成勞損久服愈風氣百疾

山藥七兩半　甘草炙七兩　芎藭　杏仁酒浸去皮麸炒　麥門冬去心　防風去蘆叉　白芍藥　白茯苓去皮　桔梗各一兩二錢半　白芷各一兩半　柴胡去蘆　熟乾地黃　當歸去蘆洗焙酒製　大豆黃卷炒　肉桂去皮各二兩半　阿膠炒　人參各一兩七錢半　白斂　乾薑各七錢半　大棗一百箇蒸熟去皮核

右為細末煉蜜與藥末同和圓如彈子大服一圓溫酒或米飲化下嚼服亦可食前

【定志圓】治心氣不定五臟不足恍惚振悸憂愁悲傷差錯謬忘夢寐驚魘恐怖不寧喜怒無時朝瘧暮劇暮瘧朝劇或發狂眩並宜服之常服益心強志令人不忘

白茯苓去皮　人參去蘆頭各三兩　遠志去苗及心　菖蒲各二兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大朱砂為衣每服七圓加至二十圓溫米飲下食後臨臥日三服

【黃耆建中湯】治男子女人諸虛不足小腹急痛脇肋疼脹腰膕下虛滿胸中煩悸面色萎黃唇口乾燥少力身重胸滿短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復常並宜服之

白芍藥六兩　肉桂去蘆皮　黃耆去蘆各三兩　甘草炙剉二兩

右為麤散每服三錢水一盞半生薑三片大棗一枚煎至一中盞去滓入餳少許再煎令餳消熱服空心食前

【人參黃耆散】治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胸脇不利減食多渴欬嗽稠粘時有膿血

赤芍藥　紫菀　知母　黃耆

桑白皮炒　甘草炙各十五兩　人參去蘆　桔梗各十兩

地骨皮去土　秦艽去土　茯苓去皮　生乾地黃

柴胡去苗各二十兩　半夏湯浸七次去滑用生薑汁製十五兩　鱉甲去裙醋炙一兩

天門冬去心三十兩

右為細末每服二大錢水一盞煎七分去滓溫服食後

【成煉鍾乳粉】主五勞七傷欬逆上氣治寒嗽通脣聲明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛療脚弱冷痹下焦傷竭強陰久服延年益壽令人有子

鍾乳不拘多少

右取鄧州鍾乳無問厚薄但顏色明淨光澤者即堪入煉惟黃赤兩色不任用欲煉亦不拘多少置鍾乳於金銀器中即以大鍋中著水沉金銀器於鍋中煮之常令如魚眼沸水減即添若煮乳三日三夜即得若蠟厚管者即七日七夜候乳色變黃白即熟如疑生更煮滿十日最佳煮訖出金銀器其鍋內煮乳黃濁水弃之勿令人服損人咽喉傷人肝脾令人頭痛兼復下利不止其有犯者食糯肉即愈弃此黃水訖更著清水華煎更煮經半日許即出之其水色清不變即止乳無毒矣即於磁鉢中用玉鎚搗水研之其鉢及鎚須夾白鐵製鉢口稍長作之使鎚得轉鉢通上下每日搗水研令勻勿使著鎚鉢即封紮鍊發白作記勿使人開一即免鐵塵入二即免研人痛髮研變乾澀即是水盡即更添水常令如稀米漿狀乳細者浮在上粗者沉在下復搗鎚鉢四邊研之不及者即粗細不勻為此每日須一開或二開攪拌令勻勿使著鎚即得勻熟免有蠶蟲研至四五日狀若乳汁研搗視之狀如蜜中白魚膠即成白然光白便以水洗之不隨水落者即熟若得水而落者即未成更須研之以不落為候熟訖澄取曝乾每服秤半兩分為三服用溫酒調下空腹服更益病輕重加減兼可合和用鍾乳圓散

【玉霜圓】治真氣虛憊下焦傷竭脚膊弦急腰脚疼痛精神困倦面色枯槁或亡血盜汗遺泄失精大便目利小便滑數肌肉消瘦陽事不舉久服續骨聯筋秘精堅髓却老還童安魂定魄換肌秘氣輕身壯陽

益壽住世

白龍骨一片，粘舌者，細擣羅後，研如粉，以水飛過三度了，日中曝乾，用黑豆一斗，內蒸一伏時，以爽絹袋盛曝乾。　紫梢花如無，以木賊代之，各三兩。　牡礪火煅成粉。　澤瀉洗，酒浸一宿，爽。　紫巴戟穿心者。　肉蓯蓉去鱗皮，洗，酒浸一宿，爽，乾，各二兩。　牛膝酒浸，爽，乾，杵。　磁石醋淬七度。　兔絲子酒浸一伏時，蒸熟，杵羅為末，去浮者。　石斛去根，炙。　朱砂研飛。　茴香炒上者，微炒。　肉桂去皮，各一兩。　韭子微炒，五兩。　鹿茸半兩，用連頂骨者，去毛，淨，約三寸，截斷，酒浸一伏時，慢火炙脆。　天雄十兩，長大者，酒浸七日了，掘一地坑，以半秤炭火燒坑通亦，速去火，令淨，以醋二升，沃於地坑內，候乾來熱便投天雄在內，以盆合土擁之，經宿後取出，去皮臍。

右為細末，煉酒蜜各半，和圓如梧桐子大，每服三十圓，空心晚食前溫酒下，常服，補眞氣，壯筋骨。

【預知子圓】治心氣不足，志意不定，神情恍惚，語言錯妄，怯悸煩鬱，愁憂慘戚，喜驚多恐，健忘少睡，夜多異夢，寤即驚魘，或發狂眩，暴不知人，並宜服之。

預知子去皮。　人參去蘆。　山藥。　石菖蒲。　枸杞子揀淨。　遠志去心。　黃精蒸熟。　白茯苓去皮。　柏子仁。　朱砂研飛。　茯神去木。　地骨皮去土。

右各等分為細末，煉蜜圓如龍眼核大，以朱砂為衣，每服一圓，細嚼，人參湯下不拘時。

紹興續添方

【安腎圓】治腎經久積陰寒，膀胱虛冷，下元虛憊，耳重唇焦，腰腿腫疼，臍腹掖痛，兩脇刺脹，小腹堅痒，下部濕疼，夜夢遺精，恍惚多驚，皮膚乾燥，面無光澤，口淡無味，不思飲食，大便溏泄，小便滑數，精神不爽，事多健忘，補元陽，益腎氣。

川烏頭炮去皮臍。　肉桂去皮，各十六兩。　石斛去根，酒浸製。　桃仁麩炒。　白茯苓。　破故紙炒。　蓽澄。　白茯苓。　肉蓯蓉酒浸。　巴戟各四十八兩。　山藥。

右為細末，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓，溫酒或鹽湯下，空心食前，小腸氣，炒茴香鹽酒下。

【麝香鹿茸圓】益眞氣，補虛憊，治下焦傷竭，臍腹絞痛，兩脇脹滿，飲食減少，肢節煩疼，手足麻痹，腰腿沉重，行步艱難，目視茫茫，夜夢鬼交，遺泄失精，神情不爽，陽事不舉，小便滑數，氣虛腸鳴，大便自溏，虛煩盜汗，津液內燥。

熟乾地黃十斤。　五味子二斤。　附子一百四十箇，炮，去皮臍。　蓯蓉三斤，酒浸一宿。　乾山藥四斤。　鹿茸燎，去毛，酒浸，爽，七十兩。　牛膝一斤四兩，酒浸一宿。　杜仲三斤半，去麤皮，炒，去絲。

右為末，煉蜜為圓，如梧桐子大，每一斤圓子，用麝香末一錢為衣，每服二十粒，溫酒吞下，鹽湯亦得。

金丹服，○宋嘉定十年十二月申明改正。

【妙香散】治男子婦人心氣不足，志氣不定，驚怖悲憂，慘戚虛煩，少睡，喜怒不常，夜多盜汗，飲食無味，頭目昏眩。

茯苓去皮不焙。　茯神去皮木，各一兩。　人參。　桔梗炒。　甘草各半兩。　薯蕷蒸。　遠志去心，炒。　黃芪各一兩。　辰砂三錢，別研。　麝香一錢，別研。　木香二錢半，煨。

右為細末，每服二錢，溫酒調服，常服補氣血，安神鎮心。

寶慶新增方

【養氣丹】治諸虛百損，脾元耗憊，眞陽不固，三焦不和，上實下虛，中脘痰飲，上攻頭目昏眩，八風五痹，或卒暴中風，痰潮上膈，言語蹇澀，神昏氣亂，狀若癲痫，及奔豚臍氣上衝，胸腹連兩脇膨脹刺痛，不可忍者。陰陽上下氣不升降，飲食不進，面無精光，肢體浮腫，五種水氣，脚氣上衝，腰背倦痛，夜夢鬼交，覺來盜汗，胃冷心疼，小便滑數，牽引小腹，足膝緩弱，步履艱難，婦人血海久冷，赤白帶下，歲久無子，及陰毒傷寒，面青舌卷，陰縮難言，四肢厥冷，不省人事者，急服百圓，用生薑大棗煎湯灌之，即便回陽，命無不活，或觸冒寒邪，霍亂吐瀉，手足逆冷，六脈沉伏，唇口青黑，腹脇攻刺，及男子陽事萎怯，脚膝酸疼，腹脹虛鳴，大便自滑，兼療腦冒煩悶，痰飲虛鳴，百藥不愈者，常服助養眞氣，生陽逐陰，溫平不僭，消磨冷滯，尅化飲食，使五臟安寧，六腑調暢，百病不侵，出入道塗，宜服此藥，隨行緩急服餌，大有功效。

禹餘粮石半斤。　代赭石各火煅七次，又醋淬七次，一斤。　磁石火煅十次，醋淬十次。　紫石英。　赤石脂各火煅一次，各半斤。

已上各研為細末，又以水研，挹其清者，置之紙上，用瓷器盛，欲使細末在紙上，候水盡適乾，各用藏研盛瓶，以麻水紙筋和泥固濟，陰乾，以好硬炭五十斤分為五處，每一處用炭十斤燒紅，下一處子煅此五藥，以紙灰蓋之，兩日後，火盡灰冷，開瓶煅如此三次，埋地坑內兩日，出火毒，再研細入下藥。

破故紙酒炒香熟。　茴香炒。　沉香不見火。　巴戟鹽湯浸，相去心。　肉豆蔻麵裹煨熟。　丁香。　木香不見火。　肉桂去麤皮。　白茯苓去皮。　山藥。　遠志去心。　蓯蓉淨洗，酒浸一宿，焙乾，一兩半。　附子炮，去皮臍。

已上各如法修製，同研為末，却入。

五靈脂。　沒藥各去炒石，研。　乳香別研細，各一兩。

已上三味入衆藥同研，却入。

鍾乳粉。　陽起石略煅。　朱砂或煅或飛，各一兩。

以上三味，別研臼時入。

右同爲細末，用糯米粉煮糊爲圓，每兩作五十圓，焙乾，入布袋內擦令光瑩，每服五圓至十圓，空心溫酒下，或薑鹽湯，或棗湯下，亦得婦人炙醋湯下。

【朴附圓】治脾元虛弱，飲食遲化，食必多傷，腹痛腸鳴，臟腑滑泄，晝夜無度，胃氣虛損，不美飲食，嘔噦惡心，此藥性溫，兼治臟冒惡心及久患脾泄冷瀉之人，最宜服此。

附子炮去皮臍　厚朴各一斤薑汁製　乾薑炮三斤　神麯炒八兩

右爲細末，酒煮糊圓，如梧桐子大，每服三十圓，空心食前米飲或鹽湯下亦得。

【川楝散】治膀胱小腸氣痛，臍下撮痛，上衝心腹，面色痿黃，脚下攣痛，四肢倦怠，不思飲食，夜多旋痛，外腎瘙痒。

川楝子煮，去皮核　破故紙炒　茴香炒各四兩　乾薑一兩炮

胡盧巴三兩酒炒　附子一兩半炮去皮臍

右爲細末，每服二錢，空心食前鹽酒調下。

【雙和湯】治男子婦人五勞六極七傷，心腎俱虛，精血氣少，遂成虛勞，百骸枯悴，四肢倦怠，寒熱往來，咳嗽喘乾，行動喘乏，面色萎黃，略有所觸，易成他疾，或傷於冷，則宿食不消，脾疼腹痛，瀉痢吐逆，或傷於熱，則頭旋目眩，痰涎氣促，五心煩熱，或因飢飽動作，喜怒驚恐，病隨而至，或虛脹而不思食，或多食而不生飢肉，心煩，則虛汗盜汗，一切虛勞不敢服燥藥者，並宜服之，當服調中養氣，益血育神，和胃進食，補虛損。

白芍藥七兩半　黃耆去蘆蜜炙　當歸洗去蘆酒製　熟地黃酒洗蒸

川芎去蘆各三兩　甘草炙　肉桂去皮不見火各二兩二錢半

右爲細末，每服二錢，水一盞半，生薑三片，棗一枚，煎至六分，空心食前服，忌生冷葱蒜等物。

【平補鎮心丹】治丈夫婦人心氣不足，志意不定，神情恍惚，夜多異夢，怯悸煩鬱，腎氣傷敗，血少氣多，四肢倦怠，足膝酸疼，睡臥不穩，夢寐遺精，時有白濁，漸至羸弱，久方見效。

山藥洗，乾，薑汁製炒　天門冬去心　熟地黃酒洗蒸　遠志去心甘草煮

龍齒各一兩半　麥門冬去心　五味子去梗皮　肉桂去皮不見火

茯神去木　白茯苓去皮　車前子去沙土研破各一兩二錢半

人參去蘆五錢　朱砂細研半兩爲衣　酸棗仁去皮隔紙微炒二錢半

右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓，空心飯飲下，溫酒亦得，如至五十圓，常服益精髓，養氣血，悅色駐顏。

【十四味建中湯】治榮衛不足，腑臟俱傷，積勞虛損，形體羸瘠，短氣嗜臥，寒熱頭痛，咳嗽喘促，吐唾痰沫，手足多冷，面白脫色，小腹拘急，百節疼痠，夜臥汗多，夢寐驚悸，小便滑利，大便頻數，失血虛極，心悸面黑，脾腎久虛，飲食全虧。

白芍藥剉　白朮洗　肉蓯蓉洗去浮鹽酒浸一宿焙乾

麥門冬去心　甘草炙　熟地黃洗去泥酒蒸一宿焙乾

白茯苓去皮　川芎洗　半夏湯洗七次　肉桂去皮

人參去蘆　黃耆炙　當歸洗去蘆酒浸焙　附子炮去皮臍

右等分，㕮咀爲麤散，每服三錢，水一盞半，生薑三片，棗一枚，煎至一盞，去滓，食前溫服。

【思仙續斷圓】治脾腎風虛，毒氣流注，腿膝酸疼，艱於步履，小便遺瀝，大便後重，此藥補五臟內傷，調中益精，涼血堅強筋骨，益智輕身延年。

防風去蘆炙　川烏頭炮去皮臍　牡仲各三兩去粗皮，薑汁製炒令黃

木瓜三兩去穰　慈菀仁炒　牛膝各四兩洗，去蘆焙酒浸一宿

續斷　萆薢各六兩

右爲末，酒糊圓，每服三十至五十圓，溫酒鹽湯空心下。

【黃耆六乙湯】治男子婦人諸虛不足，肢體勞倦，胸中煩悶，時復焦渴，唇口乾燥，面色萎黃，不能飲食，或先渴而欲發痟癉，或病癰疽而後渴者，宜服此，當服補血氣，安和五臟。

甘草一兩炙　黃耆六兩去蘆蜜塗炙

右㕮咀，每服二錢，水一盞，棗一枚，煎七分，溫服，不拘時。

【木瓜圓】治腎經虛弱，腰膝沉重，腿脚腫痒，痿痺生瘡，脚心痛痛，筋脈拘攣，或腰膝緩弱，步履艱難，舉動喘促，面色黧黑，大小便秘澀，飲食減少，無問新久，並宜服之。

狗脊去毛六兩　木瓜去穰　大艾各四兩去使，糯米制，調成餅，焙乾爲末

萆薢去蘆油浸炙　天麻去蘆　當歸酒浸製　牛膝去土酒浸一宿

萆薢各二兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大，每服二十圓，漸加至三十圓，空心食前溫酒下，鹽湯亦得。

【茱萸內消圓】治腎與膀胱經虛，爲邪氣所搏，結成塞痛，伏留不去，臍腹疼刺，小腸氣痛，奔豚攻衝，疼不可忍，陰核偏大，盾囊壅腫，結硬牽急，重大滋長，癢痒疼痛，時出黃水，痞塊腰腿沉重，足脛腫滿，行步艱難，累經治療，不見減痊，服之漸漸內消，不動大腸，亦不損穀，補虛消痛，溫養腎經，此藥不熱無毒，若志心服餌，其效如神。

吳茱萸湯洗七次　陳皮浸洗去白　山藥炒

山茱萸去核　青皮浸洗去白　茴香炒

肉桂去蘆皮各二兩　木香一兩不見火　川楝子煮去皮核

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大，每服三十圓至五十圓，空心溫酒或鹽湯吞下。

【青娥圓】治腎氣虛弱，風冷乘之，或血氣相搏，腰痛如折，起坐艱難，俛仰不利，轉側不能，或因勞役過多，

馬蘭花醋炙

傷於腎經，或處卑濕，地氣傷腰，或墜跌傷損，或風寒客搏，或氣滯不散，皆令腰間似有物重墜，起坐艱辛者，悉皆治之。又方見後。

胡桃二十箇，去殼皮　破故紙酒炒，八兩　蒜四兩，熟搗　杜仲薑汁炒，十六兩

右為細末，蒜膏為圓，每服三十圓，空心溫酒下。婦人淡醋湯下。常服壯筋骨，活血脈，烏髭鬚，益顏色。

淳祐新添方

【接氣丹】治真元虛憊，陰邪獨盛，陽氣暴絕，或大吐大瀉，久痢虛脫等病。餘同黑錫丹治狀。此藥尤佳。

內蓯蓉酒浸，　牛膝酒浸，　白朮焙，各半兩　桂心去粗皮，

肉豆蔻煨，　茴香炒，　附子炮，去皮臍，　木香

陽起石煅，　沉香　川楝子去核用肉，　胡蘆巴炒，

破故紙炒，各一兩，　丁香三錢，　黑錫去渣滓，　硫黃研，各二兩，

右件搗井砂子四兩，連搗為細末，和停，用糯米粉酒煮糊圓，如梧桐子大，溫酒嚥湯，空心下五十圓。

【寧志膏】治心臟虧虛，神志不守，恐怖驚惕，常多恍惚，易於健忘，睡臥不寧，夢涉危險，一切心疾，並皆治之。

酸棗仁微炒，去皮，　人參去蘆各一兩，　辰砂研細水飛，半兩，　乳香一分，細研，

右各研和停，煉蜜圓如彈子大，每服一粒，溫酒化下，煎湯亦得，空心臨臥服。

【三仙丹】治腎經虛寒，元氣損弱，神衰力怯，目暗耳聾，常服補益下經，溫養脾胃，壯氣搜風，駐顏注血，增筋力，烏髭鬚。

茴香三兩，炒令香透，　蒼朮二兩，米泔浸一宿，刮去皮，切碎，取淨白一斤，同炒黃色去麸，

川烏頭一兩，生，去皮，剉作豌子塊，用鹽半兩，同炒黃色去鹽，

右為細末，酒煮糊圓，如梧桐子大，每服至七十圓，空心溫酒鹽湯下。○又名長壽丹。

【樂令建中湯】治血氣勞傷，五臟六腑虛損，腸鳴神倦，榮衛不和，退虛熱，除百病。

白芍藥　前胡去蘆，　桂心　黃耆蜜炙，

白茯苓　人參去蘆，　細辛　當歸去土，

麥門冬去心，　陳皮去白，　甘草炙，各一兩，　半夏洗七次，七錢半，

右㕮咀，每服四錢，水一盞，薑四片，棗一箇，同煎至七分，去滓，空腹服，不拘時候。

【金鈴子圓】治腎氣發動，牽引疼痛，臍腹弦急，攻衝不足。

益智仁　巴戟去心，　胡蘆巴炒，　破故紙炒，

石菖蒲　茴香微炒，各二兩，　金鈴子去核，四兩，　白茯苓去皮，

陳橘皮去白，　木香各一兩，

右為末，酒煮糊圓，梧桐子大，每服五十圓，鹽湯或酒下。

吳直閣增諸家名方

【强走馬玉精圓】療男子元陽虛損，五臟氣衰，夜夢遺泄，小便白濁，臍下冷疼，陽事不興，久無子息，漸至羸弱，變成腎勞，眼昏耳鳴，腰膝酸疼，夜多盜汗，並宜服之，自然精元秘固，內施不泄，留濁去清，精神安健，如婦人宮藏冷，月水不調，赤白帶下，久無子息，面生黧黑，髮遲不生，肌肉乾黃，容無光澤，服之大效。

破故紙炒，　巴戟去心，各四兩，　茴香六兩，焙，　川楝子麸炒，

大川烏用蜂蜜半斤炒，去蜂不用，各八兩

右為細末，酒打麵糊為圓，如梧桐子大，每服三五十圓，溫酒下，鹽湯亦得，空心食前。

【降心丹】治心腎不足，體熱盜汗，健忘遺精，及服熱藥過多，上盛下虛，氣血不降，小便赤白，稠濁不清，常服鎮益心神，補虛養血，秘精氣，益丹田。

熟乾地黃洗，焙，　麥門冬去心，　天門冬去心，

白茯苓去皮，　茯神去皮木，　遠志甘草煮，去蘆骨，　當歸去蘆洗，各三兩，

肉桂去粗皮，不見火，　朱砂研飛，各半兩，　人參各二兩，

右為細末，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓，人參湯下。

【四神丹】治百病，補五臟，遠疫癘，却風癘，除尸疰蠱毒，辟鬼魅邪氣，大治男子婦人真元虛損，精髓耗傷，形羸氣弱，中滿下虛，致水火不交，陰陽失序，精神困倦，面色枯槁，亡血盜汗，遺瀝失精，大便自利，小便滑數，夢寐驚恐，陽事不舉，腰腿沉重，筋脈拘攣，及一切沉寒痼冷，痃癖疝瘕，臍腹絞痛，久瀉久痢，傷寒陰證，脈候沉微，身涼自汗，四肢厥冷，婦人百病，胎臟久冷，絕孕無子，赤白帶下，月候不調，服諸藥久不瘥，悉皆治之。此丹假陰陽造化之功，得天地中和之氣，即與尋常一煅一煉，僣燥丹藥功效不同。此丹活血實髓，安魄定魂，悅澤顏色，輕身保命，苟不恃藥力，縱其情慾，久久服之，可通仙道。

雄黃　雌黃　硫黃　朱砂並研，各五兩，

右入磁盒內，將瓦穰草為末，鹽泥固濟，慢火四圓，燒煅一日一夜，取出，再研細，以糯米漿研糊圓，如豆大，每服一粒，絕早新汲水下，經婦不可服，忌羊血蕎菜。

【十全大補湯】治男子婦人諸虛不足，五勞七傷，不進飲食，久病虛損，時發潮熱，氣攻骨脊，拘急疼痛，夜夢遺精，面色瘦黃，脚膝無力，一切病後氣不如舊，憂愁思慮，傷動氣血，喘嗽中滿，脾腎氣弱，五心煩悶，此藥性溫不熱，平和有效，養氣育神，醒脾止渴，順正辟邪，溫煖脾胃。

白茯苓焙，　白朮焙，　人參去蘆，

白芍藥　粉草炙，　黃耆去蘆

川當歸去蘆洗，　川芎各等分，

右為麤散，每服二大錢，本一盞，生薑三片，棗子二箇，同煎七分，不拘時溫服，此藥補虛損，大有神效。

【黃耆煞甲散】治虛勞客熱，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心煩熱，口燥咽乾，頰赤心忪，日晚潮熱，夜有盜汗，胸

熟乾地黃酒蒸，

肉桂去粗皮，不見火，

脇不利，減食多渴，咳唾稠粘，時有膿血。

桑白皮炙　　牛夏煮　　知母去蘆
赤芍藥洗　　甘草炙　　紫菀去蘆各二兩半　　秦艽去蘆
白茯苓焙　　生乾地黃洗焙　　地骨皮去土　　柴胡洗各三兩三錢
苦梗　　肉桂去麤皮不見火　　人參各一兩六錢半　　鱉甲醋浸去裙炙酥
天門冬各五兩去心焙

右為麤末，每服二錢，水一盞，煎至七分，去滓，食後溫服。

【秦艽鱉甲散】治男子婦人氣血勞傷，四肢倦怠，肌體瘦弱，骨節煩疼，頭昏頰赤，肢體枯槁，面色萎黃，唇焦口乾，五心煩熱，痰涎欬嗽，脊引痛，午起午臥，夢寐不寧，神情恍惚，時有盜汗，口苦無味，不美飲食，及治山嵐瘴氣，寒熱往來。

天仙藤　　前胡去蘆　　秦艽去蘆洗　　鱉甲醋浸去裙炙酥
陳皮去白　　貝母去心　　柴胡去蘆洗　　荊芥去穗
青皮去白　　甘草炙各一兩　　乾葛二兩焙　　肉桂去麤皮不見火
羌活　　白芷各半兩

右為細末，每服二錢，水一盞，生薑三片，同煎八分，稍熱服，不拘時，酒調亦得，若服發氣血，調榮衛，補勞傷。

【沉香鱉甲散】治男子婦人五勞七傷，氣血虛損，腰背拘急，手足沉重，百節酸疼，面色黃黑，肢體倦怠，行動喘乏，胸膈不快，欬嗽痰涎，夜多異夢，盜汗失精，嗜臥少力，肌肉瘦瘁，不思飲食，日漸羸弱，一切勞傷虛損，並皆治之。

白茯苓焙　　沉香不見火　　人參去蘆　　巴戟去心
川當歸去蘆洗　　牛膝去蘆酒洗　　秦艽去蘆洗　　大黃不見火
綿黃耆去蘆　　柴胡去蘆　　半夏薑汁浸二宿焙炒令黃色
荊芥去梗各半兩　　附子炮去皮臍　　鱉甲醋浸去裙炙酥
肉豆蔻四箇　　全蝎二錢半　　肉桂去麤皮各一兩
乾熟地黃去蘆　　羌活各七錢半

右為細末，每服二錢，水一盞，薑白二寸，生薑三片，棗子二枚，同煎七分，空心食前服。

【小兔絲子圓】治腎氣虛損，五勞七傷，小腹拘急，四肢酸疼，面色黧黑，唇口乾燥，目暗耳鳴，心悸氣短，夜夢鬼怪，精神困倦，喜怒無常，悲憂不樂，飲食無味，舉動喘乏，心腹脹滿，脚膝痿弱，小便滑數，房室不舉，股內濕痒，水道澀痛，小便出血，時有遺瀝，並宜服之。久服填骨髓，續絕傷，補五臟，去萬病，明視聽，益顏色，輕身延年，聰耳明目。

兔絲子五兩酒浸　　山藥內七錢半為末　　石蓮肉各二兩　　白茯苓焙一兩

右為細末，用山藥糊澱和為圓，如梧桐子大，每服五十圓，溫酒或鹽湯下，空心服，如脾腎無力，木瓜湯下。

續添諸局經驗祕方

【沉香鹿茸圓】治真氣不足，下元冷憊，臍腹絞痛，脇肋虛脹，脚膝緩弱，腰背拘急，肢體倦怠，面無精光，唇口乾燥，目暗耳鳴，心悸氣短，夜多異夢，盡少精神，喜怒無時，悲憂不樂，虛煩盜汗，飲食無味，舉動力乏，夜夢鬼交，遺泄失精，小便滑數，時有餘瀝，陰間濕痒，陽事不興，並宜服之。

沉香一兩　　鹿茸去毛酒炙三兩　　附子炮去皮臍四兩　　巴戟去心二兩
熟乾地黃洗淨酒蒸焙六兩　　兔絲子酒浸研焙五兩

右為細末，入麝香一錢半別研和勻，煉蜜為圓，如梧桐子大，每服四五十粒，好酒或鹽湯空心下，煖服，令真氣益續，續明眼聽，進食駐顏。

【椒附圓】補虛壯氣，溫和五臟，治下經不足，內挾積冷，臍腹弦急，痛引腰背，四肢倦怠，面色黧黑，唇口乾燥，目暗耳鳴，心悸短氣，夜多異夢，盡少精神，時有盜汗，小便滑數，遺瀝白濁，脚膝緩弱，舉動乏力，心腹脹滿，不進飲食，並宜服之。極煖下元，治腎氣乏及療腰疼。

五味子　　陳皮去白　　牽牛微炒　　乾薑炮
石菖蒲各一兩　　附子炮去皮臍　　川椒去目炒出汗　　楝椰各半兩

右八味，剉碎，以好米醋於磁器內，用文武火煮令乾，焙為細末，醋煮麵糊為圓，如梧桐子大，每服三十圓，鹽酒或鹽湯空心食前下，婦人血海冷，當歸酒下，溫酒飲下，冷痢，薑湯下，赤痢，甘草湯下。

【平補鎮心丹】治證與前平補鎮心丹同。

熟乾地黃　　麥門冬　　柏子仁　　茯神
生乾地黃　　天門冬　　乾山藥各七兩　　當歸去蘆六兩
苦梗炒　　辰砂各三兩研為衣　　遠志去心七兩以甘草煮三四沸
石菖蒲擣節密者十六兩　　龍骨一兩

右為細末，煉蜜為圓，如梧桐子大，每服三十圓，空心飯飲下，溫酒亦得，漸加至五十圓。

【青娥圓】治證與前青娥圓同。

胡桃肉三十箇去皮膜別研如泥　　補骨脂用脂麻同於鍋內炒熟
杜仲皮去麤皮剉，慢火炒黃，去絲，乘熱搗碎，又用酒酒勻再炒，各六兩

右為細末，入研藥令勻，酒糊圓，如梧桐子大，每服三五十圓，溫酒鹽湯下，空心食前服。

【威喜圓】治丈夫元陽虛憊，精氣不固，餘瀝常流，小便白濁，夢寐頻洩，及婦人血海久冷，白帶白漏白淫，下部常濕，小便如米泔，或無子息。

白茯苓去皮四兩，作塊，用猪苓一分，圍於磁器內，煮二十餘沸，取茯苓，日乾，去猪苓為末。

右錘黃蠟四兩，浊爲圓，如彈子大，空心細嚼滿口生津，徐徐嚥服，以小便清爲度，忌米醋，忌使性氣。

【遠志圓】治丈夫婦人心氣不足，腎經虛損，思慮太過，精神恍惚，健忘多驚，睡臥不寧，氣血耗敗，遺濁泄精，小便白濁，盜汗，耳聾鳴，悉皆主之。

遠志去心，薑汁炒　牡蠣煅取粉，各二兩　肉蓯蓉淨洗，切片，焙乾，四兩

人參去蘆　白茯苓去皮　辰砂別研　乾薑炮，各一兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大，每服三十粒，空心食前，薑煎棗湯下，溫酒亦可，此藥性溫無毒，常服補益心腎，聰明耳目，定志安神，滋養氣血。

【小安腎圓】治腎氣虛乏，下元冷憊，夜多旋溺，肢體倦怠，漸覺羸瘦，腰膝沉重，時臥少力，精神昏惚，耳作蟬鳴，面無顏色，泄瀉腸鳴，眼目昏暗，牙齒疼痛。

香附子　川楝子　川烏各一片，用鹽四兩水四升同煮，候乾別焙

茴香十二兩　熟乾地黃八兩　川椒去目及閉口者，微炒出汗，四兩

右爲細末，酒糊爲圓，如梧桐子大，每服二十圓至三十圓，空心臨臥，鹽湯或鹽酒下，常服補虛固下元冷憊。

【三建丹】壯元陽，補眞氣，治勞傷虛損，下經衰竭，腎氣不固，精溺遺失，臟腑自利，手足厥冷，或脈理如絲，形肉消脫，或惡聞食氣，聲嘶失音。

陽起石火煅通紅　鍾乳粉　附子炮，去皮臍，各等分

右爲細末，和勻，用精米糊爲圓，如梧桐子大，每服二十圓至三十圓，來欲發之日，食前服，溫酒汁半盞，空心臨臥，鹽湯或鹽酒下，常服補虛固下元冷憊。

【伏火二氣丹】治眞元虛損，精憊耗傷，腎氣不足，面黑耳焦，下虛上盛，頭目眩暈，心腹刺痛，臟腑吐逆，虛勞盜汗，水氣喘滿，全不入食，婦人血氣久冷，房中漏下，癥瘕塊癖，此藥奪陰陽造化之功，濟心腎交養之妙，大補諸虛。

硫黃四兩，黑錫　水銀　丁香不見火

乾薑各半兩

右先錘黑錫，後下水銀，結砂子，與硫黃一處，再研成黑灰色，次入鉛槽研勻，用生薑自然汁，煮糊爲圓，如梧桐子大，每十粒至一十五粒，溫酒生薑湯下，空心食前。

【靈砂】性溫無毒，主五臟百病，益精食神，補氣明目，安魂魄，通血脈，止煩滿，殺邪魅，善治榮衛不交養，陰陽不升降，上盛下虛，頭旋氣促，心腹冷痛，臟腑吐逆，霍亂轉筋，臟腑滑泄，赤白下痢，久服通神，輕身不老，令人心靈，此丹按仙經服餌之法，會五行符合之妙，體性輕清，不隨煙焰飛走，男女老幼皆可服。

水銀一斤　硫黃四兩

右二味，用新瓦銚炒成砂子，或有烟焰，即以醋洒，研細，入水火鼎，醋調赤石脂封口，綿紙扎，鹽乾，泥固濟，用炭二十斤煅，如鼎子裂，罅醋赤石脂頻抹其處，火盡爲度，經宿取出，研爲細末，糯米糊爲圓，如麻子大，每服三粒，空心薯豆蔻冷湯之物。

【上丹】養五藏，補不足，固其元，調二氣，和榮衛，保神守中，久服輕身耐老，健力美食，明目降心火，交腎水，益精氣，男子絕陽，房事不興，女子絕陰，不能姙娠，腰膝重痛，筋骨衰敗，面色黧黑，心勞志昏，羸羸恍惚，煩悶多倦，餘瀝夢遺，勝胱邪熱，五勞七傷，肌肉羸瘁，上熱下冷，難任補藥，服之半月，陰陽自和，容色肌肉，光潤悅澤，開心意，安魂消食，養胃氣。

五味子半斤　肉蓯蓉酒浸　巴戟去心　百部酒浸一宿，焙

蛇床子　白茯苓去皮　遠志去心　山藥

枸杞子　柏子仁別研　防風去叉　杜仲炒斷絲

兔絲子酒浸別研，各二兩

右爲末，蜜圓如梧桐子大，食前溫酒鹽湯下三十圓，春夏乾服，夏加五味子四兩，四季月加蓯蓉六兩，秋加枸杞子六兩，冬加遠志六兩。

【鹿茸四斤圓】治肝腎虛熱，淫於內，致筋骨痿弱，不自勝持，起居須人，足不任地，驚恐戰掉，溺熱時作，飲食無味，不生氣力，諸虛不足。

肉蓯蓉酒浸　熟地黃　牛膝酒浸　鹿茸燎去毛，瀝炙

兔絲子酒浸別研　木瓜乾　杜仲酒浸　天麻各等分

右爲末，蜜圓如梧桐子大，每服五十圓，溫酒米飲食前下。

【元兔丹】治三消渴利，神藥，常服禁遺精，止白濁，延年。

兔絲子酒浸，蒸軟，乘濕研，焙乾別取末，十兩　白茯苓　乾薑肉各三兩

五味子酒浸別爲末，七兩

右爲末，別研乾山藥末六兩，將所浸酒餘者，添酒煮糊，漫和，所得搗數千杵，圓如梧桐子大，每服五十圓，米湯下，空心食前服。

【龍齒鎮心丹】治心腎氣不足，驚悸健忘，夢寐不安，遺精，面少色，足膝酸疼。

遠志去心炒　天門冬去心　龍齒水飛　熟地黃

山藥各六兩　麥門冬去心　五味子　地骨皮

茯神去皮木　白茯苓去皮　車前子炒　柱心各五兩

右爲末，蜜圓如梧桐子大，每服三十圓至五十圓，空心溫酒或米湯任下。

【羊肉圓】治眞陽耗竭，下元傷憊，耳輪焦枯，面色黧黑，腰重脚弱，元氣衰微，常服固眞補氣，益精駐顏。

補骨脂炒　胡盧巴炒　川楝子炒　茴香炒

續斷炒，去絲　附子炮，去皮臍　茯苓各三兩　山藥炒

桃仁別研去尖麸炒　杏仁各二兩去皮尖麸炒別研

右爲末糯米粥丸如梧桐子大鹽湯溫酒空心下三五十丸

【蓯蓉大補圓】治元臟虛憊血氣不足白濁遺泄自汗自利口苦舌乾四肢羸瘦婦人諸虛皆主之

木香炮　附子炮去皮臍　茴香炒　蓯蓉酒浸

川椒炒去汗各十兩　桃仁炒去皮尖　胡盧巴　牛膝酒浸

巴戟去心　白蒺藜炒去刺　五味子　黃芪

澤瀉各五兩　羌活　楮椒　天麻

川芎　桂心各二兩

右爲末蜜丸如梧桐子大鹽酒鹽湯空心下三五十丸

【十四友圓】補心腎虛怔忡昏憒神志不寧睡臥不安故經曰臟有所傷情有所倚人不能知其病則臥不安

白茯苓去皮　川當歸去蘆　肉桂去粗皮　人參

白茯神去木　熟地黃蒸洗　阿膠蛤粉炒　黃耆

柏子仁別研　紫石英別研　遠志湯浸洗去心酒蒸炒乾

酸棗仁炒　辰砂一分別研　龍齒二兩別研

右爲末同別研藥蜜圓如梧桐子大每三十圓食後煎湯下

【鍾乳白澤圓】治丈夫諸虛百損五勞七傷真氣不足元臟不固神志俱耗筋力頓衰頭目眩暈耳內虛鳴心腹急痛氣逆嘔吐痰嗽喘促胸脇脹滿脾泄下痢遺精便濁厥冷自汗脈微欲絕婦人血海虛冷崩漏不止亦白帶下經候不調臍腹時痛面無顏色飲食不進并治一切虛勞之疾

鍾乳粉二兩　陽起石煅通紅研　附子炮去皮臍各一兩半　滴乳香別研

白檀香末各一兩　麝香一錢別研

右和勻滴水溲成麥分作六十圓每服一圓水一盞煎化及七分盞空心熱服如急病不拘時久服補益精血助陽消陰安心神定魂魄延年增壽起死回生

【三建湯】治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝腹節煩疼腰背酸痛自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風涎潮不省人事傷寒陰證厥逆脈微皆可服之

大川烏　天雄　附子各去皮臍炮各等分

右爲麤末每服四錢水二盞生薑十五片煎至八分去滓溫服不拘時

【十全飲】治諸虛百損榮衛不和形體羸瘦面色痿黃脚膝酸疼腰背倦痛頭眩耳重口苦舌乾骨蒸內煩心悸多汗飲食進退寒熱往來喘嗽吐衄遺精失血婦人崩漏經候不調凡病後不復舊及憂慮傷動血氣此藥平補有效

白茯苓　白朮　人參去蘆

川當歸洗去蘆　川芎　黃耆去蘆

白芍藥　甘草炙各等分

右爲麤末每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至七分水滓溫服不拘時

治痼冷　附消渴

【二氣丹】助陽消陰正氣溫中治內虛裏寒冷氣攻擊心胸脇腹脹滿刺痛泄利無度嘔吐不止自汗時出小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷並宜服之

肉桂去粗皮　硫黃細研各一分　乾薑炮　朱砂研爲衣各二錢

黑附子一枚去皮臍炮裂爲末半兩者

右並研勻細麵糊爲圓如梧桐子大每服三十圓煎茱萸湯或冷下空心食前服

【崔氏烏頭圓】治風冷邪氣入乘心絡或腑臟虛損風寒上乘於心令人卒然心痛或引背脊乍瘥乍甚經久不瘥

川烏頭　附子各炮去皮臍　赤石脂各三兩

乾薑炮　蜀椒去目及閉口者炒出汗各二兩　肉桂去粗皮

右爲細末蜜圓如梧桐子大每服二圓溫酒下覺至痛處痛即止若不止加五六圓以知爲度若早服無所覺至午時再服三圓夜又三圓若久心痛每旦服三圓加至十圓盡一劑終身不發忌猪肉生熱

【曹公草鍾乳圓】主五勞七傷肺損氣急羸瘦丈夫衰老陽氣絕手足冷心中少氣憊虛腰疼脚痹體煩口乾不能食此藥下氣消食長肌和中安五臟除萬病

鍾乳粉二兩　吳茱萸湯洗七次焙乾微炒半兩　石斛去根

兎絲子酒浸搗焙各一兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服七圓空心溫酒或溫湯來飲下且再服流行數百步欲溫酒三合復行二三百步覺口腹內熱稍定即食乾飯豆醬過一日如常須臾將息不得即見風雨等氣亦不食鹽臭陳惡食初服七日內多爲揚事過七日後尋性然亦不宜傷多服過半劑覺有效即相繼服三劑終身更無所忌

【金液丹】固真氣暖丹田壓筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子腰腎久冷心腹積聚脇下冷癖腹中諸蟲失精遺溺形羸力劣脚膝疼弱冷風頑痺上氣衄血咳逆寒熱霍亂轉筋虛滑下利又治痔瘻濕蠱生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽瘡

硫黃煉淨去沙石十兩研細飛過用磁盒子盛以水和赤石脂封口鹽泥固濟乾地內先堆一小罐子盛水令滿安盒子在上用泥固濟乾慢火養七日七夜候足加頂火一斤煅候冷取出研爲極細末

右藥末一兩，用薄餅一兩，湯浸，擠去水，服為圓，如梧桐子大，每服三十圓，多至百圓，溫米飲下，空心服之，又治傷寒除證，身冷脈微，手足厥逆，或吐或利，或自汗不止，或小便不禁，不拘圓數，宜併服之，得身熱脈出為度。

【橘皮煎圓】治久虛積冷，心腹疼痛，嘔吐痰水，飲食減少，脇肋虛滿，臍腹弦急，大腹虛浮，小便利數，肌膚瘦瘁，面色痿黃，肢體怠惰，腰膝痠弱，及治痃癖積聚，上氣欬嗽，久瘧久痢，腸風痔瘻，婦人血海虛冷，赤白帶下，久無子息。

陳橘皮湯浸洗，去白，取紅，十五兩，為細末。　鹿茸茹子者，燎去毛，罨開，酒浸炙乾。
肉蓯蓉酒浸微炙　牛膝酒浸焙　石斛去根，酒浸　巴戟去心
菟絲子酒浸焙搗　肉桂去麤皮　當歸洗，去蘆，焙　乾薑炮製
吳茱萸水淘去浮　杜仲去麤皮，薑汁炙　附子炮，去皮臍　陽起石酒浸，研飛
京三稜煨熟搗碎　厚朴去麤皮，薑汁炙　草薢各三兩　甘草炙，一兩

右為細末，以酒五升，於銀石器內，將橘皮末煎膏如餳，却將諸藥末入在內，一處溲和勻，仍入臼內搗五百杵，圓如梧桐子大，每二十圓至三十圓，空心溫酒鹽湯下。

【附子理中圓】治脾胃冷弱，心腹絞痛，嘔吐泄利，霍亂轉筋，體冷微汗，手足厥寒，心下逆滿，腹中雷鳴，嘔噦不止，飲食不進，及一切沉寒痼冷，並皆治之。

人參去蘆　附子炮，去皮臍　乾薑炮　甘草炙
白朮各三兩

右為末，煉蜜和圓，每一兩分作十圓，每服一圓，以水一盞，化破，煎至七分，空心食前稍熱服。

【北亭圓】治脾元氣弱，久積陰冷，心腹脇肋滿脹刺痛，面色青黃，肌體瘦弱，怠惰嗜臥，食少多傷，噫氣吞酸，噦逆惡心，腹中虛鳴，大便泄利，胸膈痞塞，飲食不下，嘔噦霍亂，體冷轉筋，及五膈五痼，痃癖瘕聚，羸瘠

陳橘皮去白，洗焙　當歸去蘆，剉焙　川芎　肉桂去麤皮
大附子炮，去皮臍　厚朴去麤皮，薑汁炙　胡椒　甘草炙，剉
縮砂仁　乾薑炮，各四兩　北亭醋淘去石，別研　青鹽別研，各二兩
五味子淨，一兩半　白朮三兩　阿魏醋化，去炒石，別研，半兩

右為末，用銀石鍋中入好酒醋，于升，白炒蜜一十兩，先下北亭，阿魏，青鹽，三味，入細麵一升，同煎糊結，便下藥末半斤，更煎，如稀麵糊，漸漸入藥末，攪所難火取出，更以乾藥末和溲成劑，搗一千杵，圓如梧桐子大，每服十五圓，微嚼，用生薑鹽湯或溫酒下，空心服，忌羊血豉汁。

紹興續添方

【沉香蓽澄茄散】治下經不足，內挾積冷，臍腹弦急，痛引腰背，面色痿黃，手足厥冷，脇肋虛滿，精神困倦，

臍腹自利，小便滑數。

沉香　胡蘆巴微炒　蓽澄茄
茴香舶上者，微炒　破故紙微炒　川楝子炮，去核
木香各一兩　附子炮，去皮臍，四兩　川烏炮，去皮臍，半兩　桃仁去皮尖，炒，二兩
肉桂去麤皮
巴戟去心

右為末，每服二錢，水一大盞，入鹽少許，煎八分，去滓，空心食前稍熱服，如有腸小腸一切氣痛，服之有效。

寶慶新增方

【清心蓮子飲】治心中蓄積，時常煩躁，因而思慮勞力憂愁抑鬱，是致小便白濁，或有沙膜，夜夢走泄，遺瀝澀痛，便赤如血，或因酒色過度，上盛下虛，心火炎上，肺金受尅，口舌乾燥，漸成消渴，睡臥不安，四肢倦怠，男子五淋，婦人帶下赤白，及病後氣不收斂，陽浮於外，五心煩熱，藥性溫平，不冷不熱，常服清心養神，秘精補虛，滋潤腸胃，調順氣血。

石蓮肉去心　白茯苓去皮　黃芩蜜炙　人參各七錢半
麥門冬去心　地骨皮　甘草炙
車前子各半兩

右剉散，每三錢，麥門冬十枚，水一盞半，煎取八分，去滓，水中沉冷，空心食前服，發熱加柴胡薄荷煎。

【獨活寄生湯】治腎氣虛弱，腰背疼痛，此病因臥冷濕地，當風所得，不時速治，流入腳膝，為偏枯冷痹，緩弱疼重，或腰痛腳重，攣痹，宜急服此。

白芍藥　當歸洗浸焙乾　防風去蘆　人參
白茯苓去皮　杜仲製炒斷絲　細辛去苗　桂心不見火
熟地黃酒蒸　牛膝去蘆，酒浸　秦艽去土　芎藭
桑寄生　甘草炙，各二兩　獨活三兩

右為剉散，每服四錢，水一盞半，煎七分，空心服，氣虛下痢，除地黃，併而漸進服，痛不得轉動，及腰腳腫痛痹痛，不得伸屈，此湯最除風濕血痹，後方有附子一枚，無寄生，人參甘草當歸，近人治歷節風，并腳氣流注甚有效。

淳祐新添方

【人參養榮湯】治積勞虛損，四肢沉潛，骨肉酸疼，吸吸少氣，行動喘嗽，小腹拘急，腰背強痛，心虛驚悸，咽乾唇燥，飲食無味，陽陰衰弱，悲憂慘戚，多臥少起，久者積年，急者百日，漸至羸瘦，削五臟氣竭，難可振復，又治肺與大腸俱虛，咳嗽下痢，喘乏少氣，嘔吐痰涎。

白芍藥三兩　當歸　桂心去麤皮
陳橘皮　人參　白朮焙　甘草炙
黃耆各一兩

熟地黃煎　五味子　茯苓各七錢半　遠志炒去心半兩

右剉散，每服四錢，水一盞半，生薑三片，棗子一枚，煎七分，去滓，溫服，便續進濃加龍骨一兩，咳嗽加阿膠蛤蚧。

【鹿茸大補湯】治男子婦人諸虛不足。

白茯苓去皮　鹿茸醋　杜仲剉炒去絲　當歸酒浸
肉蓯蓉酒浸焙　黃耆炙各二兩　石斛剉酒浸蒸　白朮焙
五味子　附子炮　肉桂　人參
北芍藥　半夏各一兩半　甘草半兩　地黃熟者酒蒸三兩

右㕮咀，每服四錢，薑三片，棗一枚，水一盞二分，煎七分，空心帶熱服，及治產後血氣耗傷，一切虛損。

【養腎散】治腎氣虛損，腰脚筋骨疼痛，膝脛不能屈伸，久病脚膝緩弱，空心豆淋酒下服，訖麻痹少時，須臾疾隨藥氣頓愈。骨中痛，嚼胡桃肉酒下，甚者三五服，風寒濕悉治之。

全蝎半兩　天麻三錢　蒼朮製一兩　草烏頭生去皮臍
附子炮各二錢

右為細末，每服一字，空心溫酒調下。

【參香散】治心氣不寧，諸虛百損，肢體沉重，惚思不樂，夜多異夢，盜汗失精，恐怖煩悸，喜怒無時，口乾咽燥，渴欲飲水，飲食減少，肌肉瘦瘁，漸成勞瘵。

白茯苓去皮　白朮焙　黃耆製　山藥
石蓮肉去心　人參各一兩　丁香　檀香
南木香各一分　烏藥　橘紅　乾薑炮
縮砂仁各半兩　甘草炙三分　沉香二錢，一法有炮附子半兩。

右為剉散，每服四錢，水一大盞，生薑三片，棗一枚，煎七分，空心服，常服補精血，調心氣，進飲食，安神守中有效。

吳直閣增諸家名方

【震靈丹】紫府元君南岳魏夫人方，出道藏，一名紫金丹。此丹不犯金石，兼走有性之藥，不僻不燥，奪造化沖和之功。大治男子真元衰憊，五勞七傷，脾腹冷痛，肢體酸疼，上盛下虛，頭目昏眩，心神恍惚，血氣衰微，及中風癱緩，手足不遂，筋骨拘攣，腰膝沉重，容枯肌瘦，目暗耳聾，口苦舌乾，飲食無味，心腎不足，精滑夢遺，膀胱疝墜，小腸淋瀝，夜多盜汗，久瀉久痢，嘔吐可食，八風五痹，一切沉寒痼冷，服之如神，及治婦人血氣不足，崩漏虛損，帶下，久冷胎藏無子。

赤石脂　紫石英　禹餘糧石火煅醋淬，手捻得碎為度。
丁頭代赭石知餘糧炮製，已上各四兩。

已上四味，作小塊，入甘鍋內，鹽泥固濟，候乾，用炭一十斤煅通紅，火盡為度，入地坑埋，出火毒二宿，

滴乳香別研　五靈脂去沙石研　沒藥去沙石各二兩　朱砂一兩水飛過

右八味，各為末，以糯米粉煮糊為圓，如小鵝頭大，曬乾出光，每一粒空心溫酒或冷水下，常服鎮心神，駐顏色，溫脾腎，理腰膝，除尸注蠱毒，辟鬼魅邪物，久服輕身，漸入仙道，忌猪羊血，恐減藥力，婦人醋湯下，孕婦不可服。

【來復丹】盛堅城八角杜先生方，一名正一丹。此藥配類二氣，均調陰陽，奪天地沖和之氣，乃水火既濟之方，可冷可熱，可緩可急，善治榮衛不交，養心腎不升降，上實下虛，氣閉痰厥，心腹冷痛，臟腑虛滑，不問男女老幼危急之證，但有胃氣，無不獲安，補損扶虛，救陰助陽，為效殊勝。

硝石同硫黃並為細末，入罐內以微火微炒，用柳箒子不住手攪，令陰陽氣和，入不可火太過，恐藥力減，再研細，名二氣末。　硫黃鮑上透明者　太陰元精石研細，水飛各一兩

五靈脂須擇五靈山者，水澄去沙石，日乾利　陳橘皮去白　青皮去白各二兩

右為五錢匙，二橘皮為細末，次入元精石末及前二藥末，拌勻，以好醋打糊為圓，如綠豆大，每服三十粒，空心粥飲下，甚者五十粒，小兒三五粒，新生嬰兒一粒，小兒慢驚風，或吐利不止，變成虛風搐搦者，非風也，胃氣欲絕故也，用五粒研碎，米飲送下，老人伏暑迷悶，紫蘇湯下，婦人產後血逆上搶悶絕，并惡露不止，及赤白帶下，並用醋湯下，常服和陰陽，發精神，散腰腎陰盛，止腹脅冷疼，一藥諸疾不辨陰陽者，並宜服之。

【養正丹】出資林眞人谷伯陽傷寒論中，一名交泰丹，卻邪補正，助陽接真，治元氣虛虧，陰邪交蕩，正氣乖常，上盛下虛，氣不升降，呼吸不足，頭旋氣短，心神怯弱，夢寐驚悸，逼體盜汗，腹痛腰疼，或虛煩狂言，口乾上嘈，飜胃吐食，霍亂轉筋，咳逆不定，又治中風涎潮，不省人事，陽氣欲脫，四肢厥冷，如傷寒陰證自汗，脣青脈沉，最宜服，及治婦人產後血氣身熱，月候不均，帶下腹痛，常服濟心火，強腎水，進飲食。

硫黃研細　水銀　黑錫去滓，淨，和與水銀結砂子。
朱砂細研各一兩

右用黑錫一隻，火上鎔，黑錫成汁，次下水銀，以柳枝子攪勻，次下朱砂，攪令不見星子，放下少時，方入硫黃末，急攪成汁和勻，如有焰，以醋酒之，候冷取出，研如粉極細，用糯米粉煮糊，圓如綠豆大，每服二十粒，鹽湯下，此藥升降陰陽，既濟心腎，空心食前服湯下。

【黑錫丹】丹陽葛濟大師受神仙桑者方，治脾元久冷，上實下虛，胸中痰飲，或上攻頭目，微痛昏眩，及奔豚氣上衝，胸腹連兩脇膨脹，刺痛不可忍，氣欲絕者，及陰陽氣不升降，飲食不進，而黃羸瘦，肢體浮腫，五種水氣，肌氣上攻，及牙齦腫痛，滿口生瘡，齒欲落者，兼治脾寒心痛，冷汗不止，或卒暴中風，痰潮上膈，言語澀澀，神昏氣亂，喉中痰響，狀似癲緩，曾用風藥弔吐不出者，宜用此藥百粒，煎薑棗湯灌之，壓下風涎，即時甦省，風涎自利，或觸冒寒邪，猝亂吐瀉，手足逆冷，唇口青黑，及男子陽事痿怯，脚膝酸軟，行步

之力。脾腹虛鳴。大便久滑。及婦人血海久冷。白帶自下。歲久無子。血氣攻注頭面四肢。並宜服之。兼療胸膈煩壅。痰飲虛喘。百藥不愈者。常服益化飲食。養精神。生陽遂陰。消磨冷滯。除濕破癖。不動眞氣。使五臟安寧。六腑調暢。百病不侵。

金鈴子盡去皮核。　胡蘆巴酒浸炒。　木香不見火。　附子炮去皮臍。
肉豆蔻麵裹煨。　破故紙酒浸炒。　沉香不見火。　茴香舶上者炒。
陽起石治煮一日。焙乾研各一兩。　肉桂不見火半兩。　黑錫去滓淨秤。
硫黃透明者結砂子各二兩。

縱調榮衛亦難將。
氣血虛羸生者。
夫妻會合功成畢。
並附胡蘆陽起破。
梧桐酒糊精修煉。
試聽桑君爲發揚。
鈴子沉香一兩除。
桂茴肉豆等無差。
反老還童事可嘉。

〔歌曰〕陰損陽衰實可傷。

右用黑盞或新瓦鐺內。如常法結黑錫硫黃砂子地上。出火毒。研細。餘藥並杵羅爲末。都一處和勻。入研。自朝午蒸。以紫光色爲度。酒糊圓梧桐子大。陰乾。布袋內擦令光瑩。每三四粒。空心鹽湯或棗湯下。婦人芡醋湯下。

【玉華白丹】庶神虛免生三品製煉方。曾經進宣政問。保上品丹。清上實下。助養根元。扶衰救危。補益臟腑。五勞七傷。夜多盜汗。肺萎虛損。久嗽上喘。狂亂轉筋。六脈沉伏。唇口青黑。腹脇刺痛。大腸不固。小便滑數。夢中遺泄。肌肉瘦瘁。目暗耳鳴。胃虛食減。久瘧久痢。積寒痼冷。諸藥不愈者。服之如神。及治腸風臟毒。

鍾乳粉煉成者一兩。　白石脂淨瓦罐起火煅紅研細水飛。
陽起石各半兩。用甘鹽盛于火中。煅令通紅。取出。酒淬放在陰地上令乾。不可膠。
左顧牡蠣七錢。先用韭葉裹鹽泥固濟。火煅放冷。取白者。淨秤半兩。

右各研細如粉。方并和作一處。勻研一二日。以糯米粉煮糊爲圓。如鷄豆大。入地坑。出火毒一宿。每一粒。經心濃煎人參湯候冷送下。熱水亦得。常服溫平不僭不燥。潤肌悅色。祛除宿患。令人久無雜毒。以當歸煎地黃浸酒下。或久冷腹帶虛損。臍腹撮痛。艾醋湯下。服藥以少白粥壓之。忌猪羊血菜豆粉。恐減藥力。

續添諸局經驗秘方

【金鎖正元丹】治真氣不足。元臟虛弱。四肢倦怠。百節酸疼。頭昏眩痛。目暗耳鳴。面色黃黑。鬢髮脫落。頭皮腫痒。精神昏困。手足多冷。心胸痞悶。遺腎切痛。膝脛酸疼。不能久立。或脚弱隱痛。步履艱難。腰背拘急。不得俛仰。腹痛氣刺。兩脇虛脹。水穀不消。大便不調。嘔逆惡心。飲食減少。恍惚多忘。氣促喘乏。夜多異夢。心悸盜汗。小便滑數。遺精白濁。一切元臟虛冷之病。並治之。

五倍子
胡蘆巴炒。
茯苓去皮各八兩。　補骨脂酒炒十兩。
蓯蓉淨洗焙各一斤。　朱砂別研。
紫巴戟去心。
龍骨各三兩。

右爲細末。入研藥令勻。酒糊爲圓。如梧桐子大。每服十五圓至二十圓。空心食前溫酒下。或鹽湯下。

【秘傳玉鎖丹】治心氣不足。思慮太過。腎經虛損。眞陽不固。旋有遺瀝。小便白濁如膏。夢寐頻泄。甚則身體拘倦。骨節酸疼。飲食不進。面色黧黑。容枯肌瘦。唇口乾燥。虛煩盜汗。舉動力乏。此藥性溫不熱。大有神效。

五倍子十六兩　茯苓去皮四兩。　龍骨二兩。

右爲細末。水糊圓。每服四十粒。空心鹽湯下。日進三服。

【巴戟圓】補腎臟。駐丹田。興陽道。減小便。塡精益髓。駐顏潤肌。治元氣虛憊。面目黧黑。口乾舌澀。夢想虛驚。服中冷淚。耳作蟬鳴。腰膀沉重。百節酸疼。項筋緊急。背脚勞倦。陰下盜汗。四肢無力。及治婦人子宮久冷。月脈不調。或多或少。赤白帶下。並宜服之。

紫金藤十六兩。　良薑六兩。　巴戟三兩。　肉桂
吳茱萸各四兩。　青鹽二兩。

右爲末。酒糊圓。每服二十圓。溫鹽酒送下。鹽湯亦得。日午夜臥各一服。

【十補圓】治眞氣虛損。下焦傷竭。臍腹強急。腰脚疼痛。亡血盜汗。遺泄白濁。大便自利。小便滑數。或三消渴疾。飲食倍常。肌肉消瘦。陽事不舉。顏色枯槁。久服補五臟。行榮衛。益精髓。進飲食。

破故紙炒。　厚朴去麤皮薑汁浸。　肉桂去粗皮。　附子炮。
赤石脂煨。　遠志去心薑汁浸炒。　巴戟去心。　乾薑炮。
兔絲子酒浸軟。別研細。已上各一兩。　川椒去目及閉口者炒出汗二兩。

右爲末。酒糊圓如梧桐子大。每服三十圓至五十圓。溫酒鹽湯下。

【玉元散】治下元氣虛。脚腹脹滿。心脇刺痛。泄利嘔吐。自汗。陽氣沖微。手足厥冷。及傷寒陰證。狂亂惕筋。久下冷利。少氣羸困。一切虛寒。並宜服之。

紅豆炒。　陳皮去白。　乾薑炮。　人參去蘆。
白朮。　茯苓去皮。　甘草炙各二兩。　附子炮去皮臍。
川芎。　烏藥去木。　山藥薑汁浸炒。　乾苟各一兩。
川烏炮去皮臍。　肉桂去皮各半兩。　黃耆炙一兩半。

右爲細末。每服二錢。水一盞。薑三片。棗子一枚。鹽少許。煎至七分。食前溫服。若服助陽散。增益元氣。溫脾胃進飲食。

【茯兔圓】治心氣不足。思慮太過。腎經虛損。眞陽不固。溺有餘瀝。小便白濁。夢寐頻泄。

兔絲子五兩。　白茯苓三兩。　石蓮去殼二兩。

右爲細末，酒麥糊爲圓，如梧桐子大，每服三十圓，空心蓮湯下，若服鎮益心神，補虛養血，消小便，

增廣太平惠民和劑局方卷六

積熱

【紫雪】療胸氣，毒盛內外，煩熱不解，口中生瘡，狂易叫走，瘟疫毒病，卒死溫瘧，五尸五疰，心腹諸疾，疥刺切痛，及解諸熱藥毒，發邪熱卒黃等，并解蠱毒鬼魅，野道熱毒，又治小兒驚癇百病。

石膏　黃金一百片，與藥煮過不用　寒水石

磁石　滑石

已上四味，各三斤，搗碎，水一斛煮至四斗，去滓，入下項，

犀角屑　羚羊角屑　青木香搗碎　沉香搗碎，各五兩，

元參洗焙，搗碎，　升麻各一斤，　甘草剉炒，八兩，　丁香一兩，搗碎，

已上八味，入前藥汁中，再煮取一斗五升，去滓，入下項，

朴硝精者，十斤，　消石四升，如關，芒硝亦得，每升重七兩七錢半，

已上二味，入前藥汁中，微火上煎，柳木攪，不住手，候有七升，投在木盆中，半日，欲凝，入下項，

麝香當門子一兩二錢半，研，　朱砂飛研，三兩，

已上二味，入前藥中，攪調令勻，安之二日，

右件藥成霜，紫色，每服一錢，或二錢，用冷水調下，大人小兒臨時以意加減，食後服，

【紅雪通中散】治煩熱，黃疸，脚氣，溫瘧，解酒毒，消宿食，開三焦，利五臟，爽精神，除毒熱，破積滯，去腦悶，治眼昏頭痛，鼻塞口瘡，重舌腸癰，喉閉，及傷寒狂躁，胃爛發斑等病，並宜服之。

赤芍藥　人參去蘆，　甘草生用，　木香各二兩，　檳榔　根殼去穰，麩炒黃，

淡竹葉　升麻　黃芩各三兩，　梔子去皮，　羚羊角屑　葛根

桑白皮　木通　大青去根，　藍葉各一兩半，

川朴硝十斤，　蘇枋六兩，　硃砂細研，一兩，　麝香細研，半兩，

右藥除硃砂麝香外，並細剉，以水二斗五升，煎至九升，去滓，更以絹濾過，再以煙火煎令微沸，然後下朴硝，以柳木攪，勿住手，候凝，次下硃砂麝香等末，攪令勻，傾新瓷盆中，經宿即成矣，細研，每服一錢至二錢，新汲水調下，更益老小虛實臨時加減服，凡服寶鎮丹者，先依上件服法，調此藥服訖，須臾更以熱藥投令宣瀉，一兩行爲度，後服寶鎮丹，立有效，

【涼膈散】治大人小兒臟腑積熱，煩躁多渴，面熱頭昏，唇焦咽燥，舌腫喉閉，目赤鼻衄，頷頰結硬，口舌生瘡，痰實不利，涕唾稠粘，睡臥不寧，譫語狂妄，腸胃燥澁，便溺秘結，一切風熱，並宜服之。

川大黃　朴硝　甘草炙，各二十兩，　連翹二斤半，　山梔子仁

薄荷葉去梗，　黃芩各十兩，

右爲麤末，每二錢，水一盞，入竹葉七片，蜜少許，煎至七分，去滓，食後溫服，小兒可服半錢，更隨證斟酌加減，服之得利下，住服，

【洗心散】治風壅壯熱，頭目昏痛，肩背拘急，肢節煩疼，熱氣上衝，口苦唇焦，咽喉腫痛，痰涎壅滯，涕唾稠粘，心神煩躁，眼澁睛疼，及塞壅不調，鼻塞聲重，咽乾多渴，五心煩熱，小便赤澁，大便秘滯，並宜服之。

白朮一兩半，　麻黃和節，　當歸去苗洗，

芍藥　甘草炙，　大黃麩裹煨，去麩，切焙，各六兩，　荊芥穗

右爲細末，每服二錢，水一盞，入生薑薄荷各少許，同煎至七分，溫服，如小兒鼻瘡疼痛，欲發，先調藥多渴，及驚風積熱可服一錢，重臨臥服，如大人五臟壅實，欲要瀉利，加至四五錢，溫熱服，

【八正散】治大人小兒心經邪熱，一切蘊毒，咽乾口燥，大渴引飲，心怯面熱，煩躁不寧，面目赤，睛疼唇焦，鼻衄，口舌生瘡，咽喉腫痛，又治小便赤澁，或癃閉不通，及熱淋血淋，並宜服之。

車前子　瞿麥　福茗　滑石

山梔仁　甘草　木通　大黃麩裹煨，去麩切，各一

斤，

右爲散，每服二錢，水一盞，入燈心煎七分，去滓，溫服，食後臨臥，小兒量力少少與之，

【龍腦飲子】治大人小兒蘊積邪熱，咽喉腫痛，赤眼口瘡，心煩鼻齆，咽乾多渴，睡臥不寧，及除痰熱咳嗽中暑煩躁，一切風證，並宜服之。

縮砂仁　瓜蔞根各三兩　甘草蜜炒十六兩　石膏四十兩，研

麝香葉一斤半　大梔子仁，微炒，二十兩

右為末，每服一錢至二錢，用新汲水入蜜調下，又治傷寒餘毒，潮熱盜汗，用藥二錢，水一盞，入竹葉五六片，煎至七分，溫服，並食後服。

【妙香圓】治丈夫婦人小兒諸疾。

辰砂飛研，九兩　牛黃　龍腦　麝香

麝香研，各三兩　金箔九十片，研　巴豆三百一十粒，去心殼，炒研細　鹿粉研

右合研勻，煉黃蠟六兩，入白沙蜜三分，同煉令勻為圓，每兩作三十圓，如治潮熱積熱傷寒結胸發黃，狂走躁熱，口乾面赤，大小便不通，應大黃炎甘草湯下一圓，瘧利下血，須黃連湯調鹿粉少許，如暴酒毒，食毒，菜毒，氣毒，風痰伏熱吐逆等，並用鹿粉龍腦米飲下，中毒吐血，四肢煩躁欲死者，用生人血下立愈，小兒百病驚癇，急慢驚風，潮搐搦，用龍腦鹿粉蜜湯下，蒸豆大二圓，諸積食積熱，頭赤煩躁，睡臥不寧，驚吳，溫利，並用金銀薄荷湯下，更量歲數加減，如大人及婦人因病傷寒時疾，陰陽氣交結，伏毒氣胃中乾燥，吸赤潮發不定，再經日數七八日已下，至半月，日未安，醫所不明證候，肌息交亂者，可服一圓，或分作三圓亦可，並用龍腦鹿粉米飲調半錢，已來下此一服，取轉下一切惡毒涎，并痰圓滿下，如要却收水洗淨，以油單紙裹埋入地中，五日取出，可再與大人小兒，依法服一圓，救三人，餘不堪使，如要藥速行，即用針刺一眼子，冷水浸少時服之，即效更速。

【龍腦鷄蘇圓】除煩解勞，消穀下氣，散胸中鬱熱，主肺熱欬嗽，治鼻齆吐血，血崩下血，血淋，熱淋，勞淋，氣淋，止消渴，除驚悸，涼上膈，解酒毒，又治胃熱口臭，肺熱喉腥，脾疸口甜，腎疸口苦，常服聰明耳目，開心益智。

鷄蘇淨葉一斤，即龍腦薄荷也。

麥門冬四兩，湯浸去心，焙乾。

生乾地黃末六兩，後入膏。　眞蒲黃微炒。　阿膠炒微燥。

眞銀州柴胡剉，同木通以沸湯大半升，浸一二宿，絞取汁後入藥。　人參各二兩。

木通剉，同柴胡浸，各二兩。　黃耆去蘆，一兩。　甘草炙，一兩半。

右除別研藥後入外，並為末，好蜜二斤，先煉一二沸，然後下生乾地黃末，不住手攪，時時入絞下者木通柴胡汁，慢慢熱成膏，勿令焦，然後將其餘藥末同和為圓，如豌豆大，每服二十圓，研破熱水下，不嚼亦得，虛勞煩熱，消渴驚悸，煩入蜜湯下，咳嗽唾血，鼻衄吐血，麥門冬子湯浸去心膜湯下，並食後臨臥服，惟血崩下血諸淋疾，皆空心食前服，治淋，用車前子湯下。

【牛黃涼膈圓】治風壅痰實，蘊積不散，頭痛面赤，心煩潮躁，痰涎壅塞，膈脘不利，精神恍惚，睡臥不安，口乾多渴，唇焦咽痛，頷頰赤腫，口舌生瘡。

紫英石研飛　麝香研　龍腦各五兩，研　牛黃一兩一分，研

寒水石粉飛　牙硝枯過，研細　石膏研細，各二十兩　甘草蜜，十兩

天南星七兩半，牛膽製

右為末，蜜圓，每兩作三十圓，每一圓溫薄荷人參湯嚼食後服，小兒常服半圓，治急驚，一圓，並用薄荷湯化下。

【抱龍圓】治風壅痰實，頭目昏眩，胸膈煩悶，心神不寧，恍惚驚悸，痰涎壅塞，及治中暑煩渴，陽毒狂躁。

天南星牛膽製，十六兩　阿膠碎炒如珠，三兩　牛黃半兩，研　白石英研飛

辰砂研　生犀角　麝香研　雄黃研飛，四兩　金箔　銀箔研，各五十片　紫雪葉各二兩

右為細末，入研藥令勻，用溫湯浸和為圓，如雞頭實大，每服一圓，用新汲水化破，入鹽少許，食後服。

【甘露飲】治丈夫婦人小兒胃中客熱，牙宣口氣，齒龈腫爛，時出膿血，目瞼垂重，常欲合閉，或即脫煩不欲飲食，及赤目腫痛，不任涼藥，口舌生瘡，咽喉腫痛，瘡疹已發未發，皆可服之，又療脾胃受濕，瘀熱在裏，或醉飽房勞，濕熱相搏，致生疸病，身面皆黃，肢體微腫，胸滿氣短，大便不調，小便黃澀，或時身熱，並宜服之。

熟乾地黃　麥門冬去心焙　枳殼去穰，麩炒

山茵蔯　枇杷葉刷去毛淨　石斛去蘆

生乾地黃　天門冬去心焙　甘草炙　黃芩

右等分為末，每服二錢，水一盞，煎七分，去滓，食後臨臥溫服，小兒一服分兩服，仍量歲數加減與之。

【桂苓圓】消暑圓】治證并方見傷寒中暑類。

寶慶新增方

【五淋散】治腎氣不足，膀胱有熱，水道不通，淋瀝不宜，出少起多，臍腹急痛，蓄作有時，勞倦即發，或尿如豆汁，或如砂石，或冷淋如膏，或熱淋便血，並治之，又方見後。

赤茯苓六兩　當歸去蘆　山梔子仁

赤芍藥去蘆，剉，各二十兩　甘草生用，各五兩

右爲細末，每服二錢，水一盞，煎至八分，空心食前服。

【消毒麻仁圓】治諸般風氣上壅，久積熱毒，痰涎結實，胸膈不利，頭旋目暈，或因酒麵炙煿毒食所傷，停留心肺，浸淫腸胃，蘊蓄不散，久則內鬱血熱，腸風五痔，外則發瘡癤痱，赤瘖遊腫，遍身燥悶，面上瘡赤，口乾舌裂，咽喉澀痛，痞中引飲，或傷寒時疫，口鼻出血，煩躁者，及風毒下注，瘡腫疼痛，脚氣衝心，悶亂，一切風熱毒氣，並皆主之。

生大黃五兩　山梔子仁十兩　生杏仁二兩，去皮尖

右三味，煉蜜爲圓，每服三十圓至五十圓，夜臥溫湯吞下，利下赤毒膠涎爲效，服時忌炙煿鹹物，若不損脾胃，常服搜風順氣解毒，治小兒壯熱，以溫湯化下三五圓，極效。

淳祐新添方

【導赤散】治大人小兒心經內盛，邪熱相乘，煩躁悶亂，傳流下經，小便赤澀淋瀝，臍下滿痛。

生乾地黃　甘草生用　木通各等分

右㕮咀，每三錢，水一盞，竹葉少許，煎六分，溫服，不拘時。

吳直閣增藏家名方

【三黃圓】治丈夫婦人三焦積熱，上焦有熱，攻衝眼目赤脹，頭項腫痛，口舌生瘡，中焦有熱，心膈煩躁，不美飲食，下焦有熱，小便赤澁，大便秘結，五臟俱熱，卻生痔瘻瘡痍，及治五般痔疾，蠶門腫痛，或下鮮血。

黃連去蘆鬚　黃芩去萬　大黃煨各十兩

右爲末，煉蜜爲圓，如梧桐子大，每三十圓，熱水下，如臟腑壅實，加服圓數，小兒積熱，亦宜服之。

【消毒犀角飲】治大人小兒內蘊邪熱，咽膈不利，痰涎壅嗽，眼赤臉腫，腮項結核，癰腫毒聚，遍身風瘙，瘡毒赤瘤，及瘡瘍已出未出，不能快透，並皆治療，小兒瘡痘欲出，及已出熱未解，急進此藥三四服，快透消毒，應手神效。

鼠粘子六十四兩，　荊芥穗　甘草炙各十六兩　防風去蘆八兩

右爲麤末，每服三錢，水一盞，煎至七分，去滓，食後溫服。

續添諸局經驗秘方

【碧雪】治一切積熱，咽喉腫痛，口舌生瘡，心中煩躁，嚥物妨悶，或喉閉壅塞，水漿不下，天行時疫，發狂昏憒，並皆治之。

寒水石研飛　石膏煅研飛　青黛

馬牙硝　消石　甘草各等分

右將甘草煎湯二升，去滓，却入諸藥再煎，用柳木篦不住手攪，令消盡，看所却入青黛和勻，傾入沙盆內，候冷結凝成霜，研爲末，每用少許，含化嚥津，下物時候，如喉閉壅塞，不能嚥物者，用小竹筒吹入喉中，頻用神效。

【勝冰丹】治三焦壅盛，上衝頭目，赤熱疼痛，口舌生瘡，咽喉不利，嚥物有礙，神思昏悶，並皆治之。

白藥子一兩半，　山豆根　黃連　甘草炙

黃藥子　紅內消各二兩　麝香研　龍腦研各二錢

右爲末，用蘆蘆盛於飯上蒸，候冷，次入麝香令勻，煉蜜圓如鷄頭大，每一圓含化，又用津嚥於指甲上，服少許點赤眼立效。

【導赤圓】治心腎凝滯，膀胱有熱，小便不通，風熱相搏，淋瀝不宜，或服補藥過多，水道壅澀，出少起數，臍腹急痛，攻疰陰間，或心肺壅熱，面赤心忪，口乾煩渴，及癰腫發背，血脈癤閉，服此排膿內消腫等，疏導心經邪熱，應內蘊風熱，五般淋疾，並皆治之。

山梔子仁炒，一十二兩，芍藥赤者，　茯苓去皮各四兩，

木通去節各半斤，　大黃炒，十五兩，　滑石四兩，　生乾地黃焙

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大，每服二十圓至三十圓，食後溫熱水吞下。

【五淋散】治證與前五淋散同。

山梔仁炒，十四兩，　淡竹葉四兩，　芍藥赤者，　茯苓去皮各半斤，

山茵陳去根，二兩　木通去節，　甘草炙，　滑石各六兩，

右爲末，每服三錢，水一盞，煎至八分，空心服。

【麥門冬散】治丈夫婦人蘊積邪熱，心胸煩悶，咽乾口燥，睡臥不安，或大小腸不利，口舌生瘡，並皆治之。

芒消一兩，　麥門冬去心，三分，　小草　黃連去鬚

升麻去蘆皮，　犀角屑　甘草炙，　黃芩

枳殼去穰麸炒，　大青各半兩

右爲末，每服三錢，水一盞，煎至七分，食後溫服。

【眞珠散】治丈夫婦人五臟積熱，毒氣上攻，心胸煩悶，口乾舌燥，精神恍惚，心忪悶亂，坐臥不寧，並宜服之。

眞珠粉　琥珀　寒水石火煅，醋淬　牙硝枯研

瓜蔞根末　鐵粉　甘草末生用　硃砂研飛

川大黃

右等分，各爲末，拌勻，每服一錢，以竹葉湯溫調下。

【靈液丹】治一切風熱，臟腑積熱，毒氣上攻，胸膈煩躁，口舌乾澀，心神壅悶，咽喉不利，飲食無味。

寒水石火煅，研飛　石膏研　瓜蔞根　烏梅去核炒，

赤茯苓去木，　葛根各一兩，　麥門冬一兩半，　龍腦別研，一錢，

右將麥門冬去心，乾，並爲末，入研藥令勻，煉蜜圓如彈子大，每服一圓，薄綿裹含化嚥津。

瀉痢　附祕澀

【鍾乳建脾圓】治男子婦人虛損羸瘦，身體沉重，脾胃冷弱，飲食不消，腹脹雷鳴，泄痢不止，又治腸風冷下痢清穀，或下純白，腹中疼痛，及久痢赤白，腸滑不禁，少氣羸困，不思飲食，並宜服之。

鍾乳粉三兩，　當歸去蘆，　神麯碎炒，　龍骨，　赤石脂煅，　黃連去鬚，　人參去蘆，　細辛去苗土，　大麥蘖炒，　乾薑炮，　茯苓去皮，　石斛去根，　肉桂去粗皮各二兩，　附子炮去皮臍一兩，　蜀椒去目及閉口者微炒出汗六兩，

右為末，入鍾乳粉匀，煉蜜為圓，如梧桐子大，每服三十圓，溫米飲下，食前日三服。

【朝真丹】治腸胃虛弱，內受風冷，或飲食生冷，內傷脾胃，泄瀉暴下，日夜無度，腸鳴腹痛，手足厥冷。

硫黃生，研細三十兩，　白礬煅七兩半，　硃砂三兩一錢，研為衣，

右合研勻，用水浸蒸餅為圓，如梧桐子大，以硃砂為衣，每服三十圓，溫米飲下，不拘時候，須去宜偏食。

【駐車圓】治一切下痢，無問新久及冷熱膿血，腸滑裏急，日夜無度，臍腹絞痛，不可忍者。

黃連去鬚三十兩，　乾薑炮一十兩，　當歸十五兩，

右為末，同膠膏和餅手圓，如梧桐子大，每服三十圓，食前溫米飲下，日三服，凡小兒服圓如麻子大，益歲數加減。

【訶黎勒圓】治腸胃虛弱，內受風冷，水穀不化，泄瀉注下，腹痛腸鳴，胸滿短氣，又治腸胃積寒，久痢純白，或有青黑，日夜無度，及脾胃傷冷，暴瀉不止，手足厥冷，脈微欲絕。

肉豆蔻去皮，　木香不見火，　乾薑炮各二十兩，　縮砂仁，　訶黎勒皮，　川烏頭炮去皮臍，　白礬煅各四十兩，　龍骨，　赤石脂各八十兩，

右為末，糯米飯為圓，如梧桐子大，每服二十圓至三十圓，溫粟米飲下，食前，甚者可倍加圓數服。

【大溫脾圓】治脾胃虛弱，冷氣攻衝，飲食不化，心復脹痛，嘔吐吞酸，痞塞不通，腸鳴泄利，水穀不分，面黃肌瘦，食減嗜臥，當服溫肺脾胃，消穀進食，久痢痛冷，食少傷多，宜常服。

吳茱萸湯洗七次，　大麥蘖炒，　肉桂去粗皮各五兩，　附子炮去皮臍，　細辛去苗各二兩，　枳殼麩炒一分半，　神麯碎炒三兩一錢，　人參去蘆，　乾薑炮，　甘草炙，　桔梗各三兩，

右為細末，煉蜜和圓，如梧桐子大，每服二十圓，溫酒或米飲下，日三服，空心食前。

【黃連阿膠圓】治腸胃氣虛，冷熱不調，下痢赤白，狀如魚腸，裡急後重，臍腹疼痛，日煩煩渴，小便不利。

阿膠碎炒一兩，　茯苓去皮二兩，　黃連去鬚三兩，

右黃連茯苓同為末，水調阿膠末搗和圓，如梧桐子大，每服二十圓，溫米飲下，食前服。

【神效胡粉圓】治腸胃虛滑，下痢無度，赤白相雜，臍腹污痛，裡急後重，減食羸瘦，或經久未差，並宜服之。

烏賊魚骨洗，　阿膠炒焦如珠子，　胡粉各四十兩，　白礬枯過，　龍骨洗各八十兩，　蜜陀僧二十兩，

右為末，以粟米飯為圓，如梧桐子大，每服二十圓至三十圓，溫粟米飲空心下。

【桃花圓】治腸胃虛弱，冷氣乘之，臍腹攪痛，下痢純白，或冷熱相搏，赤白相雜，腸滑不禁，日夜無度。

赤石脂　乾薑炮各等分，

右為末，水麵糊為圓，如梧桐子大，每服三十圓，溫米飲下，空心食前，日三服。

【靈砂丹】治臟腑怯弱，內有積滯，臍腹撮痛，下痢膿血，日夜無度，裡急後重，腸鳴腹脹，大穀不化，少氣困倦，不思飲食，或發寒熱，漸至羸瘦。

桂府滑石　乳香研各一分，　黃丹研，　訶子皮，　青皮去穰各四十兩，　附子炮去皮臍一兩半，

信州胡粉　消石與胡粉一處研，入磁罐子內，用石灰蓋口，炭火燒半日取出，去大塊，　桔梗研各一兩半，

肉豆蔻仁，　肉桂去粗皮五兩，

胡粉研，　粉霜研各半兩，　硃砂研飛一兩，

右為末，用蒸餅二兩四錢，和為圓，如梧桐子大，每服五圓，溫粟米飲下，未愈，加圓數，再服，小兒可服一圓至二圓，隨大小臨時加減服之。

【不二圓】治大人小兒一切瀉痢，無問冷熱，赤白，連綿不差，愈而復發，腹中疼痛者，宜服之。

白膠香研細四錢，　砒霜一兩六錢，研入磁罐子，以赤石脂固濟，罐泥固濟，燒通赤，候冷取出，

木鼈子十箇燒焦，　乳香六錢半，研，　黃丹二兩半，炒，

硃砂研飛半兩，　巳豆去皮心膜出油，　杏仁去皮尖各七十箇，研，

右研勻，糯糊和圓，如黃米大，每錢作一百二十圓，每服一圓，小兒半圓，水瀉，新汲水下，赤痢，甘草湯下，白痢，乾薑湯下，赤白痢，甘草乾薑湯下，並放冷臨臥服，忌熱物一兩時辰。

【訶黎勒散】治脾胃虛弱，內挾冷氣，心腹臍腹，脹滿刺痛，嘔吐惡心，飲食減少，腸鳴泄利，水穀不化，怠惰少力，漸漸羸弱，宜服。

訶子皮　青皮去穰各四十兩，　附子炮去皮臍一兩，

肉豆蔻仁麩裹煨令熟四十兩，

右為末，每服三錢，水一盞半，生薑三片，棗七分，食前溫服。

【木香散】治脾胃虛弱，內挾風冷，泄瀉注下，水穀不化，臍下疞痛，腹中雷鳴，胸膈痞悶，脇肋脹脹，及積寒久利，腸滑不禁，肢體羸困，不進飲食。

肉豆蔻仁　當歸去蘆　甘草炙　木香

丁香各二十兩　赤石脂　附子去皮臍，醋煮切片焙乾，各十兩　訶子皮十五兩　藿香葉洗焙，四十兩

右為末，每服一大錢，水一盞，生薑二片，棗一箇，同煎至六分，溫服，空心食前。

【神功圓】治三焦氣壅，心腹痞悶，六腑風熱，大便不通，腰脇疼痛，肩背重疼，頭昏面熱，口苦咽乾，心胸煩燥，睡臥不安，及治脚氣，并素有風人大便結燥。

大麻仁別搗如膏　人蔘去蘆各二兩　大黃錦紋者，麵裹煨　訶黎勒皮各四兩

右為末，入麻仁膏研勻，煉蜜為圓，如梧桐子大，每服二十圓，溫水下，溫酒亦可，食後臨臥，妊婦便不通，可倍圓數，以利為度。

【麻仁圓】順三焦，和五臟，潤腸胃，除風氣，治冷熱壅結，津液耗少，令人大便秘難，或閉塞不通，若年高氣弱及有風人大便秘澀，尤宜服之。

白檀槐半生半煨　山茱萸　防風去蘆叉　枳殼去穰麩炒

兔絲子酒浸　車前子　肉桂去麤皮　山藥各一兩半

郁李仁去皮別研　大黃半蒸半生　麻仁別搗研各四兩　羌活去蘆

木香各一兩

右為末，入研藥勻，煉蜜和圓，如梧桐子大，每服十五圓至二十圓，溫水臨臥服。

【脾約麻仁圓】治腸胃燥澀，津液耗少，大便堅硬，或秘不通，脾腹脹滿，腰背拘急，及有風人大便結燥，又治小便利數，大便因硬而不渴者，謂之脾約，此藥主之。

厚朴去麤皮，薑汁炒　枳實麩炒　芍藥各半斤　大黃蒸焙，一斤

麻仁別研，五兩　杏仁去皮尖，炒研，五兩半

右為末，蜜和圓如梧桐子大，每服二十圓，臨臥溫水下，以大便通利為度，未利再服。

【七聖圓】治風氣壅盛，痰熱結搏，頭目昏重，涕唾稠黏，心煩面赤，咽乾口燥，精神不爽，夜臥不安，肩背拘急，胸脇痞悶，腹脇脹滿，重疼，大便秘結，小便赤澀，及風瘧之地，最宜服。

郁李仁去皮　大黃蒸焙各一兩　肉桂去麤皮　羌活去蘆

槟榔生　木香生　川芎各半兩

右為末，煉蜜溲和為圓，如梧桐子大，每服十五圓至二十圓，溫熟水下，食後臨臥服，更量臟腑虛實加減服。

【七寶圓】療風氣結聚，宿食不消，兼砂石皮毛在腹中，及積年腰脚疼痛，冷如冰石，脚氣衝心，煩悶亂，頭旋昏倒，肩背重痛，心腹脹滿，胸脇閉塞，風毒腫氣，連及頭面，大便或秘，小便時澀，脾胃氣弱，不能飲食，脚轉筋攣痛，驚急，心神恍惚，眠臥不安等疾。

訶黎勒皮　柴胡去苗洗　枳實麩　木香各五兩

桃仁去皮尖，麩，六兩　大黃經醋煨，十五兩　甘草炙，六兩

右為末，煉蜜圓如梧桐子大，每服二十圓，米飲下，食後臨臥服，稍增至四五十圓，取宜利為度，冤病勢退，服五補圓，不問男女老少，並宜服，量虛實加減服。

【七寶湯】治脾胃虛弱，內受寒氣，泄瀉注下，水穀不分，腹脇脹滿，臍腹疼痛，心下氣逆，腹中虛鳴，嘔吐惡心，胃脘痞悶，困倦少力，不思飲食。

茴香去土，炒　川烏炮，去皮臍　縮砂殼仁各八兩　甘草六兩

乾薑炮，四兩　厚朴去皮，薑製　益智去皮，各一斤

右為麤末，每服二錢，水一盞，大棗七箇，擘破，同煎七分，去滓，溫服，食前空心。

【胃風湯】治大人小兒風冷乘虛入客腸胃，水穀不化，泄瀉注下，腹脇虛滿，腸鳴疼痛，及腸胃濕毒，下如豆汁，或下瘀血，日夜無度，並宜服。

白芍藥　白朮　肉桂去麤皮　人蔘去蘆

當歸　芎藭　茯苓去皮，各等分

右為麤末，每服二錢，水一大盞，粟米百餘粒，同煎七分，去滓，稍熱服，空心，小兒益力減之。

【半硫圓】除積冷，暖元臟，溫脾胃，進飲食，治心腹一切痃癖冷氣，及年高風秘冷秘，或泄瀉等，並皆治之。

硫黃明淨好者，研令極細，用柳木槌子絞過　半夏湯洗七次，焙乾為末

右等分，以生薑自然汁同熬入乾薑餅，末攪和勻，入臼內，杵數百下，圓如梧桐子大，每服空心溫酒或生薑湯下，十五圓至二十圓，婦人醋湯下。

【赤石脂散】治腸胃虛弱，水穀不化，泄瀉注下，腹中雷鳴，及冷熱不調，下痢赤白，腸滑腹痛，逼數頻多，腸肋虛滿，胃脘痞悶，肢體困倦，飲食減少。

縮砂仁二十箇　赤石脂　甘草炙，各五兩　肉豆蔻仁經麩煨令熟，四十兩

右為末，每服二錢，溫粟米飲調下，食前空心服。

紹興續添方

【純陽眞人養臟湯】治大人小兒腸胃虛弱，冷熱不調，臟腑受寒，下痢赤白，或便膿血，有如魚腦，裏急後重，臍腹疞痛，日夜無度，胃脘痞悶，脇肋脹滿，全不思食，及治脫肛墜下，酒毒便血，諸藥不效者，並治之。

白芍藥一兩六兩　當歸去蘆　人蔘去蘆　白朮各六錢

肉豆蔻麵煨，半兩　肉桂去麤皮　甘草炙，各八錢　木香一兩四錢

訶子皮一兩二錢　罌粟殼去蒂蜜炙，三兩六錢

左為麤末，每服二大錢，水一盞半，煎八分，去滓，食前溫服，老人孕婦小兒羸瘦，急宜服之，立愈，忌酒輕生冷魚腥油膩，如臟腑滑澼，夜起久不瘥者，可加炮了附子三四片，前服，此藥的有神效，不可具

遠。

【威應圓】治腫并方見一切氣類。

【大巳寒圓】治腫并方見傷寒類。

寶慶新添方

【御米湯】治久患痢疾，或赤或白，臍腹疞痛，裏急後墜，發歇無時，日夕無度，及下血不已，全不入食，並治之。

罌粟殼蜜炙　白茯苓去皮　甘草炙各五兩　人參去蘆

乾薑炮各二兩半　厚朴去粗皮，薑製炒十兩

右㕮咀，每服三錢，水一盞半，生薑三片，大棗二枚，烏梅一箇，煎至一盞，去滓，空心食前溫口服，如年老及七八十歲，每服二大錢，小兒每服一錢半，更量兒歲加減。

【地榆散】治腸胃氣虛，冷熱不調，泄瀉不止，或下鮮血，或如豆汁，或如豚肝，或膿血相雜，赤多白少，腹痛後重，過數頻併，全不入食，並宜服之。又方見後。

罌粟殼去穰蜜炒　石榴皮　蓮蕊去蕊　甘草炒各兩半分

右㕮咀，每服二大錢，水一盞半，生薑三片，煎至一盞，通口服，不拘時候。

【金粟湯】治丈夫婦人室女小兒，一切下痢，無問新久冷熱不調，日夜無度，臍腹絞痛，即痢，肢體困倦，小便閉澁，不思飲食，漸加羸瘦，又治傷生冷，脾胃怯弱，飲食不消，腹脹雷鳴，泄瀉不止，連月不瘥，並宜服之。

罌粟殼去穰蜜炒　甘草炒各半斤　陳皮去白一兩一分　車前子四兩炒

乾薑二兩炮

右㕮咀，每服二大錢，水一盞，棗一枚，生薑二片，煎至七分，空心食前稍熱服，或用飯飲調下亦得。忌生冷油膩魚腥鮓醬等物。

【育腸圓】治腸胃虛弱，內挾生冷，腹脹泄瀉，時時刺痛，裏急後重，下痢赤白，或變膿血，晝夜頻併，經久不瘥。

烏梅肉　黃連去鬚，各一分　當歸去蘆，酒浸，焙一兩　罌粟殼去蒂筋，蜜炙，各半兩

肉豆蔻紙裹煨　訶子皮

右為細末，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓至五十圓，空心食前飯飲下，如小兒作小圓，煎甘草乾薑湯下。

【腸風黑散】治榮衛氣虛，風邪冷氣，進襲腸胃之內，或食生冷，或熱炙煿，或飲酒過度，積熱腸間，致使腸胃虛弱，精粕不聚，大便鮮血，臍腹疞痛，裏急後重，或肛門脫出，或久患酒痢，大便頻併，並皆治之。

木賊燒　敗棗燒　烏梅去核　甘草炙各二兩

右為細末，每服二錢，水一盞，煎至七分，空心溫服。

【斗門散】治八種毒痢，臟腑撮痛，膿血赤白，或有五色相雜，日夜頻併，兼治禁口惡痢，裏急後重，大渴不止，酒痢臟毒，全不進食。又方見後。

罌粟殼去穰蜜炙　黑豆炒去殼各四兩　當歸去蘆　乾薑炮各一兩

地榆去蘆　甘草炙各二兩　乾葛去皮半斤

右為細末，每服二錢，水一盞，煎至七分，溫服，不拘時候。

【水煮木香圓】治一切赤白膿血相雜，裏急後重，或臟腑滑泄，日夜無度，或積寒久冷，臍腹疞痛，可思飲食。又方見後。

青皮去白　甘草炙各二兩四錢　罌粟殼去穰二兩八錢　當歸去蘆

訶子炮去核　木香不見火各六兩

右為細末，煉蜜圓如彈子大，每服一圓，水八分盞，煎至六分，空心食前溫服。

淳祐新添方

【大斷下圓】治臟腑停寒，腸胃虛弱，腹痛泄瀉，全不思食。

高良薑去蘆　赤石脂研　乾薑炮　龍骨研各一兩半

酸石榴皮去瓤淨，米醋浸一宿，炙焦黃色　白蘞炮　附子炮去皮臍

肉豆蔻麩煨　訶子煨去核　牡蠣火燒各一兩　細辛去土葉七錢半

右為細末，醋麵糊為圓，如梧桐子大，每服五十圓，空心溫米飲下。

【狗頭骨圓】治久患下痢，臍腹疞痛，所下雜色，晝夜不止，或其人久虛，頻下腸垢，謂之惡痢，並能治之。

肉豆蔻麩煨　附子炮去皮臍　狗頭骨一具火燒存性取末　乾薑各半兩

赤石脂　敗龜燒存性

右為末，醋糊圓如梧桐子大，每服五七十圓，米飲空心下。

吳直閣增諸家名方

【水煮木香圓】治證與前水煮木香圓同。

白芍藥　當歸去蘆各二兩　罌粟殼去蒂蓋，蜜炒黃色八兩

陳橘皮去白　青皮去白　甘草炙　木香各一兩一分

訶子皮去核二兩半

右為細末，煉蜜圓，每一兩作六圓，每服一圓，水一盞，煎至七分，和滓空心溫服，不拘時亦得。

【大香連圓】治丈夫婦人腸胃虛弱，冷熱不調，泄瀉煩渴，米穀不化，腹脹腸鳴，胃脘痞悶，脇肋脹滿，或下痢膿血，裏急後重，夜起頻併，可思飲食，咸小便不利，肢體倦怠，漸即瘦弱。

木香四兩八錢八分　黃連去蘆鬚二十兩，用吳茱萸十兩同炒令赤，去茱萸不用

右為細末，醋糊為圓，如梧桐子大，每服二十圓，飯飲吞下，空心食前，日進三二服。

【戊己圓】治脾受濕氣，泄痢不止，米穀遲化，臍腹刺痛，小兒有疳氣下痢，亦能治之。

吳茱萸去梗，炒　黃連去鬚　白芍藥各五兩

右爲細末，蒸餅爲圓，如梧桐子大，每服二十圓，溫飲米飲下，空心日三服。

【痢瞿散子】治丈夫婦人遠年日近赤白休息等痢。

黃柏皮去麤皮　枳殼去穰　甘草炙　御米即罌粟子

罌粟殼去蒂萼，各四兩，乾薑炮

右爲麤散，每服三錢，水一盞半，薑白二條，擣碎同煎八分，去滓，食前溫服，老人小兒加減服，食忌生冷油膩物。

【豆附圓】治丈夫婦人腸胃虛弱，內受風冷，水穀不化，泄瀉注下，腹痛腸鳴，手足厥冷，服諸藥不效者，此藥主之。

肉豆蔻炮　附子炮，去皮臍　茯苓白者，焙，各四兩　木香不見火

肉桂去麤皮　乾薑炮，各二兩　丁香一兩，不見火

右爲細末，薑汁麵糊爲圓，如梧桐子大，每服五十圓至一百圓，生薑湯下，或嚼飲亦得，空心食前進。

【溫中圓】治脾臟傷冷，宿食不消，霍亂吐瀉，心腹膨脹攻刺。

良薑去蘆　乾薑炮　青皮去白　陳皮去白，各五兩

右爲細末，用醋打麵糊爲圓，如梧桐子大，每服三十圓，米飲下，不拘時候，又療丈夫小腸疝氣塊痞痛，炒茴香少許，嚼鹽湯或鹽酒任下，日進二服。

【肉豆蔻散】治脾胃氣虛，腹脇脹滿，水穀不消，臟腑滑瀉，腹內雷鳴，困倦少力，口苦舌乾，不思飲食，日漸羸弱。

訶子皮　川烏炮，去皮臍　肉桂去麤皮　茴香炒，各二兩

肉豆蔻麵裹煨　厚朴去麤皮，薑炒　甘草炙　乾薑炮

陳橘皮各四兩　蒼朮米泔浸一宿，去皮焙，八兩

右爲末，每服二錢，水一盞，薑二片，棗一枚，煎七分，溫服。

【神應黑玉丹】治丈夫婦人久新腸風痔瘻，着床，頭痛不可忍者，服此藥不過三四次，便見功效，初得此疾，發痒或疼，穀道周回，多生硬核，此是痔，如破，是瘻，只下血，是風，皆因酒色氣風食五事過度，即成此疾，人多以外醫塗治，病在腸，自有蟲，若不去根本，其病不除，此藥的有神效。

刺蝟皮十六兩　猪懸蹄一百隻　雷丸　脂麻各四兩

牛角腮十二兩　苦楝根五兩　亂髮皂角水洗焙　敗櫚各八兩

槐角六兩

右剉碎，用瓷罐內燒存性，研爲末，入乳香二兩，麝香八錢，研和勻，用酒打麵糊爲圓，如梧桐子大，每

服八粒，先細嚼胡桃一枚，以溫酒吞下，空心晚食前，日二服，如病甚，日三服，切忌別藥，不過三兩日，永除根本。

【罌粟湯】治腸胃氣虛，冷熱不調，或飲食生冷，內傷脾胃，或飲酒過度，臍腹疼痛，泄瀉腸鳴，下痢或赤或白，裏急後重，日夜頻併，飲食減少，及腸胃受濕，膨脹虛鳴，下如豆汁，或下鮮血。

罌粟殼去蒂萼，炙，四兩　艾葉去梗　黑豆炒，去皮　乾薑炮

陳皮去白　甘草炙，各二兩

右爲麤散，每服三錢，水一盞半，煎至一盞，去滓，溫服，食前，忌生冷油膩等物，小兒量歲數加減與之。

【固腸散】治脾胃虛弱，內受寒氣，泄瀉注下，水穀不分，冷熱不調，下痢膿血，赤少白多，或如魚腦，腸滑腹痛，逼數類併，心腹脹滿，食減少力。

陳米炒，二十兩　肉豆蔻生用　罌粟殼去蒂萼　艾葉炙，各二兩　乾薑炮

甘草炙，各二兩半　木香一兩，不見火

右爲末，每服二錢，酒一盞，生薑二片，棗一枚，同煎至七分，溫服，不計時，如不飲酒，水煎亦得，忌酒麵魚腥等物。

【鍋兆圓】治時暑暴瀉，壯脾溫胃，進美飲食，及療飲食所傷，胃脘痞悶。

神麯炒　蒼朮米泔浸一宿，焙乾

右各等分爲細末，麵糊爲圓，如梧桐子大，每服三十圓，不拘時，米飲吞下。

【鍋金丹】治大人小兒一切瀉痢，無問冷熱赤白，連綿不瘥，愈而復發，腹中疼痛者，宜服之。

白膠香一錢　黃蠟　硃砂各一兩　乳香

硇砂各二錢半　木鼈半兩　黃丹二兩半　砒霜三錢半，醋煮爛

巴豆去皮心膜出油　杏仁去皮尖及雙仁者，各八兩

右研爲末，鍋蠟和圓，如麻子仁大，每服一圓，小兒半圓，水寫，新汲水下，亦痢，甘草湯下，白痢，乾薑湯下，脾疼亦然，腰痛，冷酒下，並食前，小兒圓如黍米大，每服一圓，湯使同上。

【遇仙立效散】治諸般痢，或赤或白，或濃淡相雜，裏急後重，臍腹絞痛，或下五色，或如魚腦，日夜無度，或禁口不食，不問大人小兒虛弱老人產婦，並宜服之。

御米殼去蒂萼，炒　川當歸去蘆　甘草各二兩　赤芍藥

酸榴皮　地榆各半兩

右爲麤散，每服三錢，水一盞半，煎至七分，空心溫服。小兒益齒數加減，以意爲度。忌生冷油膩腥臊等物。

【三神圓】治清濁不分，泄瀉注下，或赤或白，臍腹疞痛，裏急後重。

草烏三枚，各去皮尖，一生一炮，一燒作灰。

右爲細末，醋糊圓如蘿蔔子大，大人五七圓，小兒三圓，水瀉，倒流水下，赤痢，甘草湯下，白痢，乾薑湯下。

續添醫局經驗秘方

【地榆散】治大人小兒脾胃氣虛，冷熱不調，下痢膿血，或因腸胃乘虛爲熱毒所滲，下痢純血，臍腹疞痛，裏急後重，口燥煩渴，小便不利，純下鮮血，或先經下痢，不應服熱藥而誤服熱藥，蘊毒不散，積於腸間，滲面成血者，並宜服之。

赤芍藥　茯苓去皮各六兩　地榆炒　乾薑各半斤

罌粟殼蜜炒十二兩　當歸去蘆三兩　甘草炙四兩　乾薑炮二兩

右爲細末，每服二錢，用溫熟水調下，不拘時候，小兒三歲可服半錢，更量歲數加減與之。若下痢純白或下紫黑血腸胃不禁者，不可服之。

【秘傳斗門散】治八種毒痢，臍腹撮痛，膿血赤白，或下瘀血，或成片子，或有五色相雜，日夜頻併，兼治禁口惡痢，裏急後重，久渴不止，全不進食，他藥不能治者，立見神效。

罌粟殼蜜炒半斤　地榆炒　甘草炙各六兩　白芍藥三兩

乾薑炮四兩　黑豆炒去皮十二兩

右爲細末，每服二錢，水一盞，同煎至七分，溫服。

【丁香豆蔻散】治脾胃虛弱，宿寒停積，或飲食生冷，內傷脾胃，泄瀉注下，水穀不化，胷滿短氣，嘔逆惡心，臍腹疞痛，脇肋脹滿，腹內虛鳴，飲食減少，及積寒久痢純白，或白多赤少，日夜無度，或脾胃虛寒，泄瀉日久，愈而復發者，並宜服之。

京三稜炮　白茯苓去皮　木香不見火　乾薑炮

肉豆蔻炮　厚朴去麤皮，薑汁製　人參去蘆　芍藥各五兩

吳茱萸湯洗七次　甘草炙　丁香各一兩半　荜茇去皮七兩

右爲細末，每服三錢，水一盞，生薑三片，棗一枚，同煎至八分，空心食前溫服，如不及煎，量少許湯點服亦得。

【萬金飲】治脾胃虛弱，內受風寒，或飲食生冷，傷於脾胃，嘔吐泄瀉，臍腹疞痛，脇肋脹滿，腸內虛鳴，及腸胃受濕，膿血相雜，下如豆汁，或下瘀血，裏急後重，日夜無度，飲食減少，漸至羸瘦，並能治之。

陳皮去白　甘草半生半炙　罌粟殼去蘆，半生半蜜炙各等分

右爲麤末，每服四錢，先用沸湯泡過熱，又於椀內盛薑湯，蓋罩在內，却抄藥末在罩內，用沸湯泡至七分，罩上用鹽泥之，良久，紗絹濾去滓，空心食前溫服。

【如神止瀉圓】治臟腑虛寒，脾胃受濕，泄瀉無度，腸鳴腹痛，不進飲食，漸至羸瘦，並宜服之。

蒼朮米泔浸，去黑皮，焙　半夏湯洗七次，去滑，各半斤　川烏米泔浸軟，去皮，切作片，焙乾，用鹽四兩同炒黃色爲度，去鹽不用，淨秤四兩

右爲末，薑汁和圓，如梧桐子大，每服五十圓，空心飯飲下。

【神效參香散】治大人小兒臟氣虛怯，冷熱不調，積在臟腑，作成痢疾，或下鮮血，或如豆汁，或如魚腦，或下瘀血，或下紫黑血，或赤白相雜，或成五色，裏急後重，日夜頻併，臍腹絞痛，甚不可忍，及禁口痢，臨時痛諸痢，無新舊，並能治之。

肉豆蔻去皮　茯苓去皮各四兩　人參去蘆　木香

白扁豆炒各二兩　罌粟殼去蒂　陳皮去白各十二兩

右爲末，每服三大錢，溫米飲調下，不拘時候，立見神效。

【黃耆湯】治年高老人大便秘澀。

綿黃耆　陳皮去白各半兩

右爲細末，每服三錢，用大麻仁一合，細研，以水投取漿一盞，去滓，於鐵石器內煎，候有乳起，即入白蜜一大匙，再煎令沸，調藥末，空心食前服，秘甚者，不過兩服愈，常服即無秘澀之患，此藥不冷不燥，其效如神。

增廣太平惠民和劑局方卷七

眼目

【錦雞圓】治肝經不足，風邪內乘，上攻眼睛淚出，怕日羞明，隱澀羞痛，瞻視茫茫，多見黑花，或生醫膜，並皆治之。

甘菊花揀淨　黃連去鬚　防風去蘆　細辛去苗
杜蒺藜炒去尖角　牡蠣火煅取粉用　官桂去麤皮各五兩　糯麥
草決明　羌活去蘆　蕤仁去皮各三兩　白茯苓去皮四兩
蓽澄茄二兩，淘洗，銅器盛，飯甑蒸一伏時，曬　班蝥一隻，去皮毛翅爪，用文武火連骨炒乾
羯羊肝一具，薄批炙乾令焦

右為末，煉蜜和杵五百下，圓如梧桐子大，每服十五圓至二十圓，以溫水或溫酒下，空心，日午，臨臥，日三服，如久患內外障眼，服諸藥不效者，漸加服五十圓必效。若眼疼痛，食後用荊芥湯下二十圓。

【駐景圓】治肝腎俱虛，眼常昏暗，多見黑花，或生障醫，視物不明，迎風有淚，久服補肝腎，增目力。

熟乾地黃　車前子各三兩　兔絲子酒浸別研八兩

右為末，煉蜜為圓，如梧桐子大，每服三十圓，溫酒下，空心晚食前日二服。

【蜜蒙花散】治風氣攻注，兩眼昏暗，眵淚羞明，臉生風粟，隱澀難開，或瘙或痛，漸生醫膜，視物不明，及久患頭疼牽引兩眼，漸髮細小，昏澀隱痛，并暴赤腫痛，並皆治之。

蜜蒙花揀淨　石決明煅炒　羌活去蘆　菊花去土
杜蒺藜炒去尖　木賊各等分

右為細末，每服一錢，腦茶清調下，食後日二服。

【羚羊角散】治大人小兒一切風熱毒上衝眼目，暴發赤腫，或生瘡疼痛，隱澀羞明。

羚羊角鎊　車前子　甘草微炙
川升麻各十兩　決明子二十兩，炒　草龍膽去蘆　黃芩
山梔取仁各五兩

右為細末，每服一錢，食後溫熱水調下，日進三服，小兒可服半錢。

【秦皮散】治大人小兒風毒赤眼，腫痛瘡澀，眵淚昏暗羞明。

滑石桂府者，搗碎　黃連去鬚　秦皮各十兩

右為細末，每用半錢，沸湯泡去滓，溫熱頻洗。

【鎮肝圓】治肝經不足，內受風熱，上攻眼目，昏暗瘡痛，隱澀難開，推眵多淚，怕日羞明，時發腫赤，或生障醫，並宜服之。

決明子炒　地膚子　遠志去心　防風去蘆及叉
蔓荊子去白皮　蒐葵子　茯苓白者去皮　人參去蘆各一兩
青箱子　柏子仁炒　元參　甘草炙
車前子　地骨皮　山藥　柴胡去蘆
甘菊花各半兩　細辛去苗一分

右為細末，蜜水煮糊為圓，如梧桐子大，每服二十圓，用米飲下，食後日二服。

【菊睛圓】治肝腎不足，眼目昏暗，瞻視不明，茫茫漠漠，常見黑花，多有冷淚，久服補不足，強目力。

甘菊花四兩　巴戟去心一兩　蓯蓉酒浸去皮，炒切焙二兩
枸杞子三兩

右為細末，煉蜜為圓，如梧桐子大，每服三十圓至五十圓，溫酒或鹽湯下，空心食前服。

紹興續添方

【菩薩散】治男子婦人風氣攻注兩目昏暗，眵淚羞明，臉眥眩痒，或時赤痛，耳鳴頭眩。

白蒺藜炒　防風剉炒　蒼朮米泔浸一宿，去皮剉炒各二兩
荊芥穗一兩半　甘草炙一兩

右為末，不拘時，入鹽少許沸湯或溫酒調下一大錢，研敷。

【撥雲散】治男子婦人風毒上攻眼目昏暗，醫膜遮障，怕日羞明，眼多熱淚，隱澀難開，眶痒赤痛，臉皆紅爛，瘀肉侵睛，但是一切風毒眼疾，並皆治之。

羌活　防風　甘草炙　柴胡各一斤

右為細末，每服二錢，水一中盞，煎至七分，食後臨睡時服，薄荷茶調菊花苗湯下亦得，忌魚鹅鮮醬鹽，及炙煿發風毒等物。

寶鑑新增方

【草龍膽散】治上焦受於風熱氣毒攻衝眼目，暴赤，躁澀羞明，腫痛多眵，迎風有淚，醫膜翳睛，裹肉隱痛，並治之。又方見後。

龍膽草洗，去土　菊花去梗　木賊洗，去節　草決明子微炒

甘草炙各二兩　香附子炒，去毛　川芎不見火各四兩

右為細末，每服二錢，用麥門冬熟水入砂糖少許同調，食後服，或米泔調，或食後臨睡服。

【蟬花散】治肝經蘊熱，風毒之氣內搏，上攻眼目，醫膜遮睛，赤腫疼痛，昏暗視物不明，隱澀難開，多生眵淚，內外障眼。

草決明炒　甘菊花去梗　川芎不見火　蟬退洗，去土

山梔子去殼　穀精草去土　防風不見火　黃芩去土

蔓荊子去皮　木賊草洗淨　羌活不見火　荊芥去穗

蜜蒙花去枝　白蒺藜炒，去土　甘草各等分

右為末，每服二錢，用茶清調服，或用荊芥湯入茶少許調服亦得，食後及臨臥時服。

淳祐新添方

【春雪膏】治肝經不足，內受風熱，上攻頭目，昏暗疼痛，隱澀難開，昏眩赤腫，怕日羞明，不能遠視，迎風有淚，多見黑花。

腦子二錢半，研　蕤仁去皮殼壓去油二兩

右用生蜜六錢，將腦子蕤仁同和，每用銅筯或金銀鈸殷，大小皆時，挑少許蕤之，治迎風赤爛，以油紙塗貼。

吳直閣增諸家名方

【流氣飲】治肝經不足，內受風熱，上攻眼目，昏暗視物不明，常見黑花，當風多淚，怕日羞明，推眵赤腫，隱澀難開，或生障翳，倒睫拳毛，眼眩赤爛，及婦人血風眼，及時行暴赤腫眼，眼胞紫黑，應有眼疾，並宜服之。

牛蒡子炒　荊芥去穗　細辛去苗

白蒺藜去尖，炒　元參去蘆　大黃煨

蔓荊子去白皮　黃芩去蘆　防風去蘆

菊花去枝　甘草炙

山梔子去皮　川芎各一兩　草決明一兩半

右為細末，每服二錢半，臨臥用冷酒調下，如牙兒有患，只令乳母服之。

【洗肝散】治風毒上攻，暴作赤目，腫疾難開，隱澀眵淚，昏暗羞明，或生醫膜。

山梔炒仁　川芎　防風去蘆　薄荷去梗

當歸去蘆　大黃　羌活去蘆　甘草炙各二兩

右為末，每服二錢，冷水或熱水調下，食後，日三服見效。

【菊花散】理肝氣風毒，眼目赤腫，昏暗羞明，澀澀難開，睫睛瘀肉，或痒或痛，漸生醫膜，及治暴赤腫痛。

白蒺藜炒，去尖　蟬退去頭足翅　羌活去蘆不見火　木賊草去根節各三兩

菊花去梗，六兩

右為細末，每服二錢，食後臨臥茶清調下，常服明利頭目，洗肝去風，忌發風酸鹹炙煿等物。

【明睛散】能治外障，退醫膜，療風毒上攻眼疼赤腫，或臉皆痒爛，時多熱淚昏澁。

赤芍藥　當歸去蘆，洗　黃連去鬚　滑石細研各五兩

右為細末，人研滑石拌勻，每用半錢，沸湯點澄清去滓，熱洗，忌一切酸鹹魚蝦酒麵等物。

續添諸局經驗秘方

【蟬花無比散】治大人小兒遠年近日一切風眼、氣眼、攻注眼目昏暗，臉生風粟，或痛或痒，漸生醫膜，侵睛遮障，視物不明，及久患偏正頭風，牽搐兩眼，漸漸細小，連眶赤爛，及小兒瘡疹入眼，白膜遮睛，赤澀隱痛，當服祛風退醫明目。

石決明用鹽同東流水煮一伏時，漉出研細　當歸洗焙　川芎

羌活各三兩　蛇脫微炙，一兩　防風去叉枝　茯苓去皮

甘草各四兩　蔦蕷炒，去刺，半斤　蟬退去頭足翅二兩　芍藥赤者十三兩

蒼朮浸，去皮炒，十二兩

右為細末，每服三錢，食後米泔調服，茶清亦得，忌食女風發等物。

【明眼地黃圓】治男子女人肝臟積熱，肝虛目暗，醫膜入水輪，漏睛眵淚，眼見黑花，視物不明，黏睛冷淚，醫膜遮障，及腎臟虛憊，肝受虛熱，及遠年日近暴熱赤眼，風毒氣眼，並治之，兼治乾濕脚氣，消中消渴，及諸風氣等疾，由腎氣虛敗者，但服此能補肝益腎，驅風明目，神效。

牛膝去蘆，酒浸三兩　生乾地黃　熟乾地黃各洗焙，一斤　石斛去面

防風去蘆，又　枳殼去穰，麩炒，各四兩　杏仁去皮尖，麩炒黃，細研，去油，二兩

右為細末，煉蜜為圓，如梧桐子大，每服三十圓，空心食前溫酒下，或飯飲鹽湯亦得，忌一切動風毒等物。

【洗眼紫金丹】治遠年日近醫膜遮障，攀睛醫肉，昏暗淚多，瞻視不明，或風氣攻注，臉生風粟，或迎眶赤

蒼朮二兩，米泔浸洗

爛，怕日羞明，隱澀難開，並治之。

硃砂　鵬砂　乳香各別研　赤芍藥

當歸去苗洗各一分　雄黃研飛二錢　麝香別研半錢　黃連去鬚半兩

右爲末，入研藥拌勻，再搗煉蜜溲和爲圓，如皂莢子大，每次用一圓，安淨盞內，以沸湯泡開，於無風處洗，藥冷，開目少時，候三兩時再煥令熱，依前洗，一貼可洗三五次，不得犯銅鐵器內洗，如暴赤眼腫者，不可洗之。

【草龍膽散】治眼暴赤腫痛，風氣熱上衝，睛疼連眶，臉皆赤爛，瘀肉侵睛，時多熱淚，及因喜怒逆損肝氣，久勞瞻視，役損眼力，風砂塵土入眼澀痛，致成內外障醫及一切眼疾。

草龍膽去苗　蒺藜子去刺各六兩　菊花去枝半兩　茯苓去皮四兩　防風去叉　甘草炙　赤芍藥半斤　羌活各三兩

右爲末，每服二錢，食後臨臥時溫酒調下。

【湯泡散】治肝經不足，受客熱風毒上攻，眼目赤澀，睛疼臉爛，怕日羞明，夜臥多淚，時行暴赤，兩太陽穴疼，頭旋昏眩，視物不明，漸生翳膜，並皆治之。

赤芍藥　當歸洗焙　黃連去鬚各等分

右爲末，每用二錢，極淡湯泡，乘熱熏洗，冷即再溫洗，一日三五次洗，以速爲度，忌醋蔬等物。

【遠睛圓】治男子女人風毒上攻，睛目赤腫，怕日羞明，多饒眵淚，隱澀難開，眶痒赤痛，臉皆紅爛，瘀肉侵睛，或患暴赤眼睛疼不可忍者，併服立效。

白芷生用　兔絲子酒浸別研　白蒺藜炒去刺　木賊去節

羌活去苗　青箱子去生　蜜蒙花　防風去蘆

甘草炙各等分

右爲末，煉蜜圓如彈子大，每服一圓，細嚼白湯下，空心食前日三服，又治偏正頭痛頭風頭目眩運，眼睛昏澀痛。

【谷青散】治一切風熱毒氣上攻，兩眼多生眵淚，怕日羞明，隱澀難開，眶爛赤腫，或痒或痛，及時行暴赤眼睛昏澀痛。

谷青四兩　蔓荊子去皮二兩　防風去蘆　白蒺藜各一兩

右爲細末，每用少許末搐入鼻中，立有功效。

【秘傳羊肝圓】治丈夫婦人肝經不足，風毒上攻，眼目昏暗，淚出羞明怕日，隱澀難開，或痒或痛，又治遠年日近內外醫眼攀睛，攀肉，箴刮不能治者，此藥治之。

黃連去鬚爲末　白羊子肝淨洗去膜

右將羊肝先入沙盆內杵爛之，旋入黃連末拌搗，乾濕得所，爲圓如梧桐子大，每服十四圓，食後以溫鹽水下，連作五劑瘥，但是睛般眼疾及障翳者，皆主之，禁食猪肉及冷水。○治目方用黃連

者多矣，此方最爲奇異，劉禹錫云，有進承元者，因官治一死罪囚，雨活出之，因後數年以病月致死，一且爲忽爲內障所苦，衆明，瞻年積，半夜歇息，獨處，時聞嚏除，問悉率之，嚏相問爲誰，曰，是昔所殺活囚，今故報恩至此，遂以此方告訖而沒，猶依此方合服，不數月，眼復明，因傳于世。

咽喉口齒

【龍石散】治大人小兒上膈壅毒，口舌生瘡，咽嗌腫塞，疼痛妨悶，每用少許糝貼患處，嚥津，小兒痰壅氣攻口齒，先用五福化毒丹搽後，仍再用此藥糝貼，立效。

生腦子研二錢半　硃砂研飛二兩半　寒水石燒通赤二斤

右爲末，每日三五次用，夜臥糝貼妙。

【如聖湯】治風熱毒氣上攻，咽喉閉痛，喉瘰腫塞，妨悶，及肺壅咳嗽，略壓膿血，胸滿振寒，咽乾不渴，時出濁沫，氣息腥臭，久久吐膿狀如米粥，又治傷寒咽痛。

苦桔梗一兩　甘草炙二兩

右爲麤末，每服二錢，水一盞，煎至七分，去滓溫服，小兒時時呷服，食後臨臥。

【鵬砂圓】治大人小兒風壅膈熱，咽喉腫痛，舌頰生瘡，口乾煩渴。

腦子研三分　甘草浸汁熬膏　鵬砂研各十兩　梅花腦別研一分

麝香研一兩　牙硝枯研二兩　寒水石燒通赤五十兩

右爲末，用甘草膏子和浸，每兩作四百圓，每服一圓，含化嚥津，常服化痰利膈，生津止渴。

【麝臍散】治牙齒搖動，風蟲疼痛，齦肉宣露，涎血臭氣，常用含牙齒堅牢，解骨槽毒氣。

郁李仁三十兩　木律四十四兩　麝香空皮子一百箇，細剉　黃茄二十箇，細切

牛膝去蘆十斤

已上五味，搗碎入罐子內，上用瓦子蓋，口留一小竅，用鹽泥固濟，燒令通赤，候烟白色，即住火取出，以新土罨一伏時，取出後，入下項藥。

細辛去苗　升麻各十斤

右爲細末，每用少許揩患處，須臾漱水漱口，臨臥更貼少許，嚥津亦不妨。

紹興續添方

【玉屑無憂散】治咽喉腫痛，舌頰生瘡，風毒壅塞，熱盛喉閉，或因誤吞硬物，諸骨鯁刺，涎滿氣急，或至悶亂不省人事。

白茯苓炒黃色　元參去蘆　貫衆去蘆　甘草

山豆根銼去根　黃連去鬚　縮砂去殼　滑石

荊芥穗各一兩　鵬砂二錢　寒水石二兩研水飛

右爲末，每服一錢，乾嚥舌上，後以新水嚥下，不拘時。

寶鋌新增方

【如聖勝金鋌】治急喉閉纏喉風飛鷹單蛾雙蛾結喉重舌木舌腮頷腫痛屢經用藥不能吞水粥者又方見後。

生地黃　川芎洗　硫黃研　消石研
薄荷葉　川烏炮　臘茶各二兩

右爲細末，以生葱白熱汁澆和爲鋌，每服先用新汲水溶澱吐出，次嚼生薄荷五七葉微爛，用頭一鋌同嚼極爛，以井水嚥下，甚者連進三服即愈。重者腮腫，先服一鋌，次以一鋌安患處，其病隨藥便消，又治胃昏伏熱，不省人事，用生薄荷水調研一鋌，灌下即甦，如行路常含一鋌，即無伏熱之患。口舌生瘡，不能含口，并食熱物，如上法服訖，用水漱澱，嚼薄荷十葉如泥吐出，再水漱澱，嚼薄一鋌含口內，漸漸嚥之，覺涼滿方吐出，如此服三鋌，便能食酒醋，過食鹹酸鮮脆炙煿，喉中生泡，須銷破吐血，方省薄荷數葉，以一鋌同嚼，井水吞下，炒淋酸淋小便出血，同車前草七葉生嚼小塊，研爛，水調去滓，嚼鋌一鋌，以水送下，此藥分陰陽，去風熱，化血爲涎，爲水常帶隨身備急，一鋌可活一人命，小兒只服半鋌。

淳祐新添方

【鵬砂散】治大人小兒卒患喉痹閉塞不通，腫痛生瘡，語聲不快，風壅痰嗽，鼻衄出血。

鵬砂生，　甘草各二兩，　山藥六斤生，　腦子七匣研，
麝香四匣研，　牙硝二十四兩生，

右爲細末，每服半錢，如茶點服。

吳直閣增諸家名方

【赴筵散】治風牙蚛牙，攻疰疼痛，晝夜不止，痛不可忍，睡臥不安，牙斷宜露，動搖欲脫，或腮頷浮腫，斷爛血出。

良薑去蘆，　草烏去皮，　荊芥去穗，　細辛去土，各二兩，

右爲末，每用少許於痛處擦之，有涎吐出，不得吞嚥，頃久用溫鹽湯漱，其痛即止，若使擦牙，用腐淡末一半相和，常用，止牙宣牌口氣，永無牙疾。

【吹喉散】治三焦大熱，口舌生瘡，咽喉腫塞，神思昏悶。

蒲黃一兩，　盆硝八兩，　青黛一兩半。

右件用生薄荷汁一升，將盆硝青黛蒲黃一處，用瓷罐盛，慢火熬令乾，研細，每用一字或半錢，綿子口內頻久漱出，存之不妨，或喉中腫痛，用筒子入細半錢許，用力吹之，無不立效。

續添諸局經驗秘方

【如聖勝金鋌】治證服仰與前如聖勝金鋌同，藥味小異。

朴硝四兩，　硫黃一兩半，　川芎一兩，
薄荷用葉，　嫩茶各半兩，　貝母二兩，

右爲末，以生葱白熱汁澆和爲鋌，服頭湯使一如前方。

【五香散】治咽喉腫痛，諸惡氣結澀不通，急宜服之。

鶴苦香　木香　沉香　薰陸香各一兩，
麝香別研三分，

右爲末，入麝香研令勻，每服二錢，水一中盞，煎至六分，溫服，不拘時候。

【如神散】治風牙蚛牙，攻疰疼痛，日夜不止，睡臥不安，或牙斷動搖，連頰浮腫，不拘久近，並皆治之。

蕊蜂房微炙，　川椒去目及閉口者，微炒出汗，

右爲末，每服一錢，水一盞，入鹽少許，同煎八分，乘熱漱之，冷即吐出，一服立效。

【玉池散】治風蛀牙疼，腫痒動搖，牙龈潰爛，宜露出血口氣等疾。

當歸去蘆，　甘草炙，　川芎，
白芷，　槐花炒，　藁本，
細辛去苗，　升麻各等分，

右爲末，每用少許揩牙，痛甚即取二錢，水一盞，中煎五分，含生薑三片，頻至一盞，漸溫漱口，候冷吐之。

【荊芥湯】治風熱肺壅，咽喉腫痛，語聲不出，或如有硬鯁物。

荊芥穗半兩，　甘草炙一兩，　桔梗二兩，

右爲麤末，每服四錢，水一盞，薑三片，煎六分，食後溫服。

【細辛散】治風蚛牙疼，或牙斷宜爛，牙齒搖動，腮頷浮腫。

紅椒，　縮砂去殼，　鶴虱，　牙皂，
蓽撥各半兩，　荊芥去穗，　細辛去苗，各一兩，
草烏各二兩，　白芷，

右爲細末，每用少許於痛處擦之，有涎吐出，不得嚥，少時用溫水漱口，頻頻擦之，立有神效。

增廣太平惠民和劑局方卷八

雜病

【耆婆萬病圓】療七種癖塊、五種癲病、十種痓忤、七種戚尸、十二種蠱毒、五種黃病、十二時瘧疾、十種水病、八種大風、十二種癩癘、并風入頭眼暗漠漠、及上氣咳嗽、喉中如水雞聲、不得臥、飲食不作、肌膚五臟滯氣、積聚不消、壅閉不通、心腹脹滿、連及胸背、鼓脹氣堅結、流入四肢、或腹、又心腦氣滿、時定時發、十年二十年不愈、五種下痢、疳蟲、蚘蟲、寸白蟲、諸蟲、上下冷熱、久積痰飲、令人多眠睡、消瘦無力、陰入骨髓、使成滯疾、身體氣腫、飲食嘔逆、腰脚酸疼、四肢沉重、不能久行久立、婦人因產冷入子臟、臟中不淨、或閉塞不通、胞中瘀血冷滯、出流不盡、時時疼痛、爲患、或因此斷產、并小兒赤白下痢、及狐臭、耳聾、鼻塞等病、服此以三圓爲一劑、服不過三劑、萬病悉除、說無窮盡、故稱萬病圓。

牛黃研細、　黃芩　　茜根醋炒赤、　禹餘糧醋淬研飛、
蒲黃微炒、　芎藭　　人參去蘆、　紫菀去蘆頭、
雄黃研飛、　當歸去蘆、　麝香研、　桔梗去蘆、
大戟剉炒、　乾薑炮、　防風去蘆、　黃連去鬚、
硃砂研飛、　犀角鎊、　前胡去蘆、　巴豆去皮心膜炒、

細辛去苗、　葶藶炒、　肉桂去麤皮、　桑白皮剉炒、
茯苓去皮、　芍藥　　芫青二十八枚、入糯米同炒、米色黃黑、去頭足翅、　川椒去目及閉口者、微炒出汗、
甘遂各一兩、　石蜥蜴去頭尾足、炙、一寸、
蜈蚣十二節、去頭足、炙、

右爲細末、入研藥匀、煉蜜爲圓、如小豆大、若一歲已下小兒有疾者、令乳母服兩小豆、血出以吐利爲度、近病及卒病、用多服、積久疾病、即便服、常服微通利爲度、卒病欲死、服三圓、取吐利即愈、卒中惡口噤、服二圓、噤一合、下利即愈、五痓丸刺客忤、服二圓、與女邪病欲哭、服大如麻子、服二圓、日三夜一圓、食服之、蠱毒吐血、腹痛如刺、服二圓、不瘥更服、癲病未發前、服一圓、未瘥更服、諸有痰飲者、服三圓、冷癖、服三圓、日三服、皆閒食、常令微利、宿食不消、服二圓、取利瘥、瘧瘧積聚、服二圓、日三服、痞滯、服二圓、以一圓如杏仁大、和醋二合、溫下、部中水病、服三圓、日再服、閒食服之、小便不盡、服二圓、不瘥、明日更服、大便不通、服三圓、又內一圓下部中即通、耳聾聽耳、以綿裹如棗核塞之、鼻塞、服二圓、雜服下腫破腹、內一圓如麻子大、日一傅之、視亦白出、視丁瘡血出、以猪脂和塗、有孔內孔中、瘥、瘙癢、以醉猪洗乾、取藥和猪脂傅之、瘙癢有孔、以一圓內孔中、和猪脂傅上、痔瘡、塗綿筋上內孔中、日別易、瘥止、漸減以醉和塗上、瘥、瘙癢、以布裹令汁出、以醉和塗上、日一易、瘥止、胷背膨脹、以醋和傅腹上、日一易、又服二圓、諸冷癖積年不瘥、以酢和塗之、惡刺、以一圓內瘡孔中、即瘥、頰蛇螫、以少許內螫處、若毒入腹心煩欲絕者、服三圓、蜂螫、以少許傅之、瘥、婦人諸疾、胞衣不下、服二圓、小兒驚癇、服一圓、如米許、以塗乳、令嚼之、若兒大小加減、小兒客忤、服一圓、如米、和乳塗乳頭、令嚼之、以意量之、鳴螫、以少許傅之、瘥、小兒乳不消、心腹脹滿、服一圓如米許、塗乳頭、令嚼之、即瘥。

【神應圓】治腎經不足、風冷乘之、腰痛如折、引背脊俛仰不利、轉側亦難、或因役用過多、勞傷於腎、或因霧冷濕地氣傷腰、或因墜墮傷損、或因風寒客搏、皆令腰痛、並皆治之。

肉桂去麤皮、　當歸去蘆、各十兩、　威靈仙去土二十兩、

右爲末、以酒煮麵糊爲圓、如梧桐子大、每服十五圓、溫酒或溫薑香湯下、食前服、婦人加桂心湯下、加至二十圓、有孕婦人不得服、忌食苦菜、

【乘效圓】治男腎虛弱、或多食甘肥、致蠱蟲動作、心腹攪痛、發作腫聚、往來上下、痛有休止、腹中煩熱、口吐涎沫、即是蠱咬、宜服此藥、若積年不差、服之亦愈、又療下部有蟲、生瘡痒痛。

木香不見火、　鶴虱　　附子炮、去皮臍、　訶黎勒煨、用皮肉、
蕪荑炒、研、　檳榔　　乾薑炮、各七兩半、　大黃剉、蒸、十五兩、

右爲末、煉蜜爲圓、如梧桐子大、每服三十圓、食前橘皮湯下、婦人醋湯下、

【乳香圓】治諸痔下血，肛邊生肉，或結核腫疼，或生瘡痒痛，或大便難難，肛腸風下，又治腸風下血，無問新久及諸瘻根在臟腑，並能治之。

芫青去頭足翅，同糯米炒，以米色黃為度　枳殼去穰，麩炒　大黃蒸　牡蠣火煅　鶴虱炒，各半兩　乳香研

白丁香一分

右為末，以糯米糊為圓，如梧桐子大，每服十圓至十五圓，如治腸風，溫茶清下；諸痔，煎雞白湯下；諸瘻，煎鐵屑湯下，並食前服。

【解毒雄黃圓】解毒，治纏喉風，及急喉痹，卒然倒仆，失音不語，或牙關緊急，不省人事。

雄黃研飛　鬱金各一分　巴豆去皮，出油，十四箇

右為末，醋煮麵糊為圓，如菉豆大，用熱茶清下七圓，吐出頑涎，立便蘇省；未吐，再服；如至死者，心頭微熱，灌藥不下，即以刀尺鍬匙斡開口灌之，藥下喉嚨，無有不活。吐瀉些小無妨，及治上隔壅熱，痰涎不利，喉嚨腫痛，赤眼癰腫，一切毒熱，並宜服之。如小兒患喉嚨赤腫，及為熱痰涎壅塞，服二圓或三圓，量兒大小加減。

【麩煎餅子】治一切瘧病，發作有時，先覺伸欠，乃作寒慄，鼓振頤頷，中外皆寒，腰脊俱痛，寒戰既已，內外皆熱，頭痛如破，渴欲飲冷，或痰聚胸中，煩滿欲嘔，或先熱後寒，或先寒後熱，或寒多熱少，或熱多寒少，或寒熱相半，或但熱不寒，或但寒不熱，或一日一發，或隔日一發，或一發後六七日再發，並皆主之。

龍腦　麝香　定粉各研半兩　荷葉燒

菉豆末　甘草煎，各五兩　硃砂一兩一分，研飛　信砒醋煮，二兩半

金箔二十五片為衣

右為末，煉蜜煎和，每兩作二十丸，捏扁，以金箔為衣，每服一餅子，以新汲水磨化，日發者，未發前服之；間日者，不發夜服；隔數日發者，前一日夜服，連日者，臨晨服。

【烏梅圓】臟寒蟲蟲動作，上入腸中，煩悶嘔吐，時發時止，得食即嘔，常自吐蛔，有此證，謂之蛔厥，此藥主之，又治久痢。

烏梅三百枚　乾薑十兩，炮　黃連去鬚，十六兩　細辛去苗

附子炮，去皮臍　肉桂去皮　人參去蘆　黃蘗炙，各六兩

當歸去蘆　蜀椒去目及閉口者，微炒出汗，四兩

右異搗篩，食治之，以醋浸烏梅一宿，去核，蒸之五斗米下，飯熟，搗成泥，和藥令相得，內臼中，與煉蜜杵一千下，圓如梧桐子大，每服十五圓，溫米飲下，食前服。

【神效散】藥名靈散，治十種水氣，面目四肢，遍身俱腫，以手按之，隨手而起，咳逆喘急，不得安臥，腹大腫脹，口苦舌乾，小便赤澀，大便不利。

葶藶炒香別研，三兩　椒目一兩半　黑牽牛微炒，二兩半　猪苓去黑皮

澤瀉各二兩

右為細末，每服以漿白三匙，蜜水一盞，溶五半盞，入酒半盞，調藥三錢，絕早面向東服，如人行十里久，以蜜水漱口，煮稀粥，至巳時，入酒五合，熱暖，益人暖多少，須發一升許，不得喫鹽并麵，自辰至午，當利小便三四升，或大便利，嚼定，減七分，隔日再服，既平之後，必須大將息，及斷鹽房室等三年。

【立效散】治下焦結熱，小便黃赤，淋閉疼痛，或有血出，及大小便俱出血者，亦宜服之。

瞿麥穗一兩　甘草三分　山梔子去皮，炒半兩

右為末，每服五錢至七錢，水一椀，入瓶煎，漸白七葉，燈心五十莖，生薑五七片，同煎至七分，時時溫服，不拘時。

【必勝散】治男子婦人血妄流溢，吐血，衄血，嘔血，咯血。

人參去蘆　蒲黃微炒　小蓟井根用

當歸去蘆　烏梅去核　芎藭各一兩

右為粗散，每服五錢，水一盞半，煎七分，溫服，不拘時候。

【釣腸圓】治久新諸痔，肛邊腫痛，或生瘡痒，時有膿血，又治腸風下血，及肛門脫出，並宜服之。

天南星生　白礬枯　綠礬枯　訶子煨，去核

白附子生用　附子生去皮臍　枳殼去穰，麩炒　半夏生，各二兩

雞冠花微炒，五兩　活樓二枚，存性　蝟皮兩個，剝碎，瓦內燒，存性

右為末，以醋煮糊圓，如梧桐子大，每服二十丸，空心臨臥，溫酒下，遠年不瘥者，服十日見效，久服永除根本，小可腸風等疾，一二年內者，十服遂永不發動。

【石韋散】治腎氣不足，膀胱有熱，水道不通，淋澀不宣，出少起數，臍腹急痛，蓄作有時，勞倦即發，或尿如豆汁，或便出砂石，並皆治之。

木通剉　石韋去毛，各二兩　滑石

瞿麥　芎藭　麥子各三兩

甘草炙　王不留行各一兩

右為細末，每服二錢，小麥湯調下，食前日二三服。

【牡蠣散】治諸虛不足，及新病暴虛，津液不固，體常自汗，夜臥即甚，久而不止，羸瘠枯瘦，心悸驚惕，短氣煩倦。

麻黃根淨洗　黃芪去苗土　牡蠣米泔浸，刷去土，火燒通赤，各一兩

右為麤散，每服三錢，水一盞半，小麥百餘粒，同煎至八分，去滓，熱服，日二服，不拘時候。

【法製熱艾】主灸百病。

478

陳久黃艾不拘多少，擣取末入臼內，用木杵輕擣令熱，以細篩隔去青淨，再擣再篩，如此三次，別以馬尾篩子篩之，更再擣羅，候柔細黃熟爲度。

右主灸百病，世人著灸，多無法度，徒忍痛楚，擎能愈疾，今於聖惠千金外遺等方內，撮取點穴分寸，作炷大小，壯數多少，等分如前。

定分寸法　取病人男左女右中指第二節內，度兩橫紋相去爲一寸，應取穴及作炷分寸，並依此法。

點灸穴法　凡點穴時，須得身體平直，四肢好令拳縮，點時令俯仰，立點時令視側，灸時孔穴不正，無益於事，徒燒肌肉，虛忍痛楚，若坐點，則坐灸之，臥點，則臥灸之，立點，則立灸之，反此亦不得其穴。

作艾炷法　即下火點灸，須令艾炷根下廣三分，長亦三分，若減此，不復孔穴不中經脈，火氣不行，亦不能除病，強壯人亦可稍增令大，羸劣已內小兒，可如小麥大。

點火法　古來用火灸病，悉以木火，今即不用木火灸，又不犯諸忌，緣去久病，以清油點燈，燈上燒艾並點灸，緣油清潤，灸瘡至愈已來，且無疼痛，用蠟燭更佳，又火珠線日，以艾承之，遂得火出，此火灸病爲真，火有火服線日，以艾引之，便得火出，此火亦佳。

下火灸時法　皆以日正午以後，乃可下火灸之時，蒙陰氣未至，灸無不效，午前平旦，陰氣盛，令人煩悶，不可臥灸，慎之慎之，其大法如此，卒急者，不可用此例，若遇陰雨大起，風雹忽降，猛雨炎暑，雷電虹霓，暫時且停，候待清明，即再下火灸，灸時不得傷飽太飢，飲酒食生硬物，並忌思慮憂愁，怒呼罵叫，吁嗟歎息，一切不祥，忌之大吉。

治灸瘡不發法　凡著灸燎病，歷春夏秋冬不愈者，灸炷雖然數足，得瘡發膿，所患即差，如不得瘡發膿出，其瘡不瘥，甲乙經云，灸瘡不發者，用故履底灸令熱熨之，三日即發膿出，自然愈疾，今用赤皮蔥三五莖，去其惡汁，於暖灰火中煨熟，搗破，熱熨瘡十餘遍，其瘡三日自發，立爛膿出疾愈。

淋洗灸瘡法　凡著灸治病，纏住火，便用赤皮蔥葱薄荷二味煎湯，溫溫淋洗灸瘡，週週約一二寸已來，身體逐風氣於瘡口內出，並令經服往來不滯於瘡下，自然瘡壞疾愈，若灸瘡遇火痛後，用桃樹東南枝稍有嫩桃皮二味，偏能護灸瘡中諸風，若瘡內黑爛潰者，加胡荽三味等分，煎湯溫溫淋洗灸瘡，自然生好肉也，若灸瘡疼痛不可忍，多時不愈者，加黃連四味等分，煎湯淋洗，立有神效。

壯數多少法　千金方云，凡言壯數者，若丁壯過疾病根深篤者，可倍多於方數，其人老小幼弱者，可減半，依扁鵲灸法，有至五百壯，千壯者，皆隨時消息之。

推人神所在法　一日足大指，二日外踝，三日股內，四日腰，五日口舌，懸雍，六日足小指，七日內踝，八日足腕，九日肘，十日背膂，十一日鼻柱，十二日髮際，十三日牙齒，十四日胃脘，十五日遍身，十六日背乳，十七日氣衝，十八日股內，十九日足趺，二十日膝下，二十一日手小指，二十二日伏兔，二十三日肝俞，二十四日手陽明，二十五日足陽明，二十六日手足，二十七日膝，二十八日陰，二十九日膝腕，三十日關元下，至足已上，人神所在之日，禁忌灸刺，若過期數切，不拘此例。

紹興續添方

【常山飲】治瘧疾，凡瘧疾，蓋因外邪客於風府，生冷之物內傷脾胃，或先寒後熱，或先熱後寒，或寒熱獨作，或逐日併發，或間日一發，寒則股體顫掉，熱則舉身如燒，頭痛惡心，煩渴引飲，氣息喘急，口苦咽乾，脅酸疼，腸鳴腹痛，諸藥不治漸成勞瘧者，此藥治之。

良薑二十兩　烏梅去仁一斤　知母　川常山

甘草炙　草菓各二斤

右爲粗散，每服三錢，水一盞，生薑五片，棗一枚，煎至七分，去滓，溫服。

【對金飲子】治證并方並見傷寒類。

【消心速子飲】治證并方並見痼冷類。

寶慶新增方

【槐角圓】治五種腸風瀉血，蓋前有血名外痔，蓋後有血名內痔，大腸不收名脫肛，穀道四面攢肉如奶，名舉痔，頭上有孔名瘻，並皆治之。

槐角去枝梗，炒，一兩　枳殼去穰，麩炒　黃芩各半斤　當歸酒浸一宿，焙

防風去蘆　地榆各八兩

右爲末，酒糊圓如梧桐子大，每服三十圓，米飲下，不拘時候，此藥治腸風，瘡內有蟲，蟲盡下膿血止，痔瘡消脫，腫漏久服永除病源。

淳祐新添方

【腸風黑散】治證與瀉痢類腸風黑散同。

荊芥二兩，燒　亂髮　槐花　槐角各燒一兩

甘草炙　蟬皮各一兩半　枳殼去穰，二兩麩，一兩炒

右將合燒藥，同入磁瓶內，黃泥固濟，燒令至分性，出火毒，同甘草枳殼搗羅爲末，每服二錢，水一盞，服至七分，空心溫服，或溫酒調服亦得。

【神應黑玉丹】治證并方見瀉痢類。

吳直閣增諸家名方

【備急圓】療心腹諸卒暴百病，中惡客忤，心腹脹滿，卒痛如刀所刺，氣急口噤。

乾薑炮，一兩　巴豆去皮油　大黃各二兩

右件藥末，煉蜜爲圓，如梧桐子大，每服三圓，溫水下，不拘時。

【青解散】治大人小兒五臟積熱，毒氣上攻，胸膈煩悶，咽喉腫痛，赤眼癢腫，頭面發熱，唇口乾燥，兩頰生瘡，精神恍惚，心悸悶亂，坐臥不寧，及傷寒毒，面赤身熱，心躁煩渴，飲食不下。

寒水石研　石膏研各二十六兩　青黛八兩

右件細研如粉，入膏藥和勻，蒸餅七箇，水調爲圓，如雞頭大，每服一圓，食後薄汲水化下，或細嚼用生薑水下亦得，如中藥宜服之，及小兒驚風潮熱，痰涎壅塞，心胸煩躁，頰赤多渴，睡臥不穩，每三歲兒可服半粒，更量歲數加減與之。

【寸金圓】治元陽虛弱，寒氣攻衝，膀胱小腸，發腫作痛，或在心脇，牽連小腹，連腰陰間，致身體增寒撮痛，當歸去蘆，酒浸一宿，一兩半　楮實子一兩半　川楝子燒一兩半　巴豆炒，七箇　全蝎炒，四十箇

右爲細末，用漫當歸酒打麵糊和圓，如雞頭實大，空心溫酒鹽湯吞下二圓至三圓，併進二服。

【奪命丹】治遠年日近小腸疝氣，偏墜搐筋，臍下撮痛，以致悶亂，及外腎腫硬，日漸滋長，陰間濕痒抓成瘡。

吳茱萸去枝梗一斤四兩，用酒浸四兩，用醋浸四兩，用湯浸四兩，用童子小便浸，各浸一宿同焙乾　澤瀉去灰土二兩

右爲細末，酒煮麵糊圓，如梧桐子大，每服五十圓，空心食前鹽湯或酒吞下。

續添諸局經驗祕方

【茱萸內消圓】治腎經虛弱，膀胱爲邪氣所搏，結成寒疝，陰癩偏大，上攻臍腹病痛，脅背腰脚脹，或生瘡瘍，時出黃水，腰腿沈重，足脛腫滿，行步艱辛，服之內消，不動臟腑，一方無枳實，陳皮，桃仁，延胡索，川楝子，木香。

山茱萸搗去核取肉微炒　桔梗水浸一伏時，漉出慢火炒乾爲度　白蒺藜炒去刺　川烏炮去皮臍　吳茱萸微炒　茴香舶上者，淘去沙石焙炒　肉桂去粗皮　食茱萸　海藻洗焙　五味子淨揀　大腹皮酒洗焙　青皮去白各二兩　枳實去瓤麩炒　桃仁去皮尖及雙仁麩炒別研　延胡索各二兩半　川楝子剉炒三兩　木香一兩半　陳皮去白各一兩

右爲末，酒糊圓如梧桐子大，溫酒下三十圓，食前服。

【麝香大戟圓】治陰癩腫脹，或小腸氣痛。

胡蘆巴炒四兩　大戟去皮炒黃半兩　麝香別研一錢　茴香舶上者　川楝子各六兩　檳榔剉去麻，細切，不見火　附子炮去皮臍　訶子炮去核，酒浸蒸焙乾用　木香各一兩

右爲末，獨留川楝子，以好酒一二升，蘸白七枚，長三四寸，裹川楝子末，去核取肉，和藥搗杵，圓如梧桐子大，空心溫酒下五七圓至十圓，薑湯亦得，潮發疼痛，炒鹽鹽酒下十五圓。

【三白散】治膀胱蘊熱，風濕相乘，陰囊腫脹，大小便不利。

白牽牛二兩　桑白皮微炒　白朮　木通去節　陳皮去白各半兩

右擣爲細末，每服二錢，薑湯調下，空心服，未覺，再進，當服導利留滯不損臟氣。

【胡蘆巴圓】治大人小兒小腸氣，蟯腸氣，奔豚氣，疝氣，偏墜陰腫，小腹如卵，上下痛不可忍，或絞結攻刺，嘔惡悶亂，並治之。

胡蘆巴炒一斤　吳茱萸湯洗七次，炒十兩　川楝子炒一斤二兩

大巴戟去心炒　川烏炮去皮各六兩　茴香去土炒十二兩

右爲細末，酒煮麵糊爲圓，如梧桐子大，每服十五圓，空心溫酒吞下，小兒五圓，茴香湯下。

治瘡腫傷折

【雲母膏】治一切瘡腫傷折等病。

蜀椒去目及閉口者，微炒出汗　白芷　沒藥研　赤芍藥　肉桂去粗皮　當歸　鹽花研　麒麟竭研　菖蒲　白芨　芎藭　木香　白斂　防風去蘆叉　厚朴去麤皮，薑汁製　麝香研　桔梗　柴胡去蘆頭　松脂　人參　蒼朮泔浸一宿　黃芩　夜合川皮　乳香　附子去皮臍　茯苓去皮　高良薑各半兩　消石研如粉　甘草各四兩　桑白皮　水銀鉛丹凝如人體熱，以生鉛盛水銀，以手彈如針頭大，鋪在膏上，蓋之，安頭母　柏葉不近道者　槐枝　柳枝各二兩　陳皮一兩　雲母光明白薄白研粉四兩　清油四十兩　黃丹細研十四兩　黃芪去蘆半兩

右除雲母，消石，麒麟竭，沒藥，麝香，乳香，黃丹，鹽花八味別研外，並剉如豆大，用上好清油，於瓷器中浸所剉藥七日，以物封閉後，用文火煎，不住手攪，三上火，三下火，每上候匝匝沸，乃下火，候沸定，再上，如此三次，候白芷附子之類黃色爲度，勿令焦黑，以絹或新布絞去滓，却入鍋中，再上火熬，後下黃丹與別研藥八味，以柳篦不住手攪，直至膏凝，良久色變，再上熬，仍滴少許水中，凝結不粘手爲度，先炙一瓷器熱，即傾藥在內，候如人體溫熱，彈水銀在上，每用膏藥，即先刮去水銀，治發背，先以敗蒲一斤，用水三升煎五十沸，如人體溫，將蒲水洗瘡拭乾，貼藥，一兩分爲三服，溫酒下，未成膿者，立穿，於外貼之，於蒲外貼，旗槍針直穿穿至骨，用藥一兩分作三服，溫酒下，甚者，即瀉出膿物，並外

貼，蓬，腸離以藥半兩，分爲五服，甘草湯下，未成膿者，當時消，已有膿者，隨藥下膿，出後，每日酒下五圓如梧桐子大，待膿止即住服，風眼，貼兩太陽穴，鬚鬚咬，蜘蛛咬，外貼留蕩口，發鬚，發髭，發眉，發耳鬢，蟲牙，蟲牙疼，並外貼包裹，即當時痛止，箭頭所傷，箭頭在內外貼，每日吃少許，蜀椒豆，箭頭自出，虎豹所傷，先以甘草湯洗，然後貼膏，每日換，不過三次貼，狗蛇咬，生油下十圓如梧桐子大，仍須貼外，離蓬三日不分娩，溫酒下一分便生，血暈欲死，以蓬汁和小便半升溫酒下十圓，死者即返，死胎在腹，以榆白皮湯下半兩便生，丈夫本臟氣，蘭香溫酒下一分，每日一服，不過四度，當出惡物，瘕癖，外貼治之，一切腫毒，外貼治之，一切腫毒，皆貼之，藥到即瘥，已上主療，只忌羊血，餘無所忌，如入收此藥防身，以蠟紙裹，不令風乾，可三十年不損藥力。

【小犀角圓】治腸癰乳癰發背，一切毒腫，服之化爲水。

巴豆二十二枚去皮膜心，炒出油，細研　大黃蒸焙一兩一分　犀角三兩　黃連去鬚　梔子去皮　乾蓼藍　升麻　黃芩　防風去蘆　人參　當歸去蘆　黃芪去苗　甘草炙各一兩

右爲細末，入巴豆油，煉蜜浸和爲圓，如梧桐子大，每服三圓，溫湯下，利三兩行，喫冷粥止之，不利，加至四五圓，初服取快利，後漸減圓數，取微瀉爲度，老小以意加減，腫消及和調乃止，利下黃水，從腫處微赤色，即是消候，一切腫毒皆內消，神驗不可論，忌熱麵蒜醬，即是消候，一切腫毒皆內消，神驗不可論，忌熱麵蒜醬

【何首烏散】治脾肺風毒攻衝，遍身癰疥瘙痒，或生癮疹，搔之成瘡，肩背拘倦，肌肉頑痹，手足皸裂，風氣上攻，頭面生瘡，及治紫癜白癜頑麻等風。

荆芥穗　蒺藜子去白皮　何首烏　防風去蘆叉　蛔坡草去土　威靈仙淨洗　甘草炙

右件各五斤，搗羅爲末，每服一錢，食後溫酒調下，沸湯亦得。

【大獄活血丹】治男子婦人外傷內損，狗咬虫傷，墮撲馬墜，手足傷折，一切疼痛，腹中瘀血，刺脇築心，及左癱右緩，走疰疼痛，癰腫背痛，婦人冷氣入腹，血脈不通，產後敗血注四肢，攻刺腫痛，血氣撮痛，並宜服之。

亂髮草角水淨洗二斤，曝乾，用清麻油二斤，入鍋內炒，頻以手攪，看膠亂如糊答即止，不可令炒過。

栗楔謂栗三顆共一球，其中皮薄者是，去殼淨切日乾。

皂角刺燒通紅，米醋內淬焙　大黑豆以溫布拭去塵垢，退黑皮，焙乾。

花桑枝如臂大者，炭火燒烟盡，米醋淬，取出焙，各一斤　萆麻仁別研，塗蜜三兩。

乳香好者，細研，入米醋一碗，熬令香熱，四兩　硇砂光淨者，醋化塗蜜上，三兩。

細墨半斤，一半用萆麻仁三兩，乳鉢研，塗蜜上，塗蜜用薄紙裹以黃泥固濟，日乾，以火五七斤煅令通紅，放地上，盡蜜出火氣，兩飯久，一半用硇砂二兩，醋化塗墨上炙乾。

右六味爲末，入乳香膏內和，杵三千下，圓如彈子大，如乳香膏少，更入醋煮麵糊，痛甚者，每服一圓，輕可者，服半圓，用無灰酒一盞，乳香一豆大，先磨香盞，次磨藥盞，煎三五沸，臥濃服，以痛處就床臥，如欲出汗，以衣被蓋覆，仍用熱薑磨損處，忌一切動風物，應婦人諸疾，服者更用當歸末一錢，依法煎服，有孕者莫服。

【玉龍膏】療風止痛，消腫化毒，治一切傷折瘡腫。

梔子大者一箇，去皮　黃蠟一兩半　白芷淨揀剉，半兩　麻油清眞者，六兩　麝香研，一錢半　松脂研，一錢半　零香　藿香各一兩　杏仁去皮尖　升麻　黃芪　赤芍藥　白芷　白斂　甘草淨揀剉，各一分

右以油浸七日，却濾出油，先煉令香熟，放冷，入諸藥，慢火煎黃色，用絹濾去滓，入銀石鍋內，入麝香松脂，熬少時，以密合器盛，每用少許，薄攤絹帛上貼，若頭面風癬瘙癢腫痛，並塗磨令熱，頻用之，如耳鼻中肉銳，用紙燃子每日點之，至一月餘愈，如治炙瘡及小兒痘瘡，塗之漸減，瘡痕皆滅。

紹興續添方

【化毒排膿內補十宣散】亦名托裏十補散，治一切癰疽瘡癤，未成者速散，已成者速潰，敗膿自出，無用手擠，惡肉自去，不犯刀仗，服藥後疼痛頓減，其效如神。

黃芪以蜜上來者爲勝，半如箭羽，長二三尺，頭不叉者，洗淨，寸截，逐條縱橫，以蜜湯浸，以蜜湯浸，川蜜與薑湯蒸上，炊久焙乾，隨衆藥入研成細末。　人參以新羅者，樺皮結重實滋潤者，洗淨去蘆，薄切焙乾。　川當歸以水洗，薄切焙乾，各二兩。　厚朴梓間者，去粗皮切薑汁製一宿，慢熟焙乾。　桔梗以有心味苦者爲眞，洗淨去頭尾，薄切焙乾。　桂心用卷薄者，別研，不見火。　芎藭以川中來者爲上，今多用撫芎大塊者，淨洗切焙。　川白芷各一兩。　防風擇新香者，淨洗切焙，一兩。　甘草生用。

右十味，選藥貴精，當取淨晒焙極燥方秤，除桂心外，一處搗羅爲細末，入柱令勻，每服白三錢，加至五六錢，熟酒調下，日夜各數服，以多爲妙，服至瘡口合，更服尤佳，所以補前損壯後虛也，不飲酒人，溫煎木香湯下，然不若酒力之勝也，或飲酒不多，能勉強則用酒調，并以木香湯解酒，功效亦不減於酒也，大抵癰疽之作，皆血氣凝滯，風毒壅結所致，治之不早，則外壞肌肉，內攻臟腑，其害甚大，發覺便服，倍加服數，服之醉，則其效尤速，發散風毒，流行經絡，止腫止痛，生肌長肉，溫平和，老人小兒，婦女，室女，皆可服之。

【沒藥降聖丹】治打撲閃肭，筋斷骨折，疼急疼痛，不能屈伸，及榮衛虛弱，外受遊風，內傷經絡，筋骨緩縱，皮肉刺痛，肩背拘急，身體倦怠，四肢少力。

自然銅火煅醋淬十二次，研為末，水飛過焙　川烏頭生，去皮臍　骨碎補炮，去毛
白芍藥　沒藥別研　乳香別研　當歸洗焙各一兩
生乾地黃　川芎各一兩

右並生用為細末，以生姜自然汁與蜜等分，煉熟和圓，每一兩作四圓，每服一圓，搗碎，水酒各半盞，入蘇木少許，同煎至八分，去蘇木，熱服，空心食前。

寶慶新增方

【千金漏蘆湯】治癰疽發背，丹毒惡腫，時行熱毒發作，赤色焮腫，初發頭目赤痛，暴生障翳，吹蛾腫痛，一切無名惡瘡，肿痒難忍，所苦細微，不可輕慢，急服此藥，並皆內消，更不成膿，若發背癰疽已成膿者，當排膿服之，直至膿盡。

漏蘆去蘆　麻黃去根節　升麻剉　赤芍藥生剉
黃芩去皮　甘草生剉　白斂淨洗　白芨去蘆
枳殼米泔浸一宿，去白，各四兩　生大黃十三兩

右㕮咀，每服四錢，水二盞，煎至一盞，紗帛濾去滓，空心食前熱服，以快利為度，病人更自益增加服之，立效。

【滑肌散】治風邪客於肌中，渾身瘙痒，致生瘡疥，及脾肺風毒攻衝，徧身瘡疥皸裂乾澀，發瘡日久不瘥，並皆治之。

蝟草七兩，不見火　輕粉一錢

右為細末，瘡濕用蝟乾，瘡乾用麻油調塗傅之。

【神效托裏散】治癰疽發背，腸癰妳癰，無名腫毒，焮作疼痛，增寒壯熱，類若傷寒，不問老幼虛人，並皆治之。

忍冬草去根　黃芪去蘆各五兩　當歸一兩二錢　甘草炙，八錢

右為細末，每服二錢，酒一盞半，煎至一盞，若病在上，食後服；病在下，食前服，少頃，再進第二服，暫滯外傅，未成膿者，內消；已成膿者，即潰。

淳祐新添方

【紅玉散】斂瘡口，生肌肉，止疼痛，去惡水，不問日近年深，並治之。

寒水石煅火燒通赤，候冷細研，二兩　黃丹半兩

右同研細，乾瘡瘡口內，後用萬金膏貼之，每日一上，或再上，尤妙。

【萬金膏】治癰疽發背諸瘡痔，從高墜墮，打撲傷損，脚膝生瘡，遠年膝瘡，五般痔漏，一切惡瘡，並皆治之。

龍骨　龜甲　苦參　烏賊魚骨
黃蘗　草烏頭　黃連　猪牙皂角
黃芩　白斂　白芨　木鼈子仁
當歸洗焙　厚朴去粗皮　川芎　香白芷
沒藥別研　槐枝　柳枝並同剉研各一分
乳香別研一錢　黃丹一兩半　清麻油四兩，冬月用半斤

右除黃丹外，銀石器中，將諸藥於油內慢火煎，紫赤色，去滓不用，却入黃丹一半，放油內，不住手攪令微熱，更入餘黃丹，不住手攪，須是慢火熬令紫黑，滴在水上不散，及不粘手，然後更別入黃丹少許，再熬數沸，如硬時，却更入油些小，以不粘手為度，用時盛瘡大小攤紙上貼之。

吳直閣增諸家名方

【接骨散】治從高墜下，馬逐傷折，筋斷骨碎，痛不可忍，接骨續筋，止痛活血。

定粉　當歸各一錢　鵝砂一錢半

右為細末，每服二錢，煎蘇木湯調下，服訖後，時時吃蘇木湯。

【去風散】治久新諸瘡，破傷中風，項強背直，腰為反折，口噤不語，手足抽掣，眼目上視，喉中沸聲。

丹砂一兩　草烏頭三兩，一半生用，一半以火燒存性，於米醋內淬令冷　生烏豆同草烏一處為末，各一分
麝香研

右為細末，和勻，破傷風，以酒一小盞調半錢，神效，如箭頭，先用酒一盞調服半錢，却以藥貼箭瘡上，

【油調立效散】治濕疥侵淫，流漬遍體，大作瘙痒，搔之水出，小如粟粒，痒疥難任，肌膚濕潤，經久不差。

賦粉　綠礬　黃蘗微炙，細研　硫黃研細各等分

右為細末，研勻，以生油調塗之。

【導滯散】治重物壓迮，或從高墜下，作熱五內，吐血下血，出不禁止，或痰血在內，胸腹脹滿，喘麤氣短。

當歸　大黃

右等分，炒為末，每二錢，溫酒調下，不計時候。

【拔毒散】治小兒丹毒，肉色變異，或著四肢，或在胸背，遊走不定，焮熱疼痛，拔毒消腫，散熱定疼。

石膏三兩　甘草　黃蘗各一兩　寒水石七兩

右為細末，每用水調時，復以雞翎刷掃，以芭蕉自然汁調藥妙。

【琥珀膏】治頸項瘰癧，及發腋下，初如梅子，漸結硬強，漸若連珠，不消不潰，或穿穴膿潰，肌汁不絕，經久難差，漸成癆疾，並治之。

琥珀一兩　木通　桂心　當歸
白芷　防風　松脂　硃砂研

木鼈去殼各半兩　**麻油**二斤

右件藥，先用琥珀、丁香、桂心、硃砂、木香、五味、訶羅勒末，其餘藥並細剉，以油浸一宿於鍋中，以慢火煎，候白芷微黃漉出，次下松脂末，攪令熟，下黃丹一斤，以柳木篦不住手攪，令黑色，滴入水中成珠子不散，看硬軟得所，入琥珀等末，攪令勻，於瓷器內盛之，每使時看大小用火煬紙上匀攤貼之。

丁香　**木香**各三分

【丹參膏】治乳腫乳癰，毒氣熾作，赤熱腫成，攻刺疼痛，及治乳核結硬不消散，通順經絡，宣導藥潤。

丹參　**赤芍藥**　**白芷**各等分

右細剉，以酒浸三宿，入猪腦半斤，微煎，令白芷黃色，濾去滓，入黃蠟一兩，每用少許，時時塗之。

【神效當歸膏】治湯火傷初起，瘡漿熱毒侵展，脹赤疼痛，毒氣壅盛，腐化成膿，斂疤口，生肌肉，拔熱毒，止疼痛。

當歸　**黃蠟**各一兩　**麻油**四兩

右件，先將油煎令當歸焦黑，去滓，次入蠟盤攪之，放冷入瓷合內，每使時以故帛子攤貼。

【烏蛇膏】治風邪毒氣，外客皮膚，蒸發成腫，所起不定，遊走往來，時發痒痛，或風毒勢盛，攻注成瘡，脹赤多膿，瘡邊緊急，但是風腫，並皆治之。

臭茱萸　**藁本**　**獨活**　**細辛**
白殭蠶去絲嘴炒　**半夏**　**漢椒**去目炒　**防風**
赤芍藥　**當歸**　**桂心**　**川芎**
香白芷各半兩　**烏蛇**　**黃蠟**各二兩　**乾蝎**
附子去皮尖各一兩

右件細剉，以煉臘月猪脂二斤文火煎，候白芷赤黑色爲度，絹濾去滓，下蠟入瓷器內盛，每用取少許，摩之令熱，日三服。

【神仙太一膏】治八發癰疽，一切惡瘡軟癤，不問年月深遠，已成膿，未成膿，貼之即效，蛇、虎、蝎、犬、湯火、刀箭、所傷，並可內服外貼，發背，先以溫水洗瘡拭乾，用帛子攤藥貼，仍用水下，血氣、木通酒下，赤白帶下，當歸酒下，咳嗽、喉閉、纏喉風，並蘇裹含化，一切風赤眼，貼太陽穴，後用山梔子湯下，打撲傷損，貼藥仍用梔皮湯下，腰膝痛，貼之，鹽湯下，唾血，桑白皮湯下，諸淋，先以鹽湯洗其諸瘡癤，並量大小，以紙攤藥貼之，並每服一粒，旋圓櫻桃大，以蛤粉爲衣，其藥可收十年不壞，愈久愈烈，神效不可具述。

元參　**白芷**　**川當歸**去蘆　**肉桂**去麤皮
大黃　**赤芍藥**　**生乾地黃**各一兩

右剉，用麻油二斤浸，春五日，夏三日，秋七日，冬十日，濾去滓，油點得所，次下黃丹一斤，以滴油在水中不散爲度。

續添諸局經驗祕方

【補損當歸散】療墜馬落車被打傷腕折臂，呼叫不絕，服此藥，呼吸之間不復大痛，服三日，筋骨即當相連，神效忌冷水。

澤蘭葉　**附子**炮去皮各一分　**當歸**炒
甘草炙　**桂心**各三分　**芎藭**炒六分

左爲細末，每服二錢，溫酒調下，日三服，忌海藻、菘菜、蕎猪。

【排膿托裏散】治一切瘡癤癰毒及腸癰，或赤腫而未破，或已破而膿血不散，渾身發熱，疼痛不可堪忍者，并治婦人妳癰，一切毒腫，並宜服之。

地蜈蚣　**赤芍藥**　**當歸**　**獨椒**炒去汗
甘草各等分

右爲細末，每服二錢，溫酒調下，不拘時候。

【升麻和氣飲】治瘡疥發於四肢臂髀，痛痒不常，甚至增寒發熱，攻刺疼痛，浸淫浮腫，又煩風入腦，陰下濕痒，耳鳴眼痛，皆治之。

乾薑　**熟枳殼**各半錢　**乾葛**　**熟蒼朮**
桔梗　**升麻**各一兩　**當歸**　**熟半夏**
茯苓　**白芷**各二錢　**陳皮**　**甘草**各一兩半
芍藥七錢半　**大黃蒸**半兩

右爲細散，每服四大錢，水一盞半，薑三片，燈心十五莖，煎至七分，去滓，食前服。

【五香連翹湯】治一切瘰核瘰癧癰疽惡腫等病。出三因方。

沈香不見火　**舶上青木香**　**乳香**不見火
甘草生各一分　**連翹**去蒂　**射干**
桑寄生如無以升麻代之，用只用光活甚好。　**木通**去節各三分　**獨活**今鋪家所賣者，只是宿前胡，或是生當歸不堪用　**升麻**
麝香真者別研一錢半　**丁香**不見火半兩　**大黃蒸**三兩

右㕮咀，每服四大錢，水二盞，煎取一盞以上，去滓，取八分清汁，空心熱服，半日以上未利，再吃一服，以利下惡物爲度，未生肉前服不妨，以折去熱毒之氣。【本方】有竹瀝、芒硝，恐泥者不能辦酌，故闕之。

【五香連翹湯】方甚多，當以三因爲正，李氏方併存之。○【李氏】用乳香、甘草、木香、沈香、連翹、射干、升麻、木通、桑寄生、獨活各三分，丁香半兩，大便結者，加大黃三分，李氏所以不用大黃者，蓋恐虛人老人不宜服，故臨時加減耳。

【又一方】青木香三分，桑寄生二分，沈香、木通、生黃芪、大黃各一兩，酒浸煎，麝香二錢，乳香、藿香、川升

麻、遲、麝、各半兩、雞舌香三分、此方與三因李氏方同、但多加雞舌香麝香耳、

增廣太平惠民和劑局方卷九

治婦人諸疾外有治療諸方、互見各類、

【熟乾地黃圓】治婦人風虛勞冷一切諸疾、或風寒邪氣留滯經絡、氣血冷澀、不能溫潤肌膚、或風寒客於腹內、則脾胃冷弱、不能磨消水穀、或腸虛受冷、大便時泄、或子藏挾寒、久不成胎、月水不調、年多年少、或月前月後、或淋瀝不止、或閉斷不通、結聚癥瘕、面體少色、飲食進退、肌肉消瘦、百節酸疼、時發寒熱、漸至羸損、帶濕五色、陰中冷痛、時發腫痒、月水將行、臍腹先痛、皮膚瘙澀、瘮疹猛痒、麻痹筋攣、面生黯黯、髮黃脫落、自汗自出、心忪目眩、及產後勞損未復、肌瘦寒熱、顏色枯黑、飲食無味、漸成羸勞、並皆療之、

熟乾地黃酒浸、　五味子揀淨、　柏子仁微炒別研、　芎藭各一兩半、
澤蘭去梗二兩一分、　禹餘糧火燒紅醋淬七遍細研、　防風去蘆叉、
肉蓯蓉酒浸一宿、　白茯苓去皮、　厚朴去粗皮薑汁炙、　白芷
乾薑炮、　山藥、　卷柏去根各一兩、
當歸去蘆酒浸炒、　藁本去蘆洗、　細辛去苗、　蛇床子揀淨微炒、
牛膝去苗酒浸一宿、　人參、　甘草炙各一兩三分、　續斷、
蜀椒去目及閉口者微炒出汗、　杜仲去粗皮炙黃、　艾葉炒各三分、

赤石脂煅醋淬、　石膏煅研飛各二兩、　肉桂去粗皮、
白朮各一兩一分、　紫石英煅醋淬研飛各三兩、　石斛去根、

右件藥搗羅爲末、煉蜜和搗五七百杵、圓如梧桐子大、每服三十圓、溫酒或米飲下、空心食前服、當服養血補氣、和顏樂神、充實肌膚、調勻月水、長駐顏容、除風去冷、令人有子、溫平不熱無毒、雖久不宜服之、

【澤蘭圓】治產後勞傷、腑臟虛羸未復、氣血不調、肢體羸弱、困乏少力、面色萎黃、心常驚悸、多汗喘悶、飲食不進、產後百日內、每日常服、壯氣益血、暖下臟、進飲食、

黃芪　澤蘭去梗、　牛膝去苗酒浸一宿、　人參去蘆、
赤石脂煅各一兩、　附子炮去皮臍、　木香　荜茇
白茯苓去皮、　續斷各三分、　肉桂去粗皮、　芎藭
白朮　乾薑炮、　當歸去蘆剉微炒、　甘草炙微赤各半兩、
熟乾地黃淨洗酒蒸焙一兩半、

右爲末、煉蜜圓如梧桐子大、每三十圓、溫米飲下、空心食前、

【人參荊芥散】治婦人血風勞氣、身體疼痛、頭昏目澀、心怔煩倦、寒熱盜汗、頰赤口乾、痰嗽胸滿、精神不爽、或月水不調、臍腹污痛、登癖塊硬、疼痛發歇、或時嘔逆、飲食不進、或因產將理失節、淹延羸瘦、乍起乍臥、甚即昏床、

荊芥穗　羚羊角鎊、　酸棗仁微炒、　生乾地黃
枳殼麩炒去穰、　人參　鱉甲醋浸去裙炙黃、　肉桂去粗皮、
白朮　柴胡各七兩半、　甘草剉炙、　芎藭
赤芍藥　牡丹皮　當歸　防風去苗叉各五兩

右爲銳末、每服三錢、水一盞半、生薑三片、煎至八分、去滓、熱服、不拘時、日二服、常服除一切風虛勞冷、當病有象不宜服、

【牡丹煎圓】治婦人衝任本虛、少腹挾寒、或因產勞損子臟、風寒搏於血氣、結生瘕聚塊硬、發歇脅腹刺痛、脇肋緊脹、腰膝疼重、拘攣腫滿、背項強急、手足麻痹、或月水不調、或瘀滯澀閉、或崩漏帶下、少腹冷疼、寒熱盜汗、四肢酸痛、面色萎黃、多生黯黯、羸弱之少力、心多驚悸、不欲飲食、

延胡索　續斷仁各半兩、　赤芍藥　牡丹皮各一兩、
山茱萸　乾薑炮各半兩半、　龍骨細研水飛、　楮椒
熟乾地黃酒浸、　光活各二兩、　藁本去土、　五味子
人參　白芷　當歸去蘆酒浸、　乾山藥
澤瀉　續斷細者、　肉桂去粗皮、　白茯苓

白芷　附子去皮臍　牛膝去苗酒浸一宿焙　石斛去根酒浸三兩
木香　萆薢炮焙令乾炒熟各一兩

右為細末，煉蜜和圓如梧桐子大，每服二十圓至三十圓，溫酒或醋湯下，空心食前日二服，姙娠不宜服。

【熟乾地黃散】治婦人勞傷血氣，腑臟虛損，風冷邪氣乘虛客搏，肢體煩痛，頭目昏重，心多驚悸，寒熱盜汗，羸瘦少力，飲食不進。

丹參去蘆頭　防風去蘆叉　當歸去蘆微　細辛去苗
藁本去蘆洗　芎藭各半兩　人參　白芷
白茯苓去皮　肉桂去粗皮　熟地黃酒洗蒸焙各一兩
續斷　附子炮去皮臍　黃芪去蘆各三分

右為麤散，每服四錢，水一盞半，入生薑半分，棗三枚，擘破，煎至一盞，濾去滓，食前溫服。

【安息活血丹】治衝任不足，下焦久寒，腑腹疼痛，月事不勻，或來多不斷，或過期不來，或崩中去血，或帶下不止，面色萎黃，肌肉瘦瘁，肢體沉重，胸脇脹滿，氣力衰乏，飲食減少，一切血氣虛寒，並宜服之。

吳茱萸湯浸七遍，焙乾微炒　當歸去蘆微　人參　白芷
柏子仁炒　山茱萸去核　熟地黃酒蒸焙各一兩
虎杖　當歸　延胡索　桃仁去皮尖，以炒黃黃
木香各二十兩　澤蘭葉　杜仲去粗皮，銼炒　附子炮去皮臍
艾葉微炒　黃芪去蘆　乾薑炮　肉桂去粗皮
厚朴去粗皮，薑汁炙令熟，各五斤　牡丹皮各二斤半　肉蓯蓉酒浸焙

右為細末，以前安息香膏和圓如梧桐子大，每服三十圓，食前以溫酒下，醋湯亦得。

【吳茱萸湯】治婦人藏氣本虛，宿挾風冷，胸腹滿痛，腹脇疼刺，嘔吐惡心，飲食減少，身面虛浮，惡寒戰慄，或泄痢不止，少氣羸困，及因而生產，臟氣暴虛，邪冷內勝，宿疾轉甚，並皆治之。

桔梗去苗半兩　吳茱萸湯洗七遍，微炒二兩　熟乾地黃三分
防風去苗叉　乾薑炮　甘草炙　當歸去苗，微炒
細辛去苗各半兩

右為粗末，每服三錢，水一盞，煎至八分，絹濾去滓，熱服，空心食前。

【溫經湯】治衝任虛損，月候不調，或來多不斷，或過期不來，或崩中去血過多不止，又治曾經損娠，瘀血停留，少腹急痛，發熱下利，手掌煩熱，唇乾口燥，及少腹有寒，久不受胎。

阿膠炮粉碎炒　當歸去蘆　芎藭　人參

肉桂去粗皮　甘草炙　芍藥
半夏湯洗七次，二兩半　吳茱萸湯洗七次，焙炒三兩
麥門冬去心，五兩半

右為粗末，每服三錢，水一盞半，入生薑五片，煎至八分，去滓，熱服，空心食前服。

【禹餘糧圓】治婦人崩下久虛，胞絡傷敗，月水不調，漸成崩漏，氣血虛竭，面黃體瘦，腑腹裡急，腰膝疼重，肢體煩痛，心悸頭眩，手足寒熱，不思飲食。

桑寄生　柏葉微炒　厚朴去粗皮，薑汁炙　牡丹皮各二兩
當歸去蘆，微炒　附子炮去皮臍　龜甲醋浸去裙炙黃　乾薑炮
白芷各一兩　禹餘糧燒醋淬七遍，飛研　白石脂各二兩
狗脊去毛　白芍藥各三分　吳茱萸湯洗七次，微炒半兩

右為極末，煉蜜和圓如梧桐子大，每服三十圓，溫酒或米飲下，空心食前服。

【逍遙散】治血虛勞倦，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏重，心悸頻赤，口燥咽乾，發熱盜汗，減食嗜臥，及血熱相搏，月水不調，腑腹脹痛，寒熱如瘧，又療室女血弱陰虛，榮衛不和，痰嗽潮熱，肌體羸瘦，漸成骨蒸。

甘草微炙赤半兩　當歸去苗，剉微炒　茯苓去皮白者　白芍藥
白芷　柴胡去苗各一兩

右為粗末，每服二錢，水一大盞，燒生薑一塊，切破，蘸藥少許，同煎至七分，去滓，熱服，不拘時候。

【白薇圓】調補衝任，溫暖子宮，治胞絡傷損，宿受風寒，久無子息，或受胎不牢，多致損墮，久服去下臟風冷，令人有子。

秦椒去目及閉口者，微炒出汗　白薇去苗　鹿乾地黃
當歸去蘆剉微炒　葳蕤各一兩七錢半　藁本去苗及土　牡蠣各一兩二錢半
禹餘糧火燒醋淬七遍，研二兩　附子炮去皮臍　人參　柏子仁微炒
桑寄生　肉桂去粗皮　五味子去梗
吳茱萸湯浸微炒　石斛去根　牛膝去苗酒浸一宿焙乾
甘草炙微赤　防風去苗　芎藭各一兩半

右為細末，入研藥勻，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓至五十圓，溫酒或米飲下，空心食前服，臨覺腹痛即住服，已懷孕者，尤不宜服之。

【膠艾湯】治勞傷血氣，衝任虛損，月水過多，淋瀝漏下，連月不斷，腑腹疼痛，及姙娠將攝失宜，胎動不安，胞絡下墜，或勞傷胞絡，胞胎漏血，腰痛悶亂，或因損動胎上掐心奔衝短氣，及因產乳衝任氣虛，不能約制經血淋瀝不斷，延引日月，漸成羸瘦。

阿膠碎炒燥　芎藭　甘草炙各二兩　當歸

艾葉微炒各三兩　白芍藥　熟乾地黃各四兩

右為粗末，每服三錢，水一盞，酒六分，煎至八分，濾去滓，稍熱服，空心食前，日三服，喜者日併服。

【保生圓】衛胎益血，安和子臟，治妊娠將理失宜，或因勞役，胎動不安，腰腹痛重，胞胞漏胎，惡露時下，子臟挾疾，久不成胎，或受妊不能固養，痿燥不長，過年不產，日月雖滿，轉動無力，或致損壓，及隔產節過乖宜，驚動太早，產時未至，惡露先下，胎胞枯燥，致令產難，或橫或逆，痛極悶亂，連日不產，子死腹中，腹上冰冷，口唇青黑，吐出冷沫，新產惡血上攻，昏悶不省，喘促汗出，及痰血未盡，臍腹疼痛，寒熱往來，或因產勞損，虛羸未復，面黃體瘦，心悸益汗，飲食不進，漸成羸勞，人月常服，壯氣養胎，正順產理，潤胎易產，產後常服，滋養血氣，和調陰陽，榮膝理，實腸臟，治風虛，除痼冷。

大麻仁去殼一兩半　大豆黃卷　糯米　貝母　黃芩

肉桂去粗皮　石斛去根　甘草微炙赤　乾薑炮

秦椒微炒出汗一兩　石膏細研各一兩　當歸去蘆焙半兩

右為細末，煉蜜和圓如彈子大，每服一圓，並用溫酒或薑湯化下，嚼亦得，空心食前服。

【半夏茯苓湯】治妊娠惡阻，心中憤悶，頭目眩暈，四肢怠惰，百節煩疼，胸膈痰逆，嘔吐惡心，嫌聞食氣，好嗽鹹酸，多臥少起，全不進食。

旋覆花　陳皮去穰，銼炒　桔梗　白芍藥

人參　甘草微炙赤　芎藭各半兩　赤茯苓

半夏湯洗十遍，切焙，一兩一分。

熟乾地黃酒蒸各三分。

右為粗末，每服二錢，水一盞半，生薑四片，同煎至八分，去滓，稍熱服，食前服，次服茯苓圓三十，即漱水消除，便能食。

【茯苓圓】治妊娠阻病，心中煩憤，頭目眩重，惛悶食氣，嘔逆吐悶，顛倒不安，四肢困弱，不自勝持，常服此藥，消痰水，令能食強力，養胎，當先服半夏茯苓湯，次進此藥。

葛根　根實去穰，銼炒黃　白朮　甘草炙各二兩

赤茯苓去皮　人參　乾薑炮　肉桂去粗皮

陳皮　半夏湯洗七遍，去骨切焙各一兩。

右為細末，煉蜜和為圓，如梧桐子大，每服三十圓，溫米飲空心下，食前服。

【催生丹】治產婦生理不順，產育艱難，或橫或逆，並宜服之，神效。

麝香別研，一匙　乳香別研極細，一分　母丁香取末一錢　兔腦髓腦月含，去皮膜研

右拌勻，以兔腦和圓，如鳥頭稍大，陰乾，用油紙密封貼，每服一圓，溫水下，即時出下，產男左女右手中握驗，圓出是驗。

紹興續添方

【黑神散】治婦人產後，惡露不盡，胞衣不下，攻衝心胸痞滿，或腳腹堅脹，撮痛，及血暈神昏，眼黑口噤，產後痰血諸疾，並皆治之。

黑豆炒半升，去皮　熟乾地黃酒浸　當歸去蘆酒浸　肉桂去粗皮

乾薑炮　甘草炙　芎藭　蒲黃各四兩

右為細末，每服二錢，酒半盞，童子小便半盞，同煎，溫下，急急，不拘時候，連進二服。

【油煎散】治婦人血風勞，形容憔悴，肢節困倦，喘滿虛煩，嗽唾少氣，發熱汗多，口乾舌澀，不思飲食。

五加皮　牡丹皮　赤芍藥　當歸去蘆各一兩

右為末，每服一錢，水一盞，將青銅錢一文，麻油入藥，酒七分，溫服，服不得錢，吃不得吹，日三服，常服能肥婦人，其効妙甚。

【安胎飲】治妊娠三月四月至九箇月，惡阻病者，心中憤悶，頭重目眩，四肢沉重，懈怠不欲執作，惡聞食氣，欲啖鹹酸，多睡少起，嘔逆不食，或胎動不安，非時轉動，腰腹疼痛，或時下血，及妊娠一切疾病，並皆治之。

熟乾地黃洗，酒蒸焙　地榆　甘草微炙赤

茯苓去皮　白芍藥　當歸去蘆洗，酒浸　川芎

白朮　半夏湯洗七次　阿膠搗碎，蛤粉炒　黃芪去苗各等分

右為粗散，每服三錢，水一盞半，煎至八分，去滓，溫服，不拘時，如或惡食，但以所思之物任意與之，必愈，按煎娠禁忌，勿食鵝鴨子，鯉魚，蟹，兔，犬肉，驢，山羊肉，魚子，鱉卵，雉雀，梁米，又按胎教論云，令母常居靜室，多聽美音，聽人講論詩書禮說，禮樂，耳不聽非言，目不視惡事，心不起邪念，能令生子聰厚孝仁義，聰明無疾，斯乃聖人所留教論，故隨方狀具書。

淳祐新添方

【琥珀黑龍丹】治產後一切血疾，淋露不快，兒枕不散，積聚堅聚，按之攣手疼痛，攻心困頓，垂死者，但藥無有不效。

五靈脂去沙石　當歸去蘆　川芎　乾地黃生者

良薑

已上各等分，入沙合內，赤石脂泥縫紙筋，和鹽泥固濟封合，炭火十觔，煅通紅，去火候沙合冷，開取，合子看成黑物，乃取出，細研入後藥。○一本云，用橡頭沙合。

花乳石煅　琥珀研各一錢　乳香別研

百草霜別研，五兩　硫黃研各一錢半

右同為細末，米醋煮糊圓，如彈子大，每服一圓，炭火燒通紅，投生薑自然汁與無灰酒各一合，小便

中塗研開頓服，立效。

吳直閣增諸家名方

【南嶽魏夫人濟陰丹】治婦人血氣久冷無子，及數經墮胎，皆因衝任之脈虛損，胞內宿挾疾病，經水不時暴下不止，月內再行，或前或後，或崩中漏下，三十六疾，積聚癖瘕，臍下冷痛，小便白濁，以上疾證，皆令孕育不成，以至絕嗣，治產後百病，百日內常服，除宿血，生新血，令人有孕，及生子充實，亦治男子亡血諸疾。

秦艽　石斛去根，酒浸焙，　甘草炙，
鹿茸燒灰，　桔梗炒，各二兩，　茯苓去皮，各一兩，
人參去蘆，二兩，　木香煨，一兩，　香附炒去毛，
熟乾地黃洗，溫酒蒸焙，　當歸去蘆，
肉桂去粗皮，　乾薑炮，　川芎，
牡丹皮各一兩半，　山藥　舊米泔浸去皮，八兩，
糯米炒一升，○一本云，山藥川椒各三兩，

右為細末，煉蜜煉，每兩作六圓，每服一圓，細嚼，空心食前，溫酒嚥湯任下。

續添諸局經驗秘方

【琥珀圓】治婦人或老或少，產前產後百病，及療三十六種血冷，七疝八瘕，心腹刺痛，卒中癱瘓，半身不遂，八風十二痹等，手足酸疼，乳中痞結，瘀血懷胎，動傷犯不安，死胎不出，并衣不下，並宜服之。

琥珀研，　辰砂別研，　沉香　阿膠碎炒，
肉桂去麤皮，　石斛去根，　附子炮，去皮臍，　五味子揀淨，
川芎各半兩，　牛膝去苗，酒浸一宿，　當歸去苗炒，　人參
肉蓯蓉切，酒浸一宿，焙，　續斷　沒藥研，各三分，
熟乾地黃　木香各一兩，

右為細末，煉蜜為圓，如彈子大，每服一圓，空心嚼酒調下，午晚食前，再服，能生精血去瘀血，若人腹臍疼痛，腰脚如刀刺，及嘔逆上氣，噁心痰涎不思飲食，用薑汁少許和酒服，諸瘕及赤白帶，血冷崩中下血，漏胎下血，用生薑與艾葉炒令赤色入酒同煎數沸，去滓調服，渴酒不止，陳米飲服，溫瘧諸瀉，煎通草燈心湯服，血暈不知人，煎當歸酒調服，上無下冷，濃煎人參湯服，編身虛腫水氣，腹赤小豆湯服，產內二證傷寒，及中風角弓反張，身如板硬，煎麻黃湯服，使破蓋出汗，身經不通，或間雜五色斑，併而下，斷穀不止，飲食無味，肌膚羸劣，面赤唇焦，乍寒乍熱，四肢煩疼，五心燥熱，黑野編身，血斑赤，腫走注，及血風勞傷無力，用產子小便入薑汁少許調服，常服以小便為妙，若恐惡心，稍以中酒，如懷胎人於雜月，一日一服，至產下不覺疼痛，或病人服至五服十服，日倍飲食，是藥功成矣，其

功不能具載，略述發用湯使於前。

【白堊丹】治婦人三十六病，崩中漏下，身瘦手足熱，惡風怯寒，咳逆煩滿，抑急短氣，心脇腰背腹胜與子臟相引痛，漏下五色，心常恐懼，過悲怒憂勞即發，皆是內傷所致，並皆治之。

牡蠣燒研，　白堊　禹餘糧燒，醋淬九遍，研，　龍骨燒研各一兩半，
細辛去苗，　烏賊魚骨燒灰，　白石脂燒，　石韋去毛，
皂莢穗，　附子炮，去皮臍，　芍藥　肉桂去粗皮，
白斂　黃連去鬚，　茯苓去皮，　人參
白芷　當歸去苗，　乾薑炮，
甘草炙，各一兩，　川椒去目及閉口者，炒出汗，半兩，

右為細末，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓至五十圓，空心溫酒下。

【人參養血圓】治女人稟受怯弱，血氣虛損，常服補衝任，調血脈，宣壅破積，退邪熱，除寒癖，緩中下堅脹，安神潤顏色，通氣散悶，兼治婦人懷身，腹中絞痛，口乾不食，崩傷眩暈，及產出月羸瘦不復常者。

烏梅肉三兩，　熟乾地黃五兩，　當歸去苗，二兩，　人參
川芎　赤芍藥　蒲黃炒，各一兩，

右為細末，蜜煉杵數千下，圓如梧桐子大，每服五十圓至百圓，溫酒米湯下，食前服。

【牡丹散】治血虛勞倦，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏重，心悸頰赤，口燥咽乾，發熱盜汗，減食嗜臥，及血熱相搏，小水不利，臍腹脹痛，寒熱如瘧，又治室女血弱陰虛，榮衛不和，痰嗽潮熱，肌體羸瘦，漸成骨蒸。

乾漆二兩，炒，　蓬莪朮炮，　蘇木　鬼箭各一分，
甘草半兩湯炙，半生，　當歸　桂心　牡丹皮
芍藥　陳皮去白，　紅花　延胡索炒，
沒藥別研令細，　烏藥各一兩，

右為末，每服二錢，水一盞，煎至七分，不拘時服。

【調中湯】治產後腸胃虛怯，寒邪所侵，及未滿月飲冷當風，乘虛襲留於肓膜，散於腹脇，腹痛作陣，或如錐刀所刺，流入大腸，水穀不化，洞瀉腸鳴，或下赤白，脇脇脹脹，或走痛不定，急宜服之。

當歸　肉桂去粗皮，　川芎　白芍藥
附子炮，　良薑各一兩，　甘草炙，半兩，

右為剉散，每服三錢匕，水三盞，煎至一盞，去滓熱服。

【旋覆湯】治產後傷風，感寒著濕，咳嗽喘滿，痰延壅塞，坐臥不寧。

旋覆花　五味子　前胡　麻黃去節，
赤芍藥　半夏麴　杏仁去皮尖，麸炒，　茯苓去皮，

甘草炙　荊芥去梗

右各等分爲粗末，每服四大錢，水一盞半，薑五片，棗一枚，煎至七分，去滓，食前服。

【黑龍丹】治證品味與前琥珀黑龍丹同。

【當歸發血圓】治產後惡血不散，發熱疼痛，及惡露不快，脇腹堅脹，兼室女經候不勻，赤白帶下，心腹腰脚疼痛。

當歸　延胡索炒　赤芍藥　丹皮各二兩

肉桂一兩

右爲細末，蜜圓如梧桐子大，溫酒米飲下三十圓，食前溫服，痛甚，細嚼嚥下。

【阿膠枳殼圓】治產後虛羸，大便秘澀。

阿膠碎炒　枳殼麩去穰，麸炒各二兩　滑石研飛爲衣，半兩

右爲末，煉蜜圓如梧桐子大，每服二十圓，溫水下，牛日來未通，再服。

【失笑散】治產後心腹痛欲死，百藥不效，服此頓愈。

蒲黃炒香　五靈脂酒研淘去沙土，各等分爲末。

右先用醋調二錢點成膏，入水一盞煎七分，食前服，熱服。

【增損四物湯】治婦人氣血不足，四肢惰怠，乏力少氣，兼治產後下血過多，榮衛虛損，陰陽不和，乍寒乍熱，並皆服之。

當歸　川芎　人參　乾薑炮

甘草炙　白芍藥各等分

右㕮咀，每服四錢，水一盞，煎至六分，去滓，熱服。若產後寒熱腹中刺痛，則有敗血，當用五積散加醋煎，及大黃散服之。若所下過多，猶有刺痛，亦宜服此二藥。【一方】治經血凝滯，腹內血氣作疼，用四物湯加桃仁官桂等分，名六合湯。【一方】治下血不止，及胞漏胎動，加熟艾、乾薑、甘草、阿膠、黃芪等分，名膠艾湯。【一法】治血痢，止加膠艾，治產後血損，口乾煩渴，加枯薑、夢門冬、煩熱，小便澁，大便閉，加大黃、桃仁湯。腹脹，加厚朴、枳實。煩不得睡，加竹葉。人參、大渴煩燥，加知母、石膏。【一方】治婦人血虛心腹疼痛不可忍者，去地黃，加乾薑名四神湯。大率產後不問下血多少，須日漸無神散三服。

【附產前將護法】按諸家產論云，凡產婦入月，切忌飲酒，恐產時心神昏亂，臨產之時，不可令傍人喧擾，大小慌忙，虛致驚動產母，祇可令熟事產婆，及穩審謹卓老成親密三兩人扶侍，產母初覺腹痛，且宜任意坐臥，勉強飲食，恐致臨產氣力虛羸。若腹痛漸甚，唯宜熟忍，仍可按節次漸服溫胎，榆白皮散一二服，服藥之法，慎勿太早，須得其時，又恐人不得逼迫，且須令人扶策徐徐而行，若行步稍難，即凭物面立，須臾扶策再行，直至腹痛，連腰相引作陣痛頻，即服催生丹一服，更且勉強扶行，陣痛轉甚，難以立忍，是產時將至，即服催生符，後然安詳上草，上草之時，慎勿傷早，若太早，則子在腹中難以轉

側，又須仔細體候，直待兒逼欲生，然後令抱腰山，抱腰之人，不得傾針，則兒得順其理自然易產也。又有臥產者，亦待臥定，胎平若產，體不能曲，則子不失其道，苟或不能依此節適，必致產難，縱或幸免，必須醫生藥疾。

【產後將護法】按經云，婦人非止臨產須憂，至於產後，大須將理，慎勿以產時無他，乃縱心恣意無所不犯，犯時微若秋毫，盛病重於泰岱，且纔得分娩，切忌問是男是女，看血下多少，隨證服藥，血暈藥，宜久吃粥，服四順理中圓，候令人從心下按至臍腹，日五七次，若有疾證，即隨證服藥，粥藥相間，類類服餌，且宜閉目而坐，背後倚物，左右看承，當令直立兩膝，膝時屈伸，類令換覓，過一復時，方得上床，亦須立膝高橋，床頭厚鋪褥，遮圍四向，窗壁孔隙，恐聚風，一膝之內，常踢爐煙以防虛閉，一膝之後，漸加滋味，或以羊肉雌雞煮濃汁作糜粥，宜至百時，常服當歸圓一兩服，以養藏氣，補血脈，滿月之內，尤忌任意飲食，觸冒風邪，恣情喜怒，梳頭用力，高聲作勞工巧之類，及上廁便溺，如此節養將攝，以至百時，始得氣血和調，脏腑平復，設此不慎，即致產後餘疾。

【胎神遊方】

正二三四五六七八九十十一　床戶門灶自身灶子方廁門戶灶床

所直方位，急修造，主損胎。

【催生符】



右件符，用水飛硃砂書之，貼於房內北壁上，迎坐草之時，剳於針上，就燈燒之，不得飛揚，溫水調服。

增廣太平惠民和劑局方卷十

治小兒諸疾外有治療諸方互見各類

【返魂丹】治小兒諸風癲癇，潮發瘈瘲，口眼相引，項背强直，牙關緊急，目睛上視，及諸病久虛，變生虛風，多睡昏困，荏苒不解，速宜服之。

當歸酒浸切焙微炒　烏犀鎊各二兩　乾蠍炮　枳殼去穰麩炒
白芷沿浸一宿微炒　人參去蘆　木香不見火　茯苓去皮
丁香不見火　厚朴去皮薑汁炙熟　藥本去土　天竺黃細研
敗龜酒醋炙黃　何首烏沿浸一宿煮過切焙　桑螵蛸微炒
蓽茇子去白　白芷　虎骨酒醋炙令黃　蜈蚣微炒
縮砂仁各三分　麻黃去根節　麝香別研　羌活去蘆
羚羊角鎊　半夏湯洗七次薑汁浸三宿焙乾炒黃　川烏頭燒令通紅留烟少許入坑以盡薑新土圍食頃　白花蛇酒浸一宿炙令熟
去皮骨用肉　藿香去葉土　白附子微炮
天南星湯洗生薑自然汁煮軟切焙炒黃　槟榔　阿膠碎炒
白殭蠶去絲嘴微炒

草豆蔻微炙　肉桂去粗皮　烏蛇酒浸一宿炙熟取肉用
細辛去苗　陳皮去穰微炒　天麻酒洗切焙
沉香不見火　乾蝎微炙　槐膠　肉豆蔻去殼微炒
朱砂細研水飛　雄黃細研水飛　獨活去苗各一兩　附子水浸後炮去皮臍
牛黃別研　龍腦別研　石斛去根　蟬殼去土微炒
川芎各半兩　烏鴉一箇去嘴翅足　水銀　狐肝三具腊月采取同烏鴉一箇入新瓶內以瓦盆蓋頭泥固濟炭火一斤燒令通赤烟盡出候令研細用
　　腊粉別研一分
琥黃研細用雞蛋盛慢火煮成汁入水銀急炒如青泥成砂再研半兩　金箔二十片爲衣
　右如法修事搗研令細煉白蜜合和入酥再搗三五千下圓如梧桐子大每一歲兒一圓溫薄荷自然汁化下不計時候

【定命丹】治小兒急慢驚風，天弔撮口，潮發搐搦，妳瘋壯熱，昏塞不省。

青黛研半錢　蟬酥乾者酒浸一宿一錢　乾蝎全者七箇微炒
麝香研一趁　白附子炮爲末半分　天南星炮爲末一分
　右件細研令勻以粟米粥和圓如綠豆大別以青黛爲衣每服一圓荆芥薄荷湯化下後困睡無疑但有急者先化半圓滴入鼻中嚏噴者必差一本不用天南星

【八珍丹】治小兒驚風壯熱，精神昏憒，嘔吐痰涎，驚悸恍惚，或發瘈瘲，目睛上視。

甘草炒　天麻去蘆　朱砂研飛　南星牛膽製各五兩
牛黃研一分　天竺子微炒三百五十個　腊粉
雄黃飛各一兩一分　銀箔七十片爲衣
　右爲細末入研藥勻炮蜜爲圓如豌豆大以銀箔爲衣每服一歲兒服一圓薄荷湯化下疾證未退可再服之更量兒大小加減妳食後服

【太一銀朱丹】治小兒驚風壯熱，涎盛發癇，手足搐搦，日睛上視，及風壅實心腦滿悶，嘔吐痰涎，大便秘澀。

黑鉛煉十遍，淨三兩，與水銀結砂子分爲小塊，同甘草水煮半日，候冷取出，研去草不用
水銀結沙子　鐵粉各三兩　甘草同鉛煮十兩　天南星炮爲末三分
硃砂飛研半兩　膩粉研一兩
　右同研勻以麵糊爲圓如麻子大每一歲小兒服一圓薄荷湯下以微利爲度如未利再服乳食後

【鶴頂丹】治大人小兒風壅痰實，咽膈不利，口乾煩渴，睡臥不安，及中暑頭痛，躁渴不解。

麝香研二兩半　硃砂研飛一百兩　牙硝枯研一百二十五兩

寒水石粉一百一十兩　甘草炒爲末三十五兩

右合研勻，煉蜜溲和，每一兩二錢作十圓，大人溫生薑水化下一丸，如治中暑，入生龍腦少許，同研細，新水化下，小兒一丸分四服，更量大小加減，又治小兒臟腑積熱，心神不寧，夜臥狂叫，口舌生瘡，用薄荷自然汁化下，蜜食後服。

【至聖丹】治一切驚風天弔，目睛上視，手足搐搦，狀候多端，用藥一圓，只溫水化滴鼻中，令噴嚏三五次，更用薄荷湯下二圓即愈。如久患五疳，腹脹頭大，四肢瘦小，好喫泥土，可思妹食，爪咬指甲，時擇肩毛，頭髮稀疎，肚上青筋及久患瀉痢，並用米飲下二圓。如久患疳蟲咬心發歇疼痛，並以苦楝子煎湯下二圓。如鼻下赤爛，口齒疳蝕，并口瘡等，用兒孩子妹汁研二圓塗在患處，疳眼雀目，用白羊子肝一枚，以竹刀子批開入藥二圓在內，以麻縛纏定，用淘米泔煮熟，空心食之，仍令乳母常忌毒魚大蒜鷄鴨猪肉等。

熊膽用溫水化入藥　蘆薈研　膩粉同水銀研　硃砂研飛各一兩　麝香研各半兩　蟾酥乾者酒浸一宿　龍腦研　鉛霜研各一錢　雄黃研飛　青黛研　胡黃連各兩　白附子炮二錢　水銀一錢與膩粉同研不見光星

右爲末，入研藥勻，用熟過猪膽汁浸蒸餅爲圓，如黃米大，湯使如前，此藥退驚治風，化蟲殺疳，除百病，進乳食，若隔三兩日進一服，永無百病，不染橫夭之疾，凡有患，與服必功効。

【五福化毒丹】治小兒蘊積毒熱，驚惕狂躁，頰赤咽乾，口舌生瘡，夜臥不寧，譫語煩渴，頭面身體多生瘡癤。

桔梗微炒　元參洗焙各六兩　青黛研　牙硝枯各二兩　人參去蘆二兩　茯苓去皮五兩　甘草炒一兩半　銀箔八片爲衣　麝香研半錢　金箔八片爲衣

右爲細末，入研藥勻，煉蜜爲圓，每兩作十二圓，每一歲兒一圓，分四服，用薄荷水化下，及搐搦後餘毒上攻，口齒腐血臭氣，以生地黃自然汁化一圓，用雞翎掃在口內，熱疳肌肉黃瘦，夜目夜不見物，陳粟米泔水化下，食後臨臥服。

【靈砂歸命丹】治小兒蘊積邪熱，潮熱不除，頰赤口乾，心腦煩躁，痰涎不利，睡臥不安，或發驚癇，涎潮搐搦，又疳積潮不消，下利多日，腹中疼痛，煩渴嘔噦，服藥調和不能愈者，並可服之。

巴豆去心膜皮，炒熟研如麵，去油，三百十五粒　牛黃研　龍腦研　麝香研　膩粉研各三兩　辰砂研飛九兩　金箔研九十片

右合研勻，煉黃蠟六兩入白沙蜜三分，同煉令勻，爲圓，如綠豆大，每服二圓，金銀薄荷湯下，更量歲數加減，如驚癇搐搦，用龍腦膩粉薄湯下，風癇先以冷水浸少時服之，見効尤速。

【大天南星圓】治小兒急慢驚風，涎潮發搐，目睛上視，口眼相引，牙關緊急，背脊強直，精神昏塞，連日不省。

天南星牛膽製者，半兩　龍腦研　乳香研各一錢　人參　天麻去蘆　朱砂研三錢　乾蝎十四箇，湯浸洗去土，微炒爲末

右件研拌令勻，煉蜜和圓，如大雞頭大，每服一圓，荊芥薄荷湯化下，益兒大小以意加減，服不計時候。

【五疳保童圓】治小兒五疳，蓋其骨肉輕軟，腸胃微細，若乳哺有節，則臟腑相調，或乳母寒溫失理，飲食無常，醉飽喜怒，及小兒百晬以後，五歲以前，乳食漸多，不擇生冷，好食肥膩甘酸之物，即成五疳，一曰肝疳，其候搖頭揉目，白膜遮睛，流汗遍身，合面而臥，目中澀痒，肉色青黃，髮立頭焦，節青腦熱，腹中積聚，下痢頻多，久而不瘥，轉甚羸瘦，二曰心疳，其候渾身壯熱，吐痢無常，頰赤面黃，胸脇炷滿，鼻乾心躁，口舌生瘡，痢久不瘥，多下膿血，有時盜汗，或乃虛驚，三曰脾疳，其候腹多筋脈，喘促氣飽，乳食不多，心腹脹滿，多啼欬逆，面色萎黃，骨立毛焦，形枯力劣，胸脇壅悶，水穀不消，口鼻常乾，好吃泥土，情意不悅，愛暗憎明，腸胃不和，痢多酸臭，四曰肺疳，其候欬嗽氣逆，皮毛乾焦，饒涕多啼，咽喉不利，揉鼻咬甲，壯熱憎寒，口鼻生瘡，唇邊赤痒，腹內氣脹，乳食漸稀，大腸不調，頻頻洩痢，藥中米出，皮上粟生，五曰腎疳，其候肌肉消瘦，齒斷生疳，寒熱作時，口鼻乾燥，腦熱如火，脚冷如冰，吐逆既增，乳食減少，瀉痢頻併，下部開張，肛門不收，疳瘡痒痛，已上疾狀，並皆治療。

黃連去鬚　白鱔頭炙令焦黃，無即炒白鱔皮充代　草龍膽去蘆　雄黃飛研　青橘皮去瓤　夜明砂微炒　五倍子　蝟頭一枚，炙令黃色　苦楝根　天漿子微炒　胡黃連　麝香　青黛研　熊膽研　蘆薈研各一分

右爲細末，都研令勻，用糯爲飯和圓如麻子大，每服一歲兒一圓，不計時候，溫米飲下，日進三服，丸如○一方有蝟牛微炒一分。

【虎睛圓】治小兒驚風壯熱，痰涎壅潤，精神昏憒，睡多驚悸，或發搐搦，目睛直視。

茯神去木　天麻去苗　天竺黃研　胡黃連各五兩　白附子炮　膩粉研　天南星炮三兩　天漿子微炒四十箇　麝香研各三兩　朱砂研飛二兩　使君子一百箇　青黛研七兩

右爲細末，以麵糊爲圓，如梧桐子大，每一歲兒服一圓，薄荷湯化下，更量虛實加減，乳食後服。

【化蟲圓】治小兒羸病，多有諸蟲，或因脾臟虛弱而動，或因食甘肥而動，其動則腹中疼痛發作，腫聚往來上下，痛無休止，亦攻心痛，叫哭合眼，仰身撲手，心神悶亂，嘔噦涎沫，或吐清水，四肢羸困，面色青黃，飲食雖進，不生肌膚，或寒或熱，沉沉嚶嚶，不的知病之去處，其蟲不瘥，則子母相生，無有休止，長一尺則害

人。

胡粉炒、　鶴蝨去土、　檳榔　苦楝根去浮皮、各五十兩、

白礬枯十二兩半、

右爲末、以麵糊爲圓、如麻子大、一歲兒服五圓、溫漿水入生麻油一兩點、打勻下之、溫米飲下亦得、不拘時候、其蟲細小者、皆化爲水、大者自下、

【進食丸】治乳食不消、心腹脹滿、壯熱喘粗、嘔吐痰逆、腸鳴泄瀉、米穀不化、或下痢赤白、腹痛後重、及食積乳癖痃氣痞結、並皆治之。

代赭石燒醋淬、研、　常歸去蘆、微炒、　朱砂研飛、　枳殼去穰、麩炒微黃、

木香各半兩、　麝香細研、一分、　巴豆霜半分、

右件擣羅爲末、入研藥匀、麵糊爲圓、如麻子大、每一歲兒服一圓、溫米飲下、更量虛實加減服之、食後服、

【金箔鎮心丸】治小兒風壅痰熱、心神不寧、驚悸煩渴、唇焦頰赤、夜臥不安、譫語狂妄。

紫河車用黑豆煮軟、切作片焙乾、二十五兩、　山藥一百五十兩、　牙硝枯、十五兩、

甘草炙、　人參去蘆、　茯苓去皮、各五十兩、　朱砂研飛、一百兩、

龍腦研、十兩、　麝香研、五兩、　金箔一千二百片爲衣、

右爲細末、煉蜜爲圓、每一兩半作五十圓、以金箔爲衣、每服一圓、薄荷湯化下、含化亦得、食後臨臥服、潛服安鎮心神、散敗邪熱、涼咽膈、止驚啼、

【比金圓】治小兒驚風體熱、喘薩涎嗽、心忪頰赤、大小便不利、夜臥不穩。

天南星炮、十二兩半、　滑石　　膩粉研、各十五兩、　青黛研、二兩半、

巴豆七百箇、去皮取霜、

右爲細末、以麵糊爲圓、如麻子大、每服一歲一圓、薄荷溫水下、如急驚風、頭熱足冷、口噤面青、筋脈抽掣、上陽頑涎、疾狀甚者、加一兩圓、煎桃符湯下、疎利下蘊毒熱涎、立便安愈、小兒痢後、餘毒不解、宜與服、食後、

【香連丸】治小兒冷熱不調、泄瀉煩渴、米穀不化、腹痛腸鳴、或下痢膿血、裏急後重、夜起頻併、不思乳食、肌肉消瘦、漸變成疳。

白石脂　　龍骨　　乾薑炮、　黃連去鬚、微炒、

白礬燒、各半兩、

右件藥擣羅爲末、醋煮麵糊和圓、如麻子大、每一歲兒服十圓、米飲下、乳食前服、如煩渴、煎人參湯下、更量兒大小、以意加減、日三四服、

【開胃圓】治小兒脾臟怯弱、內受風冷、腹痛脹滿、腸鳴泄利、或青或白、乳食不化、又治臟冷夜啼、胎寒腹

痛。

白芍藥　　麝香細研、各一分、　人參

蓬莪朮煨、　白朮　　當歸去苗、微炒、各半兩、　木香

右件擣羅爲末、糊研令勻、湯浸炊餅和圓、如黍米大、每服十五圓、溫米飲下、新生兒腹痛夜啼、可服五圓、並乳食前服、

【沒石子圓】治小兒腸虛受熱、下痢鮮血、或便赤汁、腹痛後重、晝夜不止、逼數頻多。

沒石子　　地榆各半兩、　黃蘗剉、蜜炒、二兩、

酸石榴皮一兩、　黃連剉、炒、一兩半、

右件擣羅爲細末、以醋煮麵糊和圓、如麻子大、每服十圓至二十圓、溫米飲下、食前服、

【牛黃膏】治驚化涎、涼腦鎮心、祛邪熱、止痰嗽。

蛤粉研飛、二百兩、　牙硝枯研、　朱砂研飛、各十兩、　人參二十五兩、

雄黃研飛、七十五兩、　龍腦研、四兩、　甘草炙、五十兩、　金箔銀箔各二百片爲衣、

右爲細末、煉蜜澆和、每一兩八錢作二十圓、以金箔銀箔爲衣、一歲兒每服如菉豆大、薄荷湯水化下、量歲數臨時加減服之、食後、

【金屑辰砂膏】治小兒心經邪熱、頰赤多渴、睡臥不寧、譫語狂妄、痰涎不利、精神恍惚、及大人痰熱蘊積、心腦煩躁、咽喉腫痛、口舌生瘡。

牙硝枯研、　鐵粉研、各半兩、　甘草炙、二兩、　龍腦研、二錢、

辰砂研飛、三兩、　蛤粉研飛、八兩、　人參一兩、　金箔三十片爲衣、

右爲細末、煉蜜澆和、每一兩半作二十丸、捏圓用金箔爲衣、每服半皂子大、大人一圓分作兩服、並用薄荷湯化下、食後臨臥服、

【潤肺散】治小兒寒壅相交、肺氣不利、欬嗽喘急、語聲不出、痰涎壅塞、胸腦煩滿、鼻塞清涕、咽喉乾痛。

貝母去心、麩炒黃、　杏仁湯去皮尖及雙仁者、焙乾、麩炒、各二兩半、　麻黃去根節、

人參各二兩、　阿膠炒令黃燥、　桔梗各半兩、

甘草炙、一兩、　陳皮去白、一分、

右同杵羅爲粗末、每服一錢、水八分煎六分、去滓、溫服、食後、

【惺惺散】治小兒風熱瘧疹、傷寒時氣、頭痛壯熱、目澀多睡、欬嗽喘滿、鼻塞清涕。

瓜蔞根　　人參　　細辛去葉、

白朮　　甘草炙、　　桔梗各一兩半、　茯苓去皮、

右件同杵羅爲末、每服一錢、水一小盞、入薄荷三葉、同煎至四分、溫服、如要和氣、即入生薑煎服、不

計時。

【清涼飲子】治小兒血脈壅實，腑臟生熱，頰赤多渴，五心煩燥，睡臥不寧，四肢驚掣，及因乳哺不時，寒溫失度，令兒血氣不理，腸胃不調，或溫吐逆滯，欲成伏熱，或壯熱不歇，欲發驚癇，又治風熱結核，頭面瘡癤，目赤咽痛，瘡疹餘毒，一切壅滯，並宜服之。

當歸去蘆酒浸，　甘草炙，　大黃蒸煮，　赤芍藥

右每分爲散，每服一錢，水一中盞，煎至七分，去滓，溫服，量兒大小虛實加減，微溏利爲度，食後臨臥服。

【天竺飲子】治大人小兒腑臟積熱，煩躁多渴，舌頰生瘡，咽喉腫痛，面熱口乾，目赤鼻齄，丹瘤結核，癰瘡腫痛，又治伏暑躁熱，瘡疹餘毒，及大便下血，小便赤澀。

川鬱金用皂角水煮，切作片焙乾，　甘草炙各二十兩，　連翹

大梔子仁微炒各二十兩，　瓜蔞根十斤，　雄黃研飛五兩，

右爲細末，每服一大錢，食後臨臥，用新水調服，小兒半錢，臨時更量兒大小以意加減。

【朱砂圓】鎮心神，化痰涎，利咽膈，止煩渴。

鵬砂研一分，　朱砂研飛五十兩，　梅花腦研，　麝香研各半兩，

腦子研，　牙硝枯各一兩，　寒水石燒通紅研四兩，　甘草浸汁熬膏五斤，

右研勻，用甘草膏和，每兩作一百圓，每服一圓含化，小兒夜多驚啼，薄荷水化下。

【太一丹】治小兒諸風驚癇，潮發搐搦，口眼相引，項背強直，精神昏困，痰涎不利，及一切虛風，並皆治之。

天南星炮，　烏蛇酒炙取肉各三錢，　天麻去蘆酒浸一宿，　麻黃去根節各半兩，

乾蝎微炒一錢半，　白附子炮三錢半，　白殭蠶去絲嘴炒四錢，　附子炮去皮臍半兩，

已上爲細末，以水一升調浸三日，以麥食麵一斗拌勻，蒸作麵，須六月六日以楮葉裹七日取出，逐片用紙裹盛掛當風，十四日可用，每麵末一兩，入下項藥，

琥珀研一錢，　辰砂研飛六錢，　雄黃研飛三錢，　甘草炙爲末半錢，

右合研勻，煉蜜和圓，如雞頭大，每服一丸，溫水化下，不計時。

【大慈圓】治驚風諸癇，壯熱昏憒，神志恍惚，痰涎壅塞，或發搐搦，目睛直視，並皆治之。

蛇黃火煅醋淬九次，研飛二錢，　青礞石研一錢，　朱砂研飛三錢，

蝦蟆灰　雄黃各一錢半，　鐵粉研二錢半，

右研勻，以水浸餅，丸如桐子大，每服一丸，煎薄荷水磨舟刀服化下，日二三服，此藥治驚化涎，不用銀粉，小兒臟腑口淡，腸胃柔弱，凡用銀粉類，切須慎之，則無他苦。

紹興續添方

【睡驚丹】治小兒驚邪，風熱痰壅，咽膈不利，夜臥不安，睡中啼哭，驚風搐搦。

蛇黃火煅紅，米醋淬五遍，再將醋煮乾爲度，　天南星研爲粉，用薄荷汁糊和爲餅炙熟，

茯苓去皮，　鐵粉研，　使君子仁，

已上五味，搗羅爲末，各秤半斤，

腦子別研半兩，　麝香別研一兩，　銀箔研，　金箔研各一百片，

右前項五味藥末，入後項研細拌勻，糯米糊爲丸，如皂莢子大，朱砂爲衣，用薄荷湯磨下，五歲兒一丸分二服，三歲已下兒一丸分三四服，更益歲數加減，常服安神鎮心，定驚控涎。

【使君子圓】治小兒五疳，脾胃不和，心腹膨脹，時復污瘀，不進飲食，漸致羸瘦，並宜服之。

使君子仁，煨去黑皮，一兩，　厚朴去皮，薑汁炙，　陳皮去白，

川芎各一分，

右爲細末，煉蜜圓如皂子大，三歲以上一粒，以下半粒，陳米飲化下，大治小兒腹痛。

【加減四君子湯】治小兒吐瀉不止，可進乳食，常服調胃進食。

白蔻豆蔻熟煨乾，　藿香葉，　甘草炙，　黃芪去蓋各一兩，

人參，　茯苓去皮煨，　白朮各四兩，

右爲細末，每服一錢，入鹽點服，或用水七分，煎至五分溫服。

【消毒犀角飲】治證并方見前積熱類。

寶慶新增方

【肥兒圓】治小兒疳病者，多因嗣乳食吃太早所致，或因久患臟腑胃虛動，日漸羸瘦，腹大髮豎，不能行步，面黃口臭，發熱，面無精神，此藥殺蟲進食。

神麯炒，　黃連去鬚各十兩，　肉豆蔻麵裹煨，

麥蘖炒各五兩，　檳榔不見火，細剉，二十箇，　使君子去皮，

右爲細末，猪膽爲丸，如粟米大，每服三十丸，量歲數加減，熟水下，空心服。○（一方）黃連神麯使君子各一兩，檳榔肉豆蔻各半兩，木香二錢，麵糊丸如雞頭子大，熟水吞下。　木香二兩，

【換積圓】治小兒脾胃不和，宿滯不化，腹脹腸鳴，嘔逆惡心，便利不調，乳食減少，或痢瀉積滯，大便酸臭，亦治丈夫婦人胸膈不快，酒積食積，嘔逆惡心，吐瀉脾疼。

京三稜煨，　丁皮不見火各三兩，　丁香不見火，　青皮去白各一兩，

乾薑炮，　巴豆去皮膜，別各二錢半，

右件爲細末，入巴豆拌勻，麵醋糊爲丸，如粟米大，每服五十丸至六十丸，二歲兒可服七丸至十丸，生薑湯吞下，熟水亦得，不拘時候，更量兒歲數加減與之，此藥不用大黃硼砂藥粉之類，並是性溫之藥，常服消積滯，進乳食，退黃長肌。

【急風丹】治小兒傷風，鼻塞清涕，酒調塗顙門上，不可服，方見諸風類。

淳祐新添方

【助胃餅】治小兒胃氣虛弱，乳食不進，腹脇脹滿，腸鳴泄瀉，唄乳便青，或時夜啼，胎寒腹痛。

白豆蔻仁　肉豆蔻煨　丁香　人參
木香各一兩　官桂去粗皮　白朮
茯香葉　白茯苓去皮　甘草炙各二兩　橘紅去白
山藥各四兩　縮砂仁

右為細末，煉蜜和成膏，每服如雞頭實大一丸，量兒大小加減，米飲化下，不拘時候。

【觀音散】治小兒外感風冷，內傷脾胃，嘔逆吐瀉，不進乳食，人漸羸弱，大抵脾虛則瀉，胃虛則吐，脾胃俱虛，吐瀉不已，此藥大能溫養脾胃，進美飲食，全蝸觀音散見後。

人參一兩　石蓮肉炒去心一分　茯苓一口半　神麯炒二錢
綿芪　白芷　木香煨　甘草炙

白扁豆去皮炒黃去火毒各一錢

右為細末，每服一錢，水一小盞，棗一枚，薑三片，煎四分，去滓，溫服，量兒大小加減。

【小抱龍圓】治傷風瘟疫，身熱昏睡，氣粗喘滿，痰實壅嗽，及驚風潮搐，蠱毒中著，並可服之，壯實小兒，宜與服之。

天竺黃一兩　雄黃水飛二分　辰砂別研　麝香別研各半兩

天南星腦月膽黃牛膽中陰乾百日者，如無，只以生者去皮臍剉炒熟用四兩

右為細末，煮甘草水和丸，如皁子大，每服一丸，溫水化下，百時內者，作三服，或用蘇薄水煮甘草和藥尤佳。

【鈎藤膏】治小兒胎寒胃冷，腹肚污痛，夜間啼哭，嘔吐乳食，大便溏青，狀若驚搐，時有冷汗。

蠶黃二錢　沒藥別研　乳香別研　木香各四錢

右為細末，煉蜜和成膏，每服三錢，見一丸，如雞頭實大，煎鈎藤湯化下，更量大小加減，不拘時候。

吳直閣增諸家名方

【阿魏圓】治小兒五疳八痢，乳食不節，寒溫調適乖違，髮竪毛焦，皮膚枯悴，脚細肚大，顏解胸陷，漸羸尪羸，時發寒熱，盜汗欬嗽，腦後核起，腹內塊生，小便泔濁，膿痢澁青，癖肩咬指，喫土甘酸，吐食不化，煩渴併剉，心神昏昏，鼻赤唇燥，小蟲既出，蝎蟲咬心，瞑眼雀目，名曰丁奚，此藥救療效驗如神。

白蠟黃去皮　黃連去鬚　阿魏酒浸去骨，焙　胡黃連各一兩半

青黛半兩為衣

右件藥為細末，猪膽汁麵糊丸，如粟米大，每服三十丸，用飯飲吞下，食後臨臥日進三服。

【高良薑散】治小兒冷傷脾胃不和，腹脹氣悶，不欲飲食。

高良薑　草豆蔻去皮　陳皮去白
肉桂去粗皮各一分　人參去頭半兩　當歸微炒

右件為粗散，三歲兒每服一錢，水一盞煎至五分，去滓，溫服，不計時候，量兒大小加減服之。

【人參圓】治小兒乳哺飲冷過度，傷冷脾胃，腸脇脹滿，多吐痰涎。

人參　丁香　陳皮去白
白朮各一分　半夏湯洗七次半兩　乾薑炮

右件為細末，煉蜜和圓，如麻子大，每三歲兒服十丸，溫湯下，不拘時，日二服，量兒大小加減。

【白豆蔻散】治小兒脾胃不和，增寒壯熱，腹痛嘔吐，不納乳食。

枇杷葉去毛微炙　白豆蔻去皮　陳皮去白　芎藭
甘草炙各一分　乾木瓜　人參　黃芪各半兩

右為粗散，三歲小兒每服一錢，水一小盞，生薑錢子三片，棗一枚，同煎至七分，去滓，溫服，不計時候，量兒大小加減。

【厚朴散】治小兒外感風冷，壯熱增寒，頭痛體重，中寒風逆，嘔吐惡心，或手足厥冷及脾胃不和，並皆治之。

蒼朮米泔浸一宿，去黑皮，焙　厚朴去皮，薑汁炙
乾薑炮三分　甘草炙半兩

右件為細末，三歲小兒每服一錢，水一小盞，入生薑錢二片，棗子一枚，同煎至五分，濾去滓，熱服。

【柴胡散】治小兒傷寒壯熱，頭痛體疼，口乾煩渴。

石膏　黃芩　甘草
葛根各一兩　麻黃去根節　柴胡去苗各半兩　赤芍藥　陳皮去白各一兩

右為粗散，三歲小兒每服一錢，水一小盞，入生薑少許，蘆白三寸，破二十粒，同煎至五分，濾去滓，溫服，不計時候，汗出為效，量兒大小加減。

【葛根散】治小兒傷寒，四肢煩熱，頭疼體痛，心躁口乾，煩渴。

葛根　麻黃去根節　人參各半兩　肉桂去粗皮
甘草各一分

右件為粗散，三歲兒每服一錢，水一小盞，入生薑少許，棗子一枚，同煎至五分，濾去滓，溫服，量兒大小加減，不計時候。

【人參散】治小兒傷寒作熱，常服調順陰陽，和養脾胃，定吐逆，止煩渴。品味與前人參散同。

為散，三歲兒每服一錢，水一小盞，煎五分，溫服，量兒大小加減。

【豆蔻香連圓】治小兒乳食不節，腸胃虛弱，冷熱之氣，客於腸間，下赤白痢，腸內污痛，日夜頻併，不欲飲

食量大小加減服之。

黃連去鬚微炒三分　肉豆蔻仁二枚　丁香一分　木香

訶黎勒炮去核各半兩

右擣羅爲末以粳米粥和丸如米大三歲兒服十丸粥飲下

【龍骨圓】治小兒赤白久痢日夜頻併腹痛羸弱不欲飲食

黃連去鬚微炒　黃蘗　白龍骨　訶黎勒皮

木香各一分　當歸微炒　乾薑炮　白礬枯研各半兩

胡粉微炒黃三分

右件擣羅爲末煉蜜和圓如綠豆大三歲兒每服十圓溫米飲下日三服益兒大小臨時加減

【烏梅散】治小兒下痢後津液減少臟腑虛燥煩渴引飲及治諸病煩渴引飲無度

烏梅肉微炒半兩　白茯苓　乾木瓜各一兩

右擣羅爲粗散三歲兒每服一錢水一小盞入生薑錢一片煎至五分去滓溫服不計時候服益兒大小加減

【白芨散】治小兒腎氣不成腦髓不足小兒年大骨應合而不合頭縫開者是也宜以藥塗之

白芨　柏仁　防風去苗　細辛去葉各一兩

石爲細末每一錢以乳汁調塗在兒顖骨上每日一次用之

【附子散】治小兒大腸虛冷肛門脫出多因下痢得之宜以藥傅

附子生去皮　龍骨各一兩

右擣羅爲細散每用一錢傅在脫肛上按令入頻用之

【赤石脂散】治小兒因痢後脏氣下推出肛門不入

伏龍肝　赤石脂各等分

右件細研爲散每用半錢傅肛頭上每日三上用

【朱礬散】治小兒初生鵝口其舌上有白屑如米屑者鼻外亦有并不能乳

朱砂細研　白礬枯各等分

右件藥研極細每用少許傅兒舌上每日三次用之先使風乳令淨即塗

【益黃散】治小兒脾胃虛弱腹痛泄痢不思乳食嘔吐不止困乏神悶心腹膨脹顏色青黃懨懨不醒

丁香四錢不見火　陳皮去白二兩　甘草炙　訶子炮去核

青皮去白各一兩

右爲細末每服一大錢水七分煎煎至五六分食前進益大小加減與服此藥極有神效不可盡述

【錢氏白朮散】治小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉煩併不止津液枯竭煩渴多躁但欲飲水乳食不進羸困少

力因而失治變成風癇不問陰陽虛實並宜服之

人參　白朮不見火　木香不見火

白茯苓去黑皮　甘草炙各一兩　乾葛剉二兩

右爲粗末每服一錢水一小盞煎至半盞去滓溫服不拘時更量兒大小加減渴甚者併煎任意飲之

續添諸局經驗秘方

【全蝎觀音散】治證與前觀音散同

石蓮肉炒去心　白扁豆炒　人參各二兩半

全蝎　羌活　天麻去苗

黃芪切焙蜜炙　木香炮　白芷

茯苓去皮一兩半

右爲細末嬰兒一匙二三歲半錢四五歲一錢用水一盞或半盞薑棗子半箇或一箇同煎至七分去滓服不拘時候

【鎮心至寶丹】治小兒一切驚風搐搦壯熱涎多魚口噀聲眼睛直視

天南星煨　白附子炮　雄黃研　全蝎各半兩

白殭蠶去絲嘴炒　鬱金各一兩　龍腦研　麝香研各二錢半

辰砂研一分　膩粉二錢　滑石末二兩

右爲細末煉蜜爲圓如皂荚子大金銀箔爲衣每服一丸食後臨臥薄荷湯下常服鎮心神涼咽膈

【蛇頭圓】治小兒急慢驚風手足抽掣眼睛直視角弓反服證候危急者

蛇含石十箇煅三度醋淬却用甘草湯煮出臟氣研飛爲細末　鐵膩粉二兩

花蛇頭十箇酒浸用齒并肉　五靈脂酒浸去砂

蝎梢　白附子炮　鬱金炮各二兩

麝香研一兩　龍腦別研半兩

右爲細末麵糊爲圓如雞頭大每服一丸薄荷白湯研以井花水化開益兒大小加減與服

【五疳消食圓】治小兒五疳八痢殺腹臟蟲療疳勞及走馬牙齒唇爛肚大青筋此藥大能進食悅顏色

長肌膚

麥蘖　使君子去皮炒　黃連去鬚微炒

草龍膽　蘆薈　橘紅焙

右等分爲細末麵糊爲丸如麻米大每服二三十圓空心米飲吞下不拘時候益兒歲數加減

【參煎散】治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣粗喘急面赤自汗或狂言驚叫或不語無汗及癍疹

遍身赤斑，往來潮熱，時行麻豆粉子，餘毒未盡，渾身浮腫，痰涎欬嗽，或變急慢驚風，手足搐搦，眼目上視，及傷風痰喘頭疼，並皆治之。

知母　地骨皮洗淨　赤芍藥　甘草炙
石膏　牽藤子　白茯苓去皮　杏仁去皮尖，麸炒
人參　滑石各半兩　麻黃去根節，一兩半

右為細末，每服一錢，麥子煎湯調下，如初生牙兒感風冷，鼻塞身熱，噴嚏多啼，每一匙許，並用麥子煎湯下。

【秘傳神仙消痞圓】治小兒一切痞疾，皆因寒溫不調，乳哺失節，或喜生冷菓子粘食等物，脾胃微弱，不能消化，致五臟不利，三焦壅滯，結塊腹內，堅硬如石，或發作寒熱，有如瘧證，不能飲食，漸致羸瘦，急宜服之。

班蝥二十箇，去頭足翼，用糯米半升同炒，候米焦黃色為度，去米不用。
巴豆去皮取霜，二十粒。

右先將班蝥研為細末，却入巴豆霜同研令勻，用米糊為圓，如小綠豆大，小兒三歲以前每服三圓，五更初茶清下，更量歲數虛實加減與服，此藥神妙。

【銀白散】治小兒百病，如慢驚搐搦，用麝香飯飲調下，急驚定後，用陳米飲調下。驚吐不止，丁香湯調下。天柱倒脚，軟濃米飲調下。夾驚傷寒，薄荷葱白湯調下。疳氣肚脹，氣急多渴，百合湯調下。渾身壯熱，面赤驚叫，金銀薄荷湯調下。赤白痢不思乳食，荳蔻三片，棗子三枚，煎湯調下。吃食不知饑飽，不長肌肉，炒麥芽一撮同生薑煎湯調下。暴瀉，紫蘇木瓜湯調下。神情脫言語不正，及大人吐瀉，藿香湯調下。諸病後無精神，少氣力，不思食，煎生薑棗湯調下。裏受氣怯，小兒可每日一服最妙。

升麻　知母　甘草炙　白扁豆
山藥　人參　茯苓去皮　白朮各等分

右為細末，每服一錢，湯使如前，常服，沸湯點，不計時。

【磨積圓】治小兒臟腑怯弱，內受積冷，脇肋脹痛，嘔吐痰逆，腸鳴泄瀉，日夜頻併，四肢困倦，面無顏色，肌肉消瘦，不進飲食，及疳氣羸瘦，肚大青筋，口乾煩渴，小便白濁，食不生肌，或發虛脃，寒熱往來，或因食甘肥蟲動作痛，叫哭合眼，並能治之。

乾漆炒，一兩　京三稜煨　青皮去白，各六兩　丁香一兩
蓬朮半斤

右為細末，水糊為丸，如粟米大，每二歲兒可服五丸，煎蘇湯卷下，不拘時候，更量歲數虛實加減與之。

【龍膽圓】治疳病發熱，

龍膽草去蘆　黃連去鬚，微炒　使君子去皮炒　青皮去白

右等分為細末，猪膽汁和為丸，如綠豆子大，每服二十丸，以意加減，隨風熱水下。

諸湯

【豆蔻湯】治一切冷氣，心腹脹滿，胸膈痞滯，噦逆嘔吐，泄瀉虛滑，水穀不消，困倦少力，不思飲食。

丁香枝杖七斤　肉豆蔻仁，麵裹煨，八斤　甘草炒，十一斤
白麵炒，六斤

右炒鹽十三斤同為末，每服一錢，沸湯點服，食前。

【木香湯】治胸膈痞塞，心腹刺痛，脇肋脹滿，飲食減少，噫氣吞酸，嘔逆噎悶，一切氣疾，並皆治之。

木香　青皮各三斤　鹽黃　麥蘖炒，各五斤
甘草炒　鹽炒，各十一斤　蓬朮四斤

右為末，每服一錢，沸湯點服，不計時候。

【桂花湯】治一切冷氣，心腹刺痛，胸膈痞悶，脇肋脹滿，嘔逆惡心，飲食無味。

乾薑炮，九兩　縮砂仁三斤十四兩　桂心
甘草炒，各九斤

右炒鹽十四斤，同為末，每服一錢，沸湯點服，食前。

【破氣湯】治一切冷氣攻心，腹脇肋脹滿刺痛，噫氣吞酸，嘔逆惡心，胸膈噫塞，飲食減少。

青皮不去白　陳皮不去白　茴香揀淨炒，各十二兩　鹽炒，十四斤
桂心一斤　良薑炒　鹽黃　華澄茄
木香各六兩　甘草炒，八斤半　杏仁去皮尖，麵炒別搗，一斤
丁香皮九兩

右為末，每服一錢，沸湯點，食前服。

【玉眞湯】治一切冷氣，痰逆惡心，胸膈痞悶，臍腹撮痛，口苦無味，飲食不美。

阿魏麵裹煨　茴香揀淨炒，各三斤　桂香一斤半　胡椒九兩
乾薑炮，一斤半　杏仁去皮尖，麵炒別搗，三斤十二兩　白麵炒，六兩
白粳米炒，一斗六升　甘草炒，十斤　鹽炒，三十三斤半

右為末，每服一錢，沸湯點服，食前。

【棗湯】治脾胃不和，乾嘔惡心，腹脇脹滿，不美飲食。

棗去核，一斤　生薑洗切，五兩　甘草炙剉，三兩

右三味，一處拌勻，用盆器盛貯，以布蓋罨一宿，焙乾，搗為末，每服每錢入鹽少許，以沸湯點服，常服健脾胃，順氣進食。

【二宜湯】治冒暑引飲，冷熱不調，泄瀉多渴，心腹煩悶，痢下赤白，腹痛後重。

桂心四斤四兩，　乾薑砂炒，四斤，　甘草炙炒，三十斤，

杏仁去皮尖，砂炒，四斤四兩，別研，

右爲末，每服一錢，沸湯點服，如傷暑煩渴，新水調下，不拘時。

【五味湯】溫中益氣，治胸膈痞滿，心腹刺痛，短氣噎悶，欬嗽痰唾，嘔逆惡心，不思飲食。

五味子洗，九斤，　良薑炒，　陳皮去白，　茴香炒，一斤，

甘草炙炒，十七斤半，　鹽炒，二十二斤，

右爲末，每服二錢，沸湯點服，食前。

【仙朮湯】辟瘴疫，除寒濕，溫脾胃，進飲食。

蒼朮去皮，四十八斤，　棗去核，二斗四升，　杏仁去皮尖，麸炒，別搗，六斤，

乾薑炮，十兩，　甘草炒，十四斤，　鹽炒，二十五斤，

右爲細末，入杏仁和勻，每服一錢，沸湯點服，食前，常服延年，明目，駐顏，輕身不老。

【茴香湯】療元臟氣虛冷，臍腹脹滿，痞刺疼痛，不思飲食，一切冷氣，並皆治之。

茴香去土炒，六升，　川楝子洗炒，　陳皮炒，十二斤，　甘草炙炒，七斤，

鹽炒，一斤，

右爲末，每服一錢，如茶點吃，煎服，溫中益氣，利脾胃，進飲食。

寶慶新增方

【檀香湯】治精神不爽，頭目昏眩，心悸煩躁，志意不定。

川芎不見火，　白芷不見火，各二兩，　桔梗炙，三十兩，　檀香不見火，二兩，

甘草炙，六兩，

右爲細末，每服一錢，入鹽少許，沸湯點服，常服調中順氣，安神定志，清爽頭目。

【縮砂湯】治一切冷氣，心腹刺痛，胸膈痞悶，脇腹脹滿，嘔逆惡心，飲食無味，脾胃不和，酒食多傷，嘔吐不止。

縮砂仁不見火，　甘草炙，各十二兩，　桔梗炙，六十兩，　丁皮不見火，六兩，

右爲細末，每服一錢，入鹽少許，沸湯點服，食前，常服消滯氣，寬胸膈，健脾胃，進飲食，止嘔吐。

吳直閣增諸家名方

【錫脾湯】治脾胃不快，宿酲留滯，嘔吐酸水，心腹脹痛，不思飲食，傷冷泄瀉，並宜服之。

麻油四兩，　良薑十五兩，　茴香炒，七兩半，　甘草十一兩七錢，

右炒鹽一斤，同麻炒爲細末，每服一錢，白湯點下，常服快氣，大解中酒，美進飲食。

【小理中湯】治脾胃不和，中寒上衝，胸脇逆滿，心腹疼痛，飲酒過度，痰逆惡心，或時嘔吐，心下虛脹，隔塞

不通，飲食減少，短氣羸困，溫中逐水去濕，又治腸胃冷濕，泄瀉注下，水穀不分，腹中雷鳴，霍亂吐利，手足厥冷，胸痞心痛，逆氣結氣，並皆治之。

蒼朮米泔浸焙，五兩，　生薑五斤，　甘草生用，十兩，　鹽炒，十五兩，

右剉碎同研淹一宿，焙乾，研爲細末，每一錢，沸湯點，空心服。

續添諸局經驗祕方

【白梅湯】治中熱五心煩燥，霍亂嘔吐，口乾煩渴，津液不通。

白梅二十九斤，　檀香十兩，　甘草十三斤半，　鹽炒，十五斤，

右爲末，每一錢，擣生薑新水下，酒後乾嘔惡心，舌澀，如茶吃。

【三倍湯】治脾胃不和，胸膈悶滿，飲食不化，嘔逆惡心，或霍亂嘔吐，心腹刺痛，腸鳴泄痢，水穀不分。

草豆蔻仁，三兩，　甘草一兩，　生薑五兩，　鹽炒，五兩，

右件并和勻，入磁器內淹一宿，焙乾爲末，沸湯點服。

【鐵刷湯】治胃氣不和，心腹疼痛，飲酒過度，嘔噦惡心，脾疼臟冒，內感風冷，腸鳴泄瀉，婦人血氣刺痛，並皆治之。

香附子六兩，　桔梗一斤半，　甘草一斤，　乾薑半斤，

肉桂去粗皮，四兩，　茴香半斤，　良薑，　陳皮各十二兩，

右除肉桂外，同炒爲細末，每服一錢，入鹽少許，沸湯點下，常服快氣，不拘時候服。

【快湯】大治脾胃虛冷，酒食所傷，胸膈不快，嘔逆惡心，吞酸吐水，口淡舌澀，可思飲食，並宜服之。

甘草炙，十八兩，　乾薑炮，二斤半，　粟米炒，三十兩，　桔梗炒，三斤，

右炒鹽十二兩重，同爲細末，每服一錢，沸湯點，食前。

諸香

【分積香】

沉香剉，二十五兩，　篋香，　甲香炭火煮兩日，以蜜酒煮熟，　甲香炭火煮兩日，以蜜酒煮熟，

檀香剉，茶清浸炒黃，　沙木炭各二十兩，　丁香，　藿香葉，

麝香研，　苓苓香葉，　牙硝研，各十兩，　腦子研，三兩，

梅花腦研，二兩，

右除研藥外，爲細末，用蜜十兩，煉同研，如常法燒。

【衙香】

甲香製法同前，　沉香剉，　篋香剉，各六兩，　腦子研，

麝香研，各九兩，　牙硝研，十二兩，　檀香剉，十二斤，蠟茶清炒，

蜜比香稍，兩加倍，用煉和香。

右爲末，入研藥用蜜、皮和令勻，如常法燒。

【降眞香】

紫檀香剉三十兩、越桑末一兩、湯調調拌勻，慢火炒令煙末氣盡爲度。

白茅香剉三十兩、青州棗二十箇擘破、水二大升煮爛色，炒色變，揀去棗及不用，用十五兩。

紫潤降眞香剉四十兩、　焰消泡化飛去淨，點成霜，半斤。

黃熟香剉三十兩、　粉草剉五兩、　瓶香二十兩、　麝香末十五兩、

甘松揀淨、　丁皮　　藿香各十兩、　龍腦二兩、

篦香剉三十兩、

右爲末，入研藥，煉蜜澆和，如常法燒。

【清遠香】

降眞香紫藤者、　零陵香　茅香各六兩、　丁香皮

元參揀淨各五兩、　香白芷　藿香剉各三兩、　香附子揀淨、

甘松揀淨各十兩、　麝香末半斤、

右爲末，煉蜜澆和，用如常。

蘇文忠云，藥雖進於醫手，方多傳於古人，若已收效於世間，不必皆從於已出，是知醫之製方，必以古人所傳者爲則也。太平惠民和劑局方，自宋迄元，盛行於世，朱丹溪恐人之徒執古方，不復審病者之情而變通之，故設爲問答駁辨甚詳，亦救世之苦心耳，非謂局方之可廢也。如周密所謂牛黃清心丸止八味，然張氏醫通所錄已存十三味，則知此方八味之外，原有可供採用者，世之醫者，能神明乎規矩之中，安知此十三味之外不更有可採，卽此十三味之中不更有可去者乎，若旣昧於脈理，而復不知古人所以製方之意，輒以丹溪藉口，而欲自我作古，則丹溪恐局方之誤人，而不覩局方者，又爲丹溪所誤矣。廣山陳耕道識。

宋崇寧中置七局，始有和劑之名，紹興間改熟藥所爲太平惠民局，取崇觀以來所收局方，分門編纂，名太平惠民和劑局方十卷，指南總論三卷，分十四門，七百八十八方，蓋自紹興至寶慶淳祐，時有增補，非大觀中二百九十七道之舊也。今此本十四門，除產前產後二法，胎神遊方，催生符，及後附四香，不可謂之方外，止六百七十四方，名增廣太平惠民和劑局方十卷，後有圖經本草藥性總論三卷，無指南之名，旣云增廣，而與無增廣二字之本，轉少一百十四方，豈陳裁而後，又有從而詳校增減者歟，癸辛雜志謂清心丸二十九味，止前八味至蒲黃而止，自乾山藥以下，凡二十一味，乃山芋丸所誤入者，今此本牛黃清心丸所載藥味次第，自牛黃至蒲黃，已十九味，後十味以乾山藥而止，與癸辛雜志所云不同，其爲後人重訂之本可知也。要之此書雖有朱丹溪駁辨，然當時精集羣方，幾經名醫之論定，獻於朝，行於世，所

謂得十全之效，無纖芥之疑者，苟非實有足以惠民，豈竟爲紙上空談以誤世哉。雖傳寫或間有訛誤，不可因噎而廢食，余因久無刊刻之家，抄錄不無亥豕，所以校對至再至三，以期詳愼無誤，而付之梓，倘望好我者，惠我古本，俾隨時訂正，幸甚幸甚。乙丑四月崑山張海鵬識。

增廣太平惠民和劑局方用藥總論卷上

玉石部上品

【硃砂】味甘微寒，無毒，主身體五臟百病，養精神，安魂魄，益氣明目，通血脈，止煩滿，消渴，殺精魅，却惡鬼除中惡，腹痛，毒氣，疰忤，諸瘧，〔藥性論云〕，有大毒，鎮心主尸疰，抽風，〔日華子云〕，涼微毒，潤心肺，〔一云〕，治傷寒時氣，斷瘟疫，及藥子死腹中不出，〔出〕辰州麻陽大塊者，有鬱壁者佳，辰州砂不堪入藥，只可作畫色，信州出一種極有大者，相類宜州所產，然有砒氣，入鍋中，見火銷人，〔慈〕磁石，〔長〕鹹水，〔採取〕無時。

【玉泉】味甘平，無毒，主五藏百病，柔筋強骨，安魂魄，長肌肉，益精氣，利血脈，療婦人帶下十二病，除氣癰，明耳目，〔日華子云〕，治血塊，〔仙經云〕，三十六水法中，化玉爲玉漿，服爲玉泉，服之長年不老，功劣於自然泉液，〔一云〕，人臨死服五斤，死三年色不變。

【玉屑】味甘平，無毒，主除胃中熱，噦，息煩滿止渴，〔日華子云〕，潤心肺，明目，滋毛髮，助聲喉，〔一云〕，鎮肺，陽，常服令人精神不亂，屑如麻豆，服之，久服輕身長年，〔淮南子云〕，味鹹，無毒，主消渴，益養五藏，止煩躁，同金銀浸門冬煎服，甚有益，〔長〕鹿角。

【雲母】味甘平，無毒，主身皮死肌，中風寒熱，除邪氣，安五藏，益子精，明目下氣，堅肌，續絕補中，療五勞七

【清石】摂津国川辺郡清石村　清石寺

【鎌石】摂津国川辺郡鎌石村　鎌石寺

【清石】摂津国川辺郡清石村　清石寺

【赤石】摂津国川辺郡赤石村　赤石寺

【白石】摂津国川辺郡白石村　白石寺

【青石】摂津国川辺郡青石村　青石寺

【紫石】摂津国川辺郡紫石村　紫石寺

【黄石】摂津国川辺郡黄石村　黄石寺

【白石】摂津国川辺郡白石村　白石寺

【黄石】摂津国川辺郡黄石村　黄石寺

【紫石】摂津国川辺郡紫石村　紫石寺

【白石】摂津国川辺郡白石村　白石寺

【青石】摂津国川辺郡青石村　青石寺

【赤石】摂津国川辺郡赤石村　赤石寺

藥〔藥性論〕〔君〕能治脚踵吐瀉欬逆上氣黃疸〔〔日華子云〕〕治腹堅脹滿心神不安〔惡〕馬日蕃公

【紫石英】味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胷中久寒散惡血〔藥性論〕〔君〕主養脾氣治腎臟虛而驚悸不安〔日華子云〕治腹脹霍亂酒浮爲末生薑米醋煎傅之摩亦得〔聖惠方〕補虛勞止驚悸令人能食打碎五兩如米豆大淘一遍以水一斗煮取三升去滓澄清細細服或煮粥食亦得服盡更旋服長石爲之〔使〕〔得〕茯苓人參芍藥共療心中結氣〔得〕天雄菖蒲共療諸風〔長〕扁鵲附子不欲蛇甲黃連蓼句藭

【禹餘粮】味甘寒無毒主欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱療小腹痛結煩疼〔藥性云〕〔君〕味鹹主治崩中〔日華子云〕治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾又治婦人帶下產後煩悶牡丹爲之〔使〕

【太一餘粮】味甘平無毒主欬逆上氣療腹血閉淋下除邪氣肢節不利大飽絕力身頭〔雷公云〕太一餘粮看即如石輕敲便碎可如粉也無重底如棗子味冀此能益脾安臟氣

【無名異】味甘平主金瘡折傷內損止痛生肌肉〔日華子云〕無毒〔今云〕味鹹寒消腫毒瘡疣〔吳〕大食國生於石上狀如鼎石炭蕃人以油煉如蜜石嚼之如餳〔圖經曰〕嶺南人云有石無名異絕難得有草無名異彼人不甚貴重豈本經說者爲石而今所有者爲草乎用時以醋磨塗傅所苦處

【綠礬】凉無毒治喉痺蛀牙口瘡及惡瘡疥癩醫獸醫魚燒灰和服療鼻風瘡血〔藥驗方〕治小兒疳氣不可療神效丹綠礬用火煅通赤以醋酒淬過如此三次研末糊丸黃豆大溫水下日三服

【柳絮礬】冷無毒消痰治渴潤心肺

【婆娑石】解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛生南海胡人採得之無斑點者有金星層成乳汁者爲上又有豆斑石雖亦解藥功力不及復有鄂綠有文理磨銳成絹色人多以此爲之非真也凡欲驗真者以水磨點鷄冠熱血當化成水是也

玉石部中品

【雄黃】味苦甘平寒大溫有毒主寒熱氣鬱惡瘡直痔死肌療疥蟲瘙痒日瘡鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癥氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵殺諸蛇恶毒〔藥性云〕金苗也殺百毒味辛有大毒能治尸疰辟百邪鬼魅殺蟲毒人佩之鬼神不敢近〔日華子云〕微毒治疥癬風邪瘋癲風痙一切蛇蟲犬獸咬傷〔一云〕治傷寒骨蒸耳聾養胎癌瘕積聚去三尸益氣療金瘡及鬼喉風解藥蠱毒箭毒

【石硫黃】味酸溫大熱有毒主婦人陰蝕疽瘡惡蟲堅筋骨除頭禿療心腹積聚邪氣冷癖在脅欬逆上氣脚冷痿弱無力及鼻塞惡瘡下部䘌瘡止血殺疥蟲〔藥性論〕〔君〕有大毒以鼎鍋煎湯解之能下氣治脚痛腰膝久冷除冷風頑痺生用治疥癬及虛寒對欬逆煉服主治虛損羸瘦

【雌黃】味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿痛疥殺蟲蝕身痒邪氣諸毒鼻中息肉中部䘌瘡身面白斑皮膚死肌及恍惚邪氣殺蟲蛇毒〔藥性論云〕〔君〕不入湯藥

【食鹽】味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪毒氣下部䘌瘡傷寒寒熱吐胸中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺吝欬〔藥性論〕有小毒能殺一切毒氣鬼疰氣主心痛中惡主鬼疰尸疰下部蝕瘡〔日華子云〕助水鹹及雷亂金瘡明目止風淚邪氣一切蠱傷瘡腫消食滿五味長肉補皮膚通大小便小兒痫氣并內臟氣

【水銀】味辛寒有毒主療癩痼白禿殺皮膚中蟲蝨胎除熱〔藥性云〕〔君〕殺金銅毒能墮胎主疥癬療等蟲殺蟲〔日華子云〕無毒治天行熱疾傷生下死胎治癮瘕除風安神鎮心鍍金燒粉人多患風或大腹使作須飲酒并肥猪肉及服餳漿可禦其毒〔長〕磁石

【石膏】味辛甘微寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息煩中悶痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息〔藥性云〕〔使〕治傷寒頭痛如裂肚熱皮如火燥煩渴解肌出毒汗主通胃中結煩悶心下急煩躁治唇口乾澁和漿服茱萸去頭痛〔蘇炳云〕〔臣〕〔日華子云〕治天行熱狂下乳頭風旋心煩燥指齒益髓雞子爲之〔使〕〔惡〕茺蔚馬目蕃公巴豆〔長〕鐵

【金屑】味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五臟除邪毒〔藥性云〕金箔亦同主小兒驚傷五藏風癇失志鎮心安魂魄〔胥澂子云〕金液還丹論金末增年又黃金破冷除風〔長〕水銀

【銀屑】味辛平有毒主安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身益年〔藥性云〕〔君〕銀箔同主定志去驚癇小兒鎮疾狂走之病〔子母祕錄〕治癡癲卒腹背痛如折銀一兩水三升煎取二升飲之金液還丹論銀破冷除風

【生銀】性寒無毒主熱狂驚悸發癇恍惚夜臥不安鎮諸邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並水磨服功勝紫雪〔陳藏器云〕味辛〔日華子云〕冷微毒〔長〕石亭脂治小兒中惡熱毒煩悶鼻水磨下又治中惡蠱毒心熱腹煩並忘虛劣〔忌〕一切生血

【硇砂】味甘性溫無毒主五臟百病養神安魂益氣明目通血脈止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈一名二霜砂水銀一兩硫黃六錢細研先炒作胃砂頭後入水火既濟煉抽之如束針狀者成就也〔忌〕磁石鹹水茅亭客話

【水銀粉】味辛冷無毒〔長〕磁石通大腸轉小兒疳瘦羸殺蟲療癬及蟲上酒醫風痹挼捍又名汞粉輕粉嗜粉〔忌〕一切等諸血

【磁石】味辛鹹寒無毒主周痺風濕股節中痛不可持物洗洗酸痛除大熱煩滿及耳聾益腎臟強骨氣益精除煩通關節消癮瘕風痙頸核喉痛小兒驚癇〔藥性云〕〔臣〕味鹹有小毒能補男子腎虛風虛身強腰中不利〔外臺祕要云〕療丁蠱取磁石爲粉蜜調和封之立拔根出甚神效〔鬼遺方〕治金瘡

屑出，欲入之，磁石滑石各三兩爲末，以白米飲調方寸七服，日再服。〔丹房鏡源云〕：服食不可長久，多服必有大患。〔胥澄子云〕：磁石屑治腎之疾，柴胡爲之使。〔藥性〕：殺鐵毒。〔惡〕：牡丹、茵草。〔畏〕：黃石脂。

【元石】味鹹溫，無毒。主大人小兒驚癇，女子絕孕，少腹冷痛，少補身體，服之令人有子。一名元水石，一名遠石，生太山之陽，山陰有銅，銅者雄，元者雌。〔惡〕：松枝、柏實、茵桂。〔一云〕：磁石中有細孔，中黃赤色，好者能連十針，其無孔光澤純黑者，元石也，不能懸針耳。

【凝水石】一名寒水石，味辛甘寒，大寒無毒。主身熱，腹中積聚邪氣，皮中如火燒煩滿，水飲之除時氣熱盛，五臟伏熱，胃中熱煩滿，止渴，水腫小腹脹。〔藥性云〕：能懸丹石毒風，去心煩渴悶，解傷寒復發。〔一云〕：治風熱心躁，口乾狂言，渾身壯熱，及中諸毒，解巴豆毒。〔長〕：地榆。〔採〕無時。

【陽起石】味鹹微溫，無毒。主崩中漏下，破子藏中血癥瘕結氣，寒熱腹痛無子，陰痿不起，補不足，療男子堅中寒陰，下溫痺，去臭汗，補水藏。〔藥性云〕：味甘平，主補腎氣，精乏，腰疼，療冷，冷癥寒痼。〔蘇炳云〕：〔臣〕：〔日華云〕：治漏下溫疫冷氣，補五勞七傷，強陰，補髓。〔使〕：〔惡〕：澤瀉、茵桂。石英散丸、蛇蛻皮。〔長〕：兔絲。〔忌〕：羊血。

【蜜陀僧】味鹹辛平，有小毒。上久痢五痔金瘡，面上皯皰，酒面，〔日華云〕：味甘平無毒，鎮心補五臟，治驚癇，歇瘧及肚痛。〔聖惠方〕：治野雞斑點，細研，人乳汁調塗面，每夜用之。〔醫氏小兒方〕：療豆瘡塗面點，細研水調，夜塗之，明旦洗去，平復。〔外臺秘要〕：治鼻齆。

【生鐵】微寒，主療下部及脫肛。〔日華子云〕：生鐵煅淬飛淘去鹽赤滓，烘乾，用治蟲及蜈蚣蜘蛛咬毒，磨生油傅並得。〔肘後方〕：治熊虎所傷毒瘡，煮生鐵令有味，以洗之。〔千金方〕：治耳聾，燒赤投酒中飲之，仍以磁石塞耳中，夜去之，但別者。

【鐵粉】味鹹平，無毒。主安心神，堅骨髓，除百病，變白潤肌膚，令人不老，髓腦能食，久服令人身重，磨點合和諸藥，各有所主，其造作粉飛煉有法，文多不載，人多取雞蛋作屑殼之，其儘重，眞鐵則不爾，其針砂市人鍛柔鐵爲屑和砂飛爲粉賣之，兼鍊家亦莫辨也，取鋼鐵爲粉勝之。

【鋼鐵】味甘，無毒。主金瘡煩滿熱中，腸腸氣塞，食不化。〔一名〕：鐵鐵。〔鐵精〕：平，微溫。主明目化銅，療鬚髮，定心氣，小兒風癇，陰囊脫肛。〔鐵錘〕：主風邪，止產後血暈旋痛，及喉痺熱塞，並燒令赤，投酒中，及熱飲之。時人呼血暈爲兒枕，產後即起，痛不可忍，無錘用斧。〔柔鐵〕：主堅肌耐痛。〔一云〕：即熟鐵。〔日華子云〕：鐵味辛平，有毒。〔長〕：磁石火炎等，能制石平脂毒。

【太陰元精石】味鹹溫，無毒。主除風冷邪氣溫痺，益精氣，婦人絕冷漏下，心腹積聚冷氣，止頭疼，解肌，其色青白，能實瓦。〔出〕：解縣。〔鹽精〕：味亟鹹苦，青黑色，大者三二寸，形似鐵餅，黃三月四月採，亦主除風冷，無毒。又名泥精，蓋元精之類，及治傷寒。

【珊瑚】味甘平，無毒。主宿血，去目中翳，鼻塞，未吹鼻中。〔日華子云〕：鎮心，止驚，明目。〔海藻〕：按醫列佛云石崇金谷園，珊瑚樹交加，疑生鹽，味甘平無毒，主消宿血馬鞭毒疾，按其治與金相似也。〔唐本注〕：似

玉紅潤，中有孔，或無孔。〔生〕：南海及波斯國。

【馬腦】味辛寒，無毒。主辟惡，明目，赤潤。〔生〕：西國。

玉石部下品

【伏龍肝】味辛，微溫。主婦人崩中吐血，止欬逆，止血消瘀，腹痛氣。〔藥性論〕：單用亦可，鹹，無毒。〔日華子云〕：熱，微毒。治鼻紅，崩風，帶下，血崩，淋精，尿血，催生，下胞，及小兒夜啼。〔一云〕：治心痛，及中風心煩。

【砒霜】味苦酸，有毒。主諸瘡，風痰在胸膈，可作吐劑。〔日華子云〕：發，治婦人血氣衝心痛，落胎，又砒黃，發，有毒。〔長〕：菉豆、冷水醋，治霍亂疾，腎氣，帶之辟蠱毒。〔一云〕：治卒中風，昏憒若醉，痰涎壅盛，四肢不收，凡入藥，以醋煮殺毒，乃用。

【白草霜】主蠱毒中惡，血暈吐血，療金瘡，生肌止血。〔一云〕：治心痛及霍亂，又治婦人逆生。

【硇砂】味鹹苦辛溫，有毒。主積聚，破結血，癥胎，止痛，下氣，療欬嗽，宿冷，去惡肉，生好肌。〔陳藏器云〕：主婦人丈夫羸瘦積病，血氣不調，腸鳴飲食不消，喉中結氣，反胃吐水，令人能食。〔藥性云〕：有大毒。〔畏〕：藜水。〔忌〕：羊血。味酸，能消五金八石，腐壞人腸胃，生食之，化人心爲血，能除冷病，大益陽事。〔蘇炳云〕：〔使〕：〔日華子云〕：北戎砂，味辛，鹹，溫，無毒。〔長〕：一切鹽，補水臟，煖子宮，消冷癥，療血，宿食不消，氣塊，癖，及血崩帶下，惡瘡息肉，食肉餅膜，夜多小便，女人血氣心痛，丈夫腰膝酸重，四肢不任，凡修製用，黃丹石灰作煙，煅赤使用，並無毒。柔金銀可爲鐵藥。

【鉛丹】味辛，微寒。主吐逆，胃反，驚癇，癲疾，除熱下氣，止小便利，除毒熱，療瘡，金瘡溢血。〔藥性論〕：〔君〕：主治驚悸狂走，嘔逆消渴，煎膏用，止痛生肌。〔蘇炳云〕：〔臣〕：不入湯藥。〔日華子云〕：涼無毒，鎮心安神，療反胃，止吐血，及嗽，傅金瘡及肉，及湯火瘡，并小兒痳疾重舌。

【鉛】味甘，無毒。鎮心安神，治傷寒毒氣，反胃嘔噦，蛇蝎咬。〔一云〕：鉛治發背，及諸瘡毒瘡，明目牢齒，又鉛灰治瘡瘻瘡。

【粉錫】味辛，寒，無毒。主伏尸毒蠱，殺三蟲，去蠱寒，療惡瘡，墮胎，止小便利。〔藥性論〕：〔切粉便〕：又名定粉，味甘辛，無毒，能治積聚不消，焦炒止小兒疳痢。〔日華子云〕：光粉無毒，治瘧，肺痿，爛嘔血，瘡瘍。

【鉛霜】冷，無毒。消痰止驚悸，解酒毒，療胸膈煩悶，中風痰實，止渴，又治鼻衄。○鉛霜出於鉛，其法以鉛雜水銀十五分之一，合煉作片，置醋甕中，密封經久成霜，亦謂之鉛白霜，性極冷，入風痰及嬰孩驚癇藥用。

【銅青】平，微毒。治婦人血氣心痛，合金瘡，止血明目，去膚赤息肉，生熟銅皆有，青則銅之精華，銅器上綠色者是，北庭碧者最佳，治目時淘洗用。〔陳藏器云〕：銅青明目，去膚赤，合金瘡止血，入水不爛，令瘡黑肉，生熟銅皆有。

【石灰】味辛溫，主疽瘡疥瘙，熱氣惡瘡，癩疾死肌，匿眉，殺蟲蠱，去黑子息肉。〔藥性論〕：治瘧疾，蝕惡肉，不入湯服，止金瘡血，和雞子白，敗船茹，茈瓦。〔日華云〕：味甘無毒，生肌長肉止血，并主白癜，經霜瘡疥等。

療冷氣攻入紛刺痛傷血痞腫腫脹疼子，又治產後陰不能合，煎汁薰洗，解酒毒，煎水藥，倍勝鍾乳。

【赤石】味辛甘，大熱，生溫熱熱，有毒，主寒熱鼠瘻，蝕瘡死肌，風痺，腹中堅癖，邪氣，除熱，明目，下氣，除腸中熱，止渴，渴，益肝氣，破積聚，溫冷腹痛，去鼻中息肉，久服令人筋緊，火煉百日，服一刀圭，不煉服則殺人及百獸。（得）火瓦，鍼針為（使）。惡烏目毒公鬚，尿虎掌細辛。（長）水。（雞性云）（使）。鉛丹為之（使）。味甘有小毒，主除胸膈間積氣，去冷溫風痺痿痹，皆積年者。（忘）羊血。（殺）鼠。（出）賀州溪州。

【代赭石】味苦甘寒，無毒，主鬼注賊風鬼擊，殺精物惡鬼，腹中毒邪氣，女子赤沃漏下帶下百病，產難胞衣不出，墮胎，養血氣，除五臟血脈中熱血痺血瘀，大人小兒驚氣入腹，及陰痿不起。（雞性云）（使）。鳳門城土乾甚為（使）。味甘平，主治女子崩中淋瀝不止，療主子不落，辟鬼魅。（雷炮云）（臣）。（日華云）止吐血鼻衄，腸風痔瘻，月經不止，小兒驚癇疳疾反胃，止渴，痢脫精，尿血遺溺，金瘡長肉，安胎健脾，又治夜多小便，畏天雄附子。

【石燕】以水煮汁飲之，主淋有效，婦人產難，兩手各把一枚立驗。（陳藏器云）主消渴。（日華云）涼，無毒，（一云）治傷寒，小腹脹滿，小便不通，及久患腸風痔漏，一二十年不瘥，面色虛黃，飲食無味，及患臟腑傷積，多患溫瀉，暑月常瀉不止，及諸淋瀝久患，消渴，婦人月候澁濁，赤白帶下，多年不瘥，並主之。

【戎鹽】味鹹寒，無毒，主明目目痛，益氣堅肌骨，去毒蠱，心腹痛，溺血，吐血，齒舌血出。（日華子云）平，助水藏，益精氣，除五臟癥結，心腹積聚痛。

【白堊】味苦辛溫，無毒，主女子寒熱癥瘕，月閉積聚，陰腫痛漏下，無子，洩痢。（雞性云）（使）。味甘平，主女子血結，月候不通，能澁腸止痢溫暖。（日華云）味甘，治背疽洩精，男子水藏冷，鼻衄，吐血，入藥燒用。（生）邵郡山谷。

【青琅玕】味辛平，無毒，主身痒火瘡，瘡癤白禿疥瘙，死肌浸淫在皮膚中，煮煉服之，起陰氣，可化為丹。（日華云）。玻璃冷無毒，安心止驚悸，明目除翳。（陳藏器云）。獨孤主身熱目赤，以水浸令冷，熨之，殺鍋毒，得水銀瓦（長）。雞骨。

【自然銅】味辛平無毒，療折傷散血，止痛破積聚。（日華云）。涼，排膿消瘀血，續筋骨，治產後血邪，安心止煩悸，以酒磨服。（丹房鏡源云）出信州鉛山縣，銀場銅坑中深處，有多年礦氣結成，似馬齒莧色，紫色，食之苦澀，是真自然銅，今人只以大塊石為自然銅，誤也。

【金星石】味鹹，無毒，主脾肺壅毒，及主肺損吐血嗽血，下熱血，下熱淋，解毒毒。（出）并州潞州。○（銀屋石）主療與金星石大體相似。（採）無時。

【花蕊石】味酸平，主金瘡止血，又療產婦血暈，墨血，出陝華諸郡，色正黃，形之大小方圓無定，欲服者，當以大火燒之，金瘡出血，刮末傅之即合，仍不作潰膿，古方未用，近世以合硫黃同煅研末，敷金瘡，其效如神，又倉卒中金刃，不及煅合，但刮石上取末傅之，後效。（採）無時。

【礞石】治食積不消，留滯在膈府宿食，癥塊久不瘥，及小兒食積羸瘦，婦人積年食癥，攻刺心腹，（得）硇砂巴豆大黃京三棱等瓦，可作丸服之，細研為末，（一名）青礞石。

【古文錢】性平，治腹脹，明目療風赤眼，鹽泥浸用，又治婦人橫逆心腹痛，月閉五淋，燒以醋淬用。

【蛇黃】主心痛，臍下石淋，產難，小兒驚癇，以水煮研服汁。（出）嶺南蛇腹中得之，亞玉如錫，黃紫青雜色（日華子云）冷無毒，鎮心，如入藥，燒赤三四次，臨淬飛研用之，今醫家用如彈丸，堅如石，外黃內黑，二月採，云是蛇冬蟄時所含土，到春發蟄時吐之。

【蓬砂】味苦辛暖，無毒，消痰止嗽，破癥結喉痺，及銀金銀用，或名鵬砂。（圖經云）出南海，性溫平，今醫家治咽喉最為切要，其狀有大塊者甚光瑩。

草部上品之上

【黃精】味甘平，無毒，主補中益氣，除風濕安五臟，久服輕身。（雞性論）。（君）。（日華子云）補五勞七傷，助筋骨，止飢耐寒，益脾胃，潤心肺。（神仙芝草經云）。筍中益氣，五臟調，肌肉充，骨髓堅強，其力倍多，二月採，陰乾，所在皆有，惟茅山生者最佳。

【菖蒲】味辛溫，無毒，主風寒濕痺，欬逆上氣，開心孔，補五臟，通九竅，明耳目，出聲音，主耳聾，眩暈，溫腸胃，止小便，利四肢溫痺不得屈伸，小兒溫癇，身積熱不解。（藥性云）。（君）。味苦辛，無毒，斷鬼氣，殺諸蠱，治惡瘡。

【菊花】味苦甘平，無毒，主頭風頭眩腦痛，目欲脫淚出，皮膚死肌，惡風濕痺，療腰痛，去來陶陶，除胸中煩熱，安腸胃，利五臟調四肢，久服利血氣。（藥性論）。（使）。治身上諸風。（日華子云）作枕，明目，治四肢遊風，利血脈，心煩，胸膈壅悶。

【人參】味甘微寒，微溫，無毒，主補五臟，安精神，定魂魄，止驚悸，除邪氣，明目開心，益志，療腸胃中冷，心腹鼓痛，通血脈，破堅積。（藥性論）。主五臟氣不足，五勞七傷，虛損羸逆，保中守神。（日華云）。殺金石藥毒，調中治氣，消食開胃，食之無忌，茯苓為（使）。（惡）。溲疏，雷鑿。（反）。藜蘆。（一云）馬藺為之（使）。消胸中滿，主肺痿吐膿及痰，疾冷氣逆上，傷寒不下食，患人虛而多夢，加用之。

【天門冬】味苦甘平，大寒，無毒，主諸暴風濕，保定肺氣，去寒熱，養肌膚，益氣力，利小便，冷而能補。（藥性論）。（君）。主肺氣欬逆，喘息促急，除熱通腎氣，療肺痿，生瘡吐膿，治溫疾，止消渴，去熱中風，宜久服煮食之，令人肌體滑澤，除身中一切惡氣不潔之疾。（日華云）。且母為（使）。鎮心，潤五藏，益皮膚，悅顏色，補五勞七傷，治腳氣并歌，消痰風痺，療遊風煩悶吐血，去心用，煙衣抱黃為之（使）。（長）。曾青。（忌）鯉魚，誤食中毒，浮萍解之，患人體虛而熱，加用妙。

【千里及】味苦平，小寒，主天下疫氣結黃瘟，瘴癘發，煮汁，（服）之取吐下，亦搗傅瘡蠱蛇犬蠱咬處，驗生道旁，莖葉間有之，葉細厚，宜胡荽間有之。

【甘草】國老，味甘平，無毒，主五臟六腑寒熱邪氣，堅筋骨，長肌肉，倍力，金瘡腫，解毒，溫中下氣，煩滿短氣，

傷蘊欬嗽，止渴通經脈，利血氣，解百藥毒，爲丸主之精，安和七十二種石，一千二百種草。〔日華云〕：安魂定魄，補五勞七傷，一切虛損，腰脊煩悶，健忘，通九竅，利百脈，益精養氣，壯筋骨，解冷熱，入藥炙用。〔孫思邈云〕：有人中烏頭巴豆毒，甘草入腹即定，乾漆苦參爲〔使〕。〔惡〕：遠志。〔反〕：大戟，芫花，甘遂，海藻。

【乾地黃】味甘苦寒，無毒，主折跌絕筋，傷中，逐血痺，填骨髓，長肌肉，作湯除寒熱積聚，除痺，主男子五勞七傷，女子傷中，胞漏下血，破惡血，溺血，利大小腸，去胃中宿食，飽力斷絕，補五臟內傷不足，通血脈，益氣力，利耳目。〔藥性論〕：〔君〕：能補虛損，溫中下氣，通血脈，治虛後腹痛，主吐血，久服延年。

【生地黃】大寒，主婦人崩中血不止，及產後血上薄心悶絕傷身，胎動下血，胎不落，墮胞，墮損折，瘀血，留血，鼻衄吐血，皆搗飲之。〔藥性論〕：〔臣〕：三白，味平無毒，解諸熱，破血，通利月水。〔日華云〕：〔臣〕：蘇恭，〔得〕參門冬，〔惡〕貝母，〔畏〕蕪荑，二八月採取，陰乾。

【白朮】味苦甘溫，無毒，主風寒濕痺，死肌，痓溢，止汗，除熱，消食，主大風在身面，風眩頭痛，目淚出，消痰水，逐皮間風水結腫，除心下急滿，及霍亂吐下不止，利腰臍間血，益津液，暖胃消穀嗜食。〔藥性論〕：〔君〕：〔臣〕桃李雀肉經藥黃魚，味甘辛，無毒，主多年氣痢，心腹脹痛，破積消食，開胃，治水腫脹滿。〔日華云〕：治內外障眼，防風地榆爲之〔使〕。〔仙經云〕：亦能除憂氣，弭災沴，今處處有之，出茅山者佳。

【兔絲子】味辛甘平，無毒，主續絕傷，補不足，益氣力，肥健，汁去面鼾，養肌強陰，堅筋骨，主堂中寒精自出，溺有餘瀝，口苦燥渴，寒血爲積。〔藥性云〕：〔君〕：治男子女人虛冷，添精益髓，去腰疼冷，又主消渴熱中。〔得〕酒良，等類松脂爲〔使〕。〔惡〕菖蒲，〔仙經俗方〕：並以爲補藥，九月採實暴乾用。

【牛膝】〔君〕：味苦酸平，無毒，主寒濕痺，四肢拘攣，膝痛不可屈伸，逐血氣，傷熱火爛臨脣，療傷中少氣，男子陰消，老人失溺，補中續絕，填骨髓，除腦中痛，及腰背痛，婦人月水不通，血結，益精利陰氣。〔藥性論〕：〔臣〕：〔長〕牛肉，能治陰痿，補腎壞精，逐惡血流結，助十二經絡，腎人虛羸加用。〔日華子云〕：破癥結，排膿止痛，產後心腹痛，并血塊落死胎，壯陽。〔惡〕蜜，火麻，英龜甲。〔畏〕白前，惟懷州者真。

【羌活子】味辛甘，微溫，微寒，無毒，主明目益精，除水氣，療血逆大熱，頭痛心煩。〔日華云〕：治產後血暈及治動乳痛成瘡。〔一云〕：搗塗遍丁腫，服汁使丁腫內消，又下子死腹中。

【萎蕤】味甘平，無毒，主中風暴熱不能動搖，腰膝結肉瞤不足，心腹結氣，虛熱潮瘧，膝痛，壅中寒及日痛，骨蒸，溫病出。〔蘇頌云〕：補中益氣。〔日華云〕：除煩悶，止渴潤心肺，補五勞七傷虛損，腰脚疼痛，天行壯熱，長肉膚。

【防葵】味辛甘苦寒，無毒，主痎瘧，腸洩，膀胱熱結，淋不下，欬逆，溫瘧，頭腦脹，口乾，除腎邪強志，久服堅骨髓，益氣輕身。〔藥性論〕：〔君〕：有小毒，能治痎氣，殘癖氣塊，膀胱宿水，血氣癥，治鬼疰，主百邪鬼魅精怪，通氣。

【羌活】味苦甘平，微溫，無毒，主風寒所擊，金瘡止痛，頭眩痛，女子疝瘕，療諸風，百節痛風，無久新者，一

名獨活。〔日華子云〕：治目赤目疼，及伏梁水氣，五勞七傷，虛損冷氣，骨節疼痛，利五臟，獨活即羌活，出蜀中，惟西南安二八月採根暴乾。

【柴胡】〔君〕：味苦平，微寒，無毒，主心腹痛，腸胃中結氣，飲食積聚，寒熱邪氣，推陳致新，除傷寒心下煩熱，諸痰結實，胸中邪逆，五臟間遊氣，大腸停積水腸，及溫瘧拘攣，亦可作浴湯。〔藥性論〕：能治熱勞，骨節煩疼，熱氣肩背疼痛，益髓血氣，勞乏羸瘦，主下氣消食，主時疾內外熱不解，單煮服之。〔蘇頌云〕：主膜滿胸矜中痞。

【薏苡仁】味甘微寒，無毒，主筋急拘攣，不可屈伸，風濕痺，下氣，除筋骨邪氣，不仁，利腸胃，消水腫，令人能食，久服輕身益氣，其根下三蟲。〔孟詵云〕：性平，消乾濕脚氣，昔馬援服之，破五溪毒輒。

【麥門冬】〔君〕：味甘平，微寒，無毒，主心腹結氣，傷中傷飽，胃絡脈絕，羸瘦短氣，身重目黃，心下支滿，虛勞客熱，口乾燥渴，止嘔吐，愈瘦壅，強陰益精，消穀調中，保神定魄，安五臟，令人肥健美顏色有子。〔藥性論〕：〔使〕：能治熱毒，止煩渴，主大水而目肢節浮腫，下水，治脚痿吐膿，主補精，療心腹結氣。〔日華云〕：治五勞七傷，安魂定魄，止渴，肥人時疾，狂熱頭痛，止嗽，地黃取汁爲〔使〕。〔惡〕款冬苦瓠。〔畏〕苦參，青葙，木耳。

【升麻】味甘苦平，微寒，無毒，主解百毒，殺百精老物魅鬼，辟溫疫瘴氣邪氣，蠱毒入口皆吐出，中惡腹痛，時氣毒癘，頭痛寒熱，風腫諸毒，喉痛口瘡。〔藥性論〕：主小兒驚癇，時氣熱毒，能治口齒風蝕，腫痛，牙根浮爛惡臭，熱毒膿血，除心腹風毒熱腫閉不通，遲澀，騎豆瘡。〔日華云〕：安魂定魄，并鬼附啼泣，避風雨，毒，口氣瘡腫，今醫家以治咽喉腫痛，口舌生瘡，解傷寒頭痛，凡腫毒之膚殊效，細剉一兩，水一升，煎取溫汁服之，入口即吐出毒氣。

【車前子】味甘鹹寒，無毒，主氣癃，止痛利水，通小便，除熱痺，男子傷中，女人淋瀝不欲食，養肺強陰益精，令人有子，明目療赤腫。〔藥性云〕：〔君〕：味甘寒，主金瘡止血，頭鼻衄血，血痢，下血，小便赤澀，止煩下氣，除煩熱。〔藥性云〕：〔君〕：味甘平，能去風毒，腎中風熱，毒風衝眼目赤痛，障翳，腦痛淚出，壓丹石毒，去心胸煩熱。〔藥〕主洩精病，治尿血，能補五臟，明眼目，利小便，通五淋。

【澤瀉】味甘鹹寒，無毒，主風寒溫痺，乳難消水，養五臟，益氣力，肥健，補虛損，五勞，除五臟痼疾，消渴，起陰氣，止洩精，消渴淋瀝，逐膀胱三焦停水。〔藥〕味鹹，無毒，主大風乳汁不出，產難，強陰氣。〔臣〕味甘，無毒，主風痺，消渴，益腎氣，強陰，補不足，除邪惡。〔藥性論〕：〔君〕：味苦，能主腎虛精自出，治五淋利膀胱熱，宜通水道。

【木香】味辛溫，無毒，主邪氣，辟毒疫瘟鬼，強志，主淋露，療氣劣，肌中傷寒，主氣不足，消毒殺鬼精物，溫補，無毒，行藥之精。〔藥性論〕：〔君〕：治女人血氣刺心，心痛不可忍，九種心痛，積年冷氣，痃癖癥塊，服痛逐諸種氣上沖煩悶，治霍亂吐瀉，心腹痞刺。〔日華云〕：治一切氣，安胎健脾，消食，療蠱毒，膀胱冷痛，嘔逆反胃，止酒，霍亂，痢疾。〔一云〕：療毒腫，消惡氣。〔生〕永昌，今嶲州者佳。

【署預】味甘溫平，無毒。主傷中，補虛羸，除寒熱邪氣，補中，益氣力，長肌肉，主頭面遊風，頭風，眼眩，下氣，止腰痛，補虛勞羸瘦，充五藏，除煩熱，強陰。〔藥性論〕〔臣〕。能補五勞七傷，去冷風，止腰疼，鎭心神，安魂魄，補心氣不足。〔日華子云〕助五藏，強筋骨，長志安神，主泄精，紫芝爲〔使〕〔惡〕甘遂。

【遠志】君。味苦溫，無毒。主咳逆傷中，補不足，除邪氣，利九竅，益智慧，耳目聰明，不忘，強志倍力，利丈夫，定心氣，止驚悸，益精，去心下膈氣，皮膚中熱，面目黃。〔藥性云〕〔畏〕蠐螬，治心神健忘，安魂魄，令人不迷，堅壯陽道，主夢邪。○〔小草〕。遠志葉名小草，主益精，補陰氣，止虛損夢泄。

【細辛】味辛溫，無毒。主欬逆，頭痛，腦動，百節拘攣，風濕痺痛，死肌，溫中下氣，破痰，利水道，開胸中，除喉痺，齆鼻，風癎，癲疾，下乳結，汗不出，血不行，安五藏，益肝膽，通精氣，久服明目，利九竅。〔日華云〕治嗽，消死肌瘡肉，胸中結聚。〔忌〕狸肉，曾青，棗根爲〔使〕，得當歸，芍藥，白芷，芎藭，牡丹，藁本，甘草，共療婦人，得決明，鯉魚膽，青羊肝，共療目痛。〔惡〕狼毒，山茱萸，黃芪，〔畏〕消石，滑石，〔反〕藜蘆。華辛，非華陰者不得爲細辛，若單用末，不可過半錢，多即氣閉塞不通者即死，雖死無傷。

【石斛】味甘平，無毒。主傷中，除痺，下氣，補五藏虛勞羸瘦，強陰，益精，補內絕不足，平胃氣，長肌肉，逐皮膚邪熱，痱氣，脚膝疼冷痺弱，久服厚腸胃，輕身延年，定志除驚。〔藥性論〕〔君〕。益氣除熱，主治男子腰脚軟弱，健陽，逐皮肌風痺，骨中久冷，虛損，補腎，積精，腰痛，養腎氣，益力，陸英爲〔使〕〔惡〕凝水石，巴豆，〔畏〕殭蠶，雷丸。

【巴戟天】味辛甘，微溫，無毒。主大風邪氣，陰痿不起，強筋骨，安五藏，補中，增志，益氣，療頭面遊風，小腹及陰中相引痛，下氣，補五勞，益精，利男子。〔藥性云〕〔使〕。治男子夜夢鬼交，泄精，強陰。〔日華云〕味苦，安五藏，定心氣，除一切風，治邪氣，療水腫。覆盆子爲〔使〕〔惡〕朝生，雷丸，丹參。

【赤箭】味辛溫。主殺鬼精物，蠱毒惡氣，消癰腫，下支滿，疝，下血。久服益氣力，長陰，肥健。〔藥性云〕赤箭無毒，一名鬼督郵，生陳倉川谷，雍州及太山少室。三月四月八月採根，陰乾。

【菴蕳子】味苦，微寒，微溫，無毒。主五藏瘀血，腹中水氣，臚脹留熱，風寒濕痺，身體諸痛，療心下堅，膈中寒熱，周痺，婦人月水不通，消食，明目。荊芥，薏苡爲〔使〕。〔千金翼〕令由獨行方主踠折瘀血，單用煮服之。今人打撲損，多用此法，飲散皆通，其功最速，處處有之。

【卷柏】味辛甘，溫平，微寒，無毒。主五藏邪氣，女子陰中寒熱痛，癥瘕，血閉，絕子，止欬逆，治脫肛，散淋結，頭中風眩，痿蹶，強陰，益精。〔藥性云〕〔君〕。能治月水不通，尸疰，鬼疰，腹痛，去百邪鬼魅，啼泣。〔日華云〕鎭心治邪，除面皯，頭風，暖水藏，生用破血，炙止血。

【龍膽草】味苦澀，大寒，無毒。主骨間寒熱，驚癎，邪氣，續絕傷，定五藏，殺蠱毒，除胃中伏熱，時氣溫熱，熱泄下痢，去腸中小蟲，益肝膽氣，止驚惕。〔日華云〕小豆爲〔使〕，治客忤，疳氣，熱病狂語，瘡疥，明目，止煩。〔生〕齊朐山谷及宛句，狀似牛膝，味甚苦，以膽爲名。〔君〕貫衆爲之〔使〕〔惡〕防葵，地黃。

草部上品之下

【黃連】味苦寒，微寒，無毒。主熱氣，目痛，眥傷，淚出，明目，腸澼，腹痛，下痢，婦人陰中腫痛，五藏冷熱，久下泄澼膿血，止消渴，大驚，除水，利骨，調胃，厚腸，益膽，療口瘡。〔藥性云〕殺小兒疳蟲，點赤眼昏痛，鎭肝，去熱毒。〔惡〕菊花，芫花，玄參，白鮮皮，〔畏〕款冬，冷水，勝烏頭，解巴豆毒，〔忌〕豬血。

【藍實】味苦寒，無毒。主解諸毒，殺蠱蚑，疰鬼，螫毒，久服頭不白，輕身。其葉汁殺百藥毒，解狼毒，射罔毒。其莖葉可以染青，生河內平澤。〔藥性云〕〔君〕。味甘，能塡骨髓，明耳目，利五藏，調六府，利關節，治經絡中結氣，使人健少睡，益心力，藍汁止心煩躁，解蠱毒。

【芎藭】味辛溫，無毒。主中風入腦，頭痛，寒痺，筋攣緩急，金瘡，婦人血閉無子，除腦中冷動，面上遊風去來，目淚出，多涕唾，忽忽如醉，諸寒冷氣，心腹堅痛，中惡，卒急腫痛，脅風痛，溫中內寒。〔藥性論〕〔臣〕。能治腰脚軟弱，半身不遂，主胞衣不出，治腹內冷痛。得細辛療金瘡止痛，〔得〕牡蠣療風頭吐逆，白芷爲之〔使〕，〔畏〕黃連。

【絡石】味苦溫，微寒，無毒。主風熱，死肌，癰傷，口乾舌焦，癰腫不消，喉舌腫不通，水漿不下，大驚入腹，除邪氣，養腎，主腰髖痛，堅筋骨，利關節。〔藥性云〕〔君〕。惡鐵精，殺殷孽毒，味甘平，治喉痺。〔日華子云〕水蘸蘸汁傳白癜，癧瘍風，惡瘡疥癬，牡丹，杜仲爲〔使〕〔惡〕鐵落，〔畏〕貝母，菖蒲，〔生〕殷石。

【蒺藜子】味苦辛，溫，微寒，無毒。主惡血，破癥結積聚，喉痺，乳難，身體風癢，頭痛，欬逆傷肺，肺痿，止煩，下氣，小兒頭瘡，癰腫陰癀，可作摩粉。其葉主風癢。〔藥性云〕〔君〕。味甘，有小毒，治諸風癧瘍，破宿血，療吐膿，主難產，去燥熱。〔日華子云〕治奔豚，腎氣，肺氣，胸膈滿，催生，并墮胎，益精，療腫毒及水藏冷，小便多，遺瀝，泄精，溺血，入湯不計丸散，並炒去刺用，烏頭爲之〔使〕。

【黃芪】味甘，微溫，無毒。主癰疽，久敗瘡，排膿，止痛，大風癩疾，五痔，鼠瘻，補虛，小兒百病，婦人子藏風邪氣，逐五藏間惡血，補丈夫虛損，五勞羸瘦，止渴，腹痛，洩痢，益氣，利陰氣，生白水者冷，補其莖葉，療渴及筋攣，癰腫，疽瘡。〔藥性論〕〔君〕。治發背，內補，主虛喘，腎衰，耳聾，療寒熱，生隴西者不補，蜀白水赤皮者微寒。〔日華子云〕助氣，壯筋骨，長肉，補血，破癥癖，瘰癧，癭贅，腸風，血崩，帶下，赤白痢，產前後一切病，月候不調，消渴，痰嗽，并治頭風，熱毒，赤目，藥中補益，呼爲羊肉。〔又云〕白水芪涼，無毒，治血退熱毒，餘功用並同。〔惡〕龜甲。

【肉蓯蓉】味甘酸鹹，微溫，無毒。主五勞七傷，補中，除莖中寒熱痛，養五藏，強陰，益精氣，多子，婦人癥瘕，除膀胱邪氣，腰痛，止痢。〔藥性云〕〔臣〕。益髓，悅顏色，治女人血崩，壯陽，日御過倍，大補益，主赤白下，補精敗，面黑，勞傷。用蓯蓉四兩，水煮令爛，薄切細研，精羊肉分爲四度，五味以米煮粥，空心服之。

【漏蘆】味苦鹹，寒，大寒，無毒。主皮膚熱，惡瘡，疽痔，濕痺，下乳汁，止遺溺，熱氣瘡癢。〔藥性云〕〔使〕。能治身上熱毒風，生惡瘡，皮肌瘙癢，癮疹。〔日華云〕連翹爲〔使〕，治小兒壯熱，通小腸，泄精，尿血，風赤眼，乳癰，發背，瘰癧，腸風，排膿，補血，治撲損，續筋骨，傅金瘡，止血，長肉，通經脈。

【茜根】味苦寒，無毒。主寒濕風痺，黃疸，補中，止血，內崩，下血，膀胱不足，踒跌，蠱毒，久服益精氣。〔藥性云〕

主治六極傷心肺，吐血衄血，（日華云）止鼻紅帶下，產後血暈，乳結，月經不止，腸風痔瘻，排膿，治淋瘧，溲赤尿血，撲損瘀血，殺蠱毒，（長）風結。

【防風】味甘辛，無毒，主大風頭眩痛，惡風，風邪，目盲無所見，風行周身，骨節疼痛，煩滿腫脹，風頭面去來，四肢攣急，字乳金瘡內痓，（藥）主中風熱汗出，（藥性云）（臣）花主心腹痛，四肢拘急，行履不得，經脈虛寒，主骨節間疼痛，（日華云）治三十六般風，男子一切勞劣，補中益神，風赤眼止淚，及癰瘻，利五藏關脈，五勞七傷，羸損盜汗，心煩體重，能安神定志，勻氣脈，（續）附子毒，（惡）乾薑，蘆蘆，白敛，蕊花。

【蒲黃】味甘平，無毒，主心腹，膀胱寒熱，利小便，止血消瘀血，久服輕身益氣力，（日華云）治婦人帶下，難孕，人下血崩，血暈血癥，兒枕急痛，小便不通，腸風瀉血，遊風腫毒，鼻紅吐血，下乳，止漏精血痔，（生）破血，（炒）補血。

【續斷】味苦辛微溫，無毒，主傷中，補不足，金瘡瘡癰，折跌續筋骨，婦人乳難，崩中漏血，金瘡血內漏生肌肉，及腸傷惡血腰痛，（藥性云）（君）主絕傷，去諸濕毒，能宣通經脈，（日華云）助氣調血脈，補五勞七傷，破瘀結滯，血消腰毒，腸風，痔瘻，乳癰，攣擊，撲損，婦人產前後一切病，面黃虛腫，縮小便，止洩精，尿血，胎漏，子宮冷，地黃爲之，（使）（惡）雷丸。

【丹參】味苦微寒，無毒，主心腹邪氣，腸鳴，寒熱積聚，破癥除瘕，除煩，止煩滿，益氣養血，去心腹煩疾，結氣，腰脊強，脚痺，除風邪留熱，（藥性云）（臣）平，能治脚腫疼痛，主中惡，治百邪鬼魅。

【五味子】味酸溫，無毒，主益氣，欬逆上氣，勞傷羸瘦，補不足，強陰，益男子精，養五臟除熱，（藥性云）（君）能治中下氣，止嘔逆，（日華云）明目，煎水服，治風消食，霍亂轉筋，痰癖貧脈冷氣，消水腫，反胃，心腹氣脹，止渴除煩熱，解酒毒，壯筋骨，澁腎爲之，（使）（惡）婆羅勝，烏頭。

【旋花】味甘溫，無毒，主益氣，去面皯，黑色，令好，（根）味辛，主腹中寒熱邪氣，利小便，（陳藏器云）取根苗搗汁服之，主丹毒熱，根主風筋骨，合金瘡，一名美草，（生）滁州平澤五月採，陰乾。

【蛇床子】味苦辛甘平，無毒，主陰中腫痛，男子陰痿濕癢，除痹氣，利關節，頭癢惡瘡，溫中下氣，令婦人子臟熱，男子陰強，（藥性云）（君）療齒痛，浴男女陰，去風冷，大益陽事，小兒驚癇，（日華云）治諸冷，煖丈夫陽氣，助女人陰氣，撲傷瘀血，腰膀疼，陰汗濕癢，四肢頑痺，赤白帶下，縮小便，凡用取仁微炒，殺毒，作湯洗則生用，（惡）牡丹，巴豆，貝母。

【地膚子】味苦寒，無毒，主膀胱熱，利小便，補中益精氣，去皮膚中熱氣，散惡瘡疥瘙，強陰，（藥性云）（君）與陽起石同服，主丈夫陰痿不起，補氣益力，治陰卵腫疼，去熱風，可作湯沐浴，（日華云）治客熱丹毒。

【沙參】味苦微寒，無毒，主血結驚氣，除寒熱，補中益肺氣，療胸痹心腹痛結熱，邪氣血痛，皮間邪熱，（日華云）補虛止驚煩，益心肺，一切惡瘡疥癬，及身癢排膿，治腫毒，（惡）防己，（反）藜蘆。

【茵陳蒿】味苦甘微寒，無毒，主風濕寒熱邪氣，熱結，黃疸通身發黃，小便不利，除頭熱，去痰癖，（藥性云）

（使）味苦辛，治眼目，（日華子云）治天行時疾，熱狂頭痛，風眼疼，瘡癤，女人瘡癤升閃損。

【天名精】味甘寒，無毒，主療血，血瘕欲死，下血，止血利小便，除小蟲，去蠱除胸中結熱，止煩渴，逐水大吐，（下）（藥性論）（使）味辛，治瘧，止血及鼻衄，（日華云）主破血，生肌止渴，利小便，殺三蟲，除諸毒腫，丁瘡，瘻瘡，金瘡內射，身瘙癢瘙，瘙衣爲（使）。

【決明子】味鹹苦甘平，微寒，無毒，主青盲目淫，肝赤白膜眼赤痛淚出，療目青，（藥性云）（臣）利五臟，除肝家熱，益筋，爲（使）（惡）大麻子。

【燈籠草】味苦大寒，無毒，主上氣欬嗽，風熱明目，所在有之，有花若燈籠，內有紅子，根莖花實並入藥，使八月採。

【王不留行】味苦甘平，無毒，主金瘡，止血逐痛，出刺除風痺，內寒，止心煩鼻衄，惡瘡瘡癤乳難，婦人難產，（藥性論）治風毒，通血脈，（日華子云）治發背遊風，風癬，婦人血經不勻，今處處有之。

草部中品之上

【乾薑】味辛溫，大熱，無毒，主胸滿欬逆上氣，溫中止血，出汗逐風，腹痛，腸澼，下痢寒冷，腹痛中惡，霍亂腹滿，風邪諸毒，皮膚間結氣，止唾血，生者尤良，（藥性云）（臣）味苦辛，治腰腎中痛，冷氣，破血去風，通四肢，開竅，開五臟六腑，去風毒冷痺，夜多小便，治欬，主溫中，用秦椒爲（使），主霍亂不止，腹痛，治腫，補冷痢，治血閉，病人虛而冷，加用之。

【生薑】味辛微溫，主傷寒頭痛，鼻塞欬逆上氣，止嘔吐，去臭氣，（陶隱居云）多食傷心氣，（陳藏器云）汁解藥毒，白餘破血調中，去冷，除痰開胃，發熱去皮，發冷留皮，秦椒爲（使）（殺）半夏，畏蒼耳，（惡）黃芩，黃連，天雄，藜。

【葛根】味甘平，無毒，主消渴，身大熱嘔吐，諸痺，起陰氣，解諸毒，療傷寒中風頭痛，解肌發表，出汗開腠理，療金瘡，止痛脇風痛，（生根汁）大寒，療消渴傷寒壯熱，葛（殺）主下痢，十歲已上，（葉）主金瘡止血，（花）主消酒，（藥性云）（臣）治天行熱氣，嘔逆，開胃下食，主解酒毒，止煩渴，治金瘡，治時疾解熱，（日華子云）冷治胃脘熱，心煩悶，熱狂，止血痢，通小腸，排膿破血，博蛇蟲，嚙解箭毒，（陳藏器云）生，破血，金瘡腫，解酒毒，（殺）野葛，巴豆，百藥毒，○（又錄）味甘大寒，無毒，主腰丹石，去煩熱，利大小便，止渴，小兒熱渴，

【苦參】味苦寒，無毒，主心腹結氣，癥瘕積聚，黃疸，（別）石餘澁，逐水除痰，腫，補中明目，止淚，養肝膽氣，安五臟，定志益精，利九竅，除伏熱腸癖，止渴醒酒，小便黃赤，療惡瘡，下部蝕，平胃氣，（藥性論）治熱毒風生瘡，赤癩眉脫，除大熱，治腹中冷痛，中惡腹痛，（日華云）殺疳蟲，治腸風瀉血，并熱痢，元參爲（使）（惡）貝母，瀉蘆，冤絲，（反）藜蘆。

【栝蔞根】味苦寒，無毒，主消渴身熱，煩滿大熱，補虛安中，續絕除腸胃中痼熱，八疸身面黃，骨乾口燥短氣，通月水，止小便利，（實）主胃痺，（葉）療中熱傷暑，（日華云）味苦冷，無毒，補虛勞，日乾，潤心肺，治手面黯，吐血腸風瀉血，并白痢，並炒用，（根）通小腸，排膿消腫毒，生肌長肉，消樓損瘀血，治熱狂時狂，

乳癰發背瘡瘡瘡瘡〔惡〕乾薑、枸杞爲〔使〕〔畏〕牛膝、乾漆、反烏頭。

【當歸】味甘辛溫、大溫、無毒、主款逆上氣、溫瘧寒熱、洗洗在皮膚中、如人淋下、絕子、諸惡瘡癰、金瘡、賁飲之、溫中止痛、除客血內塞、中風痙汗不出、濕痺、中惡、客氣虛冷、補五臟、生肌肉、〔藥性云〕〔臣〕止嘔逆、盛勞寒熱、破宿血、主女子崩中下腸胃冷、補諸不足、止腹痛、腹疼、單煮飲汁、治溫瘧、主女人漏血腰痛、治牙疼痛不可忍、患人虛冷、加而用之、〔支太醫方〕治婦人百病諸虛不足、當歸四兩、地黃三兩、爲末、蜜和丸、米飲下、〔惡〕茵茹、濕麵、〔畏〕菖蒲、海藻、牡蠣。

【芍藥】味苦酸平、微寒、有小毒、主邪氣腹痛、除血痺、破堅積寒熱疝瘕、止痛、利小便、益氣通順血脈、緩中散惡血、逐賊血、去水氣、利膀胱大小腸、消癥、堅、時行寒熱中惡、腹痛腰痛、〔藥性云〕〔臣〕強五臟、補脾氣、治腹堅脹、婦人血閉不通、消瘀血、能蝕膿、〔日華子云〕治風補勞、主女人一切病、并產前後諸疾、赤色者、補氣、白者治血、〔惡〕石斛、芒硝、〔畏〕消石、鱉甲、小薊、〔反〕藜蘆。

【麻黃】味苦溫、微溫、無毒、主中風傷寒、頭痛溫瘧、發表出汗、去邪熱氣、止欬逆上氣、除寒熱、破癥堅積聚、五臟邪氣、緩急風脇痛、字乳餘疾、止好唾、通腠理、除傷寒頭痛、解肌、洩邪惡氣、消赤黑斑毒、〔藥性云〕〔君〕能治身上毒風瘙、主肚熱、解肌發汗、溫瘧、根節能止汗、〔日華云〕通九竅、調血脈、開毛孔、發山嵐瘴氣、厚朴爲之〔使〕、〔惡〕辛夷、石韋。

【通草】味辛甘平、無毒、主去惡蟲、除脾胃寒熱、通利九竅、血脈關節、令人不忘、療脾疸、耳聾、散癥瘕、〔藥性云〕〔臣〕治五淋、利小便、開關格、〔日華云〕安心除煩、止渴退熱、明目通小腸、排膿止痛、催生下胞、女人血閉、月候不勻、天行時疾、頭痛目眩、羸方孔結、及下乳、子名覆子。

【䗪蟲】味苦辛寒、無毒、主閉格諸癥結、小便不通、出刺、破癥瘕、堅腸胱邪逆、止惡亂、〔藥性云〕〔臣〕生五淋、〔日華子云〕催生、治痔瘡、并瀉血、〔子〕治男經不通、破血塊排膿、〔藥〕治小兒蛔蟲、痔疾、煎湯治、丹石熱發、甘草、牡丹爲之〔使〕、〔惡〕蠡蟲。

【秦艽】味苦辛平、微溫、無毒、主寒熱邪氣、寒溫風痺、肢節痛、下水利小便、療黃、無問新久、通身擊急、〔藥性云〕、差五種黃病、傷酒毒、去頭風、〔藥性云〕、療酒黃、黃疸大效、〔日華云〕味苦冷、主傳尸骨蒸、治骨及時氣、蒼朮爲之〔使〕、〔畏〕牛乳。

【百合】味甘平、無毒、主邪氣、腹脹心痛、利大小便、補中益氣、除浮腫、驚悸、癡邪、〔藥性云〕〔使〕、主百邪鬼魅、游泳不止、除心下急滿痛、治脚氣、熱欬逆、〔日華云〕安心定膽、養五臟、殺蠱毒、療乳癰發背瘡腫、并產後血狂鬼疾。

【知母】味苦寒、無毒、主消渴熱中、除邪氣、肢體浮腫、下水、補不足、益氣、療傷寒、久瘧煩熱、膀下邪氣、〔藥性云〕〔君〕治心煩躁悶、骨熱勞往來、產後褥勞、腎氣勞、惙、寒虛損、患人虛而口苦、加用之、〔日華云〕治熱勞傳尸、痞病、通小腸、消瘀、止嗽、潤心肺、補虛乏、安心、止驚悸、

【貝母】味辛苦平、微寒、無毒、主傷寒煩熱、淋瀝邪氣、疝瘕喉痺、乳難、金瘡風痙、療腹中結實、心下滿、癮疹

寒、日眩、項直欬嗽、上氣、止煩熱、渴出汗、安五臟、利骨髓、〔日華云〕消痰潤心肺、止嗽、燒灰油調、人畜惡瘡、厚朴、白薇爲〔使〕、〔惡〕桃花、〔畏〕藜芦、礬石、菲草、〔反〕烏頭。

【元參】味苦鹹、微寒、無毒、主腹中寒熱積聚、女子產乳餘疾、補腎氣、令人目明、主暴中風傷寒、身熱支滿、狂邪溫瘧、血瘕、下寒血、除胃中氣、下水、止煩渴、散頸下核瘰癧、心腹痛堅癖、〔藥性云〕〔使〕、能治諸癥、熱、主熱風喉痛、傷寒勞復、散瘤腫、〔日華云〕、治頭風、熱毒遊風、補虛勞損、心癖、煩悶多忘、及傳尸邪氣、止健忘、消腫毒、〔惡〕黃芪、乾薑、大棗、山茱萸、〔反〕藜蘆。

【白芷】味辛溫、無毒、主女人漏下赤白血閉、陰腫、寒熱風頭侵目淚出、長肌膚潤澤、療風、〔藥性云〕、〔君〕治心腹血刺痛、除風、邪女人血崩、治瀝血腰痛、〔日華子云〕治目赤、登肉、及補胎漏、消蕁、破宿血、補新血、乳癰、發背、瘡疥、腸風、痔瘻、排膿止痛、當歸爲使、〔惡〕旋覆花。

【淫羊藿】〔俗名仙靈脾〕、味辛寒、無毒、主陰痿、絕傷、莖中痛、利小便、益氣力、堅筋骨、消瘰癧、赤瘡、下部有瘡、〔藥性云〕、主堅筋益骨、〔日華云〕、得酒良、治一切冷風勞氣、補腰膝、強心力、丈夫絕陽不起、女人絕陰無子、筋骨攣急、四肢不仁、腎囊、紫芝爲〔使〕、生上邪。

【狗脊】味苦甘平、微溫、無毒、主腰背強、關機緩急、周痺、寒溫膝痛、煩利老人、療失溺不節、男子腳弱腰痛、風邪濕痺、少氣日暗、女子傷中、關節重、〔藥性云〕、味苦辛、微熱、治男子女人虛風軟脚、邪氣溫瘧、腎氣虛弱、補益男子、壞筋骨、草薢爲〔使〕、〔惡〕敗醬。

【黃芩】味苦平、大寒、無毒、主諸熱、黃疸、惡瘡、逐水、下血閉、惡瘡宜、強火療、療痰熱、胃中熱、小腹絞痛、消穀、利小腸、女子血閉淋露、下血、小兒腹痛、〔藥性云〕、〔臣〕、治熱毒、骨蒸、寒熱往來、腸胃不利、破堅氣、治五淋、令人宣暢、去關節煩悶、解熱湯、治熱、腹中疼痛、〔日華云〕、下氣、主天行熱疾、丁瘡、排膿、治乳癰、發背、〔得〕厚朴、黃連、止腹痛、〔得〕五味子、牡蠣、令人有子、〔得〕黃耆、白歛、赤小豆、療鼠瘻、山茱萸、龍骨爲〔使〕、惡藜蘆、〔畏〕丹砂、牡丹、蘇合。

【石龍芮】味苦平、無毒、主風寒濕痺、心腹邪氣、利關節、止煩滿、平胃氣、補陰氣不足、失精堅冷、〔藥性云〕、能逐諸風、主除心熱煩、大熱爲之、〔使〕、〔畏〕蛇蛻、〔反〕吳茱萸、〔出〕兗州。

【紫草】味苦寒、無毒、主心腹邪氣、五癃、補中益氣、利九竅、通水道、療腹脹滿、痛、療小兒瘡及面鼻、〔藥性云〕、味甘平、能治惡瘡癌、〔產寶〕治淋澁、產後同、〔生〕礪山、今處處有之。

【紫菀】味苦辛溫、無毒、主款逆上氣、胸中寒熱結氣、去蠱毒、療欬、安五臟、療款吐膿血、止喘、除五勞虛、補不足、小兒驚癇、〔藥性云〕、〔臣〕能治尸疰、補虛下氣、及胸脇逆氣、治百邪鬼魅、勞氣虛熱、〔日華子云〕、調中及肺痿吐血、消瘀、止渴、潤肌膚、溫骨髓、款冬花爲〔使〕、〔惡〕天雄、白蔹、雷丸、遠志、〔畏〕茵蔯蒿、

【前胡】味苦微寒、無毒、主療痰滿胸膈、心腹結氣、風頭痛、去痰實、下氣、治傷寒寒熱、明目益精、〔藥性云〕、〔使〕、主時疾內外供熱、〔日華云〕、治一切勞、一切氣、止嗽、破癥結、開胃下食、通五臟、主蠱亂轉

筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒疳半夏爲使〔惡〕烏梅〔畏〕鱉甲

【白蘞皮】味苦鹹寒無毒主頭風黃疸寒逆淋瀝女子陰中腫痛溫痺死肌不可屈伸行止瘙四肢不安時行頭中大熱小兒驚癇婦人產後餘痛〔藥性論〕〔臣〕治一切熱毒風〔日華云〕通關利竅及血脈

【藁本】味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人瘕癥陰中寒腫痛頭中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露惡風邪辟鬼魅蠱毒〔藥性論〕〔臣〕能治一百六十種惡風鬼狂流入腰痛冷能化小便通血去頭風〔日華云〕治癇疾并皮膚疵皯粉刺〔恶〕茵蔯〔畏〕青箱子

【石韋】味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱補五勞安五藏去惡風益精氣〔藥性云〕〔使〕治勞及五淋鳴鼓結熱不通膀胱熱淋〔日華云〕治淋瀝遺溺杏仁爲之使〔得甘蒲良〕〔生〕蜂陰又有生古屋瓦上者名曰瓦韋用治淋亦佳

【草薢】味苦甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘥熱氣傷中悲愁陰痿失溺〔藥性論〕治冷風挛痺腰脚不遂手足無力主男子腰痛久冷是腎間有膀胱宿水〔日華云〕治癇緩軟風頭旋癲疾補水臟堅筋骨益精明目治膀胱腎病中風失音惡菟爲之〔使〕〔畏〕炙棗大黃柴胡牡蠣〔生〕真定今處處有之

【白微】味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱胸滿胸脇不知人狂惑邪氣寒熱陰陽溢癇洗洗發作有時瘧傷中淋露下水氣利陰氣益精〔藥性論〕〔臣〕能治百邪鬼魅〔陶隱居云〕療醫邪風狂狂病〔恶〕黃芪大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗〔生〕平原

【大青】味苦大寒無毒療時氣頭痛大熱口瘡〔藥性云〕〔臣〕味甘能去大熱治溫疫寒熱〔日華云〕治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風壽天行熱疾及金石藥毒又塗諸腫毒〔古方〕治傷寒黃汗黃疸等有大青湯治傷寒頭痛身強腰脊痛葛根湯內亦用大抵時疾多用之

【白茅根】味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便下五淋除客熱在膀胱止渴壓筋婦人崩中〔藥性云〕〔臣〕〔茅〕破血主消渴〔根〕治五淋〔日華云〕茅針涼通小腸瘡毒軟癰不作頭瀉熱和酒服刀箭瘡止血并痛瘡用〔根〕主婦人月經不勻通血脈淋瀝主鼻衄〔一云〕花主嘔血吐血炙瘡生搗茅根汁傅金瘡止血煮服主鼻衄暴下血茅屋漏溜水殺蠱毒

草部中品之下

【艾葉】味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部腫痛婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子〔藥性云〕〔使〕能止崩血安胎止腹痛止赤白痢五藏痞滯血顏〔恶〕主吐血〔實〕主明目〔日華云〕止霍亂轉筋治心痛鼻洪并帶下及患痢人後分寒熱急痛〔實〕腰脚無壯陽助水臟腰膝及煖子宮〔一云〕生寒熱熱〔汁〕殺蚘

【地榆】味苦甘酸微寒無毒主婦人乳產腰痛七傷帶下五淋止痛除惡血止汗療金瘡止崩血諸瘡悉

療熱瘡痛酒除煎湯調補絕傷〔藥性云〕味苦平能治虛後餘瘀毒痛治金瘡止血痢餘瘧〔日華云〕抽膿止吐血鼻洪月經不止血崩產前後諸血疾赤白痢并水瀉止腸風得髮耳〔恶〕麥門冬

【水萍】味辛酸寒無毒主暴熱身癢下水氣勝酒長髮髭止消渴下氣〔陳藏器云〕暴乾與栝蔞等分以人乳爲丸主消渴搗汁絞飲主蛇咬毒入腹亦可傅熱瘡〔水萍子〕汁主水腫利小便又中毒暴乾末酒服方寸匕〔日華子云〕治熱毒風熱疾熱狂煩躁毒湯火瘡風瘙

【大小薊根】味甘溫主婦人崩保血大薊主女子赤白沃安胎主吐血鼻衄〔藥性云〕大薊可單用味苦平止崩中血下生取根絞汁服〔日華云〕小薊根涼無毒治熱毒風并胃脘煩悶開胃下食退熱補虛損〔苗〕去煩熱生研汁服小薊力發只可過熱大薊能補益下氣

【海藻】味苦鹹寒無毒主瘰癧氣頸下核破散結氣癥瘕癭瘤腫塊氣積中上下鳴下十二水腫並皮間積聚暴腹痛氣結熱利小便〔藥性云〕〔臣〕味鹹有小毒主降百邪鬼魅治氣疾急滿療痛氣下墜疼痛核腫〔孟詵云〕主趙男子陰氣常食之消男子瘦疾〔肘後方〕治頸下瘰癧如梅李及頸下卒結腫欲成癰膿蒸一斤酒二升漬數日稍稍飲

【天麻】味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋骨〔藥性云〕能治冷氣痼疾癱緩不遂語多恍惚譫妄失志〔陳藏器云〕主熱毒惡腫搗惡葉傅之亦取子作飲去熱毒〔日華云〕助陽氣補勞傷鬼狂惡毒通血脈開竅

【澤蘭】味苦甘微溫無毒主乳婦內壞中風餘疾大腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡腫痛並後令產內塞〔藥性云〕〔使〕味苦辛主產後腹痛類產血氣衰冷成勞羸瘦〔日華云〕通九竅利關節養血氣破宿血消癥瘕產前後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃

【阿魏】味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱毒〔藥性云〕今人熟煮蒜白爲假者眞者極臭而去臭爲奇物今下氣最極效〔日華云〕熱治傳尸破癥癖冷氣辟溫治瘧並主霍亂心腹痛腎氣溫瘴一切草菜毒〔生〕西番

【高良薑】大溫主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛〔藥性云〕〔使〕能治腹內久冷胃氣逆嘔吐治風破氣頭冷氣痛去風冷痺痛療下氣冷逆沖心腹痛吐瀉〔日華云〕轉筋瀉痢反胃嘔食解酒毒消宿食〔古方〕單用治心中惡口吐清水取根如毅子塊含之嚥津瘡口臭者同草豆蔻旗飲

【愷香子】味辛平無毒主諸痺霍亂及蛇傷〔藥性云〕可單用味苦辛和諸食中甚香破一切臭氣又卒惡心腹中不安取壓糯食之即瘥〔日華云〕得酒良治乾霍脚氣并骨勞痼痢氣開胃下食治膀胱痛陰疼

【防己】味辛苦平溫無毒主風寒溫瘧熱氣諸痛除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止洩散瘡腫惡結諸痛疥癩益產通膈理利九竅〔藥性云〕〔医防己〕〔君〕味苦有小

毒。能治風口眼喎斜，手足疼，骨節留痹，主腳氣軟弱，（本防己）（使）（畏）女萼，畏藜蘆。味辛苦，治男子腹痛，腰中脹，毒鳥不語，主散結氣，腫脹，溫痹，風水腫，治膀胱，股膝痛之（使）。藜蘆黃蜜（惡）。柳辛（畏）。

【京三稜】味苦平，無毒，主老癖，癥結塊（日華云）。味甘，經，治婦人血脉不調，心腹痛，落胎，消瘀血，產後腹痛血暈，并會血不下（外臺祕要）。下乳汁，取三兩，水二碗，煎取一碗，洗絞，取汁出爲度，極妙（子母祕錄）。治小兒疳瘦，及潮熱，无事疼癖等。

【蓬莪茂】味辛苦，太寒，無毒，主心腹結積，往忤下氣，破血除風熱，消瘰癧，功力烈於鬱金（日華云）。熱無毒，治癥瘕，血塊，產腹，通月經，治撲損瘀血，消腫毒，卒暴風痛冷氣，下食，海南生者，名蓬莪茂，江南生者，即是黃蜜（[illegible]云）。治氣爲最。

【鬱金】味辛苦寒，無毒，主血積下氣，生肌止血，破瘀血，血淋，尿血，金瘡（藥性云）。單用亦可，治女人產血結滯，溫醋磨服，亦療馬鞍用治腰痛，破血面補（經驗方）。治尿血不定，蔗白相和煎服（生）。蜀中者佳，胡人用之爲藥。

【款冬花】味辛甘溫，無毒，主欬逆上氣，善喘喉痹，肺寒熱，消渴，喘息呼吸（日華云）。調心肺，益五臟，除煩補勞，治虛損，止嗽，腳痛吐血，心虛驚悸，治肝明目，及中風，杏仁爲之（使）。（得）紫菀，瓦（惡）烏頭，硝石，元參（畏）。且母，辛夷，麻黃，黃芪，黃芩，連翹，青蒿。

【紅藍花】味辛溫，無毒，主產後血暈口噤，腹內惡血不盡，絞痛，脹死腹中，並酒煮服，亦主產婦下血，墮胎，腳踹，主小兒驚耳（濟上方）。治喉痺，塞不通，取汁服之，極驗，但咽喉塞服皆效，治婦人產暈絕者（張仲景）。治六十二種風，妨腹內血氣刺痛（廣利方）。治女子中風，血熱煩渴。

【牡丹】味辛苦，微寒，無毒，主寒熱中風，瘈瘲，驚癇，邪氣，除煩熱，堅癥瘕，留舍腸胃，安五臟，療腰痛，除時氣頭痛，客熱五勞，頭腦痛，風嗽，頭疾（藥性云）。治冷氣，散諸痛，女子經脈不通，血閉腰疼（長）。瓦礫（惡）。

【蓽撥】味辛大溫，無毒，主溫中下氣，補腰脚，殺腰氣，消食除胃冷，除痛痰，其根名蓽撥根，主五勞七傷，除汗，核腫（日華云）。治霍亂冷氣，心痛血氣（陳藏器云）。蓽撥根，味辛溫，無毒，主冷氣，嘔逆，心腹脹滿，食不消，寒痛，核腫，婦人內冷無子，治腰胯冷，除血氣。

【青葙】味苦寒，無毒，主解諸熱毒，小兒諸熱，驚癇，天行頭痛，寒熱，風水，研服，腳傳熱，瘙痒，腫，金瘡，下血，蛇犬蜂毒（藥性云）。（君）。味甘平，能解小兒疳熱，消瘦，殺蟲，又治發斑豆瘡（殺）。蟲物化爲水。

【蓯蓉】味苦寒，無毒，主熱風煩悶，腎腦間熱氣，明目，益心，小兒驚癇，五疳，殺三蟲，及痔病，瘙癢，腰中痛，補五臟，益精髓，除莖中痛，（南海藥譜云）。無治小兒諸熱（海上方）。治腰痛，以酒煮食之，神效。

【肉豆蔻】味辛溫，無毒，主鬼氣，溫中，治積冷，心腹脹痛，霍亂，中惡，冷注，嘔逆，冷氣，消食止泄，小兒乳霍，

（藥性云）。（君）。味苦辛，能主小兒吐逆不下，乳腹痛，治宿食不消，痰飲（日華云）。調中下氣，止瀉痢，開胃消食，皮外結，下氣，解酒毒，治霍亂。

【補骨脂】味辛大溫，無毒，主五勞七傷，風虛冷，骨髓傷敗，腎冷精流，及婦人血氣腹脹，一名破故紙（藥性云）。味苦辛，能主男子腰疼膝冷，益溫，逐諸冷痺頑，止小便利，腹中冷（日華云）。鎮陽事，治冷勞，明目（惡）。甘草（忌）。黃蘗，羊血。

【零陵香】味甘平，無毒，主惡氣，往心腹痛，滿，下氣，令體香（陳藏器云）。明目止淚，濁泄精，去臭，惡氣，傷寒頭疼（日華云）。治血氣腹脹，酒煎服，莖葉（海藥云）。主風邪沖心，牙車腫痛，虛勞疳證，凡是諸痛，並宜服（得）升麻，辛苦，不宜多服，令人氣喘。

【艾蒳香】味甘溫，無毒，去惡氣，殺蟲，主腹冷，泄痢疾（海藥云）。主傷寒五泄，心腹注氣，下寸白。

【延胡索】味辛溫，無毒，主破血，產後諸病，因血所爲者，婦人月經不調，腹中結塊，腰中淋露，產後血暈，血衝上，因損下血，或酒磨及煮服（生）。奚國，根如牛夏，色黃（日華云）。除風，治氣，腰腰膝，破癥癖，撲損瘀血，落胎，止暴腰痛。

【硇砂蜜】味辛溫，無毒，主虛勞冷滯，宿食不消，赤白泄痢，腹中虛痛，下氣（藥性云）。（君）。主冷氣腹痛，止休息氣痢，勞損，消化水穀，溫煦脾胃，治冷滯下痢不禁（陳藏器云）。主上氣欬嗽，奔豚鬼注，除痰邪氣（日華云）。治一切氣，霍亂轉筋，心腹痛（得）阿子，緊甲，豆蔻，白蜜等，瓦（生）南地。

【胡黃連】味苦平，無毒，主久痢成疳，傷寒欬嗽，溫瘧骨熱，理腰膝，去陰汗，小兒驚癇，寒熱不下食，霍亂下痢（唐本）。大寒，主骨蒸勞熱，補肝膽，明目，治冷熱泄痢，益顏色，厚腸胃，治三消五疳，大人五心煩熱（惡）菊花，元參，白蘞，皮（解）。巴豆蔻（忌）。猪肉，令漏精，以入乳浸點眼，甚良（一云）。治傷寒勞復，身熱大小便赤如血。

【白蘞】味辛溫，無毒，主金瘡生肌（藥性云）。亦可單用，味苦，能治喉中熱塞，喉痺不通，胸中隔塞，咽中常痛腫脹（日華子云）。冷，消痰，止嗽，治湯并血喉閉，消腫毒（圖經云）。療心氣痛，解熱毒，甚效，諸瘡腫不敷，取生根搗爛傅貼，乾即易之，無生者乾爲末，水調塗之（別本注云）。解野葛，生金，巴豆，百藥毒，刀斧折傷，能止血痛，乾末傅之，出原州。

【蓬莪朮】味苦辛溫，無毒，主心腹痛，中惡，往忤，鬼氣，霍亂，冷氣，吐酸水，解毒，婦人血氣，丈夫奔豚（藥性云）。可單用，治女子血氣心痛，破瘀癖，冷氣（日華云）。（得）酒醋，治一切氣，開胃消食，通月經，消癥血，止鍼損痛，下血，及內損惡血（一云）。治積聚，爲最要之藥，與三棱同之，其。

【莎草根】味甘微苦，無毒，主除胸中熱，充皮毛，久服令人益氣（圖經）。單服，療肺風，治丈夫心肺中虛風，及客熱，膀胱間積聚下時有氣助，皮膚瘙癢，憎寒，飲食不多，日漸羸損，常有憂愁，心怪少氣，交州所出者良。

【蒔蘿】味辛溫，無毒，主小兒氣脹，霍亂，嘔逆，腹冷，食不下，兩脇疼滿（日華云）。健脾開胃氣，溫腸，補水藏

及壯筋骨，消胃氣，（海藻云）主膈氣，消食，溫胃，補益味，多食無損，即不可與阿膠同食，壞其氣味。（殺）魚肉毒，（出）佛書國，今所在皆有之。

【白前】味甘，微溫，無毒，主肺膈逆氣，欬嗽上氣，（藥性云）（臣）味辛，能主一切氣，（日華云）治真脈胃氣，肺氣，煩悶，及上氣，（唐本云）微毒，主上氣沖喉中，呼吸欲絕。

【甘松】味甘，溫，無毒，主腹氣卒心腹痛，消，乘用合諸香，（日華云）治心腹腰下氣，作浴，令人身香。（海藻云）陳氏云，主鼠皮肝翻，風痹，齒齲，野鷄痔，（得）白芷，附子，良，合諸香及蕊衣也。

【使君子】味甘，溫，無毒，主小兒五痔，小便白濁，殺蟲，療瘕。

【白豆蔻】味辛，大溫，無毒，主積冷氣，止吐逆反胃，消穀下氣。（圖經）（臣）（文仲）治胃冷惡心，食即欲吐，以白豆蔻子三枚，搗篩，熟研，細，好酒一盞，微溫調之，併飲二三盞佳。

【蘇苞】味甘，寒，主解百藥毒，（日華子云）治蛇蟲咬，熱狂溫疾，霍亂，筋攣，鼻衄。（圖經）古方解五石毒，（又）不品方，治蠱取蘇苞根搗，（末）以飲服方寸匕，立瘥。（食療云）丹石發動取根食之，良。（出）川蜀江浙。

【蒴草】味苦，無毒，治聚積，疥癬，風瘙，根名白藥。（圖經）味苦平，有毒，主諸瘡疥癬，及牛馬諸瘡。（一云）治癰疽，入生蜜為膏腦之，用冷粥飲調之，如吐或下，不妨，如久病肺損咯血，只一服，尋常欬嗽，血妄行亦可。

【茅香花】味苦，溫，無毒，主中惡，溫胃，止嘔吐，療心腹冷痛，（日華云）白茅香花塞鼻洪，傷久不合灸瘡，醫刀箭瘡，止血并痛，煎湯止吐血鼻衄。（海藻云）小兒領身瘡疱，桃葉同煮浴之。

【膽腸】味甘，酸，平，無毒，主血痢，針灸瘡發洪血不可止者，煎之立愈，汁塗眉鬚，生速而繁，生下溫地。（日華云）排膿止血，通小腸，長髮，髮，傅一切瘡，并鼻瘡。○俗謂之鼻涕子。

草部下品之上

【附子】味辛，甘，溫，大熱，有大毒，主風寒欬逆，邪氣，溫中，金瘡，破癥堅積聚，血瘕寒溫，腳膝拘攣，踝痛脚弱，冷不能行步，腰脊風寒，心腹冷痛，霍亂轉筋，下痢赤白，堅肌骨，強陰，又墮胎，為百藥長。（一云）療偏風半身不遂，大風冷痹，癱瘓，暴逆，翻胃，元藏傷冷，耳聾，風牙齒痛，治陰盛格陽，傷寒，地膽為（使）（惡）峽蛤，（畏）防風，黑豆，甘草，黃芪，人參，烏韭，（生）犍為山。

【烏頭】味辛，甘，溫，大熱，有大毒，主中風，惡風，洗洗出汗，除寒濕痺，欬逆上氣，破積聚，寒熱，消胃上痰，冷食不下，心腹冷痛，腳間痛，肩髀痛，不可俛仰，目中痛，不可久視，又墮胎，其汁腐之，名射罔，味苦，有大毒，療瘡尸注，瘡瘻，及頭中風痛，（藥）黃耽，（藥性云）（使）逆志為之（使）（忌）豉汁，味苦，辛，大熱，有大毒，能治惡風，增痺，溫痺，逆氣，冷痰，包心腹，腹疼痛，痰癖氣塊，益陽事，中風洗洗，惡寒，除寒熱，主胃中痰滿，冷氣不下食，治欬逆上氣，治齒痛，破積聚寒，主強志，（日華子云）主附子，味甘，辛，熱，有毒，生去皮，搗濾汁澄清，旋旋煎，曬乾取膏，名射罔，服人腎作毒，術使用，或中者，以甘草，藍汁，小豆漿，浮粹，冷水，麻苞，皆可解之。

葶苧為之（使）（反）半夏，括蔞，貝母，白蘞，白芷，（惡）藜蘆。

【天雄】味辛，甘，溫，有大毒，主大風寒濕痺，歷節痛，拘攣緩急，破積聚，邪氣，金瘡，強骨節，輕身健行，療頭面風，去來疼痛，心腹結積，關節寒不能行步，除骨間痛，具陰氣，強志，令人武勇力作不倦，又墮胎，（藥性云）（君）（忌）豉汁，大熱有大毒，乾薑制，用之，能治風痹冷痺，軟脚毒風，能止氣喘促急，（殺）金蠶毒，（日華云）治一切氣，助陽道，壞水臟，補腰腎，益精明目，通九竅，利皮膚，調血脈，四肢不遂，破痃癖結，排膿止痛，續骨，消瘀血，補冷氣虛損，霍亂轉筋，背脊疼痛，消風痰，下胃脘水，發汗止陰汗，炮令，治喉痺，遂志為之（使）（惡）腐婢。

【側子】味辛，大熱，有大毒，主寒濕風痺，歷節疼脚疼冷，寒熱風痛，又墮胎，（藥性云）（使）能治冷風濕痺，大風筋骨攣急，（圖經）烏頭烏喉生節陰山谷，天雄生少室山谷附子側子生犍為山谷及廣漢，今並出蜀土，（畏）（惡）與附子同。

【烏喙】味辛，微溫，有大毒，主風濕，丈夫胃濕，除寒痹，寒熱，歷節，腰引腰痛，不能行步，踵腫結，又墮胎，（藥性云）（使）能消痰滿，開胃健脾，止嘔吐，去胸中痰滿，下肺氣，主頭結新生者，膏塗腫處不消，能除瘡瘻，氣虛有痰，加面用之。（日華云）味苦，辛，治吐食反胃，霍亂轉筋，腹腹冷，痰癖，射干為使，（忌）海藻，飴糖，（惡）烏賊，（畏）雄黃，生薑，菟絲，桑皮，蚯甲，（反）烏頭。

【半夏】味辛，平，生微寒，熟溫，有毒，主傷寒寒熱，心下堅，下氣，喉咽腫痛，頭眩胸脇，欬逆腸鳴，止汗，消心腹胸脇痰熱滿結，欬嗽上氣，心下急痛堅痞，時氣嘔逆，消痞腫，堅胎，療痰黃，（藥性云）（使）能消痰滿，開胃健脾，止嘔吐，去胸中痰滿，下肺氣，主頭結新生者，膏塗腫處不消，能除瘡瘻，氣虛有痰，加面用之。（日華云）味苦，辛，大熱，治男子腎氣衰弱陰汗，主療風溫邪痛，寒熱痞脹不消者，（畏）（惡）烏頭同。

【大黃】味苦，寒，大寒，無毒，主下瘀血，血閉寒熱，破癥瘕積聚，留飲宿食，蕩滌腸胃，推陳致新，通利水穀，調中化食，安和五臟，平胃，下氣，除痰實，腸間結熱，心腹脹滿，女子寒血閉膜，小腹痛，諸老血留結，（藥性云）（使）去寒熱結聚，宿食，利大小腸，貼熱毒腫，小兒寒熱時疾煩熱，蝕瘡，破留血，（日華云）通宣一切氣，調血脈，利關節，泄壅滯水氣，四肢冷熱不調，溫痺熱痛，利大小便，并傳一切蠱毒。

【萆薢】味辛，苦，寒，無毒，主惡瘡，積聚，結氣，又治飲食寒熱，破堅，逐邪，通利水道，下膀胱水，使留熱氣，出邪水上出，面目浮腫，身緣中風熱痺痹，利小腹，又療腳腫上氣欬嗽，定喘促，除留中痰飲，（藥性云）（臣）利小便，腳氣，喘急，止嗽，（日華子云）利小腸，通水氣，虛極，瘦皮，（使）（惡）蠶蛾，石龍芮，（得）酒良，（生）溪谷平澤及田野。

【旋覆花】味鹹，甘，溫，微溫，冷，利，有小毒，主結氣，脇下滿，驚悸，除水，去五臟間寒熱，補中下氣，消胃上痰結，嗜如膠漆，心脇痰水，肠胱留飲，風氣濕痺，皮間死肉，利大腸，通血脈，（藥性云）（使）味甘，無毒，主助脇氣下，寒熱水腫，開胃，止嘔逆不下食，（日華云）明目，治頭風，通血脈，（葉）主金瘡。

【虎掌】味苦，溫，微寒，有大毒，主心痛，寒熱，結氣，積聚，伏梁，傷筋，痿拘緩，利水道，除陰下濕風痺，（藥性云）

〔使〕。味甘，溫。治風眩，目轉，痫癎，腸痛，傷寒時疾。生隋。蜀漆為之〔使〕，〔惡〕莽草。〔生〕漢中山谷及寃句。二八月採，陰乾。

【草蒿】味苦，寒，無毒。主疥瘙痂癢惡瘡，殺蝨，留熱在骨節間，明目。〔唐本注〕：生擣傅金瘡，大止血，生肉，止疼痛。其〔陳藏器〕：主鬼氣尸疰伏留，婦人血氣，腹內滿及冷熱久痢。秋冬用子，春夏用苗，並擣汁服，亦暴乾為末，小便中服。如覺冷，用酒煑。又燒為灰，紙八九重淋汁，和石灰，去息肉黶子。〔日華云〕：補中益氣，輕身補勞，駐顏色，去心痛熱黃，生擣汁服，并傅之。瀉痢，飯飲調末服。和石灰煎，治惡毒瘡，并塗亦用。〔圖經〕：凡使子，勿使葉；使根，勿使莖。四者若同，反以成疾。

【桔梗】味苦甘，微溫，有小毒。主胸脅痛如刀刺，腹滿腸鳴幽幽，驚恐悸氣，利五臟腸胃，補血氣，除寒熱風痺，溫中消穀，療咽喉痛，下蠱毒。〔藥性云〕：〔臣〕。治下痢，破血，去積氣，消積聚痰涎，去肺熱氣促，嗽逆，除腹中冷痛，主中惡及小兒驚癎。〔日華云〕：一切氣，止霍亂轉筋，心腹脹痛，補五勞，養氣，除邪辟溫，補虛，消痰，破癥瘕，養血排膿，補內漏，消痰，喉痺。節皮為〔使〕，〔得〕牡蠣、遠志，療恚怒；〔得〕消石、石膏，療傷寒。〔畏〕白芨、龍膽。〔生〕嵩高山谷，近道處處有。

【藜蘆】味辛苦，寒，微寒，有毒。主蠱毒，欬逆，洩痢，腸澼，頭瘍，疥瘙，惡瘡，殺諸蟲毒，療噦逆，喉痺不通。〔藥性云〕：〔使〕。大毒，能主上氣，去積年膿血，洩痢，惡風，瘡疥，癬頭禿，殺蟲。均州生，俗呼為鹿葱。此藥大吐上膈風涎，暗風癎病，小〔兒〕齁鼾，用錢七一字，則惡吐人。又用通頂，令人嚏。刻本云：療噦逆，喜欬。黃連為之〔使〕，〔反〕細辛、芍藥、五參，惡大黃。近道皆有之。

【射干】味苦，平，微溫，有毒。主欬逆上氣，喉痺咽痛，不得消息，散結氣，腹中邪逆，食飲大熱，療老血在心脾間，欬唾，言語氣臭，散胸中熱氣。〔藥性云〕：〔使〕。有小毒。能治喉痺，水漿不入，能通女人月閉，治疰氣，消瘀血。〔日華云〕：消痰，破癥結，胸膈滿，腹脹，氣喘，痃癖，開胃下食，消腫毒，鎮肝明目。〔生〕南陽山谷，今在處有。

【鉤吻】味辛，溫，有大毒。主金瘡乳痓，中惡風，欬逆上氣，水腫，殺鬼疰蠱毒，破癥積，除腳膝痺痛，四肢拘攣，惡瘡疥蟲，殺鳥獸。〔蜀本云〕：主喉痺，咽中塞，聲變，欬逆氣，溫中。半夏為〔使〕，〔惡〕黃芩。○野葛毒草，誤食則用羊血解之。○一名野葛。

【蛇含】味苦，微寒，無毒。主驚癎，寒熱邪氣，除熱，金瘡，疽痔，鼠瘻，惡瘡，頭瘍，療心腹邪氣，腹痛，濕痺，養胎，利小兒。〔藥性云〕：〔臣〕。有毒。能治丹瘮，小兒寒熱。〔日華云〕：治蛇蟲蜂虺所傷，及眼赤，止血，協風毒癰腫。並葉俱用。又名蛇銜。

【蜀漆】味辛，平，微溫，有毒。主欬逆寒熱，腹中癥堅痞結，積聚邪氣，蠱毒鬼疰，療胸中邪結氣。〔藥性云〕：〔使〕。味苦，有小毒。常山苗也。治瘴鬼瘧多時不差，去寒熱瘧，治溫瘧寒熱，下氣積聚。〔日華子云〕：治癥瘕。栝蔞為之〔使〕，〔惡〕貫衆，〔畏〕漏青。

【白斂】味苦甘，平，微寒，無毒。主癰腫疽瘡，散結氣，止痛除熱，目中赤，小兒驚癎，溫瘧，女子陰中腫痛，下赤

白，殺火毒。〔藥性云〕：〔使〕。主氣壅腫。〔日華云〕：止驚邪，血邪，發背，瘰癧，腸風，痔瘻，刀箭瘡，撲損，溫熱瘧疾，血痢，湯火瘡，生肌止痛。代赭為使，反烏頭。

【甘遂】味苦甘，寒，大寒，有毒。主大腹疝瘕，腹滿，面目浮腫，留飲宿食，破癥堅積聚，利水穀道，下五水，散膀胱留熱，皮中痞，熱氣腫滿。〔藥性云〕：味苦，能瀉十二種水疾，治心腹堅滿，下水，去痰水，生皮肌浮腫。〔日華云〕：西京者上，瓜蒂為〔使〕，惡遠志，反甘草。

【常山】味苦辛，寒，微寒，有毒。主傷寒寒熱，熱發溫瘧，鬼毒，胸中痰結，吐逆，療鬼蠱往來，水脹，洒洒惡寒。〔藥性云〕：忌葱。味苦，有小毒。治諸瘧，吐痰涎，主寒熱，食多，令人大吐。治項下瘤癭。〔蜀本云〕：〔得〕甘草吐瘧。〔日華云〕：忌菘菜。〔畏〕玉札。

【青葙子】味苦，微寒，無毒。主邪氣，皮膚中熱，風瘙身癢，殺三蟲，惡瘡疥，風痔，蝕下部蠶瘡。〔子〕名草決明。〔藥性云〕：治肝藏熱毒衝眼，赤障，青盲，翳腫，主惡瘡疥瘙，下部蠶瘡。〔日華子云〕：治五臟邪氣，益腦髓，明耳目，鎮肝，堅筋骨，去風寒濕痺。〔苗〕止金瘡血。所在有之，似麥攋花，其子甚細。

【白芨】味辛苦，平，微寒，無毒。主癰腫，惡瘡，敗疽，傷陰，死肌，胃中邪氣，賊風，鬼擊，痱緩不收，除白癬疥蟲。〔藥性云〕：〔使〕。治熱結不消，主陰下痿，治面上皯皰。〔日華云〕：止驚邪血邪，癇疾，赤眼，癥結，發背，瘰癧，腸風痔瘻，刀箭瘡，撲損，溫熱瘧疾，血痢。紫石英為之〔使〕，〔惡〕理石，〔畏〕李核、杏仁。

【大戟】味苦甘，寒，有小毒。主蠱毒，十二水，腹滿急痛，積聚，中風，皮膚疼痛，吐逆，頸腋癰腫，頭痛，發汗，利大小便。〔藥性云〕：〔使〕。反芫花、海藻，毒用菖蒲解之。味苦辛，有大毒。破新陳，下惡血癖塊，腹內雷鳴，通月水，善治瘀血，能墮胎孕。〔日華云〕：小豆為〔使〕，惡薯蕷，瀉毒藥，泄天行黃病，溫瘧，破癥結。〔反〕甘草。〔畏〕菖蒲、蘆葦。

【貫衆】味苦，微寒，有毒。主腹中邪熱氣，諸毒，殺三蟲，去寸白，破癥瘕，除頭風，止金瘡。〔花〕療惡瘡，令人洩。〔藥性云〕：〔使〕。主腹熱，赤小豆，雚菌為之〔使〕，殺寸白蟲。〔又圖經云〕：苗似狗脊，狀如雉尾，根直多枝，皮黑肉赤，名草鴟頭。治頭風。又荊南人取根為末，水調服一錢，止鼻血有效。

【羊躑躅】味辛，溫，有大毒。主賊風在皮膚中淫淫痛，溫瘧，惡毒，諸痺，邪氣，鬼疰，蠱毒。〔藥性云〕：〔惡〕諸石及麵。

【茵芋】味苦，溫，微溫，有毒。主五臟邪氣，心腹寒熱，羸瘦如瘧狀，發作有時，諸關節風濕痺痛，療久風濕走四肢，腳弱。〔藥性云〕：〔使〕。味苦辛，有小毒。能治五臟寒熱，似瘧，諸關節中風痺，拘急攣痛，治男子女人軟腳毒風，治溫瘧發作有時。〔日華云〕：治一切冷風，筋骨怯弱羸顫。〔生〕太山。

草部下品

【何首烏】味苦澀，微溫，無毒。主瘰癧，消癰腫，療頭面風瘡，五痔，止心痛，益血氣，長筋骨，益精髓，女人產後及帶下諸疾。〔日華子云〕：味甘，久服令人有子，治腹臟宿疾，一切冷氣及腸風。〔忌〕羊血及鐵器。

【威靈仙】味苦，溫，無毒。主諸風，宣通五臟，去腹內冷滯，心膈痰水，久積癥瘕，痃癖氣塊，膀胱宿膿惡水，腰

腰冷痛，及療折傷，久服之，無瘡痍痕跡。〔恐〕菜及麵湯〔唐本云〕主腰腎脚膝積聚腹內諸冷病，積年不瘥者，服之無不立效。

【巴牛花】味苦溫，有毒，主下氣療脚滿水腫，除風毒，利小便〔甄性云〕〔使〕味甘，有小毒，治痰癖氣塊，利大小便，除水氣虛腫，落胎〔日華子云〕味苦鹹〔得〕胥木香，乾漆瓦，取治腹痛，下冷膿，蠱毒，頭并一切風腫。

【芭麻子】味甘辛平，有小毒，主水腫，及主風虛寒熱，身體痛癢，浮腫，尸注惡氣〔藥〕主脾氣風腫不仁，搗薄傅之〔日華子云〕治水腫，腹滿，及傷生，傅產人手足心，並後速試去，痛處，亦可研傅〔海上方〕治雞產及胞衣不下。

【天南星】味苦辛，有毒，主中風，除痰，腎下氣，破堅積，消瘤腫，利胸膈，散血腫，脣〔陳藏器云〕主金瘡，傷折，麻痺，取根碎傅傷處〔日華子云〕味辛烈平〔甄〕附子，乾薑，生薑，治撲損，瘀血，主蛇蟲咬，傅療麻痺，瘡毒。

【狼毒】味辛平，有大毒，主蠱逆上氣，破積聚，飲食寒熱水氣，腸下積癖，惡瘡，鼠瘻，疽蝕，蟲毒，殺飛鳥走獸〔藥性云〕〔使〕味苦辛，有毒，治痰飲癥瘕，亦殺鼠〔葛洪〕治心腹根連腰痛，大豆為〔使〕〔恐〕彭句蕳〔生〕蔡草隰西，二八月採根，陰乾，沉水者良。

【三白草】味甘辛寒，有小毒，主水腫脚氣，利大小便，消痰破癖，除積聚，消丁腫〔陳藏器云〕，絞汁服，令人吐，亦主瘧。

【甘蕉根】大寒，主蹇疽結熱〔藥性云〕〔君〕，搗傅一切瘡腫上，乾即更上，無不愈者〔日華子云〕治天行熱狂煩悶，消渴患瘡毒，并金石發熱，閉口乾，治遊風，風腳頭痛，并研罨傅〔又〕芭蕉汁，冷無毒，主頭風熱，止煩渴及渴火瘡。

【馬兜鈴】味苦寒，無毒，主肺熱欬嗽，頻給喘促，血痔，瘡瘙〔藥性云〕平，能主肺氣上急，蟲蟲不得，主欬逆連連不止〔日華子云〕治痔瘡瘡，以藥瓶中燒熏病處，入藥炙用，是土青，木香，稀行根子〔圖惠方〕治五種蠱毒。

【骨碎補】味苦溫，無毒，主破血，止血，補傷折〔甄性云〕〔使〕主骨中毒氣，風血疼痛，五勞六極，足手不收，上熱下冷〔日華子云〕平，治惡瘡，蝕爛肉殺蟲〔[illegible]云〕治耳聾〔圖宛方〕治虛氣攻牙齒痛，血出，牙齒痛。

【連翹】味苦平，無毒，主寒熱，鼠瘻，瘰癧，腫惡，惡瘡，腫癰，結熱蠱毒，去白蟲〔藥性云〕〔使〕主通利五淋，小便不通，除心家客熱〔日華子云〕通小腸排膿，治瘡折，止痛，通月經〔集驗方〕治痔以連翹煎湯洗乾，刀上飛絲，搽入瘡香貼之。

【劉寄奴】味苦溫，主破血下膈，多服令人痢〔別本云〕療金瘡止血為要藥，產後餘疾，下血止痛，極效〔日華子云〕，無毒，治心腹痛，下氣，水腫，血氣，通經人經脈，癥結止血，氣水腫〔經驗方〕治湯火瘡至妙，搗

末，先以糯米漿雞翎掃湯著處，後搽藥末在上，並不痛，亦無瘡，大凡湯著處，先用鹽末搽之，腐肉不腐，然後藥末傅之。

【穀隨子】味辛溫，有毒，主婦人血結，月閉，癥瘕，瘧癖，蠱毒，鬼注，心腹痛，冷氣腹滿，利大小腸，除痰飲積聚，下惡滯物〔蜀本云〕積聚痰飲不下食，嘔逆及腹內諸疾，研酒服之，不過三顆，當下惡物〔日華子云〕，宣一切窮滯，治脚氣水氣，傅一切惡瘡疥癬，葉汁傅白癜面好。

【蒴藋】味甘苦寒，無毒，主五淋，利小便，止水腫，除熱，發熱湯〔唐本注云〕獨行方〕主頭遍身皆痛者，用作草一握，以水二石，煮取一石，以漬瘡，不過三作，乃愈〔又〕並丹，主齊淋，搗生汁二升，酒二合，相和空服，頓服，當漏如白汁也，又主久痢成瘕，取乾莖搗篩，量多少，管吹穀道中，不過三四次，瘥已，若神〔生〕處處有之。

【金星草】味苦寒，無毒，主瘡疽瘡毒，大解硫黃及丹石毒，發背瘡腫結核，用葉和根，酒煎服之，先服石蘭悉下，又可作末冷水服，及塗發背瘡腫上，殊效〔經驗方〕治五毒發背。

【鶴虱】味苦平，有小毒，主蠱蟲，用之為散，以肥肉煎汁服方寸匕〔別本注云〕主心痛，以淡醋和牛膝服之立瘥，出波斯者為勝〔日華子云〕涼，無毒，殺五臟蟲，止瘧，及傅惡瘡。

【蚤休】味苦微寒，有毒，主驚癇搐頭，并舌，熱氣在腹中，風疾寒痛，除蠱，下三蟲，去蛇毒〔唐本注云〕醋磨治瘡腫，傅蛇毒有效〔日華子云〕冷，無毒，治胎風搐手足，能吐瀉痰涎〔圖經云〕，即紫河車也，俗呼蚤休，並金線〔生〕山陽川谷及荊襄。

【預知子】味苦寒，無毒，殺蟲療蠱，治諸毒，傳云取二枚，縫衣領上，遇蠱毒物，則聞其有聲，當便知之〔日華子云〕，溫，治一切風，補五勞七傷，其功不可備述，并治瘧，解氣塊，天行溫疾，消宿食，止煩悶，利小便，能生，解毒藥，中毒失音，傅一切蛇蟲螫咬，雙仁者可，帶單方，治一切病，每日取仁二七粒，患者服，不過三十粒，永瘥。

【葫蘆巴】主元藏虛冷氣〔得〕附子，硫黃，治腎虛冷，腹脇脹滿，面色青黑〔得〕蓽澄茄，茴香子，桃仁，治膀胱氣，並效〔出〕廣州并黔州，春生苗，夏結子，子作輔英，至秋採，今人多用蜀南者，治元藏冷氣為最要。

【白附子】主心痛血瘕，面上百病，行藥勢〔日華子云〕無毒，治中風失音，一切冷風氣，面皯瘡疵。

【木賊】味甘微苦，無毒，主目疾，退翳膜，消積塊，益肝腎，明目，療腸風，止痢，及婦人月水不住〔得〕牛角腦麝香，治休息痢，歷年不瘥〔得〕馬餘糧，當歸，芎藭，療崩中赤白〔得〕槐蛾，蠶蛹，蠶蛾，蠶蛾子，根實相和，主痔疾出血〔廣利方〕治腸血不止〔出〕泰隴。

【海金沙】主通利小腸〔得〕梔子，馬牙硝，蓬砂，共療傷寒熱狂，今人治小便不通，臍下滿悶〔方〕海金沙一兩，藏南茶半兩，二味搗研，令細，每服三錢，煎生薑甘草湯調下，服無時，未瘥再服。

【燈心草】味甘寒，無毒，根及苗，主五淋，治小兒夜啼〔又〕治破傷，爛瘡，貼之，用帛裹血立止。

【馬勃】味辛平無毒，主塞瘖馬疾。

【鵝蝨子】味無毒，止腸風瀉血，赤白痢，搗入崩中帶下，入藥妙用。

【水蓼】主蛇傷，搗傅之，絞汁服，主蛇毒入腹心腎，水煮漬脛，消氣腫，〔日華子云〕冷，無毒，煮飲，暴瘧，生下服水蓼。

增廣太平惠民和劑局方用藥總論卷中

木部上品

【桂皮】味甘辛，大熱，有小毒，主溫中，利肝氣，心腹寒熱冷痛，霍亂轉筋，頭痛腰疼，出汗，止煩止唾，欬嗽，鼻塞，除胎，堅骨節，通血脈，〔藥性云〕〔君〕主治九種心痛，殺三蟲，主破血，脚痺不仁，胞衣不下，除腹內冷氣痛，主下痢，治鼻息肉，〔日華云〕治一切風氣，補五勞七傷，通九竅，利關節，益精明目，腰膝疼痛，破瘀血，治風痺，生肌肉，〔得〕人參，麥門冬，甘草，大黃，黃芩，調中益氣，〔得〕柴胡，紫石英，乾地黃，療吐逆，〔殺〕草，木毒，〔忌〕生葱，○〔牡桂〕味辛溫，無毒，主上氣欬逆，結氣，喉痺，吐吸心痛，膈風脇痛，溫筋通脈，止煩出汗，利關節，補中益氣，〔藥性云〕〔使〕去冷風疼痛，○〔菌桂〕辛溫，無毒，主百病，養精神，爲諸藥先通使。

【松脂】味苦甘溫，主瘡瘡，惡瘡，頭瘡，白禿，疥搔，風氣，安五臟，除熱，胃中伏熱，咽乾，消渴，及風痺死肌，〔實〕主風痺，寒氣，虛羸少氣，補不足，〔膏〕主風濕痛，安五臟不飢，〔節〕主百節久風虛，脚痺冷痛，〔根白皮〕主辟穀，〔藥性云〕〔使〕殺蟲，主耳聾，〔日華云〕潤心脾下氣，除邪，頭膏，治瘡排膿。

【槐實】味苦酸寒，無毒，主五內邪氣，熱中，消渴，周痺風瘙，下氣，補絕傷，五痔，火瘡，婦人乳腫，子藏急痛，又腫脚，〔藥性云〕〔臣〕治大熱，雖產，〔皮〕煮汁淋陰蝕，堅硬氣痛，又根白皮，治口齒風痛，〔日華子云〕槐子治丈夫

女人陰瘡痛癢，偏生，香七粒，〔皮〕治中風，皮膚不仁，喉痺，洗五痔，虛門癢痛，及湯火瘡，煎膏止痛，其肉，消渴腫，〔槐耳〕主五痔，心痛，女人陰中瘡痛，蝕天爲之，〔使〕，〔槐膠〕主一切風，化痰，治肝臟風，筋脈抽擊，悲，風口禁，四肢不收，頭痺或眩風，周身如蟲行，或破傷風，口眼偏斜，腰背強硬，〔槐花〕味苦平，無毒，治五痔，心痛，眼赤，殺蟲，蠱毒，及熱，治皮膚風，腸風，酒血，赤白痢，〔葉〕平，無毒，煎湯，治小兒驚癇，壯熱，疥癬，丁瘡，皮蟲，治，同。

【枸杞】味苦寒，〔根〕大寒，〔子〕微寒，無毒，主五內邪氣，熱中，消渴，周痺風瘙，下胷膈氣，客熱，頭痛，補內傷大勞，嗜髓，堅筋骨，強陰，利大小腸，〔藥性云〕〔臣〕子葉同味，甘平，能補精益，諸不足，明目安神，令人長壽，〔日華云〕除煩益志，補五勞七傷，肚心氣，去皮膚骨節間風，消熱毒，散痛腫，〔孫真人備急方〕，治諸口苦有血出，又治赤眼瘡痛。

【栢實】味甘平，無毒，主驚悸，安五臟，益氣，除風濕痺，療恍惚，虛損，嗜臥，歷節腰中重痛，益血止汗，〔藥性云〕〔君〕治腰腎中冷，膀胱冷，臟宿水，興陽道，去頭風，治百邪鬼魅，主小兒驚癇，〔日華子云〕治風瘙皮膚，牡蠣，及桂，瓜子，爲〔使〕，〔畏〕菊花，并羊蹄，諸石，以及地黃等。

【茯苓】味甘平，無毒，主胷脇逆氣，憂恚，驚邪恐悸，心下結痛，寒熱，煩滿，欬逆，口焦舌乾，利小便，止消渴，好睡，大腹淋瀝，腫中痰水，水腫淋結，開胷膈，調臟氣，伐腎邪，長陰益氣力，保神守中，〔藥性云〕〔臣〕開胃止嘔逆，主肺痿痰嗽，治小兒驚癇，療心腹脹滿，婦人點淋，赤者破結氣，〔日華子云〕補五勞七傷，安胎，暖腰膝，馬鬱爲之，〔使〕，〔惡〕白蘚，〔畏〕牡蠣，地榆，蜀漆，芫花，龜甲，〔忌〕米醋，〔虛〕雪南色白而堅實者佳。

【茯神】平，主辟不祥，療風眩風虛，五勞口乾，止驚悸多忘，怒忘，開心益智，安魂魄，養精神，〔藥性云〕〔君〕味甘無毒，主驚癇，安神定志，補勞乏，主心下急痛，壓滿，人虛而小腸不利，其心名黃松節，治中偏風口面喎斜，療風筋攣不語，心神驚悸，虛而健忘，〔畏〕米醋及酸物。

【琥珀】味甘平，無毒，主安五臟，定魂魄，殺精魅邪鬼，散瘀血，通五淋，〔藥性云〕〔君〕治百邪，產後血暈痛，〔日華云〕療產難，壯心，明目，磨服，止心痛，鎮邪，破癥結。

【榆白皮】味甘平，無毒，主大小便不通，利水道，除邪氣，腸胃邪熱氣，消脂，性滑利，療小兒頭瘡痂疕，〔花〕主兒癇，小便不利，傷熱，〔藥性云〕消脂，主利五淋，治不眠，療齁，〔日華云〕通經脈，溫筋，〔別錄云〕爲末，治婦人產後臨月，日三服方寸匕，令產極易，產下，甚驗。

【酸棗】味酸平，無毒，主心腹寒熱，邪結氣，聚，四肢痠痛，濕痺，煩心不得眠，膽上下痛，血轉久泄，虛汗煩渴，補中益肝氣，堅筋骨，助陰氣，〔藥性云〕主筋骨熱，〔日華云〕治脾下滿痛，〔聖惠方〕治骨蒸，勞心煩不得眠臥，〔外臺秘要〕療齒蟲齒痛，〔惠〕防己。

【辛夷】味辛溫，無毒，主五臟身體寒熱，風頭腦痛，面鼾，通中解肌，通九竅，鼻塞涕出，治面腫引齒痛，眩冒身兀兀如在車船，去白蟲，下氣明目，〔藥性云〕〔臣〕治面生鼾，皰面脂刷，〔日華云〕通關脈，明目，治頭

痛增寒骨蒸羸瘦等證〔使〕〔惡〕五石脂〔長〕菖蒲蒲黃黃連石膏黃礬

【黃蘗木】味苦寒無毒主五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止泄痢女子陰下赤白陰傷蝕瘡療骨氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡〔藥性云〕〔使〕主男子陰瘡治下血如雞鴨肝片及男子莖上瘡屑末傅之〔日華云〕安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱澁痔血治軟心痛赤白蠱毒治鼻洪腸風寒血後分急熱腫痛身皮力微次於根〔惡〕乾漆

【楮實】味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目〔藥〕主小兒身熱〔惡〕漆〔皮〕主逐水利小便〔堂〕主經脈癰腫皮間白汁療瘡〔藥性云〕〔皮〕治水腫氣滿〔藥〕乾炒末搜麵作餅飽食主水痢〔日華云〕楮實壯筋骨助陽氣補虛勞助腰〔藥〕治刺風身癢汁傅蛇蟲傷犬咬〔肘後方〕治鼻齆

【乾漆】味辛溫有毒主絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五緩六急風寒濕痺痰欬消瘀血落結腰痛女子痛瘕利小腸去蚘蟲〔生〕療去長蟲〔藥性云〕〔臣〕殺三蟲女人月水不通〔日華子云〕治傳尸勞除風半夏為之〔使〕〔畏〕鼠子金及忌油膩〔生〕淡中山谷

【蒺藜子】味辛苦微寒平溫無毒主筋骨間寒熱澁澁拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭痛腫鳴目淚出益氣〔藥性云〕〔臣〕治風長髮髮〔日華云〕利關節治赤眼翳瘡〔惡〕烏頭石膏〔小腫實〕亦等〔生〕秦觀明越州眉州八九月採

【五加皮】味辛苦溫微寒無毒主心腹痛氣腹痛益氣療聾小兒不能行宜補陰益男子陰痿囊下濕小便餘瀝腳中酸疼不欲踐地〔日華云〕腰治骨勞腰脊嬰篇入藥炙用〔藥〕蛇退皮元參

【蕤核】味甘溫微寒無毒主心腹邪熱氣結明目目赤痛傷淚出目腫瞤瞤鼻破心下結滯腐氣久服輕身益氣〔藥性云〕蕤仁〔使〕能治鼻齆〔古方〕惟治喉〔傳信方〕治眼風淚痛或生翳或赤瞤一切皆主之〔生〕函谷山谷今河東亦有之

【楓香脂】味辛苦平無毒主癰瘡風瘙浮腫齒痛〔陳藏器云〕楓皮本功外性澁止水痢水煎止下痢為散〔日華云〕楓皮止霍亂刺風冷煎湯浴之〔簡要濟衆〕治吐血不止唐本云樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之

【丁香】味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂嘔逆風毒諸腫齒痛能發諸香其根療風鈴毒腫〔日華云〕治

口氣反胃鬼疰蠱毒及療腎氣奔豚氣陰痛壯陽暖腰膝治冷氣殺酒毒酒痔疾瘕除冷勞〔藥性云〕〔臣〕能主冷氣腹痛

【沉香】微溫療風水毒腫去惡氣〔日華云〕味辛熱無毒調中補五臟益精壯陽暖腰膝去邪氣止轉筋吐逆冷氣破癥癖冷風麻痺骨節不仁風溫皮膚瘙心腹痛風痺〔海藥云〕味苦溫無毒主心腹痛霍亂中惡邪鬼狂清人神並宜酒煮服之諸瘡腫宜入膏用

【薰陸香】微溫療風水毒腫去惡氣伏尸〔陶隱居云〕惟療惡核毒腫

【降真香】出黔南并和諸雜香燒直上天召鶴得盤旋於上〔海藥云〕味辛溫無毒燒之辟天行時氣并宅舍怪異

【雞舌香】微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛〔藥性云〕〔使〕殺蟲疥入諸香令人身香

【檀香】〔陶隱居云〕白檀治風熱腫〔陳藏器云〕主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲〔日華子云〕熱無毒治心痛霍亂胸氣腹痛溫酒服水磨傅外腎并腰膝痛處

【乳香】微溫療風水毒腫去惡氣療惡核毒腫〔日華云〕味辛熱微毒下氣益精補腰腎治腎氣止霍亂衝逆中邪氣心腹痛狂氣煎骨止痛昌肉入丸散微炒殺毒用不粘

【蘇合香】味甘溫無毒主辟惡殺鬼精物溫疫蠱毒殭屍去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身〔生〕中亞川谷

【薝香】微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛〔日華云〕味辛〔近世醫方〕治脾胃吐逆為效要之藥出海邊國今嶺南多有

【金櫻子】味酸澁平溫無毒療脾泄下痢止小便利經精氣〔日華子云〕〔花〕平止冷熱痢殺寸白蟲等和蜜粉研拔白髮傳之再出黑者亦可染髮〔又云〕東行根平無毒治寸白蟲〔又云〕皮平無毒炙止瀉血及崩中帶下○江南蜀中人熬作膏煎酒服云補治有殊效〔沈存中〕子止遺濁取其溫且澁世之用者待紅熟取汁熬膏大誤也紅熟則都失本性今取半黃時採用妙

木部中品

【桑白皮】味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脈絕補虛益氣去肺中水氣唾血咳逆水腫腹滿盧服利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人〔藥〕除寒熱出汗汁解蜈蚣毒桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白沃血痢瘡瘕積聚陰痛陰腫寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止久泄益氣不飢〔藥性云〕〔使〕能治肺氣喘滿水氣浮腫主傷絕利水道消水氣盧勞客熱頭痛內補不足續耳使又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子痃癖瘧療伏血下赤白〔日華云〕桑白皮溫調中下氣益五臟消痰止渴利大小腸開胃下食殺腹藏蟲止霍亂吐瀉續斷桂心麻子為〔使〕

【海桐皮】味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除痹蠱疰劉牙齒蟲痛蟲蠱及含之水浸洗目除屑赤

塩作羹，宋，入水不銷，〔日華云〕，溫，治血脈麻痺疼痛，及目赤血淚，〔海藥云〕，主腰脚不遂，頭痛腿膝疼痛，蓄氣，赤白泻痢，血痢，痞癖，除膚赤。

【竹葉】竹葉、竹葉味苦平，大寒無毒，主欬逆上氣溢，筋急惡寒，小兒煩熱風痙，嘔吐，煎作湯，益氣，止渴，補虛，下氣消痰，汁，主風痙，實，通神明，淡竹葉味辛平，大寒，主胷中煩熱，欬逆上氣，〔藏〕，大寒，療筋中風風痙，胷中大熱，止煩悶，〔皮節〕，微寒，主喘嗽溫氣寒熱，吐血崩中，益筋急，〔苦竹葉〕，及〔藏〕，療口瘡，目痛明目，利九竅，〔竹笋〕，葛本作諸葉，味甘無毒，主消渴，利水道益氣，可久食，〔藥性云〕，淡竹葉，主吐血熱毒風，壓丹石毒，止渴，〔又云〕，胷竹節，〔使〕，止腳痺，嗽血，鼻衄，治五痔，〔日華云〕，淡竹葉，治熱狂煩悶，中風失音不語，壯熱頭痛頭風，并懷孕婦人頭旋倒地，正腸洩，溫瘧，迷悶，小兒驚癇，天弔，墨葉同用。

【檳榔】味辛溫，無毒，主消穀，逐水除痰，殺三蟲伏尸，療寸白，〔藥性云〕，〔有〕，主宣利五臟六腑壅滯，破滿氣，下水腫，治心痛，風血積聚，〔日華云〕，味澀，除一切風，下一切氣，通關節，利九竅，補五勞七傷，健脾胃，除煩破癖結，下五膈氣，〔海藥諸論云〕，赤者味苦殺蟲，無補，〔生〕海南。

【梔子】味苦寒，大寒無毒，主五內邪氣，胃中熱氣，面赤，酒齄，皶鼻，白癩赤癩，瘡瘙，療目熱赤痛，胷心大小腸大熱，心中煩悶，胷中熱氣，〔藥性云〕，去熱毒風，利五淋，主中風，通小便，解五種黃病，明目，治時疾，除熱及消渴口乾，目赤腫病，〔陽〕玉文毒，〔殺〕蠱毒。

【龍腦香】味辛苦，微寒，一云溫平，無毒，主心腹邪氣，風溫，積聚，耳聾，明目，去目赤眥腫，〔一云〕，治急中風，目瞑牙緊及時疾，發豌豆瘡，〔陶宏景〕，主內外障眼，三蟲，治五痔，明目，鎮心，祕精，又有苦龍腦，主風瘡，野鬱，入膏脂瓦，用點眼目，則有傷，〔出〕婆律國。

【吳茱萸】味辛溫，大熱，有小毒，主溫中下氣，止痛，欬逆，寒熱，除濕血痺，逐風邪，開腠理，去痰冷，腹內絞痛，諸冷實不消，中惡心腹痛，逆氣，利五臟，〔藥性云〕，主心腹疾積冷，治霍亂，轉筋，胷中冷氣，下痢不禁，治寸白蟲，〔日華云〕，止瀉痢，消痰破癥瘕，逐風，治腹痛，腎氣，脚氣，水腫，下產後餘血。

【食茱萸】味辛苦，大熱，無毒，功用與吳茱萸同，療水氣，〔藥性云〕，治冷痺，腰脚軟痛，通身刺痛，腸風痔疾，殺腸中三蟲，去虛冷，〔食療云〕，主心腹冷痛，中惡，除咳逆，去腸胃冷，又齒痛，酒煎含之，又殺鬼疰，中風，口偏不語，又助氣衝心，和生薑煮汁飲之，又魚骨刺入肉不出者，搗封之，其骨自爛而出，〔其〕紫石英。

【秦椒】味辛溫，生溫，熟寒，有毒，主風邪氣，溫中除寒痺，髮齒髮，明目，療喉痺，吐逆痛，去老血產後餘疾，腹痛出汗，利五臟，〔藥性云〕，〔君〕，味苦辛，治惡風遍身，四肢痺痺，口齒浮腫，筋脈，主女人月閉不通，治產後惡血痛，多年痼，腹中冷痛，〔惡〕，括蔞，防葵，〔畏〕，雌黃。

【枳殼】味苦酸，微寒，無毒，主風痰痺痛，通利關節，勞氣欬嗽，背膊閉急，散留結胷膈痰滯，逐水消脹滿，大腸風，安胃止風痛，〔藥性云〕，治遍身風癢，肌中如麻豆惡瘡，主腸風痔疾，心腹結氣，兩脇脹虛，關膈壅

塞，〔根〕，浸酒服，治齒痛消痰，有氣，加而用之，〔日華子云〕，健脾開胃，四五臟下氣，止嘔逆消痰，治反胃，霍亂，酒煎，消食，破癥結痰癖，五膈氣，除風明目，及肺氣水腫，利大小腸，皮膚痒，痔瘻，及治滑胎易產。

【枳實】味苦，酸寒，微寒，無毒，主大風在皮膚中，如麻豆苦搔，除寒熱結，止痢長肌肉，利五臟，益氣輕身，除胷膈痰癖，逐停水，破結實，消脹滿，心下急痞，逆氣脇風痛，安胃氣，止酒煎，明目，〔藥性云〕，〔臣〕，解傷寒結胷，主上氣喘欬，腎內傷冷陰痿，疾而有氣，加而用之。

【蘇合香】味辛平，無毒，主五內邪氣，散皮膚骨節中淫淫溫，行毒，去三蟲，化食運寸白，散腸中，壅壅脹，〔藥性云〕，〔使〕，主積冷氣，心腹惡痛，〔日華云〕，治腸風痔瘻，惡瘡疥癬，治冷痢酸澁。

【麒麟竭】紫鬱，麒麟竭，味甘鹹平，有小毒，主五臟邪氣，帶下，止痛，破積血，金瘡生肉，蠱毒與麒麟竭二物，大同小異，〔日華云〕，紫鬱無毒，治驢馬腳痛，可塗補，〔又云〕，麒麟竭，味無毒，得蜜陀僧良，治一切瘡，治疥癬，久不合者，傅此藥，性急亦不可多使，却引膿。

【厚朴】味苦溫，大溫，無毒，主中風傷寒，頭痛寒熱，驚悸氣血痺，死肌，去三蟲，溫中益氣，消痰下氣，療霍亂，及腹痛脹滿，胷中冷逆，胷中噦不止，洩痢淋露，除膨去留熱，心煩滿，厚腸胃，〔藥性云〕，〔臣〕，主療積年冷氣，腹內雷鳴虛吼，宿食不消，除痰飲，去結水，破宿血，消化水穀，止痛，大溫胃氣，嘔吐，酸水，主心腹滿，病人虛而尿白，〔日華子云〕，健脾，主反胃，霍亂轉筋，冷熱氣，寫，膀胱淋，五臟一切氣，婦人產前產後，腹脹不安，調關節，澁腸腹蟲，除膨去煩悶，明耳目，乾漆為之，〔使〕，〔惡〕，澤瀉，寒水石，消石，〔生〕交趾。

【山茱萸】味酸平，微溫，無毒，主心下邪氣，寒熱溫中，逐寒濕痺，去三蟲，腸胃風邪，寒熱，痛痺，頭風風氣，去來，漏目，耳聾，面皰，溫中下氣，出汗強陰，益精安五臟，通九竅，止小便利，〔藥性云〕，〔使〕，味酸辛大熱，治腳骨痛，止月水不定，補腎氣，興陽道，堅長陰莖，澁精，關，療耳鳴，除面上黯，茱萸汗，止老人尿不禁，〔日華子云〕，暖腰膝，助水臟，除一切風，逐一切氣，破癥結，治酒健，蒴實為之，〔使〕，〔惡〕，桔梗，防己，防風。

【紫葳】味酸，微寒，無毒，主婦人產乳餘疾，崩中癥瘕，血閉，寒熱羸羸，養胎，〔藥性云〕，〔臣〕，〔長〕，面皰，味甘，主熱風風痒，大小便不利，腸中結實，止產後奔血不定，淋瀝，安胎，〔日華云〕，根治熱風，身瘙，遊風，風瘙，瘙血，帶下，花葉，功同用，〔又云〕，治酒皶，熱毒風，刺風，婦人血脇遊風，肩中帶下。

【茗苦樣】茗苦樣，〔茗〕，味甘微寒，無毒，主療痢，利小便，去痰熱渴，〔茗樣〕，主下氣，消宿食，作飲，加茱萸，麥，蓋等，良，〔陳藏器云〕，寒，破熱氣，除煩氣，利大小腸，如冷食，即聚痰，得火良，久食令人瘦，去人脂，使不得睡。

【虎杖】微溫，主通利月水，破留血癥結，〔陶隱居云〕，主暴瘀，酒煮根服之，〔藥性云〕，味甘平，無毒，主治大熱煩躁，止渴，利小便，壓一切熱毒，又云，能破女子經候不通，有孕人勿服，破血，〔日華子云〕，治產後惡

血不下，心腹脹滿，拂膈，主痞癖，除毒，蝕人血肉，撲損瘀血，破風毒結氣。

【猪苓】味甘苦平，無毒，主痎瘧，解毒，蠱注不祥，利水道。〔藥性云〕〔臣〕：發熱解傷寒溫疫，大熱發汗，主腫脹滿腹急痛。〔唐本云〕：去邪氣。〔外臺祕要〕：治妊娠坐子淋，又治小兒大便不通。〔子母祕錄〕：治妊娠從腳上至腹脹，小便不通，微渴引飲。〔楊氏產乳〕：療通體遍身腫，小便不利。〔一云〕：採根削皮，焙乾，用傳瘡毒。

【沒藥】味苦平，無毒，主破血止痛，除金瘡杖瘡，諸惡瘡，疼痛，卒下血，目中腎瞳痛，腎亦。〔藥性云〕：單用亦得，味苦辛，能主打撲損，心腹血積，傷折，筋骨痛，金刃所損，痛不可忍，皆以酒投飲之良。〔日華云〕：破血結宿血，消腫毒。

【烏藥】味辛溫，無毒，主中惡心腹痛，惡毒狂忤鬼氣，宿食不消，天行疫癘，膀胱腎間冷氣攻衝背脊，婦人血氣，小兒腹中諸蟲，其葉及根，嫩時採作茶片，炙研煎服，能補中益氣，止小便泄數。〔日華云〕：治一切氣，除一切冷，霍亂，及反胃吐食，瀉痢，瘧瘴，疝痛，并解冷熱，及猫犬病，並可磨服。〔斗門方〕：治陰毒傷寒，烏藥子一分，炒令黑煙起，投於水中，煎取三五沸，服一大盞，候汗出，回陽立效。

【梧桐淚】味鹹苦，大寒，無毒，主大毒熱，心腹煩滿，水和服之取吐，又主牛馬急黃黑汗，水研二三兩灌之，立瘥。〔日華云〕：治風牙齒痛，〔殺〕大毒并蛊毒。〔海藥云〕：主風疳蝕，齒牙疼痛，骨蒸風勞，能砍一切物，多服令人吐，也可以銷金銀。〔一云〕：味辛無毒，止血生肌膚，合金瘡，主產後血氣崩中，卒下血，醋磨服之，亦主眼目，物芒入目，醋點滴子上，又止血痢，及小兒客忤，搗篩和水溫服之。

【秦皮】味苦微寒，大寒，無毒，主風寒濕痺，洗洗寒氣，除熱，目中青腎白翳，療男子少精，婦人帶下，小兒癇，身熱。〔藥性云〕：主明目，去肝中久熱，兩目赤腫疼痛，風淚不止，治小兒身熱。〔日華云〕：洗肝益精，明目，小兒熱驚，皮膚風癢，退熱。〔一云〕：治天蛇毒，大蟲傷之。〔徒〕〔藝〕吳茱萸，苦楝，防葵。〔生〕蘆江川谷及宛句。

【安息香】味辛苦平，無毒，主心腹惡氣鬼注。〔日華子云〕：治邪風鬼魅，鬼胎血邪，辟蠱毒，腎氣，霍亂，風痛，治婦人血噤，并產後血暈。

【鬱金香】味苦溫，無毒，主產野諸毒，惡氣鬼注，蠱毒等氣。〔陳藏器〕：主一切臭，除心腹鬼氣鬼注。

【天竺黃】味甘寒，無毒，主小兒熱風天弔，鎮心明目，去諸風熱，療金瘡，止血，滋養五臟。〔日華子云〕：平，治中風瘋癲，卒失音不語，小兒客忤及癇疾。〔生〕天竺國。

【大腹】微溫，無毒，主冷熱氣攻心腹，大腸壅毒，疾脚氣心。〔日華云〕：下一切氣，止霍亂，通大小腸，健脾開胃，消宿食下氣，又云：根涼無毒，治小兒熱發，作湯浴，風牌牙痛，漱頭含之。

【五倍子】味苦酸平，無毒，療齒，宣疳蟲，腸鳴風毒，流溢皮膚，作風瘙癢，產疾腫水，五痔下血不止，小兒面鼻疳瘡。〔藥性云〕：治腸虛泄痢，熱渴服。〔經驗方〕：治小兒吐不定。

【蜜蒙花】味甘平，微寒，無毒，主青盲，翳赤澀多淚，消目中赤腫，小兒鼠豆，及疳氣攻眼。〔生〕益州。

【棟實】味苦寒，有小毒，主溫疾傷寒，大熱煩狂，殺三蟲疥瘙，利小便水道，根微寒，療軍蟲，利大腸。〔藥性云〕：主人中大熱狂，失心，腹悶。〔日華云〕：根治遊風熱毒，風腫，惡瘡，疥癩，小兒壯熱。〔經驗方〕：治腸毒下血，丈夫水腫氣脹，勝脹，連小腸毒氣。〔唐本注云〕：有兩種，根赤無子，有毒，服之多使人吐瀉殺人，雌者根白有子，微毒，用當取雌者。〔生〕荊山。

木部下品

【巴豆】味辛溫，生溫，熟寒，有大毒，主傷寒溫病，發熱，破癥瘕結聚堅積，留飲痰癖，大腹水腫，腸滿五臟六腑，開通閉塞，利水穀道，去惡肉，除鬼毒蠱，疰邪物，殺蟲魚，療女子月閉，關膈，金瘡瘈血，不利丈夫陰，殺斑猫毒。〔藥性云〕：〔使〕：中其毒，用黃連汁，大豆汁解之。〔長〕蘆笋，皆鼓，冷水。〔得〕火良，殺狂毛蛇蝮毒，能主破心腹積聚結氣，治十種水腫，去痰，能落胎。〔日華云〕：通宜一切病，惟塗湯除風補勞，健脾開胃，消痰破血，排膿消腫毒，殺腹蟲蟲，治惡瘡蟲肉，及疥癩丁腫，芫花為〔使〕〔惡〕，甘草〔長〕，大黃，黃連，藜蘆。

【皂莢】味辛鹹溫，有小毒，主風痺死肌，邪氣，風頭濕痛，利九竅，殺精物，療腹腫滿，消穀除蚘，嗽膠結，婦人胞不落，明目益精。〔藥性云〕：〔使〕：主破堅癥，腹中痛，能墜胎。〔日華子云〕：通關節，除頭風，消痰，殺勞蟲，治骨蒸，頭暈及中風口噤。〔梅師方〕：治霍亂轉筋，又治卒外腎偏疼，棉實為之。〔使〕〔藝〕：麥門冬。〔長〕空實，人參，苦參。〔生〕梓州。

【訶黎勒】味苦溫，無毒，主冷氣，心腹脹滿，下食。〔藥病云〕：下宿物，止腸澼，久泄赤白痢。〔藥性云〕：〔使〕：能通利津液，主破胷膈結氣，止水道，黑髮髮。〔日華云〕：消痰下氣，除煩，治水腫中，止渴痢，霍亂，貫穿腎氣，脾氣壅，益開胃，腸風瀉血，腸中帶下，五膈氣，便孕未足月人，漏血及胎動欲生，腹鳴氣噎，并悉痢人後分急痛，并產後陰痛，和蠟燒熏，及熱煎湯熏通手後洗。

【荜茇】味辛溫大熱，有毒，主邪氣，欬逆，溫中，逐骨節皮膚死肌，寒溫痺痛，下氣，除六腑寒冷，傷寒溫瘧，火風汗不出，心腹留飲宿食，腸澼，下痢，洩精，女子宇乳餘疾，散風邪，凝結，水腫，黃疸，鬼注，蠱毒，殺蟲魚毒，久服之頭不白，輕身增年，開腸理通血脈，堅齒髮，調關節，耐寒暑。〔藥性云〕：〔使〕：有小毒，能治冷風，頭頭風，下淚，鼻塞，脚不遂，虛損，留結，破血，下諸石水，能治嗽，主腹內冷而痛，除齒痛。〔又云〕：椒目〔使〕：治十二種水氣，味苦辛，有小毒，和巴豆，菖蒲，松脂，以蠟鎔為筒子，納耳中，抽之，治腎氣，虛耳中如風水鳴，或如打鐘聲之聲，卒暴聾，一日一易，神驗。〔日華子云〕：破寢結，開胃，治天行時氣，溫疾，產後宿血，治心腹氣壯陽，療陰汗，暖腰膝，縮小便。〔椒目〕：主膀胱急。〔又云〕：椒葉，熱無毒，治奔豚伏梁氣，內外腎釣，并霍亂轉筋，和麥及漆研以醋拌卷之，蜜丸為之。〔使〕〔長〕：款冬，薤黃。

【郁李仁】味酸平，無毒，主大腹水腫，面目四肢浮腫，利小便水道。〔根〕：主齒斷龋，齒堅齒去白蟲。〔藥性云〕：〔臣〕：治腸中結氣，關格不通，根治齒痛，宜結氣，破結聚。〔日華云〕：通利五臟，膀胱急痛，宜膈胷，消宿食下氣，又云：根涼無毒，治小兒熱發，作湯浴，風牌牙痛，漱頭含之。

【雷丸】味苦鹹寒，微寒，有小毒，主殺三蟲，逐毒氣，胃中熱，利丈夫，不利女子，作藥膏，除小兒百病，逐邪氣，惡風汗出，除皮中熱結積蟲毒，白蟲寸白，白出不止，久服令陰痿，亦者殺人。（藥性云）：若，味苦，有小毒，能逐風，荒花為（使），主癲狂走，殺蠱蟲。（今注云）：除利男子元氣，不除利女子，除氣，蠱實厚朴為之（使），（惡）葛根，畏根，（生）石城及漢中。

【蘇方木】味甘鹹平，無毒，主破血，產後血脹悶欲死者，（陳藏器云）：寒，主霍亂嘔逆，及人常嘔吐，用水煎服，破血，用酒煎為良。（日華子云）：治婦人血氣心腹痛，月水不調及勞，排膿止痛，消腫脹，撲損瘀血，女人失音血噤，赤白痢，并後分急痛。（海藥云）：主崩勞血瘀，氣壅滯，虛後羸瘦不安，泛起煩心，腹內攪痛，及經絡不通，男女中風，口噤不語，宜此法，細研乳頭香細末，方寸匕，酒調服，立吐惡物，蘇（生）南海。

【胡椒】味辛大溫，無毒，主下氣溫中，去痰除藏腑中風冷。（日華云）：調五臟，止霍亂，心腹冷痛，吐膿氣，主冷痢，殺一切魚肉鱉毒。（海藥云）：主胃口氣虛冷，宿食不消，霍亂氣逆，心腹卒痛，冷氣上衝，和氣，不宜多服損脾。

【益智子】味辛溫，無毒，主遺精虛漏，小便餘瀝，益氣安神，補不足，利三焦，調諸氣，煮多小便者，取二十四枚碎入鹽，同煎服，有奇驗。（陳藏器云）：止嘔噦。（一云）：含之攝涎液。（生）宜廣國海南。

【木蠶子】味甘溫，無毒，主折傷，消結腫，惡瘡生肌止痛，除殺制野蠶，女人乳癰，肛門腫痛，藤生葉有五花，狀如馨類花，黃子似梧桐，肉上有刺，其核似蠶，八月採。（日華云）：醫瘡消腫毒，嶺南人取嫩實及苗葉作菹，蒸食之。

【鈎藤】微寒，無毒，主小兒寒熱，十二驚癇，（藥性云）：（臣）味甘平，主小兒驚癇，瘈瘲，熱壅，（日華云）：客忤，治風，（蜀洪治小兒方）多用之，治卒得癇，用鈎藤甘草一錢，令分三分，水五合，煮取二合，服如小豆大，日五夜三。

【荒花】味辛苦，微溫，有小毒，主鼠瘻，上氣，喉鳴，咽腫短氣，蠱毒鬼魅，痂瘙，瘮腫，殺蠱魚，消胸中痰水，寒嗜，水腫，五水在五臟，皮膚及腰痛，下寒，蠱肉毒。（根）：療疥瘡，可用毒魚。（藥性云）：（使）能治心腹脹滿，去水氣，和五臟，寒熱，涕唾如膠，主通利血脈，治惡瘡，蠱風痺，一切毒風，四肢拘急，不能行步，能瀉水腫，脹滿。（日華子云）：療咳嗽，草瘡，所在有，決明為之（使），（反）甘草。

【櫻樹】櫻樹子，平，無毒，澀腸，痢，腸風，崩中帶下，及養血，（皮）平，無毒，止鼻洪吐血，破癥，治崩中帶下，腸風，赤白痢，入藥燒灰用，不可經過。（出）蜀南及四川江南亦有之。

【水楊】（葉，嫩枝）味苦，平，無毒，主久痢赤白，搗和汁，絞取汁服，一升，日二，大效。

人部

【亂髮】微溫，主欬嗽五淋，大小便不通，小兒驚癇，止血，鼻衄，燒之吹內，立已。（唐本注云）：灰，療轉胞，小便不通，赤白痢，嘔噦，鼻衄，瘮腫，狐尿刺，尸疰，疔腫，骨蒸，雞瘡，（藥性云）：（使）味苦，能消瘀血，關格不通，利

水道。（千金方）：治無故遺血，爪甲燒灰酒服。

【人乳汁】主補五臟，令人肥白悅澤。（日華子云）：冷，益氣潤毛髮，能治風悴，悅皮膚，點眼止淚出，并療赤眼明潤。

【頭垢】主淋閉不通。（藥性云）：治嗽，酸漿水。（日華子云）：溫，治中蠱毒，及蠱毒，米飲或酒化下，並以吐為度。

【人牙齒】平，除勞治癰，蠱毒氣，入藥燒用。

【人屎】寒，主熱時行大熱狂走，搗踏塗。（日華子云）：銹苦竹去皆皮，搗塗取汁，治天行熱狂疾中毒，并惡瘡毒。

【人溺】療寒熱頭痛溫氣，宜男者尤良。（日華云）：小便涼，止勞渴嗽，潤心肺，療血閉熱狂，撲損瘀血，敗絕及蛇犬等咬，以熱尿淋患處，蠱產胞衣不下。

【溺白垽】療鼻衄，湯火灼瘡。（日華云）：人中白，涼，治傳尸熱勞肺痿，心膈熱，鼻洪吐血，蠱毒湯疾，是尿垽。

【天靈蓋】味鹹平，無毒，主傳尸，尸疰，鬼氣伏連，久瘧勞瘧，寒熱無時，此死人頂骨十字解者，燒令黑，細研白飲和服。（日華云）：治肺痿乏力，羸瘦骨蒸勞，及盜汗等，入藥炙用之。

增廣太平惠民和劑局方用藥總論卷下

獸部上品

【龍骨】味甘平，微寒，無毒，主心腹鬼狂，精物老魅，欬逆洩痢膿血，女子漏下，療腹堅結，小兒熱氣，驚癇，療心腹煩滿，四肢痠枯，汗出夜臥自驚，恚怒，伏氣在心下不得喘息，腸癖內疽，陰蝕，止汗，縮小便，鼻血，養神定魂，安五臟。（日華云）：健脾澀腸胃，止渴痢，渴疾，懷孕漏胎，腸風下血，崩中帶下，鼻洪吐血，止汗。（又云）：澀，涼，治煩悶，頭痛，熱狂，辟鬼魅。（長）乾漆，蜀椒，理石。

【麝香】味辛溫，無毒，主辟惡氣，殺鬼精物，溫，通，無毒，痢，除去三蟲，療諸凶邪鬼氣，中惡，心腹暴痛，腹急搖痛，風毒，婦人產難，墜胎，去面鼾，目中翳膜。（藥性云）：（臣），禁食大蒜，味苦辛，除百邪魅鬼狂，心痛，小兒驚癇，客忤，鎮心安神，以宮門子一粒，丹砂相和，細研，熱水灌下，止小便利，能蝕一切惡瘡瘤。（日華云）：辟氣，殺鬼毒，蠱氣，催生，墜胎，殺蠱，解蠱，制蛇蠱咬，沙虱，溪毒，吐風痰，內子宮，暖水臟，止冷帶疾。（出）中國山谷，蜀雍州陝西。

【牛黃】味苦，平，有小毒，主驚癇，寒熱，熱盛狂癲，除邪，逐鬼，療小兒百病，諸癇，熱口不開，大人狂癲，又呼脣。（藥性云）：（君），味甘，能辟邪，魅，安魂定魄，小兒夜啼，土卒中惡。（日華云）：涼，療中風失音口噤，婦人血噤，驚悸，天行時疾，健忘，虛乏，人參為之（使），得牡丹，菖蒲，利耳目。（惡）龍骨，地黃，能殺，殺蠱，若出（出）

牛膝、乾漆等。

【熊脂】味甘、微寒、微溫、無毒。主風痺不仁、筋急、五藏腹中積聚、寒熱羸瘦、頭髮白秃、面皯、皰、食飲吐噦、〔藥性云〕：膽、〔臣〕、〔惡〕、防己、地黃。主小兒五疳殺蟲、治惡瘡、能潤、〔君〕、治面上皯皰及瘡、〔日華云〕：熊白涂無毒、治風補虛損、殺勞蟲、脂、強心腸、去白秃皮膚、療頭旋瘡瘡耳鼻瘡。

【阿膠】味甘平、微溫、無毒。主心腹內崩勞極、羸瘦如瘧狀、腰腹痛、四肢酸疼、女子下血、安胎、丈夫小腹痛、虛勞羸瘦、陰氣不足、脚酸不能久立、養肝氣、〔藥性云〕：〔君〕、主聖、筋骨益氣、止痢、輕身、〔使〕、〔畏〕、大黃、〔得〕、大瓦、〔聖惠方〕：治妊孕尿血用。

【羊乳】溫、補、寒冷虛乏、〔藥性云〕：〔臣〕、味甘、無毒、潤心肺、治消渴、〔日華云〕：利大腸、含漱口瘡、小兒驚癇疾。

【牛乳】微寒、補虛羸、止渴、〔蜀本云〕：味甘無毒、〔日華子云〕：黃牛乳潤、冷、潤皮膚、益心肺、解熱毒疾。

【馬乳】止渴、〔唐本注云〕：冷、利止渴除熱、〔驢乳〕：冷、除熱黃、小兒中熱驚熱。

【酥】微寒、補五藏、利大腸、主口瘡、〔日華子云〕：牛酥涼、益心肺、止渴、潤毛髮、除肺痿心熱并吐血、〔一云〕、有牛酥羊酥。

【酪】味甘、酸、寒、無毒。主熱毒、止渴、解酒、發利、除胃中虛熱、身面上熱瘡肌瘡、〔日華云〕：牛酪、冷、止渴、頓熱悶、心腦熱痛疾。

獸部中品

【鹿茸】味甘、酸、微溫、無毒。主漏下惡血、寒熱羸瘦、益氣強志、生齒不老、療虛勞、羸瘦羸瘦、四肢酸疼、腰骨痛、小便利、淺精溺血、破留血在腹、散石淋、腰腎、腦中熱痛、〔藥性云〕：〔君〕、主補男子腰腎虛冷、脚膝少力、夜夢鬼交、精溢自出、女人崩中漏血、及帶下、赤白、〔日華云〕：和虛羸、壯筋骨、破瘀血、殺鬼精、安胎下氣、酥炙之。

【羚羊角】味鹹、苦、溫、微寒、無毒。主骨節、明目、殺疥蟲、止寒、洩、辟惡鬼虎狼、止驚悸、療百節中結氣、風頭痛及蠱毒吐血、婦人產後餘痛、燒之、殺鬼魅、辟虎狼、〔藥性云〕：〔使〕、治產後惡血煩悶、〔日華子云〕：殺羊角、退熱、治山嵐溪毒、蒐絲爲之、〔使〕。

【羊肉】味甘、大熱無毒。主緩中、字乳餘疾、及頭腦大風汗出、虛勞寒冷、補中益氣、安心止驚、〔孟詵云〕：溫、主風眩、產病、小兒驚癇、丈夫五勞七傷、羸瘦虛寒、又云、羊肉、患天行病及瘡人、食令發熱困重致死、〔唐本注云〕：羊肉、熱病瘥後食之、發熱殺人、〔日華云〕：治腦風、并大風、開胃肥健、〔頭〕、涼、治骨蒸、〔腦〕、熱、治頭眩明目、小兒驚癇、〔脂〕、治避風并黑點。

【羚羊角】味鹹、苦、寒、微寒、無毒。主明目、益氣、起陰、去惡血注下、辟蠱毒、惡鬼不祥、安心氣、常不魘寐、療傷寒時氣寒熱、熱在肌膚、溫風注毒、伏在骨間、除邪氣驚夢、狂越傳謬、及食噎不通、〔藥性云〕：〔臣〕、味甘、能治一切熱毒風攻注、中惡毒風卒死、昏亂不識人、散產後血暈心煩悶、小兒驚癇、治山嵐、〔孟詵云〕：

治熱毒痢及血痢。

【虎骨】主除邪惡氣、殺鬼狂毒、止驚悸、主惡瘡風痺、頭骨尤良、〔藥性云〕：〔臣〕、殺犬咬毒、味辛、微熱、無毒、治筋骨毒風攣急、屈伸不得、走注疼痛、主尸注腹痛、治溫瘧、療傷寒溫氣、〔骨〕、主狗齒瘡、〔爪〕、辟惡鬼、〔肉〕、主惡心欲嘔、益氣力、〔牙〕、主丈夫陰頭痛、疝瘡、〔屎〕、主惡瘡、〔喉嚨〕、主癲又主癇病。

【犀角】味苦、鹹、酸、寒、微寒、無毒。主百毒蠱注、邪鬼、瘴氣、殺鉤吻、烏羽蛇毒、除邪、不迷惑、驚魅、療傷寒溫毒、頭痛寒熱、膏毒氣、〔藥性云〕：〔君〕、味甘、有小毒、能辟邪精鬼魅中惡毒氣、鎮心神、解大熱、散風毒、能治發背、瘡疽、瘡腫、化膿作水、主療時疾、熱如火煩悶、毒入心中、狂言妄語、〔日華云〕：治心煩、止驚、安五藏、補虛勞、溫熱、消痰、解山瘴溪毒、鎮肝明目、治中風失音、熱毒風時疾、發狂、松脂爲、〔使〕、〔畏〕、雷丸、

【兔頭骨】兔頭骨、平、無毒。主頭眩痛、頭疾、〔日華云〕：頭骨和毛燒爲丸、備生落胎、并產後餘血不下、〔骨〕、主熱中、消渴、并治瘡疥、刺風鬼狂、〔腦〕、主塗瘡瘡、〔脂〕、主目瞤、并補勞、治頭旋、喉痛、〔肉〕、味辛平、無毒、主補中益氣、亦治渴、健脾、生吃、壓丹毒。

獸部下品

【豚卵】味甘平、無毒。主驚癇、癲疾、鬼狂、蠱毒、除寒熱、賣豚五種、邪氣、腫縮、〔懸蹄〕、主五痔、伏熱在腸、腸澼內蝕、〔猪四足〕、主傷、健、補、敗瘡、下乳汁、〔心〕、主驚邪、憂悲、〔骨〕、和理骨氣、通利榜胱、〔腦〕、主傷寒熱、筋骨、虛人不可久食、病人金瘡者尤忌、〔猪屎〕、主寒熱、黃疸、酒、煙、〔日華云〕：猪、療、微毒、〔肉〕、療水銀風、久食令人虛肥、動風氣、不可同牛肉、黃食、令人生寸白蟲、〔脂〕、治皮膚風、殺蟲、傳惡瘡、〔腸〕、止小便、補下焦、〔生血〕、療、奔豚氣、及海外奔氣、〔又乳〕、治小兒驚癇、天弔、大人猪、雞、癇病、〔孟詵云〕：大猪頭、主補虛乏、氣力、去驚癇五痔、并下丹石毒。

【狐陰莖】味甘、有毒。主女子絕產、陰癢、小兒陰頭卵腫、〔五藏及腸〕、味苦、微溫、有毒、主蠱毒寒熱、小兒驚癇、〔日華云〕：暖、無毒、補虛勞、治惡瘡疥、隨腦而補頭尾灰、治牛瘦、以水飲之。

【腦胞臍】味鹹、無毒。主鬼氣尸注、夢與鬼交、鬼魅狐魅、心腹痛、中惡邪氣、宿血結塊、痃癖、羸瘦、〔藥性云〕：〔君〕、大熱、主男子宿癖氣塊、陰、勞氣羸瘦、腎精虛損、多色成腎勞氣羸瘦、〔日華云〕：腦胞、熱、補中益腎氣、暖腰膝、助陽氣、破癥結、療驚狂、癲疾、及心腹疼、破宿血、〔出〕、西或東海。

【敗鼓皮】主中蠱毒。

禽部

【烏雄雞】〔肉〕、微溫、主補中止痛、〔膽〕、微寒、主療目不明、肌瘡、〔心〕、主五邪、〔血〕、主醫折骨痛及瘡痍、〔肪〕、主耳聾、〔腸〕、主遺溺、小便數不禁、〔肝〕、及左翅、主起陰、〔冠血〕、主小便利、遺溺、除熱止煩、〔屎白〕、微寒、主消渴傷寒寒熱、破石淋及轉筋、利小便、止遺溺、減瘡痍、〔黑雌雞〕、主風寒濕痺、五緩六急、安胎、〔血〕、無毒、主中惡腹痛、主腰折骨痛乳難、〔雄羽〕、主下血閉、〔日華子

云）溫，無毒，安心定志，除邪，辟惡氣，主治血邪，破心中宿血，及治瘧症，排膿，補新血，產後虛羸，益色，肺氣（腸）治耳目，耳聾痛（腸）治遺尿，截治中風。

【烏鴉】平，無毒，治瘦病，欬嗽，骨蒸勞疾，臘月者瓦缶泥煨燒為末，飲下，治小兒癇及鬼魅，目睛研汁注目中，通目（聖惠方），治土蜂瘻，以燕頭燒灰，細研傅之（圖經云），古方用翅羽（肘後方），療從高墜下瘀血搶心，面青短氣者，以烏鴉翅羽七枚，得右翅最良，燒末酒服之，當吐血便愈。

【慈鴉】味酸鹹，平，無毒，補勞，治瘦，助氣，止欬嗽，骨蒸羸弱□者，和五味淹炙食良，只此治病，不宜常食。

【斑鳩】味甘平，無毒，主明目，多食其肉，益氣，助陰陽。

蟲魚部上品

【石蜜】味甘平，微溫，無毒，主心腹邪氣，諸驚癇痓，安五臟諸不足，益氣補中，止痛解毒，除眾病，和百藥，養脾氣，除心煩，食飲不下，止腸澼，肌中疼痛，口瘡，明耳目（藥性云）（君）治卒心痛及赤白痢疾（外臺秘要）治陰頭生瘡，以蜜煎甘草塗之，瘥（梅師方）肛門主肺，肺熱即肛塞腫縮生瘡，白蜜一斤，豬膽一枚，相和，微火煎，令可丸，丸長三寸作挺，塗油內下部，臥令後重，須臾通泄。

【蜜蠟】味甘微溫，無毒，主下痢膿血，補中，續絕傷，金瘡，益氣，不飢，耐老。○（白蠟）療人洩澼後重見白膿，補絕傷，利小兒（藥性云）（使）味甘平，無毒，主孕婦人胎動，漏下血不絕，欲死（惡）芫花，齊蛤（生）武都。

【真珠】寒，無毒，主手足皮膚逆臚，鎮心，綿裹塞耳，主聾（藥性云）（君）治眼中瞖障白膜（七寶散），用磨瞖障，亦能墜痰（日華云），安心，明目，駐顏色（外臺秘要），治難產及子死腹中，胞衣不下（肘後方），治卒忤停尸，不能言者，真珠末以雞冠血和丸，小豆大，以三四粒內口中。

【瑇瑁】寒，無毒，主解嶺南百藥毒，俚人刺其血飲以解諸藥毒（日華子云），破癥結，消癰毒，止驚癇等疾。

【桑螵蛸】味鹹甘平，無毒，主傷中，疝瘕，陰痿，益精生子，女子血閉腰痛，通五淋，利小便水道，又療男子虛損，五臟氣微，夢寐失精，遺溺（藥性云）（臣）主男子腎衰漏精，自出，又治虛損，小便數（得）龍骨療洩精（畏）旋覆花，戴椹，名蛼蛝子。

【牡蠣】味鹹平，微寒，無毒，主傷寒寒熱，溫瘧洒洒，驚恚怒氣，除拘緩鼠瘻，女子帶下赤白，除留熱在關節榮衛，虛熱往來不定，煩滿，止汗，心痛氣結，止渴，除老血，澀大小腸，止大小便，療洩精，喉痺，欬嗽，心脅下痞熱，久服強骨節，殺邪鬼，只用為之（使）（得）甘草，牛膝，遠志，蛇床良（惡）麻黃，吳茱萸，辛夷（藥性云）（君）主女子崩中，止盜汗，除風熱，止痛，治溫瘧。

【石決明】味鹹平，無毒，主目障瞖痛，青盲，久服益精（日華云）涼，明目，殼磨障瞖（勝金方）治小便五淋。石決明去粗皮甲，搗研細，如淋中有軟硬物，即添朽木細末，熱水調下二錢匕服。

【鯉魚】（膽）味苦寒，無毒，主目熱赤痛，青盲，明目，久服強悍，益志氣（肉）味甘，主欬逆上氣，黃疸，止渴，生者主水腫，腳氣滿，下氣（骨）主女子帶下赤白（齒）主石淋（藥性云）膽可單用，味大苦，點眼治赤腫

瞖痛，小兒熱閉（日華云），涼，有毒，肉治欬嗽，療腳氣，及胎不安，骨亦爲之使。

【鱓魚】味甘大溫，無毒，主補中，益血，療瀋脣，五月五日取頭骨燒之，止痢（陳藏器云），主濕痺氣，補婦人產後淋瀝，血氣不調，羸瘦，止血，除腹中冷氣腸鳴（孟詵云），補五臟，逐十二風邪（聖惠方），治婦人乳結硬疼。

蟲魚部中品

【蝟皮】味苦平，無毒，主五痔，陰蝕，下血赤白，五色血汁不止，陰腫痛引腰背，又療腹痛疝積（藥性云）（臣）味甘，有小毒，主腸風瀉血，痔病，主鼻衄，甚解一切藥力（日華云），開胃氣，止血汗，肚脹痛，疝氣。（脂）治腸風瀉血（得）酒良（畏）桔梗，麥門冬。

【蜂房】味苦鹹平，有毒，主驚癇瘈瘲，寒熱邪氣，癲疾，鬼精蠱毒，腸痔（藥性云），土蜂房亦可單用，能治癰腫不消，用醋水調塗，乾即易之（日華云），露蜂房微毒，治牙齒疼，痢疾，乳癰，蜂疔，惡瘡，即煎洗，入藥並炙用，亦解蠱毒，又主乳石發，頭痛煩熱，口乾便旋赤少者，取十二分炙，以水二升煮取八合，分再服，當利小便，諸惡毒隨便出，又療熱病後毒氣衝目，又療瘻成瘡作孔者（惡）乾薑，丹參，黃芩，芍藥，牡蠣。

【鱉甲】味鹹平，無毒，主心腹癥瘕堅積，寒熱，去痞息肉，陰蝕痔，惡肉，療溫瘧，血瘕腰痛，小兒脅下堅（肉）味甘，主傷中，益氣，補不足（藥性云），鱉甲（使），能下氣，除骨熱，治婦人漏下五色，羸瘦，頭血塗脫肛。（日華子云）去血氣，破癥結惡血，墮胎，消瘡腫，并撲損瘀血，瘧疾，腸癰，療脫肛（惡）礬石，理石。

【烏賊魚】骨味鹹微溫，無毒，主女子漏下赤白經汁，血閉，陰蝕腫痛，寒熱癥瘕，無子，驚氣入腹，腹痛環臍，陰中寒腫，令人有子，又止瘡多膿（藥性云）（使），有小毒，止婦人漏血，及耳聾（日華云），通月經，骨療血崩，殺蟲，心痛甚者（孟詵云），主目中一切浮瞖（惡）白斂，白芨，附子。

【蜥蜴】味鹹寒，有小毒，主五癃邪結氣，破石淋下血，利小便水道（惡）硫黃，斑貓，蕪荑，一名蝘蜓。

【原蠶蛾】雄者有小毒，主益精氣，強陰道，交接不倦，亦止精（日華云），晚蠶蛾壯陽事，止泄精，尿血，暖水臟，又治暴風，金瘡，凍瘡，湯火瘡（又）蠶布紙平，治吐血，鼻洪，腸風瀉血，崩中帶下，赤白痢，傅丁腫瘡。（又云）蠶沙治風痺，頑疾不仁，腸鳴。

【白殭蠶】味鹹辛平，無毒，主小兒驚癇夜啼，去三蟲，滅黑䵟，令人面色好，男子陰瘍病，女子崩中赤白，產後餘痛（藥性云），有小毒，治口噤發汗（日華云），治中風失音，一切風疾，小兒客忤（□□子）治風及勞瘦（惡）桑螵蛸，桔梗，茯苓，茯神，萆薢。

【蠶退】主血風病，益婦人，治纏喉風。

【樗雞】味苦平，有小毒，主心腹邪氣，陰痿，益精強志，生子，好色，補中輕身，又療腰痛，下氣，強陰多精（生）河內川谷樗樹上，七月採暴乾（唐本注云），此物有二種，以五色具者爲雄，良，青黑質白斑者是雌，不入藥用，今出岐州。

蟲魚部下品

【蝦蟆】味辛寒，有毒，主邪氣，破癥堅，血瘀，腹脹，療陰蝕瘡，厲惡瘡，瀉犬傷瘡，能合玉石（藥性云）。辟百邪，鬼魅，塗瘡腫，治熱結腫（又云）（臣）殺疳蟲，治風瘙，惡瘡（日華云）。冷，無毒，治犬咬及熱狂，貼惡瘡，解煩熱，又名蟾蜍，微毒，破癥結，治疳氣，蠱氣，治瘧寒冷。

【蚌蛤】冷，無毒，明目止渴，除煩解熱毒，補瘦人虛勞下血，并痔瘡，血崩，瘡下，煅丹石藥毒，以黃連末內之取汁，點赤眼并眼暗，蠣粉治反胃，淡飲（又云）（蚌粉）冷，無毒，治疳止痢，并嘔逆，塗腫，醋調服，能制石亭脂（食療云）大寒，主大熱，解酒毒，止渴，去眼赤，助冷熱氣。

【蛇蛻】味鹹甘平，無毒，主小兒百二十種驚癇，癲癇，寒熱，腸痔，蠱毒，蛇瘕，弄舌搖頭，大人五邪，言語錯越，惡瘡，嗜欬，明目（藥性云）（臣）有毒，能主百邪鬼魅，治喉痺（日華云）。治蠱毒，辟惡，止嘔逆，治小兒驚悸，客忤，儘生，擦滿，白癜風，煎汁傅，入藥並炙用（長）磁石及酒。

【白頸蚯蚓】味鹹寒，大寒，無毒，主蛇瘕，去三蟲，伏尸，鬼疰，蠱毒，殺長蟲，仍自化為水，療傷寒伏熱狂躁，大腹黃疸（屎）封狂犬傷毒，出犬毛神效（藥性云）有小毒，主蛇傷毒（日華云）。治中風，并癇疾，去三蟲，治傳尸，天行熱疾，喉痺，小兒陰囊，忽虛熱腫痛，解射罔毒。

【蜈蚣】味辛溫，有毒，主鬼疰，蠱毒，殺鬼物老精，溫瘧，去三蟲，療心腹邪熱結聚，墮胎，去惡血（日華子云）。治瘰癧，邪魅，蛇毒，入藥炙用（胡洽）治尸疰，惡氣，令人治初生兒口噤不開不能乳者。

【斑猫】味辛寒，有毒，主寒熱，鬼疰，蠱毒，鼠瘻，疥癬，惡瘡，疽蝕，死肌，破石癃血積，傷人肌膚，墮胎（藥性云）（使）有大毒，能治瘧，通利水道（日華云）療淋疾，傅惡瘡，爛入藥除翼足，熱炒用，生即吐瀉，入馬刀膏之（使）（長）巴豆，丹參，空青（惡）麻黃。

【貝子】味鹹平，有毒，主目翳，鬼疰，蠱毒，腹痛下血，五癃，利水道，除寒熱，溫疰，解肌，散結熱，燒用瓦（藥性云）（使）破五淋，利小便，治傷寒狂熱（日華云）貝齒涼，治驚悸，并鬼毒蠱氣下血（海藥云）主水氣浮腫，孩子疳蝕，及吐乳，並燒用，亦名貝子。

【白花蛇】味甘鹹溫，有毒，主中風，濕痺不仁，筋脈拘急，口面喎斜，半身不遂，骨節疼痛，大風疥癩，及暴風瘙癢，腳弱不能久立（藥性云）（君）主治脚風，麻痺，身上白癜風，瘙癢斑點，及浮風經脈（生）南地。

【五靈脂】味甘溫，無毒，主療心腹冷氣，小兒五疳，肝疳，治瘧，治產婦血暈，昏迷上衝，悶絕不知人事，又治血崩不止（經效方）治婦人血氣刺痛不可忍者，又治婦人經血不止（出）北地。

【蠍】味甘辛，有毒，療諸風，癮疹及中風半身不遂，口眼喎斜，并遲，手足抽掣，又治中風抽掣手足，小兒驚搐（經驗方）治兒驚風，用蠍一箇，不去頭尾，薄荷四葉，蜜合火上炙，令薄脆焦，同研末作四服，大人風涎，只一服（杜壬方）治腎虛耳聾效。

【鱉甲】微寒，主五邪，鬼疰，惡瘡，燒傅之，（日華子云）。涼，有毒，治小兒驚邪，婦人鬼魅，悲切，及瘧瘧惡瘡疥癬，

蝕，

【甲香】味鹹平，無毒，主心腹諸痛氣急，止痢下血，五癃（海藥云）和氣清神，主腹風痛（陳氏云）主甲疳，療瘡瘻，蠍，蜂螫，殺鼠頭毒（生）南海。

菓部

【豆蔻】味辛溫，無毒，主溫中，心腹痛，嘔吐，去口臭氣（藥性云）草豆蔻可單用，能主一切冷氣（日華云）。豆蔻花無毒，下氣止嘔逆，除霍亂，調中補胃氣，消酒毒（又云）（山豆花）。腹，調中下氣，消食，殺酒毒。

【藕實】味甘平寒，無毒，主補中養神，益氣力，除百病（藥性云）藕汁亦單用，能消瘀血不散，節，搗汁，主吐血（孟詵云）蓮子性寒，主五不足，傷中氣羸，益十二經脈血氣，生食微動氣，蒸食良，其（房）（荷葉）皆破血（荷葉蒂）主安胎，去惡血，留好血，血痢（陳士良云）蓮子心，療血渴，疾，產後血痢（日華云）藕，溫，止崔氣，開胃消食，除煩止悶，口乾渴，疾，產後血悶，搗汁，塗金瘡，并傷折，止暴痛，蒸煮食，大開胃（節）冷，解熱毒，消瘀血，產後血悶，合地黃生研汁，熱酒，并小便服，並得（蓮子）溫，并（石蓮）益氣，止渴，安心止痢，治腰痛，補精（花）。澀，鎮心，悲地黃森（荷葉）止渴，落胞，殺蠱毒，產後心肺燥。

【橘皮】味辛溫，無毒，主胸中氣，熱逆氣，止嘔欬，除膀胱留熱，停水五淋，利小便，主脾不能消穀，氣衝胸中，吐逆，霍亂，止渴，去寸白（藥性云）（臣）味苦辛，能治胸膈，鬲氣，開胃，主氣痢，消痰，涎，治上氣欬嗽（日華云）皮，發，消痰，止嗽，破癥，瘕，痞，塊，膀胱氣，腎氣，炒去穀酒，服食，橘瓤，上筋膜，治渴及吐酒，炒，熊湯飲，甚驗（一方）治霍亂，嘔噦，加枳殼服之效。

【大棗】味甘平，無毒，主心腹邪氣，安中養脾，助十二經，平胃氣，通九竅，補少氣，少津液，身中不足，大腸，四肢重，和百藥，補中益氣，強力，除煩悶，療心下懸，腸，鬱（孟詵云）乾，棗，溫，主補津液，三年陳者，核中仁，主惡氣，卒忤，又療耳聾鼻塞（又云）洗心腹邪氣，和百藥，小兒悲，欬，痢，止嗽，補五臟，治虛勞損，除腸胃，蘇氣，和光，粉，燒，治疳，痢，牙齒有病（葉）治小兒壯熱。

【葡萄】味甘平，無毒，主筋骨濕痺，益氣，續力，強志，令人肥健，耐飢，忍風寒，可作酒，逐水，利小便（藥性云）（君）除腸間水氣，調中，治淋，通小便（一云）治時氣發，熱，渴不出者，服之良。

【雞頭實】味甘平，無毒，主濕痺，腰脊膝痛，補中除暴疾，益精氣，強志，令耳目聰明（孟詵云）生食，動風冷氣（日華云）。開胃助氣，根可作蔬菜食，雞頭作粉食之，妙，是長生之藥。

【梅實】味酸平，無毒，主下氣，除煩熱，頻，安心，止肢體痛，偏枯不仁，死肌，去青黑，誌，惡疾，止下痢，好唾，口乾（藥性云）梅核仁，可單用，能除煩熱（烏梅）去痰，主頭痛，止渴，調中，除冷熱，利，止吐逆（日華云）止渴，多食傷骨，蝕脾胃，根葉，濃煎湯，治休息痢，并霍亂。

【覆盆子】味甘平，無毒，主益氣（藥性云）（臣）微熱，主男子腎精虛竭，女子食之有子，主陰痿，能令堅長（日華云）。安五臟，益顏色，養精，療中風，身熱及驚。

【茱萸】味甘平，無毒，主安中，補五臟，一名藙（孟詵云）。益寶仙家藏作粉，蜜和食之，可休糧，水族之中，此

物最不能治病，又云，令人臟冷，損腎氣，痿弱，可少少食，食多腹脹滿者，可煎酒和蜜飲之，即消。〔解〕丹石毒，今所在有之。

【木瓜】味酸，溫，無毒，主霍亂腳氣，霍亂大吐下，轉筋不止，其枝葉亦可煮用。〔日華子云〕，止吐逆，實腸，及腳氣水腫，冷熱痢，心腹痛，療渴，嘔逆，擬嘔，利，治腳氣。

【枇杷葉】味苦，平，無毒，主卒嘔不止，下氣。〔唐本注〕，用葉須大矣布拭去毛，不用射人肺，令欬不已，又主欬逆不下食。〔甄性云〕，〔使〕，能主胃氣冷，嘔噦不止。〔日華子云〕，〔子〕，平無毒，治肺氣，潤五臟，下氣，止吐逆，并渴。〔葉〕，療產後口乾。

【甘蔗】味甘，平，無毒，主下氣，和中，助脾氣，利大腸。〔日華子云〕，冷，利小腸，下氣，痛腫，消痰，止渴，除心煩熱，作砂糖，潤心肺，潤臟，解酒毒。〔石蜜〕，乳糖也，味甘，寒，無毒，主心腹熱脹，口乾渴，性冷，利膈，砂糖和牛乳煎之。〔砂糖〕，味甘，寒，無毒，功類與石蜜同，多食令人心痛。

【杏仁】味甘，苦，溫，冷，利，有毒，主欬逆上氣，雷鳴，喉痺，下氣，金瘡，寒心，貫脈，腸癖，心下煩熱，風氣去來，時行頭痛。〔甄性云〕，能治腹痺不通，發汗，主溫病，治心下急滿痛，除心腹煩悶，療腳氣，欬逆上氣，喘促。〔得〕大豆。〔惡〕黃芩，黃芪，葛根。〔解〕蜀椒，長，〔使〕，蜜，耳。

【石榴皮】味甘，酸，無毒，主咽喉渴，損人肺，不可多食，酸實澁腸下痢，止漏精。〔東行〕，根，療蚘蟲，寸白。〔甄性云〕，止赤白痢及漏精。〔海上方〕，療金瘡，刀斧傷，破血流，以石灰石榴花為末，傅瘡少時，血斷便痊好。

【李核仁】味苦，平，無毒，主蠱，仆擊，折，瘀血，骨痛。〔根皮〕，大寒，主消渴，止心煩逆，并氣。〔實〕，味苦，除癉熱，調中。〔甄性云〕，〔仁〕，〔臣〕，治女子小腹堅痛，主腰折，骨疼，肉傷，利小腸，下水氣，除膀胱。〔根皮〕，〔使〕，治腳下氣，主熱毒。〔日華云〕，李溫，發氣，又云，〔根〕，涼，無毒，主赤白痢。〔葉〕，平，無毒，治小兒壯熱，諸疾，驚癇。

【橄欖】味酸，甘，溫，無毒，主消酒，療鱠魚毒，人誤食此魚肝迷悶者，可煮汁服之，必解。其木作臼，很著魚骨浮出，故知物有相畏。〔日華子云〕，橄欖開胃，下氣，止渴。〔圖經云〕，生嚼及煮飲服之，並解諸毒。

米穀部

【胡麻】味甘，平，無毒，主傷中虛羸，補五內，益氣力，長肌肉，填髓腦，堅筋骨，療金瘡，止痛，及傷寒溫瘧，大吐後虛熱羸困，明耳目。〔甄性云〕，葉搗汁，沐浴去瓦，又牛傷熱，搗汁灌之立瘥，又療崩中血漏。〔日華云〕補中益氣，發五藏，治勞氣，羸後羸困，耐寒暑，止心煩。〔子〕，利大小便，倍生落胎，逐風溫氣，遊風，頭風生瘡，〔油〕，微寒，利大腸，脫衣不落，生者摩塗，生死蠶，葉名〔青蘭〕，味甘，寒，無毒，主五藏邪氣，風寒溫瘧，瘡氣，補髓堅筋骨。〔食療云〕，調五藏，主火灼，休糧人宜之，填骨髓，補虛氣。

【生大豆】味甘，平，無毒，煮熟服，煮汁飲，殺鬼毒，止痛，逐水腫，除胃中熱痺，傷中，滿悶，下瘀血，散五藏結積，內寒，炒為屑，味甘，主胃中熱，去腫除痺，消穀，止腹脹。〔日華云〕，黑豆，調中下氣，通關脈，制金石藥毒，治牛馬溫毒。〔惡〕五參，鼠屎。〔得〕前胡，烏喙，杏仁，牡蠣，瓦。〔解〕烏頭毒。

【赤小豆】味甘，酸，平，無毒，主下水，排癰腫膿血，寒熱，熱中，消渴，止洩，利小便，吐逆，卒噦，下膿血。〔甄性云〕〔使〕，能消熱毒，瘡腫，散惡血不散，煩滿，治水腫，主小兒急黃，爛瘡，末與雞子白調塗熱毒瘡腫，逐通氣，健脾胃。〔日華云〕，赤豆，初，治煩悶熱毒，排膿，補血脈，解油衣粘唇。〔葉〕，主解酒。

【大豆黃卷】味甘，平，無毒，主溫暖，筋攣膝痛，五藏胃氣結積，益氣，止毒。〔食療云〕，破癥，人黑豆，瓦。

【粟米】味鹹，微寒，無毒，主養腎氣，去胃脾中熱，益氣除者，味苦，主胃熱，消渴，利小便。

【粳米】味甘，苦，平，無毒，主益氣，止煩，止洩，按〔蜀本云〕，斷下痢，和胃氣，長肌肉，溫中，〔日華云〕，補中，壯筋骨，補脾胃。

【黃粱米】味甘，平，無毒，主益氣，和中，止洩，又治小兒面上瘡，及霍亂吐下。〔日華云〕，去客風，治頭痒。

【小麥】味甘，鹹，寒，無毒，主除熱，止煩渴，咽乾，利小便，發肝氣，止漏血，唾血，以作麵，溫，清，殺，止痢，作麵，溫，不能消熱止煩。〔日華云〕，麵，養氣，補不足，助五藏。〔藥性云〕，溫，中，下氣，消食除煩，缺，涼，治時疾熱毒，湯火瘡，燙損，傷折，瘀血，醋炒貼腫。〔藥性云〕，涼，除煩悶，佛時疾狂熱，消酒毒，溫胸膈，熱，患黃酒，絞汁服，并利小腸。

【大麥】味鹹，溫，微寒，無毒，主消渴，除熱，益氣調中。〔甄性云〕，〔使〕，味甘，無毒，能消化宿食，破冷氣，去心腹脹。〔日華子云〕，涼，溫，中下氣，開胃，止霍亂，除煩消渴，破癥結，能益生落胎。

【麴】味甘，大暖，療腳中風氣，調中下氣，開胃，消宿食，主霍亂，心腹氣，撲逆，除煩，破癥結，及補虛，去冷氣，除腸胃中塞不下食，又落胎，并下鬼胎。〔千金方〕，治產後羸絕，〔附後方〕，治妊娠卒胎動不安，或腰痛，胎轉，損心，下血不止，又治赤白痢下，水穀食不消。〔傷寒類要〕，治傷寒飲食勞復。〔神麯〕，〔使〕，無毒，能化水穀宿食，除氣，健脾胃。

【豉】味苦，寒，無毒，主傷寒頭痛，寒熱，瘴氣，惡毒，煩躁，滿悶，虛勞，嘔吐，兩脚痠冷。〔甄性云〕，豆豉得醋瓦，殺六畜毒，味苦甘，主下血痢如刺者，又傷寒暴病頭痛，和薤白膏服，蒸末能止盜汗，除煩躁，治時氣熱病發汗，又治陰上瘡痛。〔日華云〕，治中毒藥，蠱氣，鬼疰，骨蒸，并治犬咬。

【菉豆】味甘，寒，無毒，主丹毒，煩熱，風腫，頭石發動，熱氣，浮腫。〔日華子云〕，冷，除熱毒風，厚腸胃，作枕明目，治頭風，頭痛。〔孟詵云〕，補益，和五藏，安精神，行十二經脈，此穀勝豆，今人食皆去皮，若連病須和皮，又研汁治消渴，去浮風，益氣力。

【白豆】平，無毒，補五藏，益中，助十二經脈，調中壅腸。〔孫眞人云〕，宜皆殺鬼氣。

【醋】味酸，溫，無毒，主消恶腫，散水氣，殺邪毒。〔日華云〕，治產後鬼入，并傷損及金瘡血暈下氣，除煩破胸

續，婦人心痛，助陽補力，殺一切魚肉菜毒，米醋功用同，俗呼爲苦酒，亦醋之類。

菜部

【冬葵子】味甘寒無毒，主五臟六腑寒熱，羸瘦，五癃，利小便，滑胎，人乳難內閉，久服堅骨，益肌肉，（別錄云）。（臣）。治平。（藥）治五淋，主妬乳，能下乳汁（根）。治惡瘡，小兒吞鍼不出（葉）。治金瘡，滑小腸，治時行黃病（日華云）。久服堅筋骨，黃芩爲之使。

【瓜蔕】味苦寒，有毒，主大水身面四肢浮腫，下水穀蠱毒，欬逆上氣（日華云）。無毒，治腫滿，熱結，眼昏，吐痰，即甜瓜蔕也（別錄性云）。（使）。主鼻中息肉，聞鼻，和小豆、丁香吹鼻，治黃疸（花）。主心痛欬逆（肉）。主煩渴，除熱，多食則動痼疾（子）。主腹內結聚，破漬膿血，最爲腸胃脾內藥要藥。

【胡荽】味辛溫，微毒，消穀，治五臟，補不足，利大小腸，通小腸氣，止頭痛，凍瘃，瘻瘡，疏豆瘡不出，主蠱毒五痔（食療云）。平。利五臟，補筋脈，又主消穀。

【蜀葵花】冷，無毒，治小兒風癇（子）。冷，無毒，治淋瀝，通小腸，催生落胎，療水腫，治一切諸瘡疥癬，去邪氣，又治婦人白帶下，臍腹冷痛，面色萎黃，又治瘧毒。

【甜瓜】寒，有毒，止渴除煩熱，利小便，通三焦閉塞氣，兼主口鼻瘡。

【蘿蔔】根味辛，甘溫，無毒，大下氣，消穀，去痰癖，止消渴（蘇頌云）。煮食，利關節，理顏色，除五臟熱氣，亦主肺嗽吐血，亦不發熱。

【葱實】味辛溫，無毒，主明目，補中不足，其莖葉白，平，可作湯，主傷寒寒熱出汗，中風面目腫，傷寒骨肉痛，喉痺不通，安膽除肝中邪氣，安中利五臟，益目精，減百病，發（蘇頌）。主傷寒頭痛（蘇汁）。平溫，主補血，（別）。發痼疾（日華子云）。葱治天行時疾，頭痛熱狂，通大小腸，蓋亂轉筋，及奔豚腹氣，心腹痛，目眩，及止心迷悶，取其莖葉，用鹽霜研蛇蟲傷，并金瘡水入腦，煨研，調傅，中射工溪毒，鹽研，調傅（子）。溫中補不足，發精明目（根）。殺一切魚肉毒，不可以蜜同食。

【蒜】味辛溫，有小毒，歸脾腎，主霍亂，腹中不安，消穀理胃，溫中除邪，辟毒氣（日華云）。熱，有毒，下氣，止霍亂亂吐，溫，消穀食，治蠱毒，傳尸，鳥沙風瘡（一云）。主脚氣，治瘧疾，煮與婦人飲之易產。

【韭】味辛，微酸溫，無毒，安五臟，除胃中熱利（子）。主夢遺，補虛，和腸胃，暖腰膝，除心腹痛冷，胃中痺冷，痰氣，及腹痛（子）。腰膝疼，治鬼交甚效，入藥炒用。

【薤】味辛苦溫，無毒，主金瘡，除寒熱，去水氣，溫中散結（日華子云）。調中補不足，止久痢冷瀉，治目疼痛。

【薄荷】味辛苦溫，無毒，主賊風傷寒，發汗，惡氣，心腹脹滿，宿食不消，下氣，飲汁發汗，大解勞乏（別錄性云）。（使）。能去惡氣，發毒汗，破血止痛，通關節，新病差人勿食，令人虛汗不止（日華子云）。治中風失音，吐痰，除賊風，療心腹脹，下氣，消宿食，及頭風等。

【雞蘇】味辛，微溫，無毒，主下氣，殺穀，除飲食，腳惡氣，主吐血，崩血血痢（日華云）。嗽，治肺痿，扇中卷下，血痢，頭風，目眩，產後中風，及血不止（一名）水蘇。

【蘇紫】味辛溫，主下氣，除寒中，其子尤良（別錄云）。紫蘇子無毒，主上氣欬逆，治冷氣及腰脚中溫風結氣及脚溫風（日華云）。補中益氣，治心腹脹滿，止霍亂轉筋，開胃下食，并一切冷氣，止脚氣，通大小腸（子）。主調中益五臟，下氣，止霍亂嘔吐，反胃，補虛勞，利大小便，破癥結，消五膈，止嗽，潤心肺，消痰氣，健人。

【香薷】味辛，微溫，主霍亂，腹痛吐下，散水腫（孟詵云）。去熱風，卒轉筋，及乾末止鼻衄，以水服之（日華云）。無毒，下氣，除煩熱，療嘔逆冷氣（一云）。苗葉花實俱赤，主調中溫胃，霍亂吐瀉（肘後方）。治舌上忽出血，如簪孔者，香薷汁服之，愈。

【荊芥】味辛溫，無毒，主寒熱風瘧，瘰癧生瘡，破結聚，下瘀血，除漏蹲，（陳士良云）。主血勞，風氣，壅滯背脊痛，虛汗，理丈夫陰氣，筋骨煩疼，及陰陽毒，傷寒頭痛，頭旋眼眩，手足筋急（藏）。治產後血暈（一名）假蘇（日華云）。利五臟，消食下氣，磨酒，煎茶，治頭風出汗，跌汁煎，治暴傷寒病。

全生指迷方

王貺　撰

原序

余昔任左史，遇疾瀕死，考城王貺子亨爲察衆工之用藥，而余以生，因以其所著全生方一編遺予，藏之未暇讀也。繼掌外制，一日得異疾，謀諸醫未決，子亨笑曰：毋恐，此吾書所有也。視某章，病當某藥，如方信宿而疾良已。於是始奇之，歸居淮南，去王城遠，偶有病，秪訊於書，謫三巴，遷百粵，去醫益遠，又槖本以歸余。余以爲之裹其端曰：此書直而邃，曲而通，部居標列，而脈絡潛流，形色照彰，而對治要妙，知方者讀之智思橫生，不知者猶可按圖而愈疾，眞衛生之奇寶，濟物之良術也。至理不如，至語不費，余非知道者，而於此乎取之，子亨當官不爲，遇世變，嘗慨然再請出疆出里，其論著此書，用心救世利物，不特此矣。吳敏序

自序

總彌大者常存乎好生之心，志彌廣者每切於立言爲教。在上世則有伊尹，逮後漢乃見張機，祖述神農之經，發明黃帝之道，雖然術至通神之妙，在乎知慮以爲先，藥至起生之功，必因精能而後效，天無棄物，非人莫知所能，人有常心，非道莫知所適，疑神自悟，觸理皆分，故能贊益天機，悉體陰陽之變，深窮造化，博極生死之源，候色驗形，自契一時之理，剖腸刳腦，難傳後代之精，至於湯液除痾，砭石起死，必當研窮性味，斟酌淺深，治理在於君臣，協攻資乎佐使，方書之行，其來尚矣，有人猶不能刻意研求，專心致志，攖邪抱病，則束手無能，制療處方，則委身紕繆，余竊悲之，於是採古人之緒餘，分病證之門類，別其疑似，定其指歸，陰陽既明，虛實可致，若能按圖求治，足以解惑指迷，雖未起死回生，庶幾扶危拯困，故號曰全生指迷，以崇大倫之道焉。考城王貺子亨序

全生指迷方提要

全生指迷方四卷。宋王貺撰。案書錄解題。貺字子亨。考城人。名醫宋毅叔之婿。宣和中。以醫得幸。官至朝請大夫。是書宋史藝文志作三卷。而傳本久絕。故醫家罕所徵引。或至不知其名。今檢永樂大典所收。按條掇拾。雖未必盡符原本。然大要已略具矣。方書所載。大都皆標某湯某丸。主治某病。詳其藥品銖兩而止。獨貺此書。于每證之前。非惟具其病狀。且一一論其病源。使讀者有所據依。易於運用。其脈論及辨脈法諸條。皆明白曉暢。凡三部九候之形。病證變化之象。及脈與病相應不相應之故。無不辨其疑似。剖析微茫。亦可爲診家之樞要。謹詳加訂正。分爲二十一門。依類編次。而以論脈諸篇冠之于首。因篇頁稍繁。釐爲四卷。不復如其原數焉。

全生指迷方卷一

宋 王貺撰

脈論

論曰。人以天地之氣生。四時之法成。是以有五藏六府。四肢十二經。三百六十五穴。以象五運六氣。四時十二月。周天之度。陰陽變化。與天地同流。乖其氣。逆其理。則陰陽交錯。府藏偏毗。脈行遲速。榮衛失度。百病從生。非脈無以探賾索隱。所謂脈者。乃天真之元氣。有生之精神。精神去。脈理乃絕。故上古聖人體性鑒形。剖別藏府。詳辨經絡。會通內外。各著其情。氣穴所發。各有腧名。善診脈者。靜意視義。觀其變於冥冥之中。以神合神。悠然獨悟。口弗能言。先別陰陽。審淸濁。而知分部。視喘急。聽音聲。而知病所生。所謂陰陽者。至者爲陽。謂隨呼而出也。去者爲陰。謂隨吸而入也。動者爲陽。鼓擊躁急也。靜者爲陰。來去沉沉默默也。數者爲陽。謂一呼一吸六至也。遲者爲陰。謂往來不滿三至也。於三部九候之內。察其脈形。有獨異者。謂獨大。獨小。獨疾。獨遲。獨不應四時者。乃受病之所也。

辨五藏六府部位脈法

左手寸口脈。浮取之屬小腸爲府。沉取之屬心爲藏。其經則手太陽少陰。左手關上脈。浮取之屬膽爲府。沉取之屬肝爲藏。其經則足少陽厥陰。左手尺中脈。浮取之屬膀胱爲府。沉取之屬腎爲藏。其經則足太

陽少陰。右手寸口脈。浮取之屬大腸爲府。沉取之屬脇爲藏。其經則手太陰陽明。右手關上脈。浮取之屬胃爲府。沉取之屬脾爲藏。其經則足太陰陽明。右手尺中脈。浮取之屬三焦爲府。沉取之屬心胞絡。又屬右腎。其經則手少陽厥陰。

辨人迎三部趺陽九候五藏六府脈法

論曰。診脈之法。其要有三。一曰人迎。在結喉兩傍。取之應指而動。此部法天也。二曰三部。謂寸關尺也。于腕上側。有骨稍高曰高骨。先以中指按骨。謂之關。前指爲寸部。後指爲尺部。尺寸以分陰陽。陽降陰升。通度由關以出入。故謂之關。此部決人三曰趺陽。在足面繫鞋之所。按之應指而動者是也。此部法地。三者皆氣之出入要會。所以能決吉凶死生。凡三處大小迎速相應齊等。則爲無病之人。故曰人迎趺陽三部。不參動數。發息不滿五十。未知生死。以三者爲決死生之要也。故人迎一盛。病在太陽。謂陽極也。四盛以上爲隔陽。謂無陰以收也。寸口一盛。病在少陰。二盛。病在太陰。三盛。病在厥陰。厥有盡也。四盛以上爲關陰。謂無陽以繫也。隔陽者。氣上而不能下。則吐逆。關陰則閉塞。大小便不通。皆死不治。九候者。謂三部之位。一位有三候。浮取之屬陽。沉取之屬陰。中得之爲胃氣。故無胃氣則死。五藏之脈。輕手于皮膚得之者肺也。至肌得之者心也。至肉得之者脾也。至筋得之者肝也。至骨得之者腎也。五者輕重皆應。是謂五藏之氣全也。又有推而外之在經絡。推而內之在血脈。凡診平人之脈。當以平旦陰氣未動。陽氣未散。飲食未進。脈絡調和。可以見有餘不足之脈。一呼行三寸。一吸行三寸。呼吸行六寸。而脈四至。呼吸之間又一至。此盛脈。得天全者也。若過十息。脈應五十動。又須與氣相應。往來緩急得中。潤澤如慢水流行源源者。此蓄脈無疾也。若不滿五十動一止。此一藏之氣絕。四藏死。三十動一止。三藏死。二十動以下一止。期以歲月死。若與形氣不相應。往來短促。枯燥無首尾。此不壽之脈。而多病。凡診病脈則不拘晝夜。審脈。所以察其由。則寒熱虛實見矣。凡脈病人不病者死。人病脈不病者生。

診諸病證脈法

論曰。脈變於內。病形於外。相參以察其理。氣熱脈滿。是謂重實。脈實以堅。謂之益甚。上下相失。不可數者死。謂至數也。脈口熱而尺反緩。皮膚外證也。滑則從。濇則逆。寸口膚熱。而尺膚寒。是絕氣有餘。絡氣不足也。尺膚熱。脈滿。寸口膚寒。脈濇。是經氣不足。絡氣有餘也。脈寸虛尺虛。是謂重虛。重虛者死。寸虛者病情無常。神不守也。尺虛者行走恍然。脈滑則生。濇則死。脈急大堅。尺濇而不應。謂之形濇。手足溫則生。寒則死。乳子中風熱喘鳴肩息。脈緩則生。急則死。下痢白沫。脈沉則生。浮則死。下痢膿血。脈懸絕則死。滑則生。浮濇之脈。身有熱者死。癲疾之脈。博大而滑。久久自已。脈小堅急。死不治。病人口甘而渴。此數食甘美而多肥。五氣之溢也。謂之脾癉。病人口苦。此因數謀慮不決。膽虛氣上溢。是謂膽癉。凡消瘅之脈。實大。病久可治。病人身熱如炭。頸膺如格。人迎躁盛。喘息氣逆。太陰脈微細如髮者死不治。謂氣口與人迎不相應也。心脈滿大。痫瘛筋攣。肝脈小急。痫瘛筋攣。肝脈鶩緊。有所筮驗。無故而指。脈不至。不治自已。謂氣緊脈也。氣復則已。腎脈小急。肝脈小急。皆爲瘧。肝脈併沉爲石水。併浮爲風水。併虛爲死。併小弦爲驚。腎脈大

急沉。肝脈大急沉。皆爲疝。肺沉搏爲肺疝。太陽急爲癇。膀胱氣也。太陰急爲脾疝。少陰急爲癃。厥。心病也。少陽急爲驚。脾病也。脾脈沉鼓爲腸癖。由飽食而筋脈橫解。腸癖爲痔。胃脈沉鼓濇。胃外鼓大。心脈小急。皆爲偏枯。年不滿二十者三歲死。脈至而搏。血朔身熱者死。心肝脈小沉濇爲腸癖。心脈至如喘。名曰纍。脈不知。與人言脈至如數。使人暴驚三四日自已。肺脈有餘。病皮痺閉不通。而生瘰疬。不足。病肺痺寒濕。脾脈有餘。病肉痺寒中。陰陽寒也。不足。病脾痺。肝脈有餘。病筋痺。脇滿不利。不足。病肝痺。腎脈有餘。病骨痺。身重。不足。病腎痺。凡陰病見陽脈者生。謂病人四肢厥。惡寒多汗。脈得洪大數實也。陽病見陰脈者死。謂病人身熱狂躁譫言。欲飲水。脈得沉細微遲也。

辨脈形及變化所主病證法

浮脈之狀。在皮膚。輕手得之。重按則似有若無。王於秋。主脈。主風。主虛。乏短氣。秋得之爲順。春得之爲賊邪。冬得之爲虛邪。夏得之爲實邪。又爲微邪。其病不治自愈。純浮爲威風。浮弦爲虛勞。浮緊爲風寒。浮芤爲朝血。浮滑爲風痰。浮洪爲風氣壅滯。浮微爲氣不足。浮緩爲風虛。四肢不隨。浮濇爲傷肺。咯血嗽血。浮遲爲傷憊。浮弱爲虛損。浮濇爲氣血俱不足。又若見於何部位。以屬府經絡推之。餘倣此消息。

沉脈之狀。取於肌肉之下。得之主藏病。沉滯伏匿。在寸爲心肺鬱伏。悲憂不樂。在關爲肝脾不利。中滿善嗜。臟脹。濕勝則脇滿。溏泄。食不化。支膈胠脇滿。蓄恐。在尺則爲石水。腹脹硬。以指彈之。殼殼然有聲。小便澀。沉緊爲腸間積寒。沉澀結爲五氣積聚成形。沉數或疾爲骨蒸。沉滑爲腎消。骨枯。善渴。小便數。純沉爲蓄重。足躁不利。不得履地。得之於陰濕之氣。沉而微。天藏氣衰。骨痿不能起。

遲脈之狀。往來極遲。一息三至。爲陰盛陽虛之候。若手足厥不回者死。五藏氣短。不能朝於氣口。肺腎俱衰也。太素脈訣作腎俱絕。陳無擇三因方云。遲者應動極緩。與人迎相應。則濕寒凝滯。與氣口相應。則虛冷沉積。爲寒爲痛。遲而濇。爲瘧瘕咽酸。

數脈之狀。往來急數。一息六至。爲陽盛陰微之候。寸脈見之。爲熱爲躁爲煩。左關。爲目赤頭疼煩滿。右關。爲口臭胃煩嘔逆。尺中見。爲小便黃赤。大便閉澀。與人迎相應。爲熱。與氣口相應。或爲瘧。

洪脈之狀。大而隱指。若大而散漫。是謂氣衰。大而浮。風客於衛。欲出青黃膿如彈丸。大若不出。則傷肺。下利得脈大。利益甚。霍亂得之。則吉。又其脈主夏。屬心。

虛脈之狀。浮大無力。遲而且柔。又如蜘蛛絲。此陽氣衰。少陰獨居。爲多汗亡陽。形氣羸索。其人不壽。

散脈之狀。浮而無力。至數不齊。渙漫不收。更甚于虛。或來多去少。按之如無。此氣血俱虛。根本脫離之候。左寸軟散。爲陽虛不斂。右寸見之。爲氣耗汗出。肝脈軟散色澤者。當病益飲。脾脈得之。色不澤。當病足腫。尺脈見散。爲精氣衰耗。又產婦得之。生。孕婦得之。死。

芤脈之狀。如浮而大。於指面之下。其形中斷。又如流水不相續。或如漚漆之形。斷而倒收。又似弦而軟。太素脈訣云。芤脈之狀。中空弦邊。主吐血嘔血朝血。男子失精。婦人胞漏半產血崩。又曰其狀弦大。弦則爲減。大則爲芤。弦芤相搏。此名爲革。金利木而傷肝也。芤而滑。嘔吐甚則亡血。芤而數。陽陷陰中。血妄行。芤而急。風冷入血。

下血如豚肝。臍腹痛。死不治。芤而弦。因失血致勞傷。芤而微。或散久成血枯。

濇脈之狀。極軟弱。如以指按水中綿。如有如無。太素脈訣云。諸部脈芤。按之極小。為陰陽俱不足。溫冷霧露之氣所傷。為病頗重。如以濕熱之物蒸首。大筋軟短。小筋弛長。為痿弱。骨不能立。又為亡津液。精神不收。十便良方云。精神乾竭。或僵枯。血脈痺。得之風冷濕氣也。餘仙前。又為脛痿。枯細。手足常厥冷。肉理不密。

微脈之狀。極微。或似有似無。為氣血不足。為虛勞亡血亡汗小便數。或白濁。若微數為陰虛客陽。內熱。殺氣少也。若在尺部。腎脂枯。髓不滿。骨。若在左關。則肝氣血不足。目視䀮䀮。筋緩弱。若在右關。則虛滑泄注。穀不化。腸鳴。及漿粥不入胃。若在右寸。則為肺損骨蒸。口中如含粉霧。欬嗽肌疎。不可以風。短氣。若在左尺。為心虛恍惚。憂思不樂。多恐。如人將捕之。若六部俱微。則陽不及四肢。足脛冷。手足厥。常欲湯火煖之。陳無擇三因方云。微者極細而軟。似有若無。與人迎相應。則風著。自汗。與氣口相應。則微陽脫泄。入裏病。

脈微為虛。為弱。為脚。為嘔。為泄。為亡汗。為拘急。微弱。為少氣。為中寒。

革脈之狀。渾渾革至如湧泉。謂出而不返也。為陰氣陷陽。又為溢脈。蓋自尺而出。上於魚際。亦謂之離經。無根本也。又覆脈之狀。自寸口下退。過而入尺。皆必死之脈也。

伏脈之狀。重於沉。指下尋之方得。蓋時見時隱也。太素脈訣云。伏脈之狀。其形沉伏。隱隱其位。此陰陽之氣相伏也。或陰中伏陽。陽中伏陰。脈疾為伏陽內熱。身雖寒而不欲蓋衣。脈遲小。有來無去。此伏陰在內。陽氣不得入也。其人身雖熱。而但欲覆被向火。脈實者有伏氣在內。濇者有動氣。在左則左病。在右則右病。在尺則居臍上下。居臍上為逆。居臍下為從。

牢脈之狀。如弦而實。尋之則散。太素脈訣云。指下尋之不散。為五勞六極七傷之病。若加數疾則發熱。加短遲則發寒。疾遲不常。則寒熱支體迫急。憂思不樂。

實脈之狀。舉按有力。重按隱指。愊愊然氣不利。亦主伏陽在內。蒸熱勞倦。胃氣壅塞。為內癰。實數為三焦閉熱。大便秘。實滑為癖飲。蘊瘀留聚之病。實大為氣盛閉塞。太素脈訣云。實大作實洪。實沉為癥。府氣不通。帶短。太素脈訣云。實而短。為宿穀不化。

弱脈之狀。小而無力。為精不足。短氣。表裏俱衰。為暴下。陰併於陽。汗出不止者死。又為脚弱筋緩。足不能履地。惡寒不可出風。

細脈之狀。細細似線。太素脈訣云。其形細微。陰氣勝陽也。又為手足寒。氣少。慘慘不舒暢。又血不榮於四肢。溺寒則澀而不流行也。太素脈訣云。又主冷痛痢。

緩脈之狀。不遲不疾。一息四至。往來得中。實得上氣。太素脈訣云。緩脈之狀。如柳絮也。緩弱為病。四肢不收。受濕而痺。緩而沉。脾氣滯。志意不舒。屈氣。多瞪。緩而濇。肌肉不仁。津液不流行。榮衛失度。因以致風。緩而微。為消氣。緩而滑。為熱中。多食。緩而短。穀不化。為溏泄。緩而浮。為風。羅曳。陳無擇三因方云。緩者浮大而軟。去來微遲。與人迎相應。則風熱入藏。與氣口相應。則怒極傷筋。緩而在下。為風。為寒。為弱。為痺。為疼。為不仁。為氣不足。為眩暈。緩而滑。為熱中。緩而遲。虛寒相搏。食冷則咽痛。

濇脈之狀。往來極濇。如水不能流。或聚於指下。或綿綿如瀉漆。斷而倒收。又似止非止。太素脈訣云。濇脈之狀。如刀刮竹。到指下不能進。

主男子亡血失精。婦人胎姙不成。月候凝澀。或崩傷不止。五帶敗血在腹。或血瘕成形。筋急寒痺。浮濇為肺病。咯血欬嗽。虛勞。濇中時弦為金木相剋。脇下痛。不得臥者死。在左寸。為心痺寒懷病。積漏血。在左尺。為病小腹積氣。在右關。則病心腹時滿。在左關。則病筋急積寒。

結脈之狀。大小不定。往來不拘。數至時一止。主氣不流行。腹中癥瘕氣塊成形。或因大病後亡津液。亡血。或驚恐神散而精不收。或夢漏亡精。又多盜而心氣耗也。若無是因。則其人壽不過一二年。

代脈之狀。其來如斷絕而相待。其息以至時搏而動。主血氣虧損。或驚憂積結。形氣不相得也。

滑脈之狀。指下如水之流。或如轉珠而滑凝。太素脈訣云。不緩不洪。如珠之形。主嘔吐。主飲。滑而弦細者為支飲。欬逆。倚息面浮腫。滑而緊。停寒積飲。吞酸。腸間漉漉有聲。滑而弦。留飲在胃。頭痛而眩。滑而數。為中喝。若則為痓。手足瘈瘲搐搦也。滑而緩。熱中消穀引食。滑而細。沉。為消渴。帶微。為消中。不渴。小便數。滑實。為氣盛。上熱。滑大而數。為心氣熱。越多汗。滑而微小。為多盜汗。在尺滑。為狐風疝。在右手寸口。為肺風疝。在右關。則為脾風疝。在左關。則為肝風疝。

緊脈之狀。如按繩。緊緊指三部。通度。與弦相似而有力。舉按皆有餘。主中寒。腹痛切急。在寸口。則中寒口噤。頭痛。惡寒。欲得覆被火炙。在關上。則胃冷吞酸。中脘臍腹痛。下利。筋寒。或轉筋霍亂。欬嘔膽汁。緊數為冷熱痢。下膿血。或身熱。飲食如故。有病處。則結癰疽。在尺為寒疝痛。

促脈之狀。自尺上寸口促急。有來無去。太素脈訣。作有來時止復來。此榮衛無度數。陰氣促陽也。又腎氣離經。升而不降。又為無陰而陽無以繫也。若時氣促數。上出寸口。此陽併於血。病赤斑。十死一生。若脈見斷絕。為黑斑。獨陽攻藏。氣絕死不治。

動脈之狀。鼓動而暴。於指下不常。氣血相乘。搏擊而動也。或鼓於陽。則一陽為鈎。如叉脈之盛。或鼓於陰。一陰為毛。如秋氣之急切動。烈。鼓陽勝而急曰弦。陰緩而陽急也。鼓陽至而絕曰石。陽脾而陰孤也。陰陽相過曰溜。氣相鼓作而動也。

弦脈之狀。如張弓弩。弦。應指有力。寸按則軟弱。太素脈訣云。狀如琴弦。主莽氣。主肝藏。主虛。主痰。主勞。弦而微。氣不足。筋緩不榮。弦急似數。非數。綿綿之狀。勞傷氣促急。四肢煩厥。無首尾。而促疾。虛勞不足。弦弱而疾。夜多盜汗。弦短而大。榮衛勞傷。內急外緩。兼數。則熱。目視䀮䀮。血不足也。兼遲。則寒。筋脈急。緊弦。濇。因失血。女子則月閉。血瘕。弦緊。為虛寒。裏急。寒疝。少腹痛。而背。下利。弦遲而濇。出入無首尾。為寒閉。血少。筋乾。急。太素脈訣。作弦而急。或偏枯。血脈痺。得之風冷濕也。一便良方云。沉而微。五藏氣衰。作痺不能起。

短脈之狀。往來極短。不待息盡而回。或無首尾。但見於指面。亦不待氣來而至。其人短氣息。或不能長息。

又為大下。脫氣。又主久病。

長脈之狀。往來指下。息隨而盡。其有餘。如操帶物之長。太素脈訣云。長脈之狀。往來主長。亭風氣強勝血。而氣擁。其人壽。若加大而數。為病陽盛內熱。當利三焦。

全生指迷方卷二

寒證

論曰。若其人酒浙惡寒。但欲厚衣。近光隱隱。頭重。慄。此由寒中於外。或由飲冷傷肺胃。內外合邪。留而不去。謂之感寒。寒從外至者。兩手寸口脈俱緊。或但見於右寸。寒從內起者。其脈遲小。無汗者小青龍湯主之。小汗者溫肺湯主之。

小青龍湯

五味子　細辛（去苗）　乾薑　半夏（湯洗七遍）　甘草（炙）各一兩

右爲散。每服五錢。水二大盞。薑三片。棗一箇。擘破。同煎至八分。去滓。溫服。

溫肺湯方缺。

若陰寒積冷。心腹大痛。嘔逆惡心。手足厥冷。心智不快。腰背疼痛。良薑湯主之。

高良薑（一兩。剉。炒。）　官桂（一兩。去皮。）　當歸（去蘆。一兩。剉。炒。）　乾薑（一塊。煨。）

人參（一兩。去蘆。）　吳茱萸（七錢半。炒。）　白茯苓（一兩。）　附子（半兩。煨。）

右爲散。每服二大錢。水一盞半。入生薑五片。煎至七分。去滓。空心服。

若但寒頭重。動眩暈。肌肉痛。牽急。不得轉側。漐漐汗出。惡寒。小便難。大便反快。短氣。足寒。或時咽痛。微熱。此由寒濕客搏經脈。不得發泄。其脈遲緩而小弦。附子湯主之。除濕湯亦主之。

附子湯

附子（一箇。炮。去皮臍。）　白朮（一兩。炒。）　茯苓　白芍（各三兩。）　人參（二兩。）

右爲散。每服二大錢。水一盞半。入生薑三片。煎至七分。去滓。空心服。

除濕湯方缺。

熱證

論曰。陰不足則陽偏。陽偏則發熱。若熱從背起。自手足漸漸周身。口舌乾燥。欲飲食而不能。此由陰氣虧少。少水不能制盛火。蒸陽起於四末。循行於背。陰不能斂陽。陽氣獨行。所以發熱。或發而夜寧。或夜發而至旦即消。其脈盛疾而小。芍藥黃耆湯主之。

芍藥黃耆湯

芍藥（三錢。）　黃耆　甘草（炙。）　青蒿（鹽花。各一兩。）

右爲散。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去滓。食後溫服。

若熱從腹起。上循胸腋。繞頸額。初微而漸至大熱。發無時。過微則劇。中脘不利。善食而瘦。其色蒼黃。肌肉不澤。口唇乾燥。由脾氣素弱。會因他病。誤服熱藥。入於脾。脾熱則消穀引飲。善消肌肉。其脈濡弱而疾。參橘丸主之。若嗽者。用加減法。及炙脾臟百壯。

參橘丸

橘皮（三兩。洗。）　麥門冬（去心。）　人參（去蘆。各一兩。）

右爲末。煉蜜爲丸如梧桐子大。食前米飲下三十丸。若嗽。加五味子一兩。

若熱從腹中。或從背起。漸漸蒸熱。日間劇。夜漸退。或寒而汗出。小便或赤或白而濁。甚則頻數。尿精。夜夢鬼交。日漸羸瘦。由思慮太過。心氣耗弱。陽氣流散。精神不藏。陰無所使。治以虛勞。大建中湯主之。

大建中湯

芍藥（六兩。）　黃耆　遠志（去心。）　當歸（洗。）　龍骨　人參　甘草（炙。各二兩。）　澤瀉（各三兩。）

右爲散。每服五錢。水二盞。棗二箇。擘破。薑五片。同煎至一盞。去滓。食後溫服。服中急。加飴如棗大。

若自腰以上發熱。熱及則汗出。出已而涼。移時如故。復加昏笃。腹中膨脖。其氣上攻。時時欬嗽。嗽引脇下牽痛。醫則驚悸。其脈弦急。疾由外寒客搏。內冷相合。寒則氣收。而水液聚。內化成飲。醫以熱藥攻之。寒閉於內。熱增於上。陽氣不下行。故散越於上。發而爲熱。散而爲汗。汗多亡陽。心氣內虛。故令驚惕。治以飲家。以旋覆花丸主之。

旋覆花丸

旋覆花　桂心　枳實（麩炒）　人參（各五分）　乾薑　芍藥　白朮（各六分）　伏苓　狼毒　烏頭（炮去皮）　石膏（火煅一伏時各八分）　甘遂（三分炒）　細辛（去苗）　大黃（湯紙煨）　黃芩　葶藶（炒）　芫花（炒）　橘皮（洗）　吳茱萸（炒）　厚朴（去皮薑汁炙各四兩）

右爲細末，煉蜜爲丸如梧桐子大，米飲下三丸，未效，加至七丸，小兒黃米大二丸。若熱起骨間煩疼，手足時冷，早起體涼，日晚即熱，背脊牽急，或骨節起凸，足膝酸弱，由陰不足，而陽陷陰中，熱留骨髓，髓得熱則稀，髓稀則骨中空虛，陰虛水少，脂枯，故蒸起，其脈沉細而疾，治屬骨蒸，補髓丸主之。

補髓丸

生乾地黃（日乾三兩）　乾漆（半兩碎炒令烟盡）

右爲末，煉蜜爲丸如梧桐子大，飲下三十丸，空心臨臥服。若自胷以上至頭發熱，口鼻氣色時如烟薰，日漸咽燥，唾如凝脂，時欬，毛竦，大便不利，小便赤，由肺不調，邪熱薰上焦，其脈疾大，先服桔梗湯，熱不退者五味子湯主之。

桔梗湯

桔梗（一兩）　人參　麥門冬（去心）　甘草（炙各半兩）　小麥（一合）

右㕮咀，水三升，煎至一升，去滓，分三服。

五味子湯　指南方治發熱不退

柴胡（去苗洗四兩）　半夏（湯洗七遍一兩一分）　黃芩　五味子　赤茯苓（分兩原缺）

右爲散，每服五錢，水二盞，薑五片，棗二箇，擘破同煎至一盞，去滓，溫服。若但熱不歇，日晡尤甚，口中物物氣出，斗無所聞，甚多昏睡，唾即浪言，喜冷，小便赤澀，大便不通，由三陽氣盛，蘊於經絡，內陷府藏，或因他病而致疾，其脈短疾而數，柴胡芒硝湯主之。

柴胡芒硝湯

柴胡（四兩去苗洗）　黃芩　甘草（炙）　赤茯苓（各半兩）　半夏（湯洗七遍一兩一分）

右爲散，每服五錢，水二盞，生薑五片，棗二箇，擘破同煎至一盞，去滓，入芒硝一錢，攪和溫服，以大便利爲度。

若身大熱，背微惡寒，心中煩悶，時時欲嘔，渴，不能飲，頭昏重痛，惡見日光，過涼稍清，起居如故，由飲食失時，胃中無穀氣，熱蓄於胃中，中脘熱，則三陽不下降，而上聚於腦，又胃主陽明經，爲惡熱，其脈虛大而數，久則細小，謂之中暑，初即服好茶一杯立愈，不即治之，留而在胃，別致他病，生薑竹茹湯主之。

生薑竹茹湯

竹茹（雞子大）　人參（半兩）　葛根（半兩）　生薑（一錢切）

右爲散，水三盞，煎二盞，去滓，分二服，不拘時。若間日發熱，後必數次，頭痛拘倦，由肺素有熱，氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，其氣內藏於心，外會於分肉之間，令人消爍脫肉，其脈弦大而數，謂之瘧瘧，柴胡桔梗湯主之。

柴胡桔梗湯

柴胡（去苗洗八錢）　芍藥　人參（各二錢）　甘草（炙二錢）　桔梗（二錢）　半夏（湯洗七遍二錢半）

右㕮咀，水二升，生薑十片，棗二箇，擘破同煎至一升，分三服，去滓服。大熱者去芍藥桔梗，用黃芩三錢，即名小柴胡湯。

若身熱汗出，煩滿，不爲汗解，由太陽之經，先受風邪，與熱相搏，腎氣厥則煩滿，謂之風厥，澤瀉湯主之。

澤瀉湯

澤瀉（半兩）　白朮　防風（各二兩）　石膏（碎）　赤茯苓（各一兩）

右爲散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服。若四肢發熱，逢風如炙如火，由陰不勝陽，陽盛則熱起於四支，少水不能滅盛火，而陽獨治於外，以兎絲子丸主之。

兎絲子丸

兎絲子（先於臼內杵百下，新去雜物，末）　五味子（各一兩）　生乾地黃（一兩）

右爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，飲下三十粒，食前溫服。若發熱耳暴聾，頰腫脇痛，脂不可以運，由少陽之氣厥，而熱留其經，宜小柴胡湯。若口乾溺赤，腹滿心痛，由熱留於手少陰之經，其氣厥也，赤茯苓湯主之。

赤茯苓湯

赤茯苓（四兩）　甘草（生一兩）　木香（半兩）

右爲散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服，日食。

論曰：若其人翕翕如熱狀，淅淅如寒狀，無有時度，支節如解，手足酸痛，頭目昏重，此由榮衛虛弱，外爲風邪相乘，搏於陽則發熱，搏於陰則發寒，久不治成勞氣，荊芥散主之。

荊芥穗　人參　白朮　當歸（切細焙）　芍藥　桂（去皮各一兩）　柴胡（去苗二兩）　甘草（炙半兩）　黃耆

右爲末，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服。若忽然牙關緊急，手足瘈瘲，目直視，此風客血經，謂之風痙，脈緊大者不可治，獨活湯主之。

獨活湯

獨活半兩　荊芥穗一兩

右以水三盞，煎荊芥汁至一大盞，再入獨活，煎一半，去滓，溫服。凡用獨活，紫色有成臼子者，蓋羌活極大而老者，是尋常所用白色者，乃老宿前胡也，慎不可用。

又方

煎荊芥濃汁於盆中，坐病人於上，蒸蒸然淋洗之。若寒熱如瘧，不以時度，腹滿膀胱起，則頭暈，大便不通，或時腹痛，胸脇痞悶，此由宿穀停留不化，結於腸間，氣道不舒，陰陽交亂，備急丸主之。

備急丸

大黃溫紙裹煨　巴豆去皮心及油　乾薑去皮等分

右為細末，煉蜜為丸如豌豆大，每服一丸，米飲下，羸人服一丸，如菉豆大，以便快利為度。

風濕

論曰：若身體疼，心煩口燥，欲得水而不能飲，頸上微汗，背強，欲得覆被向火，其脈浮虛，或目晴發熱，或身重汗出，而脈但浮，或躁擾不得屈伸，近之則痛極，短氣，或身微腫，或發熱，面黃而喘，鼻塞而煩，脈大自能飲食，此由汗出當風，或因冒濕冷，復遇風邪之氣，閉固腠理，病名風濕，麻黃加朮湯主之。

躁擾不得屈伸者，甘草附子湯主之。

鼻塞，氣不通者，瓜蔕散主之。

惡風身體重者，防己湯主之。

麻黃加朮湯

麻黃去根節三兩　桂心二兩　甘草炙一兩　杏仁湯洗去皮尖半兩　白朮四兩

右為散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服。

薏苡仁湯

麻黃去根節三兩　杏仁去皮尖半兩　甘草炙　薏苡仁各一兩

右為散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服。

甘草附子湯

甘草炙二兩　附子炮，去皮臍一兩

右為散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服。

瓜蔕散

瓜蔕　細辛去苗　藜蘆去苗，各等分

右為細末，每用半字許內鼻中，以氣通為度。

防己湯

防己四兩　黃耆四兩　甘草炙二兩

右為散，每服五錢，水二盞，薑三片，棗一箇，擘破，同煎至一盞，去滓，溫服。

瘧疾

論曰：寒熱之病，或寒已而熱，或熱已而寒，或寒熱戰慄，頭痛如破，身體拘急，數欠，渴欲飲冷，或晝時而發，或間日而作，至期便發，發已即如常，此謂之瘧，瘧脈自弦，弦數多熱，弦遲多寒，此皆得之於冬中，風寒之氣，藏於骨髓之中，至春陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，而後與邪氣相合而發，常山湯主之。

常山湯

常山　知母　甘草炙各三兩　麻黃去節一兩　蒼朮去皮三兩

右為散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服，以糜粥一盃助，取汗為度。

熱多者，宜解之，栝樓湯主之。

栝樓湯

栝樓根四兩　柴胡去苗八兩　人參　黃芩　甘草炙各二兩

右為末，每服二錢，水二盞，生薑三片，棗一箇，擘開，煎至一盞，去滓，溫服。

寒多者，宜溫之，薑桂湯主之。

薑桂湯

乾薑　牡蠣火煅通赤　黃芩二兩，活人書用三兩　柴胡去苗八兩　栝樓根四兩　甘草炙各二兩　桂去皮，取心三兩

右為末，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服，不拘時候。

寒熱等者，宜調之，鼈甲湯主之。

鼈甲湯

鼈甲湯浸，刮令淨，醋炙　白朮　常山　桂去皮　柴胡一兩去苗，各　牡蠣火煅赤半兩

右為散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服。

瘦證

論曰：若始覺肌肉不仁，久而變生他證，病名曰瘦，此由風寒濕三氣客於經絡，舍於血脈，搏於榮衛，故令皮膚瘦而不仁，有熱則肌肉骨節煩疼，有寒則冷，以春得之在筋，夏得之在脈，秋得之在皮，冬得之在骨，四季得之在肌肉，又久而不去，各傳其藏，筋瘦不已，舍之於肝，夜臥則驚，飲食多，小便數，上為引，如懷妊，脈瘦不已，舍之於心，其脈不通，煩滿，心下鼓，暴上氣，肌瘦不已，舍之於脾，其狀四肢懈惰，發渴，嘔汁，上為

大寒皮痺不已，舍之於腑，其狀煩滿而喘喕。骨痺不已，舍之於腎，其狀善脹，尻以代踵，脊以代頭。右證雖多，必先肌肉不仁，其始治當以增損小續命湯，證狀小不同者，當依本法，病久入深，魯公酒主之。

增損小續命湯方缺。

魯公酒

茵芋　川烏頭炮，去皮臍。　鄧蹻花
石斛去根，各一兩。　細辛去苗　桂子仁
通草　桂去皮，取心。　山茱萸
茵蔯蒿　罌粟　附子炮，去皮。
玉不留行　石楠葉　防風
生乾地黃各半兩。　遠志去心。　天雄炮，去皮臍。　防己
牛膝去苗　甘草炙　秦艽去苗　黃芩
杜仲去皮　澤瀉

右㕮咀，酒四斗，漬十日，每服一合，常令酒氣相續。

若胃乾而渴，肌肉不仁，由居處卑濕，以水爲事，肌肉濕漬，痺而不仁，是謂肉痿。罌粟湯主之。

罌粟湯

罌粟不計多少。

右研細末，煮稀粥，入蜜，飲之。大解金石毒。

若一邊足膝無力，漸漸瘦細，肌肉不澤，上牽脇肋，下連筋急，不能行步，此由大病之後，數亡津液，血少不榮，氣弱不運，肝氣虧損，無血以養筋，筋不榮，則乾急而痛，亦不能舉，活血丹主之。

活血丹

乾地黃二兩　當歸去蘆　芍藥　續斷　白朮各一兩。

右爲細末，酒糊爲丸，如梧桐子大，酒溫下三十丸，食前服，加至五十丸。如痛甚足痿不能行，去朮，加杜仲一兩，乳香，蔵鑑仙木鼈子仁，草烏頭，白芥子各半兩。

鹿茸丸

鹿茸去毛，切作片子，酥炙，五兩。　乾地黃二兩。　兔絲子揀淨，酒蒸透，乘濕搗，焙，二兩。　杜仲去粗皮，銼碎，酒炒，二兩。
牛膝二兩。　萆薢二兩。　附子炮，去皮臍，半兩。　乾漆半兩，炒，如無，以乾漆代。

右爲細末，酒糊爲丸，如梧桐子大，飲下三十丸，食前服。

若始覺脚弱，速灸風市三里二穴各一二百壯，若覺熱悶，慎不可灸，大忌酒麵房勞。風市穴，使病人平立垂兩手，舍手著腿中指尖頭，即是穴。三里穴，在足膝蓋下三寸外廉，按之陷中是。又法，以指深按之，則足趺陽脈不見爲準。

勞傷

論曰：古書有五勞六極七傷，皆由勞傷過度，或五藏六府互相尅賊，一藏偏損，五行逆伏，以至盡絕，皆謂之虛勞也。

若日嗜羸瘦，短氣，腰背牽急，膝脛酸痠，小便或赤或白而濁，夜夢紛紜，或夢鬼交，翕翕如熱，骨肉煩疼，由房勞過度，或思慮過多，皆傷神耗精之由，得之心腎，其脈細促，大骨枯者不治，微弱者可治，脈大數甚，不能食者死。大建中湯主之。

大建中湯見前蜜熱門。

氣病

論曰：百病皆生於氣，其始必由喜怒悲憂驚恐，由是變生，形證不一，若其氣起於一邊，或左或右，循行上下，或在肌肉之間，如錐刀所刺，其氣不得息，令人腹中滿，由驚恐悲怒，或冒寒熱，留而不去，爲鬱伏之氣，因氣流行，隨經上下，相搏痛，久久令人痞悶，其脈短濇，謂之聚氣。七氣湯，趣痛散主之。

七氣湯　楊仁齋直指方云：治七情相干，陰陽升降，氣道壅滯，攻衝作疼。

京三稜　蓬莪茂　青橘皮　香附子去毛　陳橘皮洗
桔梗　藿香葉　桂取心　益智各一兩半　甘草炙，三錢。切氏產乳方，有沉香半兩，無陳橘皮。

右爲散，每服五錢，水二盞，生薑二片，棗二枚，煎至一盞，食前溫服。

趣痛散　可用方云：治氣搏作痛，肌肉之間如錐刀所刺，胸膈痞悶。

蓬莪茂炮　桂心各一兩。　檳榔　附子炮，去皮臍。
芫花炒，則爲末，一錢。　細辛去苗，半兩。

右除芫花外，共爲末，每服三大錢，水一盞，煎至七分，去滓，調芫花末一字，溫服。

若心下似硬，按之即無，常覺膨脹，多食則吐，氣引前後，噫氣不除，由思慮過多，氣不以時而行，則氣結，又曰：思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，其脈澀滯，謂之結氣。參橘丸主之。

參橘丸

橘皮洗，四兩。　人參一兩。

右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大，米飲下三十丸，食前服。

若咽中如核，嚥之不下，吐之不出，久不治之，漸妨於食，或由思慮不常，氣結不散，或因飲食之間，氣道卒阻，因而留滯，因氣者謂之氣噎，其脈緩澀，因食者謂之食噎，其脈短澀，氣噎，嘉禾散主之，食噎，神麯丸主之。

嘉禾散方缺

神麯丸

神麯炒，一兩。　橘皮洗，二兩。

右爲細末，煉蜜和爲丸，如雞豆大，每服一粒，含化嚥津。

若痛而遊走，上下無常處，脈亦聚散，或促或濇，謂之遊氣，茂香散主之。不止者，延胡散主之。

茂香散

茺蔚茂（炮，一兩）　人參（一分）　木香（一錢）

右爲細末，醋湯調方寸匕。

延胡散

延胡索（炒）　當歸（洗焙，分）

右爲細末，醋湯調方寸匕。

若自咽嗌以下至脾左右，氣各不相通，氣上奔急攻，右臂痛如斧槌，肌肉日消，凝粥不下，心中懊悶，由肺經本受寒邪，留於右邊，以肺左右，或因以大熱藥攻寒，寒本在於經，而不能散發，於是火氣但逼於肺，肺燥則氣上迫，但解藥毒，然後理肺，先宜炙肝散，後宜理氣湯。

炙肝散

牡丹皮　柴胡　芍藥（各一兩）　白朮（二兩）

右爲細末，用豬肝三指許，薄批，糝藥末二錢，慢火炙熟，細嚼，米飲下，食前服。

理氣湯（疑即前七疑湯）

栢子仁丸　史載之指南方，多楮實一兩，治臂痛不能舉伸，筋脈攣拘。

栢子仁（炒研）　乾地黃（各二兩）　茯苓　枳實（麩炒）　桂（取心）

五味子　附子（炮，去皮臍）　石斛（去苗）　鹿茸（去毛，燒作灰，酥炙）　酸棗仁

覆盆子　沉香　黃耆（各一兩）

右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大，酒下三十丸，空心服。

若腹脇有塊，大小成形，按之不動，推之不移，久久令人寒熱如瘧，咳嗽，面目浮腫，動輒微喘，日就羸瘦，由暴怒或驚恐，氣上而不下，動傷於肝，氣結聚成形，始得之在肝，其脈牢大而結，不傳，可治，沉香煎主之。

沉香煎

石斛（五兩）　椒（去目，炒出汗）　附子（炮，去皮臍）　秦艽（去土）　鼈甲（酒刮去筋膜，炙）

柴胡（去苗）　沉香　木香　檳榔　黃耆（各二兩）

右爲末，先用枸杞根新者十斤，淨洗槌碎，好酒二斗，煮至七升，取出枸杞，別用好酒三升，拍洗令淨，漉去滓，澄過，併於前煎酒內，更入熟蜜四兩，再熬成膏，相藥末，丸如梧桐子大，飲下二十丸，食前服。

血證

論曰：諸陽統氣，諸陰主血，陰盛則陽虧而陽病，陽盛則陰虧而陰病，陽氣侵陰，血失常道，故或吐或衄，或從口，或從鼻，若鼻出而色鮮，心煩燥悶，時欲引飲，出至三斗，陽入於陰也，血得熱則流散，譬如天地之經水，天暑地熱，則經水沸溢而壅起，故有內衄肺疽，其證大同而小異，其脈洪數者爲逆，微小者爲順，宜栢子藥皮湯，煎金湯，大熱者宜地黃煎。

若吐血時，先則腥臊，鼻出清液，胷脇支滿，妨於食，目眩，時時前後血，此由素經大虧，血或醉入房中，氣竭

傷肝，女子則月事衰少不來，病名血枯，栢子藥皮湯主之。

栢子藥皮湯

黃藥　栢子（各一兩）　甘草（半兩）

右爲散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服。

煎金湯

金花，并莖葉陰乾，不拘多少。

右濃煮汁，頓服立定。

地黃煎

生地黃汁（半斤）　大黃（末，二兩）

右將地黃汁熬耗一半，內大黃末同熬，候可丸，如梧桐子大，熟水下五粒，未效，加至十粒。

若吐血，服湯後轉加悶亂煩躁，紛紛欲嘔，顛倒不安，由胸上有留血，其脈沉伏，急須吐之，人參散主之。

人參散

人參　蘆

右爲末，水調下一二錢。

若血隨嘔出，胸中痞悶，嘔畢則目睛痛，而氣怒，由怒氣傷肝膽，血隨嘔出，竹皮湯主之。

竹皮湯

青竹皮　甘草（炙）　芎藭　黃芩

芎藭　白朮　人參　桂心（各一兩）　當歸（洗，焙，各六分）

右爲散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服。

若先吐血，血止後嗽，嗽中血出如線，痛引脇下，日漸羸瘦，由悲憂傷肺，肺主諸氣，血常隨之，氣傷，則血無以運，故橫流而暴出，後隨病而上下也，其脈緩小者可治，細數加急者不可治，黃耆湯主之。

黃耆湯

黃耆（蜜炙，一兩半）　白朮（炒，二兩）　人參　甘草（炙，各一兩）

陳皮（半兩）　藿香（半兩）　白芍（一兩）

右爲散，每服四錢，水一盞半，煎至七分，去滓，溫服。

若嗽血吐血，發作無時，肌肉減少，由氣虛弱，或從高墮下，勞傷所致，其脈虛弱，當補陰平陽，阿膠散主之。

阿膠散

阿膠（炙粉拌，炒，一兩半）　杏仁（炮，去皮尖，七錢半）　馬兜鈴（焙）

甘草（炙）　糯米（一兩）　牛蒡子（炒，各一兩）

右爲細末，熟水調下一二錢。

若吐血，腹中絞痛，汗自出，胸中悶，由飲食傷胃，胃氣不轉，氣上衝胸，所食之物與氣迫壅，因胃裂，白朮湯主之。

白朮湯方缺。

全生指迷方卷三

諸積

論曰：若腹中成形作塊，按之不移，推之不動，動輒微喘，令人寒熱，腹中時痛，漸漸羸瘦，久不治之，多變成水，虛勞，亦由憂思、驚恐、寒熱得之，陰陽痞滯，氣結成形，其脈結澀，謂之積氣，萬安丸主之。

萬安丸

大戟（炒）　甘遂（炒）　牽牛（炒）　五靈脂（各半兩）　芫花（炒，一分）
膽礬（研，一錢）　細墨（燒，研，一錢）　巴豆（去皮，出油，一錢）　芫青（四十箇，去頭去翅）　斑猫（二十箇，去頭去翅）
石膏（細研，一分）　延胡索（炒，半兩）　吳茱萸（炒，半兩）

右為細末，白麵糊為丸如菉豆大，生薑橘皮湯下一粒，日二服，病去六七分，即住服。史氏指南方有續隨子、郁李仁、信砒各一分，無延胡索、巴豆，袁當時大方有砒一分，無斑猫、芫青、巴豆。

若左脇下如覆杯，有頭足，久不已，令人發痰瘧，寒熱欬，或間日一發，由肺病傳肝者，當傳脾，脾乘王而不受邪，其氣留于肝，故結而為積，其脈澀結，麝香丸主之。

麝香丸

蓬莪茂（煨，一兩）　桂心　當歸　人參（各半兩）　細辛（去苗）

川烏頭（炮，去皮臍，各一分）　巴豆（一分，去皮，出油）

右研細末，白麵糊為丸如菉豆大，食後飲下三粒。史氏指南方無蓬莪茂，有芍藥一兩。

若心下如盤，久不已，令人四肢不收，發黃疸，飲食不榮肌膚，始由肝病傳脾，脾當傳腎，腎乘王而不受邪，氣留於脾，其脈緩澀，時結，謂之痞氣，三稜煎主之。孫氏仁存方云：兼治食癥、酒癥、血蠱、氣塊、血瘕時發劇痛，婦人血分，男子脾氣橫泄。

三稜煎

京三稜（剉）　蓬莪茂（各四兩，剉）　芫花（一兩）

右用米醋三升，煮令醋盡，獨炒芫花令乾，餘二味切片子，焙乾，同為末，白麵糊為丸如豌豆大，橘皮湯下三粒，以知為度。

若從少腹上衝心胸，咽喉發痛，如豬肝狀，發作欲死，由脾病傳腎，腎當傳心，心乘王而不受邪，氣留於腎，結而為積，其脈沉結，謂之賁豚，賁豚湯主之。

賁豚湯

甘草（炙）　川芎　半夏（湯洗七遍）　芍藥
葛根　甘李根皮（各五兩）　黃芩（各二兩）

右為散，每服五錢，水二盞，薑五片同煎至一盞，去滓，溫服。史氏指南方加當歸一兩。孫氏仁存方加乾薑一兩，一方當歸二兩無葛根。

若脈大而散，時一結，謂之伏梁，伏梁丸主之。

伏梁丸

青皮（白烏頭法三日令軟透，切，三十箇）　巴豆（去皮，十五箇，與青皮同炒乾，去巴豆不用）　光活（半兩）

右為末，白麵糊為丸如菉豆大，飲下五粒，未知漸加至十粒。

若身體及脾股脅皆腫，環臍而痛，不可動，動之為水，亦名伏梁。椒仁丸主之。

椒仁丸

五靈脂（去皮）　吳茱萸（炒）　延胡索（炒，各半兩）　芫花（醋浸一宿，炒，一分）
續隨子（研）　郁李仁（去皮，研）　牽牛（炒熟，各半兩）　石膏（火煅，一分，研）
椒仁（研，一錢）　甘遂（炒，一錢）　附子（炮，去皮臍）　木香（各半兩）
膽礬（研，一錢）

右為細末，白麵糊為丸豌豆大，橘皮湯下一粒，早晨日午臨臥服，如婦人血分，則去木香，加斑猫、芫青，各三十枚，去頭足翅，炒黃，歸半兩。

諸痛

論曰：諸心腹痛者，或外邪來客，或氣相干，其卒然痛而即止者，此寒氣客於脈外，得寒則縮，蹇紐急，外引

小絡，得熱即止。宜先用熨法，後以良薑散主之。

熨法　指南方云：治心腹痛，卒然而止，遇寒再發。

鹽（半斤，炒極熱。）

右以帛帛包，熨痛處。指南方云：漸去至一重。

良薑散

高良薑（五兩）　厚朴（去皮，薑汁炙，二兩。）　當歸　桂心（各三兩。）

右為散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服。

若腰脊背之外候，足太陽經之流注，如痛迸小腹，不得仰俛，惙惙短氣，由腎氣虛弱，有所不禁，補腎散主之。

補腎散

杜仲（去粗皮，炙炒焦，一兩。）　桂（去皮。）　牡丹皮（各半兩。）

右為末，每服三錢，用猪腎一箇，批開，糝藥在內，入鹽少許，以線扎定，水煮熟，空心食之。

若隱隱腰痛，以熱物熨痛處即少緩，由處卑濕，復為風邪傷足太陽之經，其脈緩濇，白朮散主之。

白朮散

白朮（二兩。）　芍藥（三兩。）　桂（去皮。）　附子（炮去皮臍，各一兩，剉。）

右為細末，溫酒調二錢匕，食前服。

若腰痛不能轉側，由勞役動傷經絡，或從高墮下，氣滯於腰，正氣流行，相搏則痛，其脈沉，大小不常，謂之腎腰。趣痛丸主之。

趣痛丸（諸氣門見趣痛散。）

若腰如錐刀所刺，大便黑色，小便赤黑，此留血滯於腰間，謂之血瀝腰痛，其脈濇，當歸丸主之。

當歸丸

當歸（三兩，剉。）　水蛭（好者，炒，三十箇。）　桃仁（去皮尖，三十個，炒研。）

右為末，酒糊為丸，如梧桐子大，酒下十粒，未知，加至三十粒。

若腰冷，腹重如帶五千錢，如坐於水，由腎經為陰濕所逼，復受風冷，久不治，變成水病，腎著湯主之。

腎著湯

甘草（炙。）　乾薑（各二兩。）　白茯苓　白朮（各四兩。）

右為散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，食前溫服。

若腰脊不舉，由遠行勞倦，逢大熱而渴，陽氣內伐，熱舍於腎，水不勝火，則骨枯而髓減，蓋陽明併腎，則腎脂枯而宗筋主束骨而利機關也，是謂骨痿，菟絲子丸、補腎散主之。

菟絲子丸

菟絲子（酒浸，別研，焙，二兩。）　牛膝（酒浸，一兩。）　杜仲（去粗皮，炙，炒焦，三兩。）

乾地黃（焙，二兩。）　萆薢（一兩。）

右為細末，煉蜜為丸如梧桐子大，飲下三十粒，食後服。

補腎散（見前。）

若脇痛不得息，痛則欬而汗出，由邪客於足少陽之絡，脇脈，宜灸足小指、次指爪甲上，與肉交處七壯，欬陰二穴也。

若臂外臑痛，手不及頭，心煩喉痺者，由邪客於手少陽之絡，以針刺手大指、次指之端，去爪甲如韭葉，令血出而止。

若臂痛不能屈伸，此邪客於臂臑之間，取腕踝骨後，以指按之極痛，刺之，留二呼，急出針，或灸。

若筋拘攣，背急痛，引脇下，從項推下夾脊，按之應手痛者，於其上灸七壯，未定，加至十四壯。

若痛引小腹，由寒氣客於厥陰之脈，或脇肋相引，腎肝脈弦大，久成寒疝，桂枝烏頭湯主之。

桂枝烏頭湯

桂心（三兩。）　芍藥（三兩。）　烏頭（炮，去皮臍，二兩半。）　甘草（炙，二兩。）

右為散，每服五錢，水二盞，薑五片，棗一枚，同煎至一盞，去滓，入蜜半匙許，再煎一二沸，稍熱服。

眩暈

論曰：頭眩之狀，謂目眩旋轉，不能俛仰，頭重不能舉，目不能開，閉則不能視物。（虞氏指南方云：視物如反，或如浮水，或身如在車船上。）是謂徇蒙招尤，目瞑耳聾，下實上虛，過在足少陽厥陰，由肝虛血弱，則風邪乃生，蓋風氣通於肝。又曰：諸風掉眩，皆屬於肝。左手關脈虛弦，謂之風眩。香芎散、桃紅散主之。

香芎散

芎藭（各一兩。）　獨活　旋覆花　藁本（去苗。）　細辛（去苗。）

蔓荊子　石膏（別研。）　甘草（炙。）　荊芥穗（各半兩。）

右為末，每服五錢，水一盞，薑三片，同煎至七分，去滓，溫服，不拘時。

桃紅散

白附子（新羅者。）　黃丹（等分。）

右同炒，候黃丹深紫色，篩出黃丹不用，只將白附子為末，清茶調下一錢匕。

若頭眩發，則欲嘔，心下溫溫，胸中如滿，由胸上停痰，胃氣不流，盤鬱不散，氣上騰入腦，腦滿則眩，關脈沉弦，或謂之痰眩。旋覆花丸主之。

旋覆花丸（見前熱。）

若但覺而不眩，發則伏地昏昏，食頃乃蘇，由榮衛錯亂，氣血濁濁，陽氣逆行，（指南云：此由邪客諸氣，陰陽持脈，上者不得下，下者不得上，精神氣亂。）上下相隔，氣復通則蘇，脈虛大而澀，謂之氣血流氣，飲子、草烏頭湯主之。

洗氣飲子

紫蘇葉　青皮　當歸洗　芍藥　烏藥
茯苓　桔梗　半夏湯洗七遍，焙乾為末，薑汁和，陰乾　黃耆
枳實麸炒去穰　防風各半兩　甘草炙　橘皮洗，各三分　木香一分
連皮大腹銅，薑汁浸一兩　川芎三分

右為散，每服五錢，水二盞，生薑三片，棗一個，同煎至一盞，去滓，溫服。

草烏頭湯

草烏頭去皮尖，生用　細辛去苗　茶芽等分

右為散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，緩緩服盡。

若但欲上視，目瞑不能開，開而眩，唾出若涕，惡風振寒，由腎氣不足，動作勞損，風搏於肺，腎氣不足，膀胱不榮於外，故使強上瞑視，因其勞而受風，在肺，故唾出若涕而惡風，謂之勞風，芍藥黃耆湯主之。

芍藥黃耆湯

芍藥二兩　黃耆三兩　川芎二兩　烏頭炮去皮尖，半兩

右為散，每服五錢，水二盞，薑三片，棗一個，同煎至一盞，去滓，溫服。

厥證

論曰：若暴厥，卒然不知人事，身脈皆動，其狀如尸，聰其耳中如循嘯聲，股間陰，由邪氣折於手足少陰太陰足陽明之絡，五絡俱竭，腎氣微少，精血奔氣促迫，上入胸膈，宗氣反聚，血結心下，陽氣下墮，陰氣卒上而不交，陰陽離居，身溫而汗出，氣復反，則唇青身冷，此為入藏，即死，謂之尸厥，先以竹管吹左耳極三度，又吹右耳如前，灸熨斗熨兩脇，以石菖蒲末著舌下，及吹鼻中，又刺足大指內側，爪甲去端如韭葉，入一分，留三呼，謂隱白穴也，出之，又刺足心湧泉穴，如上法，又刺足中指爪上令破，如上法，謂厲兌穴也，又刺手大指內側，去端如韭葉，又刺手心主，謂中衝穴也，又刺掌後銳骨之端，謂神門穴也，又刺取頭左角之髮，燒灰，酒服方寸匕，不能飲，灌之，後太乙神精丹。

太乙神精丹方缺。

若居常無苦，忽然如死，身不動，默默不知人，目閉不能開，口噤不能語，又或假有知，而惡聞人聲，或但如眩冒，移時乃甦，此由亡汗過多，血少，氣併血中，氣血爭，陰陽亂，氣過血還，則陰陽復通，而人乃甦，謂之鬱冒血厥，此證多生婦人，男子亦有之，白微湯、倉公散主之。

白微湯

白微一兩　當歸一兩　人參半兩

右為散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服。

倉公散

瓜蒂　藜蘆　鉛黃研

右等分為末，以豆許吹鼻內，醒為度。

若卒然昏冒，無所知，或妄言語，此由暴驚，心無所倚，神無所歸，久不治，陰陽相併，或陰氣併陽，陽氣併陰，令人九竅閉塞，狀類尸厥，菖蒲散主之。

菖蒲散

石菖蒲一兩　麝香一錢研

右為細末，酒調服二錢，或飲亦得。

若忽然瘈瘲，瞋目不能語，喉中有聲，大便不通，胸滿欲嘔，或惡人聲，聞人聲則惕然而驚，或時叫，此得之暴驚，氣積而不散，伏痰聚於中脘，濕滯於脾，久而脾氣既耗，水氣乘之，則風動四末，宜先吐之，以勝金丸、玉壺丸，以大便利即止，有熱則脈洪數，此脾鬱於心，鐵粉丸主之。

勝金丸方缺。

玉壺丸方缺。

鐵粉丸

鐵粉二兩　硃砂一兩研　牛黃研　天竺黃研　天南星　鉛霜研各半兩

右為末，薑汁煮糊為丸如梧桐子大，生薑湯下五丸。

若素無疾，而暴得瘈瘲，發訖即如常，經隔月日又復如前，由陰陽失其常度，氣血相併也，此謂之癇，宜龍齒丸、烏鴉散、獨活湯主之。

龍齒丸

牛黃研　麝香研，各半錢　羚羊角鎊　龍齒　硃砂研，半兩　蛇退炒　白僵蠶炒，各一分　龍骨

右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，飲下五丸，臨臥服。

烏鴉散

臘月烏鴉一個，去足嘴大翅，用麝香一錢，填口內，以好紙通裹了，再用麤紙和泥固了，候乾，炭火燒，烟盡取出為末，更入麝香一錢研和，飲調方寸匕，日二服。

獨活湯

獨活一兩　細辛去苗，一分　僵蠶炒，半兩　牡丹皮三分
紫菀去苗，一分　防已半兩

右為散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服。

若病人喜怒不常，獨閉戶牖而處，惡聞人聲者，蓋陽氣常動，因暴折而難決，肝膽氣鬱而不伸，故令喜怒。

謂之陽厥。宜鐵落飲。無食肉及菖蒲散。

鐵落飲方缺。

菖蒲散見前。

若言語不避親疎。或棄衣而走。登高而歌。此思慮用心太過。神散不藏。又或悲哭。忽忽不樂。神有餘則笑。爲狂。勝金丸主之。神不足則悲。露朱丹主之。

勝金丸方缺。

露朱丹

好硃砂研一兩。

右用其琉璃器盛之。露四十九夜。陰雨不算數。研細。入牛黃半錢。研和。滴熟蜜珠子。丸如梧桐子大。空心人參湯下一粒。

若脚背頭重。足不能行。發則眴仆。此太陽厥也。烏頭湯主之。

烏頭湯見前注

若喜怒噫痛不肉食。氣奔走上。刺足下中央之脈。血出而止。

痰飲

論曰。若咽中如炙肉臠。嚥之不下。吐之不出。由胃寒乘肺。肺胃寒。則津液聚而成痰。致肺管不利。氣與痰相搏。其脈澀。半夏厚朴湯主之。

半夏厚朴湯

半夏湯洗七遍、五兩。　厚朴去皮、薑汁炙、三兩。　茯苓

右爲散。每服五錢。水二盞。生薑十片。同煎至一盞。去滓。食前溫服。

紫蘇葉各二兩。

若心下盤旋。欲吐不吐。由飲癖停留不散。枳朮湯主之。

枳朮湯

白朮四兩。　枳實麩炒、去穰、二兩。

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。食前溫服。

若腹滿。按之沒指。隨手而起。餘與正水皆同。但四肢聶聶動。其脈亦浮。由肺氣久虛。爲風邪所客。氣不得通。百脈閉塞。氣結陰聚成水。謂之皮水。亦宜發汗。先以防已湯次以大豆散。

防已湯

防已三兩。　人參四兩。　桂心二兩。　茯苓四兩。

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。

大豆散方缺。

若欬嗽。嚥不得臥。面浮腫。脈弦急。或遲。由肺胃停寒。水聚成飲。支乘於心。氣不得下。謂之支飲。宜先用十

棗湯瀉之。後宜防已湯主之。

十棗湯

芫花炒黑。　甘遂。　大戟各等分。　大棗十枚。

右先煮棗。去滓。內前藥末。強人服一錢。虛人服五分。若病不除。再服。得快下爲度。後以糜粥自養。

防已湯見前

消證

論曰。消渴之病。其來有二。或少服五石湯丸。恣慾不節。不待年高。氣血衰耗。石性獨存。火烈焦槁。精血涸竭。其狀。渴而肌肉消。又有積久飲酒。酒性酷熱。薰蒸五臟。津液枯燥。而血澀。其狀。渴而肉不消。如解五石毒者。宜礬粟湯。欲止渴者。宜兎絲子丸。大渴而加煩熱者。宜馬通散、栝樓粉。

礬粟湯見前痺證門。

兎絲子丸

兎絲子不計多少、揀淨、水淘、酒浸三宿。

右控乾。乘濕搗羅爲散。焙乾。再爲細末。煉蜜和丸如梧桐子大。食前。飲下五十粒。一日二三服。或作散。飲調下三錢。　瑣碎錄云。用酒浸。晒於日中三兩日。一換酒。用時洗去酒。濃煎湯飲。

馬通散方缺。

栝樓粉方缺。

若其人素渴引水。一旦不飲不渴。小便日夜數十行。氣乏。肉消脫。此消中。腎氣敗也。茱萸丸主之。

茱萸丸

蓯蓉洗切、酒浸、焙。　五味子炒。　山茱萸。　乾山藥等分。

右爲末。酒糊爲丸。如梧桐子大。飲下三十粒。空心服。

疸病

論曰。黃疸之病。皆屬於脾。脾屬土而色黃。惡濕。濕勝。則土氣不行而鬱。故發則眞色見。蓋黃疸本得之濕。熱在裏。濕熱相搏。身必發黃。若先有留熱。而後爲濕氣所加。則熱多而濕少。治之先導其熱。若先爲濕氣所乘。而後有熱。則濕多而熱少。治之先去其濕。去其濕。則熱從而去。亦有因冷痞結。陰加於陽。上下氣不通。而脾氣不行。則陰氣鬱而生濕。其狀。胸中痞。嘔逆。時惡寒。當先除痞。利其小便。則濕自去。脈洪大。大便利。加渴者死。脈微小。小便不利。不渴。則生。若病人一身悉黃。四肢微腫。胸滿不得臥。汗出如黃蘗汁。此由大汗出。卒入水中所致。苦酒湯主之。

苦酒湯

黃耆五兩。　芍藥。　桂心厚心、各三兩。

右爲散。每服五錢。水二盞半。苦酒半盞。同煎至一盞。去滓溫服。

若因他病未除，忽然一身面目悉黃如橘，瘀熱在裏也。或因大熱，以冷水洗之，濕熱相搏，薰蒸肌肉，謂之黃疸。麋皮湯主之。茵陳五苓散主之。

麋皮湯

黃麋　黃連　黃芩各等分

右爲散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓溫服。

茵陳五苓散

茵陳一兩　猪苓　白朮炒各十八銖　澤瀉一兩半
桂心半兩　茯苓

右爲散，每服五錢，水一盞半，煎至一盞，去滓溫服。

若心下懊痛，足膝腫滿，小便黃，面發赤斑，由大醉當風入水，濕加於熱，內蒸脾氣，謂之酒疸。治用飲家，茯苓半夏湯主之。

茯苓半夏湯

茯苓四兩　半夏二錢半，湯洗七遍　旋覆花三錢　甘遂半錢，炒

右㕮咀，水二盞，煎至一盞，去滓，將甘遂末分二服，用藥汁半盞調服，以利爲度。

若脈浮，腹滿欲嘔吐者，先吐之，瓜蒂散主之。脈沉，腹滿，大便祕，先利之，大黃丸主之。

瓜蒂散

瓜蒂　赤小豆　秫米等分

右爲細末，粥飲調方寸匕，以吐爲度。

大黃丸

大黃煨　葶藶各等分

右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大，蜜湯下十粒，以利爲度。

全生指迷方卷四

欬嗽

論曰：古書有欬而無嗽，後人以欬嗽兼言之者，蓋其經變，毫不因痰涎而發，謂之欬；痰涎上下隨聲而發，謂之嗽。如水之漱蕩，能漱其氣也。諸欬之原，其來雖各不同，其氣必至於肺而後發。若非其時，或邪而發欬者，因因藏氣虛弱，抑或五行之氣，內相剋制，病作即治，無使傳注，不即治之，傳注他藏，遂至不起。然有因寒者，因風者，因熱者。風寒從外至，熱則從內起。風寒則諸經自受其邪，熱則臟腑薰蒸，乘而爲病。風則散之，寒則溫之，熱則調之瀉之。因風者惡風，出風中則欬甚；因寒者遇寒則劇；因熱者得熱則發。若因外感風寒，不即治之，邪氣留淫日深，攻傷藏氣，一藏受極，傳其所不勝，如肺經受病，久而不去，欬則右脇痛不可轉側，遂傳之肝，肝屬木，肺屬金，金剋木，欬引左脇不可臥，臥則欬劇，遂傳之脾，脾土也，爲木來剋，則大便鴨溏，甚則痿躄，如癡狀，次傳之腎，腎屬水，爲土所剋，則骨痿不能起於牀，手足浮腫，次傳之心，則死。若因藏氣自相薰蒸，如心乘於肺，急補肺而瀉心，補肺宜辛甘，瀉心宜苦。若脾熱薰蒸，但瀉其脾，治以甘平，調肺以辛溫，謂之間傳。學宜知此。

若肺欬惡風，脈浮，小青龍湯主之。

惡寒脈緊，杏子湯主之。

微弱者。鍾乳丸主之。

惡熱喉燥。脈數甚則咯血。天門冬湯杏子湯主之。　孫氏仁存活法祕方。肺欬之狀。喘息有音。甚則咯血。兩脇下滿。惡寒。脈弦緊。五味子煎主之。惡痛。脈疾。目赤。頭眩。百部丸主之。射干湯

小青龍湯見「寒」門。

杏子湯

杏仁去皮尖　乾薑　細辛去苗　甘草炙各半兩　五味子

桂心各一兩

右爲散。每服五錢。水二盞。薑一箇。同煎至一盞。去滓。溫服。痰多者。加半夏半兩。湯洗七遍。

鍾乳丸

鍾乳銀石器內。煮一伏時　紫菀去苗及枯燥者半兩　款冬花

黃耆各半兩　桑白皮一分。剉。微炒

右爲細末。煉蜜和丸如梧桐子大。飲下三十丸。食前服。

天門冬湯

天門冬去心　紫菀去苗及枯燥者。焙　知母焙。各一兩　桑白皮　五味子

桔梗各半兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。欬血者。阿膠半兩。炒燥。大便澀而喘。加葶藶半兩。

若心欬。脈浮惡風。桂心湯主之。

惡寒時口噤。脈緊大。附子細辛湯主之。

惡熱脈疾。小便赤澀。茯苓湯主之。

桂心湯　孫氏仁存活法祕方云。心欬之狀。上引心痛。喉介介然如梗。甚則咽喉腫痛。脈浮。惡風。宜桂心湯。

人參　桂去心　白茯苓各一兩　麻黃

遠志去心　甘草炙。各一分　貝母炒。各半兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。

附子細辛湯

附子炮。去皮臍　細辛去苗。各半兩　人參　乾薑

五味子二兩　菖蒲各一兩　甘草炙。半兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。

茯苓湯

茯苓　麥門冬去心　黃芩各一兩　秦艽去土

杏仁去皮尖一分　柴胡去苗。各半兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。

若肝欬。惡風。脈浮弦。射干湯主之。　孫氏仁存活法祕方云。肝欬之狀。欬則兩脇痛。甚則不可轉側。轉側兩脇下滿。惡寒。脈弦緊。五味子煎主之。惡痛。脈疾。目赤。頭眩。百部丸主之。

射干湯

射干　麻黃去根節。各半兩　五味子　半夏湯洗七遍。各一兩　款冬花

右爲散。每服五錢。水二盞。薑五片。同煎至一盞。去滓。溫服。

五味子煎

五味子五兩　桂取心。一兩　川烏頭炮。去皮臍。一兩

右爲末。水五升。煎至一升。絞取汁。用好蜜二兩。再煎成膏。溫酒化彈子大。食前服。

百部丸

百部八兩。細末　生地黃五斤。取汁。熬成膏

右將地黃膏和百部。爲丸如梧桐子大。飲下三十粒。食後服。

若脾欬。惡風。脈浮緩。麻黃厚朴湯主之。　孫氏仁存活法祕方云。脾欬之狀。欬則右脇下痛。引肩背痛。甚則不可以動。動則欬劇。口中如含霜雪。中脘隱隱冷。惡寒。脈緊弱。溫中丸主之。大便堅。從腹上至頭發熱。脈疾。茯苓丸主之。

麻黃厚朴湯

厚朴去皮。薑汁炙　麻黃去根　杏仁去皮尖

甘草炙　半夏湯洗七遍。各半兩

右爲散。每服五錢。水二盞。薑五片。同煎至一盞。去滓。溫服。

溫中丸

乾薑　半夏湯洗七遍。各一兩　白朮二兩　細辛去苗

橘皮洗。各一兩　胡椒各半兩

右爲細末。煉蜜和丸如梧桐子大。米飲下三十粒。食後服。

茯苓丸

茯苓　黃芩各一兩　五味子半兩

橘皮洗。二兩　桔梗半兩　半夏湯洗七遍。切。薑汁浸炒。三分

右爲細末。煉蜜和丸如梧桐子大。米飲下三十粒。食後服。

若腎欬。惡風。脈浮。白前湯主之。　孫氏仁存活法祕方云。腎欬之狀。則腰背相引疼痛。

惡寒，唾冷涎，小便數，脈緊，椒紅丸主之。
惡熱，骨間煩疼，地骨皮湯主之。

白前湯

白前　細辛（去苗）　川芎　芍藥　五味子（各一兩）　麻黃（去根節）　桂（取心，各半兩）

右爲散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓溫服。

椒紅丸

椒（去目，炒出汗，半兩）　款冬花　紫菀（去苗及枯燥者）　乾薑（各一兩）　礬石（火燒一伏時）
附子（炮，去皮臍）　細辛（去苗）　皁莢（去子，酥炙，各半兩）

右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大，米飲下三十粒，食前服。

地骨皮湯

地骨皮　百部（各二兩）　芍藥　赤茯苓（各一兩）

右爲散，每服五錢，水二盞，竹葉十片，同煎至一盞，去滓，食後溫服。
若頸骨赤大如錢，日晡發熱者死。若潮熱有時，五心煩熱，搏於榮衛，不欬者易治。脈促濇者難治。青蒿煎、柴胡芍藥湯主之。

青蒿煎

青蒿（汁，一升）　人參　麥門冬（去心，各一兩）

右將二味爲末，用青蒿汁同熬成膏，丸如梧桐子大，飲下二十粒，食後服。

柴胡芍藥湯

柴胡（去苗）　芍藥（各一兩）　地骨皮　石膏（各半兩）

右爲散，每服五錢，水二盞，小麥五十粒，同煎至一盞，去滓，食後溫服。
若但喘臥，飲食不榮肌膚，或不能食，心腹虛脹，滑泄，背脊牽急，勞倦不能動止，或因大病後，或因下利後，不復常，得之於脾，脈弦大甚者不治。四肢煩厥，亦謂之肉極。炙肝散（見前氣門）、白朮丸主之。

白朮丸

白朮　橘皮（洗，各一兩）　厚朴（去皮，薑汁塗，炙，熟）　人參（各半兩）

右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大，米飲下三十丸。
若欬嗽如膿狀，或微喘急短氣，脇下痛，皮膚乾燥，動則欬極，由形寒飲冷傷於肺，經久嗽不已，則肺枯燥，令人先寒後熱，脈弱者可治，或緊或弦者不可治。

喘證

論曰：凡人一呼一吸，謂之息。呼出心肺，吸入腎肝。呼吸之間，脾受其氣，則榮衛行陽二十五度，行陰亦二十五度，而周身之氣無過不及。若藏氣乘併，則榮衛不能循常，氣過周身失度，不能隨陰陽出入以成息，故促迫而喘。諸氣併上於肺，肺管隘，則氣爭而喘也。其始或因墜墮，恐懼，恐則精却，精却則上焦閉而氣不行，氣不行則留於肝，肝乘於肺，此喘出於肝也。或因驚恐，驚心，心無所倚，神無所歸，氣亂而氣乘於肺，此喘出於心也。或因渡水跌仆，腎氣暴傷，腎氣乘肺，此喘出於腎也。或因飽食過傷，動作用力，穀氣不流行，脾氣逆而乘肺，此喘出於脾也。圓參散主之。
若喘而發熱，頸脈皆動，日漸瘦削，由客熱乘肺，或因飲食失宜，氣不轉而氣急，悞服熱藥，火氣薰肺而逆，喘，頰赤咽燥，其脈細數，治屬骨蒸，小建中湯、天門冬湯主之。

圓參散

人參（一兩）　桑白皮（剉，炒，三兩）　大腹皮（剉，炒，一兩）　麥門冬（去心，一兩）　橘皮（洗，一兩）
吳茱萸（炒）　梔子（剉，炒）　芫花（炒）　附子（炮，去皮臍）　澤瀉（各半兩）
半夏麴（一兩）　訶子（炮，去核，半兩）　杏仁（去皮尖，研）　桂心（各一兩）　枳實（麸炒，去瓤，半兩）
白朮（半兩）

右爲細末，蓋汁煮糊爲丸如梧桐子大，米飲下三十粒，食前服。

小建中湯

芍藥（六兩）　桂心（三兩）　甘草（炙，二兩）

右爲散，每服五錢，水二盞，生薑三片，棗二箇，同煎至一盞，去滓，溫服。

天門冬湯

天門冬（去心，一兩）　馬兜鈴　百部（各半兩）

右爲散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓溫服。
若喘嗽時血出，四肢懈怠，脈浮大而沉，由腎氣上併於胃，氣道壅塞，血無所行，而散溢於脾，精不化上不勝下，脾之絡脈外絕，去胃外歸陽明，白朮丸主之。

白朮丸

麥門冬（去心）　人參　茯苓　白朮
生地黃（焙）　大豆卷（各一兩）　桑白皮（炒，二兩）　澤瀉

右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大，米飲下三十粒，食前服。
若病人不臥，臥而有所不安，則喘者，藏有所傷，精有所寄，故不得臥而喘，肺氣盛，脈滿大也，牡蠣散主之。

牡蠣散

用左顧牡蠣，文片色白正者二兩，先杵爲粗末，以乾鍋子盛，火燒通赤，放冷，研爲細末，每服一錢，濃煎鯽魚湯調下，不拘時，鯽魚重四兩者，一箇，去鱗肚，濃煎，煎時不許動。

若欬嗽逆倚息喘急，鼻張，其人不得仰，咽中作水雞聲，時發時止，由驚憂之氣奮而不散，肺氣鬱，或因過飽勞傷，氣上行而不能出於肺，復遇寒邪，肺寒則諸氣收聚，氣緩則息有所觸則發，經久則不能治，杏子散主之，及灸腎腧百壯。

杏子散

杏仁（去皮尖，麸炒黃色，研成膏）　麻黃（煎末，鄂分）

右研和，煎橘皮湯調二錢匕。

玉液散

人參　川芎　茯苓　桂心（各一兩）　馬兜鈴（半兩）

知母　貝母（炒）　杏仁（去皮尖）　萆薢（炒）　半夏麴（各一兩）

柴胡（去淨黃，一兩）　石膏（研，炒）　訶子（煨，各二兩）　橘皮（洗，一兩半）　麻黃（去根節，一兩）

白朮（半兩）　甘草（炙）　羌活（各半兩）

右為細末，每服三錢，水一盞半，生薑三片，棗一箇，煎至一盞，去滓，食前溫服。若喘息，肺鳴而嗽，由有所失亡，所求不得，氣鬱而肺熱，葉焦上舉，是謂肺痿，阿膠丸主之。

阿膠丸

天門冬（去心）　桔梗　生乾地黃（焙）　阿膠（蛤蟆，炒）　桑白皮（剉，炒）

麥冬（去心）　栢子仁（炒研，各半兩）　甘草（炙，二分）

右為末，煉蜜和丸如彈子大，每服一丸，水一盞，煎至七分，食後溫服。

嘔吐

論曰：嘔吐者，由清濁不分，中焦氣宿，若心下牢大如杯，或時寒時熱，朝食則暮吐，暮食則朝吐，關脈弦緊，弦則為虛，緊則為寒，虛寒相搏，此名為格，與關格同也，是謂反胃，青金丹、朴附丸主之。

青金丹

硫黃　水銀　木香（末）

右將硫黃、水銀二味同研，令不見水銀星子為度，合木香，再研，用生薑汁煮糊為丸如梧桐子大，米飲下三粒，食後服。

朴附丸

厚朴（去皮，剉作小塊子，各一兩）　附子（炮，去皮臍，剉作小塊子，各一兩）　生薑（八兩，去皮取汁）

右將二味，以薑汁同煮，盡汁為度，焙乾為末，酒煮和丸如梧桐子大，米飲下三粒，食前服。若心中溫溫常欲嘔，聞食吐酸，由宿寒在胃，不能運水穀，中脘成痰，其關弦，脈小而短，白朮丸、大半夏湯主之。

白朮丸　史氏指南方無橘皮。

白朮（三兩）　半夏（湯洗七遍，二兩）　橘皮（洗）　乾薑（各三兩）　丁香（一兩）

右為細末，薑汁煮糊為丸如梧桐子大，薑湯下三十丸，食前服。

大半夏湯

半夏（一升）　人參（一兩）　白蜜

右為末，每服三錢，水一盞，煎至半盞，加白蜜少許，食前服。

若心上汪洋嘈煩，頭目時痛，胷中不利，或嘔膽汁，大便或利或秘，喜渴，此中脘伏痰，旋覆丸主之。

旋覆花丸（見前熱證門）

若心下虛滿，不入飲食，時時欲嘔，嘔無所出，惙惙短氣，由他病差後，復為寒邪傷氣，氣寒則不能食，胃無穀氣以養，其脈微弱，大藿香散主之。

大藿香散

藿香葉（取心）　人參　茯苓　桔梗　木香

桂（取心）　白朮（各半兩）　半夏（湯洗七遍為末，半兩，薑汁和丸餅子，陰乾）　枇杷葉（十片，刷去毛）

右為末，每服三大錢，水一盞，炒薑絲一分，與藥同煎至七分，去滓，食前溫服。　劉孟容瑣碎錄名藿香湯。

若心下煩，不喜熱物，得熱即嘔，喜渴，由胃受邪熱，胃熱則氣濁，陰陽渾亂，其脈虛數，或細而疾，竹茹湯主之。

竹茹湯

竹茹　橘皮　甘草　半夏　赤茯苓

麥冬　人參　枇杷葉

右加薑棗煎，胃寒去竹茹麥冬，加丁香，實火去人參。

若心下悶亂，嘔吐不止，臥起不安，手足躁擾，水漿不下，由冷熱不和，邪正相干，清濁不分，陰陽錯亂，喜冷者，因熱，惡冷者因寒，名曰霍亂，其脈弦大者寒也，大理中湯、半硫丸主之。其脈數疾者熱也，小藿香散、青金散主之。

大理中湯　方缺。

半硫丸

半夏（湯洗七遍，焙為末）　硫黃

右研細，生薑汁煮糊為丸，米飲下三十丸。

小藿香散

丁香　枇杷葉（去毛）　乾葛　赤茯苓　甘草　藿香葉

右爲末。每服三錢。水一盞。生薑三片。同煎至一盞。去滓。溫服。

青金散方缺。

若卒然嘔吐。胷中痞悶。氣不下行。由飲食過傷。胷氣滯而不轉。胃中爲濁逆行。則吐。其脈沉疾。金汁丸主之。

金汁丸方缺。

若痛而嘔者。此寒氣客于腸胃。腸胃得寒。則聚沫。聚沫則痛。痛則氣逆。逆則津液反出而嘔。其脈緊細而滑。粳米湯主之。

粳米湯

附子（炮去皮臍。切片子。半兩。）　半夏（湯浸七遍。切片子。二兩半。）　甘草（炙。剉碎。一兩。）　陳粳米（半。二兩。）

右拌和。分作十二服。每服用水三盞。薑十片。同煎至一盞。去滓。溫服。

若因嘔而噦者。吳茱萸丸主之。

吳茱萸丸

吳茱萸（炒。二兩。）　橘皮（洗。二兩。）　附子（炮去皮臍。半兩。）　甘草（炙。剉碎。一兩。）

右爲細末。白麵糊爲丸如梧桐子大。飲下二十粒。食前服。

小便（附大便。）

論曰。小腸爲受盛之府。傳導水液。若始覺小便微澀赤黃。漸漸不通。小腹膨脹。由心經蘊熱。傳於小腸。小腸熱則滲於膀胱。膀胱而系轉。診心脈大而牢。用蒴藋散或石韋湯主之。

蒴藋散

蒴藋茶（一兩燒灰。）　滑石（半兩。研。）

右爲細末。沸湯浸服。或小便澀不通。點好茶一盞。入生油三兩點。飲之。

石韋湯

石韋（去毛。剉。）　車前子（剉。車前葉亦可。等分。）

右濃煮汁飲之。若腹脹滿漫不得好臥。屈膝。陰縮腫。此厥陰之厥。加赤茯苓。黃芩八兩。如前。

若卒澀小便不通。臍腹膨急。氣上衝心。悶絕欲死。由忍尿勞役。或從驚恐。氣無所伸。乘併膀胱。氣衝膀系不正。診其脈右手急。大葱白湯主之。

葱白湯

橘皮（洗。三兩。切。）　葵子（一兩。）　葱白（三莖。切。）

右以水五升。煮取二升。分三服。

固脬丸

茴香（炒。一兩。）　桑螵蛸（炒。半兩。）　菟絲子（揀淨。酒浸一宿。焙乾。二兩。）　戎鹽（炒。一分。）

右以水一盞。同煎取一半。去滓。分二服。

附子（炮去皮臍。半兩。）

右爲細末。煮糊爲丸如梧桐子大。飲下三十粒。空心服。

若小便純血。血下則凝。亦無痛處。惙惙短氣。由陽氣不固。陰無所守。五液注下。其脈散濇欲絕。而身冷者死。從容丸主之。

從容丸　史載之指南方。治虛勞溺血。加桑螵蛸半兩。炙。焦。酒糊爲丸。鹽湯下。

菟絲子（揀淨。酒浸一宿。別研。焙。）　肉蓯蓉（洗。切。）　鹿茸（去毛。蜜炙。）　乾地黃（等分。）

右爲細末。煮糊爲丸如梧桐子大。米飲下三十粒。空心服。

若大腸爲傳導之官。變化出焉。如大便不通者。津液燥也。慎無以熱藥。宜紫蘇丸主之。

紫蘇丸

紫蘇子（去皮。研。）　橘皮（洗。各二兩。）　知母（一兩。）

右爲末。用生薑汁調成稀膏。於重湯上煮。不住手攪。候可丸如梧桐子大。蜜湯下三十粒。

婦人科

四物加桂湯　治忽然寒熱。

川芎　當歸（洗焙。）　芍藥　地黃（焙。）　桂心（等分。）

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。史載之指南方內。無川芎。

淳藡丸　治先因小便不利。後身面浮腫。致經血不行。此水乘於血。名曰水分。

甜葶藡（炒。）　續隨子（去皮。研。各半兩。）　乾薑（一兩。）

右爲細末。熟漿肉和丸如梧桐子大。煎扁竹湯。下七粒。如大便利者。減葶藡、續隨子。各一分。加白朮半兩。食後服。

牡丹丸　治經候時行時止。或淋漓不斷。腹中時痛。其脈沉澀。由寒熱邪氣客於胞中。留而爲血瘀。當有所去乃愈。

大黃（蒸。）　桔梗（各二兩。）　甜葶藡（炒。各二兩。）　附子（炮。去皮臍。）　芎藭　椒汗（去目。炒。出汗。半兩。）　桂（去心。各半兩。）　茯苓　人參　蠐螬（去頭足翅。五十箇。）　細辛（去苗。兩半。）　牡蠣　厚朴（去皮。薑汁炙。）　吳茱萸（炒。）　牡丹皮　當歸（焙。各半兩。）　柴胡（去苗。）

小薊湯　治經候過多。遂至崩漏。色鮮明如水下。得溫則煩。至于昏悶。其脈數疾微小爲順。大者逆。由陰虛陽搏。爲熱所乘。傷于衝任。血得熱則流散。衝任不能收也。

小薊莖葉（洗。剉。研。汁一盞。）　生地黃汁（一盞。）　白朮（半兩。細剉。）

右以水一盞。同煎取一半。去滓。分二服。

人參白朮散　治婦人經候不來，身如病而無病，脈滑大而六位俱勻，謂之陰搏陽，有子也，精神如故，惡聞食臭，但嗜一物，或大吐時吐清水，此名惡阻，慎毋作他病治之。

白朮一兩　人參半兩　丁香　甘草炙各一分

右爲末，每服三錢，水一盞，生薑三片，同煎至七分，去滓，食前溫服。

秦艽散　治胎動不安。

秦艽　阿膠炒　艾葉炒各分

右爲散，每服五錢，水二盞，糯米百粒，同煎至一盞，去滓溫服。

白朮散　治妊娠面目腫如水狀。

橘皮洗　大腹皮　茯苓　生薑各半兩　白朮一兩

右爲末，飲調方寸匕，食前服。

兎血散　治難產，最要臨產服之。

臘兎血

右用蒸餅切片子，蘸血，陰乾爲末，煎乳香湯調服二錢。

半夏散　治胎死腹中，其母面赤舌青者是。

半夏湯洗七遍，薄切片，薑汁浸三日，炒乾。

右爲末，溫酒調下一錢，不能酒，用湯，亦治橫生逆產。

桃仁湯　治惡路頓絕，或漸少，腰重痛，下注兩股，刺痛如錐刀刺，此留血於經絡，不卽通之，大有痛處，必作癰腫。

蘇木　地黃　桃仁去皮尖，炒，各半兩　寇蟲去頭足翅，炒　水蛭炒，各三十枚

右爲散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓溫服，惡路行卽住服。

五香湯　治同前。

木香　丁香　沉香　乳香　麝香

升麻　獨活　連翹　木通各三兩　大黃一兩

桑寄

右爲散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓，食後溫服。

浚藥丸　治惡路方行，忽然斷絕，脹作寒熱，臍腹大痛，胸中如以針刺，此大有畜血，留於經絡。

當歸焙一兩　桂心　芍藥各半兩　寇蟲去頭足翅，炒　水蛭炒，各三十枚　浚藥一分　桃仁去皮尖，炒，一分

右爲細末，醋糊丸如梧桐子大，醋湯下三丸。

皁角散　治乳婦吹奶，由哺兒時鼻氣沖乳中，忽然腫硬痛，急手揉，服皁角散，活絡散，及敷藥，不卽治之。

結癰腫，能殺人。

皁角燒細研，一兩　蛤粉研，等分

右研細，熱酒調一匙，或半錢，急以手揉之，取軟爲度。

瓜子湯　治腸頭如以針刺，迎穀道，又因痔痛，小便如淋狀，時寒時熱，此由產時用力，氣併腸間，亦由陰虛，邪熱乘客，留聚腸間，熱結，恐成腸癰。　袁當時大方云，崔左丞服有效。

瓜子一兩　薏苡仁炒，四兩　桃仁去皮尖　牡丹皮各三兩

右爲末，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓溫服。

重刊宋本洪氏集驗方序

此集驗方五卷。南宋洪文安所手輯。文安名遵字景嚴。皓之仲子。以博學鴻詞中選。起家爲祕書省正字。孝宗朝。官至資政殿學士。方遵登制科時。高宗因皓遠使。推恩卽命遵入館。詞科中選卽入館。蓋自遵始。非故事也。宋祖宗之朝。君相以愛民爲務。官設惠濟局。以醫藥施舍貧人。故士大夫亦多留心方書。如世所傳蘇沈良方。許學士本事方之類。蓋一時風尙使然。夫古人立方各有深義。今世庸醫不知其理。妄行增損。遂有學醫人費之誚。憶孫淵如先生有言。今世外科每奏奇功。而內科不能者。外科用古方。而內科不用古方之故也。余往日刻新安程氏易簡方論一書。亦欲世人稍知古方本義。今復翻此書之刻。殆與余有同心也夫。吳縣石韞玉序。

重刊宋本洪氏集驗方後敍

洪氏集驗方。惟延令李氏書目有之。知宋板外絕無流傳之本。余故從宋本錄副。今始付雕。其書五卷皆全。無序有目。而目共五葉。其一號二號四號。係舊時鈔補。蓋以烏絲欄細者別之。此用汲古鈔補宋板例也。本書字句間有不同。如黃牛角鰓或有作腮者。或云一枝。或云一箇。又慢火或作熳火。又黃者狀如箭簳長二三尺。頭不又者。又疑叉之誤。又洗淨寸截。搥破□壁以鹽湯潤透。□係蠹蝕處。尙有系勞可審。疑□是縣字。以意補之。其餘版心刻工姓名有蠹蝕去者。空之。無足重輕。不復補寫。以上各條。皆隨舉一二。以見宋刻原本如是。非涉重刊。而有訛舛脫漏也。大抵方書之字。大有關係處。在藥名。分兩。法製。諸端。其餘異同可勿深論。此書刊成。求序於獨學老人。有札示余云。昨所言交感丹。恐疑用香附太偏重。因查敝處所藏方書。乃是香附一個。配茯神四兩。炒鈔是香附一斤。竊意香附一個。無一斤重之理。恐係抄者之誤。祈再查原本。此固愼重起見。然余卽以此方降氣湯。牙藥。二條證之。一用半斤。一用五兩。是遞減用之。原方一斤非誤。恆宋之癖如是如是。幷附著之。以質諸深於醫理者。一正其是非云。嘉慶己卯孟秋。吳縣黃丕烈敍。

洪氏集驗方目錄

治痢茱連丸
大交感丹
瓊玉膏
鐵甑交感丹
化毒排膿內補散
雲實膏
又發背灸法
治甲疽努肉
又勝冰散
治癰疽立効方
五解散
治腸風下血
肉豆蔻散
混元胎丹
一粒金丹
降氣湯
癰疽靈方
治癰疽發背方
治背疽參藥
治癰疽經驗方
又應補內托圓
蕊蔕茸附圓
治痢育腸圓
比金散
砒礜散
還少丹
神妙六逸丸
牙藥
治諸般瘡毒
發背灸法
內消發背
治癰疽緩命膏
又聖柳散
鹿茸世寶圓
硫附鹽礜圓
治腸風痔疾

阿魏良薑圓
水陸二仙丹
虛風圓
丁香草藥散
灸結胸傷寒
良薑湯
治胎衣不下
普救散
治舌衄
蕤蔕圓
治沙石淋
秘精圓
治痔烏金散
治腰痛
治豆瘡倒攝
治腸風
接骨方
癰藥
治傷風
灸勞法
治腰痛附牛圓
治癰疔
治鼠衄
治著龍腦散
治風牙蛀牙疼
治牙搖牙宣
治冷漏
治凍死
腰茸圓
神應乳香圓
四斤圓
神仙透空圓
治風烏荊圓
治氣塊刺痛
安腎圓
治喉口熱毒
治舌腫
治乾癬
治毒蛇傷
治傷折骨碎
治傷風倍芩圓
治虛勞秋石丹
治喉閉二方
瘡藥方
治漏瘡
治喉閉
治脚腫
治頭風頭痛
治爛緣風眼
治脚氣灸法
治諸顱
治風牙疼
治五種牙疼
治暴嗽不止
治喉閉
治暍死
人參大溫中圓
神妙驅風散
妙應圓
沈香蓽澄茄湯
烏金散
冒服散子
治傷折神授散
肉豆蔻湯
治湯火傷
治淋
治冷積降氣
治疝氣偏墜
治風毒氣眼
治諸淋
治腰痛
治癬
治外風入瘡口
治盜汗
治脚腫甘豆湯
茶牙湯治偏正頭疼
治髓瘡
治蛇毒
治盜汗
治蛀牙疼
治風蛀牙破者
治惡瘡久不較
治咽喉腫痛
治溺死

治火燒湯潑
治小腸氣
萬靈圓
治妊娠下血腰痛
治滑胎易產
產後大便不通
治小兒泄瀉
肥兒圓
助胃膏
羌活膏
沒石子圓
誤吞釘箭等物
誤食穀芒
治瘡瘍金蟬散
墜涎圓
肥兒圓
治湯火瘡
治產後百病
烏金散
治產後煩狂
產後羊肉湯
順經散
金液丹
神麯豆蔻圓
治麻豆瘡膿水
大天南星圓
誤吞珠銅鐵方
封顖
治口瘡消風散
治頭瘡如聖散
辰砂圓
觀音散
治鼻甲
催生如聖散
救生散
催生藥
產後防暈方
九寶飲
南州白丸子
木香分氣圓
辰砂安驚圓
治臍風撮口法
誤吞錢方
治吐
治脚雄朱散
治喉閉急風散
四君子圓

洪氏集驗方卷第一

治痢（先忠宣傳此方，屢有神驗。）

黃連、吳茱萸各二兩，如常法，揀洗焙乾，黃連剉令寸斷，同一處炒，俟香熟，分爲二，各用醋糊，爲丸如桐子大。若小兒，則如桑豆大。悉赤痢，則服黃連；白痢，則服茱萸；赤白，則并服之。赤先白後，則先黃連而後茱萸；赤多白少，則二分黃連，二分茱萸；反是亦如之。每服五七十粒至百粒，服之以愈爲度。陳米飲下。（大孝張黃連治白，黃連治赤也。黃連用鹽水者。）

肉豆蔻散，治赤白痢，無藥可治者，其效如神。上吐下痢者亦治。（已下三方，韓子溫少卿傳。）

肉豆蔻（切片子，炒黃色。）　櫻粟殼（搗碎，用蜜拌，炒黑黃。）
甘草（切碎，炒黃黑色。）　乾生薑（切細，炒黑。）

右等分，搗羅爲末。每服六錢，如赤痢，多加甘草一寸；炙黃，同煎。若白痢，多加炒生薑一塊，同煎，用水二大盞，煎至一盞半，連口服。不計時候，卻將兩服滓再煎服。無不愈者。

祛瘧散，熱多寒少者。一服無不驗。（予家每合以濟人，一服即愈。）

治時行寒熱，諸藥不效者。今有夢中神傳藥方，如有此疾者，依方服之即愈。如所感深重，一服未愈者，

定毒發一次更不再來。

好川白蜡蛇（蛇）

好高良薑（剉碎微炒）

二味各碾爲極細末。

右各秤等分。勿令偏些。再入乳鉢內。一處研勻。細羅過二味。病大者共抄三大錢。病小者共三小錢。於當發日日未出時。以豬腦二枚。勿用白色者。劃開取汁。與藥調勻。再用熱酒少許。打勻。通口猛作口嚥。更以酒少許送下。急嚥口。以甜物壓之。一日不得喫別藥。忌大寒物（其腦須是豬腦。其餘母豬腦不中。江南用之。就猪）

大交泰丹（偏毒未分陰陽。不可服）

治陰陽二毒傷寒。或因下早亡陽。或致結伏胸膈。四肢厥冷。脈息俱無。心燥如火。或因冷物傷脾。夾臍痛生硬。入胃中滿痞塞。潮發寒熱。并治霧胃噦逆。霍亂吐痢。小腸疝癖。脇肋氣痛。但是陰陽不順惡候。傷寒壞證。並皆治之。每服一粒。炭火內煅通赤。良久取出。放冷。細研如粉。米飲一盞。煎七分。溫服。不拘時候。隔半時辰。再進一服。其效如神。兼治小兒痘疹倒陷。依法服半粒立愈。

金星石　　大陰玄精石

銀星石　　雲母石（白色片子）

代赭石　　桂府滑石

禹餘石（已上各一兩）　　寒水石（吉州者一兩半）

不灰木（一兩色青黑性軟者）

右件九味。入磁瓶子。炭半秤煅。候火耗一半。取出。放冷。研爲細末。糯米粥爲圓如彈子大。候乾用。（孫醫證驗）

混元胎丹。乃陰陽始生之物氣。精血初生之英華。蓋人元宮眞氣所化。修眞之士服餌補漏。壯氣固神。益髓通神明。延壽命。增益道涯。超範圍外內丹之基。具服餌方如後。（久無嗣息者。服此有驗）

以首兒衣（二八月者不用。教時。連帶中元血塊）

用長流水淨洗。控乾。入甆瓶中。下無灰法酒三大勝。腦子麝香（圓力下之。多止一錢。或半字）以紙封瓶口。下用文武火煅。候酒將盡。取出。再入酒三勝。依前煅。卻用竹篦或金銀篦不住攪。以慢爛糜似粥模樣。待冷。取入砂盞內。細研如粉。別入外料。

人參（二兩）　　茯苓（二兩）　　乳香（半兩）

朱砂（半兩。水飛過。濕乾取淨）　　山藥（四兩）

已上並爲細末。人參等須擇佳者。

右用上件藥末。入於所煅藥內。如乾時。更用元煅酒。旋旋添。拌勻。一處攪搜。篩元梧桐子大。慢火焙乾。

每日空心五十粒。加至一百粒。用溫酒鹽湯下。良久用甜淡飲食飽壓。逐日薰味中減少五味。（甜鹹淡等物）服至五七日。微覺小腹連腰沈重。不須疑慮。乃是藥力攻元氣相補助如此。

西川羅浮脚仙遺少丹。大補心腎脾胃一切虛損。神志俱耗。筋力頓衰。腰脚沈重。肢體倦怠。血氣羸乏。小便昏濁。（此與叔數文傳）

乾山藥　　牛膝（酒浸一宿。焙乾。各一兩半）

山茱萸　　白茯苓（去皮）

五味子　　肉蓯蓉（酒浸一宿。焙乾）

石菖蒲　　巴戟（去心）

遠志（去心）　　杜仲（去麤皮。用生薑汁并酒合和塗炙令熟）

楮實　　柏上茴香（已上各一兩）

枸杞子　　熟乾地黃（各半兩）

右搗羅爲末。煉蜜入蓯肉爲圓如梧桐子大。每服三十圓。溫酒鹽湯下。日進三服。皆食空時。（如早食併服之無妨）至五日覺有力。十日精神爽健。半月氣力稍盛。二十日。目明。一月夜思飲食。冬月手足常暖。久服無毒。令人身體輕健。筋骨壯盛。怡悅難老。更看體候加減。如身熱。加山栀子一兩。心氣不寧。加麥門冬一兩。少精神。加五味子一兩。陽弱。加續斷一兩。常服。齒牢。永無瘡癰。婦人服之。姿容光悅。去一切病。治子宮久冷。

錢鼎先生神仙秘法瓊玉膏（陳峰叔驗此藥有驗）

新羅人參（二十四兩。若一千下爲末）　　生地黃（一秤十六斤。九月採搗）

雪白茯苓（四十九兩。未白者下爲末）　　白沙蜜（十斤）

右件。人參茯苓爲細末。蜜用生絹濾過。地黃取自然汁。搗時不得用鐵器。取汁盡。去滓。用藥一處拌。和勻。入銀石器。或好甆器內。封用。如器物小。分兩處物盛。用淨紙二三十重封閉。入湯內。以桑木柴火煮六日。如連夜火。卽三日夜。取出。用臘紙數重包瓶口。入井內。去火毒。一伏時取出。再入舊湯內。煮一日。出水氣。取出。開封。取三匙。作三盞。祭天地百神。焚香設拜。至誠爐心。每晨朝。以二匙溫酒化服。不飲者。白湯化之。此膏塡精補髓。腸化爲筋。萬神具足。五臟盈溢。髓實血滿。髮白變黑。返老還童。行如奔馬。日進數食。或終日不食。亦不飢。關通強記。日誦萬言。神識高邁。夜無夢想。人年二十七歲以前服者。可壽三百六十歲。四十五歲以前服者。可壽二百四十歲。六十三歲以前服者。可壽百廿歲。六十四歲以上服之。可壽至百歲。服之十劑。絕嗜慾。修陰功。成地仙矣。一料分五處。可救五人羸疾。分十處可救十人勞瘵。修合之時。沐浴志誠。勿輕示人。

一粒金丹。治中風癱瘓。口眼㖞斜。涎潮語澀。渾身疼痛。應一切風疾。悉皆治愈。得之者當自寶。

大川烏頭炮去皮臍　大黑附子炮裂去皮臍　新羅附子炮裂已上各二兩　五苓脂一兩　白殭蠶一兩去絲炒　白蒺藜一兩去刺炒　沒藥研一兩　朱砂研一兩　白礬枯一兩　麝香淨肉研半兩　細香墨研一兩　金箔二百片

右件前六味同爲末。後四味研匀。同合和合匀。用井花水一大盞。研墨盡爲度。將汁搜和。用杵臼內搗五百下。和圓如彈子大。金箔爲衣。窨乾。每服一粒。用生薑一兩。去皮。擦取自然汁。將藥圓於汁內磨化盡。用無灰熱酒一大盞。同浸化。溫服。更量性多少。喫溫酒一二升。投之。以助藥力。用衣被蓋覆。汗出爲效。痛勢重者。日進二服。不拘時候。

張天師留傳老換少壯。輕身強記。駐顏悅色。髮白變黑。開心中迷忘。聰明耳目。神妙六逸圓。賀州王承務方。予少卿若樸傳。

石菖蒲九節者。餌開心孔。聰明耳目。益智不忘。出青城。治耳聾。高志不老。

兎絲子補不足。益氣力。堅筋骨。主口苦燥渴。久服輕身延年。

地骨皮主五藏邪氣。熱消渴。補益眞氣。久服輕身。堅筋骨。不老。耐寒暑。

遠志補不足。除邪氣。益精神。注智。聰明耳目。去皮膚中熱。久服輕身不老。好顏色。益心。

生乾地黃填骨髓。長肌肉。去骨中宿食。補五藏。通血脈。益氣力。利耳目。

牛膝能助人筋骨。健行。治腰疼。益眞氣。令髮白變黑。久服輕身不老。耐寒暑。

右件藥各用二兩。先擣到碎。用酒浸之。春夏五日。秋冬七日。慢火焙乾。搗羅爲末。煉蜜爲圓。如梧桐子大。每服空心溫酒下三十圓至五十圓。百病俱退。服至一百日。老卻少容。服至一年。髮如漆。過二年。顏如童子。三年骨髓堅實。四年鬼神自散。精神爽清。合藥并服時。忌鷄犬見。所傳不得過十三家。潞州杜助教所傳。舊仙翁六神圓。用助六味。與此方同。

鐵甕申先生交感丹。倫居易同那傳。

世人中年精耗神衰。常言百事心灰。蓋緣心血少。而火不能下降於腎。氣憊而水不能上升至心。中焦隔絕。榮衛不和。所苦者上則心多煩悸。中則寒痞飲食減少。下則虛冷遺泄。甚至於陰痿不興。臟氣滑泄。愚醫徒知峻補下田。非獨不能生水滋心。而建僞失眞。立見衰悴。夭折之由。當自此始。悲夫。所處此方。廣濟迷流。然不可忽此藥品。志心服之半年。漸屏去一切暖藥。又不可恃此而馳嗜慾。然後力習祕固泝流之術。其神效不可殫述。實之天地。切勿妄傳。居易之顯通奉遺訓云。予年五十一歲。遇鐵甕申先生。授此祕術。酷志行持。服食一年大補。半日所服暖藥。一切屏盡。而飲食嗜好不減壯歲。此藥力之功大矣。今年八十五。享天然之壽。瞑目無憾。獨此藥得之。理當普示羣生。同登道果。藥後有湯與牙藥。可同用之。

伏神四兩　香附子一斤去毛。用新水浸一宿。炒令黃色。

右爲末。煉蜜圓如彈子大。每服。使晨一圓。以後湯嚥下。

降氣湯

伏神二兩　香附子中斤。炒浸如前。　甘草一兩半。炙黃。

右爲末。每服二錢。沸湯點下。

牙藥

香附子五兩。

右以生薑三兩研。和滓汁。浸香附子三夕。炒焦黑。存性。爲末。以青鹽二錢。拌匀。揩牙。

洪氏集驗方卷第二

化毒排膿內補散丞相兄刊是方於歙州。予歷以施人皆効。

治一切癰疽瘡癤。未成者速散。已成者速潰。敗膿自出。無用手擠。惡肉自去。不犯刀仗。服藥後疼痛頓減。此其嘗試之效也。歙丞胡權初得方於都下異人。時有苦背瘍者。七十餘頭。諸藥遍試不效。因出是方示之。衆醫環立相目而笑曰。是豈癰疽所用藥耶。固謂之曰。古人處方自有意義。觀其所用藥性平和。縱未能已疾。必不至壞病。服之何害。適治藥與服。以熱酒半升許。下藥五六錢。少頃痛減七分。數服之後。瘡大潰。膿血流迸。若有物自內托之。服之經月。瘡口遂合。若未嘗有所苦者。又有苦腹疾者。其痛異常。醫者莫曉。時意此藥頗能止痛。試以餌之。當日下膿二三椀許。痛亦隨止。乃腸癰也。又一老人忽胸間發腫。根脚甚大。毒氣上攻。如一瓠然。斜插項右。不能轉動。服藥明日毒腫既散。餘一小瘡。如粟許大。又明日帖然如故。又一人發臍。疑此方不服。既殞於庸醫之手。明年其子復苦此。與父之狀不異。因憑父之失。縱酒飲藥。遂至大醉。昔日發臥地上。酒醒。病已去矣。又一婦人發乳。痛腫疼痛。不可堪忍。自謂無復生理。又二婦人股間發腫。大如杯椀。服此皆脫然如失。蒙濟者不可悉數。姑敍大略。以示未知此方者。大抵癰疽之作。皆氣血凝滯。風毒藝結所致。治之不早。則外壞肌肉。內攻臟腑。去生遠矣。詳味

此方其所用者皆發散風毒流行氣血排膿止痛生肌長肉等藥五毒不試而坐收痊醫十全之功其可尚已今校本草於逐味下聊疏藥性溫涼與所治療雖處方妙指不可遽曉庶倉猝之際可以見其用藥大意而服之不疑

人參　微溫無毒主補五臟除邪氣通血脈破壅積除心腹鼓痛骨脇逆滿今以新羅者爲上禀風結瘕實滋潤不洗淨去蘆浮切焙乾

當歸　大溫無毒主溫中止痛除客血內寒客氣虛冷補五臟生肌肉治一切風一切勞破惡血養新血血又外傷金瘡等方皆用大稀不足洗取立効之藥凡氣血昏亂者服之即定前寇使氣血歸所當歸制名之義宜出於此今取川中來者揀大片如馬尾狀溫潤甜辣芬香者溫水洗淨切焙乾

黃耆　微溫無毒主補虛損排膿止痛五癰閉惡血補丈夫虛損五勞羸瘦煩悶熱渴活血以上來者爲勝狀如新敗蘆長二三尺頭逐五癰者洗淨寸截細破絳壁以鹽湯浸透用蜜蜜湯蒸乾

芎藭　溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣拘急除腦中冷痛面上游風治一切風一切氣一切血一切勞補中益神通利五切勞損諸寒心腹堅痛中惡卒急血氣痛經脈軟弱半身不遂壯筋骨興衆脉破癥結治腫痛發背排膿消癰養血長肉以川中來者爲上今用撞芎大塊者浮洗切焙

防風　溫無毒治心腹痛四肢拘急經脈疼痛風虛五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脉排膿新香者洗淨切焙

厚朴　大溫無毒主中風寒熱血痺死肌溫中下氣去留熱止煩滿厚腸胃去結水破宿血消化水穀止五藏一切氣痛宜用梓州來者肉厚而色紫揩之油出去粗皮切薄汁盡一宿煨熟焙燥切勿用杜朴

桔梗　微溫有小毒主胸脇痛如刀刺腹滿肠鳴利五藏除邪氣補血氣除寒熱破血消積止心腹堅痛補內脏堅實益氣利胸中寒肺脉數咳嗽喉塞不通時出濁唾腥臭吐膿如腸米

白芷　溫無毒破宿血養新血治乳癰瘡腫排膿止痛生肌

桂　大熱有小毒一曰溫無毒主補中利肝肺氣去心腹寒熱補五勞七傷通九竅利關節破痰碎癥瘕消腫除血痺筋骨生肌肉益厚者宜入治藥及下部藥藥者宜入治頭目散散藥今宜用巴蜀者皆用四兩以來新者別煎方入

甘草　平無毒主益脾寒熱邪氣堅筋骨長肌肉解毒溫中下氣倍力生川

右十味選藥貴精皆取淨膩焙極燥方秤人參當歸黃耆各二兩餘各一兩除桂外一處爲細末入桂令勻每服自三錢加至五六錢熱酒調下日夜各數服以多爲妙服至瘡口合更服爲佳所以補前損杜後患也不飲酒人濃煎木香湯下然不若酒力之勝也或飲酒不多能勉強間用酒調并以木香湯解酒功效當不減於酒也

神授靈疽靈方　唐呂四娘遇胡僧授此方沈存中良方備載其事

白麥飯石　顏色黃白類麥飯者實作臼者尤佳次火燒赤醋中浸之十遍止爲末

白斂末　與石膏分

鹿角　三二寸燒之不用白殺者凡帶腦骨者即非白殺炭火燒之烟盡爲度搗爲末倍前二味

右並搗篩令細取多年米醋於鐺中煎並令魚眼沸即下前件末調如稀餳以篦子塗傅腫上只當瘡頭留一指面地勿令合以出熱氣如未膿當內消若已作頭當撮小者日久痂甚肌肉損爛筋骨出露即於布上塗藥貼之瘡上乾即再換但以膏中不穴無不差瘡切忌手觸宜戒之劉夢得傳信方亦載

治乳癰發背諸般瘡毒丹陽伯傳

金銀花　一名忍冬草

右採葉研爲末傅瘡口花五出而白微香蒂帶紅色野生莖葉如蘩而青花開四瓣附蒂清香治背疽得其方用老翁鬚後在金陵聞醫王琪善治癰瘡云江四瓣附蒂清香治背疽得其方用老翁鬚後在金陵聞醫王琪善治癰瘡云江四瓣附蒂清香治背疽得其方用老翁鬚後在金陵又杜醫治癰瘡以二萬錢活一人方用千金藤又嶺國尉王子駿傳一方用金銀花海州士人劉純臣傳一方用金銀花海州士人劉純臣

靈寶方治一切癰疽腦疽發背等疾楊池州傳云是方得之異人和王疏此藥前後活數百人甚有神驗

大麻葉十枚　隔二三年陳者盡去其皮留麻子約有半升許用砂盆研細如粉

新胡桃十枚　不油者溪去麻研細如粉

滴乳香十塊　如大指頭大乳鉢內研細如粉

右用白沙蜜十兩同前藥於銀石器內極慢火熬三時辰其稠如飴糖多合少合准此每服二匙無灰酒半盞調下不拘時候甚者不過兩三服其效如神

治癰疽發背初覺毒氣攻緊赤腫焮痛方　行在金翰林傳

犀角　藥一兩

川升麻　一兩

赤芍藥　一兩

甘草　一兩

大黃　二兩微炒

玄參　一兩

黃耆　一兩

麥門冬　一兩去心

當歸　一兩

右爲麄末每服三錢水一盞煎八分去滓不計時

發背灸法　郭延圭知驗傳

先用蠟線度左手中指頭至手掌下橫紋止其橫紋有三兩條當以長而分明者爲正卻將所度蠟線自尾閭骨取中逆量至脊穩骨如度之長以墨記之次以蠟線取中指中節量一寸中指中節兩頭橫紋多當側取橫紋中長而分明者爲正卻將所量蠟線橫於墨點處每邊各量一寸朱點記之此正灸穴處前以墨處乃用取中非灸穴也視背疽發於左則灸右發右則灸左甚則左右皆灸至三十壯而止婦人則用右手中指取度其灸法與男子同婦人妳癰凡發背發肋發腦發腿之類不論男女皆可灸郭云自得此法救人不可勝計有親戚姓陳者得此疾其妻兒告急而陳苦不之信迫不得已灸之才十壯其紅腫處漸消於是欣然聽命再灸二十壯覺熱毒之氣從腫處下如以手拓從尾閭骨發散

陳至今無恙。又云莊姊忽背間痒痛。偏背以行。問知其狀。使以法灸。隨手即愈。如是非一。不能盡記。

發背灸法（羅子路悉札傳）

男左女右。以手中指。自上至手盡處第一路爲度。卻用此去自尾閭骨盡處。去處點定穴。卻用中指中間一節爲度。自穴分左右。背左處發則灸左穴。右亦然。止三十艾。甚則左右穴皆灸。雖人乳癰。亦用此法治之。

治背疽穿藥（童師尉傳）

龍遊有忠背疽。已潰如椀面大。視五臟俱黃。薄膜耳。自謂必死。有用大鯽魚一枚。刳去腸臟。以羯羊糞實其中。烘焙焦黑。極乾燥。研爲細末。乾穿之。瘡口遂收。至今無恙。

內消發背

舍仁（三七粒）　巴豆（三七粒。去油舍殼）　硇砂（半錢）　乳香（半錢）

右將上件藥。一處研細。次用雜棗三七箇。去皮核。研碎。又用丁香三七粒。班茅三七箇。烏梅三七箇。去核。三味同爲末。通前藥拌勻。用餅藥麵十文。生麵十文。以冷水搜。裹藥在內。慢火煨一日。莫令燒過。候藥熟。取出地上。將盆蓋覆。出火氣。然後去麵。只取藥細研。入少許。燕餅末。滴水。爲圓如菉豆大。老者七粒。壯者十粒。旋入甘草少許。用馬蘭酒吞下。春用馬蘭苗四兩。生者。秋後用馬蘭根白芽四兩。研細。同酒半升。研。去滓。吞下。如不飲酒。蜜水亦可。只可三服。

治甲疽努肉裹甲。膿血疼痛不差（出醫苑）

膽礬（洗）

右先剔去甲中肉。傅藥指上。縱有努肉。才傅。即乾落。

治脚毒發背。一切癰疽經驗方（鄱陽都諸分因請大仙尚此方。徐綱鏤板印施。便癒。鄱陽皆治）

橫紋甘草（一兩。炙乾。爲細末）

右分爲三服。無灰熱酒調。一服。如人行一里。再一服。三服併喫。鄱陽徐綱。忽患右足赤腫。三日不能履地。醫治無效。才服此藥。須臾之間。即能移步。再服全愈。

治脚毒發背。一切癰疽奪命膏（趙教授得之金州醫。嘗有神驗。已下三方。次第用之）

麻油（四兩。熬二沸）　石蟹（一枚。燒。米醋泽。才黑。又燒。碎爲末）　防風（一兩。切。焙）　蛤蚧（一對。炙存性）　燈心灰（一分）　螟蛉（一條。燒存性）　全蝎（七箇。燒存性）　血竭（一分。別研）

黃連（半兩。去蘆。切。焙）　**當歸**（半兩。切。焙）

右件爲末。用文武火熬麻油。滴水中不散。次入乳藥一處。急用柳枝不住手攪。候滴入水中成珠爲度。候極冷。貼瘡如常法。

又勝冰散

防風（半兩。焙）　當歸（半兩。焙）　滑石（一兩。研飛）　乳香（半兩。別研）　地龍（半兩。焙）　馬牙硝（半兩。研。各取末）　螺青（一兩。研）

右八味。一處和勻。用新汲水調。塗腫處。不可令稀。時時塗之。勿使至乾。

又膿痛內托圓

當歸（一兩。焙）　赤芍藥（一兩。焙）　麝香（一分。研）　人參（半兩。焙）　血竭（一分。研）　瓜蔞根（二兩。火煨存性）　茵陳（半兩。焙）　沈香（半兩。焙）　大黃（一分。焙）　全蝎（七枚。炙存性）

右件十味。和勻爲末。煉蜜圓如彈子大。每服一粒。乳香湯化破。服之。或嚼喫亦得。不拘時。

又聖柳散

苦芎（四兩。米泔水浸一宿。焙）　連翹（一兩。焙）　甘草（一兩。炙）　大黃（半兩。切）　人參（半兩。切）　赤茯苓（半兩。切）　黃芩（二錢半。存性）　梔樓（半兩）　白芷（一分）　枳殼（一兩。麩炒。去白）　南木香（一兩。切）　益智（一兩。去皮。切）　白芷（半兩。焙）　苦參（一兩。切）

右件爲細末。如渴時。加牙硝半兩。別研。入。每服二大錢。水一盞。柳枝七寸。同煎至八分。去滓。溫服。不拘時。

初發。即用奪命膏貼。如胸膈痛悶。大腸祕結。即用膿痛內托圓主之。如四邊赤腫日增。即用勝冰散主之。如煩渴不已。疾勢轉增。即用勝柳散。此疾淺深治法次第也。忌鷄肉濕麵。疾愈。半年。方可食。

治疔疽立效方（小兒暴月頭額生瘡，亦可用。）

生水蛭（一名馬蟥，取數枚，貫綿水中，用乾艾之，冬月蟄於積水邊，或田塍水道邊，掘土取之。）

古用薄紙一片，剪圓如瘡大，仍看瘡膿頭有幾箇，其紙對膿頭，作小眼，搭在瘡上，將水蛭着在紙眼處，每一膿頭用一水蛭，要得先嗜去膿，其痛立止。如無膿頭，即以手指按之，覺發熱處是也，或用茶末，以水調塗瘡上，看先乾處，即點記，如不能辨，即着在中間，如膿頭只一箇，而赤暈稍大，即近中處，加用水蛭，如膿血嗜盡，痛定腫退，可用膏藥貼之。

紹興中，汀州黃守貳疽發肩背之間，醫藥不瘥，用水蛭立效，因就寢，蚤被，稍緩，睡覺，衣被皆濕，以燭視之，乃瘡口自出血也，（水蛭嗜血，不曾貼膏藥，自出。）急令取池中藕節處泥，抹瘡口，其血立止，按本草云，水蛭攻瘰腫毒腫，取十餘枚，嚙病處，取皮皺肉白無不差，冬月中無蛭虫，地中掘取，暖水中養之，令動，先洗去人皮鹹，以竹筒盛蛭，繫之，須臾便咬，血滿自脫，更用飢者。（張仲欽運使傳云紹興壬申歲，浙西江東親目其事。）

洪氏集驗方卷第三

養脾丸附圓平補眞元，益養脾腎，固精壯氣，暖胃思食，（晉府王翰林方，丞相兄舊著，脚氣自服此藥，十餘年不作。）

鹿茸一兩（先用草燒去毛，切作片子，用酥炙令黃熟爲度。）
菟絲子六兩（酒浸一宿，炒令乾，搗作餅子，焙。）
熟乾地黃二兩（炒焙。）
川五味子一兩。
白茯苓一兩。
補骨脂一兩（炒。）
茴香一兩（炒。）
沉香一分。
丁香二錢（不見火。）
茯苓四兩（酒浸一宿，切作片子，焙乾。）
牛膝二兩（酒浸一宿，切焙。）
眞烏藥一兩。
附子一兩（炮去皮臍。）
天麻一兩。
葫蘆巴一兩（炒。）
乾漬木瓜一兩。
木香一錢（煨。）

右件，搗羅爲細末，酒糊爲圓如梧桐子大，每服三五十圓，空心，臨臥，米飲溫酒鹽湯下。

鹿茸世寶圓，諸虛不足，心脾氣弱，腹脇脹急，腸鳴泄瀉，腹疼，手足厥逆，頑痺，中滿，惡心，頭疼怯寒，肢體酸痛，飲食少思，氣短乏力，驚悸自汗，並能服之，用藥如下。（晉府王翰林方。）

鹿茸酥炙。
白朮炒。
椒紅炒，出汗。
萆薢酒浸，炒。
肉豆蔻煨，焙。
牛膝去蘆，酒浸一宿。
沉香。
附子炮，去臍。
陽起石燒。
成煉鍾乳粉
人參去蘆。
川當歸炒。
白茯苓
巴戟去心，已上各一兩。

右件十三味，依法修製，並爲細末，次入鍾乳粉，拌勻，煉蜜爲圓如梧桐子大，每服四十粒，鹽飯飲，或鹽湯送下，食前一日三服。

五解散，治傷風感寒，或內傷生冷，頭目昏痛，身體壯熱，胸膈不快，乾嘔惡心，祛風怕寒，體虛自汗。

藿香葉一兩（去土。）
人參一兩。
白朮一兩。
半夏一兩（湯洗七遍。）
甘草一兩（炒。）
白茯苓一兩。
陳橘皮一兩（湯浸一次。）
厚朴二兩（去麄皮，用生薑自然汁塗炙，令黃色爲度。）

右件同搗爲麤末，每服五大錢，水一盞半，生薑七片，棗子二枚，煎至七分，去滓，溫服，不拘時候。

育腸圓，治遠近一切赤白痢，實腸胃，進飲食。

當歸一兩。
訶子皮炮，半兩。
烏梅肉一分。
肉豆蔻仁半兩（裹米炒，以裹爲度。）
黃連去鬚，一分。
櫻粟半兩（炒黃黑色。）

右爲細末，蜜煉熟圓，大如菉豆許，每服十五圓，溫陳米飲，食前。（平江辛大丞孟傳，有加芎者尤妙。）

硫附鹽礬圓，治經年久病，腸風下血不止，虛弱之甚者，一服見效。（已下二方，上官產成駐泊陸。）

附子一兩（炮去皮臍，別件爲細末。）
綠礬四兩（用瓶子燒，直之，火煅令赤，入鹽一合，蘸黃一兩，同研令勻，爲極細末。）

右件二味藥末，同合一處，令勻，以粟米粥爲圓如桐子大，每日空心，用生地黃汁吞下，溫酒米飲亦得，每服三十圓。

治五種腸風下血，上廁蹲前有血名外痔，糞後有血名內痔，大腸不收名脫肛，穀道四面有努肉如竹名痔，痔頭上有孔腸出名漏，並皆治之。

黃牛角鰓一枝，搥碎。　蛇脫皮一條，白者。
猪牙皂角七莢。　穿山甲一片，七寸。
硇砂一兩。

右件五味，入瓷瓶子內，以黃泥封固，候乾，先以小火燒令煙出，後用大火煅令通赤爲度，取出攤開，候冷，搗羅爲細末。患者先用胡桃一箇，分作四分，一分，臨臥時細研如糊，溫酒下，便睡，先引出蟲，至五更時，以溫酒調下藥末三錢，至辰時更進一服，久年不過三服，立效。

比金散，治腸風下血方，及治痔漏，又名立效散。饒州周道太丞傳。

蝟皮一箇。　皂角刺二兩。
臨藤子一箇，去殼，細碎，別研爲末。　猪牙皂角一兩。
白礬半兩。

除臨藤子外，右四味入瓷瓶內，鹽泥封固，候乾，先以小火燒令煙出，方用大火煅令煙盡爲度，取出攤冷，杵羅細末，入臨藤子末，和勻，每服一大錢，溫酒調下，空心食前服。

治五種腸風痔疾。饒州王廣運林傳。

凡下血，皆謂腸風，蓋後有血名內痔，蓋前名外痔。大腸頭出謂之脫肛，穀道四邊有努肉，謂之鼠妳痔，頭上出血謂之漏，此方通治之。

黃牛角鰓一箇。　猪牙皂角二兩。
蛇皮一條。　穿山甲二兩。
大附子一箇，炮，去皮臍。　當歸半兩，炒。
蒴藋四兩。　麝香一錢。
蝟皮一箇。

右件一處，砂瓶內，用炭火煅令通赤，取出於地上用盆合定，四畔用土覆之，去火毒，然後搗羅爲細末。患者先用胡桃肉半箇，研爛，同酒半盞，調藥末二錢，服之，便效。

阿魏良薑圓，治三脘氣弱，中焦積寒，脾不磨，飲食遲化，喫物頻傷，胸膈滿悶，脇肋疼刺，嘔吐噦逆，噯酸惡心，腹脹腸鳴，心腹疼痛，噎塞膈氣，調胃吐食，飲食減少，悉能治之。已下二方，上官駐泊傳。

青皮二兩。　陳皮二兩。
良薑二兩。　紅豆二兩。
桂去粗皮，一兩。　縮砂去皮，二兩。
莪茂炮，二兩。　草蔻子去皮，二兩。

乾薑炮，二兩。　萊菔子二兩，炒。
木香二兩。　硇砂半錢。
阿魏一分，并兩砂，用醋化，去砂石，研。

右和麵煮糊爲圓如菉豆大，每服五十粒，淡薑湯吞下，不拘時候，日進二服，久服大補益脾胃，空腸，令人能食，去寒濕，強中溫暖，如漆來有沉寒積冷，腹中時作疼痛，宜服之，或無此證，去硇砂，常服溫養中焦，有益脾胃。

麋茸圓，治婦人風虛勞冷，一切諸疾，或風寒邪氣，留滯經絡，氣血冷澁，不能潤肌膚，或風寒客於腹內，則脾胃冷弱，不能尅消水穀，或腸虛受冷，大便時泄，或子藏挾寒，月水不調，乍多乍少，或月前，或月後，或淋瀝不斷，或閉不通，百節酸疼，頭項作痛，相應，臍腹腰腿，痛痒不仁，悉能主治，大補益元臟，絕忌羊血，解藥力。

麋茸火燒去毛，酥塗炙，四兩，切。　當歸去蘆，酒浸一宿，焙乾，二兩。
鹿茸酥塗炙，去毛，酒炙，二兩，切。　鹿角膠鐵炒，二兩。
大黑附子炮，去皮臍，二兩。　沉香二兩，不見火好者。
肉蓯蓉酒洗，焙乾，三兩。　牛膝去蘆，酒浸一宿，焙乾，二兩。
熟乾地黃酒洗，焙乾，三兩。　赤石脂一兩，真者。
破故紙酒浸一宿，炒，二兩。　陽起石一兩半，雀間用磁罐子盛，以酒二升，煮一宿，水洗，焙乾，乳鉢研如粉。
一方有麝香二兩。

右十二味，同爲細末，用酒蜜各等分，熬成稠膏子，搜和成劑，入木臼內，杵三千餘杵，圓如梧桐子大，每服三十粒，漸加四十粒，至五十粒，溫酒鹽湯吞下，空心日午服之。法酒二十兩，蜜二十兩，慢火同熬成膏子圓。

人參大溫中圓，治三焦不順，脾胃積冷，心腹大痛，嘔逆惡心，兩脇刺痛，胸膈滿悶，腹脹腸鳴，泄瀉頻併，溫脾暖胃。饒州李廉林傳。

人參去蘆，一兩。　白朮一兩，麩炒。
陳橘皮去白，一兩。　紫蘇子揀淨，一兩。
高良薑一兩，剉。　官桂去粗皮，一兩。
川乾薑五錢，炮。

右件七味，爲細末，煉蜜爲圓，每一兩作十圓，每服一圓，煎生薑湯嚥下，不拘時。

水陸二仙丹

取雞頭去外皮，取實，連殼雜搗，令碎，曬乾爲末，復取糖櫻子，去外刺，并其中子，洗淨，搗碎，入飯中，蒸令熟，卻用所蒸湯淋三兩過，取所淋糖櫻汁，入銀銚，慢火熬成稀膏，用以和雞頭末，圓如梧桐子大，每服

鹽湯下五十圓。久服固真元。悅澤顏色。括蒼吳寅仲久服有奇功。出無名附方。以車前子末解之。

治諸般惡痢。腹中攪刺。日夕頻併。危惡不瘥。神應乳香圓。

安息一分。酒浸。瞿三日。去滓。研爲膏。　呵子一個。

乳香一分。酒少許。化開。熙三日。再用火煨。令乾。研爲末。　沒藥一分。研爲末。用安息香膏子和勻。用生薑仁不以多少。燒令爆出。上焙乾。一日乾爲度。

右件四味。研爲細末。濃水爲圓。如菉豆大。每服五圓七圓。乳香湯下。空心食前。日三服。加至三五十圓。不忌毒物。其效如神。

治風毒上攻眼目澁痒。疼不可忍者。或上下臉赤爛浮腫。瘙肉侵睛。神妙驅風散。出王氏錄濟方。

五倍子一兩。鎚碎。去塵土。　蔓京子一兩半。洗令淨。

右二味同杵爲末。每服二錢。水二盞。銅石器內煎。及一盞。澄清。熱淋洗。留滓二服。再依前法煎淋洗。大能明目。去澁痒。

治大人小兒一切風虛昏眩。神志不爽。心氣不寧。手足搐跳。睡臥不穩。虛風圓。

麝一錢。　白附子一兩半。　烏蛇只用頂後肉。去皮。酒浸一宿。乾秤一兩。　赤腳蜈蚣三條。全者。酒浸一宿。焙乾。　五靈脂爲末。無器內炒。煙盡爲度。秤一兩。　天南星一兩。　蟾頭一個。大者。炭火燒。煙盡取出。不令成灰。

右除麝外。同爲細末。絕細。再入麝。同研勻。以醇酒作糊。爲圓。桐子大。每服一圓。不拘時候。或二圓。以人參湯麝香湯嚼下。或溫酒亦得。治小兒慢驚極妙。

壯筋骨。治腳膝疼痛。四斤圓。

宣木瓜去瓤。切。焙乾。秤。　牛膝去蘆。頭寸。切。焙乾。秤。　萆薢洗。塊切。焙乾。秤。　天麻細剉。焙乾。秤。已上各半斤。

右件。用無灰酒五升。浸。春浸五日。夏浸三日。秋浸五日。冬浸十日。日足。取藥焙乾。加附子二兩。虎骨一兩。虎骨。細剉。附子。炮。去皮尖。同爲細末。用浸藥酒煮麵糊。爲圓。如梧桐子大。每服五十圓。溫酒或鹽湯下。空心食前服。虎骨。須用酥炙令黃。

妙應圓。治婦人血經不調。月事淋漓。加之驚憂。遂發寒熱。後汗出過多。損耗氣血。常服。滋煖子宮。調血養氣。出濟州徐孝敦傳。

當歸去蘆。頭。二兩。　延胡索去土。一兩。　澤蘭取葉。一兩半。　白芍藥雪白者。一兩半。　肉桂去粗皮。一兩。不見火。　牡丹皮去骨。一兩。

川芎一兩。　木香半兩。不見火。　石斛去莖。一兩。　川薑一兩。炮。　熟乾地黃淨洗。薄切。焙乾。秤。二兩。

右件修製了。焙乾。搗羅爲細末。醋煮麵糊。和圓如梧桐子大。每服二十粒。用溫酒或米飲吞下。空心及晚飢服之。

丁香草藥散。治大人小兒脾虛發熱。及潮熱。他藥不能治者。服之如神。余嘗州傳。

丁香一錢半。新採者。　草藥三箇。細剉。焙乾。　麥門冬半兩。去心。溫洗。　人參二錢。　茯苓二錢半。　半夏二錢。薑製。　甘草二錢。炙。　淡竹葉數葉。

右爲麤末。分作六服。用水一盞半。薑三片。棗一箇。煎七分。去滓。不拘時服。小兒加陳皮二錢。去穰。

神仙遺空圓。治男子婦人偏正頭疼。惡心。產後體虛。傷風。惱寒頭痛。洗頭沐浴。傷風。壯熱頭痛。痰厥頭痛。腎厥頭痛。虛眩。項筋緊急。應一切頭痛。江州陳太法傳。

天麻一兩。洗。　香白芷一兩。　半夏一兩。生用。　天南星一兩。　乾薑四錢。生用。　川芎二兩。洗。　地龍半兩。微洗。去土。淨。　川烏一兩。生用。去皮尖。　草烏一兩。生用。去皮尖。　細辛半兩。　甘草二兩。生用。　白附子半兩。

右爲細末。以藥末一兩。入白麵一兩。用新汲水搜和爲圓。每一兩分作十圓。於新板上排定。日內熟之。如合。須是伏中合。

沉香菊澄茄湯。治腰腿間寒濕作痛。饒州雍醫傳。

沉香半兩。　南木香四錢。　丁香四錢。　檀香四錢。　菊澄茄半兩。　片子白薑黃半兩。　陳橘紅三錢。　青皮去白。三錢。　粉大甘草七錢。　藿香去淨土。四錢。　白荳蔻仁半兩。　天台烏藥半兩。

人參半兩

右爲細末，每服一二錢，入鹽點服。

縮砂仁三錢

灸結胸傷寒，不問陰陽二毒，只微有氣者，皆可灸，下火立效，神功散。

黃連七寸爲末　芭豆七粒去皮新瓦上出油

二味拌勻，令患人仰面臥，先用三斡耳和艾一炷如中指大，更用三斡耳子，先着在患人臍中，後安艾炷其上，只一炷覺臍腹間有聲，即便汗出而愈。

治風烏荊圓

川烏頭一兩炮去皮　荊芥穗二兩

右醋糊爲圓如梧桐子大，每服二十圓，酒或熟水下，有疾，食空時日三四服，無疾，早晨一服，少府郭監丞少病風痺搐，頭頸寬緩不收，手承頷然後能食，服此六七服即差，遂長服之，已五十餘年，年七十餘，強健，鬚髮無白者，此藥療腸風下血尤妙，累有人得效，下血人服此而差者，一歲之內數人。

烏金散，治冒暑悶亂，不省人事，欲死，及發燥引飲，無度，咽中痰涎不下。

不蛀皂角一斤刮去皮，猛火炙令成鐵，煙仍須存性，不可使成白灰也，搗三兩

甘草一兩炙

右同爲細末，以新汲水或溫熱水調三大錢服，立差，此藥神妙，不可具述。

良薑湯，治陰寒積冷，心腹大痛，嘔逆惡心，手足厥冷，心胸不快，腰背疼痛。發州李瞻林傳

高良薑一兩剉碎炒　官桂一兩去皮

當歸去蘆頭用一兩剉炒　乾薑一兩炮

人參一兩去蘆頭　吳茱萸七錢半炒

白茯苓一兩

右爲細末，每服二大錢，水一盞半，入生薑五片，煎至七分，去滓，膈空服。

治氣塊刺痛，暮夜即作，至不可忍，多因氣中傷冷所致，久而不治，婦人尤宜服之。已上二方，信守孟郎中充傳

繁甲去裙井膜醋炙半兩　當歸去尾一兩

木香半兩　青橘皮去白一分

枳實半兩　人參半兩

荊三稜半兩　沒藥研一分

血竭研一分　牛夏二時生用

右爲細末，醋煮稀糊，圓如菉豆大，不計時，白湯下十五粒，遇大府通利且止，若氣發作，大府不通，即加至五十粒，以通爲度，此病須是服此藥，令氣塊消，然不可驟然多服，須待積久消磨，每日且只一二服，覺得氣消不痛，卻只一日一服，或三日二日一服，仍旋服後面散子以補氣。

常服散子

人參半兩　黃耆半兩

當歸半兩　白朮一分

木香一分　陳橘皮去白一分

甘草二錢炙　青橘皮去白一分

沉香一分

右爲細末，每服三四錢匕，水一盞，薑二片同煎，取七八分，不計時服，遇氣痛時，每服添枳實末一二豆許。

右陳侍御宜人，嘗因不喜悅中，食柑，自後遂苦心腹痛，久之腹中結塊，遇痛作時，往往悶絕，移時方蘇，而常在夜間，是時侍御作辟雍博士，京師醫者皆不能治，有齋生蜀人史堪載之者，發聞一時，乃處此二方，服一兩月間，遂去根本，後二十餘年，復因憂悒，此疾似欲再作，而已微痛，即再合服之，數日而愈。

治婦人產後胎衣不下。鄉人馮醫之秘校傳

凡產，有產後胎衣不合，諸血奔入，久而血上衝心，遂致不救者，有產前失血過多，胎衣乾澁不下者，庸醫不曉，例以破血藥治之，不知血盡傳澁，遂終不救，當有產婦胎衣不下，呻吟痛楚，聲不可聞，忽有人教之，用苧麻浸水兩大椀，服之，即時嘔吐，胎衣便下，遂得更生。

安腎圓，治本氣怯弱，筋骨無力，或時疼痛。信州李諒駐泊傳

熟乾地黃洗淨，焙乾一兩　牡丹皮半兩

附子炮去皮尖半兩　金鈆石斛半兩

破故紙炒半兩　山藥半兩

肉桂半兩去皮　白茯苓炒去皮一兩

巴戟天去心一兩　白蒺藜炒去刺半兩

肉蓯蓉酒浸一宿一兩切焙　澤瀉微炒半兩

草薢半兩　白朮半兩

右件爲細末，用煉蜜和爲圓如梧桐子大，每服三十圓至四十圓，用溫酒或鹽湯送下，食前空心服。

治傷折內外損，神授散（子瞻用之甚驗）。

川當歸（半兩，洗淨，別搗）　鉛粉（半兩，落粉最上）　鵝砂（二錢）

右同研細，每服二錢，濃煎蘇枋汁調下。若損在腰以上，先嚼淡麵半椀，然後服藥；在腰以下，先服藥，後喫麵。仍不住呷蘇枋汁，更以糯米爲粥，入藥二錢，拌和，攤在上，或絹上，封裹損處。如骨碎，則更用竹木夾定。外以紙或衣物裹之。沈存中云：長安石使君，一日在閤中，忽有呼其姓，第回顧不見。明日過市，復聞呼聲曰：我無求於人，以爾有難，特來救禍。石謝之，欲下馬與語，其人止之，褫衣領中，出一書曰：有難即用。稠人中遂引去。石歸視，乃此方也。石到京師趍朝，立馬右掖門外，爲他馬所趨，折足墮地，又爲馬踏，手臂折，舁至家，屢氣絕。急合此藥，服且裹，半夜痛止，後手足皆平復。

普救散，治四時傷寒，渾身發熱，四肢疼痛，頭重服疼，不問陰陽二證，並皆治之（永平鄭知監施此藥）。

蒼朮（一斤，米泔水浸三日，切，焙乾）　乾葛（半斤，切，焙）　甘草（四兩，炙赤色，切細）

右爲麄末，每服二大錢，水一中盞，煎至七分，去滓，熱服，如要出汗，加連根葱白二寸，同煎。併兩服滓再煎一服，不拘時候，仍用沙銚，不得犯銅鐵器（初發傷寒宜下，此藥汗後勿服）。

治喉口熱毒至甚，咽喉胸膈，內連心肺疼痛，飲水不下，氣不能出，死在須臾，名曰馬閉（統船上官醫傳）。

巴豆七粒（去殼膜，研如泥）

右以坏子一錢，同研成膏子，每用一字許，醋煎皂角汁調，令稀稠得所，將鵝毛蘸藥，掃於喉間，良久，咳唾出膿血或涎數升，然後用第二法。其法白礬飛過，白甘草微切，各半兩，爲細末，每服半錢，新汲水調下。

肉豆蔻湯，治胸膈痞塞不快，脾胃有傷（景虛傳）。

肉豆蔻（煨）　草果子（去皮）　石菖蒲　乾木瓜　良薑　乾薑　厚朴（薑炙）　甘草（炙，各一兩）

右等分爲細末，每服一錢，鹽湯點服。

洪氏集驗方卷第四

治舌衄（二方出方氏治宅編）。

槐花

右炒爲末，掺之，昔有士人無故出血，仍有小穴，醫者不曉何疾，偶曰此名舌衄，用此而愈。

治舌腫

蒲黃

右爲末掺之，須眞者佳。一士人泛汴東歸，夜泊村步，其妻熟寐，喊之，問何事，不答，又喊之，妻驚起視之，舌腫滿口，不能出聲，急訪醫，得一叟負藥而至，用藥掺，比曉復舊，問之乃蒲黃也。

治湯火瘡

大黃

右搗碎，調以美醋，傅瘡上，夷堅志云：金山修供神，怒庖人不謹，潑其手鐺中，痛楚徹骨，號呼欲死，神授此方遂愈。

蓬莪茂，暖水臟明目（京師老李盡傳，蓬莪常嚼，多涼，非水藏之類）。

蓯蓉三兩酒浸一宿焙乾　巴戟
枸杞子　菊花
川練子各一兩

右爲末，煉蜜爲圓，如桐子大，每服三十粒，溫酒或鹽湯下，空心食前臨臥。

治乾癬已下八方，虛僞

樟腦一錢　白礬半錢生用
雄黃半錢

並細研，以生蜜自然汁調膏，各少許，磨羊蹄菜根如手指大二寸許，調藥，擦傅，止有食頃痛極，不過三次，見效。

治淋

皂角刺燒存性　破故紙等分

爲細末，紅酒或無灰酒調下。

治沙石淋

定磁末，羅細，以生地黃槌碎同煎，如熟水，時時飲之。

治毒蛇傷蠱試如方

香白芷爲末，麥門冬水調飲，倉卒時，新汲水亦可。

治冷積降氣寬膈逐痰

橘皮去穰，取紅一斤，甘草鹽各四兩，水五椀，慢火煮乾，焙搗爲末，點服。

補益治漏絕精圓

大附子炮裂去皮臍　龍骨煅通亦
牛膝酒浸一宿焙　肉蓯蓉酒浸一宿焙
巴戟去心　兎絲子酒浸三宿

右等分爲末，煉蜜圓梧桐子大，空心溫酒或鹽湯下三五十粒，甚者日午再服，小便如米泔者，不過十服。

治傷折骨碎此方用之甚驗

大鰾膠一味，碎剉，用無灰酒煮爛如粥，逐旋抄喫，極苦硬，須強進之，以多爲度，每二兩或四兩爲一服。傷甚者，不過半斤。

治疝氣偏墜

牡礪火煅　良薑

右二味爲末，用津唾調塗之，立消。

烏金散，專治痔疾神驗已下五方，魏州王東猷論林傳

黃牛角腮　烏金子
五倍子　紫河車
咸鹽仙　枳殼

右等分，入瓶瓶內，用白雄雞糞和黃泥固濟，上留一竅子，炭火煅煙盡爲度，取出地上，出火氣，爲細末，每服三錢，空心酒調下。

倍蓉圓，治腸風下血。

槐花六兩　五倍子三兩
五靈脂三兩

右件爲細末，麵糊爲圓如梧桐子大，每服三十圓，米飲下。

治風毒氣眼，連眶赤爛，洗眼神妙。

白沙蜜二兩　乳香選明者一皂大，溫水浴過
好黃丹抄半錢

右一處，於砂石器內，或銀器內，用慢火熬令焦黑色，酒在水中不化爲度，每用兩黑豆大，沸湯泛洗眼藥成，露一宿方好。

治腰痛

五加皮

右不拘多少，爲細末，如梧桐子大，酒煮麵糊爲圓，每服三十圓，空心溫酒下。

秋石丹，治男子婦人虛勞瘦

秋石一兩　乾山藥一兩

右爲末，別以酒調山藥爲糊，如梧桐子大，又以乾山藥爲衣，每服二十圓，溫酒米飲任下。

治諸痢進人黃大成傳，用之如方

鴨舌膽麝香性

右爲細末，每發時，用一字，以雞管吹入鼻內，涎出即愈。

治豆瘡倒靨入肉不盛傷

人齒一箇不以久近，燒成灰，用續猪尾血調和了，入酒小盞，同服之，資永仲教授年六歲時，生瘡，爲鄰近焚

化所觸。蠭擲入肉。諸醫束手。母已發聲哭。親戚劉知縣說此方。才飲酒了。元痛隨手如故。予見次在中。良方亦載此。用人參三五枝。炙與爲末。乳香湯調下。溫酒亦得。

治喉閉 陳子範教授傳。

皂角半兩。

右搗爲末。用醋一椀。就鍋內煎數沸。以帛濾滓。令病人服之。

又方 高逢辰解幹傳。

麻油少許。生油。

右以筯絞油生沫。卽以油沫飲之。

治腰痛 已下二方孫仲益尚書傳。

芸薹子

右用米醋研。塗傅疼處。

治腸風

橡斗子

右以乾大棗。置橡斗子中。以麵裹。火炮碎爲末。用陳米飲作一服。

痔藥方 鎮州十七里李家傳。甚妙。

蕊竹殼　野油麻葉

陳屋茅　百合花乾者。

猫兒骨

已上燒灰。入輕粉和麻油調。塗。

治癬

羊蹄根切作片。

右至五更初。先以布揩癬上。卽取羊蹄根。爛嚼。止用汁塗。後以其片揩之。將冷水漱口及洗手。初用藥時。忌不得語。欲氣勿洩也。

接骨方

牡蠣少許。

右爲末。用糯米粥調之。塗其上。卻以沙木板夾之。卽愈。

治漏痔 高逢辰解幹傳。

麝香　鵝茶

右等分爲末。乾傅。

治外風入瘡口腫毒方

全蝎一箇。　白殭蠶三箇。去絲。

蝲蛄三箇。

右爲細末。裂慈汁調塗。卽愈。

癬藥

白礬一兩。　白藥子半兩。　黃丹半錢。

右爲細末。旋掘羊蹄根獨脚者。一根者是。取自然汁。調藥。先用布揩癬。微破。用藥傅之。

治喉閉 郭延圭知縣傳。

白礬一斤。好者。　好酒一斗。

右同煮。以酒盡爲度。入合子。臨時用之。

治盜汗

防風細切。

右爲細末。浮麥煎湯服之。婺州汪伯敏將仕云。嘗見周仲恭尚書言。舊有盜汗之疾。每至大屋。則股慄。覺然。須以幃幕遮護。後得此方。遂愈。

治偏風

五積散。敗毒散。

右以二藥合煎服之。蓋五積性溫。敗毒稍涼。服之無不效者。

治脚腫

四物湯。小續命湯。

右以二藥同煎。章溫靜之節推云。嘗有人卒患脚腫。服此遂愈。

甘豆湯。治脚腫。

黑豆　甘草

右同煎湯服之。郭鎮廷圭知縣云。昔年太學士人。圍閉中。多患脚腫。至腹則死。前後如此者非一人。後有施此方。服之皆愈。蓋神方也。

灸勞法

以肚臍相對。取背脊骨。灸之。甚妙。

治頭風頭痛

人中白　焰消各一兩

右用水一椀，無灰皮紙濾下，研細，重湯煮過，再研入少腦子，每用少許，以棉耳子，搐入鼻中，即愈。襄陽府胡急腳專賣此藥，積錢至數萬緡，秘惜不傳，上官樞以計得之。

茶牙湯，治偏正頭疼，惡心嘔吐不止者。

細茶牙一兩　生草烏半兩，去皮尖　細辛半兩

右為麄末，每五錢，水二盞，慢火煎至六分，去滓，溫服，一服取效。

治丈夫婦人腰痛重腿，步履艱辛，痛不可忍。附牛圓，上官樞治傳。

附子半兩，炮，去皮臍　黑牽牛瓦上炒令乾

右為細末，酒煮麵為圓如梧桐子大，每三十圓，空心溫酒下，如半邊腰疼，只用黑牽牛瓦上焙乾一邊，附子炮一邊，餘一邊生用，不去皮，搗羅為末，如前法服。

治爛紗風眼

覆盆子

右取葉挼碎，以汁滴眼中，即有蟲出，上官醫云，頃歲寓居潭州瀏陽縣石霜寺，有皇叔太尉者，乳媼患爛紗風眼，近二十年，一日有藥媼過之曰，老婆能治此眼，眼中有蟲，赤而長，其細如絲，遂入山取藥，其家遣人尾其後，但見沿山路，採取樹葉，以手挼碎，入口咀嚼，留其汁，以皂紗蒙患人眼，握筆畫雙眼於紗上，然後用藥汁滴於眼之下緣，須臾蟲自紗中出，其數十七，其家甚喜，媼去數日，復至，則眼下緣肉乾如常人，再用前法治眼上緣，得蟲又以十數，媼謂上官曰，公為醫官，不可不傳此方，須以錢二萬貫我，上官諾之，遍召傍近村婦，患此眼者，治之無不差，媼又曰，是方出本草葉部中，覆盆子，注云葉挼絞取汁，滴目中，去膚赤，有蟲出如絲線，上官廉用之皆效。

治雷頭上官樞傳

鱔魚

右以鱔魚數條，打死，先用油塗其腹，寘患人腿上，盤令周遍，以帕子緊定，食頃，患人覺痛不可忍，然後取鱔，鱔腹上有針眼大蝨子，皆蟲也，蟲既去盡，卻用死人脛骨燒灰，塗瘡口，即愈。沈存中良方，亦載活鱔治漏瘡。

治癬疥

宣連去蘆，浸一宿

右焙乾為末，蜜圓如梧桐子大，空心日午臨臥，酒吞二十粒，東坡云惠州軍校姚歡，年八十餘，鬚髮不白，自言年六十歲，患癬疥，周匝頂踵，或教服黃連，遂愈，久服，故髮不白。

治腳氣灸法

右灸風市兩穴，以多為貴，蔡元長為開封少尹，一日據案，忽覺蟲自足心行至腰間，落筆並倒，久之方甦，椽曹曰，此疾非俞山人不可療，使呼之，俞曰，真腳氣也，灸風市一艾而去，明日又覺蟲自足至風市便止，又明日疾如初，召俞，俞曰，是疾非千艾不可，一艾力盡，故疾復作，蔡如其言，灸數百，自此遂愈。沈公雅檢正說予紹興辛巳歲在吳門，適邪宅以備巡宰，徙治吳縣，卑溼，始得足痺之疾，以風市為主，家屬隔曲池，三里灸之即愈。

治毒蛇咬，毒氣已入腹，脅脇脹痛不能忍，太平州湯三盞，氣林傳。

生白礬末，須看所咬瘡口大小，然後抄礬末，於刀頭上，鑄令沸，乘沸，滴在瘡口上，隨手痛止，若腹中毒氣未退，依前點腦，即取草決明葉兩握，研取自然汁，以熱酒飲下，卻將滓貼瘡口上，軟帛輕手蹙之。

治鼻衄不可止，欲絕者。

右茅花，無即以根代，每服一大把，剉，水兩椀，煎濃汁一椀，分二服，沈存中云林次中御史在楚州，嘗訪一故人，久之不出，或問之，云，子婦衄血垂盡，方救視未及延客，坐中一客云，適有藥，急令挼茅花一大把，煎濃汁一椀，帶囊中，取小紅圓二粒，令茅花湯吞下，一服即差，而不言其方，後有人聞之，曰，此止是茅花之功耳，試復問之，其人大笑曰，誠如此，紅圓乃含香硃砂圓，恐不信茅花之功，以此為記耳，存中在鄉延時，一將官卒病衄甚困，以此療之，即差，又徐德占教衄者，急灸項後髮際兩筋間，宛宛中，三壯，立定，蓋血自此入腦，注鼻中，當人以線勒頸後，尚可止衄，此灸決效無疑。

治諸鯁

以木炭皮為細末，研令極細，如無炭皮，堅炭亦可，粥飲調下二錢，日四五服，以鯁下為度，此法人家皆有，沈存中云，在漢東，乃目覩其神，有劉晦士人隣家一兒，誤吞一錢，以此飲之，下一物如大烏梅，剖之乃炭裹一錢也，池州徐使君極寶此方，數數用之，未有不效者，近歲累有人言，得此方之效，不復悉載。

治盜汗

當歸中兩，去蘆，細切　人參中兩　猪心一箇，細切

右以猪心分四片，用一片，水三盞，煎一盞半，作二服，一方，當歸、人參各一兩，猪心半箇，細切，五盞水煎三盞，去滓，兩服。

甘草一兩　烏梅一兩，去仁，瓦上焙乾　白礬中兩，生研　五倍子一兩，煨

右為細末，入白麵四兩，同和勻，每服一大錢，新水調下，如滑瀉振亂作渴，一服即愈，雖平日不敢飲冷。

者，以冷水服藥不妨。（世傳仁齋所驗近試方。）

治風牙疼

華陰細辛　多年石灰

右二味，等分為末，每用少許揩牙，漱去涎，溫水漱，立止。

治蛀牙疼

巴豆不以多少，去殼，麵裹，煨熟，去麵，粟米飯同巴豆研，為圓如羅茄子大，每用一二粒，綿裹，安於蛀孔內，仍睡少時，覺不疼，去之。

治風牙蛀牙一切疼痛（每用藥止用一米大，仍以蓮帶貼之。）

巴豆（一大箇，去大皮。）　豆豉（七箇。）

大蒜頭（一箇，去鬚，并去瓣皮。）

右作一處，研極爛，圓作一團，用油紙裹，每遇牙疼，至臥時，先以溫水漱口，次以針微剔所痛之處，以藥實之，明日復以水漱，灌即愈。

治五種牙疼，不蛀破處者。

細辛　乾薑

川烏　草烏

藜蘆　吳茱萸（各半兩。）

荷草（一兩。）　木律（一分。）

右為細末，先用鹽湯漱濕，手點藥揩牙，候良久，藥力敗，用溫水灌漱，齒痛即止。

治風蛀牙，如蟲蛀破者。

乳香（一錢。）　巴豆（三粒，紙裹，壓去油。）

右火上鎔乳香成汁，用巴豆不住攪和，候冷，取出，圓成膏子，酌量牙齒蛀穴大小，將燈上炙旋圓，納於穴中，痛即止。

治牙搖牙宣（湯致遠院傳。）

蘘草根（一名香附草。）

右去皮，細切，用生薑汁浸一夕，次日曝乾，熟為末，用之。

治暴嗽不止，或失聲者（蘄州上官監傳。）

款冬花（去枝杖，細剉，焙乾，為細末。）

右用生蜜搜和，作餅子，貯火香盒中，如裝香然，安藥在火上，令病人開口噙煙，米飲吞下，臨臥時，（予頃年見紹興間判宗正，先以款冬花在香盒中燒煙，却用小竹罩罩之，止露一竅，令人以口，凡三兩次，嗽即止。）

治惡瘡久不較諸藥無效

白鱗魚頭（乾者。）

右燒為細末，用輕粉調塗。

治冷蛔（行在鄭春夫傳。）

蜣蜋蟲（化蟬。）

右用三兩枚，於瓦上炒成灰，乾掺瘡口。

治喉閉

南鵬砂（一錢。）　青黛（一錢。）

甘草（半錢。）　白僵蠶（二錢。）

右為細末，用腦子少許，研和，乾掺喉間即愈。

治咽喉腫痛

白礬（飛過。）　甘草（炙，各半兩。）

右為細末，乾掺喉中，徐徐吞下。

治凍死

舊鹿

右用鹿，束凍死者其中，袞轉不絕手，自然和氣相續，即愈。

治喝死

泥漿

右於行路中，旋以刀器，掘開一穴，入水其中，攪之，卻取爛漿，以飲死者，即愈。

治溺死（予在鄱陽，嘗有溺水者，身體紅，絕，用此法治之即甦。）

乾壁泥

右先打壁泥一塔，置之地上，卻以死者仰臥其上，更以壁土覆之，止露口眼，自然水氣翕入泥中，其人遂甦。

治火燒湯潑

醋

右以酸者，用手搽地上泥塗之。

治湯火瘡

釜鐺下黑塵

右以水煖研入釜及油調傅立愈。

治嵌甲

青蠅四十八枚。　麝香百文。

右取蠅折去兩翅不用，以其餘熟乾，入麝為末。或急用，則取蠅置懷中，候乾擣之。或炙乾即入油調傅。又一方用蝎牛一枚，燒存性，同為末，入膩粉黃丹油調傅，然不若此方為妙。

治小腸氣

舶上茴香一斤。

右用生絹四兩，研碎，併滓汁拌，和茴香過一宿，熟焙乾為細末。次用青鹽二兩，別碾入藥，酒糊為圓如梧桐子大。每服三五十圓，鹽湯或溫酒下，空心食前。郭廷圭知縣云：舊苦此疾，蓋不下五七發，服藥一料，病根遂除。今已十五六年不作。

洪氏集驗方卷第五　婦人小兒

治婦人產後百病烏金散。鼎州彭氏傳，有缺，答十八類，文多不載。

坎	離	震
兌	土	巽
艮	坎	乾

燒時切忌婦人雞犬見，如見風之無効，功須是之。用一罐依此寫法，定四面各立好子，作一圓子，其頭燒鯉魚皮各用一藏瓶去底入鍋，蒸乾，却用瓦子蓋用好紙筋調泥固濟，乘濕放在土字上，用木炭火五斤燒通赤，取藏瓶放冷打開出藥。

血餘一兩，依前法燒之。　鯉魚皮一兩，依前法燒之。

沒藥半兩。　紅花一分，生用。

伏龍肝一分，罐下取燒赤者土是。　凌霄花半兩，色鮮者，焙使。

好香墨半兩，生用。　乾柏木一寸，細研入香，好者可使。

當歸半兩，去指七，微炒，令香，用之。

右件九味，並細為末。產後母子熱，疾後胎死在腹，難產，生衣不下，血暈，起坐不得，如見異花，口乾心悶，

乍寒乍熱，四肢浮腫，言語顛狂，見神見鬼，不語，瀉痢，腰膝疼痛，小腸尿血，澁痛，崩中，嘔逆不安，咳嗽，涕唾，喉中如貓作聲，面色遍身黑赤點子生，眼澁腰疼，身發筋急，應是一切產後諸疾，皆治。以酒一盞，煎取八分，調藥兩錢，空心頻服之，用無灰酒大妙。

催生如聖散

黃蜀葵花

右一味，焙乾為細末，每服二錢，熟湯放溫調下，神妙。或有漏血胎，臨乾澁，難產，痛劇者，併進三服，良久腹中氣寬，胎滑，即時產下。如無花，只用黃蜀葵子，爛研小半合，以酒調，濾去滓，溫飲，尤佳。予家常合以濟人，甚驗。

萬靈圓，治婦人月水滿，不通，久無嗣息，血癖氣痛，四肢浮腫，嘔逆，心疼，虛煩，勞悶，面色萎黃，崩漏帶下，寒熱蒸勞，頭疼齒痛，血下無度，淋瀝諸疾，產前安胎，臨產催生，產後胎結痛，傷寒煩渴，瀉痢，血勞，血逆筋攣，痰癖頭疼，敗血上衝，血刺，泄瀉，咳嗽喘急，嗽血，血塊起伏，氣落氣脹，血作腰痛，小便不禁，子死腹中，失蓋汗不出，血風，脚手痺頭，凡產後諸疾皆治。

牡丹皮洗。　川芎本洗。

川當歸切，焙，黑色者佳，洗。　白茯苓去皮。

赤石脂別研。　香白芷

官桂去皮，見火，不　白薇洗。

京芎洗。　蠟胡索去皮。

白芍藥　白朮米泔浸一宿，已上各一兩。

甘草炙，別研，已上各半兩。　沉香不見火。

沒藥

右件藥材，皆用溫水洗淨，杵羅為末，煉蜜圓彈子大，每服一粒，或半粒，空心溫酒化下。凡妊娠臨月，服此五六粒，產時無痛，如久無子，服二十粒，當月有子。并治積年血風，半身不遂，種種血疾，不問年深，皆可療，神效不可具述。

烏金散，治血崩漏下，最治產後血崩，并小產血崩漏下。

機關皮　烏梅

乾薑燒灰存性，三味各等分。

右研細，每服二大錢，煎烏梅湯調，濾服，不以時。

救生散，治急喉閉，產前產後有此疾，皆可服之。

白殭蠶半兩，去絲，剉，略炒。　甘草生一錢，重。

右二味，各取末，秤和勻，每服一錢匕，以生薑汁調藥令稠，灌下，便急以溫茶清衝下。

治姙娠忽然下血，腰痛不可忍。

鹿角一兩，剉　當歸一兩，剉

右二味，作一服，以水二盞，煎至一盞，去滓，溫服，食前。

治婦人產後，因驚或怒傷肝，或發氣逆中脘，或坐草風入子藏，遂成顛狂，或成中風不語，角弓反張，狂走，歌唱不常。

荊芥穗瓦上焙乾

右為細末，每服二大錢，熱米飲調下，酒亦得，用之如神。

催生藥

香白芷　百草霜

右等分為末，用童子小便，却入酒醋少許，沸湯調下，甚有神驗。

滑胎易產神效八味散一名如意散，已下四方，太平州郭御顯駐泊傳。

甘草二兩，炙　黃芩

大豆黃卷　乾薑

吳茱萸　麻子仁

大麥蘖炒，上各四兩　桂心三分

右為末，酒服方寸匕，湯飲亦得，空心食前，須入月方得服，過三十日，動作宜謹，勿上厠，恐不覺墮地，如此之易也。

治產後虛眩不能支持，兩脇當臍急痛，氣上衝，前後相引痛，治之如神，羊肉湯。

精羊肉切，四兩　當歸切，半兩

川芎剉，半兩　生薑切，一兩

右以水十盞，煎至三盞，掠上沫，去滓，分四服，空心熱服，一日服盡，來日再合兩日滓，併一日煎之，當一劑服。

產後防益方

舊漆器

右不以多少，烈火燒煙，熏鼻中，即醒。

治產後大便不通

緣亡血過多，腸間乾燥，甚至旬日已上，腹脹急痛，悶冒，氣喘神昏，力弱，欲攻之則必致危殆，不攻則無

緣得利，郭醫云嘗用古方蜜導法，即時得下，且無所損，眞活人之法，其方雖見仲景傷寒論，而產家不收，最為緊要。

順經散，治小兒十餘歲，因驚之後，心氣不行，小府淋漓，日及三十餘次，漸羸黃瘦，宜服此劑主之。高遠長卿幹醫。

韭子湯浸過，取白仁，乾秤，一兩　益智子取仁，鹽炒，過半兩

琥珀半兩，研　石菖蒲去毛，一錢

白茯苓三分　狗脊鹽，去毛，淨，半兩

石蠶子火燒，煙炒出火毒，研極細，半兩

右七味為末，和勻，每服一錢，用韭葉白，煎湯調下，空心食前各一服，日午一服，尤妙。予表姪十餘歲時，嘗遊慈山，歸已昏暮，遇一巨人醉臥寺門，驚悸得疾，自是之後，一日便溺五六十度，醫治數月不能效，遂以病證扣高逢辰，即援筆授此方，服藥未幾日減一日，初則三二十度，最後十數度，凡服兩料而愈。

紫蘇葉一兩　蘘荷葉一兩

麻黃一兩，去節　大復皮一兩

肉桂半兩　甘草半兩，炙

杏仁半兩，麸炒　桑白皮半兩

陳橘皮半兩，去瓤者

右件為麄末，令將杏仁研極細，將諸藥同和勻，每服半錢，水半盞，烏梅半枚，生薑一片，同煎三分半，食後去滓溫服，臨睡亦得，忌酒腥之物。

治小兒泄瀉

金液丹，衛州白圓子。

右以二藥等分細研，用麵糊圓如黍米大，每服五十圓，米飲下，臨安節推章謐靜之云，渠有小兒，自五月患腹脹，至七月不止，遂作慢驚候，以此藥投一服，徐用少粥壓之，即愈，再服六七服，遂無事。錢氏小兒方，亦載此。

肥兒圓外臺秘要，出江傳

川黃連　蘘荷仁

神麯炒　大麥蘖炒

右四味，等分為細末，用豬膽為圓，如小菉豆大，每服三十圓，加至五十圓，食後熟水吞下。此方乃李家方，每歲祝宰為常寧時女子失珠，極貴，復丞相孫繞，遂來訪，為尋此方，自云其家得此藥，小方脉求嘗登門，女子自服此藥，十日間取下瘀血，遂為驗，自此日益頑壯，須小兒可服藥即與之，孟正云，奈相

（家傳服此藥，但加藿香子一味。）

神麯豆蔻圓，治小兒疳氣，羸弱，臟腑虛怯，及滑泄不止，飲食減少，腹脹寒熱，面黃肌瘦，引飲無度。

神麯（半兩，炒）　肉豆蔻（三枚，面裹煨）
麥蘖（半兩，炒）　宣連（半兩，去鬚）
皮若子（十四枚，去殼）　蕪荑仁（一分）
蓽茇（一分，合研）

右爲細末，用猪膽汁浸麵作糊爲圓如黍米大，每服二十圓，飯飲吞下，空心服。

木香分氣圓，治小兒脾胃虛弱，飲食過傷，積滯內停，或多吐嗽，胸膈不快，面黃腹急，下利無度。

香附子（水浸一宿，搗去黑皮，令淨，飯上蒸過一次，焙乾，秤二兩）　南木香（一錢，麵裹煨）
縮砂（一分，去殼）　甘草（半兩，炙）
京三稜（半兩，濕紙裹煨，紙熟切焙）　瓷黃（半兩，米泔水浸一宿，切焙）

右爲末，用白麵糊爲圓如黍米大，每服二十圓，飯飲吞下，溫熟水亦得，食後服。

助胃膏，助小兒胃氣思食，止渴，常服甚妙。（餳炼，張米助教傳。）

人參　白朮
甘草　茴香（各半兩）
乾山藥（一兩）　檀香（一錢）
烏梅肉（半兩）　白豆蔻仁（半兩）
縮砂仁（半兩）　乾木瓜（一兩）

右爲細末，煉蜜爲膏，空心如皂子大，每服一圓，嚼服，或溫水吞下。

治小兒麻豆瘡子已出太密，發潰膿水黏衣着席，不能轉動，疼痛，濕爛，傅之便乾，更不成瘢痕方。

右用牛糞，不以多少，曬乾，火煅成灰，取心中白者，研令極細，如用蛤粉相似，用綿撲撲有瘡處，不以時候，一方用烏牛糞，一方用黃牛糞（出幼幼新書，一名白龍散，此方用之有驗。）

辰砂安驚圓，理風熱涎盛，身體拘急，睡中不穩，鎮心（已下三方，張米助教傳。）

天麻（一分）　川芎（二錢）
防風（半兩，洗去蘆頭）　甘草（炙，一兩）
白附子（一分）　人參（半兩，洗）
茯神（半兩）　朱砂（二錢，一半入藥，一半爲衣）

右細末，煉蜜爲圓，如鷄頭大，每一圓至兩圓，用薄荷荊芥煎湯化下。

羌活膏，散風熱，化痰安驚。

羌活（半兩）　荊芥穗（半兩）
白朮（二錢）　甘草（半兩）
白附子（二錢）　桔梗（去蘆頭，半兩）
白茯苓（二錢）　川芎（二錢）
防風（二錢，去蘆頭）　朱砂（二錢，一半入藥，一半爲衣）

右細末，煉蜜爲圓，如皂子大，每服一圓至兩圓，用薄荷湯化下，如涎盛，加腦茶湯下。

大天南星圓，治小兒急慢驚風，涎潮發搐，目睛上視，口眼相引，牙關緊急，背脊強直，精神昏塞，連日不省。

滴乳香（研）　龍腦（研）
牛黃（研，各半錢）　朱砂（研，三錢）
麝香（研，一錢半）　天麻
人參　防風（各一分，去蘆頭）
天南星（黃牛膽汁製，半兩）　乾蝎（十四箇，湯浸軟，去腹內土，微炒）

右細末，煉蜜爲圓，如大鷄頭大，每服一圓，荊芥薄荷湯化下。

治裸中小兒臍風撮口法

右視小兒上下齒，齒當口中心處，若有白色，如紅豆大，此病發之候也，急以指爪正當中掐之，自外達內，掐令匝，微血出，亦不妨，又於白處兩邊頭，亦依此掐令內外斷（只掐令見脉斷，不必破肉，指爪勿令太銳，恐傷兒甚，沈存中云。）爲河北察訪使日，到趙郡，有老人來獻此法云，篤老，惜此法將不傳，願以濟人，而之趙人云，此翁生平手救千餘兒矣，環數邑之人，皆就此翁治，兒應手而愈。

沒石子圓，治小兒吐瀉臟腑不禁（上官監傳。）

黃連（鹽水炒）　訶子（炮，去核）
肉豆蔻（麵裹煨）　木香（炮）
沒石子（炮）

右各秤一錢爲細末，粟米飯爲圓如綠豆大，米飲三十圓。

誤吞珠銅鐵而哽者方

燒弩銅牙令赤，內酒中，飲之立愈。

誤吞錢方

擣火炭末，服方寸匕則出。

誤吞釘及箭金針鐵等物方

多食肥羊肉脂及諸肥肉自裹出。

封頸

天南星一箇大者

右以慢火炮裂去皮臍入麝臍細辛三錢同作爲末入麝香少許用米醋調塗絹帛貼在頸上以乾爲度。

治小兒吐宗人子典巫傳

赤麴半兩　藿香葉半兩

丁香一分不見火如熱吐即以丁香之牛　肉豆蔻一箇麵炮

右爲細末每服一錢大段小者半錢煎香橘木湯調下橘木定嘔止吐神妙不可言。

治小兒誤食穀芒

雞嘔

右將鵝倒懸嘔盛半蛤蜊令小兒飲之穀芒即下。

消風散治小兒一切口瘡并重舌鵝口已下五方依州教助數傳

鵬砂一錢　朱砂一字

雄黃一錢　甘草末半錢

腦子一字

右研細和勻少許傅之吞嚥不妨應用如方

雄朱散治小兒頸項裏外腫核

石膏二錢　雄黃二錢

牙消一錢　天竺黃二錢

甘草末一錢　腦子半字

右研細和勻傅之裹核喫不妨外核用蘆荷汁調塗微口新水調亦得。

金華散治小兒一切瘡瘍

黃皮去麤皮半兩炙焦　黃連半兩

海漂消三錢　五倍子三錢

輕粉一分如入

右爲細末和勻猪乾用油調傅濕時乾傅。

如聖散治小兒一切頭瘡

松脂半兩研細　輕粉半兩

右件和勻油調傅之。

急風散治小兒喉閉腫痛

青黛成片好者

每用少許研細新水調少許嚥之吐涎爲妙大人亦治。

鑒涎圓治咳嗽化痰已下一方張衆助教傳皆有神驗

天南星去皮臍生用半兩　白附子洗去皮半兩

川烏尖去皮臍生用一分　白殭蠶洗淨直者一分

白礬枯一分　半夏洗淨生用一兩

右爲細末用薑汁糊爲圓如小菉豆大每服二十圓用生薑蘇苞泡湯吞下。

辰砂圓治咳嗽安驚化痰

辰砂半兩研一半爲衣一半入藥　白礬枯半兩

天南星去皮臍切作片子再用雪水煮焙乾一兩　大半夏湯浸七次用生薑白礬汁作餅子炙一兩半

白附子去皮半兩

右爲細末用糯米粉煮糊爲圓如小菉豆大每服二十圓用腦茶蘇苞湯吞下。

四君子圓治脾虛受食不甚化停積中脘吐逆惡心臟腑泄瀉常服消化食滯進美飲食厚腸胃充肌體悅顏色退黃婺州蔣助教傳已下三藥予家常合甚効

縮砂仁　烏梅肉焙乾

陳橘皮去瓤取仁　訶子紙裹煨去核取皮用

右各一兩爲末煮好大棗取肉爲圓如麻子大每服三十圓至五十圓棗湯熟水任下無時。

肥兒圓已下二方張來助教傳

黃連炒　蕪荑仁炒

神麯炒　麥蘖炒

蘆薈研細各等分

右爲細末豬膽汁調麵糊爲圓小菉豆大每服十五圓至二十圓飯飲吞下。

觀音散理脾胃不和氣弱昏倦多困不思食。

白朮一分　人參一分

甘草一分炙　乾葛一分剉　藿香葉一分　白豆蔻三錢炒　茯苓三錢　櫻粟子三錢炒　綿黃耆一分炙　木香一分

右爲細末。每服二錢。用生薑棗子紫蘇煎湯調下。不計時。日進三服。

右集驗方五卷。皆予平生用之有著驗。或雖未及用而傳聞之審者。刻之姑孰。與衆共之。乾道庚寅十二月十日番陽洪邁書。

賢人留意濟斯民。學仕之餘未捨勤。猶訪醫方治疾病。豈因富貴墮心身。迺知後世家風遠。想見當年德業新。愧我長貧仍惻隱。不能望見駟車塵。

洪公當宋盛時。爲侍從官。兄爲宰相。其富貴爲何如也。而懇懇不忘救民之事。著成方書。百世行之。

余素不諳醫。而喜蓄醫書。非眞好醫書也。好醫書之爲宋元舊刻者。今茲六月中。有揚州書友來告余云。有宋板太醫集業四册。欲售。余屬其携來。久而未至。聞已售于他姓。亦不甚惜之。因向來各家書目未載。卽舊藏書家亦俱不知。或是書未必眞宋板。後閱陸其清佳趣堂書目。載是書云。文淵閣藏本。有楊南峯都臣虎二跋。方悔前此不之買。而已弗可追矣。適余友陶蘊輝從都中寄此宋板洪氏集驗方二本。至乃欣然。以爲聊慰我欲。蓋此宋板醫書亦所罕有。見有季氏鋼書。隨檢延令宋板書目。知卽係是書。卷後八行墨跡。季氏云鮮于樞詩跋。諒必有本而云然。百世行之已下定有脫文。想滄葦收藏時必未遺失。故知之詳也。至于板刻年月。載之甚詳。宋刻固無疑義。而余舊藏傷寒要旨。與此同出一手。黃慮毛用刻工姓名可攷而證。刊刻之地同是姑孰。刊刻之時同是乾道。唯辛卯差後庚寅一年爾。二書之分不知幾時。二書之合又在一地。豈非奇之又奇耶。餘言詳彼書跋語中。茲特誌得書之由。并誌余所以考證是書者如此。甲子十一月蒙翁黃丕烈識。

頃在楊州郡齋。借到太醫集業。尋覽之餘。見板口有三因字。遂取三因極一病證方論互勘。知卽割裂其殘本爲之耳。太醫集業者。第二卷之一條。並非別有此書也。佳趣堂書目所云誤。歸晤藝翁。出示是跋。舉以語之。賜記於後。他年倘仍收得。必捃摭一唉。

嘉慶乙丑八月澗蘋顧廣圻書。

博濟方

王　袞　撰

欽定四庫全書提要

博濟方五卷宋王袞撰袞太原人其仕履未詳惟郎簡原序稱其嘗爲錢塘酒官而已此書諸家書目皆著於錄惟宋史藝文志陳振孫書錄解題俱作三卷晁公武讀書志作五卷稍有不同蓋三五字形相近傳寫者有一訛也公武又稱袞於慶歷間因官滑臺暇日出家藏七十餘方擇其善者爲此書名醫云其方用之無不效如草還丹治大風太乙丹治鬼胎尤奇驗今案袞自序有云歸侍家君之任滑臺道次得疾遇醫之庸者妄投湯劑疾竟不瘳據此則官滑臺者乃袞之父而公武即以爲袞殊爲失考袞又言博採禁方逾二十載所得方論凡七千餘道因於中擇其尤精要者得五百餘首而公武乃云家藏七十餘方則又傳寫之誤也原書久無傳本惟永樂大典內載有其文袞輯編次共得三百五十餘方視袞序所稱五百首者尚存十之七謹分立三十五類依次排比從讀書志之目蓋爲五卷其中方藥多他書所未備今雖不盡可施用而當時實著有奇效足爲醫家觸類旁通之助惟頗好奇異往往雜以方術家言如論服杏仁則云彭祖夏姬商山四皓煉杏仁爲丹王子晉服四十年而騰空丁令威服二十年而身飛此類殊誕妄不足信今故取服食諸法編附卷末以著其謬俾讀者知所持擇焉

自序

天地之間運行而生成者非五行乎人稟五行之秀而生故具之於形稟之於氣也其在天則四時六氣運乎外一失其道則爲災爲沴焉其在人則五味七情攻乎內一失其理則爲疾爲疹焉時候乖有德者和之疾疹生善醫者治之蓋醫之興其來浸久軒后著之於書周禮明列其職皆所以重人命也然人之疾狀多端醫道又不可一塗取也方書藥餌其數實繁故自姬漢而下沿及於今雖鉅賢博識編聯周施者甚衆然不能盛行於世何也亦非採擇不精治療無準蓋明其術者即深秘其隱憂昧於道者乃不詳其證候迨乎臨用有悞十全袞歸侍家君之任滑臺道次得疾遇醫之庸者不究其脈理妄投湯劑而疾竟不瘳復又母氏多病積有年所袞遂因公暇潛心醫術博採禁方逾二十載矣所得方論凡七千餘道皆傳之於家爍得之於親舊故非耳剽口授率經效用因於其中擇其尤精要者理療可憑方書必驗得五百餘首仍於逐篇之前或言其疾狀或紀其脈息或序其形證或論其得病之由庶使昧於醫者可審讀而修制之工於醫者可消息而變用之噫今之人有得一妙方獲一奇術乃緘而秘之惕惕然惟恐人之知也是欲獨吾其身而非仁人泛愛之心也袞嘗念人之有疾苦若己父母有之汲汲然欲其登也故竭精研慮編次成集傳諸好事斯亦博濟之一端也故曰之曰王氏博濟方王袞序

原序

大鈞播物融結而爲萬類其最靈最貴者惟人人之所稟賢不肖雖異然莫不自重其性命所不免者疾苦也古之君子居位行道曷嘗不以周人之急除民之瘼爲心哉人而無食乎可賑而飽之也人而無衣乎可解而溫之也至于一脈內潰五藏生聾悟惻脅亂號呼楚毒聲欬間有不可生之意當是時非妙診靈劑可以起廢保命則雖有金玉物其宝骨肉環其前割前忍愛痛心疾首又何補救哉予歷宦不啻數十載或遘奇傑或韜巾衍所得方錄較然神異者用以濟人至今未嘗少懈居常患不能家至戶曉使天下之人皆蒙其利以是汲汲然有不足者今春錢塘酒官王君惠然見過出方書三編示予且曰袞平素喜醫診所摭精要方若干首不敢自愛欲刊摹以周四方冀人人得遂其生予樂聽所云頓起夙昔之願稱嘆者久之雅聞其人好奇博涉之士也因自錄素所奇異方有驗於人者得三十餘通請附于類例之內以助成一家噫救災恤患陽秋之大誼也博施濟衆仁者之首善也惟冀一圖一劑有瘳有喜使輻員之衆無札瘥無疵獲胥考終命是所願也予既寫其惠心贊厥美事俾舉崖略庸紀于末郎簡序

宋王袞撰　　金山錢熙祚錫之校

傷寒

人參養散　治內傷寒冷外傷寒氣嘔吐煩熱頭疼身不疼及氣虛傷寒

人參一兩　白朮三分　陳橘皮去白　乾薑炮　杏仁去皮尖　甘草炙　枳殼各半兩麸炒　芍藥三分　薑薑一分聖濟錄作高良薑

右九味同爲末每服二錢生薑五片棗二枚水一盞煎至七分熱服再以稀粥助之漢出差

金沸草散　治傷寒壯熱風氣壅盛頭目心胸不利婦人血風朝發丈夫風氣上攻狀如中脘有痰令人壯熱頭疼項筋緊急時發塞熱皆類傷風有寒氣則出漢如風盛則解利

荊芥穗四兩　旋覆花三兩　前胡三兩　半夏一兩流淨薑汁畧煮　赤芍藥一兩　麻黃去節三兩　甘草炙一兩

右七味同爲末每服二錢水一盞入生薑棗同煎至六分熱服如漢出併三服陳白明管見良方但頭不疼項不強爲異耳

石膏散　治傷寒頭痛不可忍者

石膏一兩　麻黃一兩去根節　何首烏五錢　乾薑三分

右爲末每服二錢薑一片水一盞同煎至八分溫服

太一散　治傷寒頭痛

大附子一兩炮去皮臍　甘草半兩生　石菖半兩去毛　石膏二兩　滑石二兩

右五味同爲細末每服二錢蔥白薄荷茶調下

人參訶子散　治傷寒氣不順食嘔胸膈不利有時泄瀉

人參　乾薑　厚朴去皮　地黃各一分　訶子七枚去核　豆蔻一箇去皮　丁香一分

右七味同爲末水一盞末二錢入生薑棗同煎熱服

沈香散　治傷寒嘔結痞心胸氣虛弱服息沈細正氣補元奪命

沈香　船上茴香　青橘皮去白各一兩　蓽澄茄

胡椒　川楝子　陳橘皮去白各一兩

右七味同生杵爲末如患者但得心頭有氣未　亦服之每服二錢蔥白三莖各長一寸擘破入酒并童子小便各半盞煎至六分放溫和滓服患重者不過三兩服氣正服生

柴胡散　治傷寒日數過多心中氣悶或發疼痛狂言不定煩躁不得睡大小便不通

柴胡去苗一兩　大黃一兩　朴硝一兩　甘草半兩　枳殼一兩去瓤

右五味爲末每服三大錢水三盞煎至六分溫服一日只二服不可多服候大小便通即自然汗出或當此候喫下毒氣藥通利即不用服柴胡散或狂言須服大有奇效

厚腸散　治心胸悶結喘不定服之自汗出

大黃半兩　甘草半兩　枳殼半兩麸炒

右三味爲末每服三錢水七分盞煎二三沸溫和滓服汗出爲度六日內多使此散如無證不用

豆蔻散　治兩感傷寒結胸壯熱惡寒飲食不下大小腸秘塞陰毒昏沈臍下水結撮痛四肢逆冷心躁不省人事食撥結聚心下逆滿坐臥不省

肉豆蔻二枚　麻黃去根一分　木香一分　蜈蚣五個橘米炒

吳茱萸一錢　白朮一分　乾薑二錢炮　大黃八錢紙裹煨

訶黎勒二枚炮　茯苓去皮人錢　甘草一分炙　附子八錢去皮炮

青橘皮二片七　桂心三錢　槟榔二枚　當歸一分

右一十六味同爲細末每服三錢蔥三枚水一盞煎至七分食後熱服蓋覆若胸腹內痛空心服必效如稍清利無妨

金針丸　治傷寒結胸氣逆并手足冷吐嘔不定

陽起石　不灰木　訶黎勒各半兩　巴豆二十五枚去皮心不去油

杏仁二十五枚去皮尖

右五味同爲細末用軟粟米飯爲丸如彈子大每服取一丸穿一眼子於燈上燒烟絕爲末以生薑米飲調服之以利爲效

仙茅丸　治傷寒結胸及惡候者大效

仙茅一分　貫衆半兩　黑附子半兩去皮臍　草撥一分　乾薑半兩

甘草少許　巴豆半兩去皮心

右七味同爲細末麵糊爲丸如梧桐子大下結胸生薑米湯下一丸五七日患者更打破一丸同前湯下　如常傷寒只用冷漿水下　如轉後須用順氣微表藥服之汗出差

人參散　治傷寒和氣溫中安神魂五日內服

人參　茯苓去皮　白朮米泔浸一宿　陳橘皮各一兩

右四味杵爲末每服二錢水一鍾生薑二片煎至六分溫服之每日三服

順氣散　治傷寒脾胃氣不和汗前汗後喘逆煩悶虛氣攻刺心脇疼痛及治欬嗽見暴逆傷寒放俗方

厚朴去粗皮薑汁浸炒黃　茴香炒　陳皮浸去瓤焙　枳殼湯浸去瓤炒黃　川芎炒　桔梗　白芷炒　甘草炙　麻黃去節　杏仁去皮尖炒

右各等分爲末杏仁別研一處和勻每服二錢蔥白三寸薑二片棗一枚同煎至七分熱服　此藥調理傷寒汗後氣虛甚有奇效凡病人若手足指節逆冷嘔惡有陰毒傷寒之證急併三五服自然回陽順氣汗出如服了覺身熱汗久未行却併服金沸散表之　年老傷寒不問陰陽二毒並先服順氣散三兩服後方服金沸散表汗　少壯者若是陽毒並先表汗後用此藥調氣若被風雨遍濕並宜服之

返陰丹　治傷寒厥逆

太陰元精石一兩　硫黃一兩　硝石一兩各爲末　膩粉半兩

右四味依次勻布在乾熨斗內用紙蓋覆慢火煨久候藥上有黃芽生起便止傾乳鉢內閉氣細研五七百下用蒸餅爲丸如皂子大若傷寒脈候微細四肢冷逆者及曾經轉瀉者煎艾湯約一盞先熱喫艾湯一半細嚼一丸以湯下之須臾汗出便差重者二丸必愈神妙

正元散　解傷寒證濟錄云治傷寒陰證脈候沉細

麻黃去節　陳皮去白　大黃生　甘草炙　乾薑炮

茱萸　官桂去粗皮　芍藥生　附子炮去皮臍　半夏湯洗七遍

右十味唯麻黃多于衆藥一倍餘藥減用一半同搗爲末每服一大錢水一盞入生薑三片棗一枚煎至七分熱服如出汗須候汗乾可去蓋覆　凡纔覺傷寒四肢頭目骨節疼痛便服此藥如人行五里許再服或連喫三服立見

汗出便差　若患陰毒傷寒更入退陰散半錢同煎或傷冷傷食頭昏氣滿及心腹諸疾服之無有不見效者

退陰散

川烏頭炮　乾薑各半兩

右二味同爲粗散炒令轉色放冷再搗細末每服一錢水一盞鹽一捻煎半盞去滓溫服　此藥大治陰毒傷寒手足逆冷脈息沉細頭痛煩躁重連喫三服　若小小傷冷每服一匙入正元散鹽一捻若陰毒傷寒欬逆煎一服細細熱呷立止

奪命丹　治陰陽二毒衝心

硃砂二兩　金箔八十片　臘粉半兩　黃蠟三兩　巴豆八十箇取霜出油

右五味同爲末煉蠟和丸如雞豆大每服以臘粉一錢米飲一盞調下如人行一里藥性動下惡物如藥在其中取出掘一地坑埋三伏時取出除却上面黑物以麝香裹養之如更用時擘爲兩處重爲丸一粒可療五七人神聖之功卒難序述

風證

燒肝散　治三十六種風二十四般冷五勞七傷一切痢疾脾胃久虛不思飲食四肢無力起止甚難小便赤澀累年已瘡久醫不差俱依此法服之必愈

茵陳　犀角　石斛　柴胡去苗　白朮　芍藥各半兩　乾薑　防風　紫參　白蘞　吳茱萸　官桂去皮各一兩　桔梗　人參　胡椒

右一十五味同爲末以羊肝一具如無即豬肝代之分作三分淨洗去血脈脂膜細切用末五錢蜜白一匙細切相和以濕紙三五重裹之後掘地坑內以火燒令香熟每日空心生薑湯下大段冷勞不過三服見效

骨碎補丸　治風虛攻注徧身筋骨疼痛坐臥不能飲食減少行步無力元氣耗損

威靈仙　草烏頭各半兩　白附子　荊芥各一兩

白然銅醋煮半兩　牛夏湯浸七遍半兩　蓯蓉一兩酒浸切　沒藥分

骨碎補半兩去毛　牛膝一兩　地龍一分去土　硫砂半兩去灰

右一十二味同搗爲末酒煮糊爲丸如梧桐子大每服五七丸臨臥空心茶酒任下服至十日于皮膚間覺微微行是藥效婦人以醋湯或當歸酒下

馬藺花煎丸　治元臟虛風壅熱上攻下注脚氣等證

馬藺花一兩　大附子一兩炮去皮臍切同馬藺花以水一升煮水乾焙　巴豆春夏二十二粒秋冬三十八粒擘碎和殼同荒花和殼一升半搗黃醋乾焙　白附子一兩　破故紙一兩　牽牛子半兩　槐鄰半兩　荒花一兩

陳皮一兩去瓤　羌活一兩

右十味爲末醋麵糊爲丸如桐子大食前服或臥時空心加減自五丸加服丈夫艾鹽湯下婦人橘皮湯下

草還丹　治風順氣調利三焦明耳目益真元壯筋骨駐顏容保生延壽

仙茅　川羌活　防風去蘆　金毛狗脊去毛

紫花白朮　茯苓去皮各一兩　乾薑　九節石菖蒲

白丑各一兩半　藏靈仙二兩　何首烏　蒼朮各一兩

右十二味各要新好者洗擇淨焙乾並生用細杵爲末以白生砂蜜和爲劑再入白杵三千下熟丸如桐子大每服十五丸至二十丸冷水下不嚼婦人乃候不通紅花酒下半月見效

牛膝煎丸　大治下元氣虛冷氣流注脚膝無力行步不能狀似軟風補益宣陽

川烏頭五兩逐日三度換水浸令透軟去皮臍細切用好酒三升漸漸下熬成膏更細研　木瓜三個下面兩去瓤後將好艾光熟杵爲末入在木瓜內填實蒸熟細研如泥止　海桐皮末入在木瓜內填實蒸熟細研如泥止　牛膝去蘆　羌活去苗　巴戟　萆薢各一兩半　青鹽細研　金毛狗脊去毛　草薢各二兩　青橘皮去白瓤上茴香

右一十味焙乾杵羅爲末以前二味膏攪和令勻相度莫令硬丸如桐子大每日空心溫酒或鹽湯下三十丸勿嚼

牛膝海桐皮煎丸　治腎臟風并腎俞氣有時上攻耳目頭面背膊及流注手臂腰脚筋絡頃麻疼痛或時無力耳作蟬鳴以至重聽大壯筋骨補元氣

牛膝半斤　海桐皮半斤二味細剉杵爲末用好酒五升于盤石臼內浸或將皮膠　赤箭一兩蜜炙　川烏頭二兩炮去皮臍　川苦練二兩　五加皮一兩　虎腦骨四兩塗酥炙令黃色　大黃二兩　桃仁二兩去皮尖以麩炒黃色　赤芍藥一兩　肉桂一兩去皮　當歸一兩　麻黃一兩去根節　地龍一兩去土微炒　川芎二兩　木香　獨活　沒藥研　乳香研　防風去蘆　骨碎補　麒麟竭

乾蝎　天南星生用各一兩　硇砂半兩研飛過　麝香半兩研

右二十九味修事淨同爲末再研令勻細後入前膏內和勻再杵三二千下丸如梧桐子大每日空心溫酒或鹽湯下十丸忌生冷油膩毒物等

天雄沉香煎丸　治下元積冷傷憊陽事不能筋骨無力或成下墜及小腸氣痛并腎臟風毒攻注脾胃不和腰脚沈重

天雄四兩生用剉碎　防風二兩生用　紫小黑豆二兩淨試生用　漢椒四兩

草烏頭四兩生用　附子四兩生用　牛膝二兩

天麻各二兩生用已上九味以無灰酒一斗于銅器內慢火煮不得令大沸酒盡爲度焙令乾　沉香

丁香　木香　羌活　乾薑各一兩　官桂三兩去皮

肉蓯蓉三兩酒浸去土炙熟　紫巴戟二兩去心

右一十六味同杵爲末煉蜜丸如桐子大每日空心溫酒下二十丸加至三十丸此藥兼明耳目雄氣海駐顏色

金粉丸　治風冷氣流注脚脚疼痛行步艱難久患不差

川烏頭一兩每個彈牛膝一兩去苗酒浸細切之　何首烏一兩半蒸　紫金丹　治腎臟風上攻下注虛腫疼痛補暖丹田大進飲食及療婦人血風血氣流注筋骨疼痛或發寒熱口苦舌乾四肢煩倦血海久虛兼化痰涎

黑附子半兩炮去皮臍　丁香半兩　硇砂半兩研飛過　縮砂半兩去皮　當歸半兩

天南星半兩炮　半夏半兩　肉豆蔻五箇　自然銅一兩火煅醋淬

木香半兩　防葵半兩　青橘子半兩　硃砂半兩　水銀一分

右一十四味先將水銀硃砂硇砂三味同細研除即一處爲細末和勻以醋麵糊爲丸如梧桐子大薄荷茶下十丸或薄荷酒下亦可日二服

勞證

夫勞者牢固也勞傷也經曰五勞六極七傷皆因榮衛不調血氣虛損或房或酒或大病愈後有失調理因變證候其狀極多不能備舉大抵春夏劇秋冬差

鹿茸丸　治虛勞傷憊腰脚疼痛少力精神不爽飲食減退駐顏益氣

附子（一兩炮去皮臍）　鹿茸（二兩去毛塗酥炙微黃）　桃仁（一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃）　酸棗仁（三分微炒）　蓯蓉（一兩酒浸一宿去皮炙焙）　巴戟（一兩去心）　防風（三分去蘆）　白茯苓（一兩去皮）　白蒺藜（三分去刺微炒）　草薢（三分剉）　桂心（三分去皮）　石斛（一兩去根剉）　補骨脂（一兩微炒）　當歸（一兩）　羌活（三分）　牛膝（一兩去苗）　木香（三分）

右一十七味同爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒下二十丸

鱉甲散　治五心煩熱飲食減少狀似勞氣

鱉甲（一兩半醋炙）　常山（一兩生）　大黃（一兩炮）　甘草（三分半生半熟）　柴胡（一兩去蘆焙）　石膏（一兩）

右六味杵爲末每服二錢水一盞小麥一把煎至七分去滓溫服却將二服滓再煎作一服神效

神效喝起散　治丈夫女人背脚勞倦肢節酸疼多困少力飲食無味面黃體瘦或發寒熱

鱉甲（洗淨醋炙令黃）　柴胡（去苗）　秦艽　牡丹皮　附子（炮去皮臍各等分）

右五味同爲末每服三錢用續隨石子一個去筋膜以袋白一寸椒末一錢同研如糊入梳與藥相和用童子小便一小盞煎三五沸入藥末攪勻盞盞子盞之放溫服

人參半夏丸　治患勞氣心胸煩悶痰涎壅塞不思飲食頭目昏眩

半夏（一兩湯洗七遍）　大腹皮（一枚）　人參（三分）　枇杷葉（三分去毛炙）　鱉甲（三分醋炙令黃）　柴胡（三分去苗）　茯苓（一兩去皮）　前胡（三分去面）　橘皮（三分去白）　芍藥（半兩）

右一十味同爲散每服三錢水一盞半生薑三片同煎至七分溫服

羌活煮散　治風勞攻疰四肢背脚酸痛上焦虛熱心胸躁悶面無顏色四肢昏沈多困少力元藏虛憊腰脚沉重日漸

羸瘦冷氣時攻腸脇疞刺脹滿酒後痰唾稠多（聖濟總錄作羌活湯用藥白二枚悉二寸）

羌活（二兩）　荊芥（二兩去梗）　附子（二兩去皮臍）　秦艽（二兩去蘆）　人參（一兩）　麻黃（二兩去根節）　茯苓（一兩去皮）　牛膝（二兩酒浸一宿焙）　白蒺藜（二兩酒浸一宿焙）　沉香（一兩）　鹿茸（酥炙）　草薢（一兩剉）　甘草（一兩）　當歸（一兩）　牡丹皮（一兩）　漢防已　官桂（各一兩去皮）　半夏（一兩浸一宿）

右一十八味同擣爲末每服二錢水一盞棗一枚蒸白一寸煎至七分溫服空心午前臨臥各一服忌動風物

沈香鱉甲散　治脾腎風勞氣攻疰背脚四肢煩倦百骨節酸疼喫食減少心胸不快涕唾稠粘多困少力面色黑氣肌膚瘦瘁

沈香　木香　人參　黃芪　牛膝（去苗）　秦艽（去蘆）　柴胡（去蘆）　茯苓　荊芥（各半兩）　半夏（生薑汁浸二宿焙令黃色半兩）　羌活（三分）　肉豆蔻（四枚去殼）　附子（一兩炮去皮臍）　桂心（一兩不得近火去皮）　鱉甲（一兩醋炙令黃）　乾地黃（三分）　乾蝎（一分）

右件洗擇焙乾杵羅爲末每服二錢用水一大盞蒸白二寸薑三片棗二枚同煎七分空心夜臨日午食前各一服忌毒物

金花丸　治急熱勞煩羸面目萎黃頭痛目澀多困少力

黃芩　黃連（宜州者）　川大黃（各一兩）

右件爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每日空心食後溫水下十五丸二十丸

治鬼交多饒驚魘

川楝子（十個炮）　胡蘆巴（一分）　鮑上茴香（一兩）　柴胡（半兩）　附子（一個炮去皮臍）　鱉甲（一個醋炙令黃）　宣連（半兩）

右件同杵爲末煮麵糊爲丸如梧桐子大每服五丸茶酒任下

青蒿煎丸　治骨蒸勞

青蒿（一斤切淨洗去土）　甘草（一兩炙黃色爲末）　杏仁（一兩醋浸去皮尖另研）　柴胡（一兩去蘆爲末銀州者）　鱉甲（一兩去裙襴醋浸令黃赤色爲末）　蜜（二合）

右先用童子小便五升煎青蒿取一升去滓淨入小淨銅子內再煎如稀餳入酥少許及蜜藥末等熬成膏可丸如

梧桐子大每日空心溫酒下二十丸漸加至三十丸忌猪肉麵毒物

橘皮煎丸　治冷勞羸疾目睛手足攣急形容枯瘁食不消化腹脹不能納食食物無味面黃力弱積年腸風痔疾痃癖氣一切勞病女人血瘕氣塊赤白帶下子宮冷甚宿水露血

治五種膈氣冷膈熱膈氣膈恩憂膈四肢無力饒睡此藥大能通利五藏明目出一切風冷

陳橘皮（一斤去白）　官桂（去皮）　乾薑（炮）　川當歸（炙已上四味另研細）　荊三稜（炮）　附子（炮去皮臍）　草薢（已上三味另搗羅）　蒲黃（各六兩）　烏頭（炮去皮臍）　木香（各一兩）　川椒（去目炒出汗一兩）　大麥蘖（四兩）　厚朴（去皮薑汁炙已上六味各半兩擣末）

右件用無灰好酒四升先煎上四味如人行十里更下次三味又如人行十里次入下六味又添酒兩碗煎成膏取出以留出者麥蘖末相和勻再擣一千下爲丸如梧桐子大每日空心以茶酒任下二十丸至三十丸午時再服忌生蕊豆豉此藥煎若用銀石砂鍋極妙如無即取好熟使鐺淨刷洗無油膩先於鐺抹眞酥次下酒及下藥用慢火煎不住以銀匙攪直候如膏取出于淨盤中勻攤候硬軟得所擣好衆手爲丸晒乾此藥如久服即補氣壯真元駐顏色進飲食

燒肝散　治丈夫女人五勞七傷胃脘滿悶飲食少味脚膝無力大腸虛滑即或口內生瘡牙齒宣露及婦人風血氣塊者

肉豆蔻（三個和皮）　官桂（三分去皮）　香白芷（半兩）　當歸　人參　破故紙　茯苓　桔梗（各半兩）

右八味爲末每服四錢羊肝四兩批作片子摻藥在上令勻以刀背微槌以兩粉塗濕紙裹文武火燒令香熟爲度放冷用米飲嚼下

沈香散　治丈夫女人五勞七傷熱無力小便黃赤喫食無味心多驚悸骨節酸疼心胃痞悶兩脇疼痛散滿氣

沈香　檳榔　當歸（去蘆）　官桂（去皮）　前胡　黃芪　乾薑（炮各半兩）　柴胡（去苗一兩）　大附子（炮去皮尖）　人參　茯苓（去皮）　枳殼（麸炒）　訶子（炮去皮）　甘草　五味子（各一兩）

雄腦芎半兩 半夏二兩用漿水煮三十沸細切小片子焙乾用之 草豆蔻二分炮去皮

右件爲末每服二大錢水一盞生薑二片棗子二枚同煎至七分溫服日可三服

柴胡膏 治五勞七傷肢體煩倦日漸消瘦行步稍難飲食不進

柴胡半兩 赤芍一兩一分 白蒺藜根一兩一分 川附子炮 青皮 吳茱萸 陳皮各半兩 青木香一分 烏雞一隻淨去皆皮毛腸肚唯揀肉

右入味爲末入烏雞肉內再杵成膏於磁器內收貯每食前用鹽酒一盞膏一匙頭調服常令患人有酒容只服酒日便見效驗

大柴胡鱉甲散

柴胡 秦艽 常山 貝母 山梔子 甘草 烏梅 豉心 鱉甲塗醋炙 黃芩各一兩 生薑半兩 大黃半兩 桃枝 柳枝 蜜白 蓬白各一兩 糯米半合

右一十七味杵爲末分作八貼用水一升酒一盞同煎至八分作三服早午晚日三服兩時滓併煎作一服此方累醫較人大段瘦者即喫藥大效

炙肝散 治男子五勞七傷手足酸疼四肢煩倦多患口瘡咽喉不利心胸痞滿不思飲食久積泻痢脚膝浮腫日漸消瘦

柳桂 吳白芷 羌活溫水洗浸過 獨活 芍藥各一兩 訶子皮七箇好者 白朮半兩 薑蠶半兩

右杵爲末每服用豬肝一具淨除筋膜切如柳葉狀換水七遍控乾用藥末十錢鹽一分同拌令勻作丸串子以慢火炙熟空心任意服之以生薑粥下之

延壽散 治男子女人少童等傳尸諸勞嗽寒熱百般變候並宜出却蒸汗勞蟲永去根本

牡丹皮 附子炮上皮膠 柴胡去苗 秦艽 鱉甲酒浸炙令赤色各半兩

右五味同爲細末入人中白半兩同研以磁器盛之每服用猪石子一枚蒸白椒末同一處細剉如膏入藥末三錢匙拌和以竹便一盞水半盞同煎令沸溫服其患人帖體著皂紗衫一領服後衣物蓋覆令惡汗出粘膩盡出仍脫皂衫揩拭身乾避風將息每七一度服後汗輕即住皂衣遂以皂角湯泡洗安息香烘乾末後用了即棄于十字路中或長流水內永差

養正膏 治傳尸出汗取辟蠱邪

鱉甲一兩醋浸炙令黃淨去裏拍碎 天靈蓋用七匙頭大一片淨洗酥塗炙令黃色一 桃柳桑枝各七匙長桃仁四十九個去皮尖 安息香一分 青蒿 淡豉三七粒 蒸白一莖

右八味隔夜以水一升浸至五更煎取半升再以童便半升同煎取四合又用檳榔一個爲末麝香一錢將所煎藥去滓調下至日高二丈時放溫頓服以衣蓋汗出審看十指汗出如鵝絲五色臭穢汗出後仍瀉下蟲狀惡物盡甚者旬日再服永效

延齡膏 治一切勞

蝦蟇 鶴骨 丁香 棗葉 鰻鱺 木香 猪牙皂角各等分 麝香另研細少許

右爲末用羊腸大者盛之縛定兩頭於飯甑上蒸熟爲度取出候冷以竹刀子割開同腸研細再入麝香同研令勻爲丸如梧桐子大每日到辰巳間用茅香熟水吞下一百丸後以丸更看病人强弱漸漸服之須得一度喫盡一百丸後以衣被蓋之出汗病甚者略露面其蟲遂從後汗出屍蟲如麥麩大餘者皆微壯出盡汗後病人其身輕快十去三四也候汗乾後即一時換却原著衣服并臥物等初服藥見當時隨藥便盡吐出並不住即難療或一百丸猶可醫別以新藥補數如藥全住疾無不退服藥後忌一切動勞等物此藥病甚者喫及兩服至三服即永除根本一服後別用喫無觸忌治勞煎散三五服爲妙初出汗頻換手帕揩之約兩炊飯久腸勞隨瀉下一度別用盆一個盛之其蟲皆微壯浮在上面動服藥後如不吐甚妙也一生永忌觸犯藥苦參人參空青麥門冬烏頭切忌服之

鬼哭飲子 治一切勞

阿魏一分微煨一處 東引桃枝小者一人握如用其子只用一兩半 檳榔一兩爲末 蒸白二寸連根 甘草 青蒿大一

右用童便二升浸桃枝甘草青蒿蒸白四味一宿來日五更初煎取六合去滓然後入阿魏更煎兩沸分爲二服每服臨喫時入檳榔末半兩同服如覺心頭惡必吐吐後更進第二服如是服兩一服後心頭安穩即須進二服必然通轉當下必見惡物服時仍不得令人與患者面對恐惡蟲飛入人口鼻內 此藥如是女人患須是男子面向北與煎如男子患却須女人向北與煎仍忌猫狗見患者春喫二服秋喫三服每年五服勞蟲並盡即去病根

血證

順中散 治肺臟壅熱毒則胸膈壅滯血與氣皆逆行上於肺肺壅不利故令人吐血不止朝夕不住發寒熱氣喘促紅物至多頻頻嘔吐漸至勞劣

槟榔好者枚 大黃半兩 甘遂半兩 木香半兩 茴香半兩 白牽牛子半兩 青皮半兩湯浸去白焙

右件同杵爲細末每服一錢用木香煎湯下或木香酒下亦得如作常服茶酒任下一宇 如曾中藥毒嘔逆黑血至多不能飲食服此順中散亦能解毒止血

治暴吐血不止方

用人參一味爲末每服一大錢以雞子青投新水半盞調下

嘔黃丸 治吐血衄血

嘔黃一兩用小豉合子內盛上用不灰木炭一錢煨令赤一錢滴水和勻作餅子蓋頭石膽燒已灰半碗蓋合子上用一斤炭燒如不聞藥香未得住火如聞香即住火焰度教令取出沙研細末入小二味馬兜鈴子去皮 甘草並二味微煨令黃燒下杵勻各用四錢

右件同研爲末煉蜜爲丸如皂子大以綿裹一丸含化

漢防已散 治咯血

漢防已 鶴州黃芪各一兩

右件同細搗爲末每服一錢水一盞小麥二十粒同煎七分食後溫服

盜汗

煎麥散　治榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼飲食進退肌瘦面黃

大鱉甲二兩醋煮三五十沸後淨去裙襴另用好醋煮令青　銀州柴胡二兩去苗　大川烏頭一兩炮製去皮脐　元參三兩　乾漆一兩炒　乾葛一兩　秦艽二兩去土　人參一兩　茯苓一兩

右件爲末每服二錢先用小麥三七粒麻湯一盞去麥同煎至七分溫服食後或臨臥時服之如久患後亦宜服此以退其勞倦調順經絡

如智散　治五心虛煩夜多盜汗面色黃瘁四肢少力多困饑睡飲食不進

萎蕤　川芎　青皮去白　肉桂去皮　木鱉子　當歸去須　羌活　秦艽　柴胡去苗　黃芪已上各一兩　甘草如五心發熱即減半兩一兩　烏梅

右同杵爲末每服一錢水一盞入青蒿頭子七枚同煎至七分去滓溫服若冬月無青蒿以蓋蒿代煎之

地骨皮散　治骨蒸壯熱肌肉減瘦多困少力夜多盜汗

地骨皮水洗　秦艽水洗淨　柴胡去苗　枳殼去瓤麩炒　知母生用　當歸去頭　鱉甲去裙襴醋炙黃色

右各等分爲末每服二錢水一碗桃柳枝頭各七個生薑三片烏梅一個同煎至七分去滓溫服每日空心臨臥各一服

上焦證

人參荊芥散　治上焦壅滯頭目昏眩涕唾稠粘心胃煩悶

人參　柴胡去苗　羌活　荊芥　旋覆花　甘菊　桑白皮各等分

右七味同杵爲丸每服二錢水一盞煎七分食後臨臥溫服

利膈散　治上焦壅多患咽喉胷膈不利

荊芥穗子青乾淨好者　鼠粘子各一兩　甘草三分炮過　白丑二兩炒令香熟

右爲末每服一錢入鹽點兼治風牙痛以三末入川椒一粒鹽二錢煎熟熱含冷吐出

白蒺藜散　治上焦虛熱頭目昏疼或眼赤腫心胃煩悶

地骨皮去土　白蒺藜去皮　旋覆花　山茵陳　白菊花已上各半兩　鼠粘子　石膏各一兩

右七味並生同杵爲末每服一錢食後茶湯調下日進三服

金花散　治心腹壅熱重蒸上焦致口氣生瘡連年不差

黃連半兩炒令稍焦赤色如年少即加一分許　人參半兩　枳殼半兩麩炒微黃　甘草半兩炙微赤　半夏半兩以薑汁拍破浸一宿兼出培乾

右五味爲末每服一錢生薑三片煎六分食後臨臥溫服

白龍丹　治上焦風壅化痰涎利胷膈逐風祕

雷丸末二錢　甘遂末三錢　牽牛一兩炒取末六錢不用再羅者　龍腦少許

粉霜四錢入口麵少許三味同研令勻細滴水和作餅子於後火內煨令熱取冷研令細　輕粉四錢水和作餅

右同爲細末研令勻入青州棗煮熟取肉和爲丸如菉豆大每服五七丸溫漿水下　如一切風癇驚搐涎滯並以漿下七丸及至十丸　如小兒痰熱及渴不止頭疼但煩少與服自然消除　大人風氣壅盛上焦不利最宜服此更在臨時的其加減

蒼耳散　治上焦風壅中脘有痰頭目昏暗心煩口乾利膈化痰涎

旋覆花一兩　細辛一兩去葉　川芎二兩　甘草半兩炙　獨活各半兩　羌活各半兩　皂角二挺燒存性

右七味同杵爲細末每服一錢水一盞煎至六分食後臨臥熱服

犀角散　治上焦壅熱咽膈腫痛不利

鼠粘子一兩炒令香熟　甘草一分　荊芥半兩

右三味同爲細末每服一錢水五分一盞煎令沸去滓溫服大利胷膈

中焦證

沈香散　治脾元氣不和中焦痞悶氣滯噦寒進食和氣

沈香　木香　青橘皮去白　郁李仁湯浸去皮另研　陳橘皮去白　人參各用一兩　豆蔻　檳榔　肉桂去皮　甘草炙　乾薑炮製各半兩

右十一味同爲末每服一錢水一盞煎至七分溫服不以時候

四倍散　治脾元氣不和大補虛損

訶子一兩煨　人參二兩　白茯苓四兩去皮　白朮半斤

右四味同爲細末每服二錢水一盞入生薑棗子同煎至六分去滓溫服空心食前服如早晨常服有大功效

白豆蔻散　補中益氣調順脾元心胃滿悶不思飲食上熱下冷

白豆蔻仁半兩　肉豆蔻三個　白朮一兩　厚朴薑汁炙半兩　甘草三分炙　肉桂半兩　青皮半兩

右七味同爲末每服二錢水一盞生薑二片棗米少許煎二枚同煎至七分去滓熱服大妙

木香通真散　治中脘氣不和心胃滿悶氣刺脇肋飲食無味和氣

木香半兩　人參一兩　官桂一兩半去皮　川芎一兩　陳皮二兩去皮　茯苓一兩　青皮一兩去白　厚朴一兩半用生薑汁塗炙令黃　茴香一兩用上者　檳榔半兩女人用桃仁一兩麩炒去皮尖

右十二味除桃仁另研外餘並擣羅爲末入桃仁拌和令勻每服一錢水一盞鹽少許同煎七分溫服不拘時候大能和順脾元氣

嗽氣散　治氣調中和脾胃御藥院云治心胃虛冷頭痛嘔逆飲食減少氣不宣通

荊三稜五兩　白朮三兩　萊菔五兩銼炒　枳殼去白一兩麩炒

木香半兩

右五味同爲末每服二錢生薑三片水一盞煎六分溫服如和脾胃即更入棗同煎　若解傷寒併三兩服汗出立差

下焦證

燒石子茴香散　治下焦虛冷腸腹撮疼心胃痞脹和元氣進飲食

舶上茴香　川附子炮去皮臍　官桂去皮　木香　紫白蔻去心　胡椒　陳皮去白　川椒去目　乾薑炮各半兩　荊三稜一兩煨

右一十味同爲細末每服用猪石子一對洗去筋膜切作薄片以末二錢入葱絲少許鹽半錢濕紙裹煨熟餌訖以酒或粥飯壓之須臾腳下暖甚妙

牛膝煎丸　治男子下元虛冷傷憊筋骨衰弱遍身癢疹及風氣上攻下痓疼痛不可忍者

牛膝五兩去苗切作細段用好酒浸三日取出細研如麪糊用酒於銅器內慢火熬成膏爲度　附子炮去皮臍　川芎　虎骨酥炙黃色各三兩　破故紙　葫蘆巴　蓯蓉酒浸三日細切焙各四兩　巴戟生用去心　仙靈脾去莖梗生用各一兩

右八味各修事淨一處杵爲細末用牛膝膏和合入臼杵令軟硬得所丸如小彈子如是難丸更入少多熟蜜同丸每日早晨及夜臥溫酒化下一丸嚼下亦得志意服一月永無風氣攻痓及癥疹自然肢體安暢

補骨脂丸　治脾腎久冷積氣成塊或發疼痛補暖

大木瓜一個去皮瓤入硇砂一兩去砂石墨令熟研爛極　補骨脂炒　蓯蓉　官桂去皮　青皮　木香　縈香子　槟榔已上各一兩　荊三稜半兩醋浸一宿炒令黃　肉豆蔻半兩

右九味爲末用木瓜爲丸如梧桐子大每日空心鹽湯下二十丸溫酒亦可

硇砂丸　治男子元臟虛憊積冷壅滯憊虛冷不思飲食憊意無力（巴戟有白木）

羊腰骨一條去淨肉用硇砂二兩醋二升同煎煎蒸羊腰骨令焦黃以醋盡爲度焙乾　木香　白槟榔　官桂去皮　人參　牛膝　茯苓　郁李仁　附子炮　巴戟去心　蓯蓉

丁香　沈香　蓯蓉已上各一兩　石斛半兩　阿魏半兩用麵

右十六味並杵羅爲末用酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每日空心鹽酒或鹽湯下二十丸

三焦總治

麻仁丸　治三焦不和藏府虛冷胃隔痓悶大便秘澀

麻仁四兩先以溫水浴曝在井中五日令生芽日晒退皮取仁　大黃四兩二兩煮二兩生用　白槟榔一兩半　山茱萸一兩半　蓯蓉一兩半　官桂去皮一兩半　車前子　枳殼麩炒　防風各一兩半　羌活一兩半　木香一兩　兎絲子一兩半酒浸宿後炒黃　郁李仁四兩

右十三味同爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸臨臥溫水下

三焦散　治三焦不和榮衛不調肢體煩倦頭目昏疼飲食無味多困少力寒熱痰壅頭旋

前胡　柴胡各去苗　桔梗　羌活　獨活　人參　枳殼麩炒　鱉甲去裙襴酒浸炙黃各一兩　甘草半兩炙　石膏一分如頭　旋覆花半兩

右十一味爲細末每服一錢半至二錢水一盞煎至七分溫服　解傷寒發汗入麻黃一兩去節同杵爲末　如上焦不利口心入地骨皮一兩半

麥門冬散　治三焦不利心肺多壅痰涎併積口舌乾燥喘嗽疼肢體黃瘁氣血不調

麥門冬去心半兩　桔梗半兩　夏各一分　貝母　升麻各半兩　蔓荊子一分　甘草半兩　前胡　防風　款冬花　桑白皮各半兩　杏仁一分　白术一分　五味子一分用薄荷　赤芍藥半兩　菊花一分

右十六味各洗擇令淨焙杵羅爲末食後夜臥各進一服每服二錢水七分盞生薑一片同煎至三分去滓溫服大益心肺

牛黃甘露丸　治三焦鬱疾飲水無度舌上皴裂肌肉黃瘦精神減退小便多頻脇服

硃砂一兩研者　牛黃一分　鐵粉半兩　犀角半兩剉　丁香半兩　胡桐淚半兩　藏麝半兩　麝香一分　銀箔五十片　地龍半兩

槟榔　牡蠣　苦參　石膏　錫箔紙　甘草炙　白扁豆各半兩微火炒　鉛白霜半兩　麥門冬半兩去心　知母半兩　宣連一兩　金箔一百五十片　生栝樓根一兩杵細

右二十三味除栝樓根另杵同爲細末煉蜜和臨和時即入金箔及生栝樓根一處和勻爲丸如豌豆大空心金箔三片銀箔三片碎研米飲下十丸漸加至二十丸飯後臨臥各一服日近輕者當日止重者三日止十日後只空心一服夜後一服用金銀箔各一片一月日外只用溫漿水下五十丸其藥合二月至九月即用生栝樓根九月後只用煉蜜和爲丸亦得忌鹹酸炙煿魚酒等

利膈丸　治三焦不順胃膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎精神不爽

牽牛子四兩一半生一半熟　不蛀皂角塗酥炙令香然用二兩

右二味爲末以生薑自然汁煮糊爲丸如梧桐子大每服二十丸荊芥薑湯下

神妙沈香丸　消化滯氣調順三焦空胃膈理脾元大能化酒食毒

丁香一分　沈香一分　乳香一分　阿魏少許　肉桂半兩去粗皮　槟榔二枚冬加二枚　肉豆蔻二枚夏加二枚　蓽撥半兩　舶上茴香半兩炒　巴豆十五個去皮心不出油另研

右爲細末研入巴豆阿魏令勻煮白米飯爲丸如菉豆大每服五丸生薑湯下　如胃膈氣不和及元臟冷氣上攻迷悶加至十丸溫酒下　常服茶湯任下要微動以意加服之

橘香散　調順三焦平和胃氣順氣

白术四兩米泔浸宿洗淨　陳皮二兩去白　茯苓一兩去皮　甘草一兩炙　附子一兩炮　乾薑半兩炮

右爲末每服二錢水一中盞薑二片棗一枚同煎至七分溫服如覺傷寒入荊芥煎服

五藏證治

茯神丸　治心肺壅熱口苦舌乾沸唾稠粘胸膈煩悶不思飲食肢體倦怠或發煩熱狀似骨蒸

茯神二兩去皮木　柴胡一兩半去苗　黃芪一兩半　生乾地黃二兩

桔梗　鱉甲二兩醋炙黃色　人參　白前各一兩　枳殼一兩麩炒去白　赤芍藥半兩

右十味杵爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每食後生薑湯下十丸臨時更加減服

金花散　治心肺積熱咽喉不利口舌生瘡心胷煩悶涎沫多

菉豆粉四兩　雄黃三分　甘草末七錢　朴硝五錢　白豆蔻半兩　生腦子半錢　麝香半錢　甜硝五錢

右八味杵爲末旋滴生蜜少許研令勻入磁器內收貯每服半錢用薄荷水調下小兒驚亦宜服之

潤肺散　治肺氣壅滯咳嗽不已

甜葶藶一兩隨子內紙隔煨火內炒熟　肉桂一兩　馬兜鈴大者二枚微炒用

右三味杵爲細末每服一錢水一盞煎至七分放溫食後時時呷一口可自早至午服盡或臨臥溫水調一字或半字亦可

貫芪散　治肺臟壅塞咳嗽涕唾稠粘咽喉不利

黃芪去蘆蜜炙出擣碎焙秤一兩　山梔子一兩如雀腦者去皮炒黃　甘草水浸一宿焙用　茯苓赤者以水中澄去浮者炒用一兩　秦艽一兩須是于腳下左文切布拭都毛　柴胡一兩去蘆以布拭去土淨剉勿犯鐵器　地骨皮半兩　川升麻半兩　甘草半兩炙　黃芩一兩　人參一兩

右十味同杵爲末以磁器內盛貯每服三錢水一盞同煎至六分去滓溫服食後服之

蛤蚧散　治患肺痿咳嗽即肺壅嗽

蛤蚧一對新好者用湯洗十遍慢火內炙令香研細末　人參　茯苓　知母　貝母去心煨湯洗　桑白皮已上各二兩　甘草五兩炙　大杏仁六兩湯浸去皮尖麸炒令香取出研

右八味同爲細末入杏仁拌勻却粗羅再篩研細爲妙每服半錢入生薑二片酥少許水八分沸熱服如以湯點頗服亦妙

鵝梨煎丸　治肺風攻皮膚成瘡癬瘙痒大化痰涎解壅熱

鵝梨去皮核一個大者　薄荷一斤　皂莢十挺浸大者蛀者已上三味搗爛中揉取汁用自然汁法去滓　杏仁四兩去皮尖麸研將杏仁膏并前自然汁同于銀石器內慢火熬成膏後另入藥末

防風去蘆　白蒺藜微炒去刺　天麻炙令通黑各二兩　威靈仙去泥　甘草炙一兩

右六味杵雜爲細末入煎肯內溲和爲丸如梧桐子大每服食後用溫漿水下十五丸至二十丸臨臥時再服

救生丹　治遠年日近肺氣喘急坐臥不能總煎用竹瀝丹

雞內金三七枚雞肫內黃皮是也旋旋去之　甜葶藶炒令黃紫色　黑牽牛子半兩用瓦上慢令下焦　砒信一分另研研令如粉　黃丹半兩研令如粉法裂

右六味爲細末煮青州棗大者十二枚去皮核搗和爲丸如菉豆大以硃砂爲衣食後臨臥溫薏苡下七丸甚者十丸不過三五服立效須忌大冷大熱毒食等

杏仁丸　治肺氣喘急者由肺乘於風邪則肺脹脹則肺不利經絡溫氣道不宣則上氣逆喘或息鳴

馬兜鈴　杏仁去皮尖　蟾蜍各半兩爲末　砒霜一分

右爲細末煮棗二十枚去皮核和藥末爲丸如梧桐子大空心薄荷湯下二丸妙

紫蘇膏　治肺痿勞嗽喘促涕唾稠粘咽膈不利

生地黃三兩　生薑二兩與地黃相和研研布絞取汁　生天門冬半斤　生麥冬一斤　杏仁三兩生研入　紫蘇子二兩炒研　生牛蒡四兩　生元參一斤

右八味洗令淨剉碎同研令如泥蘇子杏仁投于地黃汁內更以細物濾絞汁去滓於銀石器內盛用煉蜜五兩半貫酥二兩安於炊飯甑上蒸一飯久於淨器內收不以時候抄一小匙嚥之如久服大益心肺潤肌膚補助榮衛忌生冷猪肉

秦艽散　治肺痿勞咳嗽不止時覺寒熱涕唾稠濁

秦艽炙　柴胡去蘆　貝母炮　桔梗　陳皮去白一兩　甘草炙三分　訶子一兩半煨去核用肉秤　麻黃各一兩

右八味同爲末每服二錢空心熟食前用小便一盞烏梅一個同煎三五沸溫服

華蓋散　治肺感寒氣有痰咳嗽久瘵不差

紫蘇子炒　麻黃去根節　杏仁去皮尖　陳皮去白　甘草半兩炙

桑白皮　赤茯苓去皮各一兩

右七味同爲末每服二錢水一盞煎至六分食後溫服

豆蔻湯　治脾胃虛弱不思飲食吐嘔滿悶胃脘不利心腹滿

草豆蔻肉八兩　生薑和皮切作片子用一片　甘草四兩剉碎

右三味勻和入銀器內用水過藥三指許慢火熬令水盡取出焙乾杵爲末每服一錢點之夏月煎之作冷湯服亦妙

十味人參散　調理榮衛進飲食解利經絡去久滯風邪

人參　厚朴薑汁炙　官桂去皮　甘草炙　杏仁去皮尖　白朮　乾薑炮　茯苓去皮　麻黃去節和根　陳皮去白

右各等分爲末每服二錢水一盞入薑煎七分熱服如纖覺吹著不安連二三服汗出立愈

平胃散　治脾胃氣不和不思飲食

厚朴去粗皮薑汁炙令香淨二兩半　甘草炙一兩半　蒼朮米泔水浸一日剉去皮四兩　陳皮去白二兩半　人參一兩　茯苓一兩

右六味爲末每服一錢水一盞入生薑棗子同煎七分去滓溫服空心服之或杵細末蜜爲丸如梧桐子大每服十丸鹽湯嚥下空心服治氣利膈進食平胃丸也如做湯入鹽點服亦曰白朮湯此藥本無人參茯苓二味好事君子加之

丁沈丸　治脾胃一切氣不和吐逆不思飲食霍亂不止心腹刺痛脹悶胷膈噎塞久積虛氣傷酒瘀逆婦人血氣及月候不調理中

丁香　沈香　木香　檳榔　白豆蔻

雲南根各半兩　肉豆蔻去皮　甘草炙　青皮去白各半兩　茯苓各二兩　白朮四兩　人參　訶子一兩去核　麝香一錢研　元參一兩半　官桂一分　丁香皮半兩　金鈒石斛一兩　柳桂一分　乾薑一分炮

右二十味同爲細末續入麝香和勻煉蜜爲丸如酸棗大每服半丸或一丸爛嚼炒生薑橘皮鹽湯下溫酒亦可

草豆蔻散　治脾胃氣不和霍亂不止酒食所傷兼患脾泄

能和一切冷氣

厚朴（二兩去皮用生薑三兩取汁浸炙汁盡為度）　草豆蔻（和皮一兩）　乾薑（一兩炮）　白术（一兩炮黃色）　訶子（一兩炮去核細切炒二兩）

右為末每服二錢　霍亂冷米飲下或酒調下　脾痛不可忍者炒生薑酒下三錢　餘即如湯煎服

椒朴丸　治脾胃虛乏伏積冷氣喫食不消多困羸瘦面黃口淡不思飲食

梓州厚朴（去皮用十兩以薑汁炙令香細剉）　漢椒（揀淨十兩）　鹽花（十兩）　黑附子（二兩炮去皮臍剉碎）

右以水十碗於銀石器內以文武火熬候水盡為度焙乾同研為末煉蜜并糯米粉同為糊和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸空心溫酒下　如大腸滑洩生薑米飲下

藿香丸　治胃氣消食定霍亂止嘔逆進飲食化冷痰

藿香（一兩）　厚朴（一兩去粗皮薑汁炙令香熟）　甘草（三分炙）　官桂（半兩去粗皮）　青皮（三分湯去瓤切細炒）　乾薑（一兩炮）　枇杷葉（一分炙去毛）

右七味同為末每服二錢水一盞薑二片棗一枚同煎七分服

丁香散　暖脾助胃止心腹痛進食定嘔逆治霍亂

肉豆蔻（去皮）　人參（各半兩）　白茯苓（去皮）　蒼术（三分）　青木香（半兩）　吳茱萸　丁香（各一分）　厚朴（炙令香熟）　荊三稜（炮半兩）　乾薑（炮剉半兩）　芍藥（半兩）　甘草（一分）

右十二味同杵細末每日空心食前米飲調下二錢

華澄茄散　治脾元虛冷氣不和心胃不快肚腹膨脹氣刺氣痛元氣疾疼不思飲食酒色過度面黃口淡

華澄茄（半兩炒）　荊三稜（三兩炮煨）　陳皮（二兩去白）　香附子（三兩炒）　甘草（二兩炮）　丁香（二兩）　胡椒（二兩）　荜澄茄（一兩）　官桂（一兩去皮）　桔梗（一兩）　白豆蔻（十二枚擣碎）　阿魏（皂子大一塊麵裹煨麵黃為度去麵另研細旋入諸藥）

右十三味同為末細研和令勻每服一錢入生薑二片水八分盞煎五七沸熱喫如作湯入薑一錢點之大藥中酒兼其味甚佳

香蘇散　治肝元風盛則於脾胃致多飡洩調順中脘平和

胃氣

紫蘇葉（一分揀淨焙乾）　肉豆蔻（一分去殼）　天雄（一分剉碎以鹽一兩炒令黃色住）　青皮（去白一分）　縮砂仁（一分）　白术（半兩細剉炒黃色）　川芎　甘草（各一分炙）

右九味為細末每服二錢水一盞生薑三片同煎五分溫服日進三服

柴胡散　治榮衛不順體熱黃瘦筋骨疼痛多困少力飲食進退

柴胡（二兩）　鱉甲（二兩）　甘草　知母（各一兩）　秦艽（一兩半）

右五味杵為末每服二錢水八分盞棗二枚煎六分熱服

烏頭丸　補煖水藏壯筋骨縮小便大治風

川烏頭（一斤用東流河水浸二七日每日三度換水日一河水浸二七日每日三度換水日一夫切准細薄片入棗牛子一合同炒候香熟法牽牛子不用）　鮑上茴香（二兩另杵為末）　青鹽（五兩另研）　陳皮（去白二兩）　牛膝（五兩細切以好酒浸一七日爛研）　川椒（五兩揀去子）

右六味依法修製用牛膝膏拌和勻入臼再杵千下丸如梧桐子大每日空心鹽湯溫酒任下十丸至二十丸牛膝酒浸後爛研與諸末拌和恐難得細或只將牛膝浸日足後焙乾為末却將浸牛膝酒煮糊和末為丸亦可若更服可腦湯散最相宜也

諸氣

夫人之生稟於榮衛人之本皆係於氣氣若和平邪正不能干犯氣若盛衰百病由是生焉故怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收聚熱則腠理開而氣洩憂則氣亂勞則氣耗思則氣結經曰九氣七氣及言諸氣者皆不出於此也診其脈寸口伏冒中逆氣是諸氣上衝胷中故面浮腫喘息如脈浮大不治上氣脈躁而喘者屬肺肺脹欲作風水發汗即愈其脈若虛寧得伏匿者生牢強者死喘息低不得者其脈滑手足溫即生如脈濇及手足冷死數者亦死謂其形損故也至于五積六聚癥瘕塊皆由陰陽不和臟腑虛弱受於風邪搏于臟腑之氣所為也腑者六腑也臟者五臟也臟為陰腑為陽陽浮而動陰沈而靜是以五臟積癥發不離其部上下有所窮已聚瘕者六腑所成痛無常處上下無所留止蓋由臟腑受邪初未能為疾留滯不散乃成癥瘕也

了沈香丸　治一切氣不和心腹痛悶氣脹胷膈壅塞不利及積冷氣或時攻衝脾胃氣逆不思飲食霍亂不止臟腑滑洩酒食所傷醋心不消冷痰併多大效

甘草（炒）　官桂（去皮）　沈香　丁香　木香　槟榔　訶子（炮去核各半兩）　人參（半兩）　白术（四兩剉碎炒黃）　白豆蔻（去皮半兩）　肉豆蔻（去皮半兩）　青皮（半兩去瓤）

右十二味同為細末煉蜜為丸如小彈子大每服一丸生薑湯嚼下

阿魏丸　治男婦一切氣攻刺疼痛呼吸不得大腸滑洩

阿魏（半兩）　當歸（半兩細切醋炒）　官桂（半兩）　陳皮（半兩去白細切醋炒）　白茯（三分）　吳白芷（半兩）　蓬术（一兩）　延胡索（半兩醋炒剉）　木香（三分）　吳茱萸（半兩醋炒）　川芎（半兩醋炒）　附子（半兩炮去皮臍）　乾薑（一兩炮）　肉豆蔻　硃砂（各三分研細末）

右除阿魏硃砂外同杵為細末以頭醋半升浸阿魏經宿用生絹裝取汁煮麵糊為丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五丸溫酒下橘皮湯亦可婦人醋湯下

小了沈丸　治一切氣疾開胃口消酒食毒

甘草（一兩炙）　縮砂（一兩去皮）　白芷（一兩炒）　阿魏（一兩用醋半升煮為膏入諸末在內）　麝香（少許）　木香（半兩）　丁香（半兩）　陳皮（四兩去白）　鮑上茴香（半兩炒）　生薑（一斤細切入合和絞汁）　青鹽（四兩拌令一宿焙乾）　沈香（一兩）

右一十二味杵為末醋煮麵糊為丸如雞頭用硃砂為衣每空心及喫酒或鹽薑湯嚼下一二丸大化酒食毒和氣場氣散　治虛氣攻衝心胷滿悶元氣冷疼及一切氣不調順

鮑上茴香（炒）　枳殼（麩炒去白）　茯苓　人參（各半兩）　陳皮（去白二兩）　青皮（去白二兩）　甘草（炙半兩）　乾薑（炮半兩）　高良（一分）　蒼术（半兩）　丁香（一分）

右十一味同杵為末每服一錢水一盞入生薑棗同煎至七分熱服入鹽如茶點服亦可

揀氣丸　治一切氣

木香（半兩）　荊三稜（一兩炮）　青皮（一兩去白）　乾薑（半兩炮）　木瓜（一兩）　茴香（一兩炒）　胡椒（一兩）　官桂（一兩去皮）　阿魏（一錢用白麵和煨熟）　甘草（一兩炒）　槟榔（一兩炮）

右十一味搗羅為末用蒸餅先水浸過後和為丸如彈子

大硃砂爲衣每服一丸鹽湯嚼下

乳香丸　散滯氣消酒食利胃脘化痰和順元氣止冷氣攻刺

乳香　沈香　沒藥　木香　硃砂細研　烏頭炮　蓬莪朮　檳榔各一兩　茺花炮炒令赤　枳殼　狼毒醋煮　乾漆炒各半兩　阿魏一分　青皮三分

右一十四味同杵爲末以硃砂一兩半用水飛過去砂石以川楝子肉四兩爲末同以好醋熬成膏入在前末和勻爲丸如豌豆大每服十丸十五丸溫酒或薑湯鹽湯任下亦可

桂枝丸　治氣利胃脘進飲食充肌膚療心疼腹痛若宿酒後服妙

檳榔三個大者　牽牛三兩以一半麸炒一半生用　官桂二兩去皮　陳皮二兩去白　乾薑二兩炮　青皮二兩去白

右六味同爲細末煮醋麵糊爲丸如菉豆大每服十五丸茶酒任下如婦人心腹疼即醋湯下　男子用茴香湯下勝金丸　治一切氣不和及女人血氣腫化積滯消酒食

茺花　大戟　甘遂　牽牛　乾漆　青皮　陳皮去白　巴豆各半兩　硇砂　膽礬各一分

右除硇砂膽礬外餘並用生薑半斤搗碎入好醋一升浸一宿取出薑不用控乾焙令乾爲末醋化硇砂并膽礬煮麵糊攪和爲丸如豌豆大消酒食及常服茶酒任下三五丸　婦人心氣痛醋湯下　水氣及一切氣腫并痎瘧生薑酒下　一切氣不和生薑湯下

五積散　治一切氣

茅朮二十兩　桔梗十兩　陳皮六兩去白　吳白芷三兩　厚朴二兩去皮　枳殼四兩麸炒　官桂去皮春夏用三兩秋冬用四兩　白茯苓一兩去皮　芍藥一兩　當歸二兩　人參二兩　川芎一兩半　甘草二兩　半夏一兩洗七遍　乾薑春夏用一兩半秋冬用二兩　麻黃去節根春夏用二兩秋冬用三兩

右各洗擇淨焙乾除官桂枳殼另杵外諸藥同爲粗末分作六分於大鐵鍋內以文武火炒令微亦黃熟爲度下可令焦須是勻取出以淨紙襯安板床下候冷勿令塵土侵却入前枳殼官桂末和勻密器內收貯　若陰氣傷寒手足逆冷或睡裏寤驚及虛汗不止脈氣沉細面青或手足冷心多嘔逆宜入順元散一錢同煎熱服　或婦人產前胎不安及傷腹痛只依常法以末二錢水一盞煎至七分服　如生產痛陣踈及艱難經兩三日不生胎死腹中或產母頓無力產戶乾即入順元散同煎以水七分酒煎數十沸相次喫兩服其產母便省有力其血氣內和便自有痛陣胎死者不至三服其順元散多少量產母虛實用之神效　或是傷寒徧身煩熱頭痛每服更入蔻白一莖或七粒同煎服之連喫三服出汗陽毒不宜　或脾胃不和內傷冷食渾身疼痛頭昏無力或痰逆或胃脘不利氣壅或多噎塞飲食不下及元氣攻刺兩脇疼痛及女人血海久冷月候不勻走疰腹痛及不行者並如常法前服順元散

順元散

川烏頭二兩炮去皮臍　附子一兩炮去皮臍　天南星一兩炮

右三味同爲細末每服入前散子用之

豆蔻散　和一切氣及疎轉後用之亦可

肉豆蔻三個　官桂一分去皮　川芎一分　香附子一十個炮過　零陵香一分　陳皮一兩去白　甘草三分炮

右七味同爲散每服一錢水一盞薑棗同煎六分不拘時男婦老少並宜服之

治項氣方

猪膽二七個子瓦上焙乾　甘草一兩　桑白皮一兩　石楠根皮一兩麸炒　刺椿根頭皮一兩　黃蘗少許　膩粉一十文

右七味同爲散每服二錢以陳米飲調下空心臥服忌生冷油膩動風物

磁石丸　治諸氣腫大有妙效次用補藥

羌活　陳皮　木香　澤瀉　赤茯苓去皮　附子炮去皮臍　檳榔　白朮　訶子炮皮用肉　蓬莪朮　椒紅　上好磁石吸鐵多者燒赤入醋中淬十次細研水飛過至極細焙炒　烏頭炮　桑白皮另研羅爲末用藥餅　鼈甲另研取細末　黃芪

右一十七味各半兩爲末用羊石子或豬石子去筋膜生細研和末再杵一二千下如硬更入酒糊丸如梧桐子大焙乾空心日午溫酒下二十丸至三十丸切忌房室并鹹藏諸毒物須至百日外

分氣丸　消滯氣利胃脘止心疼化酒食毒治腹脇脹滿

荆三稜醋浸一宿切作片焙乾用　牽牛微炒　大戟各三兩細剉炒令紫色　茺花二兩麸炒　甘遂二兩微炒令黃色　官桂去皮一兩

右同杵爲細末以醋煮糊爲丸如菉豆大每服十丸煎陳皮湯下不嚼破如大段腹脹膨滿氣滯如要行動漸加丸數并喫三兩服以微利爲度

搜癥丸　治結氣

硇砂　川烏頭　官桂　乾漆各半兩

右搗爲細末用青州棗煮熟取肉爲丸如菉豆大每棗肉一個用巴豆五枚一處同杵一二千每服五丸木瓜酒下

七聖散　治氣

厚朴四兩去皮後剉細用薑汁炒令紫黑色　生薑二兩洗淨細切作片焙乾一宿炒令紫黑色　牛膝一兩細剉炒至色黃　甘草二兩細剉炒令紫黑色　陳皮去白六兩炮令紫黑色　晒豆蔻二兩炮令紫黑色細剉合

右各炒了更同炒令勻同爲細末常服二錢入鹽少許點吃忽患脾氣等疾每服三錢薑二片棗二枚水一盞同煎至六分溫服　婦人冷血氣亦宜服忽氣痛等疾並宜服食　凡硇轉後並宜以此補治之

補陰丹　治男子本臟氣婦人血氣一切氣疾及產後一切血臟病患宜服之

硃砂去石　硇砂去石　延胡索　木香　半夏湯浸七遍　茺花醋浸炒黃色　斑猫去翅足糯米炒令黃黑色　川苦楝子醋浸炒黃　荆三稜　海蛤　蓬莪朮　大附子炮去皮臍　上酒香　青皮各兩　肉豆蔻三枚　檳榔三枚

右一十六味搗羅爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服五七丸女用醋湯男用溫酒或鹽湯下空心臨臥各一服　此藥大健脾元能療小腸氣膀胱氣刺疼痛婦人產後惡物不盡變作血瘕者並宜服之

慈白散　治一切冷氣不和及本臟虛冷氣攻衝疼痛大治

婦人產前虛後暖痛胎不安或血刺者兼能治血臟宿冷百骨節倦疼肌瘦性弱傷勞帶癖服久盡除但婦人一切疾病最宜服之

川芎　當歸　枳殼（麩炒）　厚朴（去皮薑汁炙）　官桂（去皮）
乾薑（炮）　芍藥　木香　蓬莪朮（煨）　青橘皮（去白）　茴香（炒）
麥糵（炒）　人參　蓬莪朮（煨）　荊三稜（煨）　苦楝子（去皮各一兩）　茯苓（去皮）　乾地黃（一兩）
大黃（半兩味酒浸用）　訶子（半兩去核）

右二十味同杵為末每有患者三平錢常服之只須用二錢用大葱白二寸分中擘破用清水一盞同煎至七分熱服後入鹽半錢和滓熱服至方內訶子大黃二味或有用芍藥或有不用者蓋相度病狀可入即入不必入盡也此二味多不全用若須入大黃即服時不須更入鹽也丁香煮散　治一切冷氣攻衝心胃不利不思飲食腹脇刺痛口舌無味

丁香（一兩三分）　蓬莪朮（二兩）　蓽澄茄（一兩半）　枳殼（一兩三分麩炒令黃色）
藿香（一兩半）　沈香（一兩）　麝香（半兩）　芍藥（半兩）　當歸（三分）
訶子（二兩去核）　前胡（一兩）　人參（一兩）　京芎（一兩）　木香（三分）
槟榔（七個）　豆蔻（去皮七個）

右一十六味同擣為末每服一錢水一盞煎至五分熱服大治吐逆及酒後嘔吐不止胃脘悶不思飲食

沈丁煎丸（又名鎮心丸）　治心腹冷氣不和絞刺疼痛大效

蓽澄茄（煨者）　沈香　木香　丁香　槟榔
肉豆蔻（去皮）　官桂（去皮）　當歸（洗去土切細焙乾）　川芎　苦楝子
高良薑　茴香（炒）　蓬莪朮（各一兩）

右一十二味杵羅為末用附子二兩炮烏頭二兩炮另杵為末用米醋五升浸硇砂一兩經一宿澄去砂石以此醋煮附子烏頭為糊溲和前藥末為劑杵三五百下為丸如彈子大每服一丸細嚼丈夫炒生薑鹽湯下　婦人炒生薑醋湯下　有孕不可服　但腹諸疾服之必差

大阿魏丸　治男子女人一切冷氣攻刺疼痛或成積聚脇厥冷本臟氣上攻築心疼悶絕不知人事及治傷冷傷寒或氣虛夾陰氣傷寒並見先此用止真氣

阿魏（一兩半以醋化人白麵三兩和作餅子炙令黃熟）　石菖蒲（一兩半蜜浸一宿炒）
厚朴（三分薑汁塗炙伊桿）　槟榔　硫黃（一兩如粉）　白朮（各一兩炮炒）　訶子（一兩去核）　桃仁（三分麸炒去皮尖另研細）　青木香（一兩）
乾薑（半兩生）　附子（一兩半炮）　當歸（二分）

右一十二味除硫黃桃仁外同細杵為末次入硫黃桃仁同研令勻以稀麵糊為丸如梧桐子大每服十丸溫酒鹽湯任下女人醋湯下並用空心服如常服即大壯元氣飲食駐顏

理中丸　治一切冷氣攻刺疼痛心腹脹滿胃冷吐逆臍腹撮疼

阿魏（一分用白麵兩匙醋和作餅子炙令黃熟）　荊三稜（煨）　蓬莪朮（煨）
甘草（炙）　青橘皮（去白）　陳皮（去白）　乾薑（炮）　官桂（去皮）
乾木瓜　白朮（各一兩）

右一十味杵羅為末用麵糊為丸如櫻桃大以好硃砂為衣每服一丸嚼破煎生薑木瓜鹽湯下　如婦人血臟氣攻刺即用炒當歸生薑湯嚼下一丸一切氣痛但服此藥必效

順氣散　調順冷氣解利傷寒

吳茱萸（洗淨焙炒用半兩）　麻黃（一兩去節）　人參（半兩）　甘草（一兩炙）
訶子（半兩煨去核）　厚朴（一兩去皮薑汁炙）　陳皮（去白一兩）　乾薑（半兩炮）
大黃（三分）　官桂（去皮）

右一十味同為末每服一平錢水一中盞薑二片棗一個同煎六分通口服　如外傷風邪即先服此藥三服次喫發汗丸散必效

蓽澄茄丸　治丈夫元陽虛冷氣上衝心胃滿悶腸脇雷鳴或多攻刺嘔逆膨脹

沈香　丁香　木香　茴香（各半兩）　蓽澄茄（一分）　胡蘆巴（一兩）　巴豆（一分）

右八味同為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸薑鹽湯嚼下

硇砂木香丸　治丈夫婦人一切冷氣攻刺疼痛或成積聚隱見不常發則疼刺

巴豆（一兩去皮以紙出油盡為度另研）　硇砂（半兩另研細後入巴豆入諸藥）　附子（一枚炮去皮臍）　官桂（去皮）　茱萸（炒）　茴香（炒）　木香　丁香（各半兩）

右一十味同為末用草柿一枚洗蒸令軟和末丸如菉豆大取食利胃腸氣淡茶下十丸女人血氣及諸殺氣艾酒下丈夫臟腑氣惡酒下化痰津液下酌其虛實加減丸數

七香丸　消化酒食毒破心胃冷氣攻刺疼痛

丁香（二分）　官桂（一分）　青皮（半兩）　巴豆（二十箇去皮膜以紙出油用）
硇砂（半兩去皮）　木香（分）　槟榔（三枚）

右七味為末醋糊為丸如菉豆大每服十丸十五丸薑湯茶酒任下

勝金丸　治冷熱氣不和不思飲食或腹痛疼刺

小梔子　川烏頭（各等分）

右同生杵為細末酒糊為丸如梧桐子大每服十五丸炒生薑湯下如小腸氣痛炒茴香慈酒下二十丸

沈香蓽澄茄散　治一切冷氣不和及膀胱小腸氣疾常服即大妙能補護四十歲以上者宜服之

蓽澄茄　沈香　胡蘆巴（微炒）　茴香（微炒）　官桂（去皮）　川苦楝子（炮裂去核用肉）　木香
硃故紙（微炒）　紫巴戟（穿心者已上各一兩）　桃仁（麸炒去皮尖用二兩）　川烏頭（半兩炮去皮臍）
黑附子（臍用四兩）

右一十二味同杵為細末每服二錢水一大盞入鹽同煎至八分溫服又小腸一切氣痛服之有效如空心入鹽點半錢熱服

諸積

救生丹　治酒食化滯氣空利胃腸

丁香（一分）　肉桂（一分去皮）　大甘草（七錢炒存性）　麵薑（半兩燒存性）
木香（一分）　巴豆（千五個去殼油令黑色為度）

右六味杵為細末以酒煮麵糊為丸如菉豆大茶酒送下三二丸

硇砂丸　消久積食治心腹脇滿胃脇不利痰實胃噎

硇砂（好者杵二錢研）　狼毒（剉碎醋拌蒸炒黃用一兩醋一升在合紫色）　巴豆（十五枚去皮膜以醋一升在合紫色）
蠶甲（醋炙黃香一兩）　芫花（醋炙黃色一兩）　乾漆（一兩）　硫黃（一分研）

右杵爲細末同和勻一處煮麵糊爲丸豌豆大每服三丸食後臨臥溫生薑湯下

萬金丸　消化積滯調三焦空利胷膈定氣刺疼痛腹脇服疼冷氣攻注婦人血氣小兒夜啼胷冷疼涎並宜服此

船上硫黃一分　巴豆去皮秤半兩二味同以生絹袋子盛于槃水內用文武火煮一伏時成冷另研極細　柴胡半兩去蘆　附子一兩炮　乾薑半兩　陳橘皮去白一分　桔梗一分　青黛半兩　當歸一分

右九味同爲細末以麵爲丸如小豆大每服二丸至三丸溫水下　婦人血氣醋湯下　小兒夜啼常服一丸溫水下　水瀉生薑湯下　血淋地榆湯下　白痢乾薑湯下　一切氣疾煎生薑橘皮湯下並宜空心服　痰涎併多生薑湯下　一切氣疾煎生薑橘皮湯下並不以時候服

三稜丸　治積年五臟氣塊積滯

荆三稜　石三稜二味鹽醋浸一宿取出切杵爲末醋煮成膏　青皮去白　硇砂以溫水浸過熬成霜　厚朴去皮薑汁塗炙　雞爪三稜炮　巴豆四枚去皮研已上各半兩　槟榔二個生用一個炮用一個　肉豆蔻一個去殼　乾漆一分炒　木香一分

右一十一味爲末入於膏子內和擣一千下丸如菉豆大每服五丸　如氣痛茴香湯下　臍下氣塊神麯湯下　心膈氣禹餘糧湯下　左脇塊柴胡湯下　右脇木香湯下　血氣塊當歸酒下　血氣痛赤芍藥湯下五七丸

氣針丸　治久積風壅疏利滯氣空胸膈止刺疼

牽牛二兩一半生一半炒　木香　青皮去白　川大黃微炮　槟榔一兩

右五味爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸以溫水下

三稜丸　治積聚氣塊及和脾胃或心腹滿悶噎塞者

荆三稜三兩擣碎以好醋三升用文武火煮令盡爲度勿千鐵器中　枳殼去瓤麩炒一兩　木香一兩　青皮一兩　槟榔一兩　官桂去皮一兩　甘草二兩

右七味同杵爲末每服一大錢水一盞煎至七分去滓溫服如患在膈上即食後服之

膈噎

通關散　治五膈氣噎塞妨悶遍身虛腫涕唾稠濁不下飲食

麥蘖三錢　馬兜鈴一錢　訶子一枚　芒花三枝微炒　硇砂一錢　白丁香三錢　黃丹一錢　硇砂一分　白礬　鉛白霜各一錢

右一十味同研令至細勻每服一錢半入賦粉兩文雞子一個去黃只取清調末却入雞蛋殼內用濕紙裹慢火煨熟放冷嚼服茶湯下臨臥服之來日逐下黑惡物不差如小可噎閉依法服一錢必效

半夏散　治五膈氣噎心胷不利涕唾稠粘飲食進退

半夏半兩薑汁浸一宿焙乾　厚朴半兩去皮薑汁炙　枇杷葉一兩去毛　肉豆蔻一個去殼　母丁香二十五枚　青丁香一塊大

右六味爲細末每服一錢水八分煎六分和滓熱服酒後服尤妙也

槟榔散　治胸膈注悶噎塞不快不思飲食大治脾胃一切病并腎膈氣醒酒化氣

槟榔　木香　人參　甘草炙　乾薑炮　官桂去皮　青皮去白　厚朴去皮用薑湯炙令香黃色　荆三稜炮煨　白术米泔浸一宿焙乾已上等分　神麯炒

右十一味杵爲末每服煎半錢入鹽少許　如患脾胃病并腎膈氣每服一錢入鹽湯服甚妙

草撥散　治噎疾

虎頭王字骨酥炙微赤竹瀝炮　草撥微焙　人參　羚角屑已上各等分

右四味爲末每服二錢溫水調下臨臥食後服

目疾

目者五臟六腑之精華宗脉之所聚肝臟外候也臟腑虛實風邪痰熱所乘風傳於肝上衝於目故為病多矣若血氣充實則瞻視分明若榮衛虛損則目多昏暗風冷則淚出勞熱則赤澀如久不愈往往變為大病其臟主血足厥陰是其經也

防風散 治風毒眼暴赤眼

菊花 防風 甘草 蔵靈仙 黃連 牛蒡子各三分

右杵為末每服一錢風眼葱湯下赤目新汲水調下日可二服

撥雲散 治風毒眼目昏暗翳膜遮障

菊花 防風 白蒺藜炒令黃 柴胡去蘆 甘草各等分 羌活

右六味同為末每服一錢半水一盞煎至六分食後臨臥溫服之

大明散 治一切風毒氣眼翳膜昏暗眼睛澀疼熱淚時多

蟬退 白蒺藜 川羌活 荊芥穗 黃芪 烏蛇皮各等分蛇皮蟬退二味入罐子內蓋好口洗殺過

右六味同為末研令勻每服一錢酒調下日三服神效

芎羌散 治男女血風毒眼昏澀赤爛丈夫腎臟風毒氣眼

腫疼退翳膜洗睛輪

荊芥穗炒 牛蒡子炒 木賊 蒼朮生用各等分

右用為末每服二錢煎荊芥湯熱臘茶調下日可三服空心日午臨臥各一服

大效洗輪散 治風毒攻注眼目赤疼大退翳膜去瘀肉洗風砂氣膏磁末內入目澀痛

仙靈脾葉炙 秦皮 黃連 槐花各等分 生犀角屑少

右五味同杵研為細末每服半錢以新水調澄清洗之砂錢等不三兩上自然退在水中 如風毒眼郎時每半錢水一盞煎至七分放熱洗之每服可經三次

青金丹 治丈夫女人一切風毒上攻眼目赤腫昏澀時發

攜疼或緣眶赤爛冷淚頻多及氣毒上攻外障翳膜赤筋瘀肉並能理療小可暴赤眼腫痛熱之立差

真銅青 生犀 真珠母 海螵蛸 生龍腦 蕤仁

右七味各研磨後將銅青與蕤仁同殺研如糊次入白丁香研丈入下三味後又殺研令勻細用細香墨濃研汁於淨器中相度和熱為度丸如菉豆大每丸用兒孩子乳汁化熱之餘者且以紙蓋如熱時乾再入乳汁化之未用者常以生腦子養在磁器中存貯

羌活散 治男子婦人小兒遠年日近毒氣上攻眼目昏暗赤澀瘀肉生瘡翳膜遮障不明及久患偏邪頭疼眼目漸小細及有夾腦風痛多覩墨花但有此狀服藥五日見效

羌活 川芎 天南星 蕤本以上各一兩 牽牛子六兩杵取二兩末餘者不用微炒乾 天麻 旋覆花 青皮

右八味一處為末後入牽牛末和勻取生薑自然汁煮麵糊為丸如梧桐子大每日食後溫酒鹽湯米飲任下二十丸日進三服不翳內外障及暴赤眼

蟬蛻散 治眼目赤疼澀腫兼生翳膜瘡等

蟬蛻 地骨皮 宣連 菊花 白朮 蒼朮 牡丹皮 草龍膽以上各一兩 甜瓜子半兩

右九味同杵為末每服一錢半瓜子荊芥同煎湯調下每日食後臨臥各一服大治時疾後餘毒上攻眼目甚效忌熱麵牙豆醋醬等

仙朮散 治眼目髓膜遮障昏暗退翳

蒼朮一兩米泔浸 木賊一兩 蟬蛻一分淨 穀精草一分 甘草一兩 黃芩半兩 蛇退皮一錢湯洗焙

右七味同為細末每服一錢空心臨臥時冷水調下

磁石丸 治內外障翳不問年遠近及中一切疾

磁石兩貝殼各透赤旋投去醋內浸之十宿後搗碎別器安隨水飛過後千杵萬遍汁盡研細入乳鉢內用水少許研細次更入水再研傾于瓦器內自然澄清去水取出後入瓶內者盆合定一宿取出後入瓶和內騎乾或焙乾或焙乾與藥相和 牛膝 時取無灰酒煮五伏以來取出

官桂 一兩刮去粗皮用之 **秋茶** 一兩去皮用 **巴戟** 一兩去心用新瓦焙乾 **乾薑** 一兩炮裂去皮 **遠志** 一兩去心取 **地骨皮** 一兩去皮用 **荊子** 一兩炮去皮 **蓯蓉** 二兩水浸一宿去皮焙乾 **黃芪** 一兩去蘆 **覆盆子** 一兩去蘆 **防風** 一兩半寸用 **栢子仁** 一兩去殼 **鹿茸** 一兩取上嫩者拌麩炒令黃 **生地黃** 一兩

右藥為末煉蜜為丸如梧桐子大一應丈夫女人所患者不計年月遠近或障翳侵塞或皮膜侵逼空心茶酒鹽湯任下二十丸至三十丸雖不覩三光服之必效忌動風炙煿物

羚羊角飲子 治斑蕁後翳膜忽生及風毒蒙赤等眼

羚羊角用一對以絹子扎綁定一處煮共取細末二兩再研如粉 **車前子** 決明子各一兩 **防風** 川升麻 綿黃芪 川大黃 黃芩 芒硝各二兩

右九味同研為末每服二錢水二盞煎至一盞半凡欲服藥時先將藥末以水浸一宿次日以此水并藥同煎熟却入磁餅子內用油單紙封紮垂在井中一宿至次日取出微暖動臨臥時徐徐呷不得就枕頭睡至明見效如要急取功即空心日午時各喫一服

抽金散 治自幼久患肝氣上攻眼目蓋明生翳久瘀不差大人有翳膜遮障但睛不損

粗黃連 沙參 元精石 決明子各一兩

右為末每服半錢用羊子肝一具竹刀子切作縫子摻末子內以線繫入餅子內用米泔煮熟淡喫每箇作三服

決明散 治青盲眼矢五臟六腑之精氣皆上注於目若臟虛有風邪痰飲乘之有熱則赤痛無熱則內生障蓋臟腑血氣不榮盛於目故外狀不異而只不見物或加有痰熱則生翳如蠅翅狀發在睛上此方乃至人傳授大效

石決明 草決明 青葙子 井泉石 蛇蛻 細辛 甘草以上各等分

右七味修事皆不得犯鐵器仍須用木臼中杵細杵羅為末後用豬肝一具去膜淨洗瀝乾後用竹刀子隨肝豎切作縫子將上件藥末平秤一兩逐縫子摻入藥末畢後

將麻線子細意扎縛了却入生絹袋內牢縛定用上鍋子或瓦石鍋亦得入淘米濃米泔煮之更入青竹葉一握枸杞根一握黑豆三合同煮肝熟爲度取出候冷仍先飽喫食後方用竹刀子逐片切喫旋呷元汁送下喫盡後更喫豆無妨久患者不過三兩具見效切記合藥時須潔淨敬信不得犯鐵器服未有不驗也

洗頭明眼方

鳳眼草（即榆樹上兩邊生燒灰淋水洗頭依日洗之將一年明如童子眼及加椿皮瓜丈佳）

右用正月七日　二月八日　三月四月　四月五日　五月一日　六月四日　七月七日　八月三日　九月二十日　十月二十三日　十一月二十九日　十二月十四日

決明散　治眼一切疾

石決明　草決明　丹丞明（又名丹丞石）　青箱子　白正　甘草　黃葉　黃連　龍骨　蔓菁草　根實　牡蠣　枸杞子　蛇皮（雄者五分雌者五分在草木屋上者雄在土地蛇蛻之雌者以上各用一兩）　白蒺藜　蟬蛻　白附子　黃芪（各半兩）　羌活（活水中生下者半兩其子滑頭黃水溫溫洗過）　魚子　虎睛（一個切作七片子每一片子用文武火炙乾入眼杵羅為一七遍了盡篩羅為度）

右藥每服七分五更時披衣以陳茶清調下日午臨臥準前服之　背小弩肉細腫疼痛不可忍者三五日見效

大段赤白翳膜遮睛久不可見光明者服一七日減三五分見物至第二七日取下眼中翳膜如赤白濃膠半月至三七日其眼好安如不患時復舊　若根枯死者不療活者通醫訣曰如何知活死如有煩惱傷酒色遇風雨眼中疼痛者即是活眼也若或有此無淚不疼痛者名為無根也更不用此藥忌毒魚麵蒸猪肉酒色等

展砂膏　治一切眼疾

白龍腦　烏魚骨（研極細亦通用）　川硝　真麝香　牛黃　牙硝　井鹽　石膽（各少許惟石膽多于衆藥）　硇砂（則當香少許）　膩粉（一大兩）

右等均為細末入白砂蜜和令得所以銅筯點之為妙

通神膏　治眼生翳膜赤脈努肉澀癢痛有淚

白砂蜜（四兩）　青鹽（一字）　麝香（一字）　乳香　硇砂（半字）　當歸（半錢）　黃連（一錢）　白礬（半字飛過）

右八味於乳鉢內輕研破於青竹筒內煮半日用絹濾去滓盛瓶內收貯每點藥時眼目少時以溫湯洗翳膜等並退

紫金膏　治外障退翳膜療風毒上攻眼疼赤腫或臉皆爛時多熱淚昏澀大效

槐嫩枝芽三十條（子中春採實乾收者以嫩枝子亦可）　龍腦（少許）　谷丹（先細研過壓實者七枚子四枚各長可二寸半）　烏魚骨（炙過炒二錢）　白砂蜜（四兩）　輕粉（炒三錢）　乳香（一錢許）

右先將槐枝并黃連用雪水或井花水亦得一椀半入銀石器內慢火熬及半盞許去滓次乳香研碎先入又熬之候如一茶許却先將蜜熬去滓放冷却入前熬者膏子及衆末攪勻再熬候金漆狀乃成入不犯水瓷器內收之每用少許點大妙

明眼金波膏　去翳肉洗翳膜

宣連（四兩）　蕤仁（半兩）　杏仁（四十九箇）　金州蘗（三兩以上二味搗碎以水二碗浸一宿于器內煮取半碗濾過）

右先將杏仁去尖雙仁以蕤仁於口內退皮同杏仁研如粉入前藥汁內同熬及一大盞更濾過入好蜜及藥九分入麝香一錢白礬一字飛過硇砂一字空青三錢如無只以生青代之曬槌碎龍腦二錢以絹袋子盛在藥內又熬及一半許於冷水內滴直候藥在水上不散即成用小餅子一個封閉令密於飯甑上蒸三度逐度于井內放過及冷為妙磁銀器內收貯點之如常法治療功能卒不可述

甘石膏　點眼昏花視物不明（烏馬兒監司經驗方）

爐甘石（研）　代赭石（紫色者研七次）　黃丹（各四兩水飛）　白沙蜜（半斤）

右將二石研為極細末次與黃丹和合用銅鍋將蜜煉去白沫更添水五六碗熬沸下煎藥以文武火熬用一碗用銅器攪試將藥滴水中沉下為度方可住火熬成用夾紙四重濾過用淨瓷器盛貯密封不要透下塵土恐點時煩眼如眼昏花不時點之有驗

食膏　治眼目昏花

井鹽（五錢兼以青鹽代之）　詞子（一個去核）　黃連（去鬚五錢）　烏賊魚骨（二錢半去甲）　黃丹（三兩水飛）

右為細末用好蜜一十兩熬去白沫濾淨入前藥末于銀銅器內用文武火慢熬用槐柳條攪成膏紫色為度用淨瓷器盛貯于地內埋一伏時去其火毒取出每用豆大一塊溫水化開洗眼

耳病

治腎虛上攻耳內生瘡虛鳴及聾者

磁石（一兩燒赤醋淬十遍研細水飛過）　附子（一兩炮裂去皮臍）　巴戟（一兩）　川椒（一兩去目及閉口者微炒去汗）

右四味擣羅為末每服用猪腎一個去筋膜細切葱白薑白各一分細切入藥末一錢鹽一字攪和令勻以十重濕紙裹於煨灰內燒熟空心細嚼酒解粥下十日內見效

如聖散　治水入耳內膿出疼痛日夜不止

箭竿內蛀末（如有蟲子一處同研細用三錢）　麝香（一錢）　獻粉（一錢）

右三味一處同研細每用先以綿杖子揩淨然後可三遍耳子深送以棉塞定如覺放徹即是惡物也要出去棉側耳令汗流出依前腫痛甚者三服差

小膏子　治凍耳兼療濕癬

丹參（一兩）　黃蠟（半兩）　豉（合）　慈白（五錢）　清油（三兩）

右先將油煎三兩沸次入參豉煎令焦即濾出然後入蠟勻攪入磁合子內盛每患即塗之三兩上即差

治油蚰入耳

川烏頭（三個）　木鱉子（七個）　白礬（五文）　猪牙皂角（一挺）　夜明砂（一文）　白丁香（一錢）　小兒衣帶（一個如無耳內血三兩熟亦可）　烏雞糞（三兩）　黃丹（三文）

右九味一處細擣為末每服一字醋調灌入耳內少時蟲盡出

齒髮髮

齒牙者骨之所終髓之所養手陽明支脈入於齒右髓氣不足陽明脈虛則不能榮於齒牙為風冷所傷故多疼痛既不

藥盛因結爲蟲食於齒牙則有孔蟲居其間又相傳受餘毒牽連疼痛陽則既虛則生熱熱則血氣妄行故令牙齒宣露

香膽散　治牙齒動搖解骨槽毒氣却令堅牢

香膽（十箇兼香者皮子是細切）　牛膝（一斤去蘆細切）　木律（四兩）　郁李仁（二兩）　秋熟出子黃茄子（二個細切）

右五味入鐵臼內擣成相著握作團子後入鐵子內上用瓦子蓋口留一小竅用鹽泥固濟燒罐子通紅候煙白色即住去火以新土罨一伏時取出入麝香一錢再同研細每日早晨楷痛處牙齒候須臾溫水漱口臨臥更貼少許嚥津亦無妨和劑局方名麝膽散無麝香有升麻細辛用法並同

潔牙散　治齒牙浮動宣露疼痛

荆芥（去梗）　細辛　莽草　升麻（各一兩）　木律（半兩）

右同杵爲末每服五錢水二盞入槐枝十數莖鹽二錢同煎令濃熱含冷吐

麝香散　治大人小兒齒龈損爛及走馬疳

麝香（一分研）　猪牙皂角（三挺燒存性用）　膩粉（一兩）　香附（一兩）　白馨（二兩）　苦楝根白皮（一兩）　綠豆（一兩十人銼了內裹了用）　黃檗（一兩）　水銀（十兩）

右杵爲末用無灰酒三升熬成膏患者先淨漱口塗之久患者取藥一匙研霜粉霜末各一錢拌和勻使妙

黑散子　治牙疳及宣露

藁本　升麻　皂角（不蛀者燒以存性各半兩）　石膏（半兩）

右四味杵羅爲末臨臥時以手指蘸揩擦齒上微漱存藥氣此散大能牢牙去疳

黑金散　烏髭鬚兼治牙齒一切疾

麻枇（勿細杵不用羅）　地黃（勿揀擇引膏好者然後晒乾）　皂角（六挺不蛀刷去皮子好者每挺截作二兩杵碎不用羅）　青鹽（二兩杵碎）　東引桃枝　柳枝　桑枝（各十條採時不拘大各長如大指許）　牆頭豆（生者）　馬齒（及盛時採人蘸大見採到即于淨室陰乾拘數數用）

右藥用一斗三升瓦罐子新好者將前件藥物逐味分作三處逐一味一重重下於罐子內藥絕用一新瓦片可罐子口蓋覆仍于蓋子中心開一竅子出煙罐子週迴以好黃土紙筋泥固濟候乾于淨房內用炭火四向慢慢燒之須是用火得所煙盡撥却火塞眼子却黃土培一兩宿候冷取出藥其色如鴉羽于磁器內研細切勿犯鐵更入升麻白芷各一兩細研羅入于末內令勻以磁器內收密封閉逐漸取出一匙頭許亦以小磁器內收每日不以旦暮或食後揩齒表裏精細耐煩揩之悉令遍迴即合口須臾若不倦久長用之髭鬚自然黑潤異常牙齒堅白無脫落口氣香潔合時切忌見婦人雞犬

揩齒七聖散　牢牙蓋齒

白麵（四兩）　皂角（二挺不去皮子剉碎）　訶子（一兩）　鹽（兩）

右件處以麵裹用槐枝子燒煙盡爲度後次入升麻細辛各一兩同杵爲末每日早揩須臾漱口

揩牙烏髭地黃散　歌曰野客白仙鄉來呈變髮方南方採酉草丙地取生薑筒漆猪牙皂烏麻及地黃免絲都七味固濟人磁缸火煅須連日黃烏終夜長藥成將揩齒功效實難計不惟髭髮黑兼亦壽延長

酌草　生薑（切片焙乾）　筒子漆　烏麻子（如無用麻子代之）　地黃　猪牙皂角　免絲子

右各四兩入瓶內以黃泥固濟火煅一日後入地一尺二寸深窖却三伏時取出合子盛露三夜不得着日氣羅爲末如齒藥用之

烏髭鬚揩齒法

生乾地黃（十分切）　升麻（一兩研末）　訶子（二枚研末）　白鹽花（半分研末）　麻枇（末四合取遍用者）　粟饋飯（一大合）　硃砂（一兩細研臨煎時以牛黃濃汁免煎上）

右件都搗令勻于一淨沙瓶中盛露封頭通身遍泥陰乾七八日待泥乾入爐中坐之餅四畔以炭火週迴燒其炭續續添盡七晝即住其藥以爲黑灰收之并細爲末每日夜用之揩齒一如後法　揩齒法欲使藥時用生薑一塊如杏仁大爛研須臾即吐却滓以左手指揩三五遍就濕指點藥末更揩十數遍令汁不得吐以兩手取津塗髭鬚待辛辣定即細細嚥之此藥即兼治脚風腸風下氣駐顏益齒若能勤用一生不白髭髮一百日却黑赤者五十日

黑用藥二十日即便見效也若能空心遍用更飯後用之見效即速矣

眩暈

須風眩暈若由血氣虛爲風邪所乘也諸陽經脈上走於頭而因運動勞役陽氣發洩腠理開疎而受風邪頭風之上頭面多汗惡風甚則頭疼心煩悶或因新浴髮中外風亦爲此病久不差眩暈由風邪流入於腦腦轉而目系急目系急故成眩暈也其脈寸口洪大而長是也服大效香砂丸必愈

大效香砂丸

巴豆（生出油去皮）　生硃　乳香　細辛　富附（去皮）　丁香（少許）　官桂（少許去皮）　龍腦（五十文）　麝香（五十文）　檳榔（少許）

右各等分爲末以水浸蒸餅和爲丸如桐子大發日用好茶下一丸須是當門齒與冷茶嚼下十年只用一粒額上汗出即差

獨活丸　治風毒氣上攻頭目疼痛昏眩不快利膈化痰

獨活　川芎　甘菊（各一兩）　半夏（湯浸去滑作餅子炙二兩）　乾蝎（一分炒）　防風（一兩）

右五味同爲末以半夏末用生薑自然汁一大盞煮如膏和爲丸如豌豆大每服七丸至十丸荆芥薄荷湯下

伊那丸　治肝腎虛風上攻頭旋項筋急眼有黑花耳內虛鳴

伊那（半兩熟湯浸炒）　穿心巴戟（糯米炒候赤黃色米不用）　黑附子（生去皮尖）　羌活　沙苑白蒺藜（慢火微炒各一兩）

右五味同爲末煉蜜爲丸如梧桐子大空心鹽酒下十五丸至三十丸食後臨臥米飲下

芎米湯　治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不食

川芎　半夏（湯泡七次）　白米（各一兩）　甘草（炙半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候

嗽喘

華蓋散　治咳嗽解表滋潤皮膚調理自然汁出

麻黃（一兩不去節）　甘草（一兩）　杏仁（二兩湯浸去皮尖）

右三味先以前二味爲粗末後入杏仁研細同拌令勻每

服三錢水一盞煎至七分去滓服日三服即愈

紫蘇飲 治咳嗽壅痰涎潤肺

紫蘇 貝母 款冬花 漢防己各一分

右四味研爲細末每服一錢水一茶碗煎七分溫服

款肺散 治寒壅相交咳嗽不止胷膈鬱痰涎併多

麻黃二兩去根節炒 貝母 桑白皮各一兩剉炒 柴胡

杏仁一兩去皮尖炒 糯米一兩 款冬花一兩焙炒

右七味新好者杵爲末每服一大錢水一盞煎七分不拘時溫服

阿膠散 治久患咳嗽及勞嗽

阿膠二兩炒過如無以黃明膠四兩代亦可炒過用 人參半兩 杏仁二十個去皮尖

黃芪 葵花一分 甘草半分 款冬花一分

右六味同杵爲末每服二錢早晨用糯米粥一盞子入末熱嚼晚食前再服如只用糯米濃飲調下亦可

黑靈丸 治咳嗽不已日久年深皆效

羌活 獨活各一分 巴豆三十枚不去皮半夏三十個同入殼子內鹽泥固濟炭火三角燒取出入前二味

右同杵爲末煉蜜爲丸如桐子大每服一丸以後味藥煎湯下

馬兜鈴半兩 官桂一分 甜葶藶半兩微炒

右三味同杵爲末每服一錢水一盞煎至八分下丸子其餘飲子時時呷令藥香常在咽喉中

華蓋散 治上喘咳嗽兼治膈熱

桑白皮 神麯炒 桔梗各一兩 人參三分 百合三分

甘草炙 杏仁去皮尖各半兩

右七味同爲末每服一錢水一盞煎至六分食後溫服

痰飲

辰砂丸 治上膈風壅有痰結實如梅核及稠濁者

辰砂半兩要真 天南星半兩 白礬半兩 半夏三兩薑汁拌作餅炙令黃

右四味杵爲末用生薑白然汁合和爲丸如菉豆大每服十丸以薑湯下食後服

壞涎丸 治痰涎壅盛服藥未退頭重心煩飲食不下

硇砂二分 寒水石半兩猛火燒透紅放冰內淬五七遍取出 密陀僧一分

定粉一分 龍腦一分 水銀一大分將定粉放盞內與水銀同研漸漸滴令似乳任用

半夏半兩漿酒盞汁浸一宿

右七味爲末用生薑自然汁煮麵糊爲丸如菉豆大研好硃砂度過每服一丸至二丸生薑龍腦水下勿嚼

人參半夏丸 墜痰化涎

半夏一兩 生薑四兩取汁先以湯洗半夏七遍浸三日後于日內蒸裂切作片子焙乾用 北細辛一兩 人參一兩 赤茯苓去皮 天南星半兩生用

右六味同杵爲細末餘羅以蒸餅水浸過却用紙裹煨熟爲丸如菉豆大每日空心夜臥用淡生薑湯下十五丸開胸生薑棗湯下 風涎皂角一寸薑三片蘿蔔三片同煎湯下

旋覆花散 清頭目利胷膈化痰涎解上焦風壅咽喉熱疼唾如膠粘

旋覆花 桑白皮各三分 地骨皮一兩 菊花 石膏一兩分 甘草半兩 葶藶一兩去皮

右七味杵爲末每服一錢水一盞煎七分食後溫服此藥兼治頭風有效

中金丸 治金化痰辟邪養正益津液潤肌膚大進飲食延年補氣

用蒼朮不計多少以長流水浸七日逐日一度換仍以竹刀旋削去粗皮切作片別用無灰酒浸一宿浸可以於木上灰二指許候滲酒盡焙乾爲末煉蜜和丸如桐子大每服早晨茶酒任下三十丸忌桃李雀鴿

丁香丸 治胷冷有痰

半夏二兩以水浸一七日每日早晨換水足取出令自乾 白蘞半兩 丁香一分

右三味同爲末用薑汁合和爲丸如小豆大每服五丸至七丸鹽湯下膈上有痰涎只用三服壓下立效

半夏煮散 治胷冷有痰嘔逆不思飲食及中酒後大宜服此

半夏十六分湯洗十度 木通十六分 前胡六分去頭 陳皮六分去白 槟榔六分生杵煎湯藥成膏後對酌入 枳殼五分麩炒 茯苓六分 旋覆花五分去萼梗 白朮六分 官桂五分去粗皮

右一十味到羅爲散每服三錢生薑三片水一大盞同煎八分去滓取清汁先以湯洗半夏七遍浸三日後于日內蒸裂切作片子焙乾用

玉液散 治胷虛有痰

半夏一兩 生薑二兩去皮細切

右三味一處爛搗研晒焙乾羅爲末每服一大錢水一盞煎至六分去滓溫服

霍亂

人參藿香散 治霍亂定嘔逆止心腹刺痛大進飲食化痰益氣

藿香去土二兩 青皮 人參 茯苓 乾薑

枇杷葉布拭去毛炙令黃色各一兩 半夏三兩以生薑六兩一處杵作餅子焙乾 草豆蔻六個去皮 丁香半兩 甘草炙三分 厚朴去皮二兩

右十一味同杵爲末每服一錢水一盞入薑棗同煎七分熱服

翻胃

小木香散 治翻胃病全不下食開胃和氣胡氏新效方作定胃散

胡椒二十粒 木香一小塊 糯米

右三味同炒至米熟爲度杵末分二服每服水一盞煎至六分溫服

定胃散 治翻胃吐逆仁齋作溫胃散治久令翻胃

附子一個去皮臍生別作四塊

右用生薑半觔以水一椀同煮附子汁盡爲度取附子焙乾爲末每服一錢冷米飲下空心服許叔微本事方名附子散治翻胃

順氣散 治半胷氣調進飲食

甘草四兩炙令黃 白茯苓四兩 白朮人兩 附子二兩炮去皮臍 陳皮二兩半去白 乾薑一兩

右爲末每服一大錢水一盞入荆芥少許煎至七分熱服

癥癖

小三稜煎 治食癥氣塊及小腸氣本臟氣腎俞氣膀胱氣五膈氣風痰胷口冷脾積氣食傷冷氣抱心心腹脹滿吐逆酸水五種虛疾脾寒水氣

荆三稜 蓬莪茂各四兩洗淨 芫花一兩去枝葉

右三味同入一磁瓶內用米醋五升浸滿藥封却瓶口以炭火煨令微乾即取出別三稜莪茂使杵碎芫花別以

餘醋炒微焦後同二味猛焙乾搗羅爲末用米醋煮麵糊爲丸如梧桐子大每服三丸至五丸用生薑鹽湯吞下婦人醋湯下

通靈丸　治久患癖塊或因氣不和即發疼痛胷多痞塞消化痰癖大效

荆三稜　酸石榴皮各二枚　杏仁　苦葶藶　甘遂　大戟　大黃　巴豆　芫花　五靈脂各一兩　鹽豉　烏梅各二兩

右一十二味剉細用水一斗二升入藥于鍋內同蒸候水盡就鍋內炒令黃焦色止取出杵羅爲末更入木香青橘末各一兩伴勻醋煮麵糊爲丸如小豆大每服薑湯下三五丸　心胸痞悶疼橘皮湯下　喫酒食飽悶生薑湯或茶湯溫水下亦可

三聖丸　治日久積年血氣癥癖痰聚諸藥療理不差至效

船上硫黃一兩　水銀一兩　硇砂五錢研如粉一分用

右三味乳鉢內滚研如粉却以生鐵銚內用文武火熬鎔成汁以鐵火筯攪令勻一茶久放冷刀剗下以紙裹入地坑內埋一宿取出再研令勻細却以赤芍藥一分荆三稜一分莪朮一分紅花一分並生用細剉如法酒一升煎及一半漉出于砂盆內研生布捩汁再熬放冷入瓷器盛煮糊丸如菉豆大　若因產後傷于飲食結伏腹脇少許下七丸或至十丸　若取磨癥塊空心溫酒下三丸至五丸　所有藥滓捩了焙乾爲末另入乾地黃半兩與蒲黃一分芫花一分醋炒焦黃色同研爲末以三聖丸所剩麵糊爲丸如菉豆大治婦人血臟冷乳攻衝心胷疼悶及一切血海疾可常服溫酒下十丸

木香硇砂煎丸　消癥瘕積聚血結刺疼

木香　大黃煨　荆三稜生用　巴豆去皮膜不出油用細研　官桂去皮　青皮去白　茴子漆炒　莪朮煨　附子炮去皮臍　乾薑炮各一分　香墨一指節大細研　硇砂半兩以好醋一盞煮一宿去砂石

右將大黃木荆三稜木巴豆等三味同于銀石器內以好醋一升煎一兩沸次入硇砂同熬成膏次入諸藥末和勻再入臼杵千百下爲丸如菉豆大每服五丸　傷冷食冷

酒冷水結聚腹內氣塊疼痛用乾薑湯或橘皮湯下之夾食傷寒白湯下亦可　粘食不消成氣塊即用煮麵湯下　食牛羊魚鱉肉成氣塊不散用所傷汁下　宿酒不消血氣不調當歸酒下　妊娠不服要轉淡茶下　加至七丸　小兒三丸常服一兩丸

水氣

檳榔散　治水疾及諸般氣腫大效

白檳榔勿用大腹子不得見猛火焙令微黃用半兩　葶藶隔紙于鐵子內炒令紫色　郁李仁湯浸去皮微炒　茯苓　澤瀉　甜瞿麥只取花用半兩　藁本一分　滑石三分　大戟三分剉碎微炒　陳皮去白

右件細杵爲末每服一錢用桑白皮濃煎湯空心調下當時取碧綠水後如燒羊肩即差如未盡隔日再服看腫消如故更不用服如治水疾忌鹽一百日

逐氣散　治水疾

椶櫚根一兩多少去皮剉如絲日晒乾可爲末

右用黃頷魚三頭大莽三個菉豆一合以水一大碗同煮以豆爛爲度先將豆任意喫後却以汁調藥末二錢其水即化爲氣消也

脚氣

訶子散　治脚氣疼痛發腫熱悶或上攻或即吐逆人不覺大抵地方多卑濕處多煩狀多服有此疾

訶子　大腹皮煨熟和皮用　木香　漢防已　沉香　紫蘇莖葉　木瓜　羌活　芍藥　杉木節各半兩

右十味剉爲細末分作十服每服用水八合煎至二合去滓通口服每二服滓并煎一服兼大治風氣上衝

烏藥散　治乾濕脚氣

烏藥一兩　蒴藋一分二味炒令黃色

右同爲末溫酒下二錢若是乾脚氣用苦練子一個柏漿水一升煎至五合調下立差

小便澁

犀灰散　治小便澁茴香內痛

用鹽退紙不拘多少燒灰細研入麝香少許和勻每服二錢米飲調下

鹿茸散　治血臟久冷腹疼痛小便澁白濁

鹿茸二兩　大附子一兩炮　赤芍藥半兩　芫花一分醋浸過炒令黃色　丹皮一分　紅藍子半兩　郁李仁一分去皮　荆三稜半兩　沒藥一分　木香一分　椰材一兩去皮

右一十一味同爲末每服一大錢如腹痛用當歸沒藥酒調服水七分酒三分同煎及七分熱服

大便澁

白豆蔻散　治脾胃氣不和止脾泄瀉痢

白豆蔻一兩去殼　橘皮一兩去瓤切細　訶子二兩去核半生半煨　肉桂二兩去皮　當歸洗

右六味杵爲末每服一錢水一中盞薑棗同煎至七分稍溫服如要丸用好棗漿水煮去皮核細研爲丸如桐子大

小草還丹　補脾腎虛冷止大腸泄瀉

根莖半兩剉如絲令黑黃色　茱萸　肉苁蓉酒浸一宿焙乾　石榴皮各二兩　厚朴內半兩剉如絲令黑黃色　肉豆蔻

右七味爲末酒糊爲丸如桐子大每服空心米飲下三十丸或嚼破生薑米飲下

保安丹　治脾元虛泄瀉久患瀉服藥未效日夜不止臍腹冷痛及一切氣刺氣痛

牽牛炒令黃熟　白牽牛炒令黃熟　椒目　當歸　陳皮去白　乾薑炮令黃色　蜀椒去目子

厚朴去皮以薑汁炙令香熟　吳茱萸各半兩　船上硫磺研一分別研至細

右八味同爲細末入硫磺末和勻以米醋和作劑分爲兩團另用白麵半觔裹上件藥令勻如燒餅法煨令麵熟爲度麵入臼內杵三五百下丸如梧桐子大　每患一切氣痛及宿酒食不消炒薑鹽湯下二十丸　如患泄瀉米飲下

丁香散　治脾泄瀉

厚朴半兩去皮用生薑汁塗炙令香熟　檳榔一個火燒過　肉豆蔻二個去皮麵裹燒　丁香二錢焙乾

右四味同杵爲末每服二錢用米飲煎三三沸溫湯服以少許清粥飲衝下

草豆蔻散　治胃口冷喫食無味及脾泄瀉不止兼大治酒後數圖如痢心胸不快不思飲食

草豆蔻半兩每個麵裹煨熟麵焦黃去麵用　甘草一兩炙　肉桂去皮一兩　陳皮去白一兩　蓽澄一兩

右五味同爲細末每服一錢半更入糯米末一錢水一盞棗二枚同煎七分溫服其滓再煎服之

橘皮煮散　治脾元氣不和泄痢不止腹內雷鳴氣脹膨滿冷氣刺痛及解傷寒

橘皮去白　白朮各二兩　訶子　乾薑炮　官桂去皮　枳殼去瓤麩炒　木香　人參　甘草炙已上各一兩　草豆蔻七枚去皮　厚朴一兩半薑汁塗炙黃　檳榔五枚　半夏二分湯洗七度用

右十三味杵羅爲末每服二錢生薑三片棗子二枚水一盞同煎七分去滓溫服

神聖香薷散　治久患脾泄瀉

宣連一兩勻剉如豆大　生薑四兩勻剉如黑豆大

右二味一處以慢火炒令乾薑脆深赤色即止去薑取出只要黃連研爲細末每服二錢空心臘茶清下甚者不過兩服即差

大聖散　治脾元臟冷滑不止腹痛絞刺和陰氣進食

川烏頭四兩生用　益智仁三兩　生乾薑二兩　青皮二兩　茴香二兩

右五味同杵爲末每服一大錢水一盞入薑一片煎至五分溫服　如小腸氣攻刺急煎一二服熱喫

訶子散　治脾胃虛冷滑泄不思飲食和一切冷氣

訶子煨　厚朴薑汁塗炙黃香　甘草炙　白朮炒　草豆蔻肉煨　陳皮去白各等分

右六味同杵爲末每服一大錢水一盞入薑棗同煎至七分溫服

暖肝散　治脾元虛冷滑洩不止口內生瘡腹中冷不思飲食吸冒消食止瀉

蒼朮三兩　縮砂去皮　柴胡去蘆　厚朴薑汁炙去皮　桔梗各一兩　蘇葉三兩　桂心二分去皮　陳皮去白　蓽澄去心　北藁各半兩　胡椒一分

右十一味同杵爲末以細絹篩爲散每服以猪肝四兩切作片每片用末一大錢摻于肝上入葱白蔣薤等令有滋味一重重布了麩片裹之糖灰火內煨令通熱麵焦黃色即得去麵取肝空心服之其麵可二分以來或細切肝以散拌和如作角子如常煨熟食之亦得並以薄米飲下之忌生冷毒物等

如聖散　治腸風瀉血日夜不止

車螯一合二個　皂角刺四十九個　硇砂味同研　硃砂　乳香各一分

右四味入車螯合內以蚯蚓泥裹用炭火六觔煅火盡爲度取出研爲細末空心溫酒調下一錢

茱金膏　治腸風瀉血兼療痔漏

龍腦　麝香　滴乳香　雄黃　蜜陀僧以上五味各一錢　硇砂半分　硃砂　阿魏一分　安息香一分

右乳香安息阿魏以熱水浸之通軟用大碗中以乳石研令細其有龍腦麝香硃砂蜜陀僧雄黃都研爲末其硇砂入茱豆粉二兩同研令細更用巴豆三粒去皮心膜以水一大碗浸之一日六度換水取出後用拾重紙出油亦研細與藥都一處研勻方入瀉藥中全和攤在碗中候通手便丸之如豆大空心好溫茶下一丸　心痛水瀉生薑湯下一丸　食癥麵湯下一丸大妙

烏金散　治遠年近日腸風下血不止

枳殼不計多少燒成黑灰存性便以薑子合定爲細末　羊脂炭不拘多少爲細末

右二件用枳殼末五錢炭末三錢和令勻用米飲一中盞調下空心服再服見效十餘良方名黑龍散

敗毒散　治脾毒下血臟腑疼痛類往圖厮後重驚悸

槐花炒　白礬煅及入分許存性二味等分是生時科

右二味同爲末每服一錢烏梅一箇水一盞煎六分去滓溫服

芍藥散　治非時下血及血刺

赤芍一兩半　官桂去皮三兩　甘草半兩炮

右藥同爲末每服一錢水一盞生薑半觔傷少許同煎至七分溫服

烏犀丸　治腸毒下血不止

用淡豆豉大蒜去皮苗等分一處杵令和勻可丸即丸如梧桐子大每服鹽湯下三四十丸久患血痢亦宜服之

中毒

鍾魂散　解中藥毒煩躁吐血口內如針刺者

北礬一兩　茶草一兩

右二味同擣爲細末作一服以新汲水調之立解此藥入口其味甘甜並不覺苦味者是也必併服兩服盡五更初一服如人行三五里再進一服當日見效忌油膩毒物

萬靈丹　解一切藥毒及蠱毒金蠶等毒

光明硃砂一兩令人研濃一枚取汁如無新者陰乾者用時以溫水浸軟溫水調用　大天南星三兩乃本生用　黃沙牛膽

右以膽汁和溲前二味爲丸如皂子大陰乾如有中諸毒者但頭肚未裂皆可救療服時先取汁脚以新水洗之澄取清者半盞入鹽磨化一丸頓服續以薄粥投之以吐爲度其藥除

保靈丹　解蠱毒及一切藥毒方象

胎產

大凡婦人懷孕當入月即當豫備所須及合用湯藥仍知逐月吉凶方向免臨時忽遽以至不周如產婦但腹痛而未暖疼者即未產候也凡生產有坐產臥產各須平正其身不得稍有偃曲即令兒生失道如未是其時切不可上草太早及强喂氣用力衝擊於兒以致生疾切忌產時旁人不得揮霍恐驚動產母只可令一老成并親屬人扶持令行或不能行即須立且直候兒過生方可得正產或正臥切忌上草太早生病極多子母纔分莫問兒女速與童子小便一盞及逐惡血藥一服不得令便臥且候移時背靠軟物仰臥立膝高搭床頭厚鋪裀褥遮障孔隙免有賊風所傷仍須三日內常令產婦舉內闊猛酷烟以備血暈也又不得教熟睡頻喚省緣氣血全虛恐生昏亂凡在一七日內唯頻服童便醇酒各半盞煎令沸放溫服日五七劑及食白淡粥二七日食淡膏肉三七日漸食滋味一月內菜實生冷恚怒嗔愁並皆不可稍染敗病即成大病一百日內氣血未和勿恃平寧便為無事往往自恣輒成大病凡十二月產帳及藏胎衣但向月德月空上皆可假令正月即月德在丙月空在壬壬上坐產婦丙上藏胎衣如壬位不便即子丙上安之亦得但於集聖歷日上檢看備詳也

藿香散　安胎和氣利胸膈治噎塞阻食

藿香　人參　茯苓　白芷　威靈仙　甘草　桔梗

右七味各等分杵為末每服二錢水一盞薑三片同煎六分溫服

河膠散　治妊傷寒安胎出汗

大獨頭蒜一箇以紙瓜蔞裹了外用黃泥固定以炭火煅令通紅放冷打開取出細研如未有瓜蔞但只以瓜根半兩代之　羌活　獨活　蒼朮去粗皮焙　紫菀　白朮　人參　附子炮去皮臍　阿膠一分已上各半兩　甘草

右一十味都擣為細末每服一大錢水一盞入連鬚蔥白一寸同煎至七分溫服如人行十里許連二服至三服末後一服喫了便以冷水漱口二十遍漱罷以衣微蓋汗出大妙

催生滑胎散　治疼痛

槐子炒　麥蘗炒　貝母炒　滑石　當歸炒各等分

右五味同為細末每於未產月十日前每日空心用溫酒下二錢

滑胎散　產前服

牽牛子一兩　赤土少許

右二味研令極細母覺陣頻時煎榆白皮湯調下一錢

又方

用臘月兔頭腦髓一箇攤于紙上均翦作符子於上面書生字一個覺陣頻動時于母釵子股上夾定燈焰上燒灰盞子盛了煎丁香酒調下

治子死胎中方

黃明乳香不限多少

右于端午時或歲除夜收猪心血和研為丸如雞豆大以紅絹袋盛掛于門上如患者以冷酒磨下一丸

備急丹　治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊等症

用錦文新大黃一兩杵羅為末用頭醋半斤同熬成膏丸如梧桐子患者用溫醋湯七分盞化五丸服之須臾取下亦治馬墜內損者

香桂散　治產後臍下疼痛不止產寶諸方作當歸散

當歸　川芎各一分　官桂去皮半兩

右三味同為細末分作三服每服酒一盞煎三五沸更入童便少許同煎至七分溫服甚者不過再服必瘥

金黃散　治產後惡血攻心時發躁

蒲黃半兩　延胡索一兩　桂心一分

右三味杵為細末每服一錢用烏梅湯放冷調下

金花湯　治逐惡物止腹疼

桂心去皮　威靈仙　白芷　當歸　牡丹皮各等分

右五味同杵為末每服二錢煎麵湯調下大凡婦人產後更須常體問產婦如所出惡物多即不須再三下之過即血虛氣極煩悶暈亂而生病焉如覺比常少及不行切須急攻之緣血隨氣行上擁于心故令煩悶而心滿急二者為異切在審詳蓋產婦體虛切不得妄亂進熱湯散如別無脈候但與調氣治血湯散最妙

沒藥丸　治產後心胸煩躁惡悶不快

沒藥　澤蘭　延胡索　乾漆　當歸　牛膝　牡丹皮　桂心去皮　乾薑各等分

右九味同為細末醋煮麵糊為丸如桐子大煎麵湯下十丸至十五丸不拘時服

延胡散　治產後血渴不止

延胡索　鬱金　乾葛　枳殼各等分

右六味並以好醋浸一宿炙乾杵為細末每服一錢冷橘皮湯下不過三服差

常山飲　治產後血海虛乘熱發狂鬧亂作時

常山　石膏　大黃煨　甘草炙　鱉甲煨炙　柴胡去蘆

右六味並以好醋浸一宿炙乾杵為細末每服三錢水二盞煎至一盞放冷服兼治室女體熱紅服不行

芸薹散　治產後心腹諸疾

芸薹以紙煨炒　當歸　官桂　赤芍藥各等分

右四味為末每服二錢煖酒下趕下惡物

逐裁丸　治產後血海氣虛腹臟疼痛心胸痞悶每過紅服行或多或少及有塊積者

蓬莪朮　當歸炒　大黃煨　桃仁去尖麸炒　桂心黃色各一兩　芎藭　牡丹皮　延胡索炒　木香　赤芍藥各半兩

右一十味擣為細末每服一錢溫酒調下午前臨臥各一服

大聖通真丸

馬鳴退二兩炙杵　人參一兩　甘草二兩炮　防風一兩　芍藥一兩　桔梗三兩　石膏二兩研如粉　當歸二兩炙　附子炮一兩　茺蔚一兩　藁本一兩　澤蘭二兩　白芷一兩　乾薑一兩　白蒺藜一兩

川椒三兩出汗取紅 柏子仁一兩 石茱萸一兩炒 蟬退二兩炒 蒼朮一兩炒 白薇一兩 白朮一兩 厚朴一兩一分入生薑 木香 黃芪 牛膝各一兩本法原不用此三味好事者加之亦得

右二十六味擣羅爲末煉蜜爲丸如彈子大每日空心茶酒任下 療八風十二脾寒氣乳風血瘕又治胎不安子在腹中死兼療萬無不效 如胎不安服一丸便止 如娠時臨月日服一丸至產不知產痛消去寒熱 如產後復發惡露中風兼傷寒汗不出以麻黃三分去根節杵末酒煎下藥丸汗出如多更進一丸便止 腸堅積聚朝暮進一丸 陰中痛月經不定不過三丸即差 又經產無子朝暮服之輒因有子 四肢脹滿洩利嘔吐不能飲食赤白痢如因產惡物積于大腸中風尸噤不語挑開口研藥設不具盡若阻道途有疾輕重以意服兼治傷寒

酒化一丸灌之即愈 男子女人萬病悉皆治之言有所大聖散 治婦人產前產後一切疾患大能安胎和氣或子死腹中疞刺疼痛產後血暈血癖血滯血崩勞血入四肢腰是血臟患者并胎衣不下及傷寒嘔吐遍身生瘡經候不調赤白帶下乳生惡氣欬嗽寒熱氣撮四肢室女紅脈不調並宜服之如或子臟虛冷頻頻墮胎及孕娠後乖違將攝因依成疾並可服之若能常服和悅顏色血海安寧飲食進美舉止康強丈夫服之亦療五勞七傷藤沈良方名澤蘭散

蘭九分使嚴者不用根 白朮三分米泔浸切作片子以麩炒令黃色 白芷三分濕紙裹煨過 藁本二分 人參三分 川椒一兩只取三分紅皮用 厚朴一兩薑汁炙 桔梗 白蒺藜七分揀擇只用仁子 阿膠半兩研炒合盧別杵 細辛一兩 丹參三分 肉桂五分去皮不見火 生地乾黃一兩 吳茱萸四分洗炒 黃芪三分 川烏頭三分去皮臍 卷柏四分不用根 白茯苓一兩 甘草七分炙 石膏二兩研細水飛過 五味子三分 柏子仁一兩生用 防風一兩 當歸七分 芍藥七分 川芎七分微炒 乾薑三分炮 白薇二分去土

右二十九味並揀擇令淨分兩爲末每日空心以熱酒調下一錢如婦人一切疾病但請服之神妙 藥沈良方云子家婦人女子藥多疾者服此藥悉差往往有子

三十四味薯蕷丸 治婦人產前產後諸疾并三十六種冷

血風氣等病 人參半兩 茯苓三分去皮 當歸 宮桂去皮 吳白芷 細辛 木香 牛膝 左山寒水石 藁本 麻黃去節 甘草炙 蘭香茱如無茱只用子亦得 防風 桔梗 赤參 芎藭 黑附子炮 蟬退已上各半兩去土 芍藥 牡丹皮各三分 馬鳴退一兩炙 沈香一分 石茱萸一分

右件同爲細末煉蜜爲丸如彈子大每日空心用酒化一丸 治八風十二痼乳中風淋血聚并治胎不安 若死在腹中不過三丸生下死胎 生衣不出一丸便出 產後腹內絞痛繞臍下如刀刺相似者一丸便止 產前產後赤白痢并帶下及嘔逆心氣煩滿服一丸立差 如懷胎入產月但一日一服至生產時不覺痛 產前傷寒中風體如板者用熱煎麻黃湯下一丸立止 經信不通或頻併來或白喫食無味瘦惡作熱面赤唇焦手足煩疼遍身如黑點生血斑凡婦人一切疾病但服此藥必有功效保生丸 治產前產後血氣風冷及是婦人所患一切疾病並皆理療神驗

金釵石斛二分另杵 秦艽 官桂去皮 乾地黃 貝母 防風 糯米 甘草炙 乾薑炮 細辛已上各一分 當歸 蜀椒去目 大麻仁 大豆卷即黑豆皮黃 芎已上各二分 石斛明淨者 麒麟竭 沒藥 龍腦各半錢

右一十九味並須州土新好者大分細擣羅爲末煉蜜丸兩熱須入水一分同煉令水盡和藥爲丸先杵五百下後丸如彈子大勻可成七十二丸用湯使治病狀如後 產前產後血氣頭旋身戰可用薄荷湯下 月信不通當歸酒下 赤白帶下溫酒下 婦人臨產難產胎衣不下子死腹中橫產倒死死絕不語但看頭熱氣在取一丸用芎藭湯研灌口中但入喉立甦神妙 產後惡血不盡腹疼痛嘔吐發熱憎寒煩悶月候不調或多或少皮膚虛腫產血不止虛勞中風口噤不語半身不遂產前產後赤白痢大便秘澀血渴血暈狂語見鬼頭痛面色痿黃漸成勞瘵飲食無味已上病狀並無灰酒研下一丸服之五七丸

臨產五臟不痛男女易生其神驗難述 催生當歸酒下 產後中風血暈生地黃汁同煎十沸研藥一丸溫之立瘥 禦風但五日一度爛嚼一丸空心熱酒下或溫酒下嚼一丸溫酒下 小兒天弔驚風薄荷酒下一丸分作三服 中風不語身忽如板用消梨好瓜薄荷同研熱服一丸用衣被蓋覆但汗出相次揭衣被便當風坐臥立瘥 其婦人身上一切諸疾但只以溫酒及當歸薄荷同研一丸立瘥 產寶語方云忌生冷油膩魚雞等物湯酒入口溫熱得所但未產以前與產後一臘好依方合一法博濟方中用麒麟竭沒藥龍腦三味近醫者云血竭沒藥破血產前不可服若合只依太醫局方除此三味合之分兩亦同產前後亦可通服也初產作小丸服之一法初產了五七日間氣虛蜜藥纔下散胷隔悶恐發虛熱凡合一料以糯糊丸半料糯糊丸者初產至兩臘可服丸如桐子大分三十六服

阿膠丸 治產前產後神妙

真阿膠因斤火炙令黃爲妙 蛇脫皮一條燒灰 熟艾半兩燒灰 敗筆一管燒灰 大麥花少許炙乾如無此花以麥麩代之亦可爲細末

右五味一處研令細以軟粳米飯爲丸如雞豆大如丸時粘手以少許麵爲丸 婦人有身十個月滿足者有諸般疾病用井花水磨下一丸 產後有病用通靈散一字酒湯磨下一丸 此藥大安胎臟如築打着及死胎在腹中用酷湯下一丸 產前欬嗽用千金散子一字熟水調下一丸 產前產後被血衝心用黃散子半錢醋湯調下一丸 產後遺瀝不止用燒鹽半錢無灰酒下一丸 難產者三日至五日服此立下用通靈散子醋湯下一丸 如婦產時衣先下未見兒足齒衣生用通靈散子一字調下一丸 如兒先下衣未見須臾用醋湯下一丸 如剖前後心用通靈散子一字調下一丸 如槊破後經三五日不生用黃散子一錢酒調下一丸 產前產後痢醋湯下一丸 血氣用艾枝煎湯下一丸醬粟炒令黃爲末是千金散 眞阿膠炙令黃爲末是黃散子 蛇蛻衣燒灰爲末是通靈散子

琥珀散　治產前產後血氣不和及一切疾

當歸一兩微炒　川芎一兩　赤芍藥二兩　莪朮一兩煨

右爲末每服二錢空心溫酒下如腰腹痛加陳橘皮一兩去白乾薑半兩炮同和勻如不喫酒以水一盞同煎至七分溫服

經氣雜證

白薇丸　治婦人無子或月水斷續不勻及上焦虛熱下部冷憊飲食減少肢體黃瘁凡有心腹一切疾病和劑局方名小白薇丸治婦人衝任虛損子藏受寒久無子息及斷續不產此因上熱下冷百病滋生或月水崩下帶漏五色腰腹疼重面黃肌瘦或因產乳不能將護路厠太早或久坐濕地並冷風從下入血藏既虛風邪內乘或月水當行失于調攝傷動胞絡陰陽不和上焦虛陽壅燥下藏邪冷結伏致使月孕不成冷極傷敗月水不勻飲食減少夜多盜汗面生黯黯齒搖髮落脚膝疼重舉動少力並宜服之

白薇　乾熟地黃　川椒去目微炒去汗　白龍骨各一兩　前子　當歸到碎炒　芎藭　細辛　乾薑炮各半兩　藁本　白芷　覆盆子　菖蒲　白茯苓　遠志去心　人參　炒黃卷柏各三分　麥門冬一兩半去心焙

右二十一味同杵爲細末煉蜜爲丸如桐子大每日空心及晚食前溫酒下三十丸局方云常服壯筋骨益氣血煖下藏除風冷冷八府子

鼈甲丸　治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積氣結硬時發刺疼漸成勞狀

鼈甲去裙醋炙黃　官桂去皮　荆三稜醋浸急炒　川大黃煨　桃仁麸炒去皮尖　丹皮　訶子皮　琥珀　牛膝　土瓜根各等分

右一十味同爲細末煉蜜爲丸如桐子大煎桃仁湯下十五丸破血癥氣塊尤妙

桃仁煎　治月水不調阻滯不通

桃仁二兩湯浸去皮尖麸仁麸炒微黃　川大黃二兩　蟅蟲一兩炒黑色去翅足　川朴硝二兩

右四味同爲細末用醋五升入銅銀鍋內以慢火熬成膏可丸丸如桐子大當日晚不喫晚食五更初以溫酒吞下一丸不喝破至明日午際取下如赤豆水或似羊肝蝦蟆衣其病下了即一丸分作二服未下再服候鮮紅即住服仍以調氣湯散補之

延胡索散　治婦人血氣走作疼痛不可忍者及月水不調面色萎黃喫食減少及生產後諸疾並皆治之

延胡索生用　荆三稜生用　蓬莪茂酒浸少時　當歸酒洗焙乾各一兩

右四味同爲細末每服二錢空心溫酒下如血氣發甚者及月水不勻並用韋使酒紅花同煎調下只三服差矣

當歸煎丸　治婦人久積血氣時發發刺痛肌瘦力乏月候不調

川當歸去土二兩　檳榔　赤芍藥　牡丹皮　延胡索各半兩

右五味先將當歸用米醋一升二合慢火熬成膏入衆末和爲丸如桐子大每服二十丸溫酒下空心日午服

澤蘭丸　治婦人血海虛損肌肉黃瘁喫食進退月水不勻四肢倦悶聖濟總錄治午多午少或腳或筋或溫或涼

澤蘭一兩　附子一兩炮　當歸　牛膝　牡丹皮　芍藥各半兩　人參　陳皮　厚朴薑汁炒　蛇床子各一兩半　黃芪　乳香　白朮　蓯蓉酒浸家　官桂去皮各三分　川芎半兩　遠志去心半兩

右一十九味同爲細末煉蜜爲丸如桐子大空心溫酒下十五丸米飲亦可

沈香鼈甲散　治室女榮衛不調經候凝滯或時頭目昏悶上腭積涎吱懼不利五心虛煩飲食進退多困少力

木香一兩　沈香三分　鼈甲九肋者一枚淨去裙襴炙令黃香用一兩半　常山一兩　當歸一兩湯洗七遍去蘆　半夏一兩去滑止　官桂去粗皮一兩　柴胡一兩去蘆　人參一兩　白茯苓一兩　槟榔三分　甘草炙　青皮一兩　陳皮一兩　生地黃一兩

右一十五味同搗羅爲末每服二錢水一盞又入生薑三片同煎至七分去滓溫服空心日午臨臥各一服御藥院方內有麥門冬一兩無官桂一味

乾柿煎丸　治衝任久虛下漏不時連年未止變生多病夜有盜汗欬嗽痰涎頭面多痛百節酸疼血海虛冷面生黯黯腹刺疼全不喫飲食日漸羸弱懷姙不牢或無嫉孕並宜服之

好乾柿十個去蒂細切　沈香一兩研　茯苓一兩研　禹餘糧石四兩醋淬七次人乳研如粉令細入　白朮一兩　吴茱萸去梗炒令黑　川烏頭一兩炮裂去皮臍　乾薑半兩炮　地龍二兩去土炒令黃色　陳橘皮一兩去白

右七味搗爲末入前藥膏和令得所入臼內杵一二千下取出爲丸如桐子大每服十丸至十五丸溫酒下醋湯下亦可　如患多倦少力全不思食粥飲下　如欲姙娠服不過兩月必有空心食前服

人參荆芥煎散　治婦人血風勞氣攻刺疼痛四肢無力不思飲食多困黃瘦胸膈痞滿經水不利心多怔忡

荆芥穗四兩　柴胡去蘆　蓯蓉洗去浮鹽酒浸一宿焙乾　肉豆蔻去殼　白芷　黃芪各一兩　當歸洗焙一兩　鼈甲洗淨醋炙黃　官桂去粗皮各二兩　蓬莪茂　海桐皮　乾地黃　枳殼麸炒去瓤　木香各一兩　沈香半兩　槟榔半兩　芍藥　人參　茯苓　甘草炙

右二十三味並杵羅爲末每服二錢水一盞生薑二片烏梅二個同煎至七分溫服一日二服　如覺臟腑熱邪宜心服　小便多即食後臥時服　如患有氣塊血塊立得消亦治丈夫風勞病其功不可盡述

香甲散　治婦人血風虛勞四肢少力肌肉黃瘁多困減食遍身酸疼真邪相擊心腹振痛

木香三分　鼈甲去皮肉醋炙令黃香二兩　牡丹皮　陳皮去白　官桂去皮　人參　茯苓　柴胡去蘆　白朮　當歸炒　熟乾地黃　黑附子炮裂去皮臍各一兩　乾薑三分炮　甘草半兩炙

右一十六味同爲末每服二錢水一盞煎入生薑三片棗二枚同煎至七分去滓稍熱服　如煩渴心躁更入烏梅一兩同杵爲末

大香甲散　治婦人血臟風虛冷氣肌肉黃瘦飲食進退經

候不勻心腹多服漸變如勞補血海調氣

沈香半兩　鱉甲酒浸去裙襴炙令黃用一兩　柴胡半兩　人參半兩

梧桐子　茯苓　川芎　藿香各半兩葉　羌活

木香各半兩　陳皮去白　牡丹皮　安息香各半兩　當歸半兩剉去蘆

厚朴半兩薑汁炙令香　荊三稜半兩煨　官桂去皮　附子一兩炮去皮脐

牛膝各半兩　桃仁湯浸去皮尖半兩　和皮大腹子一分

右二十一味各洗淨擇焙乾爲末分一半每服二錢水一盞入生薑黑梅各少許同煎至八分溫服餘一半更入

乾漆一分　阿魏半兩　赤芍藥一分

右同爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸空心煎烏梅地黃湯下與散子相間服

金花散　治室女骨蒸熱勞

藿香　零陵香各一分　蓮子心二分　延胡索　芍藥

香白芷　川芎　當歸　官桂去皮各一分

晚蠶蛾二分

右一十味同擣羅爲散每服溫酒調下一錢一日二服

枳殼飲子　治婦人手足煩熱夜臥多汗肌肉黃瘁羸候不勻四肢煩倦心胸滿悶狀似勞氣

枳殼二兩去瓤麩炒　半夏一兩湯洗七遍以生薑汁浸三宿用麩炒令黃　紅芍藥一兩

柴胡去蘆一兩半　黃芩一兩半

右五味同爲細末每服二錢水一盞生薑一塊擘破棗二枚同煎至八分去滓溫服候五心煩熱及身體壯熱潮熱退方住服

當歸散　治婦人血風攻注百骨節酸疼皮虛腫筋脈拘急或生瘧疹寒熱不時飲食無味

延胡索　當歸　蒲黃炒　京芎　滑石研細

乾地黃　天麻　地榆醋炒焙乾　肉桂去皮　澤蘭

蓬莪朮炮　赤芍藥

右一十一味皆等分唯地榆減諸藥之半各依法修製了許羅爲細末每服一錢半溫酒調下或薄荷茶清調下亦可　如手脚冷卒患血氣奔心撮痛炒生薑酒調下二錢

牡丹皮散　治婦人血氣攻疰頭目疼痛遍身煩疼口苦舌乾多困少力或發寒熱狀似傷寒

牡丹皮　赤芍藥各二兩　川芎　羌活各一兩半　甘菊

防風各二兩　半夏一兩半湯浸洗七度炒令黃　甘草一兩炙

右八味同爲細末每服二錢水一盞薄荷十葉煎至七分稍熱服

狼毒丸　治婦人血氣攻疰腰脚及背膊疼痛四肢煩倦麻痺兼療丈夫元臟風攻遍身痛筋脈拘急腰脚無力

天南星　狼毒　海桐皮

加牛膝一味焙用之以酒浸一宿亦炒

黑附子炮各等分又一法更

右四味各用童便浸安著盞子四隻內浸一宿漉出控乾杵爲末酒糊爲丸如梧桐子大每日空心以猪腎汁十餘滴炒葱一根發酒下二十丸只酒亦可如有孕不可服之

牡丹皮散　治婦人臟冷氣不和心胸煩悶不思飲食四肢無力頭昏身體痛

牡丹皮　芍藥　白芷　乾薑各一分　當歸

延胡索　陳皮去白　官桂去皮　烏藥　苦枝

紅花　川芎各半兩

右十二味並生杵爲末每服一錢半用生薑二片酒水各半盞同煎至七分溫服　如初生產後每日三服一七日後漸減服數如服藥後腹內些小疼痛請不怪如喫至滿月永無病生

赤芍藥散　治婦人氣血不和心胸煩悶不思飲食四肢少力頭目昏眩身體疼痛

牡丹皮　白茯苓　赤芍藥

甘草各一兩　柴胡三兩去蘆　吳白芷

右六味爲末每服二錢水一盞入薑棗同煎至七分溫服食後臨臥各一服

勝金丹　治婦人血海虛冷腹冷疼肌肉黃瘦飲食進退時多困倦四肢發煩產前產後諸疾但依法服食大效

大黃二兩用米醋浸兩宿以竹刀子細切子帶上蒸九度研爲末　地龍去土醋炒過半兩

茺花一分醋炒令黃色于器內炒不得犯鐵器　蓬莪朮炮半兩　川芎半兩

當歸半兩　蒲黃　延胡索半兩于器內炒　杜牛膝半兩

官桂去皮　赤芍藥各半兩　乾地黃半兩以醋微炒　劉寄奴一分炒

右十二味並同爲末傾入大黃膏內溲和爲丸如雞豆大每日早晨臨臥用溫酒化下一丸　如產後有疾以炒生薑酒化下一丸產後只用溫酒化下一丸月數未多即且莫服此藥

黑靈散　治婦人遠年血氣甚者

穿山甲半兩　黑鯉魚皮半兩　小兒髮半兩　皁莢不蛀者三錢

右四味同入于磁瓶子內用鹽泥固濟先用文武火燒次用大火煅之令赤熱放冷取出研細每服半錢溫酒調下順氣木香丸　治婦人血氣攻刺手足疼痛冷痺心腹久積停淨刺口吐冷涎面目黃黃色發歇有時

黃瓜花一兩　巴豆七個用醋半兩煮盡醋炒葉色　延胡索

秦艽　桑蛾各半兩　官桂一分　木香一分

右七味爲末醋煮麵爲丸如綠豆大每服十丸熟酒下

沒藥散　治婦人急血氣疼痛不可忍者

沒藥　紅花少許　延胡索炒　當歸洗各等分

右四味爲細末每服二錢以酒半盞童便半盞相和勻赤燒稱鎚或小鈴子淬過後調下常服只用溫酒一錢亦可

伏龍散　治婦人赤白帶下久患不瘥肌瘦黃瘁多困乏力

棕櫚不拘多少燒灰燒火者急以盆蓋隔令火出　蓮粟上塵粟長者如蓮以絹袋盛之空虛者抄子鐵子內炒令烟盡于淨地上放冷出小砂伏龍肝子鍋底下土取赤上放冷細盛用

右三味等分研和勻令入龍腦麝香各少許每服二錢溫酒調下鹽醋湯亦可患十年者可半即瘥

大琥珀丸　治婦人百病

木香二兩細切微炒　琥珀二兩生用　北亭一兩炒石脆青者白脆黃者一兩

京芎二兩炒　官桂一兩去皮　當歸一兩略炒　白僵蠶一兩去絲取淨用

生薑自然汁于白琥內焙乾　沒藥一兩生用　薑黃一兩略炒　蟬殼一兩去上爪

右一十味並依法修事秤定分兩一處爲末別以乳香一兩用水磨盡香在水內入少白麵爲糊丸如菉豆大以好生硃砂一兩半麝香一錢爲衣將硃砂麝香末分爲三度上之貴色勻也治婦人室女百病常服五丸溫酒湯亦得久病十五丸至二十丸日兩服　赤白帶下煎荊芥酒下

經脈不通虎杖京芎蜜同煎酒下　心氣痛不可忍生薑醋湯下上喘咳嗽訶子人參煎湯下　五勞烏梅鱉甲

慈白煎酒下　血邪發狂磨刀水磨生犀下用鉛白霜亦得　四肢痙癘遍體生瘡及五痔何首烏煎酒下　血海積冷腹中絞痛食後氣脹腰脚無力炒薑酒下　血暈悶亂童便酒各半盞煎沸放溫下　血山崩白艾葉煎酒下

臨產作陣血悶悶亂胎息不順子死腹中生衣不下及要催生並用生雞子清一個熱酒調下　小產產後敗血奔心口噤舌強寒熱發渴頭面浮腫坐臥不得百節酸疼用生地黃生薑汁各少許入童便半盞同煎三五沸去滓溫服下　產後中風用川烏頭二個炮製去皮臍白僵蠶少許一處爲末酒煎半盞下　產後淋瀝不止口苦盜汗乾荷葉阿膠煎酒下　頭面及四肢腫痛伸縮拘急延胡索酒下　血瘕結塊刺痛難忍當歸煎酒下　赤白等痢熱陳米飲下　有孕不得服之

二十六味牡丹煎丸　治婦人血刺血痃走注心胸疼痛血海虛冷臍下膨脹小腹滿悶腿膝無力血多血少背膊闊倦血皴裂手足麻痺身體振掉腰脊傴僂月經不調或清或濁赤白帶下血山崩漏面色痿黃身生癰疹腹內虛鳴面生黯黧手足熱疼并筋攣骨疼兩筋拳急起坐托壁腰背牽掣舒卷不得　陳自明嘗見良方云治婦人衝任本虛小腹挾寒或因產勞損子臟風寒搏于血氣結生痕聚塊硬發歇背項強急手足麻痺或疼滯澀悶血小腹疼痛寒熱盜汗四體酸痛羸乏少力心多驚悸不能飲食

牡丹皮一兩　黑附子一兩炮　牛膝酒浸一兩宿一兩　龍骨二兩細研水飛過　五味子一兩生　官桂去皮一兩　人參一兩　槟榔二兩　白木一兩　白茯苓一兩　當歸一兩　續斷細者一兩　木香一兩　澤瀉一兩　延胡索半兩　羌活二兩　藁本去土用細者一兩　乾熟地黃二兩　赤芍藥一兩半　乾薑半兩　山茱萸半兩　縮砂仁半兩　石斛二兩　乾薑一兩　單薑一兩炒熟　白芷一兩

右二十六味並各州土新好者洗淨令焙乾杵爲細末煉蜜爲丸如桐子大　如是血熱及夜多煩躁不用附子山茱萸草薑乾薑此四味却入柴胡黃連甘草牽牛子四味柴胡去苗一兩甘草一兩餘各半兩爲末同和每服十丸至二十丸溫酒下醋湯亦可空心臨臥各一服不嚼並無

所忌

驚癇

安神丸　治小兒驚風搐搦化涎鎮神

使君子兩枚以麵裹子煨火中煨後麵熟爲度去麵只用使君子　水銀一錢粉子　香細墨一錢　蘆薈一錢　辰砂一錢　膽茶一錢　輕粉二錢　天竺黃半錢　青黛半錢　蝎梢三七個　乳香一錢　寒食麵一錢半　眞熊膽半錢　龍腦一錢

右十四味同研令勻細滴水和爲丸如菉豆大每服一丸薄荷蜜水化下如小兒稍覺驚着化半丸與喫若能常服永無驚疾

延壽散　治小兒驚搐不定或因驚風已經取下此病再作氣粗喘促

雞舌香大者一枚　硃砂半錢　五靈脂一錢半　黃芪半錢

右四味同研爲細末每服半錢用糯米泔調下如孩子小只服一字

神效龍腦膏　治小兒驚風搐搦痰壅在心藏眼直視或眼不開口噤四肢或冷或熱大便或祕或泄

生龍腦研一錢用柳木槌子敲碎得脚粉分　水銀半錢好硃砂一錢　天南星二錢先去皮臍浸軟取大以水銀一處如棗核許慢火煨令熟　石腦油冬天用半兩夏天用一分有毒

右四味爲末以石腦油和丸如菉豆大一歲二歲三歲四歲一服一丸二丸煎乳香湯下不得化破服後三五頓食久取下惡物痰涎大有奇功

桃紅丸　治小兒慢驚嘔涎安靈其狀多因久患脾胃虛弱風邪中入而作此疾

蘇磬一兩半　赤脚蚣半兩

右二味同爲細末作稠麵糊爲丸如菉豆大每服用溫米飲下三丸次喫補虛丸

補虛丸

新羅白附子一兩湯浸去皮　大半夏一兩

右二味各用白湯浸二日每日換水三度取出焙乾爲末以生薑白蜜汁著兩錢薑末煮糊和爲丸如菉豆大每服三丸溫粟米飲下

牛黃硃砂丸　治小兒慢驚風搐搦及天狗似癇者

蠍梢二七個　牛黃半錢　麝香半錢　雄黃少許　硃砂錢

黑附子尖三個　巴豆一粒如者皮用丹去皮用肉

右七味一處研令勻如粉以棕蒸餅和爲丸如蕭荷子大濃煎荆芥湯下一丸以衣被蓋少時汗出可愈　如天狗搐搦開口不得者便用若柳草蒸入麗同搾汁藥一丸在兒後心上以前熱棕下併子著之用手吊子繫定後更服一丸化破人麝香少許以荆湯下之煙內蒜氣渾身汗出立愈用端午日合忌雞犬婦人兒

如聖青金丸　治小兒慢驚忽發吐逆夜驚啼在再不解或脫或泄變成慢驚或爲痫疾等狀定搐痰壅病緊痰涎鎮心神

龍腦一錢研　麝香少許　香墨半錢研　胡粉一錢　白麵三錢研個以白麵裹慢火煨令熟　使君子一個　青黛錢　銀箔十片如魚鱗少用　金箔

右九味同研令細滴井水和丸如雞豆大患慢驚用薄荷水化下一丸服訖須臾便睡睡立愈後更服兩三服如此須小驚者及急驚只服半丸以下慢驚隨大便取下涎一合以來神效

睡驚丸　治小兒慢驚風身體壯熱手足微冷

白龍腦　硃砂各一錢水飛　香墨末　胡粉少許　使君子一個

右件以寒食麵爲糊丸如桐子大用薄荷水化一丸厚朴散　治小兒外傷風冷解肌

厚朴去皮以薑汁炙令香　蒼朮　陳皮去白各一兩　甘草半兩

右件同爲細末每服一錢水一盞入生薑二片棗一枚同煎至六分熱服

鉛白霜丸　治小兒驚風傷寒四五日未得汗搖頭撲手口鼠多啼叫不睡喫水無休

鉛白霜半兩　山梔子一兩　甘草炙半兩　馬牙硝半兩　硃砂　人參　天竺黃各半兩

右七味爲末煉蜜爲丸如桐子大每服一丸冷熱蜜湯化

下

青黛丸 治小兒驚食嘔氣

青黛分一 木香 豆蔻 槟榔各一分 麝香一錢

續隨子一兩去皮 蝦蟆三個燒存性

右七味同爲細末煉蜜爲丸如菉豆大每服五丸薄荷湯下

紫霜散 治小兒驚涎壅熱睡中驚搐驚叫解心臟安神魂

硃砂一兩半好者 鉛粉半錢 鈆霜一錢 天竺黃一錢 龍腦半錢

已上五味並同細研 甘草一錢炙 人參一分 使君子一錢煨

右後三味先研爲末細羅了却入前五味同研令極細和勻後以銀器或新磁器內貯之服一字蜜水調下看小兒大小加減用之

真珠丸 治小兒驚熱有痰及多溫肚夜臥不穩喫食過多

天南星一枚研末一錢 巴豆二十四枚去心膜以水浸一宿研細不出油用

右二味先研巴豆令熟次下南星以糯米粥和爲丸如菉豆大隨兒年歲服之 瀉痢用米飲下 取食葱湯下如膈上有食即吐出如在中脘即瀉下 驚悸薄荷荊芥湯下

金化散 治小兒驚熱化痰利膈

川大黃湯浸煨 乾葛 甘草炙 川甜硝另研細各等分

右同爲細末每服半錢水一盞煎至六分食後溫服

小硃砂丸 治小兒蓄積鎮心臟化痰涎

硃砂一錢研細 巴豆三十粒去皮膜出油盡 半夏湯洗七遍研爲末炒二大錢

杏仁五枚去皮尖

右四味同研爲細末以麵糊和丸如菉豆大二歲只服一丸荊芥薄荷湯下三歲加一丸五歲服三丸如有驚伏在即行盡仍舊藥出如無驚藥丸更不下甚妙而復穩

辰砂丸 治小兒壯熱驚積在內壅併痰涎及嬭癖取虛中積轉驚

辰砂一兩 定粉半錢 粉霜一錢半 膩粉一錢 麝香少許

白丁香半字

右六味同研爲細末用粟米飯和爲丸如菉豆大捻作餅子慢火內微炮令紫色用粟米飯飲化下一丸微利爲度

錢湯丸 治小兒驚積壯熱

猪牙皂角灰一錢 硃砂一錢 天南星末半錢 滑石末一錢

輕粉一錢好者 巴豆二十四粒去皮尖

右六味同研至細以寒食麵爲糊和丸如菉豆大每服一歲二丸三歲三丸煎錢湯下臨臥服

延壽丹 治小兒驚癇及大人卒中惡風涎潮昏重口眼不斜

辰錦砂用鹽浸少時以大火煅過 膩粉 鐵焰粉 白附子炮各一兩 天南星生浸洗 蛇黃

大附子一枚 天竺黃 巴豆

右一十五味同研和爲細末以蜜和粟米飲溲和爲丸如雞豆大每中惡風痰涎及五般癇疾薄荷酒磨下一丸老人半丸小兒驚癇十歲以上一丸分四服四歲以下一丸分五服新生孩兒一丸分七服並用蜜水磨下 如中風者妻直面如桃花色口眼俱閉喉中作聲汗出如油及汗出不流多要下泄或瀉血者並是惡候更不用服唯口噤眼開者藥下立差 如患纏喉風壅塞氣息不通將絕者急化一丸生薑薄荷酒下必效

雙丸子 治小兒癲痫一切風痰傷寒小兒驚風等

天麻輕炙 天南星炮 蠶蛾 生犀末 硃砂另研 羚羊角末 蠍梢須是蠍尾者 生金箔 牛黃一分 雄黃一錢 狐肝一具水煮爛切焙乾另杵 烏鴉一隻去腸爪翼肚子 麝香各半

烏蛇酒浸去皮骨輕炙 零陵香一錢 天雄尖 麝香各少許

右件修製擣羅再用下項藥

好硃砂一兩水飛 牛黃 龍腦各一兩 麝香 膩粉 乳香各少許

右一十七味並揀擇淨分兩秤足依法修製擣細研令勻煉蜜和硬軟得所却子石上搥三百下用坩器盛每服二丸薄荷湯下大人白豆大小兒菉豆大卒患併三服 癲癇中風用膩粉三大錢水調同藥化下

薄荷湯下 婦人血風并產前產後中風手足灣曲當歸紅花酒下傷寒豆淋酒下三五丸

透冰丹 治一切風毒上攻心胸不利口舌乾澀風虛痰壅不思飲食及風毒下注腰脚疼痛脾虛體黃腎敗骨弱疏痰

利膈治癲癇等一切風疾小兒驚風

川大黃 益智子去皮 茯苓 茯神去皮木 蔓荊子去花葉 蔵靈仙去土 天麻 僊靈脾去梗 吳白芷

山梔子七枚小者爲上去皮各一兩 麝香一分另研 細墨一分另研 太醫局方煅用蜜水淬 川烏頭四兩生用去皮脐太醫局方用河水浸半月研三日一換水切作片焙乾鹽一兩炒黃去鹽

右並生爲末入麝香墨拌勻蜜溲和入臼內杵一萬下丸如桐子大每服茯苓汁溫酒下二丸 如卒中研四丸用皂角白礬溫水下立效 癲癇風每日服三五丸常服一丸茶酒任下 小兒驚風入膩粉少許薄荷汁化半丸灌之 療癲癇茶清下一丸忌動風毒物

神寶丹 治大人小兒一切風疾但服此藥無不應效

白然銅半斤 金星礬石 禹餘糧石 石膏各一兩

右四味用炭火煅通赤傾在醋內淬如此凡一七度放乾後都擣羅爲末入在磁盆內以湯淘洗二十度候浮盡上面黑汁澄淨了只收在底真實藥於瓷器內慢火逼乾水脈後細研乃用諸藥如後

茯苓 戴靈仙 茯神 天竺黃 天麻

藤 白僵蠶 鉛白霜 蟬蛻去毒炒 白蒺藜

旋覆花 莽草 犀角 半夏湯洗去滑七遍炒令黃

藿香已上各一分 桑螵蛸 瓜蒂各二七個 赤小豆四十九粒 人參

槟榔半生半熟各半兩 劍脊烏蛇酒浸去皮骨炙黃用肉一兩 真虎骨一兩酒浸炙黃 白龍砂以白大黃第三日漬淘取漿米煮乾用之一兩

右件修製擣羅再用下項藥

好硃砂一兩水飛 牛黃 龍腦各一兩 麝香 膩粉

乳香各少許

右六味研如塵用前藥攪和令勻用槌膠水煮麵糊和得所入鐵臼擣熟丸如彈子大焙乾每一粒豆淋酒磨下作十服每五服後浸皂角水磨下服之小兒患量大小以意加減與服用薄荷金銀湯磨下神效不可具述

神效雄黃丸 治小兒五般癇牛癇即牛聲馬癇即馬嘶狗癇即狗吠羊癇即羊鳴雞癇即雞鳴五癇病者五藏相引邪氣盛起寒厥反張手顫口吐涎沫須臾如迷復作 此方與

錢氏五色丸同但博濟水銀用八分耳五色丸

硃砂半兩研 水銀一分作二兩 真珠一兩研 木鉛三兩同水銀熬

右煉蜜爲丸如麻子大每服三四丸煎金銀薄荷湯下

疳積

金瓜圓 治小兒疳熱身多壯熱黃瘦久服肥孩兒解肌

黃連 黃蘗 甘草炙 青皮去白各等分

右四味同爲細末研入麝香少許和匀以猪膽和却入膽內盛用線子繫定于石器內煮水煮五七沸取出風頭釣一宿取出爲丸如菉豆大每服五七丸米飲下漸加至十丸

至聖青金丹 治小兒一十五種風疾五般疳氣變蒸寒熱漏病衆花冀脚細肚脹肚上青筋頭髮稀疎多咳泥土揩眉毛咬指甲四肢羸瘦疳蝕咳心瀉痢頻併饒驚多啼疳蝕口舌赤白瘡疳眼雀目此悉皆治療入口大有神效

青黛上細如者二分研 雄黃二分研 龍腦少許 熊膽一分別減水人化藥

胡黃連二分 麝香五分研 蟾酥一皂子大 水銀一皂子大鉛霜

白附子二板 蘆薈一分研 硃砂一錢研 膩粉一分

右十三味細研杵羅爲末後再都入乳鉢內細研令勻用猪膽一枚取汁熬過浸蒸餅少許爲丸如黃米大瓷乾於磁器內收密封或要旋取每服二丸各依湯餌如後

小兒患驚風天搐戴上眼睛手足搖搦狀候多端但取藥一丸用溫水化破滴入鼻中令噴嚏三五遍後眼睛自然放下搐搦亦定更用薄荷湯化下二丸 久患五疳四肢小肚高揭眉喫土咬指甲髮稀疎肚上青筋粥飲下二丸

小兒變蒸寒熱薄荷湯下一丸化破服 小兒久患疳蝕咬心苦楝子煎湯下二丸 小兒患鼻下赤爛口邊疳蟲并口瘡等用兒孩子奶汁研一丸塗在患處 小兒患疳眼雀目用白羊子肝一枚以竹刀子批開內藥二丸在羊肝子內以麻縷子纏定用淘米泔水內煮令熟空腹喫下仍令乳母常忌毒魚大蒜雞鴨猪肉等 此藥小兒常隔二兩日喫一服永無病不染傳天之疾凡有患但與服必有功效

蚵蛾黃連丸 治小兒疳食氣頭面虛腫腹內泄瀉面色痿

黃頭髮作穗心腹脹滿肚上青筋

疳蝦蟆十枚洗去腹肚以酒浸炙令黃香即住火用 木香一分 胡黃連半兩

黃連半兩 沈香一兩 丁香一分 麝香少許 乾薑一錢燒存性用

木鱉半兩燒令煙盡用 巴豆二十二粒以木瓜洗去心膜齊流蜜物壓去油研如麵止

右十味細杵羅爲末以水浸蒸餅爲丸如綠豆子大空心臨臥米飲下丸三歲以上二丸至三丸忌粘滯物

方 治小兒走馬疳蝕遂損骨者及小可攻蝕用之必有效

用大天南星一枚當心剜作坑子安好雄黃一塊在內用麥麵裹火內燒候雄黃銷作汁以盞子合定出火毒一宿去麵研爲細末入好麝香少許掃在瘡上

秋霜散 治小兒走馬疳蝕唇頰齒牙浮動宣露口臭至妙

信砒一分 粉霜半錢 膩粉半錢 麝香少許

右四味同研令細如粉每用時以指頭點一粟米許搭在患處牙龈上立效

麝香丸 治小兒疳熱化食壓驚

麝香 青黛 雷丸 鶴蝨 管仲

黃連各一兩 扁豆一十四個油煎去皮

右七味除麝香青黛外處杵羅爲細末于乳鉢內再研和勻用豬猪膽汁和蒸餅爲丸如菉豆大每服五七丸空心日午米飲下看兒大小加減如常服尤妙

青黛散 治小兒疳熱殺蟲

青黛研令細宜連一錢半爲末 苦楝根去皮焙乾爲末 雄黃一分別研

硃砂者細研令勻一分別研 夜明砂半兩別研 川大黃半兩剉碎蒸二度焙乾爲末取用

麝香一錢別研 蕪荑半兩

右九味爲細末每服看兒大小服一錢半錢如若用蜜水調下日再服米飲調下亦可此宜常服

萬金散 治小兒疳蝕咬心痛面伏地臥口吐清水痰涎

白檳榔半分 苦楝根 石榴根皮 鶴蝨 藜蘆

右五味同爲末空心熱茶調下一錢更臨時看兒大小加減藥忌飴糖粘滯食凡疳在內阳服溫脂服刑色無定或如蛻青日漸瘦弱此乃內疳之候 若鼻下赤爛白揉鼻

頭上有瘡瘡不著痂漸漸蝕耳生疳頭大項細此腦疳之候 若肩被蝕齒作五色或嚼黑口下疳口邊上腭孔子口中臭氣肩齒槁爛此乃口疳之候 若下部開張痢下膿血有時赤爛痛不可忍痢下久無度臭不可聞此是虫疳之候

萬壽方 治小兒疳氣羸瘦腹大頸小頭髮稀疎臟腑不調或瀉秘

乾蝎半兩 乾蚯蚓半兩 蛇蛻皮一分 乾蝦蟆三個

使君子五個燒 沒食子五個燒 麝香一分

右上四味入罐子內封閉口炭火燒通紅同後三味研細取爲丸如菉豆大每服五丸米飲下一日二服

胡連丸 治小兒疳瀉痢等極妙

胡黃連 丁香 蜜陀僧各半兩 肉豆蔻一個

右件同研細入麝香一分和勻次入菉豆末少許同水和爲丸如麻子大兒三歲以下一丸三歲以上五丸 孩子腦疳身熱及赤爛黃連湯下 脾虛羸瘦泄痢四肢虛腫青州棗湯下 肝疳眼澀生瞖甘草湯下 骨疳冷地臥愛食土漿蘇茶湯調下 常服米飲下 肺疳上氣急喘橘皮湯下 筋疳瀉血鹽湯下 蟲疳及瀉無定生薑湯下

雜病

真珠散 治小兒吐奶及霍亂吐瀉不止

石亭脂炒一錢七 白滑石炒三錢七

右二味同研千餘遍看兒大小生薑糯米泔調下一字立瘥

乳香丸 治小兒霍亂吐瀉不定

半夏半兩湯洗七遍生薑汁炒黃 乳香 砂仁各一錢研

右三味爲末麵糊爲丸如菉豆大每服五丸米飲下日三服

方 治小兒未及周歲吐瀉不止此乳母氣血動榮或熱奶傷胃致有痰涎

雄黃好者少許 大黃 五靈脂各等分

右三味同研爲細末每服一字磨刀水調下

香朴散　治小兒脾痛兼和氣止瀉及腹肋刺痛起止疼痛不思飲食

厚朴一兩　木香一分　麥蘗一分炒　神麯一分炒　青皮一分去白　陳皮一分去白

右六味同爲細末每服半錢溫水調下

煅金液丹　治小兒三五歲患無辜瀉痢亦可服

硫黃一名石亭脂一名金液取三五兩至十兩董煅得輸上黃爲第一餘黃重便得但無夾雜爲上研碾入煅子內可及八九分無妨

右件藥取煅藥罐子一個盛藥在內下蓋子了採狗蹄草一大握本名石蹄苗木鱉草一大握稱田中生一莖四花如田字亦名水田草獨莖生若無上件二草且只使蓋母草代之亦可使將裹藥罐子底下并周匝可厚五六分只至口縫不裹然後置於平地上四面羸炭五六觔上面安熟火一觔以來燒之直候火燒藥罐子九分來通赤可看口縫處有碧焰子起便急手撥炭火急將柴灰三斗都蓋勿令氣發出直候冷撥灰取出刮去泥土記上是煅一度法度依此煅之第二度依前法作藥草裹固煅之如前法煅五度若火候得所煅出如熟雞子黃即是候也若急要服只煅兩度亦可服之煅度數多者爲妙煅度數足便於淨地上埋爐子一宿出火毒凡逐度煅了刮去下面砂石丈妙又取出爐子於銚子著水煮一二十沸然後敲破爐子取藥杵爛更入乳鉢內點煎水研爛如泥並無粗者却研令乾每一兩藥用蒸餅一兩以來浸握出水了入藥內和合更於茶臼內杵令勻如麵可丸如梧桐子大日晒乾孩子留末子研細以米飲調以盞子灌之夜啼心驚奶傷有痰涎者並速研藥一分以來令服之日二服自然便放遂下積物多多與服並無忌若三五歲患無辜瀉痢並服得

烏龍散　治小兒秋後瀉痢久患不瘥大腸滑泄

龍骨　黃丹　定粉　猪指甲子各等分

右四味同入一磁器罐子內安藥以物塞口用火煅令通赤放冷取出研爲末每服半錢米飲調下

使君子丸　治小兒臟腑虛滑及疳瘦下痢腹脹不思飲食

使君子一兩麵裹煨黃爲度　甘草半兩炙令香　厚朴半兩去皮薑汁炙令香　陳皮去白薑汁炙令香　青橘半兩如是夾脂及脂肪熱煨用不調不用此一味　訶子半兩去核用

右件同爲細末煉蜜爲丸如小雞豆大三歲以上每服一丸米飲化下兒年百日以上三歲以下每服半丸乳汁或清米飲化下

胡黃連丸　治小兒疳痢瀉痢等極妙

胡黃連半兩　肉豆蔻一個　檳榔一枚　訶子二枚四一枚生用　丁香半兩　紅雪一兩　蜜陀僧半兩

右七味同研細末入麝香一分和勻次入菜豆末少許同水和爲丸如麻子大兒三歲以下一丸三歲以上五丸孩子腦疳身瘦及爛黃連湯下　脾胃羸瘦泄痢四肢虛腫青州棗湯下　肝疳眼澀生瘡甘草湯下　骨疳令地臥愛食土紫蘇茶調下常服米飲下　肺疳上氣急喘橘皮湯下　筋疳瀉血鹽湯下　蟲疳及瀉無定生薑湯下

如聖散　治小兒多時瀉痢眼生翳膜并疳眼退翳

蛇蛻皮二條各長二尺用麩爛煨皮研　穀精草一兩去根土　黑附子一枚去臍子

蟬殼一分去足　石決明一分　定粉四錢

右件前三味先擣羅爲末次入諸藥研爲散每服一字半羊子肝一具切破摻末用麻皮線縛米泔煮熟先熏眼後與喫如未能喫食研汁灌之

木香丸　治小兒調中順氣補虛

草豆蔻五個和皮　人參　茯苓　陳橘皮去白各一兩　防風　藿香

右六味同爲細末每服一字減半錢薑鹽十米飲調下

孝慈丸　治小兒奶食衝脾傷風欬嗽壓涎

甜葶藶一兩紙上炒過　牽牛子一兩濕熟　漢防己一兩濕熟　大杏仁一兩去皮失炒熟研

右三味先擣羅爲末入杏仁同研用煮鼠肉再杵爲劑丸如菉豆大每服三丸至五丸淡生薑湯吞下一日二服

燒青丸　治小兒奶癖食癖每至午後時作寒熱徹有欬嗽脇肋癖硬

輕粉二錢　元精石一分　硇砂一錢　白麵三兩

右五味同細研滴水和爲餅子以文武火燒熟爲度再研去白一分　青橘半兩如是夾脂及脂肪熱煨用不調不用此一味　訶子半兩去核用

右件同爲細末煉蜜爲丸如小雞豆大三歲以上每服一丸米飲化下兒年百日以上三歲以下每服半丸乳汁或清米飲化下

胡黃連丸　治小兒疳痢瀉痢等極妙

胡黃連半兩　肉豆蔻一個　檳榔一枚　訶子二枚四一枚生用　丁香半兩　紅雪一兩　蜜陀僧半兩

右七味同研細末入麝香一分和勻次入菉豆末少許同水和爲丸如麻子大兒三歲以下一丸三歲以上五丸孩子腦疳身瘦及爛黃連湯下　脾胃羸瘦泄痢四肢虛腫青州棗湯下　肝疳眼澀生瘡甘草湯下　骨疳令地臥愛食土紫蘇茶調下常服米飲下　肺疳上氣急喘橘皮湯下　筋疳瀉血鹽湯下　蟲疳及瀉無定生薑湯下

如聖散　治小兒多時瀉痢眼生翳膜并疳眼退翳

蛇蛻皮二條各長二尺用麩爛煨皮研　穀精草一兩去根土　黑附子一枚去臍子

蟬殼一分去足　石決明一分　定粉四錢

右件前三味先擣羅爲末次入諸藥研爲散每服一字半羊子肝一具切破摻末用麻皮線縛米泔煮熟先熏眼後與喫如未能喫食研汁灌之

木香丸　治小兒調中順氣補虛

草豆蔻五個和皮　人參　茯苓　陳橘皮去白各一兩　防風　藿香

右六味同爲細末每服一字減半錢薑鹽十米飲調下

孝慈丸　治小兒奶食衝脾傷風欬嗽壓涎

甜葶藶一兩紙上炒過　牽牛子一兩濕熟　漢防己一兩濕熟　大杏仁一兩失炒熟研

右三味先擣羅爲末入杏仁同研用煮鼠肉再杵爲劑丸如菉豆大每服三丸至五丸淡生薑湯吞下一日二服

燒青丸　治小兒奶癖食癖每至午後時作寒熱徹有欬嗽脇肋癖硬

輕粉二錢　元精石一分　硇砂一錢　白麵三兩

右五味同細研滴水和爲餅子以文武火燒熟爲度再研滴水和丸如黃米大每服七丸粟米下三歲已下服五丸肉湯丸　治小兒痰呷咳不止

銅青　大黃　猪牙皂角各剉末各炒一錢

右三味同研令細用油餅麵和爲丸如小豆大每服五七丸煎猪肉湯忌酸鹹

龍腦膏　治小兒風熱咽喉腫疼塞悶生瘡搔頭躁悶及齒咳心痛

龍腦半錢　白礬一分紙子內煨搗研令細　蟬殼三十個去足研末炒　牛黃研半字　蛇退皮一條長二尺燒灰黑者生者再煨須緊按實者鐵器焦後研爲末　元明粉一錢

右六味一處煉研入砂糖少許和爲劑丸桐子大冷水化一丸

方　治小兒牙宣常有鮮血不止牙齦臭爛者

雌黃炒一錢大麝半錢

右件同研至細先用紙條子以生油塗之然後摻末在上少用末蘸作小片子尖看大小用插在爛動處一服瘥

丹砂丸　消除積滯化胃久伏積聚

巴豆一分去皮以米醋煮一二十沸中取沸水內洗七遍淨去膜并心及乳脚內一個研如粉出油　豆蔻四個爲末　木香　硃砂一分

右同研令細以麵糊和爲丸如菘菜子大每服三五丸小兒一丸酒食所傷鹽湯下溫水亦可　小兒疳氣肚脹腹聚米飲下

抵聖丸　治下虛中積久會取轉不得者

犀角末二錢　蝎稍二七個　銀末　硃砂各一兩　巴豆二十枚去皮膜　芫花二錢同巴豆用好醋一盞煮令醋盡漿出巴豆以冷水浸洗控乾再炒令乾搗末取二分用

右件同爲細末再研如麵將巴豆另研如糊和勻以水煮麵糊爲丸如小菉豆大　如小兒因驚積聚粘滯毒物在于脾胃羸曾取下變成虛積羸湯下　體熱困悶眼合不開黃連甘草薄荷桃仁湯化膩粉一字許下　一歲以上三歲以下二丸小可只一丸米飲下　大人喫食吐逆心腹脹滿夜有盜汗日漸羸瘦用薑棗湯下　婦人血氣米醋湯下五七丸更在臨時約其虛實加減用之張氏家傳方名紫金丹

香葛根　治小兒上焦虛熱喫水不止

枇杷子（炒）　乾薑　胡黃連　甘草　黑參

麥門冬（各等分）

右六味同爲細末每服一錢水一盞生薑一片煎至七分後更入蜜少許再煎至五分放溫食後服

犀角散　治小兒恒熱後多發熱面赤五心煩悶四肢無力飲食減少夜多盜汗面色痿黃

犀角（末）　柴胡（去蘆）　枳殼（麩炒）　麥門冬（去心）　茯苓（去皮）

芍藥　大黃　桑白皮　人參（已上各一分）　黃芪

鱉甲（一個醋煮令黃）

右十一味同爲細末每服半錢用桃仁九個漿水煮麥門冬一十九個去心共桃仁同研令細入水一盞與藥同煎至六分去滓溫服早晚各一服亦治大人盜汗

靈砂丹　治衆疾及小兒癇風

硃砂（半兩五升慢火煮三十餘遍用一白個秋夏用五十枚）　大附子（炮）　青皮　杏仁（去皮尖各一兩）　巴豆（以米水浸去皮心）

右先將巴豆以水五升煮令油出水盡爲度細研與衆藥末和以粳米飯和爲丸如豌豆大　小兒癇風桃柳枝一握煎下　小兒肚脹石榴湯下　小兒及患人相度虛實加減服　一方用麵糊一兩炮

金鎖散　治大人小兒衆疾

白附子（炮）　木香　肉豆蔻（去皮）　猪牙皂角（去皮子）

桔梗　吳茱萸（麩炒）　肉桂（去皮心）　大黃（生）

知母　白茯苓　當歸　槟榔（生一個）　川芎（淨）

巴豆（去皮日日換湯後一七日又用麥麩水煮一日細研）　白蘋婆（取仁）

白僵蠶（二分直者）　黃連（取淨二兩）　朽藥

右十八味同杵羅爲細末入巴豆於乳鉢內同研令勻然後入磁器中密封候至一七日後每用一字湯使如後卒中風羊髓酒下頭旋菊化酒下血淋大黃湯下瞼腫痛醋湯下吐血竹茹湯下腸風青陰繁柳草自然汁入熱酒又槲葉燒灰調酒下寸白蟲先喫牛脯後以蘋婆湯下霍亂吐瀉新汲水下肺氣喘杏仁湯下小兒一切疾米飲下小兒鵝蜜湯下小兒誤吞錢麻粉湯下小兒天鵝風以蟬殼燒灰入小便調下

靈寶丸　治小兒瘡疥及三十六種風疾服之必愈

天麻（洗）　天南星　白附子　獨活　白僵蠶

川烏頭（炮）　羌活（洗）　乾蝎（令酒各兩）　牛黃　龍腦（各一分細研）　麝香（半兩細研疑人衆藥）

右十一味各要上好藥淨洗日內晒乾不用近火杵爲細末煉蜜爲丸如豌豆大諸色風疾薄荷溫酒下五丸女人血風更入少當歸末溫酒下如雞瘋風下牀不得先用白礬半兩爲末葱十莖煎湯溫浴後用薄荷汁溫酒下三十丸衣被蓋出汗別服補藥如是男子婦人疥癬瘋癩並須依前法洗浴服三十丸出汗當日必瘥小兒瘡疥亦須如常浴每一歲一丸並須出汗並瘥忌食麵猪肉魚毒等物

治斑瘡方

用臘月兎兒活血以蒸餅相和丸如粟米大每服五丸無根水送下食乳者乳汁送下

解毒必勝散　治瘡疱將出未能勻徧透肌

用牛蒡子不限多少炒令熟杵爲細末每服一錢入荆芥二穗水一盞同煎至七分放溫與服如瘡疹已出更與服亦妙

瘡科

癰疽者五臟六腑不和所生也五臟主裏氣行經絡而沉六腑主外氣行經絡而浮若喜怒不常飲食不節陰陽不調令熱相干則臟腑氣虛氣虛則腠理開疎寒邪客於經脈之間爲寒所折則榮衛稽留於脈榮者血也衛者氣也血榮得寒則澀而不行衛氣從之與寒邪相搏故壅遏不通氣者陽也陽氣蘊積則生熱寒熱不散故積聚成癰疽也癰之欲發先浮淺皮薄以澤疽之證皮厚似牛領之皮毒氣深也久則熱勝於寒熱氣淳盛蓄積故傷肉而敗肌肉壞則化爲膿血癰患屬表骨髓不枯易爲治療疽患屬臟傷骨爛筋則難理經曰一寸二寸爲癰三寸四寸爲癤五寸至一尺爲疽一尺至二尺三尺曰竟體疽疽成圍腠皆出諸氣人有憤鬱不遂志欲者血氣蓄積亦多發此疾凡痤癤者是六腑受邪經絡壅滯而發熱毒浮淺不能爲害但出膿血時令盡不爾則再攻爲瘡愈盛矣

治一切癰腫未破疼痛令內消

用生地黃杵如泥隨腫大小攤於布上糝木香末於中又再攤地黃一重貼於腫上不過三五度

抵聖丸　治骨疽瘡及冷漏久不合者

滴乳香　膩粉　白礬（枯有性各等分）

右三味同爲細末每遇患者先用鹽醬水洗之以汁調之貼瘡上必效

殘霞膏　治風毒流注惡瘡熱疼生肌化毒

烏蛇（四兩）　五倍子（半兩）　蛇皮（半兩以上生使則碎）　巴豆（二十個去殼）

雄黃　牙硝（各一兩研）　麝香（一錢添）

右件依法修事於銚子內入油二觔半煎聞油香入前藥熬候藥并巴豆焦黑色漉出諸藥不用却入黃蠟一兩半慢火養成膏以磁器內盛但有風毒瘡以小紙攤貼妙

羚羊角　治丈夫婦人風毒攻衝頭面生瘡虛腫等

羚羊角（兩少許）　犀角　羌活　槟榔　人參（各一兩）　當歸

右件剉碎焙杵過分作四貼每貼用水一升煎至四合

分作兩服空心臨臥分服其每貼兩服滓更用水半升煎至七分又作一服喫之溫服立瘥

敗風膏　治本臟風毒攻疰生瘡及熱毒氣流注赤癢

白芨半兩　白斂半兩　白礬一兩半淨　蕭草一兩洗細剉　吳茱萸分　水銀如豆大　麝香少許

右七味爲末相和先用油半盞以下磁碗內盛以慢火熬令沸更入蠟一分同煎三五沸却安令處入前藥末調和自然成膏或是瘡以鹽湯洗後以貼在瘡上

四白散　治腎臟風毒攻疰四肢頭面生瘡遍身瘙癢

白花蛇一兩半酒浸一宿去皮骨秤　新羅白附子　白蒺藜微炒去刺各一兩

右四味同杵爲末早晚空心溫酒下二錢

損鄧散　治腎臟風攻疰生瘡兼療惡瘡

甘草　黃連　密陀僧各一分　槐柳一斤炮　木香

右五味同杵爲末先以溫鹽漿水洗過瘡挑乾以唾調貼之止痛生肌

烏犀膏　治皂角及惡水入瘡口內熱痛不止

皂角子不計多少燒灰存性用一二分

右先研皂角子絕細續入砂糖和勻如膏貼於瘡立效

藥神散　治腸風痔疾

羌活去蘆　黃芪　蔓荊子　狗脊火燒去毛　枳殼麩炒　槐柳　蒴藋以麻莖藥爲度不以個數藥末去子留鹽用

右等分杵羅爲末入蒴藋中盛以砂盒或瓦罐子內鹽泥都封塗之火煅通赤候冷取出藥末更別用藥如後

荊芥子　白蘞二味與前等分　木香半

右同前藥杵羅爲末空心茶酒調下一錢日三服別無忌

治痔方

黃蘗　黃連　黃丹　膩粉　白礬

右爲末各用三錢都一處和令勻患者先煎葱湯洗後用藥末一錢塗之久患不過三度理之大有效楊侯家藏方

無膩粉名三黃散

乳香散　治風毒痔瘡

乳香　猪牙皂角　穿山甲各二兩　蛇蛻一條頭尾全者

篇蘗四兩去兩頭粗硬尖者　蒺藜半角尖一對可長二寸已來

右都入在砂罐子內蓋口用鹽泥固濟曬乾用十觔炭火煅候碧焰子出去火放冷取出細研每服二錢用胡桃肉一個細研以酒半盞入藥同調空心服五服後見效

追毒膏　治瘰癧神效

丁香七個　麝香一錢　真茗五十箇　雄鼠糞七箇兩頭尖者以麥麩兩匙同炒候黑黃時去麩用　斑猫三個去翅足以糯米炒令黃去米用　槲皮三兩去蘆皮了搗碎細剉以水二斗煎取四升濾過重熬後成膏悉後入諸項藥

右六味同杵爲末候槲皮煎溫和乃入諸藥攪合勻貯於磁器內每服空心以溫酒一盞調下三匙以來臨時更看人大小及肥瘦加減斟酌用之喫了更以清溫酒下之便仰臥須臾即吐出若病根年深者如蝦蟆衣魚腸相似近者若蜆肉吐了以溫水漱口粟米淡粥補如無粟米亦可忌一切十毒物月餘

血竭散　治瘰癧已破膿水不止者

青州棗二十個燒爲灰　乾地黃半兩別杵爲末　血竭炒二錢半

右三味都細研如粉以津唾調貼瘡上

治瘰癧滿項不破及腫疼痛方

用不蛀皂子三百個酒一升半化硇砂一兩同浸皂子七日以文武火熬成候酒盡爲度每至臨臥含化三粒服半月必瘥

遂邪散　瘰癧者由風邪毒氣客於肌肉隨虛而停結爲瘡如李梅棗核大小兩三相連皮肉間時發寒熱甚也久則潰膿連屬而生久不愈則爲瘰癧不以年遠服之必效

皂子不計多少以絹袋盛入鼎中及三七個取個夫頭趁熱火炒令黃色去却麩後搗爲末　斑猫五十箇

右用皂子末二錢七斑猫末一錢七水銀粉二錢生雞卵一個取白傾盡內更入飯飲半盞并藥一處打勻四更初服至五更取下蟲物或從小便中下出如有些小瘡痂不妨或患及五年只三服三年只二服二年只一服忌口只用燒鹽喫五七日其方曾經親驗甚有神效

生犀丸　次日服消毒化結聚

生犀半分　生龍腦半分　真麝香半分　紅娘子二十個　斑猫

膩粉一錢 麝香二十文 乳香一塊好者如皂子大

右件同研爲細末應是一切瘡以黃連湯或鹽湯拭乾糝在瘡上不得以衣物粘著瘡口

八效虎骨散 治血風遍疰疼痛丈夫筋骨疼及打撲損疼痛甚者

虎骨醋炙 敗龜各 當歸 官桂去皮 地龍去皮 牛膝去苗 漏蘆 戎鹽仙 自然銅燒醋淬 元胡索

右一十味各等分同杵羅爲細末每服一錢用熱酒調下每日一服

療瘡

穿山甲 虎脛骨各一兩醋炙 雞舌香一枚 麝香少許

右件同研令至細每半錢看所患大小以黃米粥攤在紙上候溫和得所然後糝末在藥上封裹所傷處疼痛立止隔日換貼之

五傷接骨膏 治一切傷折及驢馬傷墮并打撲閃肭著疼痛不可忍者

沒藥一兩好者生用 乳香一分好者生用 川椒一兩揀擇去子生用 芍藥一兩揀擇淨洗用 川芎一兩好者生用 川當歸一兩揀擇淨洗切焙令乾 自然銅一兩半用火煅令赤候冷研令細用水淬過細切焙令乾上銀子及上綾絹取一兩

右件都搗羅爲末入自然銅末拌和令勻用黃蠟三兩半於銚子內鎔爲汁次入藥末不住手攪令勻丸如彈子大每服一丸用好酒一盞同煎煎散藥丸爲度候通口呷酒就痛處臥些小只可一服止大段疼痛者兩丸至三丸未瘥

定痛膏 治大段傷折疼痛

白檳榔一枚 肉豆蔻一枚 官桂半兩 木鼈子二十個 香白芷二錢 天南星一個 柳桂一分 當歸一兩 黑附子大者一個 黃蠟臨時不定 白附子一兩 丁香三兩

右一十二味都爲末一兩蠟用藥末一兩同於鐺內煎直候紫色花上來藥方熟後用井泉水一盞將鐺內藥傾入水盆內然後以手捏乾其藥直須熱炙更不得分毫結梗捻爲餅子裹在傷處其藥三日後却將藥重於火上炙團一處依舊捻餅子裹舊傷損處

一處依舊捻餅子裹舊傷損處

遲魂神白散 治打撲損及傷中大效

花乳石五兩搗碎如皂子大 硫黃搗碎如皂子大

右用磁盒子一個先入乳石一重次入硫黃一重重鋪盡浮上用鴨舌草銜掃是也赤石脂和塗盒子口縫又用鹽泥固濟勿令有小縫紋用新磚一口四面著金木水火字中央書土字上安盒子用炭火二觔煅之耗及三分漸漸去之取去盒子地坑內埋一宿細研爲末但是刀傷損至死者於傷處糝藥其血化爲黃水更糝藥其人便活更不疼痛 如婦人產後血暈至死但心頭暖即以童小便調下一錢取下惡血如猪肝片終身不患血風等症若高上有血化爲黃水吐出及隨小便出便瘥 若牛抵人腸出不損者急納入以桑白皮縫合於縫上糝藥立活甘草不可有縫 如內痛血入腦腦熱煩童子小便及入酒少許調一錢服之 此藥眞神仙所傳如逢德行者可以合博救其獲陰功

黑龍散 治傷折手脚骨髓突出補碎續筋

穿山甲四兩 虎頭骨四兩 洛粉三兩炒色爲度 麝香一錢 龍腦一錢 丁香一兩好者新丸

右先用瓦罐子一個投虎骨在罐子內燒令煙起次入穿山甲同燒煙焰起爲度取出放冷同前藥杵羅令細用小黃米一大合水二盞煎成稠粥續入藥末一字喘一小杓子再煎攪勻後於損處先著手帕子一條攤上面覆裹勿令透氣再著紙裹三五重井油單都裹角即一伏時一度換依前法忌冷水溫麵不得鹹物服自然銅沒藥治之如無黃米即以糯米代之

蓬莪散 治傷撲疼痛

蓬莪朮 白殭蠶各一兩 蘇木一兩 沒藥半兩

右四味同杵羅爲細末每服二錢以水一盞煎至七分溫服日三五服

當歸散 治驢馬傷墜他物傷折痛楚不可忍者

川當歸三分焙令香 芎一兩半炒令黃 桂心一分去皮 甘草三分炒令黃 附子一分泡 澤瀉一分炒令香 獨椒一分

右七味搗爲散每服酒調方寸匕日三服如傷折呼喚痛聲不絕服食長久之間不復痛十日可筋骨相連或小兒弄車所損臂膝皮肉決見骨不呼喚聲不絕服數日便能行動其效如神

丹藥

張果老先生服杏仁法

夫人受命於天放形於地以日爲魂以月爲魄一生以後更不合死皆是飲食養育不致煩絕矣藥在鑪根之下凡人未必盡知冠冕之流貴耳賤目只重吳蜀之空名不知咫尺之可取以爲用可期必致殊不知長生之後服之則可延年世上單服一味藥而得延年者黃精枸杞藥中爲妙品猶有生頭痛病而難服彭祖夏姬商山四皓煉杏仁爲丹以致仙宮而王子晉丁令威等並不去世事高麥子服生杏仁服之久遠仙來迎候乘龍駕鶴以致昇騰者只服杏仁矣服之生五臟補筋骨添血髓益精神強記目明視徹千里消災辟變凡爲仙若王子晉服經四十年不覺身衆勝空丁令威服經二十年不覺身飛此二子者不服諸藥惟服生杏仁凡有此神驗不須煉熟氣生力全若煉熟則減其半杏仁共有十名一曰長生元二名千歲元三名化白令少元四名却老元五名通神萬歲元六名定精元七名蓋精元八名超升元九名換骨輕身元十名煉杏仁金丹元其人服之一一經歷矣

杏仁性不冷亦不熱無一切忌嗣亦不與諸藥相妨惟忌不淘白粳米甜水粥遲遲喫者有少不安須臾即可或客行在路只恐不及如法若逢不淘白粳米甜水粥但放令冷任食多少無妨害惟忌此粥外並不妨

杏仁性溫平有少苦味久即甘美服之三年更不覺有苦氣惟覺甘美性不下氣能去腸上熱肚腰口服者當自知之

取生杏仁去皮尖雙仁服黃色者尤妙於平旦時空腹未食口時二七枚口中迴皮尖熟嚼令津液半口可嚥之訖如在一里任喫諸食如單瓦延年者任食肉及葷辛如欲昇騰者即不得食一切肉及葷辛任畜妻子營養備作也肉者易敗壞之物所以不益于身葷辛品味仙家忌之能斷諸肉即仙道易成或服生杏仁一年百病自除二年身輕目明徹視千

里但得延命五十年服經六年骨肉換盡面若桃紅延年七紀服經七年行及奔馬換舊齒重生服八年玉女侍衛延得一百五十年服經九年時聞仙宮鐘磬延命五百年服經十年命與日月齊如食五辛及血食則不得聞也服經二十年身騰空虛而無所歸服經三十年仙宮來迎若斷妻子血味五年營養者服之二十年衆仙來迎白日昇天如斷血味營養只畜妻子者四十年一朝不覺自受衆仙來迎余性好射獵血肉爲本今登六十遊恒山頂上得此方便於山拾杏仁服之經十年自覺身輕目明便踴躍無礙服二十年余已八十矣本亦只營一百年即擬自理實不敢希望延年忽有三十餘人從恒山頂上來余欲避之不得便卓然立只迎去半里便即禮拜不敢正視有童子先來相引忽然莫識何處須臾問知是仙宮非人凡世余故留此方遺後明者勿輕之勿與凡流之輩徒傳必輕之以爲口實也

張先生服生杏仁愼忌損益法契聖寺原師處得此法原師於王屋山揚行眞處得此本每日旦朝空腹取杏仁二七枚去皮尖雙仁者面向東南未漱口前熟嚼令口中津液有半口便即嚥却如人行一里當任意食之恐減藥力杏仁取效服三七日四七日即覺洩氣過常時三倍服三個月脚熱如火腹中搜病不覺自愈服經八個月脚臟調和搜病不斷有如嬰兒之觀至十六個月臟腑更新胸膈通泰上氣永斷癖病消散服經二十四個月肝臟鮮明肝上有痕皮不覺自脫落眼目精明眼病永除目能遠視服經三十二個月脾臟踈暢胃脘開通常自搖動脾氣永消腹胃通快服經四十個月腎臟端正去黑皮氣無壅滯腰膂之間結令永盡房屋少壯服初滿二年百害不傷服經三年百神覆蔭三年穀氣破散腦中疼痛忽然出生血一千片勿驚怪此是藥來即就止此是上上應延年之效如三年內大腸中血不下者亦是次上上之喜應延年之象如滿四年無不下者到五年內其血更亦不來矣如依前更來是穀氣厚重藥力未加而藥賜未來當須加杏仁至四十七枚乃可破得穀腸必破藥力衝破亦同延年必仙之效耳凡服杏仁血下一日不嫌飲食二日平且瀉血瀉血之後便聞飲食惡氣耳間眼見即生嘔逆如有能忍飢得七日者是上仙如不能忍飢者任食煮白粳米粥汁飲之以時爲之是次仙三日五日七日並下血一升皆聞食臭八日平且下血後聞飲食美任意食之若食即須少食之多即令人滿悶七日別一度下血一升到八日已上平且身騰空虛而無所歸服經三十年仙宮來迎若斷妻子血味五年營養者服之二十年衆仙來迎白日昇天如斷血味營養只畜妻子者四十年一朝不覺自受衆仙來迎余性好射獵血肉爲本今登六十遊恒山頂上得此方便於山拾杏仁服之經十年自覺身輕目明便踴躍無礙服二十年余已八十矣本亦只營一百年即擬自理實不敢希望延年忽有三十餘人從恒山頂上來余欲避之不得便卓然立只迎去半里便即禮拜不敢正視有童子先來相引忽然莫識何處須臾問知是仙宮非人凡世余故留此方遺後明者勿輕之勿與凡流之輩徒傳必輕之以爲口實也

張先生服生杏仁愼忌損益法契聖寺原師處得此法原師於王屋山揚行眞處得此本每日旦朝空腹取杏仁二七枚去皮尖雙仁者面向東南未漱口前熟嚼令口中津液有半口便即嚥却如人行一里當任意食之恐減藥力杏仁取效服三七日四七日即覺洩氣過常時三倍服三個月脚熱如火腹中搜病不覺自愈服經八個月脚臟調和搜病不斷有如嬰兒之觀至十六個月臟腑更新胸膈通泰上氣永斷癖病消散服經二十四個月肝臟鮮明肝上有痕皮不覺自脫落眼目精明眼病永除目能遠視服經三十二個月脾臟踈暢胃脘開通常自搖動脾氣永消腹胃通快服經四十個月腎臟端正去黑皮氣無壅滯腰膂之間結令永盡房屋少壯服初滿二年百害不傷服經三年百神覆蔭三年穀氣破散腦中疼痛忽然出生血一千片勿驚怪此是藥來即就止此是上上應延年之效如三年內大腸中血不下者亦是次上上之喜應延年之象如滿四年無不下者到五年內其血更亦不來矣如依前更來是穀氣厚重藥力未加而藥賜未來當須加杏仁至四十七枚乃可破得穀腸必破藥力衝破亦同延年必仙之效耳凡服杏仁血下一日不嫌飲食二日平且瀉血瀉血之後便聞飲食惡氣耳間眼見即生嘔逆如有能忍飢得七日者是上仙如不能忍飢者任食煮白粳米粥汁飲之以時爲之是次仙三日五日七日並下血一升皆聞食臭八日平且下血後聞飲食美任意食之若食即須少食之多即令人滿悶七日別一度下血一升到八日已上平且身騰空虛而無所歸服經三十年仙宮來迎若斷妻子血味五年營養者服之二十年衆仙來迎白日昇天如斷血味營養只畜妻子者四十年一朝不覺自受衆仙來迎余性好射獵血肉爲本今登六十遊恒山頂上得此方便於山拾杏仁服之經十年自覺身輕目明便踴躍無礙服二十年余已八十矣本亦只營一百年即擬自理實不敢希望延年忽有三十餘人從恒山頂上來余欲避之不得便卓然立只迎去半里便即禮拜不敢正視有童子先來相引忽然莫識何處須臾問知是仙宮非人凡世余故留此方遺後明者勿輕之勿與凡流之輩徒傳必輕之以爲口實也

張先生服生杏仁愼忌損益法契聖寺原師處得此法原師於王屋山揚行眞處得此本每日旦朝空腹取杏仁二七枚去皮尖雙仁者面向東南未漱口前熟嚼令口中津液有半口便即嚥却如人行一里當任意食之恐減藥力杏仁取效服三七日四七日即覺洩氣過常時三倍服三個月脚熱如火腹中搜病不覺自愈服經八個月脚臟調和搜病不斷有如嬰兒之觀至十六個月臟腑更新胸膈通泰上氣永斷癖病消散服經二十四個月肝臟鮮明肝上有痕皮不覺自脫落眼目精明眼病永除目能遠視服經三十二個月脾臟踈暢胃脘開通常自搖動脾氣永消腹胃通快服經四十個月腎臟端正去黑皮氣無壅滯腰膂之間結令永盡房屋少壯服初滿二年百害不傷服經三年百神覆蔭三年穀氣破散腦中疼痛忽然出生血一千片勿驚怪此是藥來即就止此是上上應延年之效如三年內大腸中血不下者亦是次上上之喜應延年之象如滿四年無不下者到五年內其血更亦不來矣如依前更來是穀氣厚重藥力未加而藥賜未來當須加杏仁至四十七枚乃可破得穀腸必破藥力衝破亦同延年必仙之效耳凡服杏仁血下一日不嫌飲食二日平且瀉血瀉血之後便聞飲食惡氣耳間眼見即生嘔逆如有

夫椒性稟五行情通六義葉青應於甲乙皮赤在於丙丁花黃與戊己爲容腋白光庚辛之色子之呈質應乎坎方熱不止蒸暖及丹府傍通血脈中助眞元又能消酒食之毒又能辟溫邪之氣安和五臟調暢三焦陽草之中功不可比每金州川椒一觔擣令淨者去目及合口者仍於鐺銚內炒令透於地上鋪紙兩重以椒在上用新盆內合定周迴以黃土培之半日許其毒成汙取出曬乾木臼輕杵取紅皮四五兩再入鐵臼杵爲末以木蜜爲丸如桐子大候乾以紗絹袋子盛掛通風處每日空心茶酒任下十丸至十五丸半年加之二十丸一年後加之二十五丸並無所忌又歌曰其椒應五行其仁通六義欲知先有功夜間且不起服之半年內脚心汗如水四時去煩勞五臟無風氣明目腰不疼身輕心健記別更有異能三年精自駐顏色如童子精爽又少睡但服此神效一生瘧疾已若能志心服三屍自然藥更有九般蟲各各自迴避倘逢此色人第一書傳意雖未遇神仙初緣已得地至人傳授神仙服餌雄黃丸

夫雄黃千萬變爲黃金服餌莫若眞人此法微妙不傳凡世今但錄此方久服即身輕益氣悅澤顏色去三屍辟百毒遠疫癘鎮心神奇功最妙卒莫紀陳每擇雄黃如雞冠血色不雜砂石者不限多少搗羅令細以松脂和杵爲丸如彈子大每旦以酒研下一丸服至十日腹中三屍百蟲自下面上紫黑皆除除及一月百病自瘥耳目聰明久服即可至神仙常須潔淨不損藥力尤佳

煉松脂法用桑柴灰淋汁將松脂伺於鍋內或上石器中煉成汁後用稷皮濾過灰汁內勁者以水澤如雪白者用如未精依前法再煉之每合前藥以和勻爲服

枸杞煎　明目駐顏行步康健壯元氣潤悅肌膚

採枸杞子不計多少先去蒂子然後用淋水洗淨淘出控乾後夾布袋子一個入枸杞子在內於淨砧上取自然汁澄一宿去其清水入石器內慢火煎成膏子取出入磁器內收每服半匙頭以溫酒調下久服神妙大有所益如合時天色稍暖其杵下汁更不用經宿其膏煎下三兩載並不損壞如永遠服多煎下亦無妨

服九節菖蒲法　駐顏延年明耳目去風氣通關竅安神益智

九節菖蒲不計多少惟生於山澗石上東流水中者採取爲妙若是少得時只石上水中生者亦得不可用陂澤中生者于八月內採取得去根鬚淨擇了以淘米汁浸三日三夜每日換米泔取出控乾以硬竹削爲片子如錢厚以布袋盛貯於長流水中浸三伏時更用井花水淨洗擇如蒸飯九度每蒸後曬一日候數足不得犯鐵器于木石臼子內細搗羅爲末煉蜜爲丸如梧桐子大初服二十丸漸加至三十丸四十丸五十丸用鹽湯下茶酒亦可忌羊血若有餘者以紙袋盛貯掛在風口如服盡更取末合或酒煮糊和丸亦得

煅金液丹訣

硫黃（一名石亭脂一名金液取三五兩至十兩並煅淬煉如上硫黃爲第一餘黃並依得但無夫雞爲上粹所入雞子內可及八九分無妨）

石硇取煅藥罐子一個盛藥在內下蓋子了採狗蹄草一

大握（末名玉龍丹）大鹽草一大握（稻田中生一塹四花如田字亦名水田草獨莖生）將二草大鐵臼內搗爛更入一抑黃土同杵勻如泥（若無二味將益母草代之亦可）更將裹藥罐子底下并周匝可厚五六分只至口縫不裹然後置於平土上四面簇炭五六觔上面安熱火一觔來燒之直候火燒罐子九分來通赤尋開口縫處有碧焰子起便急手撥炭火急將柴灰三斗都蓋勿令氣焰出直候冷撥灰取出刮去泥土（已上是燒一度法也度度依此燒之）第二度法依前法取藥草裹固燒之如前法燒五度若火候得所燒出如熟雞子香即是候也若要急服只燒兩度亦可服（燒度數足者妙燒煉數足便於地上埋爐子一宿出火毒凡逐度燒了刮去下面砂石妙又取出爐子於銚子內著水煮一二十沸然後敲破爐子取藥杵爛更入乳鉢內點前水研爛如泥並無麤者却研令乾每二錢用蒸餅一兩以來湯浸握出水了入藥內和合更入茶臼內杵勻如麵可丸梧桐子大日曬乾收服法如後

一每遇患者幾腹臟稍秘及飲食減少似有作寒作熱狀候即服便此即效也瘥了日只可一服　一無患逐日早服二十丸至三十丸諸疾永不生　一但遇有患更不問疾之冷熱但取藥服之以效為度自然見神功別藥更不宜雜藥亦不得著別藥吐瀉此藥自然補瀉與常不同不問丈夫婦人老小有患並服無忌　一孩子留末子細研以米飲調以盞子灌之夜啼心驚癇傷有瘀涎者并速研藥一分以來令服之日二服自然便效逐下積物多多與服並無忌若三五歲患亦無　一瀉痢不止以黃連貝母二味煎湯下藥恐難苦杵藥羅入等分蒸餅丸如梧桐子大米飲下　一若患陽風痔疾入白茴末等分依前法丸服米飲下　一切鎗頭瘡以末傅之　一應久患風氣疾肺疾積冷病患忽患傷寒遽疾胸膈不利頭疼肚熱並宜依前法多服　一只如傷寒多被醫人誤下轉藥或發汗不依前後反却陰陽遂致患疾難起今後如有患纔覺中者傷寒便多取藥服令日喫一二百丸逐下若得瀉勿為怪直候瀉盡病自然復平屢曾如此醫人其驗無比　一此藥可療衆病更臨時看疾深淺加減丸數服食若皮膚

之疾可以鍼治藥恐難到　此藥至靈無比只為世人多妄傳云有毒畏忌不服到有疾難療在有所傷子親傳此法以此方救療的有依憑倘已病痊不須多服

金鏃散　療衆疾

白附子（泡取心半兩）木香（半兩）地龍（三分）肉豆蔻（半兩去皮）乾蝎（三十個）肉桂（取心半兩）黃連（取淨二兩）大黃（半兩生）梔樓（半兩）吳茱萸（半兩麩炒）芍藥（半兩）川芎（半兩淨）知母（半兩）白殭蠶（三分直者）白蘚皮（半兩）白芷（半兩）當歸（半兩）核棗（兩個一個煨熟）猪牙皂角（半兩生去皮）人參（半兩）巴豆（二兩去皮逐日換湯浸二七日又用溫漿水浸一月淘研末）

右二十味同杵羅為細末次入巴豆於乳鉢內同研令勻然後入磁器中密封於暖處候至一七日後每服一字湯使如後　卒中風半牆酒不頭旋菊花酒下　血淋大黃湯下　腰膝疼醋湯下　子死胎桂心水銀湯下二服取下　吐血竹茹湯下　腸風背陰繁柳草自然汁入熟酒又槲葉燒灰調酒下　寸白蟲先喫牛膝後以蕪荑湯下　霍亂吐瀉新汲水下　肺氣喘杏仁湯下　小兒一切疾米飲下　酒食毒漿湯下　婦人血氣煖酒下　冷血艾湯下　眼痛菊花湯下　疝氣茴香湯下　五淋木通湯下　瘧疾蒜酒湯下　久冷椒湯下　月脈不通熱酒下　赤帶荊豆湯下　白帶艾湯下　食噎橘皮湯下　產痛桃仁湯下　產後溫酒下　難產同　驚風蝎梢湯入小便少許下　痟等米飲下　赤白痢乾薑甘草湯下　白痢白木湯下　赤痢地榆湯下　中熱麻黃湯下　鬼箭桃符湯下　小兒蚵蜜湯下　漆瘡椒湯下　虎風足筋骨痛畫獅子燒灰調湯下　婦人淋葵菜湯下　赤眼甘草湯下　腰膝疼痺牛膝湯下　喫噎橘皮湯下　肺氣蛤蚧湯下　寒熱柳枝湯下　小兒誤吞錢風粉湯下　水疾苦葫蘆湯下　腸上食淡竹葉湯下　熱毒風山梔子湯下　腰宣薑棗湯調半錢　誤喫水銀粉泡不止煎黑鉛湯下　婦人血勞黃瘦柳桂心湯服後下黑血瘥鮮血不瘥五勞猪膽湯服七日後鼻中出鮮血瘥黑血不可治　小兒天靖風以蟬殼燒灰

入小便調下

神仙太一丹　治諸病皆醫藥所不及者

硃砂（一兩辰州者為上不用夾砂石者）紫石英（一兩）鐵引粉（一兩）雄黃（一兩）硫黃（半兩用西番者）銀箔（二十片）金箔（二十片）太陰元精（半兩）麝香（一兩別研）端午日南行猪糞（燒灰後研一兩）

右一十味先將難研者研細後於端午日長早更各細研了却一處同研令極勻候午時用三五家粽子尖（其粽子須用番麥作）面向南溲劑為丸如雞豆大凡遇大患時每丸可療兩人小可疾病每丸可分為三服

鉢上硫黃（一兩研令極）水銀

右先將未曾經使者銚子一個坐於文武火上令煖入水銀在內片時後入硫黃用柳木槌子研令銘勻後拈下銚子放冷取出細研却入前藥同研令勻和溲此藥本謂之龍虎太一丹蓋用此二味故也時多隱之此藥經久不壞其功益盛收時以金銀器或珀器內盛貯仍以硃砂同入合收之其湯使如後　凡草木蟲魚鳥獸菌蕈等毒並用溫酒和童子小便磨下　一切藥毒鬼毒如前下　金石毒炒雞鴨糞淋酒磨下　瘟疫用炒生薑湯下　狂走不識人者生薑蜜水磨下　麻豆瘡生薑蜜湯磨下　陰陽二毒傷寒三日後煨葱酒磨下　五般瘴氣犀角末調酒磨下　五般蠱毒炒烏雞糞一合并竈心土末三錢同用酒煎十數沸去滓磨藥五更初服腳不得著地於床上垂腳坐服之　鬼交狐魅丈夫心神迷惑婦人則情意狂亂或恢鬼孕用桃仁七個去皮尖細研酒調下　丈夫婦人鬼魅並用猪膽酒下　尸疰鬼疰麝香酒下　藥箭毒桑白皮酒下　中虎毒沙蝨毒磨犀角黃連酒下　蠱毒背磨犀角麝香酒下　蛇咬虎傷炒烏雞糞淋酒下　石水蛭末調酒下　心躁氣乘金銀煎酒下　心疼氣絕炒生薑鹽酒下　大便不通煨葱白酒下　小便不通煎通草湯下　腫毒人肚磨犀角酒下　脚氣衝心豆淋酒下　銅銀冷瘡煙入腹煨葱白酒下　婦人血刺血塊煎當歸酒下　丈夫婦人中急風炒烏雞糞淋酒下

（口不得用生半夏末搐牙龈塗兩牙間則口開便灌藥）心風用活地龍一條納于生葱管內同研令蠕少酒投之取涎者一盞下　頭風煎枸杞酒磨下　喉閉塞雷薄荷酒磨下細細嚥之　一百二十般風痛以鼠粘子酒下要除根本一丸分兩服空心臨臥各一服　如有人卒暴死牛馬糞汁磨下如未醒再用童便和酒下　驚怖死者麝香酒下　如魘魅欲死者新汲水調靈心土磨下更以吹鼻散納鼻中不得叫喚有燈即不得吹滅如無燈即不得點上　中熱死口鼻血流用牛黃酒下又以小便沃熱灰擁心上冷則易之　溺死者放水出後以新汲水和半夏末二丸安鼻內後以艾灰酒下　白縊死者緩緩解下不得割斷繩子酒和雞冠血并童子小便磨下男子雌雞冠血女子雄雞冠血下仍用雞冠血磨丹塗喉上次以四人將小竹筒子於兩耳鼻內齊吹如活後更服藥十日　凡一切惡疾至死者但心頭暖雖久可救下藥扶起令藥行即相次活矣一右須皆空心面東服之疾甚者不過再服若急疾有病且以溫酒和童子小便磨下服之然後依所患湯使服之或病勢深重須吐瀉者則服一丸　如吐瀉過多則以菉豆末一錢水調服之立止忌熱食白牛肉一切臭穢物　如孕婦不可服之

青金丹　治宗疾

巴豆二兩先去心麩皮用新瓦罐煮之乾更用硬黃紙裹伏時取出不用殼黃杏二三百枚所如前各半兩並生一半熟一半已上各半兩　木香　青橘皮去瓤　吳茱萸　附子一半生一半已上各半兩

右件同為細末入巴豆膏煉蜜三兩人青黛半兩研細和丸如菉豆大每服三五丸至十丸服餌如後　丈夫遠年氣疼醋湯下　丈夫背氣痛橘皮湯下　五般瘧疾艾湯下　咳嗽杏仁湯下　一切風冷柳枝湯下　痢疾烏梅湯下　婦人湯下　大便不通大麻子湯下　心痛胡椒湯下　血氣不通當歸湯下　赤白痢黃連湯下　赤眼梔子湯下　血汗葱湯下　中毒桔梗湯下　赤白帶芍藥湯下　霍亂木瓜湯下　水瀉不止米飲下　宣轉牛蒡湯下

霍砂丹　治聚疾

硃砂半兩　大附子一兩泡去皮臍　青橘皮去白瓤一兩　麵糊一兩泡　杏仁一兩去皮尖　巴豆春冬用一百個夏秋五十個以水五升慢火煮三十沸

右先將以巴豆水五升煮令油出水盡為度細研與聚藥米和勻以粳米飲和為丸如豌豆大其治療如右常服消酒食以酒下或溫湯下　氣痢生薑湯下　痔漏腸風胡麥湯下　大風痰梔子湯下　心痛熱酒下　疎利滯氣津液下　瘧疾醋湯下　肺病及一切勞疾桃柳枝各一握煎湯下　腰疼膝痛酒下　水瀉新汲水下　小兒驚風桃柳枝一握煎湯下　小便秘燈心湯下　暖卵風慈湯下　霍亂木瓜湯下　發汗麻黃湯下　臂腰口生薑湯下　懷胎氣衝心酒下　一切風防風湯下　陰毒傷寒熱酒下　止瀉黃連湯下　蛇蟲咬傷冷水下　宿食不消白湯下　頭痛不止白湯下　痺氣膨脹茶下　疙瘩丁香湯下　五勞七傷楮實湯下　口瘡崇湯下　脚氣上衝胸熱湯下　心痛打損酒下　傷食各隨原色湯下　敗血不散米飲下　雞產黃葉湯下　小便溢大黃湯下　肺氣咳嗽杏仁湯下　眼昏黑花黑豆湯下　牙疼茱萸湯下　小兒肚脹石榴湯下　乍寒乍熱桃心湯下　懷胎不安芎藭湯下　口吐酸水訶子湯下　產前瀉痢艾湯下　小兒五疳乳汁下　脇腹疼痛芍藥湯下

大人服五丸小兒攻愈人相度虛實加減丸數服之

修製藥法

予今遊集名方以防疾苦然博文之士不在其陳行路之間亦應遺忘今畧書其修合節度列之如右

凡藥有酸鹹甘辛苦之五味寒熱溫涼四氣有毒無毒陰乾暴乾收採各順歲時新陳別其黃假凡將修合並須精細

凡藥有分劑觔兩輕重多少不可妄有增減若用得其宜與病相會入口必愈

凡藥有宜丸者宜服散者宜水煮者宜酒漬者亦有不可入湯酒不可犯火氣並如本法不可改易

凡搗羅藥竟恐有鐵屑以好磁石攪協取之

凡病在胸膈以上者先食後服藥病在心腹以下者先服藥後食在四肢血脈者宜空心服在骨髓者宜飽滿臨臥並依本法次第服之

凡藥須要酒服者以助其勢飲服者直攻其疾有冷有熱有疎有數並有本方不可妄服

凡藥須去苗去核有燥有濕將欲杵合再秤取合足分兩或差爲病必誤

凡篩散藥竟即須再羅貴其勻細

凡和合丸藥成團必須再杵千百下視其色和同亦須易爲丸撚

凡云蜜劑取藥末分兩算乃蒸煉其蜜合和滋潤全勝火熬法用生蜜自如本方

凡蒸藥常用微火煎令小沸用水多少煎及分數並依本方

凡修合本方自有修製切在依藥不可更變

凡藥有三品稟性不同攻病既除不必盡劑

凡服藥有先有後有早有晏蓋相須而相使或相反而相制但從本方不宜更易

博濟方卷五終

四庫提要補正

胡玉縉撰

博濟方五卷

其仕履未詳惟卷首序稱其曾官殿中而已

陳氏振孫宣和書目云其所事中官中書令後官觀定命官四等爲祁元輩

五年爲大理寺少卿見李燾續通鑑一百六十三百廿六序稱卻迺作則者

當神宗時人集醫者婦人良方之書自明乃南宋淳熙中人卷四大觀珀

丸下引自明皆見良方必非錢原本所有蓋皆後人竄羼矣

史載之方

史堪撰

史載之傳

史堪、字載之、蜀人。（書錄解題）治病用藥、初不求異、炮炙製度、自依本法、審證精切、不過三四服、立瘥。（校之方敘）眉州人彭師古、年三十時、得異疾、不能食、聞薑腥氣輒嘔、惟用一鐺旋煮湯、沃淡飯數匙食之、食已、鼻中必滴血一點、懶懶疲削、醫莫能愈、乃趨郡謁堪、堪曰、君之疾在素問經中、其名曰食掛、凡人肺六葉舒張如蓋、下覆於脾、則子母氣和、飲食甘美、一或有戾、則肺不能舒、脾爲之蔽、故不嚌食、茶問曰、肺葉焦熱、名曰食掛、蓋食不下脾、擁而成疾耳、遂製藥服之、三日、覺肉香、啖之、無所苦、自此啖食、宿恙頓除。（宋稗類鈔）蔡元長苦大腸祕、醫不能通、堪診脈已、曰、請求二十錢、元長曰、何爲、曰、欲市紫苑耳、末紫苑以進、須臾遂通、元門大驚、問其說、曰、大腸、肺之傳送、今之祕、無他、以肺氣濁耳、紫苑清肺氣、此所以通也。（北窗瑣錄）著有指南方二卷、凡分三十二門、門各有論。（解題）

陸氏曰、史堪、里貫無考、據書錄解題、知爲蜀人而已、蜀有史崧、見蜀中廣記、亦以醫名、其卽堪之一家歟、余旣刻其書、因撫諸書而爲之傳。

史載之方卷上

宋 史堪撰

四時正脈

春

春脈弦、其氣來柔軟弱虛而滑、端直以長、名之曰弦、反此者病、其氣來實而強、名爲太過、病在外、其氣來不實而微、此爲不及、病在中、太過則令人善忘、忽忽冒眩、巔疾、不及則令人胸痛引背下、兩脅胠滿。

夏

夏脈鈎、其氣來盛去衰、反此者病、其氣來盛去亦盛、此爲太過、病在外、其氣來不盛、去反盛、此爲不及、病在中、太過則令人身熱而膚痛、爲浸濕、不及則令人煩心、上見欬唾、下爲氣泄。

秋

秋脈浮、其氣來輕虛以浮、其氣來急去散、故曰浮、反此者病、帝曰、何如反、其氣來毛而中央堅、而兩旁虛、此謂太過、病在外、其氣來毛而微、此謂不及、病在中、太過則令人逆氣而背痛、愠愠然、不及則令人喘呼、吸少氣而欬、上氣見血、下聞病音。

冬

多脈奮，其氣來沉而搏，故曰營反此者病，其氣來如彈石者，此謂太過，病在外，其去如數者，此謂不及，病在中，太過則令人解㑊，脊脈痛而少氣，不欲言，其不及則令人心懸，如病飢，胷中滿，脊中痛，少腹滿，小便變。

中

脾無善脈，止見惡脈，蓋脾脈以和緩爲主，故四時之脈雖不同，春脈弦，夏脈鈎，秋脈毛，冬脈營，皆要有脾脈，若脾脈不見，便是五藏真脈見，真脈見者死，所以脾無善脈者，謂其常脈便是吉脈，其太過不及，皆爲病脈，太過則令人四肢不舉，其來如水之流者，太過也，濕勝則然耳，不及則令人九竅不通，名曰重強，其來如鳥之啄者，不及也，土不用事則然耳，濕勝而其脈如流，邪乃傷腎，土不用事而九竅不利，因受木所制，木制則脾受水矣，九竅不利，故多生浮腫脹滿之疾，久而成水。

真脈

真肝脈至，中外急如循刀刃，責責然，如按琴瑟絃，色青白不澤，毛折，乃死，真心脈至，堅而搏，如循薏苡，累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死，真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人，膚色白亦不澤，毛折，乃死，真腎脈至，搏而絕，如以指彈石，辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死，真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。

厥陰所勝生病

運氣所勝

殮泄食減，體重煩冤，腸鳴，腹支滿，甚則忽忽善怒，眩冒巔疾，脇痛而吐甚，衝陽絕者，不治。

司天所勝

體重，肌肉萎，食減口爽，目轉耳鳴，胃脘當心而痛，飲食不下，舌本強，食則嘔，殮泄，腹脹，溏泄，瘕水閉。

在泉所勝

酒淅寒如瘧，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，膈咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得帿與氣，則快然如衰，身體皆重。

少陰所勝生病

運勝

瘧，少氣欬喘，血溢，泄注下，嗌燥，耳聾，中熱，肩背熱。

天勝

喘嘔，寒熱，嚏鼽衄，鼻窒，甚則瘖瘖，脇痛，善太息，胸中煩熱，嗌乾，右胠滿，皮膚痛，寒熱，欬喘，唾血，鼽衄，溺色變，於瘖，附腫，肩背臂臑及缺盆痛。

地勝

腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱，皮膚痛，齒痛，頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛，腹大。

太陰所勝生病

運勝

腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤，肌肉萎，足萎不收，行善瘈，脚下痛，飲發中滿，食減，四支不舉，腹滿，溏泄，腹鳴反下，甚而大路絕者，不治。

天勝

胸中不利，陰萎，氣大衰而不起，不用，當其時，反腰髀痛，動轉不便，心下否滿，少腹痛，時害於食，附腫，骨痛，陰痿，陰痿者，按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸，飲積，心痛，耳聾，渾渾焞焞，嗌腫，喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，膕如結，腨如別。

地勝

陽明所勝生病

運勝

兩脅下少腹痛，目眥痛，皆瘍，耳無所聞，體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿，且痛引少腹，甚則喘逆氣咳，肩背痛，尻陰股膝髀踹踝足皆病。

天勝

脇痛，目赤，掉振鼓慄，筋痿，不能久立，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，左胠脇痛，寒清于中，感而瘧欬，腹中鳴，注泄，溏溏，心脇痛，不可反側，嗌乾，面塵，腰痛，丈夫顏痛，婦人少腹痛，口味，皆瘍，痔瘧，瘧。

地勝

骨病喜嘔，嘔有苦，太息，心脇痛，不能反側，甚則嗌乾，面塵，身無膏澤，足外反熱。

太陽所勝生病

運勝

身熱頭，心躁悸，陰厥，上下中寒，虛妄，心痛，甚則腹大，脛腫，喘欬，寢汗出，憎風。

天勝

心熱頭，嗌乾，善飢，嚏，喜悲，數欠，熱氣妄行，善忘，甚則心痛，嘔血，血泄，鼽衄，善悲，□□時眩仆，腹滿，手熱，肘攣，掖腫，心澄澄大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫，嗌乾，甚則色焰，渴而飲。

地勝

少腹控睾，引腰脊，上衝心痛，血見，嗌痛，頷腫。

少陽所勝生病

天勝

欬嚏鼽衄，鼻窒，瘙，寒熱，附腫，心痛，胃脘痛，厥逆，鬲不通，熱上，皮膚痛，色變黃赤，傳而爲水，身面附腫，腹滿。

仰息泄注赤白瘡瘍唾血煩心胸中熱甚則鼽衄

地勝

注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便少陰同候

六氣復而生病

厥陰之復

少腹堅滿裏急暴痛心痛汗發嘔吐飲食不入而復出筋骨掉眩溏厥甚則入脾食瘧而吐

少陰之復

燠熱內作煩躁鼽衄少腹絞痛火見燔燎嗌燥分注時止氣動於左上行於右欬皮膚痛暴瘖心痛鬱冒不知人迺酒浙惡寒振慄譫妄寒已而熱渴而欲飲少氣骨痿腸胃不便外爲浮腫噦噫瘡瘍癰疽甚則入肺欬而鼻淵

太陰之復

體重中滿食飲不化陰氣上厥胸中不便飲發於中欬嗌有聲頭頂痛重而掉瞀尤嘔而密默唾吐清液甚則入腎竅泄無度

少陽之復

驚駭欬衄心熱煩躁便數情風厥氣上行面如浮埃目而瞤瞤火氣內發上爲口瘡嘔逆血溢血泄發而爲瘡惡寒鼓慄寒極反熱嗌絡焦槁渴引水漿色變黃赤少氣脈萎化而爲水傳爲浮腫甚則入肺欬而血泄

陽明之復

病生脇脇氣歸於左善太息甚則心痛否滿腹脹而泄唾苦欬嚏煩心病在胸中頭痛甚則入肝慈駭筋攣

太陽之復

心胃生寒胸中不利心痛痞滿頭痛善恐時眩仆食減腰脽反痛屈伸不便少腹控睪引腰脊上衝心唾出清水及爲噦噫甚則入心善忘善悲

論六氣所生之病

五行之爲病一也而所生之氣不同如木之所至爲風化而病之生不獨止於肝火之所至爲熱化而病之生不獨止於心此司天司地統歲紀運之不同故爲病亦從而各異又有乘年之虛過月之空失時之和或勝而所勝受刑或復而制於所勝且以經言之天火下臨則肺氣上從則白起金用而草乃眚燥氣下臨則肝氣上從則蒼起木用而土乃眚以常所勝而論之則火至而肺病金至而肝病今也天火下臨則金以從天之氣而白迺用故病反生於肝天金下臨則木從天之氣而蒼迺用故病反生於脾類舉而推則厥陰司天脾氣上從而水斯眚太陽司天心氣上從而金斯眚少陰司天肺氣上從而肝斯眚太陰

司天則腎氣上從而火斯眚皆可知矣此天度之尊獨異於他經盲天能制色以其能制勝己而使不爲害至於司地則氣化之正各隨其體耳若夫紀運之歲之不同則又視其司天之氣化如六甲之歲陽土當運有陰疑流衍之布宜與六己之歲不同也然己巳己亥與六甲之歲同六庚多肝病而庚寅庚申之歲金不能制肝六戊多肺病而戊辰戊戌之歲火不能害肺氣化所至譬如權衡可即其氣以求其病惟勝復之候不同難以前期亦隨其氣之多寡以求其證勝之爲病輕復之爲病重勝則所不勝者順受其克復如報怨仇焉此又不可不知也今以木之受病本於肺金之所制則不過如肺氣有餘凌犯於肝生眼昏背癢耳無所聞胸痛體重之病耳若迺木化之盛肝氣妄行大傷於脾則金必相救邪反傷肝能使人體重煩冤胸痛引背兩脅滿宜痛引少腹故經言上應太白星者謂金之復也雖然人之氣猶之天地之氣五藏之氣即五運之氣三陰之氣即六氣之變顧一身之氣多寡之如何亦不必因天地之氣化所生己亥之歲人多肝病而有病肺者子午之歲人多心病而有病腎者此一人之身自有天地之氣化調治之法與五運六氣所至之法同至於病一也而所生之病所受之本所以至病之由不一者或以本藏有餘而成或以本藏不足而成或經絡所過之處同而成經之所載二火所生之病雖輕重不同而其實則一太陽太陰水土共胞寒濕同化所生之病亦類目會衆筋而病變多端心統五藏而病生奇怪清濁異源各有其機表裏殊狀各有其應今詳舉之以明治病之缺

大府泄

肝熱刑脾而泄即經言飧泄餘證當腸鳴腹支滿口膠渴小府赤宜涼其肝輕金其胃診其脈六脈輕弦胃上得肝脈不至大弦然六脈雖弦亦不必有骨力以泄則氣虛不實故也宜用荊芥散

荊芥穗 壹分　防風　芍藥　訶子皮
羌活　甘草 各壹分　白蒺藜 半兩　厚朴 十錢去皮
木香 三錢

右爲細末非時以水壹盞棗壹个同煎三錢匕和滓服

脾濕而泄經言腹滿溏泄餘證腹痛體重食減甚則足痿行善挈脚下痛宜用制苁豆蔻散

草豆蔻　制苁　訶子皮 各壹兩　大腎
陳橘皮 各半兩　甘草　薑本 各八錢　獨活
藿香 各壹分

右爲細末空心水壹盞棗兩片乘兩个同煎三錢取八分和滓服

腎水之寒亦生溏泄以寒濕同化所生之病一耳經又言寒迫下焦傳爲濕泄陰氣入腎竅泄無度病泄皆屬於水土之所生其證體重食減腹痛四支不舉甚則注而赤白腰膝酸痛股膝不便若脾氣之濕則六脈浮濁如革濕散而大如按泥漿加之腎寒則又沉伏遲弱動而無力宜併治其水暖其脾腎暖脾藥宜以制苁豆蔻散暖腎藏方、草解勝金丸

萆薢　訶子各壹兩　石斛　續斷
芎　附子　巴戟去心　宣桂
藁本各半兩　蓬莪茂　山茱萸　細辛
當歸　獨活各壹分

右爲末，煉蜜丸如梧桐大，空心米湯下五七十丸。

又方，宜服船上硫黃丸，方見痢門。

肺金之勝，亦生腹鳴溏泄，肺主清肅之氣，流入于中，變成寒中鶩溏，又肺主少腹，故生斯病。餘證少腹痛，中滿胠脇痛，其脈六脈毛而微，不浮，毛爲肺脈，微則泄而氣弱，初泄則本肺脈一指偏，一二日則變而微，但不浮耳，尺澤沉而小緊，宜溫其肺，四味芍藥散。

吳白朮　芍藥　桔梗　香白芷

右等分爲末，非時，水壹盞，生薑三片，同煎三錢匕，入棗二个，取八分服。

大府祕

肝心氣實，風血相搏，大府結澁，口苦舌燥，甚則口乾膠，小府赤，頭痛眼昏，六脈洪大而實，宜用柴胡湯。

柴胡　前胡　防風　杏仁去皮尖
羌活　伏苓　甘草　芍藥各一分

右爲麤散，食後并非時，水一盞，葱白一根，同煎三四錢匕，取八分，去滓服。

麥門冬去心，一分。　乾地黃八銖　半夏二銖

肺氣上實，其氣上蒸，不能傳送，大府祕熱，其脈浮而疾，尺澤脈短，寸口脈大，宜用柴胡湯，加紫菀、麻黃各一分，良。

寒濕之勝，大府反祕，經言陰氣不用，便堅，以土不用事，脾胃不動，無傳送耳，其證具水土之證，脈亦如之，宜用大腹皮散。

陳橘皮壹兩　青橘皮　大芎　五味子
芍藥　香白芷　甘草各一分　大腹皮
草豆蔻各半兩　木香　檳榔各四銖

右爲細末，每服三錢匕，非時，水一盞，煎八分，和滓服。

元氣虛弱，腎水空虛，胃無津液，大府澁遲，六脈微而虛，宜用薤粥。

肉蓯蓉一分，米一掬，先洗薤令淨，切令極細，同米，用水兩碗已上，煮作稀粥，既熟，入少許葱，并薄入鹽醬調和，空心投三四盞。

小府祕

小府之祕，其狀難識，有淋、有癃、有澁，或疼、不疼，肝心之氣，盛實而熱，小腸氣虛，熱氣流入膀胱，遂成小府

赤澁之病，其脈數而輕弦，尺澤弦而長，又微緊，或心脈長，皆主此病，宜用此方。

伏苓半兩　麥門冬去心　芍藥　前胡
杏仁去皮尖　桔梗　防風各一分　荊芥三銖
甘草炙　木通各四銖

右爲細末，食後，以水壹盞，葱白一支，同煎三錢匕，和滓服。

又方，宜服此五苓散。

肝經之熱，小府赤澁，六脈弦急而長，又發寒慄，宜用蔓荊湯方。

蔓荊子　羌活　獨活　麻黃
荊芥穗　芍藥　木通　甘草

右等分，前法煎，食後服。

濕氣寒氣之勝，同犯於心，心氣上行，不得小便，小府不快，宜服削瓜草豆蔻散，又服此大芎湯。

大芎壹兩　蓬莪茂半兩　木香四錢　伏苓半兩
甘草　乾薑各壹分

右爲細末，空心，水壹盞，入鹽少許，同煎三錢匕，和滓服。

元氣虛弱，腎氣不足，膀胱氣虛，衝任脈虛，丈夫癃痼，婦人艱閉，宜服此方，其脈，六脈皆動，細數而輕弦，腎脈小緊而沉，膀胱澁而短。

五味子壹兩　血竭　萆薢　牛膝
芍各半兩　乾熟地黃壹兩　蓬莪茂　青鹽各壹分

右青鹽壹味，自爲細末，餘七味爲細末，蒸餅，丸如梧桐子大，空心，清湯下五七十丸。

身熱

寒邪所傷，身能發熱，寒氣外固，陽氣內拒，蓋寒氣能固氣出如火，此當發其寒，六脈浮而輕疾，散滿指下。

麻黃去根節　側瓜各半兩　藁本　芎
宣桂　芍藥　獨活　甘草壹分已上各
細辛四銖

右爲麤散，空心，并非時，水一盞，生薑一片，煎三錢，去滓服。

心火獨盛，少陰、少陽之勝，身熱，小府赤，大府祕，頭痛，口乾，舌燥，骨疼，六脈洪大而實，有骨力，又數，宜用此方。

伏苓　麥門冬去心　芍藥　麻黃
前胡　柴胡　甘草　羌活

桔梗各等分　牡丹皮四錢

右如前法，爲散。

肝氣之熱，身亦發熱，其狀與心火之勝同，以風熱同化，木火相助，其候同也。然肝之發熱，所以不同者，蓋熱而往往自則其寒多覆背上脊裸酒酒振寒，并兩足多冷，膠涎，甚則嘔逆而吐，六脈絃急而長，其他與心火勝之亦同，然心火之勝，脈必洪，而肝熱卻洪大而絃，然亦有上於絃而不洪大者，以風氣之獨勝耳，宜用此方。

荊芥穗　羌活　獨活　芍藥
防風　麻黃去節　連翹子　秦艽
蔥荊子　乾薑苛　甘草等分

右爲散，食後，水一盞，煎三錢，取八分，去滓和滓任意，又看其人氣實，肝臟熱多，至於生涎，則加天南星、半夏、白礬、蠟、乾蠟、各少許，天南星、白礬、蠟、可與桑柴等，半夏、蠟隨意加減，不必多涎結而大府祕，則以牽牛和上件藥服，以疎爲度。

身寒

經言，陰盛生寒，陽盛生熱，元氣虛乏，腎水極寒，發爲寒戰，冷汗自出，六脈微細而沉，寒邪犯心，則腎脈必擊而沉，心下大動不安，甚則仆倒，宜先暖其腎，後保其心，暖腎驗方。

牛膝酒浸一宿　石斛　巴戟去心　草蓯蓉水煮
苓各半兩　續斷　伏苓　附子炮
當歸　細辛　五味子　菟絲子各一分，酒浸兩宿

右爲末，煉蜜爲丸如梧子大，空心米湯下七十丸。

濕氣之勝，汗出惡風，肌體多冷，長風食減，倦怠無力，六脈濡濇而緩弱，大而散，面目無光，宜服前暖腎丸，并服此方。

白朮　陳橘皮　芎藭　細辛
藁本　獨活　甘草炙　藿香
官桂各一分　草豆蔻　人參半兩　乾薑四錢

右爲末，煉蜜和丸如梧子大，空心米湯下五十丸。

頭痛

頭痛之狀，最爲難辨，大風入骨而痛，大熱入骨而痛，痰伏於胸中而痛，元氣虛微而痛，心火之勝頭痛，六脈之應，皆屬於肝，卽用涼肝藥，氣熱而生涎，亦能令人頭痛，卽用前取涎藥，腎水之勝，陰犯於心，經言心氣上行，痛留眉頭間，甚則延及胸，頭痛，腦戶間痛，宜服其腎，獨寒濕之氣初作，未至犯心，寒邪所客，多襲於陰，上貫風池，熱府，令人頭目不利，腦後兩大筋迸

急，眉目昏眩，此爲寒邪未入五藏，六腑皆初傷寒之脈，浮散而數，宜用前發汗藥。

腹痛

人有病腹痛者，其狀多端，經之所言亦多變，濕邪之勝，腹滿而痛，食減體重，四肢不舉，腹鳴腸濇，宜用此方，神和散。

草豆蔻　肉豆蔻　陳橘皮　白朮各半兩
厚朴去粗皮　丁香　木香　大芎
蓬莪茂各一分　吳茱萸三錢　訶梨勒三錢　芍藥十錢

右爲細末，每服叁錢，空心，水壹盞，姜兩个，同煎八分，和滓服。

寒冷食物所傷，厥入胃，腹中撮痛，卽與前寒濕勝痛之脈不同，若寒濕之氣勝而腹痛，六脈皆微細而沉，時時小緩，經謂所謂陽絃頭痛，陰微腹痛是也，至於爲冷寒之物所傷，則六脈又緊而微，緊應腹有形，此爲物所傷者，脈必有形，而爲濕氣所傷者，脈止於微而已，宜用神和散，加大腹皮半兩主之，覺冷物未化，卽加青橘皮少許，每服入半夏少許主之，清厥入胃，兩脇下痛，及小腹痛，此肺之清肅之氣所成，六脈當急而微絃，肺脈獨大而實，左尺微小急，蓋清肅之氣流入於中，寒聚而小腹有形，經言，連小腹而作寒，甚則爲婦人癥瘕，丈夫疝瘕之類，肺以毛爲主，若浮，則爲熱，沉大爲冷，至於寒之所聚，則大者飲而爲小急，又甚則緊，緊爲痛，應腹有形，亦各從其類也，宜暖行肺氣以散之。

陳橘皮　蓬莪茂　紫菀
京三稜　當歸　延胡索
桔梗　甘草炙　木香各一分

芎藭
官桂
大腹皮

芍藥各四錢　白朮半兩

右爲細末，服時，水壹盞，生薑二片，同煎三錢七，取八分，和滓服。

至於肺氣之勝，已傷於肝，則又能體重煩冤，胸痛，引背而痛，宜服前方，又服此暖行肝氣方，人參散。

人參半兩　當歸　桑寄生　白蒺藜
蓬莪茂　芎　獨活　京三稜
甘草各一分，炙　藿香四錢　五味子半兩　木香四錢

右爲細末，每服三錢，服時，水一盞，薑二个，同煎八分服。

人有病，胃脘當心而痛，食已而痛，又甚，連腹中而急，六脈絃緊而長，宜用肝藥，人有病，兩脇下非時氣痛不安，如生積聚，一腹中鼓動，搖悶不安，甚則生氣塊，上衝咽喉，頭目俱逆，口舌膠粘，小便赤黃，衝心而痛，夜臥不安，此爲肝涎與血相聚，致生此疾，其脈當洪大沉實，而有骨力，以肝脈之熱，生風而痛，則脈絃而長，今反洪大沉實者，此爲涎伏之也，宜用荊芥散。

荊芥穗　連翹　羌活　牡丹皮

貫芎　杏仁　當歸　芍藥
山梔子　大黃醋煮　蔓荊子各一分

右每服三錢，食後，水一盞，生薑一片，半夏末少許，同煎，取三四沸，和滓服。大府不甚祕，減大黃，若大府脇甚，自作大黃末，每服酌量加減進服。其大黃一味，自修製，臨時末。

寒間舉痛論云：寒氣客於脈外，則脈寒，脈寒則縮踡，縮踡則脈絀，急則外行小路，故卒然而痛，得熱則痛止。其脈正與寒濕之氣脈同，宜神和散。

舉痛論云：寒氣客於經脈之中，與炅氣相薄，則脈滿，脈充大而血氣亂，故痛甚，不可按，其脈散滿指下，充大而至數不多，却不甚有骨力，宜去其寒，而行其血氣。

當歸　大黃　蓬莪茂　伏苓
大腹皮　陳橘皮　青橘皮　延胡索
官桂各一分　木香四錢　芍藥十錢

右爲細末，每服三錢，非時，水一盞，煎八分服。

舉痛論云：寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引，故痛，按之則血氣散，痛，其脈亦差大，差緩而沉，宜用前藥，青橘皮者。

舉痛論云：寒客於夾脊之脈，則按之不能及，故按之無及，夾脊乃脊脈之所行，其脈當尺澤沉而緩，宜行其腎經以去其寒。

烏藥壹分　芎　當歸
蓬莪茂　延胡索各一分　木香　京三稜
甘草炙三錢　縮甲各四錢

右爲細末，空心，水一盞，煎三錢服。

舉痛論云：寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，客寒所犯，則脈不通，脈因之則氣不通，故喘助應手，其脈當實大有形，不勻輕滑而又緊，來疾去遲，如有物制之，宜通其脈，行其氣。

桔梗中兩　大腹皮　芍藥　木香
當歸　陳橘皮　枇杷葉去毛　半夏自塩末，每服入兩豆許
荒花舊藏於土鍋內煮過，炒令烟出無黑，已上各壹分

右爲細末，每服三錢，生薑三片，同煎八分服，以大腑通疏爲度，宜服神和散之餘，如此夕喘，宜調理其肺。

舉痛論云：寒氣客於背俞之脈，則脈澁，脈澁則血虛，血虛則痛，背俞主於心，故相引而痛，按之則熱至，熱氣至則痛遠止，脈澁以血虛而不行，其脈六脈細數而肝心尤微，心脈如帶，芤重按即缺，往往身有汗，宜足其血，以保其心。

人參壹兩　當歸半兩　木香
烏藥　官桂　甘草
防風各一分　沉香三錢　陳橘皮十錢
關右語　延胡索
茯苓

舉痛論云：寒氣客於厥陰之脈者，絡陰器，繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，引脅與小腹痛矣，其脈皆輕帶弦，肝脈迎腎脈，弦長而緊，甚則透過尺澤而弦，宜用此方。

白茯苓半兩，炒去尖　蔓荊子壹分　芍藥　獨活
蓬莪茂　甘草各一分　麻黃十錢，去節

右爲細末，每服三錢，空心，水一盞，煎兩箇，同煎八分服。

舉痛論云：寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故卒然成積，其脈沉大而實，膀胱動而有聲，宜通其小腸。

血茸　大芎　蓬莪茂各半兩　萆薢
木香　當歸　茯苓各半兩　青鹽三錢

右爲細末，蜜丸如梧子大，空心，清湯下五七十丸。

舉痛論云：寒氣客於五臟，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣來入，故卒然不知人事，氣復反則生矣，其脈伏而大，極無骨力，三部皆芤，身有冷汗，宜炙氣海，後用藥。舉痛論云：寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔，其脈細而滑，宜用神和散，加茯苓、人參各半兩。

服滿
人有病，腹脹滿，善噫，兩脇滿，咽膈不通，此肝勝也，其脈弦而長，宜涼其肝。人有病，腹大，小腹中痛，惡寒發熱如瘧，小腑赤，其脈洪大，此心熱也，宜涼其心。人有病，小腹痛，睡不得小便，頭痛，目似脫，頂似拔，腰似折，此土濕之勝，宜暖其脾。其脈當濇而動，人有病，右胠胁滿，腑脹，心痛，肺脹，腹大滿，膨脹而喘嗽，此氣爲火所勝，其脈兩手寸口洪大，肺上亦洪，骨力小如心脈，此爲心肺相持，宜解其金火之熱，以平其心肺。

黃耆半兩　麥門冬去心　茯苓　紫菀
麻黃去節　防風各壹分　羌活　甘草炙四錢
杏仁十四箇，去尖

右爲焙散，非時，水一盞，薑一片，棗一箇，同煎三錢，去滓服。

人有病，身腑腫，腹滿，仰息，泄注赤白，欬血，此少陽之勝，與火勝同候，其脈亦然，以前方主之。

嗌
世人論凡嗌者，皆以爲肺，然有服肺藥而不愈者，遂以肺不受藥爲難治，何以言之，繆也，又或以肺熱而

喘，誤投涼藥，此又近似之言，止可以知肺喘，而未足以明五臟之喘，且以經言之，所言踏蹉喘嘔，皆屬於上，未嘗以喘屬於肺，至於言五臟之多寡，六氣之勝復，則喘之所生，可指其狀而明，藥之所投，亦可以隨其證而效。

今人有病，胸中煩熱，嗌乾，右胠滿，欬喘唾血，肺脹，腹大膨膨而喘者，此火之刑金，肺傷而喘也，宜用此方。

麥門冬（去心，半兩）　桔梗　麻黃（去節）　紫菀
杏仁（去皮尖）　柴胡　前胡　甘草（炙）
貝母（已上各一分，去心）　光活（三銖）　黃耆（十銖）

右為麤散，每服三錢，水一盞，生薑三片，煎至七分，去滓，溫服。人有病，左脇痛，寒滯于中，欬而喘，此為肺之滯氣所成，宜用此藥。六脉毛而微，寸脉伏而小，比之火之盛刑金，則異矣。蓋火盛刑金而喘，則六脉純得火脉，疾大而有力，若寸口偏大而關脉帶芤，即須唾血。人有病，腹大脛腫，喘欬，寢汗出，惙風，胸中滿，食不消化，食減體重，六脉沉重而濇，渾渾革至，如物刺之，此為腎寒大過，宜暖其腎。

續斷　牛膝　細辛　五味子
巴戟　附子　當歸　菟絲子
細骨脂（各一分）　大芎　草薢（各半兩）　木香（三銖）

右煉蜜丸如梧子大，空心，鹽米湯五七十丸，以神和散並進。人有病，肝臟風盜，積涎所聚，伏隔間，口乾而膠，食即惡心，全惡肉味，心躁不安，夜臥不得眠，咽喉隔塞，如物抵築，多喘，診其脉，六脉皆大而沉伏，重手取之，隱隱然骨間，乃得，再再尋來，疾去遲，宜用治涎藥。

荆芥穗　天南星　防風　羌活
白蒺藜　連翹　獨活　麻黃
乾荷葉　乾蠍　天麻（炮）　半夏

右等分，修治為細末，每服三錢，入半夏末一兩豆許，水一盞，生薑三片，煎七分，和滓，飯後服。有人得此涎候，却緣久病而虛，又誤服熱藥，或元氣本虛，六脉大而無骨力，却浮洪而數，重手按之，則浮指而虛，有表無裏，却不宜用前方，此病難治，當用此方。

人參（半兩）　天南星（炮）　防風　獨活
麻黃　天麻（炮）　琵琶葉（去毛）　半夏
羌活（已上各一分）　白蒺藜（去刺）　薏苡仁（各十銖）

右除半夏一味自為末，餘為細末，非時，水一盞，薑三片，煎至七分，又宜時時以補藥助其元氣，而徐以此壞涎藥挑之。

人有病，久患欬嗽，虛羸氣乏，胸中氣微，不能報息，六脉虛微而數，此之一候，並帶勞疾證，即為難治，若脉止虛微不浮而數，寸尺調勻，即藥到便安，若浮數而虛，亦勞也，若浮大疾數而虛，輕手取之，全無骨力，重手按之，全不應指，此不治之證，肺萎當用此方。

人參（半兩）　五味子　茯苓（各半兩）　鱉甲（醋炙）
山藥　麥門冬（去心）　甘草　枇杷葉（去毛，各一分）
黃耆　紫菀（各十銖）　半夏　阿膠（炙透，各四銖）

右為麤散，生薑三片，每服入半夏一兩豆許，飯前服，或非時服之，又宜服補腎氣藥，以歸其元氣，每服三錢，水一盞，煎至七分。

脚痛

脚氣之病，蓋由有寒濕之勝，故經於太陰之勝，言足脛腫，於太陽之勝，言至引陰股，筋肉拘苛，又言歲土太過，甚則肌肉萎，足痿不收，行善瘈，脚下痛，飲發中滿，四支不舉，此寒濕之氣所成也，然天下之病，固有似是而非，本異而標同，用藥過差，則利害相反，若脚氣之病，本於寒濕之勝，而至於肺熱，而病生於足，胃熱而風生於足，與脚氣相似，而寒熱殊狀，試別而明之，熱而足痛者，以肺經之所行也，故經言，歲金太過，則股髀踹踝足胥病焉，胃熱而足病者，抑以宗筋不行，而傳為痿厥也。

今有人病足痛，得水土寒濕之狀，六脉沉伏而勁，上濇下虛，尺澤微而濇，宜暖其下，用此方。

牛膝（半兩）　黃耆（半兩）　獨活　當歸
石斛　附子　草薢　五加皮（各一分）
天麻（炮）　大芎　續斷（各十銖）　細辛
木香（各三銖）　官桂（四銖）　芍藥（壹分）

右為末，薏苡粉煮作稀糊，丸如梧子大，空心服五七十丸，溫酒或鹽湯下。

肺乘熱而足病，則左手一手脉全微而細，左尺又小，搏擊而沉，右手脉偏有骨力，洪大，而肺脉尤甚，再尋虛弦而長，用修崔氏紫蘇方服之，蓋世人多以崔氏方治脚氣而得效，不知此方止可治肺熱脚痛耳。

紫蘇子　芍藥　官桂　茵芋
茯苓　大腹皮　桔梗　甘草（炙，各一分）
羌活（三銖）　麻黃（去節，一兩）　黃耆（半兩）

右為麤散，生薑一片，煎三錢，以為飲服。

胃熱而宗筋不潤，則脚弱無力，兩足酸軟，或帶微腫，診其脉，胃脉一指絃而長，又微帶疾，六脉差大，宜用此方。

大腹皮（半兩）　茵芋（八銖）　杏仁（去尖）　伏苓
芍藥　當歸　陳橘皮　甘草（炙）
薏苡仁（各一分）　青橘皮（四銖）　芎（十銖）

右爲麤散、非時、蜜煎、仍以前暖腎藥、壯元氣藥、相兼而進、若服此藥、大府微利、即住此、却進補藥兩三日、待定帖、仍進此藥。

脈要精微解

經曰、春日浮、如魚之游在波、夏日在膚、泛泛乎萬物有餘、秋日下膚、蟄蟲將去、冬日在骨、蟄蟲周密、君子居室、故曰、知內者按而紀之、知外者終而始之、此六者、持脈之大法、以經意考之、以四時之脈、分表裏之淺深而決之、以內外之辨、且以春日浮如魚之游在波、則陽氣之萌、脈雖見而未出於膚、夏日在膚、泛泛乎萬物有餘、則脈已在膚矣、秋日下膚、蟄蟲將去、則秋陰氣之至、脈雖下膚、而未至於沉、冬日在骨、蟄蟲周密、則脈已沉矣、以是知內者按而紀之、以明脈之在裏也、如秋日之下膚、冬日之在骨是也、知外者終而始之、以明脈之在表也、如春日之浮、夏日之泛是也、然知內者必曰按而紀之者、蓋脈之在內、非深按之、無以得其實、知外必曰終而始之、則初按而病已見矣、故因其病、以推原其本、啟玄子乃以知內爲知脈、知外爲知色、殊非黃帝所謂持脈之大法也、細舉而明之、心脈搏堅而長、當病舌卷不能言、凡脈之搏、以有所犯、而鬼勝則搏、心脈之搏、以腎邪犯之也、病舌卷而不能言、舌雖應心、而舌本蓋少陰經之所散也、治之之法、不獨涼其心、且暖行其腎、其大而散、當消環自已、若心脈之芤、雖孔而軟、縱失血、亦當溫、加之以胃藥。

紫蘇子　黃耆　芍藥　官桂
獨活　茯苓　大腹皮　甘草炙各一分
天麻炮十錢　杏仁四錢去皮尖

右爲麤末、蜜煎、不計時候、用水一盞、煎七分。

寸口脈沉而弱、曰寒熱及疝瘕、及少腹痛、又曰、脈急者疝瘕少腹痛、病同而脈異、啟玄子遂以爲經傳之誤、亦不知變矣、寒疝之爲病、有寒濟運於小腹而爲疝、故止言寸口脈沉而弱、不分左右之脈、皆沉故也。右沉則肺冷、而寒濟之氣流入於中、左沉則心氣不足、血爲寒邪所犯、而少腹痛、至脈急曰疝少腹痛、則言六脈之皆急也、蓋經舊言、診得心脈而急爲疝、正謂此矣、寸脈弱而疝者、宜緩其中、寸脈沉而疝者、宜用此方。

當歸　牛膝各半兩　烏藥　木香
京三稜　蓬莪茂　茴香
官桂　草薢各一分　芍藥　大芎各十錢
沉香四錢　血茸　延胡索
細辛各五錢　益智子三錢

右爲細末、蜜丸如梧子大、空心、濟湯六七十丸。

脈急而疝、宜用此方。

蓽撥子　麻黃　芎　蓬莪茂
甘草炙　木香　茯苓各一分　芍藥半兩
獨活十錢

右爲細末、每服三錢、生薑三片、水一盞、煎至七分、不計時候服。

明察脈

春戌、夏丑、秋辰、冬未、四時之喜神、取五行之養氣爲用、皆歷三辰而數、如春以戌爲喜神、即正月在戌、二月在亥、三月在子、四時放此而推、若於脈中得之、犯他脈、喜宿喜凝之事、四時脈皆於胃中見、以五行皆資土以致用、而周身之脈、亦因胃脈、然後見於氣口、如春脈以弦爲主、須六部脈皆循循、不急不絕、不緊不數、而胃脈微弦而緩、弦爲春、緩爲本、六脈無犯、主一月內喜應、若正月於戌日見、二月於亥日見、三月於子日見、則旬內應、如胃脈帶弦而毛、則主災、夏脈洪爲主、六脈皆隱隱而大、不散不浮、不滑不數、胃脈微洪而緩、洪爲夏、緩爲本、脈六脈無犯、一月內喜應、旬內得脈、皆不出旬、秋脈主毛、胃脈上輕、帶毛而緩、又須有根蒂、此一脈難辨、如四時之脈、蓋若毛而輕、如風如氣、則反爲災、不爲喜脈、惟不浮不輕、緩緩而徐、浮手按之、乍如秋脈、重手取之、則去來如一、脈之不散、舉之不輕、然後爲喜脈、日辰之應、與春夏同法。

傷寒論

病有緩性命於毫髮之端、決死生於頃刻之下、死生之間、係醫者之工拙、醫者之工、則病之瘥愈速如轉圜、醫者之拙、則所投之藥、過於白刃、此傷寒之病、非獨傷人之急、醫者之難事也、古人有言、一日二日、在於皮膚、四日五日、傳之藏府、放皮膚之間可汗、傳藏府之間可下、世之學者、未嘗不宗之以爲定論、然不知人之有虛實、則病之有輕重、病之有輕重、則傳之有遲速、忽有經兩日三日、而傳藏府、善爲醫者、當審察其脈、審其病之所在而已、若以治傷寒之病有四失、一、失之愆、蓋傷寒之病、其始在於皮膚、其次傳之藏府、當皮膚之間可汗、於藏府之間可下、苟不辨陰陽、不分內外、當汗而下、當下而汗、誤投藥餌、以傾人性命、此一失之愆也、二、失之不精、蓋傷寒之病、傳之藏府、則證候多端、千變萬化、莫能盡究、其毒氣之在肝者、不可疎脾、在心者、不可疎肺、五藏之治、餘皆同此、醫者治之、決以爲病之所傳、在於何藏、方之所投、當以何藥、病之所減、當以何時、藥之一投、遂可平復、苟不知病之源流、不識病之傳受、誤投藥餌、以希苟合、不幸而少有差誤、人之傾危、可立而待、此貳失不精也、三、失之怯、蓋傷寒熱毒、傳在五藏、攻損正氣、其毒氣之盛、如煙如霧、薰灼三焦、致令病危困、不思飲食、醫者反以爲胃氣之虛、不肯通疎、遂見傾損性命、但今患傷寒熱毒之人、飲食不進、大府不通、小便黃赤、病者危困、即先定其病之所傳、在於何藏、急以疎轉之藥、取其毒氣、其病勢輕減、則飲食增加、而平復如故矣、此三失之怯也、四、失之暴、蓋治傷寒之法、既失之愆、又失之怯、則不精不詳者、不可容易言也、愆因言治傷寒之法、切慮後之學者、心術未明、見識未到、但務以不怯爲志、妄投轉藥、以傷人性命、此余所以言四失之暴也。

後之學者，苟能明此四失，亦足以識治傷寒之大略，至於陽毒所次，陰毒所注，其傳在五藏，則藏證各殊，實於六府，則府證各異，其傷人之急者，惟二感尤爲極重，余今輒以病證脈候陳其一二，庶幾世人緣此之傳也。

一日，巨陽受之，巨陽之脈，起於目內眥，上額交巔，上入絡腦，下項，循髆內，夾背，抵腰中，在手爲小腸，在足爲膀胱，故頭項腰背強，其脈當疾數而浮，以散如新沐浴，如風，而左尺脈微緊而數。

二日，陽明受之，陽明主肉，其脈夾鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥，其脈又經於腹背，上頭項，在手爲大腸，在足爲胃，診其脈，當疾數而浮，漸漸按之，如通於裏，以陽明爲宗筋，而胃脈受之，又漸入於裏，六脈雖浮數，而胃脈一指微洪而數。

三日，少陽受之，問其脈，循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾，又起於目銳眥，上抵頭角，下耳後，其脈當疾數而利，得六七至以上，而肝脈又差數，此三陽受病，皆屬於表，故其脈疾數而浮，以其未入於藏府，故言汗而已。

四日，太陰受之，太陰脈布胃中，絡於嗌，入胃，上隔，夾咽，連舌本而散於舌下，其脈當疾數而洪大，有骨力，胃脈差大。

五日，少陰受之，其脈直行者，從腎上肝鬲，入肺中，循喉嚨，夾舌本，故口燥舌乾而渴，其脈最爲洪大，六七至以上，心脈隱隱應指，來去如一。

六日，厥陰受之，厥陰之脈，自足上循陰器，抵少腹，又上貫鬲，故煩滿而囊縮，其脈疾數如長，三陰三陽，五藏六府，榮衛不行，五藏不通，則死，大抵三日以前爲三陽受病，其脈在表，宜汗，三日已後三陰受病，其脈在裏，宜泄，若初經三日，其脈疾數大，表裏如一，即不可汗，亦不可下，只以解利藥通其中而已。

一二日，脈氣疾數，以溫辛發散藥汗之而愈，藥中亦須有通表解藥，不可純用熱藥，既汗之後，脈當安和，緩軟，不疾不數，如老年衰削人脈，輕手按之，緩緩不絕，重手按之，隱隱不乏，即自然安寧，若既汗之後，疾數不解，即難治，加之以結，則困重，或至於死，蓋結脈疾數而歷絕，蹙蹙如珠，而又不流利，與滑不同，但逐部位通流於指，如滴水起頭是也，然初得病一日二日內，有增寒壯熱，脈輕而浮，乃謂之傷寒，若幾得病，並無增寒頭疼欲碎，身熱如火，頭目赫赤，眼睛進火，大府祕，小府赤，六脈洪大，有骨力，此名熱病，雖初得，亦不汗，蓋治傷寒之法，惟初一二日，與熱病使藥不同。

三四日已後，與熱病同醫，一日二日，脈氣微小，不疾不數，不浮不散，唯沉軟而細，則汗之之藥，宜極以溫辛，如脾胃濡沉，則是感冷之一候，多變成陰證，陽毒傷寒，面赤頭痛，身熱如火，心神煩躁，頭目昏眩，項背強直，脈候當洪大而有骨力。

傷寒煩躁，飲水不休，若脈實而洪，不是疾數，是爲熱毒，若洪大而不實，是爲心脾受毒。

傷寒後，寒熱已退，腹中餘一塊，疼痛不可忍，忽走在腹面上，疼，此爲道氣在肝，脈氣洪而長，肝脈循循而過左足，宜清其血。

四五日，熱毒上衝，心胸壅塞滿悶，渾身壯熱，頭痛不止，大府不通，胸中痰實，脈氣當寸關脈實，而尺澀輕如絕，心脈炎炎而上。

熱毒在肝，蓄怒，筋脈碎痛，神昏，不欲見人，兩脇脹滿，手足躁，不安臥，右手關脈，當偏大緊急而長，熱毒在心，頭疼煩躁，面赤舌強，口語不快，忽心痛，聲嘔，狂言妄語，忽思狂走入水，精神不守，左手脈，一指偏大，若舌強硬急，以妙手針刺其舌兩傍，出惡血，不可刺其舌心，熱毒在脾，渾身肌肉碎疼，即食即惡，思吐，通身發熱，兩唇乾焦，邊脈動，或環唇青黑色，甚則腰痛，腹滿，兩頰痛，右手關上，脾脈，一指偏大，如衆脈。

熱毒在肺，上衝咽喉，心胸壅實，隔塞不通，渾身大熱，面色或赤，而又帶白，喘欬，不得大息，右手寸口，一指偏大，而加之以浮。

熱毒在腎，腰背疼痛，脊骨強急，頭不痛，若渴數飲，甚則項痛而強，腑寒以酸足下，不欲言，其脈當左手尺澤微而輕浮，又輕緊。

傷寒，熱毒攻於肝心兩藏，毒氣煩盛，上衝於肺，血隨氣逆，鼻中衄血，口中吐血，甚則耳中眼中皆有血，診其脈，當洪大而炎上，如流水之長，如乍開乍合，乍歛乍散，此爲失血之候，熱毒內傷肝心兩藏，肝心失守，不能主血，毒氣煩盛，上蒸於肺，血隨氣行，流入於肌膚，發爲赤斑，通身大熱，頭重疼痛，睡時如己身傍畔更有一身，精神昏亂不守，其脈雖大而鬱結不解，重手取隱隱而有骨力，如重炎綾絹裹之，爲發班之候。

傷寒，熱病發嗽，坐臥喘急不安，其脈，右手寸關脈當洪大，而加之浮數，傷寒，熱毒熾盛，蓄炙三焦，攻擊皮膚，通身發如橘色，其脈如發班候而差沉，與黃疸同法。

熱病結胸，心前閉塞，胸中有一塊不通，堅硬不散，通身發熱，頭疼不安，面色黯赤，喉中涎溢，大府祕熱，昏悶不省人事，病則伏暑相似，其肺當洪大而有骨力，而肺脈實而不浮，伏暑即結而沉。

傷寒熱病，五六日，愈加困重，因喫疎藥，下糞如紫黑色，病勢不減，神思昏昏，小腹膨脹，狂言妄語，不省人事，甚則腹中有塊，堅硬不散，其脈結伏，此毒氣攻血，腹內有淤積惡物，十皆九死。

陰毒傷寒，渾身手足厥冷，面青，唇皮無色，四肢無力，心中寒慄，重則閉目，不知人事，脈氣當細微而沉，重手取之，又軟而無骨力，若臂脈細微而搏沉者，爲重。

診失血

脈訣曰，芤爲失血，芤脈狀如按葱子，內面兩頭有，中間曲而缺，非謂絕也，若心脈肝脈帶芤，而肺脈浮以數，又肺脈微弦而緊，則骨蒸咯血。

心脈芤而肺脈軟沉，尺脈沉伏，微微帶緊，腸風下血。

心肺芤而尺脈緊，膀胱，小腸溺血。

肝脈芤而肺脈大浮而促，兩手尺澤皆微，嗽而咯血。

肝心肺脈俱盛洪大，而不甚有骨力，乍開乍合，如流水之狀，此金火相傳，當吐血，心脈微而緊，促而朝上魚際，急按即來遠去速，此爲腸風，下血少，多心戰，揮事無心力，肝脈長而動，下貫尺澤，心脈大而實，三焦

血有餘，亦當下血。

肝脈細微而澁，尺澤微，胃脈濡，大府失血。

心脈與肝脈不盡連接，如滴水起頭，鼻衄出血。肺脈浮大而散，心脈大，鼻衄。

缺云，緊爲蟲，爲痔，須肝脈亦緊并細，方爲痔，不爾，卽蟲也。

六脈浮大，無骨力，來疾去遲，輕手帶洪，重手取之如濡，此久有痔瘡，血少。六脈浮大，有骨力，肝脈弦而長，肺脈大而實沉，與胃相際，胃脈輕弦而濡，此三焦血泛，胃虛下血。

六脈如常，心脈動，腎脈搏而沉，又細而數，血泄，或溺血，便血。

婦人胎孕，在手關寸脈滑數，而肺脈脈虛而毛，尺澤陷而與關脈不際者，孕也。若肝脈長而溢寸，胎漏失血。胎下血有二，有肝氣虛微，腎脈緩軟，胎脈陷下，胎動而失血者，當補之。若肝脈有餘而失血，是胎溢，當涼也。

婦人肝脈洪大而反結澁，缺云，澁脈生，婦人敗血。若脈洪大而又伏，則積塊而血不行，久則陰門腫，以厥陰脈絡門而過。

診失精

腎脈虛，緩軟而沉，又微以濡，凡尺脈得八裏脈又搏擊，皆失精。心脈動，多夢交。六脈濡緩而輕浮，又澁，多溺精。

六脈濡，腎脈沉而細，膀胱脈動而緩，以大，心脈動而浮，主小便白濁，肝心脈弦而腎脈緊而細，重手按之却來遲去疾，小府當赤而濁，腎脈細沉而微緊，肺脈重而洪大，小便卽少腹先痛，此寒伏於胞絡中。

赤脈弦而結，陽中有伏陰，胞滿，小便不出，小腹迸脹。

六脈如常人，獨脾脈一指疾大而數，唯腎脈差微，主頭疼，口乾，溺精，此爲土邪入腎，當清其脾。

婦人尺澤帶弱遲，八裏之脈，膀胱脈動，多下白帶，若腎脈搏而沉，陰中濕癢生瘡，丈夫陰濕，此皆精氣之失。

六脈皆澁，又遲緩，丈夫失精，婦人敗血。

心脈肺脈疾而動，腎脈膀胱動而濡，丈夫溺多口乾，若婦人產，乳多口乾，卽多補其腎，不可以口乾爲熱。

診癲疝

癲疝之病，尺脈緊而動，按之卽虛。

肺脈輕弦而虛，胃脈沉濡而軟，尺脈緩軟，寒厥入胃肺，主少腹，少腹當如有形，腎虛卽成癲疝疾。

肝脈弦而疾，腎脈緩軟而虛，亦爲以厥陰祇陰器絡陰而過，乃爲癲疝。

六脈急沉，爲疝，爲瘕，爲少腹痛，蓋疝瘕皆寒搏於中，而急則爲痛，腎脈大急沉，爲腎之疝，當暖其腎，肝脈大急沉，爲肝之疝，當暖其肝，心脈搏而沉，又急而沉，肺脈同診，皆爲疝，若小急而不鼓，皆爲瘕。

診汗脈

脈缺曰，陰微盜汗，勞象有此，特其一端耳，大抵汗爲血之餘，若陰微，則血不足，則當主少汗，此言微盜汗，當緩軟而澁，右手關脈急而沉，心脈搏而動，方主盜汗，小府澁，忽失精。

六脈皆滑，主汗，以其陰氣有餘，故多汗。

心脈大滑而腎脈搏沉，以汗爲心之液，今心脈大滑，則水犯之而動，故汗。

心脈獨大而洪，六脈疾而動，主睡中忽然出汗，以心氣獨主故耳。

六脈濡濕而重濁，脾脈大而濡，主汗出惚風。

論膈噎

六脈微而澁，腎脈綿軟而沉，來遲去疾，如代脈相似，心脈沉，主元陽正氣虛弱，陽事不起，小便餘瀝，輕冒風雨，忽喫些子冷物，卽胸中噎塞，如有一塊物在喉中，飲食無味。

肝心脈澁而遲，來遲去速，肝脈無骨力，主思慮喜怒，忽疑淚思憶，其狀，心胸滿悶，隔塞不快，飲食難下，兩脇脹滿，忽時氣痛衝心不可忍，面色青黃，肝心脈澁而沉，重手取之，緩而無力，如新沐堅重，來遲去疾，胸中噎塞，飲食減少，行步無力，大府虛冷，非時間心前如有一條冷線，上徹咽喉，此爲冷噎，六脈澁而浮汗。

肝心脈浮大而無力，胃脈大而散，重手取之，雖無骨力，隱隱而來，唯兩手尺澤差短，其胸前隔塞，飲食減少，大府祕熱，忽時不調，喫鹹卽心躁，喫暖卽喉乾，痰實，頭目昏重，兩足無力，戟身不起，舌上生瘡，唇皮焦裂，或非時口中涎流，衝肺散爲乾嗽，忽時急飢，見食卽吐，食不住腹，此熱膈。

六脈微有骨力而來遲，却差小而微急，主寒熱氣膈，其狀，大府熱，忽時却下黃糞汁，胸中鬲塞不快，滯氣積聚。

六脈浮大輕，有骨力，來遲去速，肺脈偏大而浮，加之泛，如促聚於寸口，主熱噎，胸前噎塞不通，飲食不下，所喫湯水只到喉，仍便吐出，所咽下津液，只到喉中，亦便吐出口膠，非時睡涎溢，大府祕熱，當用通藥利其大府熱咽，如上所說，用引大府藥，既通其大府，卽脈氣洪大如管，但去疾，與尋常洪大之脈不同，卽輕以解肺順氣益胃化涎藥餌之。

六脈皆得噎脈，肝脈偏大而澁，肺脈橫格，主因怒而得，大便不通。

六脈皆噎脈，肝心微小而弦，微有骨力而來遲，因悲憂而得，所喫物，間巡歷胸間，隱隱而下，蓋風不化，血不盛，當益其肝心，順其氣。

六脈濡伏，重手取之，如動而無骨力，主冷噎，飲食不通，身上厥冷，胸中如有冷物塡塞。

六脈濡伏，胃脈偏重，濡而重，主胃寒，腹濕而得噎，四支厥冷，胸前噎塞，飲食不下。

診室女婦人諸脈

諸婦人之脈，陰陽與男子相反，當要尺澤隱隱，來去如一，和緩，不澁不弦，寸口平，方能孕育，若尺澤弦急，肝脈動，心脈疾，六脈澁而不與勻，無子。

血盛氣衰，爲孕，謂心脈洪大流利，替替而滑，肺脈毛而微，却不浮，爲孕，仍須尺澤與肝脈微細，而肝脈微

橫，卽是孕。

肝脈澁而不絕，尺脈微陷，心脈滑，是孕。

肝脈澁，心脈滑，肺脈寬一，如孕脈然，尺脈急而長，爲敗血，爲積血，非孕。

肺脈急而弦長，右脈浮而短，小腹堅硬如孕。

肺脈急而沉，腎脈濇沉，小腹有形如孕。

肝脈急而沉，腎脈小急緊，陰痒，陰中痛腫。

室女六脈皆弦而長，又洪，尺脈微緊，經候通行，兩足痛腫，行不得，肌肉消瘦，大府乾澁，頭痛眼昏。室女十六七，肝脈弦而長，胃脈輕弦，裏裏如一，骨蒸熱，風行周身，上焦鬱，肌肉消瘦，忽通身黃黑，面色帶黑，小便黃赤，五心煩躁，漸欲成勞。

婦人肺脈盛，肝脈軟而虛，忽微而動，心脈芤，肺氣有餘，相刑尅，肝木受金傷，不能主血，月候多少，遲速不定，多不節，以致無子，偶然懷之，又無故墮下，當減其肺，益其肝。

關尺微細而沉，腎氣虧乏，不能生肝，經候多少，遲速不定，不能生子。

肝心脈弦緊而疾，肺脈浮而大，尺澤鬱鬱不散，月經不通，大府祕熱，兩足痛，不得行，肌肉消瘦，漸次如馬鑑節。

六脈弦緊而長，心脈洪大而實，尺脈結，月經不通，長淡，怒不得安處，忽忽似顛狂，夜不得睡，小便赤，大府如常，忽下鴨溏。

肝脈虛弦而長，按之無骨力，心脈動而疾，肝邪傳心，日夜煩躁，忽如顛狂，不得眠睡，六脈大而沉，肝脈橫，肺脈浮，主婦人血熱，經候行少，背上非時有一片發熱，口無津液，忽兩三月一次，忽半年不行，或止些小黑血。

六脈大而沉，重手取之，隱隱乃得，輕手如無，重取却有骨力，非如尋常沉伏之脈，此因胎藏本熱，忽因產後未經百日，恣喫涼物，寒熱相伏，經及二三月候不通，全如懷孕，惡血所聚，如有身，露下有塊，但堅硬不動，往往却氣氣痛，只以辛溫藥散，自然行下，不必疏通。

婦人脈如孕，尺脈亦絕，與孕無殊，但六脈動而不勻，胃脈輕滑伏，此因經候行次，或產後起早，并誤喫生冷，傷損氣血俱病，因生積聚，久無所療，變成惡物，其狀，腹中成塊，如蛇鼠，如鹿，如虎之類，以手按之，衝手跳起，但此病到年深，其惡物帶命喫人血盡，忽絕無經候通行，或經候行時只如淡水，如此，卽傾危人也。

六脈疾大虛急，有大爲風，浮血浮，寸爲尺澤有寒，忽因經候行時，忽因產後喫生冷不相當之物，忽產後早起，傷風，血氣俱病，經行時，忽先氣疼，忽小腹急疼。

心脈芤，肝脈虛，尺澤微細，血海虛損，經候過多，忽成片流下，不可禁止，六脈皆沉，肝脈弱而虛，尺澤細細如線，又帶澁而遲，肝腎多感寒，伏在子宮，血海虛損，經候過多，小便白濁如米泔，少陰腎脈貫脊而行，背上，忽有片寒冷，口中卽吐清水。

六脈疾大而浮，腎脈急而浮，心脈差洪，血風頭痛，口乾吐痰。

六脈弦大，肝心脈澁而短，尺脈急沉而搏，緣使性多瘀怒，傷損肝心正氣，因而積涎，怒而氣逆，涎隨氣上，其狀，閉得心前昏悶，煩亂不快，遂有一塊之物，上觸到咽喉，卽手足俱冷，口禁不開，不省人事。

六脈弦大而疾，尺脈亦弦而動，泛泛不絕，經候過多，七八月不止，背下鮮血，此非虛，不可補，止可涼風血，緣風盛血散，然久而不止，卽肝氣脫血。

妊娠之脈，若肺雖微，然浮而緊於寸口，當上氣喘促。

妊娠，六脈雖要滑而流利，然肝脈滑而洪大，胃脈亦有骨力，則上喘而口膠，見食多。

妊娠之脈，尺脈不絕，與肝脈相連，而口軟無力，又沉以細，當主少腹疼痛，蓋胎氣熱則在上，冷則墜下。

妊娠之脈，尺脈急沉而搏，胃脈濇而重，六脈又軟，胎氣墜下，陰門脹。

妊娠，六脈疾而動，肝脈如長而散，主胎漏失血，不可補之，此血溢也，當安其胎，涼其血。

妊娠，尺澤沉伏，肺脈實沉而動，腰痛不可舉，兩手沉重，行步無力，睡，腸痛。

妊娠，心脈洪大而浮，肺脈浮而散，胃脈浮而大，通身瘙癢，漸次面目渾身俱腫，心躁不安。

妊娠，六脈皆結而伏，胃脈沉而動，主忽然如中風，心前昏悶，卽如有一塊物塡塞，此緣臟腑本熱而忽感寒，忽喫生冷，寒熱相伏而不散，以辛溫散之。

妊娠，六脈洪大，過關溢寸，主上焦有熱，唇口乾焦，口舌生瘡，非時頭痛不安，小便黃赤。

妊娠，血有餘，六脈大而疾，又緊而流利，表裏俱有骨力，主渾身碎痛，并腹內疼不可忍者，宜涼其血。

婦人妊娠，有發熱如瘧，雖夏常長風，此肝盛血熱，風行于表，熱極卽生寒，若肝盛胃虛，卽更右一壁塞，以妊則血盛而氣衰故也，診其脈，當左長而緊，微帶浮，右關沉而濇，如按泥漿。

婦人之脈，六脈俱沉細而急，左手尺澤微而緊，指指如線而轉，連及肝脈，按之卽結而散，此胞精不足，當久患敗血，赤白帶，若動而數，加之以短，卽不久傾危。

婦人之脈，皆沉而洪大，重手取之，其深至骨，隱隱然應指，有骨力，來疾去遲，至數與常人無異，但胃脈亦洪大，上隔有伏痰，此爲血澁生積，當經候不快，忽不行，腰痛，口乾而渴，背迸，眼睛迸，兩臂重，手缺盆迸，大府秘，心悸，夜不得眠。

診黃疸

黃疸有二，有肝熱刑脾而疸，有濕極而疸，若肝脈洪大，胃脈濇，腎而濁，肝脈加之浮，腎脈搏而擊，卽發黃疸，若胃脈重濁而弦長，按之無骨力，腎脈搏而沉，心脈有動象，卽濕極而發疸，然疸之病，多先目黃，以衆脈皆會於目系，所以肝熱亦目黃而疸，胃熱亦目黃而疸，肝熱卽口乾引飲，小府亦而澁，胃濕亦目黃而口不乾，小府赤而不澁，又有下部冒寒，風濕，濕氣衝心，發爲目黃，不必是疸，素問言太陽之勝，有面亦目黃者是也，只可緩行其小府，濕熱相鬱而疸，卽口脈洪而大，不弦，却帶軟而長，宜利其小府。

半產正產論

夫半產、正產、婦人之常事也。然其間多有產後染成大病。忽絕無月水行。忽宮藏虧損不禁。忽積成癥瘕。而歲久月深。傾損性命。此無他。輕之以爲半產。而不甚將養之所致也。不知半產之候。其將養當過如正產十倍。正產止血藏空虛。半產卽肌骨虧爛。當切慎之。正產有如果中之果。夫果之爲物。俟其自熟。陰陽氣足。則其殼自開。而果子自墮。方是之時。子之與殼。兩無所損。如婦人懷孕。十月已滿。陰陽氣足。則其子宮自開。而兒子生下。若月未滿足。因誤服藥餌。忽寒邪熱毒所傷。忽扶輕舉重。忽倒地打傷。其胎藏傷損。胞系虧爛。然後其胎墜下。卽有如世人採折新果。碎其皮殼。就殼中斷其根蔕。然後取得果子。此其半產之證也。以其胎藏傷損。胞繫斷去。而後胎墜下。則其半產之人。將養調治。得不過如正產十倍者哉。正產之後。補其虛。生其肌肉。益血。窮其所因。解其病。去其風邪。養其藏氣。加之將養過如正產十倍。損傷之胎。無不平復也。吁。世之人多輕之。至於傾危。不可勝數。得不惜哉。

正產、半產出血過多。不可禁止。忽氣閉不識人。其脈洪大而浮以泛。如新沐。如破肚之脈。若微細而澁絕。其候因。

胎死腹中。其脈洪大而沉。尺澤當澁澁下部。不澁不絕。卽無提。謂胎不下。當氣滿實。所以洪大而沉。又澁寸過。若澁而短。卽死。

婦人欲產。漿破血下。渾身疼。診其脈。當洪大而有骨力。尺澤澁而長。方是正產。謂孕則尺脈不來。欲產而漿下。則尺澤澁。若渾身疼甚而漿未破。血不肯下。卽難產。凡渾身痛甚。須是腰痛。連穀道疼。連痛。方是正候。以少陰犯胞絡脈。連腰過脊及肛門。若只是腹痛。不可用作正產候。

產後。脈結而澁。尺脈短而動。肺脈浮而急。卽是衣未下。產後血風虛熱搏之。洪大而數。數與疾不同。數則漿動與短。主血虛。面色深赤。身體如醉。見屋宇如懸倒。忽頭痛重不安。

產後血風虛熱搏之。洪大而疾。心脈實而有骨力。肺脈洪而浮。主血逆頭痛。面赤如醉。身體如在虛空。大腸祕澁。語聲微細。

產後。六脈得洪大。如血虛脈。胃脈實而弦。肺脈浮而洪。主大腸祕熱。頭痛面赤。煩心嘔逆。產後。如骨蒸脈。六脈弦而微緊。有骨力。主血行少。未經數日。身下乾淨。腹中餘血惡血未下。非時氣痛。攻心刺肋。

產後。六脈輕浮。微有骨力而來遲。肝脈細而虛弦。多因小遺登後早。忽亂喫食物早。宮藏傷風。飲食減可。近以十日。遠經半月。粥飲不進。才喫一口湯水。卽聞湯水逕歷胸中。方下入胃。既入胃。仍下出。面色并肉色黃。形體困重。此候留風邪在中。血熱而感寒。成寒熱隔氣。風不用事。食不化。此病須是喫得酒一兩盞。方可調理。每日宜服酒一兩盞。如治風調理。故予特製此方。

細辛　官桂　芎　當歸各半兩
羌活　藿香各一分　木香少錢　桑寄生□分
吳茱萸　蓬莪茂各三錢　甘草四錢炙

右爲細末。每服三錢。空心。煎防風湯調下。喫了。渾身手足發。忽頭疼。卽連喫酒一兩盞。候通身發熱。忽行下惡物。卽便安樂也。若人得此病。須是依上件題目。方可服此方。

產後。六脈皆沉伏而遲。主渾身厥冷。非時口不識人。

產後。六脈動而疾。胃脈滑而澁。於尺澤。腎脈軟而虛弦。此緣產遲。忽衣遲。既產後。早起傷風。吐泄不定之脈。宜溫其胃。

產後。六脈沉細而伏。此寒氣在下。腰痛。起動不得。

產後。六脈沉細。腎脈伏而沉。肺脈虛而大。產後乳汁多。故流出。其乳汁冷而口乾。此腎冷肺虛寒。不可以口乾爲上熱。誤服涼藥。此腎少陰之脈。從肺出。絡心注胸中。其直行者。從腎上貫肝鬲。入肺中。循喉嚨。夾舌本。故如此。

產後。六脈洪大而緊。肝脈澁。肺脈浮。忽然乳疼。堅硬成塊。將欲成癰腫。

產後。未經百日。腹疼氣疼。轉瀉不止。六脈沉細而虛。此餘寒在中。

產後。心脈一指偏小而動。又芤陷。若肺脈重而洪大。却無骨力。則主乳多。肺脈如常。惟心脈如此。加之腎脈微細。則小便虛澀。

產後。惡血行。少腹中塊痛。須六脈大而緊。肺脈緊而虛。弦爲寒。肺主少腹中有塊。產後血熱。肝藏風搏生滅。發爲疼痛。卽急心痛。六脈當得二陽一陰。二陽實大。一陰者沉也。

產後。尺澤虛軟而代。至數不及。白涕不止。血崩下帶。

產後。尺澤虛軟而代。至數不及。加之胃脈濡濕而散。卽水土俱寒。多下白涕。產後六脈浮而虛。腎脈微而小。至數遲。來處無力。緜緜若代。中風。肌肉麻痺。肢節牽抽。非時增寒。大府虛冷。

產後。六脈浮而數。來疾而去遲。中風。血肢躁。身體疼。精神昏悶。大府祕澁。產後亂喫物早。傷損脾氣。非時腹脇脹滿。飲食不快。診其脈。胃脈遲而肝脈弱。

產後。亂喫物早。傷損血氣。身體虛弱。飲食減少。眼如猫兒眼。診其脈。肺脈橫格而肝脈乾。傷微弱。腎脈沒泛。欲動而無力。此血氣俱病。當調其血。益其氣。暖其胃。使進食。

產後。腎脈微而沉。胃脈濡濕而沉。多緣寒氣所損。忽因坐草多時。地之寒氣所衝。腹中成塊。忽衝心背。臍腹疼痛。嘔逆惡心。不思飲食。

產後。血氣微弱。六脈沉細。重手取之。細細乃得。脈氣。別無陽脈。唯肺脈差浮而弱。主頭冷。重項頸。難。非時間頭面上肌肉麻痺。大腸虛冷。頻出。後又多虛。往。或時泄瀉。兩足沉重。少精神。行步無力。面黃瘦。或未經百日。經候通行。或誤喫涼藥。有此疾候。忽自懷孕時間。通身寒冷。至產後。卻有此疾。但稱以補腎補肝藥。補益其血氣。而祛風邪。藥助之。

產後。心虛中風。心中戰慄。驚動不安。如人將捕。大府傷冷。六脈微而肝心脈偏細沉。又產後只緣腎氣之虛寒。風邪所中。腎脈細而搏。以沉。腎既受病。傳其所勝。心盛。腎邪非時驚悸。如人將捕。初以益心氣去風

邪藥治之。次當補其腎。又次當益其肝。足其血。緣心受腎邪。而又肝氣微弱。不能生其心氣。故以三方藥治之。

產後肝腎虛冷受邪。六脈虛微。腎脈搏沉。心脈輕帶滑。主產後肝虛中風。產後血暈之疾有二。風搏血熱而暈。卽六脈洪大。有骨力。又有一般大府虛冷。却因使性激怒。傷損肝心。其氣上逆。因而血暈。其狀頭暈重痛。昏昏如醉。語聲低小。但多思睡。診其候。六脈輕。有骨力。不至洪大。肺脈輕浮而不毛。心脈促而朝上。此最爲用藥之難。故作此一方。

麻黃去根一分　延胡索　防風各一分
官桂去皮中粗　甘草炙　芎　羌活
木香各一錢　細辛各二錢

右爲細末。每服一錢半。水一盞。煎取九分。非時。去滓服。不要多服。病止卽住藥。若氣體虛微。喫煎藥未效。却加壯熱頭痛。面赤如醉。宜服此方。

牡丹皮　荊芥穗　羌活　麻黃去根
防風各一分　甘草二錢炙

右爲細末。每服二錢。水八分一盞。煎一兩沸。急瀉出。食後。徐徐去滓。熱服。病已卽止。

產後餘惡血未下。因感風邪。與熱血相搏。壯熱頭痛。面赤如醉人。服湯藥。急昏悶不醒。身如在虛空。見食卽吐。食不住腹。脈氣結而不勻。遂位間絕。然各有骨力而微。此用藥亦難。宜此方。

麻黃去根三錢　麥門冬　黃芩　羌活
大黃　荊芥穗　山梔子　芎藭
射干各半兩　官桂　當歸各一分　甘草炙三錢

右爲細末。不要煖。只生擣。每服二錢。濃煎薄荷湯調下。若脈氣極有骨力。應指而動。又當有伏熱。當大府熱。出後不通。前藥二錢半。取汁用。調下牽牛末一錢半。夏末一字。和滓服。大府不熱。不用牽牛。

載之治病。用藥初不求異。炮炙製度。自依本法。以錄計者。蓋其審證精切。不過三四服立瘥。驗是而不效。乃察病按方之不審。便當改轍。不可泥也。此皆親試而得之。非敢夸大其說。六錄爲分。四分爲兩。

史載之方卷下

診胃脈

訣云。阿阿緩若春楊柳。此是脾家居四季。此叔和知之而未詳也。大抵胃脈雖和緩而貴不疾不速。重而取之不虧。乏浮而取之。阿阿而至。不洪不濇。卽爲五藏脈全。若弦而急。又洪大而有骨力。卽受肝熱邪。能生嘔逆。若弦而緊。卽受肝冷邪。能生殞泄。訣又曰。脾數卽吐。因脾熱。此非脾熱。乃肝熱而侵脾。故作此和神之方。須使去風邪藥。以和胃藥。此方神效。但於使療處方覺其驗。

訶子皮壹兩　削尤好者二兩　藿香　棗本
陳橘皮　芎　獨活此止風者半兩　楂子七錄。此用行肝氣。乃木香中擣圓小粗烈味苦者。
細辛　防風　甘草炙香一分
荊芥穗二錄　羌活半兩　連翹壹分　秦膠三錄
乾薄荷壹分

右爲末。每服三錢。水一盞。煎取八分。去滓和滓任意服餌。才服逡巡。却覺胸膈如飢。若是肝熱刑脾而吐。唇焦口膠而赤。渴引飲。小便赤。背脊寒。酒酒如瘧。聞腐藥臭。只要涼水喫。卽加

已上同爲末。每服三錢。更入半夏二片。水一盞。生薑三片。同煎至七分服。若是脾濕冷泄。卽加

香白芷 壹分　肉豆蔻　草豆蔻 各半兩

如法修製，大抵用脾藥須要止風邪藥相並，其他加減，乃臨時看風氣多少，卽萬不失。壹脚膝下邊生瘡，乃肺氣不下降使然，宜服降肺氣湯藥。

有病，吐半月不已，乃心膈間有涎，宜用天南星去涎藥去之。

水邪攻心氣，素問云：攻所熱者死，用桂與薑，壯心氣勝之，其病狂言身熱，骨節疼痛，面赤，眼如拔，而腦如脫。

小便白濁而口乾，是土氣餘而克腎水，以枳殼散清其脾，則安。痔病用荊芥薰，以釣腸丸服之。方出寶死者是。

爲醫總論

道之渾淪，莫知其源，道之既判，變化無窮，莫知其端。推其變化之間，凝而爲質，五行名之，化而爲氣，五運統之。運而爲人，五藏應之。自此而後，物之可名，數之可推，理之可窮，而道之迹乃可得而言之也。大而天地，小而一身，理或智然，統而論之，要其所歸，一歸之無失而已。故雲霧不精，則上應白露不下，白露不下，則苑囊不榮。乃至賊風數至，暴雨數起，天地四時不能相保，與此天氣不襲，道之相失也。人之起居乖宜，將養失度，一藏有餘，一藏不足，寒溫之不能相交，榮衛之不能相通，風之氣乘隙而入，疾如飛矢，奇病苛疾，應如反掌。此天地之與人，其理未嘗不一致。古之聖人，和於陰陽，調於四時，春夏養陽，秋冬養陰，與萬物浮沉於生長之門。故生身無奇病而壽敵天地，無有終時。此無他，養無失而生氣不竭者也。賢人則上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏，而無失，亦可益壽而有極時。至於庶人，不能法天之紀，用地之理，失於所養，天之邪氣感而害五藏，水穀之寒熱感而傷六府，地之濕氣感而害皮肉筋脈，百病無端，從斯而至。病之一生千變萬化，莫能窮究。故世之善醫者，不患治病之難，患識病之難，患使藥之難。何則，受病有淺深，使藥有重輕，度其淺深，分毫之不可差，明其輕重，銖絫之不可偏。淺深輕重之間，醫者之精粗，病者之性命，差之毫釐，失之千里。得失之間，死生性命之所係，醫之道，不得不爲之難也。故善爲醫者，一病之生，必先考其根源，定其傳受，審其刑尅，分其冷熱寒溫，辨其上下內外，有眞有邪，有虛有實，忽隔絕痞塞不通，忽空虛微弱失守，可針可灸，可下可汗，關於不精，勇於必驗，制之有先後，取之有輕重，條理具存，各有其常，而不可差之分毫也。夫病之所起，其來有根源，其次有傳受，其傳有刑尅，此非常之證，勞傷之候也。夫勞之爲病，始於丹元，隨海之虛，則眞病之所生，莫不先在於腎，水能勝火，故傳之於心，火能勝金，故傳之於肺，金能勝木，故傳之於肝，木能勝土，故傳之於脾，五藏相傳，五氣相滅，五神耗散，榮泣衞除，而精神榮衞，治之之法，其根在腎，而未傳於心者，投之以腎邪之藥，而其氣自損也，當於腎之未治，而傳之與心，先治於腎，攻其鬼而伐其根也，次治心，逐其邪，而保全其心氣也，當於心之未治，而傳之與肺，涕唾膠粘，喘嗽不安，先治於心，攻其鬼而斷其相傳之勢，火邪撲滅，肺藥未投，而喘嗽之消滅，十亦去八九矣，次治於肺，解其邪，而保安其金氣也，後治於腎，清其藏，而返其眞氣也，當此未治，而至於肺傳之肝，觸骨痿痺，隱伏於床，治之亦徒勞功，如此所爲，考其根源，定其傳受，而審其刑尅也。夫五藏溫病安

從來，將養乖宜，病生於變，是則百病之起，雖千變萬化之幾，而要其所歸，不出於寒溫熱冷而已。冷者不可治之以溫，名曰不及，涼而治之以熱，名曰太過。不及者，病之不能滅，而太過者，反有所傷於眞氣也。冷者熱之，寒者溫之，輕重得宜，疾徐有制，動無毫釐之失，而所療之病，舉獲萬全，此所爲分其冷熱寒溫者矣。傳曰：狂風入林，枯枝先折，猛雨破壩，隙者先壞，則入邪之所以感傷於人，莫非乘隙而入，此人之所病，不能無內外上下之辨也。肺氣喘嗽，膠痰堅實，伏在胸中，涕涎併起，傾損性命，如此之類，病在上也。脚膝痿軟，行步無力，腰胯沉重，如此之類，病在下也。生於皮毛，染於筋骨，忽塞所中，飲食不消，忽熱毒所攻，大府祕澁，百端隨人冷熱，如此之類，病在內也。在上者吐之而安，然不可吐者，當制之以緩，在下者補之而愈，然不可補者，當制之以急。在外者可針可灸可汗，隨其所宜，而在內者可攻可補可下，隨其冷熱而已。其治之有方，其辨之有法，亦何患乎所投之藥無必勝之驗者哉。此辨其上下內外者也。夫五味爽人之口，五色盲人之目，嗜慾無窮，貪着不已，憂患迭生，精神頹壞，而眞殘根伐，是人之不能無虛實也。實者爲有餘，虛者爲不足，有餘者瀉之，不足者補之，而補瀉之間，又有內外之辨，故形不足者，溫之以氣，精不足者，補之以味。五藏六府之內，實者通之以藥餌，四肢八節之外，實者瀉之以針石刺。此其補瀉之有所不同也，乃所爲分其虛實者矣。夫古之人，年滿百而動作不衰，今之人，年未滿五十而動作有衰，非天之私於古而禍於今也。古之人知養道之術，嗜慾不能勞其目，淫邪不能惑其心，血氣安和，精神內守，故年滿百而動作不衰，蓋眞全而邪氣不能勝也。今之人不知養道之術，務快其心，逆於生樂，血氣枯竭，精神耗散，乃有胎胎相傳，病病相孕，受氣虛微，肌體羸弱，呼吸喘息之間，而百病臻湊於五藏六府者矣。此無他，精虛神乏，而外邪得以干其陰陽之正氣也。海爲醫者，保其眞，去其邪，無使其過劑之藥，反有以賊其眞也。此所謂分其眞邪者矣。乃至有隔絕痞塞不通，空虛微弱失守，雖三尺之童，亦耳聞而心識者矣。夫病之在內，藥餌攻之，病之在外，針石取之，其有病勢之急，而藥石之功緩而難制，聖人不能救之法，類而舉之，若今陰毒傷寒，其四肢八節皆冷，面青脣黑，不知人事，急於氣海灸之，一灸不過十數壯，而人神氣完復矣。又有夏暑之月，任意取涼，頻飲涼水，忽飲冷酒，後恣貪色慾，精氣至虛，陰邪壯盛，陰陽相奪，陰氣偏勝，獨守下元，陽氣虛微，上攻頭項，其病脚冷如雪，四肢八節俱寒，脈氣深伏，但有其熱如火，其痛難忍，方此之際，針石何濟，急於氣海上灸之，一灸不過數十壯，而日前之所飲涼水冷酒，皆轉下，須臾四肢八節俱暖，而陰陽之氣仍相交際者，又有冷熱之難，頭忽鮮赤而疼痛，忽堅硬而不痛，急以濕紙帖其上，尋其紙之先乾處，便灸，一灸至百壯，餘而後止，若以冷頭而紙上不得其先乾處，卽於頭處當頭着灸，亦以百壯而止，但見肌體厚薄，方可安灸，瘦薄者少灸，肥厚者多灸，忽是冷頭灸而不痛，則以開痛而止，因喫硫黃後有此病，更在虛處不論安灸，夫病之可汗可下，可針可灸，其緩急之序，重輕之別，操之不失其宜，施之各有其度，又何患乎人之不安，病之不愈者哉。嗚呼，天地無全功，聖人無全能，雖黃帝、岐伯之論，尙有不治之病，則今有非常之候，不得其詳，未明其實，闕而勿治，醫者不爲之辱也。苟其病之熾盛，人之危篤，醫者既明其理，又識其詳，當此之時，不可有分毫之怯，急以毒藥驗針，回其生於萬死之地，舉必萬全，然

非至神無能與此。愚者行之無異於操刀殺人也。如此所爲。關於不精。勇於必驗者矣。此皆持之有術。治之有統。不可相踰於規矩權衡者也。至於病之有非五行之所傳化。若寒熱之相交。陰陽之相伏。忽似熱而反寒。忽似寒而反熱。忽兩寒兩熱之相攻。忽有餘不足之相礙。千變萬化而生人之大病。苦今若肺藏本有實熱。反因隨大風。冒大雨。極感於寒邪之氣。寒邪之氣客於肺經。寒熱相交發而成嗽。醫者治之。投以涼藥。順其肺氣。則助其寒邪之勢。而嗽愈增。投以暖藥。則激其本藏之熱。而加喘急。寒溫之藥。俱難以遏。則惟力使藥之輕重。當見於此。或有以羌活

黃橘皮　麻黃去根　紫菀　杏仁去雙仁皮尖
細辛　獨活　防風　桔梗

右爲末。每服二錢。沸湯點。空心服。不過數服而嗽止。此輕□□解其寒邪。空心賺其寒邪之氣流出於胃也。此所謂治其寒熱相交者矣。忽有人之藏府根本實熱。却因履天暑。冒大熱。驟入涼處。頓飲涼水。寒氣勝。投其熱氣陰陽相伏。陰氣固而不散。陽氣伏而不動。其病結爲一塊。伏在胸中。此病名爲伏暑者也。其候忽寒。心中煩躁。狀似傷寒。而脈不甚數。醫者治之。妄投轉藥。雖六府之精華。悉皆蕩盡。而心前之結塊。愈增堅固。此無他。所下之藥。助其寒邪之勢。陰氣轉堅而不散也。治之之法。

芎　細辛　蕤香　黃橘皮
木香各一分

右爲末。每服二錢。水一盞。煎至七分。爲湯。空心服之。先解其寒邪之氣。不移時而心前之結塊頓然消散。然後復審其脈氣。察其暑毒之輕重。必投藥以解之。則亦何患乎藥之不驗者哉。如此所謂治其陰陽之相伏者矣。夫病有似熱而反寒者。若今有產後之病。五藏積冷。陰氣偏勝。乳汁倍多。無故流出。口舌常乾。非時發渴。頭旋目暈。飲食減少。腸胃虛空。身體羸瘦。每思登後。忽又不通。遂學治之。不過曰口舌常乾。非時發渴。上焦之有熱也。頭旋目暈。血熱而生風也。每思登後。又忽不通者。大腸之祕澁也。是不知乳汁倍多。無故流出。則口乾而發熱。從可知矣。體氣虛弱。頭旋目暈。腸胃空虛。而傳送之氣不足。則每思登後。又忽不通。從可知矣。一旦誤以爲熱。而投之冷藥。豈不傾人性命於頃刻哉。病有似寒而反熱者。若今壯歲之男子。志在淫邪。恣貪補藥。以番求色慾。熱藥所攻。榮衛結澁。上氣有餘。下氣不足。上下之氣不相交際。脚膝痿弱。行步無力。兩足多冷。或時增寒。肌體羸瘦。飲食減少。才喫醎味。卽便惡心。醫者治之。不過曰。此五藏六府之虛弱也。投以暖藥。譬猶抱薪救火。與甚亡益也。才以清涼之藥。解利肺經。散其毒熱。上攻之氣。榮衛一通。則其陰陽之氣。仍相交際。手足自暖。脚膝損輕。而平復如故矣。此所謂似寒而反熱也。夫歲陽太過。天地不無旱乾之災。歲陰太過。天地不無水潦之患。以虛生寒。以實生熱。則人之藏府。不能無兩寒兩熱之相攻也。若今傷寒所謂陽毒之類。皆兩寒兩熱之相攻者矣。哀哉。色慾無厭。喪身之本。世人多以迷心。恣其所欲。反飡毒熱之藥。以希苟活。其丹元儘海。雖已空虛。而藏府骨髓。虛熱轉盛。此病之所生。不能無有餘不足之相礙也。若今人之患大腸祕澁。忽五六日。忽十日。出後不通。小腸虛憊。日夜五六十

次。每次小便。仍有一盞半盞已來。其清如水。忽時黃色。臨小便時。其痛難忍。甚則心神煩躁。此肝心脾肺四藏之毒熱有餘。而腎與小腸主氣不足也。脾肺心積熱。則腸乾澁。腎與小腸虛憊。則水道滑。肝心積熱。則其血沸溢。甚則血黯黑。熱毒之氣。如煙如霧。鎮在中焦。因其小腸虛憊。水道乘虛。只行於小腸。此所以小便雖清。其痛難忍。其病有似於淋。而非淋疾。天下物理。有似是而非者。正謂此也。醫者治之。投暖藥以固小腸。而則滋其肝心熱毒之氣。而痛愈加。下涼藥通大府。則藥隨水道。只行於小腸。而病愈盛。冷熱之藥。俱難以進。此有餘不足之相礙也。治之之法。當以通氣藥爲湯。洗其穀道。先引其五藏之氣。歸入於胃。使其湯水稍隨氣而下入於胃。第二度。使水漸取得一兩箇下氣。相次如藥取得些小乾糞。氣歸大腸。所餘湯水。亦隨氣行。歸入大腸。則未喫小腸氣藥。而小便自止也。漸次使藥通其肝心熱毒之氣。使出後。稍通便下藥。取其熱毒所取下物。如半腐爛者。淤血之類。如此。然後得其病根之消滅也。所下之藥。具在方中。此謂治其不足有餘之相礙也。吁。醫術如林。余之所得。芽孽而已。醫道如海。余之所得。涓滴而已。因其所得。雖無寸長。豁其用心。實非古人之形於筆舌者。今略舉數條。論之於前。以明醫道之大略而已。

涎論

論曰。舟非水不行。然波濤沸溢。則覆舟之患生。人非氣不活。然痰涎併積。則傾人之患至。波濤非自生也。其所以生者。不平之勢作之也。痰涎非自積也。其所以積者。不順之氣留之也。故善行舟者。不懼波濤。而懼舟之不完。善攝生者。不懼痰涎。而懼氣之不順。故世人之疾病。其所以殘傷性命之急者。無甚於痰涎。而世之醫者乃有見之而不能識。忽有識之而不能治。此不幸之人。其殘傷天橫者。不可勝數。何則。舉天下之人。獨知風氣之有涎。不知藏府冷亦生涎。熱亦生涎。痰涎一生。千變萬化。而病之所起。非特一端。愚今略舉數端。明之。後之學者。於診療之際。類而推之。亦庶幾其疾病之徒。無天橫者矣。夫涎之爲名一也。而具數種。一曰風涎。二曰熱涎。三曰冷涎。四曰病涎。五曰虛涎。六曰毒涎。其一曰風涎。蓋因人之風氣之盛。上逆於涎。不能下入於胃。風氣一蒸。痰涎併起。而上塡塞胸中。卽使人悶倒無知。其風氣久而不順。性命之傾危。速如反掌。若其風氣未盛。逡巡之間。仍復自順。其涎亦隨氣而下。卽平復如故。此蓋人之肌肉厚。湊裏深。風不得泄於外。風熱內攻。大府祕熱。毒氣上攻。遂生斯疾。此名之曰風涎。然風涎之爲名一也。而人藏府虛實之不同。則涎之爲病也。變化不一。愚得以命其變而言之。若今人之病。大府實熱。痰涎滿口。吐如清膠。胸中喘息如常。但湯水飲食俱不可進。凡所飲食。只到喉中。卽不能下。用力嚥下。卽喉中隔絕。喘急悶倒。良久方蘇。惟進得些小膠粥。此亦風涎之候也。然風涎之候。變不同。則當如何而治之。曰。善除荊棘者。先斷其根。善治風痰者。先順其氣。人身無倒上之涎。天下無逆流之水。今風痰一上。而塡塞胸中。傾人性命者。風氣逆而上也。今之治風涎者。多使天南星、半夏之類。是不知病之源流。去荊棘而不除其根也。苟能以藥先順其風氣。兼發其湊理。使其風氣得以發泄於外。順行於內。則其胸中之痰涎。自隨氣而下。未喫涎藥。而痰涎自順矣。然病勢之有輕重。則取之有緩急。若風氣炎盛。膠涎併起。其氣卒難以順之者。當制之以急。非吐之不可。風氣未極。痰涎未併。爲害未深者。當制之以緩。先順其氣。而後治其涎

也。此亦治涎之大約也。然風涎之候。又有冷熱之不同。或有寒風所中。冷涎所聚。其人必先於半年或數月前。喫食減少。身體沉重。筋脈痿弱。才見肉味。便覺惡心。非時口中一兩點冷涎出。身不自覺。冷涎所併。忽悶倒不知人事。良久復蘇。卽生麻痺。或失音不語。冷涎所積。少有上併。多聚中焦。盈溢胸中。包裹心絡。能使人狂言妄語。神識不定。非特不覺手臂忽自舉動。如此爲冷涎之所中也。治之法。先以溫暖之藥。散其冷毒之氣。急以熱藥。發其勝理。然後以治涎之藥。取下其涎。雖且暫安。而寒風所中於人。亦甚不久。何則。熱風中人。如天地春夏之風。長含生氣。以發萬物。其人雖病難死。此古人所謂風所以能發人也。寒風所中於人。如天地秋冬之風。長含殺氣。以肅殺萬物。其人所中。非久必死。此古人所謂風所以能害人也。其二曰熱涎。若今有取性之丈夫。多飡葷膩。好食鹹酸。以色爲心。恣貪補藥。忽因醉酒房室。勞傷其精。丹元髓海。雖以空虛。而藏府骨膽。虛熱轉盛。其涎所積。隔在中焦。因其腎藏之虛寒。邪氣與熱涎相交。發爲疼痛。重則不移時而傾人性命。醫者治之。不過曰。此肝腎之氣。是不知熱涎乃病之根本。然京三稜、蓬莪茂。非能治氣。而世人用而不驗者。不識其病之源流也。善爲醫者。臨事制宜。隨機應變。審當輕重。涎多者吐之。涎少者下之。所用之藥。偏取肝家之風毒。又何患乎人之不安哉。三曰冷涎者。若今人之肝藏有餘。脾氣不足。忽因使性。長懷淤怒。傷損肝心正氣。此冷涎之所以積也。脾氣不足。復因肝氣所乘。伏而不動。停水滯穀。久而不化。肝心長懷淤怒。則其氣滯澁而不行。此冷涎之所以積也。然肝生風。性之不定。忽時而作。肝主怒。怒則氣逆。此冷涎所以隨氣而上。而生人之大病也。證其候而言之。則其病必先悶心前滯亂不快。相次卽有一物。隨氣而上。觸至咽喉。卽悶倒不知人事。手足肌肉。漸次寒冷。逡巡復平愈。治之之法。當以吐藥取之。得其所取之涎。其清如水。其冷如雪。取涎之後。復審其藏氣。隨其所病。而調和之。亦無患乎藥之不驗也。四曰病涎。其人必好食堅硬之物。傷損脾氣。忽因淤怒。傷損心肝正氣。忽因寒邪熱毒之傷。忽因大病之後。餘毒客在藏府。其氣結澁昏滯。不能宣暢。是以痰涎因而聚積。涎與滯氣相交。往往發爲疼痛。此名之爲病涎者也。明其病證。在心前痛。輕則連年累月。痛無暫停。重則傾人性命。速如反掌。重輕之殊。涎之多少也。治之之法。當在盡其病勢輕重。以利藥取之。輕則其涎如油。重則其凝如白膠。取涎之後。然後使藥清其藏氣。益其正氣。使之平復如故也。五曰虛涎。其人必因受氣之虛。忽因大病之後。生冷所傷。忽因疾病之間。淫慾不節。致令藏府之氣。空虛羸乏。而骨膽之間。虛熱上蒸。上氣鎮長。有餘下氣。但當不足。陰陽之氣。不相交際。不順之氣。隔在中焦。是以虛涎因而積聚。風熱一攻。卽其涎併上。初發作時。先覺滯涎滿口。漸閉心前。有一物。上觸咽喉。卽喉中急促。悶倒不覺。兩手相亂。把拽風氣極上。卽頭上痛。忽皮膚間痛。逡巡風氣順下。乃遂平復。治之之法。當以臨發時。使五分利藥取之。以其胃氣不足。不可十分利吐也。若利吐不出。非時以壞風涎藥攪之。候分數少減。卽於氣海上安之一炙。引其涎下入於胃。然後使藥調其藏氣。酌量其藏府之虛實。有餘者瀉。不足者補。令上下之氣相等。可庶幾其全安也。若脈氣微細。大府虛冷。減其肝氣。益其胃氣。斯可矣。若小兒得病者。全是胃氣之虛。氣海上安炙補脾胃。以愈斯疾。仍不輒喫取風涎藥也。六曰毒涎。若今人之患陽毒傷寒。肝心脾肺受其毒毒之氣

因其毒涎相積聚在中。候其證。卽使人大府祕熱。小便黃澁。面色黯赤。渾身發熱。昏昏如醉。狂言妄語。不知人事。如此之候。悉皆是涎。診其脈氣。又却沉伏。重手取之。骨間乃得。此乃疫毒之涎。盈溢心胸。伏其脈氣。非脈氣之與病相反者也。此所謂毒涎者矣。治之之法。急以疎轉之藥。取其毒氣。蕩下其涎。所下之藥。須心肝脾肺四藏俱治。然當以肝藏爲主。偏下肝藏之藥爲要也。雖然。涎之爲病。千變萬化。其狀不一。是今之所舉數端。止其大略而已。後之學者。類而推之。加以識見之明。而診療無差。亦無患乎涎爲人之大患者矣。

治涎諸方

凡人得只有此方內一件一句病證。皆可喫此藥。

治一切丈夫婦人風涎所積。非時急飢。見食卽飽。心中嘔逆。一切飲食。都不聞味。口中涎溢。唾如澱膠。急卽吐逆。食不住腹。面色青黑。肌肉乾燥。唇皮焦赤。忽時黑色。兩脇下氣跳。忽衝脇下跳戰。轉入背脾痛。遍身肌肉。忽時跳戰。兩臂沉重。忽如有物壓者。夜間都睡不着。忽如有物上觸咽喉。卽昏悶不醒。須臾仍却無事。忽時如有物繩繫腰背。忽時有物橫在背上。腰背疼痛。忽滿口生瘡。忽時下赤糞。忽時泄瀉不定。頭上躁熱。小便赤色。通身發熱。眼色勁急。忽時心躁。熱上攻胸。額發汗如水。忽時項上皮肉間疼痛不可忍。忽時心前脇下迸重。如懸一片物。忽間重處非時麻痺。忽身上肌肉結塊連綴。疼痛不安。忽時頭面小腹兩脚都腫。若是婦人。連陰門腫。忽起兩眼迸痛。視物不明。若有此候。月水不行。通得月水。方爲安校。忽時間在兩脇下起。衝入胃管。上築咽喉。昏悶不安。須是開口仰項吐氣。方得稍快。忽時如有亂蟲咬心肝。不可眠臥。忽時間氣在手指足指甲起。相次聚入胃管。卽便大發熱。昏絕不醒人事。須吐氣千百聲。良久方蘇。如此。是藏府有積毒風涎之所致也。凡人不安。有此內一件病證。皆可進服此藥。但論輕重。加減服餌。喫此藥後。四肢八節。肌肉毛髮俱軋軋然有聲。卽藥之驗也。此涼藥也。喫後。大府反熱。卽取病之證也。此病有根。受之太深。此藥不輟進服。徐徐減病根。若病勢濃者。急炙肝俞。減其風氣。若是大府結澁。更添下而藥數味。喫安校。若是太歲過六壬丁卯、己亥之年。常有此候。己巳、己亥年。其病尤甚。若過己上年辰。雖無病之人。亦可喫此藥。免得生病。

治風氣取涎方

荊芥穗　麻黃去根　薄荷
連翹　防風　獨活
木香　乾蠟　僵蚕去絲嘴三分
半夏三錢　山梔壹分　羌活
芍藥　牽牛半兩

以上細擣爲末。每服貳錢。食後。煎生薑薄荷湯調下。和滓服。若是大府祕熱。膠痰滿口。喉中嚥藥不快。只請去滓喫。候風氣少利。卽和滓喫也。若是大府祕不出。後卽用大黃壹分。半夏三銖。牽牛一兩半。其三味擣羅爲末。作一處。每服用上面藥末三錢。牽牛等末三錢。共計六錢。滴熟水丸如梧子大。爲一服。巳午時葱湯下。大府尚不通。忽穀道中通糞不下。卽用皂角、牽牛二味。擣羅爲細末。雜管盛。內於穀道中。吹之。

去指甲用指頭穀道中撥取乾糞下也。

痢論

夫痢之爲病世人所患者多然方册所載者未嘗有必驗之方古人所談者未嘗有卓然之論服餌之即世人夭橫者莫知其數此聖人名方爲大奇後之學者不能思而自得之也若今有人得一名方自以爲神傳聖惠應効不測然有一人服之而減未可謂其必然之驗也此愚以方册所載者未嘗有必驗之方也以赤爲熱以白爲冷醫者之辭萬口一說此愚以爲古人所談未嘗有卓然之論也何則以赤爲熱以白爲冷赤白爲冷熱不和獨知大腸而痢之有變化重輕之別得其粗而不得其詳知其一不知其二者矣夫痢之爲痢一名而具八種一曰白痢二曰赤痢三曰赤白痢四曰水穀痢五曰血痢六曰疫毒痢七曰休息痢八曰小兒疳痢此皆受之不同治之不得不異索其詳而論之則其痢之爲病雖變化重輕之不同然一歸之脾氣之虛而已。

萬物非土不生五行非土不載五藏非脾不養脾者中州之土能化腐水穀殷滋味於肌膚行糟粕於大腸脾藏溫和而諸藏之有冷熱不調即自生他病不爲之痢也是故赤痢雖熱本因脾腎之虛赤白相雜雖爲冷熱不和而又有重輕之別若今人之下赤痢先轉數行而後有赤痢之變若以赤痢爲熱何乃有先轉之說歟以赤白爲冷熱不和而復有赤少白多赤多白少能無重輕之別乎此病有變化之不同予得以命其祖而言之也一曰白痢者五藏傷冷脾胃極虛之所成也其得之重出後如雞卵清如魚腦漿者腎有所傷也急以補脾腎藥以暖之加以船上硫黃丸無問多少空心即服以止爲度蓋病勢之重治之不可後時也二曰赤痢者三焦之熱血有餘而脾腎威寒之所成也夫肝心積熱之人多食生冷愛喫涼水口之所納都聚於脾腎寒溫之氣所傷而肝心氣變血損於中此肝心之血乘脾之虛滲入大腸而赤痢者也先服解寒氣藥次喫變脾藥其治之如反掌爾三曰赤白痢者心肝血損而脾之與胃藏腑皆虛之所成也脾氣之虛則肝氣和乘胃氣之虛則停水滯穀凝而爲涕肝氣乘脾氣則肝心之熱血乘脾之虛滲入於大腸與胃中之涕相雜而下此所以爲赤白也忽有赤少而白多忽有赤多而白少忽有赤白相等此受病有淺深下藥有輕重當在臨時度宜隨機應變不可差之分毫也愚初以謂赤多而白少者消利肝氣而輕暖脾胃也白多而赤少者微消肝心之氣而甚暖脾胃也赤白相等者微利肝心平益脾胃氣而自愈但發寒熱爲最重方見痢方中四曰水穀痢其人多飲涼水忽發生冷之所成也所下之痢悉皆黃色忽時下白沫治之之法補暖脾胃而其疾自愈五曰血痢其人多淡怒因更相毆擊忽因焦熱梅驟食生冷脾胃損虛之故也所下之痢多黯赤色無寒熱者消其肝心之氣而疾自去矣六曰疫毒痢者毒氣所傳一坊一境家家戶戶更相染易無有不病凡下痢之時忽先發寒熱忽先轉數行忽生冷所傷因而下痢所下之利渾是赤色濃如膠漆忽時半盞下濃血腹中刺痛忽心中煩躁三焦否隔全不思食此名爲疫毒痢也然則疫毒所主五藏從何而得輕言春若傷陽夏必人多瀉痢此疫毒之根先受之於肝也夫春氣本和而反傷於熱此陽氣所勝肝家受熱而其氣有餘者也經言五行受病必先傳其

所勝則肝之得病必先傳之與脾而世人於夏月之間多食生冷傷損脾氣脾氣虛肝邪得以乘之而脾受肝邪伏而不動莫能消水化穀此疫毒之痢必先轉數行而後有赤痢之變也先轉數行者脾受邪而脾已生病也後有赤痢之變者肝之血熱乘脾之虛滲入大腸而爲赤痢也中間忽有赤白相等者此肝之毒血雜胃中之寒涕也若發寒熱方見痢方中有白少而赤多或有白多而赤少肝之邪毒有輕重之不等也七曰休息痢者蓋患痢之人其治痢之時不能解肝邪而肝家餘毒之所成也脾藏久受肝邪則不能強健消化水穀是毒痢之所下纏綿久遠而不較此所以爲休息也八曰小兒痢者蓋小兒肝受熱而相刑於脾之所成也肝之刑脾則所下之痢全是赤色或赤白相雜至脾之自受病氣則骨肉消瘦所下之痢多黃涕白沫少有赤色相雜也如此數論亦治痢之大略而已至於醫道之淵微恐不能知其妙。

治痢諸方

治脾胃虛冷停水滯氣凝而成涕所下之痢渾是白涕宜喫此方初得痢時並無壯熱頭痛方可喫此藥。

船上硫黃一兩細研如塵

右以白麵一分鍋內炒令熟放冷於乳鉢內與船上硫黃末同研令勻滴熱湯丸如梧桐子大每服五十丸以止爲度空心溫米湯下若初得痢時即不可喫此藥

治脾胃氣冷相刑於腎土水相攻寒濕交爭所下之痢全是清涎有如雞卵清之類宜喫此方將船上丸相間服。

石榴去根　白龍　吳茱萸
草豆蔻去皮　芎　乾薑
防風各一分　訶梨勒逐箇顆火炮熟去核只使皮新半兩

右以上細擣羅爲末煉蜜丸如梧子大早朝空心溫米湯下五十丸空心服有壯熱不請喫治三焦壅熱其血流散乘脾之虛滲入大腸而所下之痢皆赤色別無白痢相雜並不壯熱亦無心腹疼痛診其脈上都浮大脾脈多沈而沉大宜服此方候上焦氣清赤痢消減忽變成白忽赤痢減後却間得小腹迸脹即便斟合後方喫取平安。

麻黃去根　防風　麥門冬去心
木香　牡丹皮去心　蘭胡去毛
蒲黃四錢

右爲細末每服二錢食後熟湯調下去滓服候赤痢減忽變成白忽間小腹脹服宜喫此方

治赤痢喫前方了忽變成白忽已校可忽間小腹脹服即斟合後方喫也。

防風　甘草炙各一分　芎半兩
訶梨勒逐箇顆火炮熟去核只使皮半兩
木香三錢

右爲細末每服一錢半水一盞煎取九分空心和滓喫。

續斷
蓯蓉壹分
牡礪一分火燒通赤

右以上細擣爲末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心服有壯熱不請喫治三焦壅熱

獨活
荊芥穗各一分

治水穀痢。所下痢非無赤色。只下黃涕。忽時下白沫。飲食減少。肌體黃瘦。宜服此方。

阿子（細剉。火煨熱。去核。只使皮。一兩）　黃橘皮　白朮　茯苓各半兩
甘草四錢　肉豆蔻一箇　舶上硫黃一兩（細研）

右搗羅爲細末。用舶上硫黃相和。令勻。用薏苡仁作粉煮粥。丸如梧桐子大。急火焙乾。每服五十丸。空心。溫米湯下。須是焙乾。莫令損藥氣。治赤痢。所下之痢。渾是鮮血。忽有黯色。據候。多因使性瘀怒。傷損肝心正氣。忽因爭打。傷損經絡。致有斯疾。

桑寄生一兩　獨活　木香　甘草炙
芎　牡丹皮（去心。各一分）

右爲細末。水一盞。煎取八分。非時喫。每服二錢。

治疫毒痢并論（痢藥。須子細對證用之。取效如神。大抵此一篇方。無不精妙。但要病證相對。）

凡疫毒痢。一方一境。家家戶戶。更相染易。無不病。緣疫毒之痢。非獨一般。證候多端。根源奇異。雖神醫岐伯。尚以爲大奇之病。後之學醫。未識其粗迹。豈知其津涯。但言白痢爲冷。赤痢爲熱。赤白爲冷熱不和。不知有何經證。以白爲冷。偏下暖藥。幸亦無差。以赤爲熱。不知熱從何藏。愚者妄言。不過曰熱從肝心。因何無涼肝心必驗之一方。定治赤痢以行於世。以赤白爲冷熱不和。又不知指稱何藏。愚者妄言。不過曰冷熱氣不和。復不知因何無和氣藥一方。定可用治赤白痢以存之方册。醫家自不知病在五藏。從何而生。只務檢方行藥。幸而偶有所中。人且獲安。不幸而差之毫釐。所投之藥。乃暗中與戰。但病者不見痕迹。所傷無能知覺。觀之得不寒心。吁。神農之後。世世學醫者。未明天地之氣候。不識五藏之廟變者。不能知當病之源流。豈足與語奇病之變化。是以痢之一病。方册所載。古人所談。未嘗有一言一句略明其相。予嘗探尋五運之氣數。稽諸天地之變化。推步六氣之行度。參考脈氣之輸注。以天驗人。以人應天。痢之一病。億萬分中少知其一二。但以其變化之間。獨可神悟。難以言宣。筆舌之間。不能曲伸其旨。使後學者洞識精微。而無悟人之性命。深以爲恨。今但子細陳其粗迹。以爲後之醫者。鑒跡在詳審而用之。適足以知我之用心。誠爲愛人之切。爾經言。春若傷陽。夏必久多瀉痢。此之一節。無問太歲。但一春之間。早有炎炎暄熱之化。至於夏月。忽生瀉痢之病。通其肝氣。其病即愈。但兩三盞無驗。更不請喫。若少有效驗。喫之以較爲期。蓋痢之一病。證候多端。藥中其源。即便安校。故無在於多喫也。切慮世醫誤認證候。妄投藥餌。以傷性命。但患痢之人。所喫之藥。兩三盞不見効驗。更不請進服。今自有方。具其變之候。備別于下。更在詳擇而用之。永無差誤。緣疫痢之狀。變證多端。予請以太歲推之。

子午之年。君火司天。土性生金。火性制金。土火交生。濕蒸相搏。則宜其土有所潤。火有所潛。火氣見鬱。心氣內傷。乃生赤白血痢。寅申之年。相火司天。土火並化。氣味交通。與此同候。丑未之年。太陰司天。土化流行。土火交通。濕熱並至。子母同化。性不相伴。溫濕攻心。脾鬱。心氣內變。血淤於中。注下赤白。且子午年、丑

未年、寅申年。土之司天則異。而氣化之生病則同。何也。答曰。夏秋相交。火金相雜。土之一氣。常遊於其間。土有所潤。暑有所潛。然後金生。是以火土二位。氣位交通。事理相混。其所以司天之歲雖殊。相鬱而生痢則一也。方見下。卯酉之年。陽明司天。金行其令。氣化淒清。人少脾病。六月七月。水火相犯。八月九月。金木相攻。水之與木。一化有餘。赤白下注。從此而生。是歲君火司地。少陰在泉。火能制金。一旦於歲中火淫所勝。焰明郊野。則化來救。變更作人病。赤白在下。己亥之年。少陽在泉。相火司地。與此同化。然君火之化善。相火之化惡。善則傷人遲。惡則傷人速。治同法。方並見下。

辰戌之年。太陽司天。水化流行。寒邪犯心。血氣內變。傷損於中。因而下注赤白。此病世之罕有。蓋傷犯人之急也。但

辰戌年之痢。發熱如火。當痛。所下之痢。如紫草水。如膠涎。如茶脚。不急治之。其亡也如反掌。方並見下。

己亥之年。厥陰司天。木化流行。土木相交。風濕相爭。脾土受邪。此肝之熱血。乘脾之困。滲入大腸。而生赤白瀉痢之病。方見下。

已上天地氣候。推之未詳。予請以五運之政推之。

甲子、甲午。濕化有餘。丙子、丙午。寒運太過。庚子、庚午。上受天刑。必有水救。已上年辰。天地相遇。剛柔始交。月氣是水。與天相犯。水火相持。以爲一病始。更遇寒濕之運。與水相助。忽受刑之運。有水相救。已上年辰。歲半之前。多有清肅之化。至於夏月。氣候反寒。熱交爭。乃生赤白之痢。爲此寒濕犯火德之與常例不同。自有方在下。子年爲甚。而午年少減。若寒化偏多。陽化少與。乃生寒瘧傷寒麻瘧之病。痢疾乃加。戊子年。土爲天符。戊午年。天符歲會。氣以之詳。人以之寧。一旦寒濕之氣少犯於心。忽注下赤白。人多患暴死。有此證候。治之亦與丙申年同。議者謂戊子、戊午年。天氣運氣皆是火。今乃言忽有寒濕犯心。何也。答曰。己午之上。有戊己之土。當有寒濕之化。與火相持。然後使金得而生。此戊辰、戊午年。亦疑有寒濕之化相犯於心也。經言。中執法者。其病速而危。中行令者。其病徐而持。中貴人者。其病暴而死。蓋以此也。

壬子、壬午。木運相助。風熱大盛。木能制土。脾乃受邪。若此歲中。忽有大風發熱之勝。人生瀉痢之病。其鬼在肝。方具於下。然子午之歲。地之初歲。寒邪與天相爭。丙丁之位。與戊己共居。若於歲中反有寒濕之多。所生之痢。治亦與甲子、丙午、甲寅、甲申、丙寅、丙申、戊申、庚寅、庚申、壬寅、壬申年。氣候大約與子午年同。所生之痢亦同。法方並見下。

乙丑、乙未、丁丑、丁未、己丑、己未、辛丑、辛未、癸丑、癸未、己上年辰。每一年之運。各管三氣化。乙丑、乙未。金運本涼。以其氣之不足。反與少微同化。然火土交味。太陰所寓。熱化並行。濕熱相持。心氣內鬱。血損於中。注下赤白。忽火之不常其德。侵傷其不足之金。則水必相救。寒邪犯心。因而生痢。此乙丑、乙未年之痢。忽有以土之鬱火而生。忽有水之犯心而成。其受病臟腑雖不同。然土水其胞。寒濕同化。則其治大同而小異也。方並見下。經言。其運涼熱寒。蓋以此矣。向下准此而推。

丁丑、丁未。木運正風。與天土相犯。然以氣之不足。反與少商同化。若於歲內。金之不常其德。多有清肅之

化，則火必相救，炎暑將至，與土相持，而濕熱相交，血氣內損，乃注下赤白，然丑未之年，天能制色，土將犯水，木雖不足，而其怒無時，忽若風化大來，土木相戰，則肝發傷脾，此丁丑、丁未年之痢，忽起於肝，忽生於脾者矣。方見下。輕言丁丑、未之年，其運風涼熱蓋以此也。

己丑、己未年，天符歲會，氣以之詳，物以之寧，人以之安，然太陰之味，先苦後甘，氣化相交，土性生金，火性尅金，忽於歲中，火土相攻，心血內變，痢疾所生，人多暴死，此蓋邪之不可侵傷於貴人也，方見下。遇此年辰，當喫調和脾氣藥，以安貴人，是服食之宜也。

辛丑、辛未，水運不足，雖上受天刑，然下加太陽，反歸乎氣，是歲天土地水，寒濕偏多，火氣見鬱，若有痢之疾生，其起在心，其鬼在於脾腎，方並見下。

癸丑、癸未，火當其運，其氣不足，反與少羽同化，是歲太陽在泉，寒氣不減，寒濕更作，火氣見傷，痢之所生，其病在心，其鬼在脾腎胃，方並見下。

寅申之年，大約與子午年同，但相火之政暴，過其獨勝，則其害立至，若與水土相犯，其候變證多端，方具於下。

乙卯、乙酉年，金運不足，木與少微同，然乙在卯上，為天符，反歸乎氣，在酉上，為三合，名曰貴人，邪不可犯，然是歲金位在上，火位在下，名為逆化，金燥交合，切忌火氣之勝，若火有所勝，水必來救，此年忽有痢疾之生，天氣炎熱，病起於心，氣候清寒，病起於腎，方具于下。丁卯之年，木運不足，下加於卯，雖上受天刑，其政不減，是為歲中，忽有風熱之勝，痢疾之生，其鬼在肝，乙酉之年，木受天刑，然是歲火司於地，與木相得，忽於歲中反有風熱之作，方見下。

己卯、己酉年，土運不足，然木受天刑，必難相犯，忽於歲中風濕交爭，痢之所作，其鬼在脾，卯年宜有此候，酉年差減，若有此疾，治之亦同。辛卯、辛酉年，水運不足，反與土同化，而歲水不及，火化妄行，與土相持，勝熱客於胃，多下赤痢，忽作便血，土勝則溺火而注下赤白，是歲若有痢疾之生，一起於心，一起於脾，有方治之，具見於下。

甲辰、甲戌、丙辰、丙戌之年，寒濕過多，火氣見溺，庚運之年，清化亦甚，是歲運氣與天水相生，與地土相得，已上年辰，痢疾之生，切為大害，不可妄投涼藥，戊辰、戊戌之年，水火相戰，壬辰、壬戌之年，土木相攻，所生之痢，其證自各不同，方具於下。

乙巳、乙亥之年，金運不足，無能與天相犯，乃與少微同化，丁巳、丁亥之年，上為天符，木化之甚，己巳、己亥之年，木能制土，脾將受邪，辛巳、辛亥之年，水運不足，與土化同，土木相攻，脾氣偏弱，癸巳、癸亥、不足之火，與天相得，與地相符，火致政不減，是痢疾所生，起在肝心，方並見下，以運言之，猶且未足，予請以六氣推之，子午年、丑未年、寅申年，四月、五月，火土相交，辰戌年，四月、五月，水火相犯，巳亥年，四月、五月，木土相攻，卯酉年，四月、五月，金火相持，水若相救，邪乃犯心，子午年，六月、七月，土火相鬱，卯酉年，六月、七月，水火相犯，辰戌年，六月、七月，土木相攻，己亥年，六月、七月，火土相持，已上年月，忽生痢疾，皆隨其月氣，

相攻而成也，舊為醫者，先治其鬼，其病自愈，識者謂六氣推遷，於十二月中各紀一步，今獨舉四月、五月、六月、七月，兩氣以言痢疾，何也，答曰，夏秋相交，火金相繼，土水二化，長遊行於其間，土寄於巳，所以生金，火位於申，所以制金，土生於申，所以傳金，水生於申，所以救金，然後夏秋有相承之理，五行六氣，玄妙從此而著，人之痢疾，從此五行玄妙中生，是故聖人名之曰大奇之病，予故陳逐年四月、五月、六月、七月之氣候以言之，其餘他氣生痢，皆倣此而推，切以六氣之政化，見之未詳，予請以脈候明之。

若令人之下痢，服涼藥、暖藥，皆不驗，診其脈，脾一指外鼓而沉，此名陽濯，其候非藥力可治，久當自較，但世人有患不驗，綿經久，却因亂喫一般物，使得安校，此乃正腸濯之候也，今有患痢，診其脈，肝脈一指小而緩，此病輕，治即愈，今有人患痢，診其脈，腎脈一指小而沉，所下之痢，皆是血痢，此之一病，受之非常，治之亦難，血溫身熱者死，方亦見下，今有人患痢，診其脈，肝心脈、脾脈，皆微細，不濟不絕，所下皆是血痢，藥到便安，今有人患痢，其脈微小，再三尋之，又沉而濇，此之一候，若下白痢，其勢雖重，庶幾可治，若是下血，切忌發熱，通身發熱者死，熱見七日死，已上所陳，雖未足以達痢之淵源，亦足以明其粗迹，識者謂，如子所言，自甲子至於癸亥，每六十年中，未嘗有一年不生痢疾，今世人患痢疾，於數年中間，忽止有一年，其故何也，答曰，六十年中，未嘗有一年無水土相攻，未嘗無土火相鬱，未嘗無水火相犯，但五運之政，譬如權衡，一年間五行氣數，更相承制，得其平等，則其疾自然不作，忽若一氣大過，一藏有餘，痢疾之生，蹤不旋踵，予故備陳其粗，以開後學之未悟，庶幾診療之間，無差悟之過者矣，但諸病傷人不一，惟水邪犯心為重，世人初患痢時，先發寒熱，投藥治之，其勢不退，發熱太甚，食則嘔逆，下痢不止，心熱如火，只要入涼處，只思喫冷水，狂走，渾身肌肉疼痛，著手不得，此候，十難治其三四也，治疫痢方，須是子細首尾讀此方論，令分明，識病根源，然後喫藥，但諸痢初得時，先發寒熱，忽頭痛，忽狂熱，忽轉數行便下，赤白相雜，忽止下白痢，忽先下白痢，後變成赤痢，忽先下赤痢，後却變成白痢，宜喫此方，但初下痢時，先發寒熱頭痛，即是寒邪犯心，寒氣犯心，水火相戰，故初得病，先發寒熱，水火相犯，血變於中，所以多下赤痢，如紫草水，如苴菜水，無色澤者，寒邪犯心之重也，先發寒熱，而所下之痢止白色者，寒邪犯心之未重也，先下白痢，而後有赤痢之變者，寒邪犯心，其勢漸加也，先下赤痢，而後變成白痢者，寒邪犯心，其勢漸減也，赤白相等者，□水火相犯，其氣相等，寒濕之氣相搏而成也，忽有赤少而白少，此寒邪之勢有多少，毒痢之病有輕重，以白多為輕，以赤多為重，治之之法，先奪其寒，則所下之藥一也，以太歲分之，則丙子、丙午、甲子、甲午、庚子、庚午、丙寅、丙申、甲寅、甲申年，與寅、庚申并辰戌之年，運過，丙申及庚運所臨，其害尤甚，及丑未之年，宜有此候，又更撫問太歲，蓋天地變化，其候多端，難可窮盡，今立此方，但世人亦不必拘定太歲，但看一年中春夏之內，多有寒鬱之化，陽光少見，忽寒熱二氣更相交爭，忽於夏月多寒濕之化，寒邪犯心，所受之痢，先發寒熱，忽頭痛，忽先轉數行，後有赤痢，忽赤白相雜，忽止下白痢，並宜喫此通神散，喫後取壯熱減退，若兩三盞後，壯熱不退，更不喫此方，自別有論方在下。

麻黃（去根節）　官桂（去粗皮各三分）　甘草（各一分炙）

白芷各一兩　細辛八錢　獨活　桔梗
防風　芍藥　白芷各半兩　牡丹皮去心
牽牛四錢炒

右為細末，每服二錢，非時，熱湯調下，和滓熱喫。若喫三兩盞後，寒熱不退，更勿喫，自別有方論在下。若喫此藥後，寒熱已退，赤痢已消，便修合第二、第三方藥喫之。取安穩，若寒熱已退，赤痢未消，更服三兩盞，然不可多喫。一日只兩盞，候赤痢消，方修合第二方喫。候出後，度數減少，便修合第三方喫。取平安也。但六甲之年，六庚之歲，春夏之內，時氣多寒，人得痢疾，此藥通神者是。六甲之年，丑未之歲，濕化偏多，人得痢疾，先發寒熱，即於方內添草豆蔻一兩修合也。又不問太歲，但一年間，春夏之內多寒，人有痢疾，先發寒熱，並宜喫此方。治毒痢初得時，先發寒熱，喫前方藥，寒熱已退，赤痢已消，宜進此方，還氣散。若喫前方藥，寒熱未退，赤痢未消，更勿進此藥，但天地變化，其候非常，痢疾體候多端，此不得不盡子細故聞。

阿子五箇，用細麵火炮熟，不要焦，不要焦得所去殼，不使砂熟，咬開子破，去核不用，只仰皮焙乾。

右為細末，每服二錢，以米湯一盞半，同藥煉取一盞喫。若吐出一兩口涎，便住，如喫經數盞，大腑漸安，出後減少，便修合第三方藥喫。以牢固大腸，還復真氣，前方藥壯熱未退，血痢未減，不請進此藥。治毒痢，痢喫前兩方藥，病勢已減，所下之痢，止餘些小，忽清糞，忽如鴨糞，忽如茶湯，如濁油，忽只餘些小，淺深紅色，宜喫此方，以牢固大腸，還復真氣。

舶上硫黃一兩，去沙石，細研，如飛面。

右以蓽茇仁二兩，炒熟，擣為末，與舶上硫黃相和勻，滴水相和，丸如梧子大，空心，以米湯下五十丸。治毒痢，初得時，先發寒熱，服前面毒痢方，通神散三兩盞，一日，忽隔一夜，寒熱不退，下痢不減分數，通身發熱，所下之痢，多是濃涕，如桃花色，如紅米膠，每一次忽下一盞半盞已來，喫此藥二盞、三盞，經一日，忽一夜，寒熱不退，下痢不減分數，更不進此藥，若依法將藥兩盞，壯熱便退，下痢少減分數，即請漸漸進此藥，每日只兩盞，候赤痢稍減，忽變成白痢，却修合上面還氣散，喫取平安，且痢之有寒熱，其證一也。前方以發藥解之，此方以涼藥投之，其說何也？答曰：水邪犯心，身能發熱，土濕鬱火，身亦發熱，肝熱刑脾，身亦發熱，惟至精者識其秋毫之變，切恐世人未能通其妙旨，予因設此兩方，以救其失。然毒痢之傷人，惟水邪犯心最為極重，但患痢疾之人，有增寒壯熱，先喫上面通神散兩三服，寒熱不退，下痢不止，然後進此藥，以太歲分之，惟六壬、六戊、寅申巳亥之年，宜有此候，而六戊之年，尚有差變，蓋火盛之年，必有寒濕相犯，故然。以六氣推測不定，又不可局定年辰，但一年之間，春夏之內，熱氣偏多，濕化不舉，人有痢疾，肝脈弦，心脈洪，然後喫此藥，若喫兩盞後，不見效驗，更勿進服，蓋痢之所起，切忌水之犯心，不可妄投涼藥，故此方兩盞後無驗，更不可服。

荊芥穗　牡丹皮去心　木香　白頭翁

芍藥　桔梗　防風　獨活
地榆各一分　貢連煨令黃，使三分　牽牛炒一分

右為細末，每服二錢，水壹盞，煎一二沸，急瀉出，食後溫和喫之。此藥少見效驗，更可進服，以安為期，然不可多喫。一日只兩盞，痢才住，便得止。

治毒痢初得時，發寒熱，微有小寒熱，忽止，腹痛，出後時，糞後有少膿涎，與赤痢相雜，却自飲喫涼藥，漸漸下，痢極多，皆是清涎，與赤痢相雜，通身發熱，不思飲食，渴身肌肉，着床則痛，據此候，宜當喫此藥，但身體大熱如火，與人相近，則熱氣逼人，其脈輕微，輕手取之，散漫指下，不分部位，全無骨力，指下如風如氣，重手取之，指下全無，急用鍋子五箇，炮熱，如下面法，擣羅為末，為一服，先用熱米湯調和滓熱服，吐出涎，脈氣方生，可進下面方。

白芷中兩　甘草四錢炙　阿子五箇，麵裹炮熟，去殼，研去核，用肉，焙乾。　芍藥　大黃各一分

桑寄生壹兩　防風　白芷　芍藥各一分

右為細末，每服三錢，熱陳米湯調下，和滓喫。

治毒痢初得病時，並無寒熱，所下之痢，全是濃血，忽黯血，左右三部脈氣皆微細，宜喫此方。

甘草四錢炙

右為細末，每服二錢，水一盞，煎八分，空心，和滓喫。

治赤白痢初得時，並無寒熱，忽患赤白痢，經久未較，別無增寒壯熱，宜此方。

淡豉十箇　黃連四十九枚，每枚一粒飯許

右件，用新瓶瓶一箇，安藥在內，以新片瓦蓋瓶口，大火煅通赤後，煙絕取出，就熱研如飛塵，每服二錢，熱鹽米湯調下，和滓服。無是赤白痢，無問赤多白少，但身體無增寒壯熱者，皆可喫此方。

治赤痢或赤白相雜，初得時，並無增寒壯熱，經及數日，身體不熱，只聞小腹內躁熱，下血不止，或止血便喫藥不見驗效，宜服此方。貢巾巳亥年、六壬之年，宜有此候，但喫百盞後不見效，更不請喫此藥，但腎皮赤，忽變黯色，小便黃白，身體涼，夜間則發熱，如此，即肝熱刑脾之證也。

荊芥穗　牡丹皮去心　白頭翁
芍藥　防風　桔梗各一分
牽牛炒熟三錢　木香三錢　地榆　黃連壹分

右為細末，每服二錢，水壹盞，煎兩沸，食後，和滓溫服。須是一年之間，春夏之內，風熱太甚，分明識其痢疾定是伏熱，方可進此藥。

治下赤痢身體並無增寒壯熱，此名肝心變辭。

黃連一兩，蜜浸一宿，炙令香熟　木香三錢

右爲細末，濃煎陳米湯調下二錢，食後，和滓服。

治赤痢不止，其脈反微小沉而又濇，其身熱者死，熱七日死，此候極危困，但喫上面通神散一兩盞，發熱便退，亦庶幾可治，便修合上面還眞散，船上黃丸，喫取安校若喫通神散後發熱不退，難治之也。

治忠赤痢赤白，忽因先寒嗽，後變成痢，忽因忠痢後，却變成寒嗽，但疾痢時，無問赤白，若有增寒壯熱，並宜喫上面通神散喫了，熱壯已退，便修合還眞散，船上黃丸，喫取安校，緣此證候，乃水邪犯心，治之不可輕也。

桑寄生半兩　地榆　芎　防風各一兩
人參　黃檗皮各一兩　甘草炙　木香各三錢

右爲細末，每服二錢，水一盞，煎取八分，和滓喫，服經數日外，仍修合，服益脾藥。

治小兒疳痢，所下之痢，多黃沫白涕，但髮稀面黃，服大，忽非時泄瀉，不成脫肉，宜喫此方。

使君子半兩，麩煨三度　白薇　肉豆蔻　草薢
訶子一兩，連麩煨，去核使肉　木香各一分
芎　檳榔

右爲末，每服一錢半，空心，食米湯調下，量兒大小服之。

治小兒肝受疳氣，相刑於脾，所下之痢，多是鮮血，忽是膿血，忽赤白相雜，宜此方。

防風　地榆　芎
史君子半兩，麩煨四五回，焙　木香　甘草各三錢，炙

右爲細末，每服壹錢半，非時或食後任意，煎點冷喫。

治痰嗽，益眞丸。

人參　黃耆　吳白朮各半兩
熟乾地黃六錢　鱉甲四錢　木香壹分
白茯苓　阿膠炒成珠子　當歸去苗　白芍藥
枳實一錢，炒　胡角刺各三錢　桑寄生二錢

右爲細末，煉蜜丸如梧子大，非時，清湯下三十丸，一日兩服。

治氣嗽腹結。

白朮半兩　人參壹錢　大芎
藿香　半夏　薏苡仁半兩　陳橘皮各一分
草豆蔻各一分　甘草炙　茯苓三分
厚朴三錢，麩炒　天南星二錢，炮

右爲細末，空心，水壹盞，薑三片，棗二箇，破之，同煎七分，去滓服。

治心氣動，肝脈虧。

桑寄生壹分　茯苓　防風
甘草炙　槐角　枳實各一分，炒
白蒺藜炒去刺　人參各半兩　白朮七錢，以性溫藥
右爲細末，每服三錢，水一盞，磨沉香少許，煎七分。

治精血皆虛，鹿茸丸。

血茸半兩，用麩炒炙　五味子　山藥各一兩，以上三件爲末
右煉蜜和作一塊，收藥合中，臨時丸，每服三十丸，食前溫酒下。

治肝腎氣虛，外應目不染，宜服此，足精丸。

好熟乾地黃細切焙乾九蒸，用酒蒸過者　當歸去苗　肉蓯蓉
人參　山藥各半兩　茄茸炙，去皮，七錢　白芍藥
川椒去目，一錢半　青木香　獨活　五味子六錢
白蒺藜　杜仲麩炒　菟絲子一酒浸宿　甘菊各三錢
大芎　肉蓯蓉各四錢　黃耆各半兩

右爲細末，煉蜜丸如梧子大，空心，濃煎糯米湯入鹽少許，下五十丸。

又服洗肝散。

天麻半兩，酒浸一宿，焙　白蒺藜去刺　天南星一分，炮各
黃耆　蕤仁　白芍藥各半兩
甘菊　甘草炙　人參各三分　木香一錢半
沉香研，少許

右爲細末，水一盞，薄荷二葉，磨沉香少許，同煎藥之時，取七分，去滓服，日進二三服，每服二錢。

補心氣，人參散。

人參七錢　伏神　山藥各半兩　芎二錢
黃耆　熟乾地黃各一分　防風一分半　白蒺藜去刺四分
官桂去皮，一分半　天南星炮過二分　白芍藥
甘草一分，炙
右爲細末，每服二錢，水一盞，生薑少許，煎七分。

司業六脈滿而不實，寸口倍於人迎尺脈，血濁而氣浮，宜清血抑肺氣，如此，即隔通而氣歸於下，不可服燥烈之藥，第一方。

人參七錢，好者　陳橘皮去白，一分半　白茯苓　麥門冬去心，三錢
桔梗　紫菀　防風各一分　黃耆
前胡　白芍藥各一分　木香一分半　白蒺藜去刺

桑白皮各半兩　甘草二錢炙　大腹皮半錢

右爲細末。每服三錢。非時或食後少時水一盞。磨沉香少許。生薑一片。同煎八分。初服三四服。覺膈快便不須服。却只常服丸子。候三兩日間。覺似藥。即進一服。此散子不常服。

又方

天麻酒浸焙　肉蓯蓉酒浸一宿　熟乾地黃好者　兎絲子酒浸一宿
山藥　梔子仁各半兩　草薢　茯苓
白芍藥各半兩　牛膝去頭四分　人參七錢　枳實一分麩炒過
木香一錢半

右爲細末。搗薏苡仁爲粉。煮作稀糊。丸如梧子大。陰乾。每日空心。濃煎糯米湯入鹽下五十丸。

治小兒腹中有氣不散。面黃府微澁。夜有盜汗。

史君子三錢　京三稜　草薢　白茯苓
鱉甲　人參各一分　黃耆炙錢　獨活二分
肉豆蔻二個　木香一錢半　甘草二錢

右爲細末。非時水半盞。煎二錢。煉取三分。去滓服。覺氣散。則已之。不可多服。

治小兒瀉。本因傷水。

訶子　白朮　白芍藥各一分　甘草炙
蕎麥　獨活　厚朴去皮各二分　黃連炒分

右爲麄末。煎一錢許。去滓服。水七分。煎至半盞。久便血。

黃連一錢半炒　白蕎麥去殼半兩　槐花炒焦　獨活
訶子炮取肉　枳實炒焦　荊芥穗　蓽澄茄各一分
木香一錢半　白芍藥三分　甘草二錢炙

右爲細末。食後水一盞。煎三錢。匕取七分。和滓服。或煉蜜丸如梧子大。清湯下三四十丸。無時日。一服或二服。

治小兒急慢驚風。

人參半兩好者　天麻炮　天南星炮　黃耆
芎各二錢　薏苡仁　獨活　伏神
蓽澄茄各一分　鱉甲醋炙黃　木香各半分　甘草炙分
半夏湯浸一錢半　乾蠍四箇全者用麩米炒米熟爲度　辟雲朱砂研

朱砂令研臨服入少許

右爲細末如飛塵。入朱砂麝香少許。每服二錢。同煎三四沸。與三匙頭。如更發數。即添麻黃一味。并煎服。不入麻黃。如大府冷。即添白芷末一二豆粒許。同煎。小兒藥宜服細末。取其氣液之全。唯是止瀉痢。乃作丸耳。

治血滯精虛。肛門痒痛成痔。

白歛　黃耆炙各半兩　槐花蘸炒
白芍藥　甘草炙　當歸去蘆各一分
枳實炒焦半兩　白蕎麥三錢

右爲麄末。非時水一盞。煎三四錢。匕取八分。去滓服。每日空心。先服鹿茸腎鹽丸。方在前。却日進三四服。以去痔根。初服只一二服。俟服青鹽丸及旬日。自然可截此藥。後續進兩三服。二藥相兼而進。久可以去其根本。下血日多。即令人心怯。無情緒。意思不悅。宜戒酒。慎護。病雖已止。宜服此二藥。

服藥若痔根已安。藏血未止。即更服後方。

新活鯽魚壹箇重四五兩以上者去鱗不去鱗　白蘞三兩微炒　茯苓　槐花半兩
蒲黃壹分　南木香錢半

右爲麄末。搗蘞末。和魚肉。丸如梧子大。每服三十丸。米飲下。日進三四服。

少陽相火之復與水爭戰。耳痛方。

宮桂去皮三錢　白芍藥　白茯苓　桔梗
防風　甘草炙　羌活　麻黃去節
麥門冬去心各一分　黃耆半兩　山茵陳二錢

右爲麄末。每服三錢。水一盞。生薑兩片。煎至七分。去滓服。日三。如不痛。更不消服。只進補腎藥。小兒藏寒泄瀉不止。豆蔻丸。

草豆蔻一枚剝開皮入乳香一塊在內。煨用和白麵裹。慢火煨令熟。去麵及豆蔻皮不用。

右爲細末。以粟米飲丸如麻子大。每服五七丸。米飲下。無時。

治婦人骨蒸方

桑白皮　黃耆　鱉甲醋炙黃　薏苡仁各半兩
紫蘇葉　茯苓　甘草各一分炙　菊苗
大腹皮一錢半　陳橘皮三錢　宮桂去皮二分

右爲細末。每服四錢。水壹盞。薑三片。煎八分。服之。三四日。却服後方。微利不妨。如脚未消。即間用豆湯服一服。

又方

牛膝去頭酒浸一宿　當歸去苗　茯苓　熟乾地黃
薏苡仁　黃耆　巴戟去心各半兩　栢子仁
鱉甲醋炙　芎各一分　桑螵蛸三分

右細末，煉蜜丸如梧子大，空心鹽湯下五十丸。

小兒泄，厚腹丸。

地榆　天麻　芎　赤石脂各一分
訶子皮　削朮各三分　厚朴去皮一分薑炙　木香半分

右爲細末，羊肉爲丸，非時服三十丸。

治久瀉方

白朮半兩　白芍藥半兩　桔梗壹分　白芷半兩

右爲細末，以猪肝四兩片切，如食法，入少鹽和之，不用油，用藥先和一半於銚內，先煙過，次用木炭火上炙乾，再傅末作兩三次食之，止泄最妙。

又方新製

人參壹兩　黃耆　薏苡仁　糯米末
阿膠炒　木香　茯苓　半夏如法製
甘草炙　鱉甲醋炙各一分　白朮半兩　肉豆蔻大者兩箇

右爲細末，不羅，非時，以水一盞生薑一片，棗子一箇，破之，同煎三錢，取七分服，去滓服，至十來服，或七八服，覺血淡，或微有些小膿，每服加白朮少許，及烏梅肉半箇煎，但血旋止，和胃藥，藥未可全去，只桔梗、枳實二味，以白羨餘代之。

痢稍止，未全減，藏府忽下血猶未止，却服此方。

黃耆蜜炙　白羨餘去刺各半兩　白歛
槐花微炒　阿子皮四箇　茯苓
獨活各一分　木香壹分
黃連燒焦二錢

右爲末，煉蜜丸如梧子大，非時，浆湯下二十丸至三十丸，米湯亦得。

又方

訶子大者炮令熟　山藥　人參　白朮各半兩
乾地黃一兩半，地黃雖能補而去肝風，但難熟乾，故用之耳　桑螵蛸中使非訶子不能爲功　木香壹分
桑寄生壹分

右爲末，煉蜜丸如梧子大，空心米湯下三十丸，常服以去痔疾，又能足血。

蘭室秘藏

李杲撰

蘭室秘藏目錄

卷上

飲食勞倦門
飲食所傷論
勞倦所傷論
調中益氣湯
交泰丸
木香乾薑枳朮丸
和中丸
消積滯枳香丸
黃芪當歸湯
益智和中丸
脾胃虛損論
三黃枳朮丸
寬中喜食無脂丸
木香人參生薑枳朮丸
扶脾丸
檳榔丸
黃芪湯
參朮湯
益胃散
巴豆三稜丸

白朮丸
中滿腹脹門
中滿腹脹論
諸腹脹大皆屬於熱論
中滿分消丸
廣茂潰堅湯
破滯氣湯
心腹痞門
消痞丸
黃連消痞丸
導藤丸
胃脘痛門
草豆蔻丸
麻黃豆蔻丸
酒客病論
葛花解醒湯
半夏枳朮丸
除濕益氣丸
升麻黃連丸
瓜蔕散
消渴門
消渴論
和血益氣湯
生津甘露湯
甘草石膏湯
生津甘露飲子
眼耳鼻門
諸脈者皆屬於目論
內障眼論
芎辛湯

草豆蔻丸
中滿分消湯
半夏厚朴湯
草豆蔻湯
失眠丸
消痞湯
神聖復氣湯
枳朮丸
橘皮枳朮丸
除濕散
上二黃丸
當歸潤燥湯
辛潤緩肌湯
甘露膏
碧天丸

廣大重明湯
運奇湯
羌活退醫膏
復明散
吹雲膏
撥雲湯
圓明內障升麻湯
蔓荊子湯
救苦湯
益陰腎氣丸
當歸龍膽湯
瀉陰火丸
溫衛湯
嗜藥麻黃散
加味滋腎丸
龍膽飲子
羌活退醫湯
麗澤通氣湯
徹寒湯
百點膏
神効明目湯
明目細辛湯
助陽和血湯
防風飲子
神効黃芪湯
黃芩黃連湯
歸葵湯
熟乾地黃丸
羌活退醫丸
補陽湯
升陽柴胡湯
圓明膏
療本滋腎丸
退醫膏
柴胡聰耳湯
遷睛紫金丹
溫肺湯

卷中

頭痛門
頭痛論
清空膏
川芎散
碧雲散
清上瀉火湯
細辛散
養神湯
半夏白芷天麻湯
口齒咽喉門
徹清膏
白芷散
羌活清空膏
補氣湯
羌活湯
安神湯

口齒論
羌活散
麻黃散
活蟲散
蟲梢散
刷牙藥
當歸龍膽散
細辛散
牢牙散
神功丸
神驗法
嘔吐門
丁香茱萸湯
補肝湯
衄血吐血門
麥門冬飲子
麻黃桂枝湯
三黃補血湯
止衄血法
腰痛門
川羌肉桂湯
破血散疼湯
蒼朮湯
緩筋湯
蒼朮復煎散
婦人門
經閉不行有三論
經漏不止有三論
升陽除濕湯
酒煮當歸丸
草豆蔻散
麝香散
益智木鼈散
白牙散
獨聖散
牢牙地黃散
立効散
清胃散
桔梗湯又方
白朮湯
吳茱萸丸
人參飲子
黃芪芍藥湯
救脈湯
獨活湯
地龍散
麻黃復煎散
拈痛湯
羌活蒼朮湯
涼血地黃湯
固真丸

烏藥湯
水府丹
黃芪當歸人參湯
柴胡調經湯
升陽舉經湯
半產慎用寒涼之藥論
全生活血湯
調經補眞湯
勝陰丹
柴胡丁香湯
桂附湯
黃芪白朮湯
增味四物湯
溫衝補血湯
四聖散
補氣升陽和中湯

卷下

大便結燥門
大便結燥論
通幽湯
潤腸丸
升陽湯
潤腸湯
小便淋閉門
小便淋閉論
通關丸
導氣除燥湯
痔漏門
痔漏論
秦艽白朮丸
助陽湯
丁香膠艾湯
當歸芍藥湯
益胃升陽湯
當歸附子湯
坐藥龍腦膏
潤陽丹
延胡苦楝湯
人參補氣湯
白朮茯苓湯
補經固眞湯
立効散
溫經除濕湯
麻黃桂枝升麻湯
潤燥湯
麻黃白朮湯
活血潤燥丸
清肺飲子
腎疸湯
秦艽蒼朮湯

七聖丸
秦艽羌活湯
紅花桃仁湯
陰痿陰汗門
陰痿陰汗及臊臭論
龍膽瀉肝湯
固眞湯
椒粉散
溫腎湯
瀉痢門
訶子皮散
升陽去熱和血湯
芍藥檗皮丸
槐花散
黃芪補胃湯
人參益胃湯
疝瘕門
散脇濟堅湯
連翹散堅湯
救苦化堅湯
黍粘子湯
消腫湯
升麻托裏湯
柴胡通經湯
保生救苦散
聖愈湯
黃芪肉桂柴胡酒煎湯
雜病門
安神丸
補氣湯
秦艽防風湯
當歸郁李仁湯
秦艽當歸湯
清震湯
清荒湯
補肝湯
延胡丁香丸
升麻補胃湯
益智和中湯
和中益胃湯
茯苓湯
升陽除濕湯
升麻補胃湯
升陽調經湯
龍泉散
柴胡連翹湯
淨液湯
內托羌活湯
內托黃芪湯
白芷升麻湯
一上散
獨聖散
硃砂安神丸
當歸補血湯

柴胡升麻湯
小黃丸
補益腎肝丸
麻黃茱萸湯
除濕補氣湯
升陽湯
自汗門
自汗論
調衛湯
當歸六黃湯
活血通經湯
人參益氣湯
補中湯
上清湯
正氣湯
退熱湯
天麻黃芪湯
白朮除濕湯
瀉血湯
瑩肌如玉散
小兒門
治驚論
黃芪湯
升陽益血湯
補陽湯
塌氣退黃湯
消痞丸
斑疹論
消毒救苦散
黍粘子湯
火鬱湯
黃芩利膈丸
太陽經嚏藥
黃芪湯
參歸湯
清燥湯
紅豆散
瀉柴湯
導氣湯
麻黃苍朮湯
朮桂湯
趁痛丸
解表升麻湯
健步丸
加味四君子湯
洗面藥
面油摩風膏
霍黃散
厚腸丸
大藥黃湯
中滿分消丸
桔梗湯
麻黃柴胡升麻湯

蘭室秘藏卷上

東垣老人李　杲撰

飲食勞倦門

飲食所傷論

陰陽應象論云。水穀之寒熱。感則害人六府。痺論云。陰氣者。靜則神藏。躁則消亡。飲食自倍。腸胃乃傷。此乃混言之也。分之爲二。飲也。食也。飲者。水也。無形之氣也。因而大飲則氣逆形寒。飲冷則傷肺。病則爲喘咳。爲腫滿。爲水瀉。輕則當發汗利小便。使上下分消其濕。解酲湯。五苓散。生薑半夏枳實白朮之類是也。如重而畜積爲滿者。芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之。此其治也。食者。物也。有形之血也。如生氣通天論云。因而飽食。筋脈橫解。腸澼爲痔。又云。食傷太陰厥陰。寸口大於人迎兩倍三倍者。或嘔吐。或痞滿。或下痢腸澼。當分寒熱輕重而治之。輕則內消。重則除下。如傷麥物者。半夏神麯乾薑三稜廣朮巴豆之類主之。如傷熱物者。枳實白朮青皮陳皮麥蘖黃連大黃之類主之。亦有宜吐者。陰陽應象論云。在上者因而越之。瓜蔕散之屬主之。然而不可過劑。過劑則反傷腸胃。蓋先因飲食自傷。又加之以藥過。故腸胃復傷。而氣不能化。食愈難消矣。漸至羸困。故五常政大論云。大毒治病。十去其六。小毒治病。十去其七。凡毒治病。不可過之。此聖人之深戒也。

勞倦所傷論

調經篇云。陰虛生內熱。岐伯曰。有所勞倦。形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下脘不通。而胃氣熱。熱氣熏胸中。故內熱。舉痛論云。勞則氣耗。勞則喘且汗出。內外皆越。故氣耗矣。夫喜怒不節。起居不時。有所勞傷。皆損其氣。氣衰則火旺。火旺則乘其脾土。脾主四肢。故困熱無氣以動。懶於語言。動作喘乏。表熱自汗。心煩不安。當病之時。宜安心靜坐以養其氣。以甘寒瀉其熱火。以酸味收其散氣。以甘溫補其中氣。經言勞者溫之。損者溫之者是也。金匱要略云。平人脈大為勞。脈極虛亦為勞矣。夫勞之為病。其脈浮大。手足煩熱。春夏劇。秋冬差。脈大者熱邪也。極虛者氣損也。春夏者時令邪也。秋冬差者時令邪也。以黃芪建中湯治之。此亦溫之之意也。夫上古聖人飲食有節。起居有常。不妄作勞。形與神俱。百歲乃去。此謂治未病也。今時之人。去聖人久遠。則不然。飲食失節。起居失宜。妄作勞役。形氣俱傷。故病而後藥之。是治其已病也。推其百病之源。皆因飲食勞倦。而胃氣元氣散解。不能滋榮百脈。灌溉臟腑。衛護周身之所致也。故蒼天之氣。貴清靜。陽氣惡煩勞。噫。飲食喜怒之間。寒暑起居之際。可不慎歟。

調中益氣湯

治因飢飽勞役。損傷脾胃。元氣不足。其脈弦洪緩而沉。按之中之下得時一澀。其證四肢滿悶。肢節疼痛。難以屈伸。身體沉重。煩心不安。忽肥忽瘦。四肢懶倦。口失滋味。腹難舒伸。大小便清利而數。或上飲下便。或大便澀滯。或夏月發泄。米穀不化。或便後見血。或便見白膿。胸滿短氣。咽膈不通。痰唾稠粘。口中沃沫。食入反出。耳鳴耳聾。目中流火。視物昏花。勞肉紅絲。熱壅頭目。不得安臥。不思飲食。並皆治之。

橘皮（如服中氣不轉運。加木香一分。如無此證不加。）
黃蘗（酒洗。已上各貳分。）
升麻（此一味為上氣不足。胃氣與脾下流。乃補上氣健陰引陽。）
柴胡（已上各叁分。）
人參（有嗽者去。）
炙甘草
蒼朮（已上各伍分。）
黃芪（壹錢。）

如是顯熱躁。是下元陰火蒸蒸熱發也。加生地黃（貳分。）黃蘗（叁分。）
如大便虛坐不得。或大便了而不了。腹中常常迫。皆是血虛血澀。加當歸身（叁分。）無此證則去之。
如身體沉重。雖小便數多。亦加茯苓（貳分。）黃蘗（叁分。）澤瀉（伍分。）蒼朮（壹錢。）時暫從權而去濕也。不可常用。
兼足太陰已病。其脈亦絡於心中。故顯濕熱相合。而生煩亂。
如胃氣不和。加湯洗半夏（伍分。）生薑（叁片。）有嗽者加生薑。生地黃（貳分。）以製半夏之毒。
如痰厥頭痛。非半夏不能除。此足太陰脾邪所作也。如兼躁熱。加黃蘗。生地黃（各貳分。）

如無已上證。只服前藥。

右件劑如麻豆大。都作一服。水二大盞。煎去粗。稍熱。食遠服之。事心絕慮。靜坐少語。藥必為効耳。

如夏月須加白芍藥（叁分。）
如春月腹中痛尤宜加。
如惡熱而渴。或腹痛者。更加芍藥（伍分。）生黃芩（貳分。）
如惡寒腹痛。加中桂（叁分。）去黃芩。謂之桂枝芍藥湯。亦於前藥中加之。
如冬月腹痛。不可用芍藥。蓋大寒之藥也。只加乾薑（貳分。）或加半夏（伍分。）以生薑少許製之。
如秋冬之月。胃脈四道為衝脈所逆。脇下少陽脈二道而反上行。名曰厥逆。其證氣上衝咽。不得息。而喘息有聲。不得臥。加吳茱萸（伍分。至壹錢。渴洗去苦。）觀厥氣多少而用之。亦於前藥中作一服服之。
如夏月有此證。為大熱也。此病隨四時為寒熱溫涼也。宜以

黃連（酒洗。）　黃蘗（酒洗。）　知母（酒浸。已上各等分。）

右為細末。熟湯為丸。如梧桐子大。每服一百丸。或二百丸。白湯送下。空心服。仍多飲熱湯。服畢少時。便以美食壓之。使不令胃中停留。直至下元。以瀉衝脈之邪也。大抵治飲食勞倦所得之病。乃虛勞七損證也。當宜以甘溫平之。甘多辛少。是其治也。

寬中喜食無厥丸（一名寬中進食丸。）

實形氣。喜飲食。

木香（伍分。）
乾生薑（壹錢。已上各等分。）
澤瀉
白朮（已上各貳錢。）
枳實（壹錢。）
半夏（柒錢。）
右為細末。湯浸蒸餅為丸。如梧桐子大。每服三五十丸。米湯下。食遠。

青皮
炙甘草（壹錢。伍分。）
檳榔
縮砂仁
草豆蔻仁（伍錢。）
大麥蘗麵（壹兩。炒。）

人參
白茯苓
橘皮
豬苓（已上各貳錢。伍分。）
神麯（伍錢。伍分。炒。）

交泰丸

升陽氣。瀉陰火。調榮氣。進飲食。助精神。寬腹脇。除怠惰。嗜臥。四肢沉困不收。

乾薑（炮。貳分。）
肉桂（去皮。已上各壹錢。）
白朮（已上各伍錢。伍分。）
苦練酒蒸。
川烏（炮。去皮。肉。壹錢。伍分。）
巴豆霜（伍分。）
柴胡（去苗。）
厚朴（去皮。炒。叁錢。秋冬加柒錢。）
縮砂仁（已上各叁錢。）
吳茱萸（渴洗。柒伍錢。）
人參（去芦。）
小椒（炒。去汗。于陰日。）
白茯苓
知母（肆錢。一半酒炒。一半中。春夏用。秋冬去。）
皂角（水洗。燥。去皮。弦。）

紫菀（去苗，已上各陸錢）　黃連（去鬚，炒，壹錢伍分，秋冬）

右除巴豆霜別研外，同爲極細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服十丸，溫水送下，食遠，虛實加減。

木香人參生薑枳朮丸

開胃進飲食。

乾生薑（貳錢伍分）　木香（叁錢）　人參（叁錢伍分）

陳皮（肆錢）　枳實（壹兩，炒）　白朮（壹兩伍錢）

右爲細末，荷葉裹，燒飯爲丸，如梧桐子大，每服三五十丸，溫水下，食前。

木香乾薑枳朮丸

破除寒滯氣，消塞飲食。

木香（叁錢）　乾薑（伍錢，炮）　枳實（壹兩，炒）

白朮（壹兩伍錢）

右爲細末，荷葉裹，燒飯爲丸，如梧桐子大，每服三五十丸，溫水送下，食前。

扶脾丸

治脾胃虛怯，腹中痛，泄瀉無度，飲食不化。

乾生薑　肉桂（已上各伍分）　紅豆（已上各壹錢）　乾薑

縮香　橘皮　白朮

茯苓　炙甘草　半夏

訶子皮　神麯（炒，已上各肆錢）　烏梅肉（已上各貳錢）

大麥麵（炒）

右爲細末，荷葉燒飯爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，白湯送下，食前。

和中丸

補胃進食。

人參　乾生薑　陳皮（已上各壹錢）

乾木瓜（貳錢）　炙甘草（叁錢）

右爲細末，湯浸餛餅爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，白湯送下，食前。

檳榔丸

破滯氣，消飲食。

炙甘草（壹錢）　木香　人參

檳榔（已上各貳錢）　陳皮（伍錢）

右爲細末，湯浸餛餅爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，白湯下，食前。

消積滯集香丸

治傷生冷硬物不消。

京三稜　廣茂　青皮

陳皮　丁香皮　益智

川練子　茴香（已上各壹兩）　巴豆（和皮米炒，伍錢）

右爲細末，醋糊爲丸，如綠豆大，每服五七丸，溫水生薑湯任下，食前服。

黃芪湯

補胃除濕，和血益血，滋養元氣。

木香（氣通，去之）　麝香葉（已上各壹錢）　當歸酒洗

陳皮（已上各貳錢）　人參　澤瀉（已上各伍錢）

黃芪（壹兩）

右㕮咀，每服五錢，水二大盞，煎至一盞，如欲汗加生薑煎，食遠熱服之。

黃芪當歸湯

治熱上攻頭目，治身胸背發熱。

當歸身（虛或洗）　黃芪（伍錢）

右㕮咀，作一服，水二大盞，煎至一盞，食前熱服。

參朮湯

治脾胃虛弱，元氣不足，四肢沉重，食後昏悶。

黃蘗（酒浸）　當歸（已上各貳分）　柴胡

升麻（已上各叁分）　人參　陳皮

青皮（已上各伍分）　神麯末（柒分）　炙甘草

蒼朮（已上各壹錢）　黃芪（貳錢）

右㕮咀，都作一服，水二大盞，煎至一盞，食遠服。

益智和中丸　季秋食。

木香　黃連　生地黃（已上各貳分）

黃芪　人參　麥門冬

神麯末　當歸身　乾生薑

陳皮　茴香（已上各叁分）　糯砂仁（柒分）

桂花（壹錢）　姜黃（已上各伍分）　益智仁（貳錢貳分）

炙甘草（貳錢伍分）　桂枝（壹錢伍分）　草豆蔻仁（壹錢）

麥蘗麵（叁錢）

右爲細末湯浸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯下細嚼亦當

益胃散

治因服寒藥過多以致脾胃虛損胃脘疼痛

人參　甘草　縮砂仁
厚朴（已上各一錢）　白豆蔻　姜黃
乾生薑　澤瀉（已上各一錢）　益智仁（二錢）
黃芪　陳皮（已上各一錢）

右爲麤末每服三錢水二盞生薑五片煎至一盞去柤食前溫服

脾胃虛損論

易水張先生常戒不可峻利食藥下咽未至藥丸施化其標皮之力始開便言快也所傷之物已去若更待一兩時辰許藥盡化開其藥峻利必有情性病去之後脾胃既損是其氣元氣敗壞促人之壽當時設下一藥枳實一兩麩炒黃色爲度白朮二兩只此二味荷葉裹燒飯爲丸以白朮甘溫甘溫補脾胃之元氣其苦味除胃中之濕熱利腰臍間血故先補脾胃之弱過於枳實兇化之藥一倍枳實味苦寒泄心下之痞悶消化胃中所傷此一藥下胃其所傷不能即去須待一兩時辰許食則消化是先補其虛而後化其所傷則不峻利矣當是之時未悟用荷葉燒飯爲丸之理老年味之始得可謂奇矣荷葉之物中央空象震卦之體震者動也人感之生足少陽甲膽者風也生化萬物之根蔕也內經云厥陰於始序則不疑人之飲食入胃營氣上行即少陽甲膽之氣也其手少陽三焦經人之元氣也手足經同法便是少陽元氣生發也胃氣穀氣元氣甲膽上升之氣一也異名雖多止是胃氣上升者也荷葉之體生於水土之下出於汚濁之中非汚所染挺然獨立其色青形乃空青而象風木者也食藥感此氣之化胃氣何由不上升乎其主意用此一味爲引用可謂遠識深慮合於道者也更以燒飯和藥與白朮協力滋養穀而補令胃厚耳不至內傷其利廣矣大矣若內傷脾胃辛熱之物酒肉之類自當不快覓藥於醫醫者亦不問所傷什之集香丸小丁香丸巴豆大熱藥之類下之大便下則物去遺留食之熱性藥之熱性重傷元氣則七神不熾經云熱傷氣正謂此也其人必無氣以動而熱困四肢不舉傳變諸疾不可勝數使人眞氣自此衰矣若傷生冷硬物但醫或用大黃牽牛二味大寒藥投之隨藥下所傷去矣遺留食之寒性藥之寒性重瀉其陽陽去則皮膚筋肉血脈無所依倚便爲虛損之證論言及此令人寒心夫辛辣薄味之藥無故不可亂服非止牽牛而已至眞要大論云五味入口各先逐其所喜攻攻者尅伐瀉也辛味下咽先攻瀉肺之五氣氣者眞氣元氣也其牽牛之辛辣猛烈傷人尤甚飲食所傷腸胃□當以苦泄其腸胃可也肺與元氣何罪之有用牽牛大罪有五此其一也況胃主血所生病爲所傷物者有形之物也皆是血病瀉其氣其罪二也且飲食傷之於中焦止合尅化消導其食重瀉上焦肺中已虛之氣其罪三也食傷腸胃當塞因塞用又曰寒因寒用枳實大黃苦寒之物以泄有形是也反以辛辣牽牛散瀉眞氣大禁四也

殊不知鍼經有云外來客邪風寒傷人五臟若誤瀉胃氣必死誤補亦死其死也無氣以動故靜若內傷腸胃而反瀉五臟必死誤補亦死其死也陰氣有餘故躁今內傷腸胃是謂六腑不足之病反瀉上焦虛無肺氣肺者五臟之一數也雖不即死若更旬日之間必暗損人壽數謂如人壽應百歲爲牽牛之類朝損暮損其元氣消耗不得終其天年但人不覺耳將爲天年已盡此乃暗裏折人壽數故特著此論并方庶令四海聞而行之不至夭橫耳此老夫之用心也胃氣不可不養復明養胃之理內經云安穀者昌絕穀者亡水去則榮散穀消則衛亡榮散衛亡神無所依仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脈道乃行故血不可不養胃不可不溫血養胃溫榮衛將行常有天命穀者身之大柄也書與周禮皆云金木水火土穀惟脩以奉養五臟者也內傷飲食固非細事苟妄服食藥而輕生殞命其可乎哉黃帝鍼經有說胃惡熱而喜清冷大腸惡清冷而喜熱兩者不和何以調之岐伯曰調此者食飲衣服亦欲適寒溫寒無淒淒泄暑無汗飲食者熱無灼灼寒無淒淒寒溫中適故氣將持乃不致邪僻也是必有因用豈可用俱寒俱熱之藥倉卒致損與以刃殺人者何異內經說內傷者其氣口脈反大於人迎一倍二倍三倍分經用藥又曰上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死如但食不納惡心欲吐者不問一倍二倍不當正與瓜蔕散吐之但以指或以物探去之若所傷之物去不盡者更診其脈問其所傷以食藥去之以應寒因寒用又謂之寒因寒用泄而下降乃應太陰之用其中更加升發之藥令其元氣上升寒因通用因血而爲直何爲血內傷胃氣是也何爲直曰而升發胃氣是也因其飲食之內傷而使生氣增益胃氣完復此乃因血而爲直若分經用藥其所傷之物寒熱溫涼生硬柔輭所傷不一難立定一法只隨所傷之物不同各立治法臨時加減用之其用藥又當問病人從來稟氣盛衰所傷寒物熱物是素食之耶不可服藏氣藥若乘飢困而傷之耶當益胃氣或爲人所勉勸強食之宜損血而益氣也診其脈候傷在何臟可與對病之藥豈可妄瀉天眞元氣以輕喪身寶乎且如先食熟物而不傷纖之以寒物因後食致前食亦不消化而傷者當問熱食寒食孰多孰少揀酌與藥無不當矣喻如傷熱物二分寒物一分則當用寒藥二分熱藥一分相合而與之則榮衛之氣必得周流更有或先飲酒而後傷寒冷之食或傷熱食冷水與冰如此不等皆當驗其節次所傷之物酌量寒熱之劑分數各各對證與之無不取効自村所定藥方未取便謂能盡性藥之理姑用指迷辯惑耳

三黃枳朮丸

治傷肉湯麵辛辣味厚之物塡塞悶亂不快

枳實（麩炒黃色）　黃連（去鬚酒洗）　大黃（濃紙煨）
神麯（炒）　橘皮　白朮（已上各一兩）
黃芩（一兩）

右爲粗細末湯浸餅爲丸如菉豆一倍大每服五十丸白湯下臨時量所傷多少加減服之

治傷生冷硬物，心腹滿悶疼痛。

巴豆霜伍分　木香貳錢　升麻
柴胡巳上各壹錢　草豆蔻麵裹煨熟用仁　香附子炒巳上各伍錢
神麯炒黃色　石三稜煨去皮　京三稜煨巳上各壹兩

右爲細末，湯浸蒸餅爲丸，如菉豆一倍大，每服一二十丸，溫白湯下，量所傷多少加減服之。

白朮丸

治傷豆粉濕麵油膩之物。

白礬枯壹錢　黃芩伍錢　橘皮焙壹錢
神麯炒黃色　半夏湯洗七次　白朮巳上各壹兩
枳實麩炒黃色壹兩壹錢

右爲極細末，湯浸蒸餅爲丸，如菉豆大，每服三五十丸，白湯下，素食多用乾薑，故加黃芩以瀉之。

草豆蔻丸

治秋冬傷寒冷物，胃脘當心而痛，上支兩脇，咽膈不通。

炒鹽伍分　乾生薑　青皮
橘皮巳上各貳錢　麥糵麵炒黃色　生黃芩各月不用
半夏湯洗七次　神麯炒巳上各伍錢　草豆蔻麵裹煨去皮取仁
白朮巳上各壹兩　枳實麩炒貳兩

右爲極細末，湯浸蒸餅爲丸，如菉豆大，每服五十丸，白湯下。

中滿腹脹門

中滿腹脹論

六元政紀論云：太陰所至爲中滿，太陰所至爲蓄滿。諸濕腫滿，皆屬脾土。論云：脾乃陰中之太陰，同濕土之化。脾濕有餘，腹滿食不化，天爲陽，爲熱，主速化也，地爲陰，爲濕，主長養也。然陽則陰不能生化，故云藏寒生滿病。調經論云：因飲食勞倦，傷脾胃，始受熱中，末傳寒中，皆由脾胃之氣虛弱，不能運化精微而制水穀，聚而不散，而成脹滿。經云：腹滿膨脹，支脇胠脇，下厥上冒，過在太陰陽明。乃寒濕鬱遏也。脈經所謂胃中寒則脹滿者是也。（編注：三卷雜病第八）腹滿大便不利，上走胸嗌，喘息喝喝然，取足少陰。又云：脹取三陽，三陽者，足太陽寒水爲脹，與通評虛實論說腹暴滿按之不下，取太陽經絡，胃之募也，正同。取者瀉也。經云：中滿者瀉之於內者是也。宜以辛熱散之，以苦瀉之，淡滲利之，使上下分消其濕，正如開鬼門，潔淨府，溫衣繆刺其處，是先瀉其血絡，後調其眞經，氣血平，陽布神清，此治之正也。或曰：諸脹腹大，皆屬於熱者何也。此乃病機總辭，假令外傷風寒有餘之邪，自表傳裏，寒變爲熱，而作胃實腹滿，仲景以大承氣湯治之，亦有膏粱之人，濕熱鬱於內而成脹滿者，此熱脹之謂也。大抵寒脹多而熱脹少，治之者宜詳辨之。

諸腹脹大皆屬於熱論

諸腹脹大皆屬於熱，此乃八益之邪有餘之證。自天外而入，是感風寒之邪傳裏，寒變爲熱，作胃實，日晡潮熱，大渴引飲，譫語，是太陽陽明并大實大滿者，大承氣下之。少陽陽明微滿實者，小承氣下之，泄之則脹已。此之謂也。假令孩童爲脹滿，亦有寒脹熱脹，是天之邪氣傷暑而得之，不即時發，至秋暑氣衰絕而癥病作矣。知其寒也，局方用交解飲子者是也。內虛不足，寒濕令人中滿，及五臟六腑俱有脹滿，更以脈家寒熱多少較之。胃中寒則脹滿，濁氣在上，則生膨脹，取三陽，三陽者，足太陽膀胱寒水爲脹，腹暴滿，按之不下，取太陽經絡者，胃之募也，正同。腹滿膨脹，皮膚肤脇，下厥上冒，過在太陰陽明，胃中寒濕鬱遏也。太陰膨脹，復不利，不欲食，食則嘔，不得臥，按所說寒脹之多如此，中滿治法，當開鬼門，潔淨府，開鬼門者，謂發汗也，潔淨府者，利小便也。中滿者，瀉之於內，謂脾胃有病，當令上下分消其濕，下焦如瀆，氣血自然分化，不待泄濁穢，如或大實大滿，大小便不利，從權以寒熱藥下之，或傷酒濕麵及味厚之物，膏粱之人，或食已便臥，使濕熱之氣不得施化，致令腹脹滿，此脹亦是熱脹，治熱脹分消丸主之。如或多食寒涼，及脾胃久虛之人，胃中寒則脹滿，或藏寒生滿病，以治寒脹中滿分消湯主之。

中滿分消丸

治中滿熱脹，鼓脹，氣脹，水脹，此非寒脹類

白朮　人參　炙甘草
豬苓去黑皮　姜黃壹錢各　白茯苓去皮
乾生薑　砂仁貳錢巳上各　澤瀉
橘皮巳上各貳錢　知母炒焙　黃芩去腐炒夏用壹兩貳錢
黃連淨炒　半夏湯洗七次　枳實麩炒巳上各伍錢
厚朴薑製壹兩

右除茯苓澤瀉生薑外，共爲極細末，入上三味和勻，湯浸蒸餅爲丸，如梧桐子大，每服一百丸，煖熱白湯下，食遠服，量病人大小加減。

中滿分消湯

治中滿寒脹，寒疝，大小便不通，陰躁，足不收，四肢厥逆，食入反出，下虛中滿，腹中寒，心下痞，下焦躁，寒沉厥，奔豚不收。

川烏　澤瀉　黃連
人參　青皮　當歸
生薑　麻黃　柴胡
乾薑　草澄茄巳上各貳分　益智仁
半夏　茯苓　木香

升麻（已上各叁分）　黃芪　吳茱萸
厚朴　草豆蔻仁　黃蘗（已上各伍分）

右剉如麻豆大，都作一服，水二大盞，煎至一盞，食前熱服。忌房室酒濕麵生冷及油膩等物。

廣茂消堅湯

治中滿腹脹，內有積聚，堅硬如石，其形如盤，令人不能坐臥，大小便澀滯，上喘氣促，面色萎黃，通身虛腫。

廣茂　紅花　升麻
吳茱萸（已上各貳分）　生甘草　柴胡
澤瀉　神麯　青皮
陳皮（已上各叁分）　厚朴（生用）　黃芩
黃連　益智仁　草豆蔻仁
當歸梢（已上各伍分）　半夏（柒分）

如渴加

葛根（肆分）

右剉如麻豆大，水二大盞，煎至一盞，稍熱服，食遠。忌酒醋濕麵。服二服之後，中滿減半止，有積不消，再服後藥。

半夏厚朴湯

紅花　麝木（半分）　吳茱萸
乾生薑　黃連（已上各叁分）　木香
青皮（已上各貳分）　肉桂　蒼朮
白茯苓　澤瀉　柴胡
陳皮　生黃芩　草豆蔻仁
生甘草（已上各叁分）　京三稜　當歸梢
豬苓　升麻（已上各肆分）　神麯（一分）
厚朴（捌分）　半夏（壹分）　桃仁（柒箇）
昆布（少許）

如渴加

葛根（叁分）

右㕮咀，作一服，水三盞，煎至一盞，去柤稍熱服。此藥二服之後，前證又減一半，却於前藥中加減服之。

破滯氣湯（一名木香化滯飲）

破滯氣，治心腹滿悶。

炙甘草（肆分）　白檀
陳皮　大腹子
白茯苓　桔梗（已上各伍分）
人參　青皮
木香　姜黃

右㕮咀，每服三錢，水二盞，煎至一盞，去柤溫服，不拘時。

草豆蔻湯

治腹中虛脹。

澤瀉（壹分）　木香（叁分）　麝香
半夏（製）　枳實　白豆蔻仁
黃芪（蜜炙去之）　益智　砂仁
青皮　陳皮（已上各陸分）　檳榔
當歸（已上各柒分）　神麯（肆分）　白朮（已上各貳錢）
草豆蔻仁（已上各叁分）
茯苓

右為細末，都作一服，水二大盞，生薑三片，煎至一盞，去柤溫服，冬月加黃芪五七分，春夏止服正藥，食遠。

心腹痞悶

消痞悶

治心下痞悶，一切所傷，及積年不愈者。

乾生薑　神麯（炒）　炙甘草（已上各貳分）
豬苓（貳錢伍分）　澤瀉　厚朴
砂仁（已上各貳錢）　半夏（湯洗七次）　陳皮
人參（已上各肆錢）　枳實（伍錢炒）　黃連（淨炒）
黃芩（已上各陸錢）　姜黃　白朮（已上各兩）

右為細末，湯浸蒸餅為丸，如梧桐子大，每服五七十丸至百丸，白湯送下，食遠服。

失笑丸（一名枳實消痞丸）

治右關脈弦，心下痞，惡食懶倦，開胃進飲食。

乾生薑（壹錢）　炙甘草　麥糵麵
白茯苓　白朮（已上各貳錢）　半夏麯
人參（已上各肆錢）　厚朴（炙肆錢）　枳實

黃連（已上各伍錢）

右爲細末，湯浸餛餅爲丸，梧桐子大，每服五七十丸，白湯下，食遠服。

黃連消痞丸

治心下痞滿，藥滯不散，煩熱喘促不安。

澤瀉　炙甘草　陳皮（伍錢）　半夏（玖錢）　茯苓　豬苓（已上各伍錢）　黃連（壹兩）　姜黃（已上各壹錢）　乾生薑（貳錢）　白朮（已上各壹錢）　枳實（柒錢）　黃芩（炒，貳兩）

右爲細末，湯浸餛餅爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，溫湯下，食遠。

消痞湯（一名木香化滯湯）

治因憂氣鬱結中脘，腹皮裏微痛，心下痞滿，不思飲食。

枳實（炒）　生薑　草豆蔻　當歸梢（貳分，已上各）　木香（壹分，已上各）　炙甘草（伍分，已上各）　陳皮　柴胡（肆分）　半夏（壹錢）

紅花少許

右爲麤末，作一服，水二盞，生薑三片，煎至一盞，食遠服，忌酒濕麵。

葶藶丸（一名人參順氣飲子）

治心下痞，胸中不利。

半夏（洗）　青皮（已上各伍分）　縮砂　炙甘草　苦葶藶（酒洗，炒）　獨活（已上各壹錢）　厚朴（炙）　當歸身（壹分）　茴香（酒製）　羌活　人參　石膏　白豆蔻仁　乾葛（已上各壹錢）　黃芩（一半酒洗，一半炒）　柴胡

右爲細末，湯浸餛餅和勻，餘子內擦如米大，每服二錢，臨臥用一口湯下。

胃脘痛門

草豆蔻丸

治脾胃虛弱，而心火乘之，不能滋榮上焦元氣，遇冬腎與膀胱寒水旺時，子能令母實，以致肺金大腸相輔而來剋心乘脾胃，此大復讎也，經云：大勝必大復，理之常也。故皮毛血脈分肉之間，元氣已絕於外，又大寒大燥二氣併乘之，則苦惡風寒，耳鳴及腰背相引而痛，鼻息不通，不聞香臭，額寒腦痛，大惡風寒，目時眩不欲開，腹中爲寒水反乘，痰唾沃沫，食則反出，腹中常痛，心胃作痛，脇下縮急，有時而痛，腹不能努，大便多瀉而少祕，下氣不絕，或腹中鳴，此脾胃虛之至極也，胸中氣亂，心煩不安，而爲寒亂之漸，胸膈不通，極則喘塞有聲，喘喝閉塞，或於日陽處，或於暖室中，少緩口吸風寒之氣，則復作四肢厥逆，身體沉重，不能轉側，頭不可以回顧，小便溲而時躁，此藥主之，秋冬寒涼大復氣之藥也。

神麯末　當歸身　人參　陳皮　半夏（已上各壹錢，洗）　草豆蔻仁（麵裹燒熟爲末，壹錢肆分）　柴胡（詳腸下痛多少用之）　青皮（已上各陸分）　益智仁　白僵蠶（捌分，已上各）　甘草（生陸分，熟陸分）　桃仁（裝箇湯浸，去皮尖）　姜黃（已上各肆分）　黃芪　吳茱萸（湯洗，焙乾）　澤瀉（小便數，減半）　麥糵麵（壹錢伍分，炒）

右除桃仁別研如泥，餘爲細末，同研勻，湯浸餛餅爲丸，如梧桐子大，每服五七十丸，白湯下，食遠服。

神寧復氣湯

治復氣乘冬足太陽寒水足少陰腎水之旺，子能令母實，手太陰肺實反來剋上，火木受邪，腰背胸膈閉塞疼痛，善唾口中涎，目中泣，鼻中流濁涕不止，或如息肉不聞香臭，欬嗽痰沫，上熱如火，下寒如冰，頭作陣痛，目中溢火，視物朧朧，耳聾耳鳴，頭并口鼻大惡風寒，晝日晴暖，夜臥不安，常覺痰塞，咽膈不通，口不知味，兩脇縮急而痛，牙齒動搖，不能嚼物，臍腹之間及尻臀足膝不時寒冷，而多汗，行步欹側，起居艱難，麻木風痺，小便數，氣短喘喝，少氣不足以息，遺失無度，及婦人白帶，陰戶中大痛牽心面色黧黑，男子控睪痛牽心腹，或面色如赭，食少，大小便不調，煩心寂亂，逆氣裏急，腹不能努，或腸鳴，膝下筋急，肩脾大痛，此皆寒水來復火土之讎也。

乾薑（炮）　人參　半夏（湯洗）　甘草（捌分，已上各）　白蒺藜（伍錢，去心刺）　黑附子（炮，已上各壹分）　郁李仁（另研，已上各伍分）　升麻（已上各柒分）　柴胡　當歸身（陰分，酒洗）　防風　藁本　羌活（已上各壹錢）

右件都作一服，水五大盞，煎至二盞，入黃芪一錢，橘紅五分，草豆蔻仁一錢，麵裹煨熟去皮一錢，同煎至一盞，再入下項藥，黃藥三分，酒浸，黃連三分，酒浸，枳殼三分，生地黃三分，酒洗，此四味預一日另用新水浸，又以華細辛二分，川芎細末三分，蓽茇荊子三分，作一處浸，此三味并黃藥等煎正藥作一大盞，不去柤，入此所浸之藥，再上火同煎至一大盞，去柤熱服，空心，又能治喘嗽，喘唇舌，舌根強硬等證，如神，忌肉湯，宜食肉，不助經絡中火邪也，大抵腎元與膀胱經中有寒氣不足者，并宜服之，於月生月滿時食，隔三五日一服，如病急，不拘時候。

麻黃豆蔻丸

治客寒犯胃，心胃大痛不可忍。

木香　青皮　紅花
厚朴已上各貳分　蘇木叁分　蓽澄茄肆分
升麻　半夏湯洗　麥蘖麵
縮砂仁　黃芪　白朮
陳皮去白　柴胡　炙甘草
吳茱萸　當歸身已上各伍分　益智仁肆分
神麯末貳錢炒　麻黃下去節叁錢　草豆蔻仁伍錢

右爲細末，湯浸餅爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，白湯下，或細嚼湯下亦可。

酒傷病論

論酒大熱有毒，氣味俱陽，乃無形之物也，若傷之，則止當發散，汗出則愈矣，此最妙法也，其次莫如利小便，二者乃上下分消其濕，何酒病之有，今之酒病者，往往服消癥丸大熱之藥下之，又有牽牛大黃下之，是無形元氣受病，反下有形陰血，乖悞甚矣，酒性大熱，已傷元氣，而復重瀉之，況亦損腎水眞陰，及有形陰血，俱爲不足，如此則陰血愈虛，眞水愈弱，陽毒之熱大旺，反增其陰火，是耑元氣消亡，七神何依，折人長命，雖不卽死，而虛損之病成矣，金匱要略云，酒疸下之，久久爲黑疸，愼不可犯此戒，不若令上下分消其濕，當以葛花解醒湯主之。

葛花解醒湯

木香伍分　人參去芦　猪苓去黑皮
白茯苓　橘皮已上各壹錢伍分　白朮
乾生薑　神麯炒　澤瀉已上各貳錢
蓮花青皮叁錢　縮砂仁　白豆蔻仁
葛花已上各伍錢

右爲極細末和勻，每服三錢匕，白湯調下，但得微汗，酒病去矣，此蓋不得已而用，豈可恃賴日日飲酒，此藥氣味辛辣，偶因酒病服之，則不損元氣，何者，敵酒病故也，若頻服之，損人天命。

枳朮丸

治痞，消食強胃。

枳實麩炒黃色壹兩　白朮貳兩

右爲極細末，荷葉裹燒飯爲丸，如綠豆一倍大，每服五十丸，白湯下，不拘時候，量所傷多少加減服之。

半夏枳朮丸

治因冷物內傷。

半夏湯洗七次壹兩　枳實麩炒黃色

右三味爲極細末，荷葉裹燒炊飯爲丸，如綠豆一倍大，每服五十丸，白湯下，量所傷加減服之。

橘皮枳朮丸

治元氣虛弱，飲食不消，或臟腑不調，心下痞悶。

橘皮　枳實麩炒黃色各壹兩　白朮貳兩

右爲極細末，荷葉裹燒飯爲丸，如綠豆一倍大，每服五十丸，白湯下，量所傷加減服之。

除濕益氣丸

治傷濕麵，心腹滿悶，肢體沉重。

紅花叁分　羅蔔子炒熟伍錢　枳實麩炒黃色
黃芩生用　神麯炒黃色　白朮已上各壹兩

右同爲細末，荷葉裹燒飯爲丸，如綠豆一倍大，每服五十丸，白湯下，量所傷加減服之。

除濕散

治傷馬嫁子，并牛羊酪水一切冷物。

甘草貳　紅花已上各貳錢
乾生薑已上各叁錢　車前子
茯苓叁錢　神麯炒黃色壹兩
半夏湯洗七次　澤瀉已上各伍錢

右爲極細末，每服三錢匕，白湯調下，食前。

升麻黃連丸

治多食肉口臭，不欲聞其穢惡氣，使左右不得近。

白檀貳錢　生甘草叁錢
連花青皮　升麻已上各伍錢
黃芩去腐酒洗貳兩　生薑取自然汁
黃連去鬚壹兩

右爲極細末，湯浸餅爲丸，如彈子大，每服一丸，細嚼白湯下，食後。

上二黃丸

治傷熱食痞悶，兀兀欲吐，煩亂不安。

甘草貳錢　升麻
黃連酒洗壹兩　黃芩貳兩　柴胡已上各叁錢

一方加

枳實伍錢

右爲細末，湯浸餅爲丸，如菉豆大，每服五十丸，白湯下，食遠。

治傷冷飲者以五苓散，每服二錢三錢匕，加生薑煎服之。

治傷食兼傷冷飲者，煎五苓散送半夏枳朮丸。

治傷冷飲不惡寒者，腹中亦不覺寒，惟覺悶，身重食不化者，或小便不利，煎去桂五苓散，依前斟酌服之。

瓜蔕散

上部有脉，下部無脉，其人當吐不吐者死，何謂下部無脉，此謂木鬱也，飲食過飽，塡塞胸中，胸中者，太陰之分，野經曰，氣口反大於人迎三倍，食傷太陰，故曰木鬱則達之，吐者是也。

瓜蔕　赤小豆已上各等分

右二味爲極細末，每服二錢匕，溫漿水調下，取吐爲度，若不至兩手尺脉絕無，不宜便用此藥，恐損元氣，令人胃氣不復，若止是胸中窒塞悶亂不通，以指探去之，如不得吐者，以物探去之，得吐則已，如食不去，用此藥吐之，解云，盛食塡塞於胸中，爲之窒塞，兩寸脉當主事，兩尺脉不見，其理安在，胸中有食，故以吐出之，食者、物也，物者、坤土也，是足太陰之號也，胸中者肺也，爲物所塡，肺者手太陰金也，金主殺伐也，與坤土俱在於上而旺於天，金能尅木，故肝木生發之氣，伏於地下，非木鬱而何，吐去上焦陰土之物，木得舒暢，則鬱結去矣，食塞於上，脉絕於下，若不明天地之道，無由達此至理，水火者，陰陽之微兆，天地之別名也，故曰獨陽不生，獨陰不長，天之用在於地下，則萬物生長矣，地之用在於天上，則萬物收藏矣，此乃天地交而萬物通也，此天地相根之道也，故陽火之根，本於地下，陰水之源，本於天上，故曰水出高源，故人五臟主有形之物，物者、陰也，陰者、水也，右三部脉主之，偏見於寸口，食塞其上，是絕五臟之源，源絕則水不下流，兩尺竭絕，此其理也，何疑之有，假令所傷前後不同，以分爲率，傷熱物二分，傷生冷硬物一分，用寒藥三黃丸二停，熱藥巴豆三稜丸一停，合而服之，如熱物傷少而寒物傷多，則寒藥少而熱藥多也，假令夏月大熱之時，傷生冷硬物，當用熱藥巴豆三稜丸治之，須加三黃丸，謂天時不可伐，故加寒藥以順時令，若熱物只用三黃丸，何謂此三黃丸時藥也，假令冬天大寒之時，傷羊肉濕麵等熱物，當用三黃丸治之，須加熱藥少許，草豆蔻丸之類是也，爲引用又爲時藥，經云，必先歲氣，無伐天和，此之謂也，餘皆倣此。

消渴門

消渴論

陰陽別論云，二陽結謂之消，脉要精微論云，薄成爲消中，夫二陽者，陽明也，手陽明大腸主津，病消則目黃口乾，是津不足也，足陽明胃主血，熱則消穀善飢，血中伏火，乃血不足也，結者津液不足，結而不潤，皆燥熱爲病也，此因數食甘美而多肥，故其氣上溢，轉爲消渴，治之以鹹除陳氣也，不可服膏粱芳草石藥，其氣慓悍，能助燥熱也，越人云，邪在六腑，則陽脉不和，陽脉不和，則氣留之，氣留之，則陽脉盛矣，陽脉大盛，則陰氣不得營也，故皮膚肌肉消削是也，經云，凡治消渴，仲景偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人，則膏藥之

疾也，岐伯曰，脉實，病久可治，脉弦小，病久不可治，後分爲三消，高消者舌上赤裂，大渴引飲，道論云，心移熱於肺，傳於膈，消者是也，以白虎加人參湯治之，中消者善食而瘦，自汗，大便硬，小便數，叔和云，口乾饒飲水，多食肌亦瘦，揮成消中者是也，以調胃承氣三黃丸治之，下消者煩躁引飲，耳輪焦乾，小便如膏，叔和云，焦煩水易虧，此腎消也，以六味地黃丸治之，經錄所謂未傳能食者必發膈，有背者，不能食者必傳中滿鼓脹，皆謂不治之證，潔古老人分而治之，能食而渴者，白虎加人參湯，不能食而渴者，發氏方白朮散倍加葛根治之，上中既平，不復傳下消矣，前人用藥，厥有旨哉，或曰，未傳者，何也，此火邪勝也，其病甚而不消，或赤水者是也，經云有形而不痛，陽之類也，急攻其陽，無攻其陰，治在下焦，元氣得強者生，失強者死，未傳中滿者，何也，以寒治熱，雖方士不能廢其繩墨而更其道也，然臟腑有遠近，心肺位近，宜制小其服，腎肝位遠，宜制大其服，皆適其至所爲，故如過與不及，皆誅罰無過之地也，如高消中消制之太急速，過病所久而成中滿之病，正謂上熱未除，中寒復生者也，非乘之罪，失其緩急之制也，處方之制，宜加意焉。

和血益氣湯

治口乾舌乾，小便數，舌上赤脉，此藥生津液，除乾燥，生肌肉。

柴胡　麻黃根已上各等分　酒漢防己　酒生地黃減分　升麻已上各壹錢　紅花少許　炙甘草　酒當歸梢肆分　羌活已上各伍分　酒黃連制分，治舌上赤脉也　杏仁　生甘草此味治口乾舌乾也　酒知母　石膏減分，治小便赤色　酒黃蘗　桃仁已上各陸箇

右㕮咀，都作一服，水二大盞，煎至一盞，去柤溫服，忌熱湯麵酒醋等物。

當歸潤燥湯

治消渴，大便閉澀，乾燥結硬，兼善溫飲，陰頭退縮，舌燥口乾，眼澀難開，及於黑處見浮雲。

細辛壹分　生甘草　炙甘草　熟地黃已上各叁分　柴胡叁分　黃蘗　如母　石膏　麻子仁　桃仁泥曰　當歸身　荊芥穗已上各壹錢　升麻壹錢伍分　防風　杏仁陸箇　小椒叁箇　紅花少許

右㕮咀，都作一服，水二大盞，煎至一盞，去柤熱服，食遠，忌辛熱物。

生津甘露湯一名清涼飲子。

治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結燥小便頻數

升麻肆分　防風　生地黃已上各伍分　漢防己　柴胡　羌活　黃芪　酒知母　酒龍膽草　石膏　紅花少許　桃仁伍箇

右㕮咀都作一服水二盞酒一匙煎至一盞稍熱服食遠

辛潤緩肌湯一名消神補氣湯

治消渴證稍愈止有口乾腹不能努此藥主之

生地黃　細辛已上各壹分　石膏肆分　黃蘗酒製　生甘草　知母已上各伍分　當歸身　荊芥穗　防風已上各壹錢　升麻壹錢伍分　杏仁陸箇　小椒貳箇

右㕮咀都作一服水二大盞煎至一盞食遠稍熱服之

甘草石膏湯

渴病久愈又添舌白沫微腫咽喉嚥津覺痛嗌腫時時有渴喜冷飲口中白沫如膠

生地黃　細辛已上各壹分　黃連已上各叁分　甘草伍分　柴胡柒分　黃蘗　當歸身　桃仁炒去皮尖　防風已上各壹錢　升麻壹錢伍分　杏仁陸箇　小椒貳箇　紅花少許

右如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食後溫服

甘露膏一名闕香飲子

治消渴飲水極甚善食而瘦自汗大便結燥小便頻數

半夏貳分湯洗　人參　生甘草　當歸身陸分　炙甘草　酒黃芩壹錢　黃蘗已上各壹錢　杏仁拾箇　熟甘草　闕香　白豆蔻仁　升麻

連翹　防風已上各壹錢　桔梗已上各伍分　酒知母壹錢伍分　生甘草　石膏叁錢

右為極細末湯浸餅和勻成劑捻作薄片子日中晒半乾擦碎如米大每服二錢淡生薑湯送下食後

生津甘露飲子

治消渴上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不能下時有腹脹或瀉黃如蘗名曰鱉泄渾身色黃目睛黃苦四肢痿弱前陰如冰尻臀腰背塞面生黯色齊下急痛善嚏多怒健忘

藿香貳分　木香已上各叁分　當歸身　生甘草　白芷　石膏壹錢貳分　炙甘草　人參已上各壹錢　柴胡　白蒺藜　當歸　山梔子　連翹　杏仁去皮　酒知母　桔梗叁錢　黃連　麥門冬　龜甲　白豆蔻仁　姜黃已上各壹錢　牡黃蘗已上各壹錢伍分　升麻　全蝎二箇去毒

右為細末湯浸餅和勻成劑捻作片子日中晒半乾擦碎如黃米大每服二錢津唾下或白湯送下食遠服

眼耳鼻門

諸脈者皆屬於目論

陰陽應象論云諸脈者皆屬於目目得血而能視五臟六腑精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為眼子筋之精為眼眥血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精則為約束裹擣筋骨血氣之精而與脈并為系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則目眩眼系入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以鳴矣邪中其精其精所中不相比也則精散精散則視岐故見兩物目者五臟六腑之精榮衛魂魄之所常營也神氣之所主也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脈發於陽故陰陽合傳而為精明也目者心之使也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑也夫十二經脈三百六十五絡其血氣皆上走於面而走空竅其清陽氣上散於目而為精其氣走於耳而為聽因心乖煩冗欲食失節勞役過度致脾胃虛弱心火大盛則百脈沸騰血脈逆行邪害空竅天明則日月不明矣夫五臟六腑之精氣皆稟受於脾上貫於目脾者諸陰之首也目者血脈之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者若火也主人之神宜靜而安相火化行其令相火者包絡也主百脈皆榮於目既勞役逆動勞乃妄行又因邪氣所并

而損血脈，故諸病生焉。凡醫者不理脾胃，及養血安神，治標不治本，是不明正理也。

內障眼論

凡心包絡之脈，出於心中，以代心君之行事也。與少陽爲表裏，嗇子散大者，少陰心之脈挾目系，厥陰肝之脈連目系。心主火，肝主木，此木火之勢燄也。其味則宜苦宜酸宜涼，大忌辛辣熱物，以助木火之邪也。飲食中當知此理可也。夫辛主散熱則助火，故不可食。諸酸主收心氣，瀉木火也。諸苦瀉火熱則益水也。尤忌食冷水大寒之物，此則能損胃氣不行，則元氣不生，元氣不行，胃氣下流，胸中三焦之火及心火乘於肺上，入腦灼髓，火主散溢，嗇子開大，大熱之物又助火邪，此蓋不可食驗也。藥中云，茺蔚子一味辛及主益睛，辛者是助火也，故去之，乃加黃芩黃連瀉中焦之火，芩能瀉上焦肺中之火，以酒洗之，乃瀉因熱用也。又去青葙子，爲助陽火也，加五味子以收嗇人開大，且火之與氣，勢不兩立，故內經曰，壯火食氣，氣食少火，少火生氣，壯火散氣。諸酸之物，能助元氣，孫眞人云，五月當服五味，助五臟氣，以補西方肺金，法云，以酸補之，以辛瀉之，辛瀉氣則明矣。或曰，藥中有當歸，其味亦辛而甘，其不去者何，此辛甘一味，以其和血之藥，況有甘味，又欲以爲鄉導，爲諸藥之使耳。

芎辛湯

治兩眼澀夜隱澀難開，羞明惡日，視物昏暗，赤腫而痛。

細辛貳分　芎藭　甘草　白芷已上各壹錢

右㕮咀，都作一服，水二盞，煎至一盞，臨臥溫服。

碧天丸一名井珠丸

治目疾累服寒涼藥不愈，兩眼蒸熱，如火之熏，赤而不痛，滿目紅絲，血脈貫睛，昏悶昏暗，羞明畏日，或上下瞼赤爛，或冒風沙而內外皆皆破，洗之神効。

枯白礬貳分　銅綠研壹分　蔓荊子已上各伍分　防風壹錢伍分

右先研白礬銅綠令細，旋旋入粉同研勻，熟水和之，其爲一百丸，每用一丸，熱湯半盞，浸一二箇時辰，洗至覺微澀爲度，合半時辰許，臨臥洗之，瞑目便睡，一丸可洗十遍，再用湯內坐令熱，此藥治其標，若裏實者不宜用。

廣大重明湯

治兩目瞼赤爛，熱腫疼痛，并稍赤，及眼瞼痒痛，抓之至破，眼弦生瘡，目多眵淚，澀難開。

龍膽草　防風　細辛已上各壹錢　生甘草

右剉如麻，內甘草不剉，只作一錠，先以水一大椀半煎龍膽一味，至一半，再入餘三味，煎至少半椀，濾去柤，用清帶熱洗，以重湯坐令熱，日用五七次，但洗畢合眼一時，去勞肉泛長及痒亦驗。

百點膏

張濟氏眼病醫六年，以至遮睛人，視物不明，有雲氣之狀，因用此藥而効。

蕤仁去皮尖壹分　當歸身　甘草已上各陸分　防風捌分　黃連一大椀煎至一半入藥拌如麻豆大，水貳錢

右件剉如麻豆大，蕤仁別研如泥，同熬，滴在水中不散，入去沫蜜少許，再熬少時爲度，合病人心靜點之，至目中微痛，日用五七次，臨臥點尤疾効，名之曰百點膏，但欲多點，使藥力相續也。

遮奇湯

治眉痛不可忍。

炙甘草夏月生用　羌活　酒黃芩壹錢冬月不用此一味如能食熱痛倍加之　防風已上各叁錢

右㕮咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去柤，食後服之。

神効明目湯

治眼澀緊急，致倒睫拏毛，及上下瞼皆赤爛，睛疼昏暗，羞則冷淚常流，夜倒眼澀難開。

細辛貳分　蔓荊子伍分　防風壹錢　葛根壹錢伍分　甘草貳錢

一方加

黃芪壹錢

右㕮咀作一服，水二盞，煎至一盞，去柤，稍熱臨臥服。

羌活退醫膏一名復明膏

治足太陽寒水膜子遮睛，白翳在上，視物不明。

椒樹東南根貳分西北根貳分　蠶本　黃連　防風　柴胡　升麻　生甘草肆分　當歸身陸分　蕤仁陸箇　漢防己已上各貳分　麻黃去根節　生地黃已上各叁分　羌活柒分

右用淨水一大椀，先煎漢防己、黃連、生甘草、當歸、生地黃，煎至一半，下餘藥再煎，至一盞，去柤，入銀石器中再熬之，有力爲度。

明目細辛湯

治兩目發赤，微痛，羞明畏日，怯風寒，怕火，眼睫成紐，眵糊多，澀難開，眉攢眶悶，乾澀，涕唾稠粘，大便微硬。

川芎伍分　生地黃酒製　當歸梢　白茯苓　荊芥壹錢貳分　防風貳錢　蔓荊子已上各陸分　羌活已上各叁錢　細辛少許　藁本已上各壹錢　桃仁貳拾箇　麻黃根　椒須壹箇　紅花少許

右㕮咀分作四服每服水二盞煎至一盞去柤稍熱臨臥服之忌酒醋濕麵

復明散

治內障

青皮叁分　橘皮　蒺藜已上各伍分　炙甘草　連翹　柴胡已上各叁錢　當歸身貳錢　川芎　生地黃　黃芪壹錢伍分

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去柤稍熱服之食後忌酒醋濕麵辛熱大料物之類

助陽和血湯

治眼發之後微有上熱白睛紅腫澀難開眼多眵淚

蔓荊子貳分　香白芷叁分　黃芪　炙甘草　柴胡　當歸身酒洗　防風已上各伍分　升麻陸分

右㕮咀都作一服水一盞半煎至八分去柤稍熱服臨臥避風寒處睡

吹雲膏

治目中淚及迎風寒泣羞明畏日常欲閉目喜在暗室塞其戶牖醫療歲久遮睛此藥多點神驗

細辛壹分　升麻　青皮　連翹　柴胡伍分　生甘草　荊芥穗壹錢貳分取濃汁　生地黃壹錢伍分　蒺藜仁已上各叁分　防風已上各肆分　當歸身已上各陸分　楝黃連叁錢

右㕮咀除連翹外用澄清淨水二椀先煮餘藥至半椀入連翹同煮至一大盞許去柤入銀石器內文武火熬滴入水成珠不散爲度入煉去沫熟蜜少許熬勻用之

防風飲子

治倒睫拳毛

細辛　蔓荊子已上各叁分　葛根

防風已上各伍分　當歸身壹錢半分　人參已上各壹錢　炙甘草

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食遠服避風寒

攢雲湯

戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下出黑白臀兩箇隱澀難開兩目緊縮而無疼痛兩手寸脈細緊按之洪大無力知是太陽膀胱爲命門相火煎熬遂行作寒水臀及寒瘧遮睛證呵欠善悲鼽忘嚏噴眵淚時自淚下面赤而白能食不大便小便數而欠上而喘

黃芪壹分　細辛　生蠶　葛根　川芎伍分　柴胡陸分　荊芥穗　藁本　生甘草　升麻　當歸身　知母伍錢　黃蘗伍錢伍分　羌活　防風

右㕮咀如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去柤熱服食後

神效黃芪湯

治渾身麻木不仁或頭面手足肘背或腰脚麻木不仁並皆治之如兩目緊急縮小及澁明畏日隱澀難開或視物無力時痛昏花手不得近或目少精光或目中熱如火服五六次可効

蔓荊子壹錢　陳皮去白伍錢　人參貳錢　炙甘草　白芍藥壹兩　黃芪貳兩

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤臨臥稍熱服

如小便淋瀝加澤瀉伍分一服止則去

如有大熱證每服加酒洗黃蘗叁分

如麻木不仁雖有熱不用黃蘗止加黃芪壹兩通用三兩也

如眼縮急去芍藥忌酒醋麵大料物葱韭蒜辛物

如麻木甚者加芍藥壹兩通用二兩

圓明內障升麻湯一名神和養胃論

治內障服得之脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛飲食不節形體勞役心不得休息故上爲此疾

乾蠶壹錢　五味子貳錢　白伏苓叁錢　防風伍錢　白芍藥壹錢　白茯苓壹錢　柴胡柒錢　人參　當歸身酒洗　炙甘草　白虎　葛根已上各壹錢　升麻

黃芪　羌活已上各壹兩伍錢

右㕮咀。每服五七錢。水三大盞。煎至二大盞。入黃芩黃連貳錢。同煎數沸。去粗。煎至一盞。熱服。食遠。

黃芩黃連湯

黃芩酒洗炒　黃連酒洗炒

生地黃酒洗已上各壹兩

右㕮咀。每服二錢。水二盞。煎至一盞。去粗。熱服。

蔓荊子湯

治勞役飲食不節。內障眼病。此方如神効。

蔓荊子貳錢伍分　黃蘗酒拌炒四遍

炙甘草捌錢　黃芪

右㕮咀。每服三錢。或五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。臨臥溫服。

歸葵湯一名連翹飲子

治目中溜火。悉日興火。隱澀難開。小角緊。視物昏花。迎風有淚。

柴胡貳分　生甘草　白芍藥已上各壹錢　蔓荊子

連翹　生地黃　人參已上各壹分　當歸身

紅葵花　人參已上各壹分　黃芪

酒黃芩　防風　羌活已上各壹分

升麻壹錢

右㕮咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。食後溫服。

救苦湯

治眼暴發。赤腫臉高。苦疼不任者。

桔梗　連翹　紅花

細辛已上各壹分　當歸身夏月減半　炙甘草已上各伍分

荊芥　草龍膽已上各壹分　羌活太陽

升麻陽明　柴胡少陽　防風

藁本　黃連已上各壹錢　生地黃

黃蘗　黃芩　知母已上各壹錢伍分

川芎叁錢

右㕮咀。每服一兩。水二盞。煎至一盞。去粗。食後溫服。

若苦疼則多用苦寒者。兼治本經之藥。再行加減。如晴昏加知母黃蘗一倍。

熟乾地黃丸

治血弱陰虛。不能著心。致心火旺。陽火甚。瞳子散大。少陰爲火。君主無爲。不行其令。相火代之。兼心包絡之脈出心系。分爲三道。少陽相火之體無形。其用在其中矣。火盛則令母實。乙木肝旺是也。心之脈挾於目系。肝連目系。況手足少陽之脈。同出耳中。至耳上角。斜起於目外眥。風熱之盛。亦從此道而來。上攻頭目。致偏頭痛悶。瞳子散大。視物則花。此目血虛。陰弱故也。法當養血涼血。益血。收火之散大。除風之熱。則愈矣。

人參貳錢　炙甘草　天門冬湯洗去心

地骨皮　五味子　枳殼炒

黃連已上各叁錢　當歸身酒洗焙乾　黃芩已上各伍錢

生地黃酒洗焙乾伍分　柴胡捌錢　熟乾地黃壹兩

右件同爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。茶湯送下。食後。日進二服。

益陰腎氣丸

此壯水之主。以鎮陽光。

澤瀉　茯苓已上各貳錢伍分　生地黃酒洗乾

牡丹皮　山茱萸　當歸梢酒洗

五味子　乾山藥　柴胡已上各伍錢

熟地黃貳兩

右爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服五十丸。淡鹽湯下。空心。

羌活退翳丸

治內障右眼小背青白翳。大背微顯白翳。腦疼。瞳子散大。上熱惡熱。大便秘澀。小便如常。遇天氣暄熱。頭疼睛脹。可服此藥。翳在大背。加葛根升麻。翳在小背。加柴胡羌活。是也。

黑附子炮　寒水石已上各壹錢　酒防己貳錢

知母酒炒　牡丹皮　羌活

川芎已上各叁錢　酒黃蘗　生地黃酒洗炒

丹參　茺蔚子　酒當歸身

柴胡已上各伍錢　熟地黃捌錢　芍藥壹兩叁錢

右爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五七十丸。白湯下。空心。宿食未消。待饑則服之。藥後省語言。以食壓之。

當歸龍膽湯

治眼中白翳。

防風　羌活　甘草　石膏已上各壹錢伍分　五味子　酒黃芩炒　酒黃蘗炒　草龍膽酒洗　芍藥已上各伍錢　柴胡　升麻已上各貳錢　黃芪蜜炙已上各錢　當歸身酒洗

右㕮咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去柤，入酒少許，隨風熱服，忌言語。

補陽湯

治陽不勝其陰，乃陰盛陽虛，則九竅不通，令青白瞖見於大背，及足太陽少陰經中鬱遏，足厥陰肝經氣不得上通於目，故青白瞖內阻也。當於太陽少陰經中丸原之下，以益肝中陽氣，衝天上行，此乃先補其陽，後於足太陽太陰標中（標者，源也）瀉足厥陰肝經火，下伏於陽中，乃次治也。內經云，陰盛陽虛，則當先補其陽，後瀉其陰，此治法是也。每日清晨，以腹中無宿食服補陽湯，隨風服瀉陰丸，若天色變，經大寒大風，并勞役預日，飲食不調，精神不足，或氣弱，俱不可服。待體氣和平，天氣如常，服之，先補其陽，使陽氣上升，通於肝經之末，利空竅於目矣。

肉桂壹錢去皮　知母炒　生地黃酒炒　白茯苓　陳皮已上各叁錢　人參　黃芪　獨活　當歸身酒洗　澤瀉　甘草已上各壹兩　柴胡貳兩　防風已上各伍錢　白芍藥　羌活　獨活　五味子　細辛苓　知母已上各壹兩

右㕮咀，每服五錢，水二盞，煎至一大盞，去柤，空心服之。

瀉陰火丸一名連蘗益陰丸

石決明叁錢炒存性　甘草　防風已上各伍錢　黃連酒炒　當歸梢　草決明　黃蘗　知母酒炒如大者加作伍錢　澤瀉　楮實酒炒微潤

右為細末，煉蜜為丸如菉豆大，每服五十丸，至一百丸，茶清下，常多服補陽湯，少服此藥，多則妨飲食。

升陽柴胡湯

肉桂伍分　防風　陳皮已上各壹錢　柴胡去苗壹錢伍分　白茯苓　生地黃酒炒

黃芪　甘草梢　熟地黃　人參　當歸身　獨活　白芷已上各伍錢　羌活　白芍藥壹兩已上各

右剉，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去柤，稍熱，食遠服。

別合一料，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服五十丸，茶清下，每日與前藥各一服，食遠，不可飽服。

如天氣熱，加五味子叁錢，天門冬去心，芍藥椿實已上各伍錢。

湯衛湯

治鼻不聞香臭，目中流火，氣寒血熱，冷淚多，瞬下冷，陰汗，足痿弱。

陳皮　青皮　黃連　木香已上各叁分　人參　甘草炙　白芷　防風　黃芪　澤瀉已上各伍分　黃蘗　升麻　知母　蒼朮　羌活已上各壹錢　當歸身壹錢伍分　柴胡

右都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤，食遠服之。

圓明膏

治勞心過度，飲食失節，乃生內障，及瞳子散大，此方收睛圓明。

訶子皮溫紙煨　甘草已上各貳錢　當歸身叁錢　麻黃去節揩淨　柴胡　生地黃

右七味，先以水二椀，煎麻黃至一椀，掠去沫，外六味各㕮咀如豆大，篩去末，入在內同熬，滴水中不散為度，入熟蜜少許再熬，點點眼。

嚏藥麻黃散

治內外障眼。

麻黃壹兩　當歸身壹錢

右二味同為麤末，炒黑色，入麝香乳香少許，共為細末，含水鼻內嚏之。

療本滋腎丸

黃蘗酒炒　知母酒炒已上各等分

右為細末，滴水為丸，如梧桐子大，每服一百丸至一百五十丸，空心鹽白湯下。

加味滋腎丸

肉桂叁分　黃連壹錢
苦參叁錢　苦萆薢炒　石膏煅研用
黃蘗酒炒　知母各伍錢

右爲極細末，打薄麵糊爲丸，如梧桐子大，每服一百丸，空心服，白湯下，食壓之。

退腎膏

治熱白濁

萆薢　升麻已上各叁分
防風　青皮已上各肆分
柴胡已上各伍分　當歸身叁分
生地黃壹錢伍分　黃連叁錢
右用水一椀，入前藥煎至半椀，去粗，更上火煎至半盞，入荊芥水兩匙，入蜜少許，再上火熬勻點之。

龍膽飲子

治痔瘻流膿，生痔腎，濕熱爲病。

穀精草　川鬱金
炙甘草已上各伍分　麻黃壹錢
青蛤粉　草龍膽
羌活已上各叁錢　黃芩炒
右爲細末，每服二錢，食後溫茶清調服之。

柴胡聰耳湯

治耳中乾結，耳鳴耳聾。

連翹肆錢　柴胡叁錢
當歸身　人參已上各壹錢
麝香少許研　蚯蚓叁箇去翅足炒另研
右除三味別研外，生薑三片，水二大盞，煎至一盞，去粗再下三味，上火煎一二沸，稍熱服，食遠。

羌活退腎湯

治太陽寒水腎膜遮睛，不能視物。

羌活壹兩伍錢　防風壹兩
薄荷葉　藁本已上各肆錢
黃蘗肆錢　川芎
酒生地黃壹錢　小椒伍分
荊芥穗加煎成藥　酒知母伍錢
當歸身已上各叁錢　細辛少許

麻黃貳錢用根節

右咬咀，每服三錢，水二大盞，煎至一盞半，入荊芥穗，再煎至一盞，去粗，稍熱服，食遠，忌酒醋濕麵等物。

遠睛紫金丹

治目眶歲久赤爛，俗呼爲赤睛是也，當以三稜針刺目眶外以瀉濕熱，如眼生倒睫拳毛，兩目緊蓋，內伏火熱而攻陰氣，法當去其熱內火邪，眼皮緩則毛立出，瞳膜亦退，用手法拳出內瞼向外，以針刺之出血。

白沙蜜貳拾兩　甘石拾兩燒七遍碎，連水淬并
揀連壹兩小便淬碎爲末　南乳香
烏魚骨貳錢　硼砂小盞內放於瓶口上蒸乾
白丁香直者伍分　輕粉壹字
右將白沙蜜於沙石器內慢火去沫，下甘石，次下丹，以柳枝攪，次下餘藥，以粘手爲度，作丸如雞頭大，每用一丸，溫水化開洗。

麗澤通氣湯

治鼻不聞香臭。

黃芪肆錢　蒼朮
獨活　防風
葛根已上各叁錢　炙甘草貳錢
川椒　白芷已上各壹錢
右㕮咀，每服五錢，生薑三片，棗二枚，葱白三寸，同煎至一盞，去粗溫服，食遠，忌一切冷物及風寒涼處坐臥行立。

溫肺湯

治鼻不聞香臭，眼多眵淚。

丁香貳分　防風
葛根　羌活壹錢
黃芪已上各貳錢　麻黃不去節肆錢
右爲麤末，水二盞，葱白三根，煎至一盞，去粗，食後服。

御寒湯

治寒氣風邪傷於毛皮，令鼻塞濁，欬嗽上喘之證。

黃連　炙甘草
黃蘗　佛耳草
羌活已上各貳分　炙甘草
款冬花　升麻

白芷　防風已上各壹分。
人參　陳皮已上各伍分。
黃芪壹錢。
右㕮咀，都作一服，水二盞，煎至一盞，去粗，食後熱服。

升麻　蒼朮等分。

閨室秘藏卷中

頭痛門

頭痛論

金匱真言論云：東風生於春，病在肝，命在頸項，故春氣者病在頭。又諸陽會於頭面，如足太陽膀胱之脈起於目銳眥，上抵頭角，病則頭角額痛。夫風從上受之，風寒傷上，邪從外入，客於經絡，令人振寒頭痛，身重惡寒，治在風池風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉。汗之則愈。此傷寒頭痛也。頭痛耳鳴，九竅不利者，腸胃之所生，乃氣虛頭痛也。心煩頭痛者，病在耳中，過在手巨陽少陰，乃濕熱頭痛也。如氣上不下，頭痛煩疾者，下虛上實也，過在足少陰巨陽，甚則入腎，寒濕頭痛也。如頭半邊痛者，先取手少陽陽明，後取足少陽陽明，此偏頭痛也。有真頭痛者，甚則腦盡痛，手足寒至節，死不治。有厥逆頭痛者，所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛齒亦痛。凡頭痛皆以風藥治之者，總其大體而言之也。高巔之上，惟風可到，故味之薄者，陰中之陽，乃自地升天者也。然亦有三陰三陽之異，故太陽頭痛惡風，脈浮緊，川芎、羌活、獨活、麻黃之類為主。少陽經頭痛，脈弦細，往來寒熱，柴胡為主。陽明頭痛，自汗發熱，惡寒，脈浮緩長實者，升麻、葛根、石膏、白芷為主。太陰頭痛，必有痰，體重或腹痛為痰癖，其脈沉緩，蒼朮、半夏、南星為主。少陰經頭痛，三陰三陽經不流行，

而足寒氣逆為寒厥，其脈沉細，麻黃、附子、細辛為主。厥陰頭項痛，或吐痰沫厥冷，其脈浮緩，吳茱萸湯主之。血虛頭痛，當歸、川芎為主。氣虛頭痛，人參、黃芪為主。氣血俱虛頭痛，調中益氣湯，少加川芎、蔓荊子、細辛。其効如神。白虎半夏天麻湯，治痰厥頭痛藥也。清空膏，乃風濕熱頭痛藥也。如濕氣在頭者，以苦吐之，不可執方而治。先師嘗病頭痛，發時兩頰青黃，暈眩，目不欲開，惻言，身體沉重，兀兀欲吐。潔古曰：此厥陰太陰合病，名曰風痰，以局方玉靈丸治之，更灸俠谿穴即愈。是知方者體也，法者用也，徒執體而不知用者弊，體用不失，可謂上工矣。

清空膏

治偏正頭痛，年深不愈者，善療風濕熱□上壅損目及腦痛不止。

川芎伍錢。　柴胡柒錢。
防風去芦。　羌活已上各壹兩。
細茶子黃芩叁兩去皮，剉一半酒製一半炒。　黃連炒。
右為細末，每服二錢七，於盞內入茶少許，湯調如膏，抹在口內，少用白湯送下，臨臥。

如苦頭痛，每服加細辛貳分。

如太陰脈緩有痰，名曰痰厥頭痛，減羌活、防風、川芎、甘草，加半夏壹兩伍錢。

如偏正頭痛，服之不愈，減羌活、防風、川芎一半，加柴胡壹兩。

如發熱惡熱而渴，此陽明頭痛，只與白虎湯，加好吳白芷。

微清膏

蔓荊子　細辛已上各壹分。
川芎已上各叁分。　生甘草
藁本壹錢。
右為細末，每服二錢，食後茶清調下。

川芎散

治頭目不清利。

川芎叁分。　柴胡柒分。
防風　藁本
升麻已上各壹錢。　熟甘草
酒黃連炒。　酒黃芩已上各肆錢伍分。
右為細末，每服一錢，或二三錢，食後茶清調下，忌酒濕麵。

白芷散一名雙金散。

治頭痛。

薄荷葉
熟甘草已上伍分。
羌活
生甘草
酒生地黃貳錢。

鬱金壹錢　薄荷葉　香白芷　芒硝已上各叁錢　石膏已上各貳錢

右爲極細末，口含水鼻內嚏之。

碧雲散

治頭痛，

細辛　鬱金　蔓荊子　川芎已上各壹錢貳分　青黛壹錢伍分　薄荷葉貳錢

右爲極細末，口嚏水鼻內嚏之。

光活清空膏

蔓荊子壹錢　黃連叁錢　防風　甘草已上各肆錢　芒硝壹錢　石膏叁錢　光活　黃芩壹兩　紅豆壹兩

右爲細末，每服一錢，茶清調下，食後臨臥。

清上瀉火湯

昔有人年少時氣弱，常於氣海三里灸之，節次約五七十壯，至年老添熱厥頭痛，雖冬天大寒，猶喜塞風，其頭痛則愈，微來暖處，或見烟火，其痛復作，五七年不愈，皆灸之過也。

荊芥穗　川芎已上各貳分　蔓荊子　酒黃連　當歸身　荅花已上各叁分　甘草已上各伍分　生地黃　藁本　酒黃芩　升麻　防風已上各柒分　柴胡伍錢　炙甘草　酒知母已上各肆錢　黃芪已上各叁錢　光活叁錢　細辛少許　紅花少許

右剉如麻豆大，分作二服，每服水二盞，煎至一盞，去柤，稍熱服，食後。

補氣湯

服前藥之後服此藥。

柴胡貳分　升麻叁分　當歸身貳錢　炙甘草肆錢　黃芪貳分　紅花少許

右㕮咀，作二服，水二盞，煎至一盞，去柤，稍熱服，食後。

細辛散

治偏正頭痛，

細辛　芎藭已上各伍分　炒黃芩　柴胡貳錢　瓦粉已上各貳分　酒黃連　酒黃芩已上各壹錢　生黃芩　川芎已上各柒分　炙甘草壹錢伍分

右爲麤末，每服三錢，水一大盞半，煎至一盞，取清，食後服之。

羌活湯

治風熱壅盛上攻，頭目昏眩。

炙甘草柒分　白茯苓　防風　羌活已上各壹兩　澤瀉壹錢　酒黃芩已上各伍錢　細黃芩酒洗　酒洗瓜蔞根　柴胡柒錢　酒黃連

右爲麤末，每服五錢，重，水二大盞，煎至一盞，取清，食後臨臥，通口熱服之。

養神湯

治精神短不得睡，項筋腫急難伸，禁甘溫，宜苦味。

木香　橘皮　酒黃芩貳分　人參　白朮　川芎已上各叁分　蒼朮　麥蘖麵　黃連已上各伍分　甘草　黃芪壹錢　柴胡已上各壹分　黃蘗　升麻肆分　當歸身　半夏已上各柒分

右㕮咀，每服五錢，水二大盞，煎至一盞，去柤，稍熱服，不拘時候。

安神湯

治頭痛頭旋眼黑。

生甘草　炙甘草已上各貳錢　柴胡　升麻　酒黃蘗　防風貳錢伍分　酒生地黃　羌活已上各壹兩

右爲麤末，每服五錢，水二大盞半，煎至一盞半，加蔓荊子五分，川芎三分，再煎至一盞，去柤，臨臥熱服。

半夏白朮天麻湯

范天騏之內有脾胃證，時頭煩躁，胸中不利，大便不通，而又爲寒氣憋鬱，悶亂大作，火不伸故也，疑其有熱，服疎風丸，大便行，其病不減，恐其藥少，再服七八十丸，大便復見兩行，元證不瘳，增以吐逆，食不能停，痰唾稠粘，湧出不止，眼黑頭旋，惡心煩悶，氣短促上喘，無力以言，心神顛倒，目不敢開，如在風雲中，頭苦痛如裂，身重如山，四肢厥冷，不得安臥，余料前證是胃氣已損，復下兩次，則重虛其胃，而痰厥頭痛作矣，與此藥而治之。

黃芪貳分酒洗，　乾薑叁分，　澤瀉
白茯苓　　天麻　　黃芪
人參　　苦朮已上各壹錢，　炒神麯
白朮已上各壹錢，　橘皮已上各壹錢伍分，　半夏湯洗，
麥糵麵

右㕮咀，每服五錢，水二大盞，煎至一盞，去柤熱服，食前。一服而愈，此頭痛苦甚，謂之是太陰痰厥頭痛，非半夏不能療，眼黑頭旋，風虛內作，非天麻不能除，黃芪甘溫，瀉火補元氣，實表虛，止自汗，人參甘溫，瀉火補中益氣，二朮俱苦甘溫，除濕補中益氣，澤瀉、茯苓利小便，導濕，橘皮苦溫，益氣調中升陽，神麯消食，蕩胃中滯氣，大麥麵寬中助胃氣，乾薑辛熱，以除中寒，黃芪大苦寒，酒洗，以療冬天少火在泉發躁也。

口齒咽喉門

口齒論

論曰：夫齒者腎之標，口者脾之竅，諸經多有會於口者，其牙齒是手足陽明之所過，上龈繫於坤土，乃足陽明胃之脈貫絡也，止而不動，下龈嚼物，動而不休，手陽明大腸之脈所貫絡也，手陽明惡寒飲而喜熱，足陽明喜寒飲而惡熱，其病不一，牙者腎之標，亦喜寒，寒者堅牢，爲病不同，熱甚則齒動，龈齦柤脫，作痛不已，故所治療不同也，有惡熱而作痛者，有惡寒而作痛者，有惡寒惡熱而作痛者，有惡寒飲少熱飲多而作痛者，有惡熱飲少寒飲多而作痛者，有牙齒動搖而作痛者，有齒龈腫起爲痛者，有脾胃中有風邪，但覺風而作痛者，又有牙上多爲蟲所蝕，其齒缺少而色變，爲蟲牙痛者，有胃中氣少，不能於寒柤露其齒作痛者，有牙齒疼痛，而穢臭之氣不可近者，痛既不一，豈可一藥而盡之哉。

光活散

治客寒犯腦，風寒濕腦，痛項筋急，牙齒動搖，肉龈柤脫疼痛。

藁本　　香白芷　　桂枝已上各壹分，
蒼朮　　升麻已上各伍分，　當歸身陸分，
草豆蔻仁壹錢，　光活壹錢伍分，　羊脛骨灰貳錢，
麻黃去根節，　防風已上各叁錢，　柴胡伍錢，

細辛少許，

右爲細末，先用溫水漱口，淨擦之，其痛立止也。

草豆蔻散

治寒多熱少，牙齒疼痛。

細辛葉　　防風已上各貳分，　羊脛骨灰
熟地黃已上各伍分，　當歸身陸分，　草豆蔻仁
黃連已上各壹錢叁分，　升麻貳錢伍分，

右爲細末，同前牙痛處擦之。

麻黃散

治冬寒時分寒濕腦痛，項筋急，牙齒動搖疼痛。

防風　　藁本已上各叁分，　羊脛骨灰
當歸身　　熟地黃已上各陸分，　草豆蔻仁
升麻　　黃連已上各壹錢，　光活壹錢伍分，
麻黃不去節，叁錢五分，　草龍膽酒洗，　生地黃已上貳錢，

細辛少許，

右爲細末，依前藥法擦之。

熱牙散一名麝香散。

治大熱牙齒腐露根肉，龈脫血出，齒動欲落，疼痛妨食物餌，反忤熱多。

熟地黃貳分，　益智仁貳分半，　當歸身
生地黃　　麻黃根　　酒洗防己
人參已上各叁分，　升麻壹錢，　草豆蔻
黃連已上各貳錢伍分，　羊脛骨皮貳錢，　麝香少許，

右爲細末，如前藥擦之。

治蟲散一名白芷散。

藁本　　熟地黃貳分，
益智仁　　當歸身
吳茱萸捌分，　光活伍分，
升麻已上各壹錢，　黃芪

治大寒犯腦，牙齒疼痛，及蟲痛，胃經濕熱腫痛。

桂枝壹分，　羊脛骨灰
白芷已上各叁分，　草豆蔻仁
黃連已上各肆分，

右爲細末。同前擦之。

益智木律散

治寒熱牙痛。

木律貳分。　當歸　益智皮　升麻壹錢伍分。

羊脛骨灰　草豆蔻皮壹錢貳分。

右爲細末。用度如前擦之。

如寒牙痛。不用木律。

蠟梢散

治大寒風犯腦。牙痛。

白芷　當歸身　升麻　黃芪已上各貳分。　麻黃去節壹錢伍分。

桂枝　藁本　草豆蔻皮壹錢。　蠟梢少許。

右爲細末。如前法用之。

白牙散

白芷柒分。　升麻壹錢。　羊脛骨灰貳錢。　麝香少許。

右爲細末。先用溫水漱口。擦之妙。

胡牙藥

麝香壹分。　生地黃　熟地黃貳分。已上各　當歸身　升麻壹錢。　草豆蔻皮伍分。　白豆蔻　黃連已上各貳錢。　五倍子壹箇。　沒石子壹箇。

右爲極細末。如前法擦之。妙。

獨聖散

治一切牙痛風痛。

北地藜蘆不以多少。陰乾。　柴胡已上各貳分。　防風　羌活伍分。　羊脛骨灰貳錢伍分。　石膏壹錢伍分。　酒防己　人參已上各貳分。　羊脛骨灰　草豆蔻已上各貳錢。

右爲細末。每用刷牙。以熱漿水漱牙外。麻末煮漿水刷牙。大有神効。不可具述。

當歸龍腦散

治寒熱停牙痛。

香白芷　生地黃已上各伍分。　草龍腦　當歸梢　麻黃　升麻　羊脛骨灰　草豆蔻皮　黃連已上各壹錢。

右爲細末。如前法擦之。神効。

牢牙地黃散

治腦寒痛及牙痛。

藁本貳分。　生地黃　羌活　防己　當歸身　益智仁已上各貳分。　熟地黃　黃芪已上各伍分。　人參已上各叁分。　黃連　羊脛骨灰　香白芷　升麻壹錢。　吳茱萸　草豆蔻皮壹錢貳分。

立効散

治牙齒痛不可忍。及頭腦項背微惡寒。飲大惡熱。其脈上中下三部。陽旺陰盛。是五臟內盛。六腑陽道脈微小。小便滑數。

細辛貳分。　炙甘草叁分。　升麻柒分。　防風壹錢。　草龍腦酒洗貳錢。

右㕮咀。都作一服。水一盞。煎至七分。去柤。以匙抄在口中。漱痛處。待少時則止。

如多惡熱飲，更加草龍膽壹錢，此法不定，隨寒熱多少，臨時加減。若更惡風作痛，加草豆蔻黃連伍分，勿加草龍膽。

牢牙散

治牙齦肉綻有根，牙疳腫痛，牙動搖欲落，牙齒不長，牙黃口臭。

羌活壹兩　草龍膽酒洗壹兩伍錢　羊脛骨灰貳兩　升麻貳兩

右爲細末，以紗羅子羅骨灰作微麤末，和勻，臥時貼在牙齦上。

清胃散

治因服補胃熱藥，致使上下牙疼痛不可忍，牽引頭腦，滿面發熱，大痛，足陽明之別絡入腦，喜寒惡熱，乃是手陽明經中熱盛而作也，其齒喜冷惡熱。

當歸身　擇細黃連如連不好，更加貳分，及倍之。　生地黃酒製伍分　牡丹皮伍分　升麻壹錢

右爲細末，都作一服，水一盞半，煎至一盞，去柤，帶冷服之。

神功丸

治多食肉人口臭不可近，牙齒疳蝕，牙齦肉將脫，牙齒落血不止。

藿香葉如無，藿香代之。　當歸身　藿香用葉。　升麻貳錢　生地黃酒洗　木香伍錢　生甘草伍錢　黃連去鬚，淨洗，秤　檳砂仁伍錢

右同爲細末，湯浸餌餅爲丸，如菉豆大，每服一百丸，或加至二百丸，止白湯下，食遠服，兼治血痢及血崩及血下不止，血下褐色或紫色黑色，及腸澼下血，空心服米湯下，其脈洪大而緩者，及治麻木，厥氣上衝，逆氣上行，忘聞忘見者。

桔梗湯

治咽喉微壅痛，聲破。

當歸身　馬勃壹分　白殭蠶　黃芩伍分　麻黃伍分，不去節　桔梗　甘草壹錢　桂枝少許

右爲麤末，作一服，水二大盞，煎至一盞，去柤，稍熱服之，食後。

又方

治口瘡久不愈者。

黃蘗不計多少，眞者佳，塗其上，令黃色。

右爲細末，乾糝瘡上，臨臥，忌醋醬鹽。

神驗法

治口瘡，無問久新。

夜間將二丸以勒緊左右交手揉三五十次，但遇睡覺行之，如此三五度，因溫而生者一夜愈，久病藩般口瘡三二夜愈，如鼻流清涕者，勒之二丸，揉之數夜可愈。

內經云，膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上口爲糜，易老五苓散與導赤散合而飲之。

嘔吐門

丁香茱萸湯

治嘔吐噦，胃虛寒所致。

黃蘗發分　炙甘草　柴胡　橘皮伍分　吳茱萸　蒼朮　當歸身伍分　草豆蔻仁

右爲麤末，每服五錢，水二大盞，煎至一盞，去柤，稍熱服，食前。

白朮湯一名茯苓半夏湯。

治胃氣虛弱，身重有痰，惡心欲吐，是風邪羈絆於脾胃之間，當先實其脾胃，

炒神麯貳錢　陳皮　白朮伍錢　白茯苓　半夏伍錢　天麻壹錢　麥蘖麵炒黃色

右㕮咀，每服五錢，水二盞，入生薑五片，同煎至一盞，去柤，稍熱服之。

補肝湯一名柴胡半夏湯。

治素有風證，不敢見風，眼澀頭痛，眼黑，胸中有痰，惡心兀兀欲吐，遇風但覺皮肉緊，手足難舉，重物，如居暖室，少出微汗，其證乃減，再或遇風，病即復。

柴胡　升麻　白茯苓藥分　炒神麯　半夏貳錢　生薑拾片　藁本伍分　蒼朮壹錢

右爲麤末，都作一服，水二大盞，煎至一大盞，去柤，稍熱服。

吳茱萸丸一名木香利膈丸。

治寒在膈上，噎塞咽膈不通。

木香　青皮伍分　白殭蠶

姜黃　澤瀉
當歸身　炙甘草已上各陸分
人參　橘皮
黃芪已上各捌分　半夏壹錢
吳茱萸已上各貳分　麥麩麵壹錢伍分

右爲細末，湯浸餅爲丸，如綠豆大，每服二三十丸，溫水送下，勿多飲湯，恐速下，細嚼亦得。

衄血吐血門

麥門冬飲子

治吐血久不愈，以三稜鍼於氣街出血，立愈。

黃芪壹錢　麥門冬
生地黃　人參已上各伍分

右爲麤末，都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤熱服，不拘時。

人參飲子

治脾胃虛弱，氣促氣弱，精神短少，衄血吐血。

麥門冬貳分　人參去芦　當歸身　五味子拾箇

黃芪　白芍藥

五味子伍箇

右爲麤末，都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤熱服。

一貧者有前證，以前藥投之愈，繼而至冬天居曠室中，臥大熱炕而吐血數次，再來求治，料此病久虛弱，附膀有形而有火熱在內，上氣不足，陽氣外虛，當補裹之陽氣，瀉其裏之虛熱，是其法也。冬天居曠室，衣蓋單薄，是重虛其陽，表有大寒，裹遇裏熱，火邪不得舒伸，故血出於口，愷仲景傷寒論中一證，太陽傷寒，當以麻黃湯發汗，而不與之，遂成衄，卻與麻黃湯立愈，此法相同，予遂用之。

三黃補血湯

治六脈俱大，按之空虛，心面赤，善驚上熱，乃手少陰心厥也，此氣盛多而亡血，以甘寒鎮墜之劑大瀉其氣，以陰氣浮，以甘辛□微苦峻補其血。

牡丹皮　黃芪　當歸　柴胡已上各壹伍分　川芎已上各貳錢　生地黃壹錢

右㕮咀如麻豆大，每服五錢，水二大盞，煎至一大盞，去柤，稍熱服，食前。

升麻壹錢　熟地黃　白芍藥伍錢

如兩寸脈芤，血在上焦，或衄血，或嘔血，與犀角地黃湯則愈。

柴胡已上各肆分　陳皮已上各伍分
益智仁　茯苓已上各壹錢
升麻　白芍藥
草豆蔻仁

數脈湯一名人參救肺飲。

治吐血

甘草　蘇木
升麻　柴胡
當歸梢　熟地黃
黃芪　人參已上各貳錢

右爲麤末，都作一服，水二大盞，煎至一盞，去柤，稍溫，食前服。

麻黃桂枝湯

人參俗上能元氣不足而實其表也　麥門冬保肺氣已上各叁分
當歸身和血養血各伍分　麻黃去根節
黃芪實表衛　白芍藥已上各壹錢
桂枝壹錢補表虛　甘草補其脾胃之虛
五味子伍箇斂安其斷氣

右以水三盞，先煎麻黃一味，令沸去沫，至二盞，入餘藥同煎至一盞，去柤熱服，隔臥，只一服而愈，更不再作。

黃芪芍藥湯

治鼻衄血多，面黃，眼澀多眵，手麻木。

爲根　羌活已上各伍錢
炙甘草貳兩　白芍藥
丹麻壹已上各兩
黃芪叁兩

右㕮咀，每服伍錢，水二盞，煎至一盞，食後。

六脈弦緊而濇，按之空虛，其色必白而天不澤者，脫血也，此大寒證，以辛溫補血益血，以甘溫甘熱滑潤之劑以佐之，則愈，此亡血亦傷精氣。

止衄血法

治鼻血久不止，素有熱而暴作者，諸藥無驗，神法以大紙一張，作八摺或十摺，於水內濕潤取出，以熱熨斗熨至一重或二重，紙乾立止。

腰痛門

川芎肉桂湯

丁未冬，曹通甫自河南來，有役人小翟，露宿寒濕之地，腰痛不能轉側，兩脇掐急作痛，已經月餘不愈，腰痛論中說皆爲足太陽足少陰血絡中有凝血作痛，問有一二證屬少陽膽經外絡脈病，皆去血絡之凝乃愈，其內經有云，冬三月禁不得用鍼，只宜服藥，通其輕絡，破其血絡中敗血，以此藥主之。

酒漢防己　防風已上各叁分　炒神麯
獨活已上各伍分　川芎　柴胡

肉桂　當歸梢
蒼朮（壹錢已上各）　羌活（壹錢伍分）
右㕮咀，都作一服，好酒三大盞，煎至一大盞，去柤，稍熱，食遠服。

獨活湯

治因勞役腰痛如折，沉重如山。

炙甘草（貳錢）　羌活
獨活　大黃（煨）
肉桂（已上各壹錢）　當歸梢
酒漢防己　酒黃芪（已上各壹兩）
右㕮咀，每服五錢，酒半盞，水一大盞半，煎至一盞，去柤，熱服。

破血散疼湯

治乘馬損傷，跌其脊骨，惡血流於脇下，其痛苦楚不能轉側，妨於飲食。

羌活　防風
蘇木（壹錢伍分）　連翹
柴胡（已上各貳錢）　水蛭（壹錢，炒去燻，別研）
右件分作二服，每服酒二大盞，水一大盞，除水蛭研香另研如泥，煎餘藥作一大盞，去柤，上火令稍熱，調二味空心服之，兩服立愈。

地龍散

治腰脊痛，或打撲損傷，從高墜下，惡血在太陽經中，令人腰脊痛，或脛踹臂股中痛不可忍，鼻塞不通。

當歸梢（壹分）　中桂
麻黃（伍分）　蘇木（陸分）
黃芪　甘草（已上各壹錢）
桃仁（陸箇）　獨活
羌活（貳錢）
右㕮咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去柤，溫服，食遠。

蒼朮湯

治濕熱腰腿疼痛。

防風（風能勝濕）　黃芪（已上各壹錢，婦得之時，寒也，久不愈，寒化為熱，除濕止痛）
柴胡（貳錢，去行經）　蒼朮（貳錢，去濕止痛）
右都作一服，水二大盞，煎至一盞，去柤，空心服。

麻黃復煎散

炙甘草　防風
桃仁（伍箇，去皮尖，研如泥）　澤瀉
連翹（已上各伍錢）
桃仁（叁拾箇）

治陰室中汗出，懶語，四肢困倦無力，走注疼痛，乃下焦伏火而不得伸，浮而躁熱汗出，一身盡痛，蓋風濕相搏也，以升陽發汗，漸漸發之，火鬱乃濕在經者，亦宜發汗，況正值季春之月，脈緩而遲，尤宜發汗，令風濕去而陽升，以此困倦乃退，氣血俱得生旺也。

白朮　人參
柴胡　防風（已上各伍分）
黃芪（已上各壹錢）　麻黃（去節，微煎，不令作末，水五大盞，煎令沸，去沫，煎至二盞，入下項藥同煎）
黃芪（已上各貳錢）　甘草（叁錢）
右㕮咀，都作一服，入麻黃湯煎至一盞，臨臥服之，勿令食飽，取漸次有汗則効。

緩筋湯（一名羌活湯）

治兩目如火，腫痛，兩足及伏兔筋骨痛，膝少力，身重腰痛，夜惡寒，痰嗽，頸項皆急痛，目外眶，自終急，食不下。

熟地黃（壹分）　生甘草
紅花　炙甘草
獨活（已上各貳分）　藁本
黃芩　草豆蔻仁
生地黃　當歸身
羌活（叁錢）　蒼朮（伍分）
右為麤末，都作一服，水二大盞，煎至一盞，去柤，食遠服之。

拈痛湯

治濕熱為病，肩背沉重，肢節疼痛，胸膈不利。

白朮（壹錢伍分）　人參（去芦）
升麻（去芦）　葛根
防風（去芦）　知母（酒洗）
黃芩（炒）　猪苓
炙甘草　黃芩（酒洗）
羌活（已上各伍錢）
右㕮咀，每服一兩，水二大盞，煎至一盞，去柤，食遠服。

蒼朮復煎散

治寒濕相合，腦右痛，惡寒，項筋脊骨強，肩背脾服痛，膝臂痛無力，行步沉重。

紅花（壹分）　黃蘗（叁分）
柴胡　苦參（酒炒）
蘇木　蒼朮（已上各貳錢）
升麻　澤瀉
酒黃蘗　當歸身（已上各叁錢）
麻黃（已上各叁分）　茵蔯（酒炒）

藁本　澤瀉
升麻已上各伍分　羌活壹錢
右㕮咀，先煎苦芼湯二大盞，復煎前項藥至一大盞，稍熱空心服，取微汗爲効，忌酒濕麵。

羌活苦芼湯
治脚膝無力沉重。
炙甘草　黄芪
生甘草　葛根已上各伍分
柴胡半兩分　升麻
縮砂仁　蒼朮已上各壹錢
黄芪貳錢　知母貳錢伍分
右㕮咀，分作二服，水二大盞，煎至一盞，去柤，空心服。

婦人門

經閉不行有三論

陰陽別論云：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月，其傳爲風消，爲息賁者，死不治。婦人脾胃久虛，或形羸氣血俱衰，而致經水斷絶不行，或病中消胃熱，善食漸瘦，津液不生，夫經者血脈津液所化，津液既絶，爲熱所爍，肌肉消瘦，時見渴燥，血海枯竭，病名曰血枯，經絶，宜瀉胃之燥熱，補益氣血，經自行矣。此證或經適行而有子，子不安，爲胎病者有矣，或心包脈洪數躁作，時見大便祕澀，小便雖清不利，而經水閉絶不行，此乃血海乾枯，宜調血脈，除包絡中火邪，而經自行矣。內經所謂小腸移熱於大腸，爲瘕瘕爲沉，脈澀不利，則月事沉滯而不利，故云爲瘕瘕爲沉也。或因勞心，心火上行，月事不來，安心和血瀉火，經自行矣。故內經云：月事不來者，胞脈閉也。胞脈者，屬心而絡於胞中，命氣上迫肺，心氣不得下，故月事不來也。

經漏不止有三論

陰陽別論云：陰虛陽搏謂之崩。婦人脾胃虛損，致命門脈沉細而數疾，或沉弦而洪大有力，寸關脈亦然，皆由脾胃有虧，下陷於腎，與相火相合，濕熱下迫，經漏不止，其色紫黑，如夏月腐肉之臭，中有白帶者，脈必弦細，寒作於中，中有赤帶者，其脈洪數疾熱明矣，必腰痛或臍下痛，隨經欲行，先見寒熱往來，兩脅急縮，兼脾胃證出見，或四肢困熱，心煩不得眠臥，心下急，宜大補脾胃而升舉血氣，可一服而愈。或人故貴脫勢，人事疎少，或先富後貧，心氣不足，其火大熾，旺於血脈之中，又致脾胃飲食失節，火乘其中，形質肌肉容顏似不病者，此心病者不行於診，故脾胃飲食不調，其證顯矣，而經水不時而下，或適來適斷，暴下不止，治當先說惡死之言勸諭，令拒死而心不動，以大補氣血之藥，舉養脾胃，微加鎮墜心火之藥，治其心。補陰瀉陽，經自止矣。痿論云：悲哀大甚，則胞絡絶也，陽氣內動發，則心下崩，數溲血也。故本病曰：大經空虛，發則肌痺，傳爲脈痿，此之謂也。

升陽除濕湯一名調經升麻除濕湯。
治女子漏下惡血，月事不調，或暴崩不止，多下水漿之物，皆由飲食不節，或勞傷形體，或素有心氣不足，困飲食勞倦，致令心火乘脾，其人必怠惰嗜臥，四肢不收，困倦乏力，無氣以動，氣短，上氣逆急上衝，其脈緩而弦急，按之洪大，皆中之下得之，脾土受邪也，脾主滋榮周身者也，心主血，血主脈，二者受邪，病皆在脈，脈者血之府也，脈者人之神也，心不主令包絡代之，故曰心之脈主屬心系，心系者，包絡命門之脈也，主月事，因脾胃虛而心包乘之，故漏下月事不調也，況脾胃爲血氣陰陽之根蔕也，當除濕去熱，益風氣上伸以勝其濕，又云火鬱則發之。

當歸酒洗　蔓荊子藥分
防風　升麻
藁本已上各壹錢　柴胡
炙甘草　羌活
苦芼　黄芪已上各壹錢伍分
右剉如麻豆大，勿令作末，都作一服，以潔淨新汲水三大盞，煎至一大盞，去柤，空心熱服，待少時以阜飯壓之，可一服而已。如灸足太陰脾經中血海穴二七壯亦已。
此藥乃從權之法，用風勝濕，爲胃下陷而氣迫於下，以救其血之暴崩也，併血惡之物住後，必須黄芪、人參、炙甘草、當歸之類數服以補之，於補氣升陽湯中加以和血藥便是也。若經血惡物下之不絶，尤宜究其根源，治其本經，只益脾胃，退心火之亢，乃治其根蔕也。若遇夏月白帶下脫漏不止，宜用此湯一服立止。

涼血地黄湯
治婦人血崩，是腎水陰虛，不能鎮守包絡相火，故血走而崩也。

黄芩　蔓荊子壹分已上各
黄蘗　藁本
細辛　黄連
羌活　升麻
防風已上各叁分　柴胡
甘草壹錢　生地黄
紅花少許　當歸已上各伍分
右㕮咀，都作一服，水三大盞，煎至一盞，去柤，稍熱，空心服之。
足太陰脾之經中血海二穴，在膝臏上內廉白肉際二寸中，治女子漏下惡血，月事不調，逆氣腹脹，其脈緩者是也。灸三壯。
足少陰腎之經中陰谷二穴，在膝內輔骨後大筋下小筋上，按之應手，屈膝取之，治膝如錐，不得屈伸，舌

纖漏下，煩逆溺難，少腹急引陰痛，股內臊痛，婦人漏血不止，腹脹滿不得息，小便黃如蘗，女子如姙身，可灸二壯。

酒煮當歸丸

治瘧疾白帶下，疰脚氣，腰已下如在冰雪中，以火焙煖，重重厚綿衣蓋其上，猶寒冷不任，寒之極也，面白如枯魚之狀，肌肉如刀割削，瘦峻之速也，小便不止，與白帶長流而不禁固，自不知覺，面白目青藍如菜色，目眩眩無所見，身重如山，行步欹側，不能安地，腿膝枯細，大便難秘，口不能言，無力之極，食不下，心下痞，煩心懊憹不任其苦，而停痞，背惡寒，小便遺而不知，此上中下三陽真氣俱虛欲竭，噦不止，胃虛之極也，脈沉厥緊而濇，按之空虛，若脈洪大而濇，按之無力，猶爲中寒之證，況按之空虛者乎，按之不鼓，是爲陰寒，乃氣血俱虛之極也。

茴香伍錢　黑附子炮製去皮臍　良薑已上各壹錢

當歸叁兩

右四味剉如菉豆大，以上等好酒一升半同煮，至酒盡焙乾。

炙甘草　苦練生用　丁香已上各伍錢　木香　升麻已上各壹錢　柴胡貳錢　炒黃鹽　全蠍已上各壹錢　延胡索肆錢

右與前四味藥同爲細末，酒煮麵糊爲丸，如梧桐子大，每服五七十丸，空心淡醋湯下，忌油膩冷物酒濕麵。

固真丸

治白帶久下不止，臍腹冷痛，陰中亦然，日中溜火，視物眩暈然無所見，齒皆惡熱飲痛，須得黃連細末擦之乃止，惟喜乾食，大惡湯飲，此病皆寒濕乘其胞內，故喜乾而惡濕，肝經陰火上溢，走於標，故上盛而目中溜火，腎水侵肝而上溢，致目眩暈而無所見，齒惡熱飲者，是陽明經中伏火也，治法當大瀉寒濕，以丸藥治之，故曰寒在下焦，治宜緩，大忌湯散，以酒製白石脂白龍骨以枯其濕，炮乾薑大熱辛瀉寒水，以黃蘗之大寒爲因用，又爲鄉導，故云，右者雖有重罪，不絕人之後，又爲之伏其所主，先其所因之意，又瀉齒中惡熱飲也，以柴胡爲本經之使，以芍藥五分導之，恐辛熱之藥大甚，損其肝經，故微瀉之，以當歸身之辛溫，大和其血脈，此用藥之法備矣。

黃蘗酒洗　白芍藥已上各壹兩分　柴胡　當歸酒洗已上各貳錢　白石脂已上各壹錢，火燒赤，水飛細研，日乾　白龍骨酒煮，日乾，水飛爲末　乾薑炮，肆錢

右件除龍骨白石脂水飛研外，同爲細末，水煮麵糊爲丸，如雞頭仁大，日乾，空心多用白湯湯下，無令胃中停滯，待少時以早飯壓之，是不令熱藥犯胃，忌生冷硬物酒濕麵。

烏藥湯

治婦人血海疼痛。

當歸　烏藥壹兩　甘草　香附子貳兩炒

右㕮咀，每服五錢，水二大盞，去柤，溫服，食前。

助陽湯一名升陽除濕湯

治白帶下，陰戶中痛，空心而急痛，身黃皮緩，身重如山，陰中如冰。

生黃芪　橘皮已上各伍分　防風　高良薑　乾薑　郁李仁　甘草已上各壹錢　柴胡叁錢分　白茯花葉桑

右剉如麻豆大，分作二服，每服水二大盞，煎至一盞，去柤，食前，稍熱服。

水府丹

治婦人久虛積冷，經候不行，癥瘕癖塊，腹中暴痛，面有黯黯黑氣痛。

硇砂淋熬沸湯取　紅豆已上各伍錢　桂心去粗皮　木香　乾薑已上各壹兩　砂仁貳兩　經煆花葉石研壹兩　生地黃汁　蓽子小便各壹升　班猫去壹百箇頭翅　蜆蛤卷百箇去頭足，糯米壹升炒，米黃去米不用　臘月狗膽壞枚

右九味爲細末，同三汁熬爲膏，和丸如雞頭大，硃砂爲衣，每服一丸，溫酒細嚼，食前服，米飲亦可，孕婦不可服。

丁香膠艾湯

治崩漏不止，蓋心氣不足，勞役及飲食不節所得，經隔少時，其脈二尺俱弦緊洪，按之無力，其證自覺臍下如冰，求厚衣被以禦其寒，白帶白濇之物多，間有如屋漏水，下時有鮮血，右尺脈時微洪也。

熟地黃　白芍藥已上各叁分　丁香已上各肆分　阿膠壹分　當歸壹錢貳分　川芎　生艾葉壹錢

右川芎爲細末，當歸酒洗剉，熟地黃丁香爲細末，艾亦剉，都作一服，水五大盞，先煎五味作一盞，各二分，去柤，入膠，再上火煎至一大盞，帶熱空心服之。

黃芪當歸人參湯

丁未仲冬，郭大方來說其妻經水崩漏不止，先曾損身失血，自後一次縮一十日而來，今次不止，其人心容性急多慮，以予料之，必因心氣不足，飲食不節得之，大方曰無，到彼診得寸中寸脈沉細而緩，間

而沉數。九竅微有不利。四肢無力。上喘氣短促。口鼻氣皆不調。果有心氣不足脾胃虛弱之證。胃脘當心而痛。左脅下縮急有積。當臍有動氣。腹中鳴。下氣大便難。脈證極多。不能盡錄。擬先治其本。餘證可以皆去。安心定志。鎮壓其經。調和脾胃。大益元氣。補其血脈。令養其神。以大熱之劑去其冬寒凝在皮膚內。少加生地黃。去命門相火。不令四肢痿弱。

黃連壹分。　生地黃叁分。　連神麴　草豆蔻仁貳分。
橘皮　桂枝已上各伍分。　麻黃不去節已上各叁錢。
黃芪　人參
當歸身伍錢伍分。　杏仁伍箇另研如泥。

右㕮咀作二服。水二大盞半。煎麻黃令沸去沫。煎至二盞。入諸藥同煎至一大盞。於巳午之間。食消盡服之。一服立止。其胃脘痛乃胃上有客寒。與大熱藥草豆蔻丸一十五丸。白湯送下。其痛立止。再與肝之積藥。除其積之根源而愈。

當歸芍藥湯

治婦人經脈漏下不止。其色鮮紅。時值七月處暑之間。先因勞役。脾胃虛弱。氣短氣逆。自汗不止。身熱悶亂。惡見飲食。非惟不入。亦不思食。沉困困倦。四肢無力。大便時泄。後再因心氣不足。經脈再下不止。惟覺氣下脫。其元氣逆上全無。惟覺心腹中氣下行。氣短少不能言。是無力以言。非懶語也。此藥主之。

柴胡貳分。　炙甘草　生地黃叁分。
橘皮不去白。　熟地黃已上各伍分。　黃芪壹錢伍分。
荊芥浄洗去皮。　當歸身　白芍藥
白芷已上各貳錢。

右十味㕮咀如麻豆大。分作二服。水二盞半。煎至一盞。去柤稍熱。空心服之。

柴胡調經湯

治經水不止。鮮紅。項筋急。腦痛。脊骨強痛。

炙甘草　當歸身　葛根已上各叁分。
獨活　羌活　升麻已上各伍分。
柴胡貳分。　荊芥已上各壹錢。
紅花少許。

右剉如麻豆大。都作一服。水四大盞。煎至一盞。去柤。空心稍熱服。取微汗。立止。

一婦人經候凝結。黑血成塊。左廂有血瘕。水泄不止。穀有時不化。後血塊暴下。并水俱作。是前後二陰有形血脫竭於下。既久。經候猶不調。水泄日見三兩行。食能煩心。飲食減少。甚至瘦弱。東垣老人曰。夫聖人治病。必本四時升降浮沉之理。權變之宜。必先察氣。無伐天和。無勝無虛。遇人天殃。無致邪。無失正。絕人

長命。故仲景云。陽盛陰虛。下之則愈。汗之則死。陰盛陽虛。汗之即愈。下之即死。大抵聖人立法。且如升陽或發散之劑。是助春夏之陽氣。令其上升。乃瀉秋冬收藏殺寒涼之氣。此病是也。當用此法治之。升降浮沉之至理也。天地之氣。以升降浮沉乃從四時。如治病不可逆之。故經云。順天則昌。逆天則亡。可不畏哉。夫人之身。亦有四時天地之氣。不可止認在外。人亦體同天地也。今經漏不止。是前陰之氣血已脫下矣。水泄又數年。是後陰之氣血下陷以脫矣。後陰者。主有形之物也。前陰者。精氣之戶下竭。是病人周身之血氣。常行秋冬之令。陰主殺。此等收藏之病是也。陽生陰長。春夏是也。在人之身。令氣升浮者。穀氣上行是也。既病。人周身血氣皆不生長。穀氣又不勝。其肌肉消少。是兩虛之氣俱將絕矣。既下元二陰俱脫。血氣將竭。假令當是熱證。今下焦久脫。化爲寒矣。此病久沉久降。寒濕大勝。當急救之。瀉寒以熱。除濕以燥。大升大舉。以助生長。補養氣血。不致偏竭。聖人立治之法。既濕氣大勝。以所勝治之。助甲風木上升是也。故經云。風勝濕。是以所勝平之也。當先調和胃氣。次用白芷之類。以燥其濕而滋元氣。如其不止。後用風藥以勝濕。此便是大舉大升。以助春夏二濕之久陷下之至治也。

益胃升陽湯

血脫益氣。古聖人之法也。先補胃氣。以助生發之氣。故曰陽生陰長。諸甘藥爲之先務。舉世皆以爲補。殊不知甘能生血。此陽生陰長之理也。故先理胃氣。人之身內胃氣爲寶。

柴胡　升麻已上各伍分。　炙甘草
當歸身酒洗。　陳皮已上各壹錢。　人參去芦。有嫩去之。
炒神麴已上各錢伍分。　黃芪貳錢。　白芷叁錢。
生黃芩少許。

右㕮咀。每服二錢。水二大盞。煎至一盞。去柤稍熱服。

如腹中痛。每服加白芍藥叁分。中桂少許。

如渴或口乾。加葛根貳分。不拘時候。

升陽陰經湯

治經水不止。如右尺脈按之空虛。是氣血俱脫。大寒之證。經手其脈數疾。舉指弦緊或澀。皆陽脫之證。陰火亦亡。見熱證於口鼻服。或渴。此皆陰躁陽欲先去也。當溫之舉之升之浮之燥之。此法當大升浮血氣。切補命門之下脫也。

肉桂去皮。盛夏勿用。秋冬用。　白芍藥　紅花已上各伍分。
細辛陸分。　人參去芦。　熟地黃
川芎已上各壹錢。　獨活根　黑附子炮製去皮臍。
炙甘草已上各伍分。　羌活　藁本去土。
防風已上各貳錢。　白芷　當歸

黃芪已上各叁錢　柴胡已上各叁錢

右㕮咀每服三錢若病勢順當漸加至五錢每服水三盞煎至一盞空心熱服

桃仁拾箇湯浸去皮尖細研

半產誤用寒涼之藥論

婦人分免及半產漏下昏冒不省假目無所知覺蓋因血暴亡有形血去則心神無所養心與包絡者君火相火也得血則安亡血則危火上燒故令人昏冒火勝其肺腹目不省人事是陰血暴去不能鎮撫也血已虧損往往用滑石甘草石膏之類乃辛甘大寒之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽使二者俱傷反爲不足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之熱用寒涼之藥驅令下行豈不知上焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈今反下之幸而不死暴虧氣血生命豈能久活又不知內經有說病氣不足宜補不宜瀉俱以自之病悉屬於陰宜汗不宜下又不知傷寒鬱冒得汗則愈是禁用寒涼藥也分免半產本氣不病是暴去其血亡血補血又何疑焉補其血則神昌當時血下降亡今當補而升舉之心得血而養神不昏矣血若暴下是秋冬之令大旺今舉而升之以助其陽則目張神不昏迷矣今立一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足也

全生活血湯

紅花叁分　蔓荊子　細辛已上各伍分

生地黃加之多　熟地黃已上各叁錢　藁本

川芎已上各伍分　防風諸陽脫陷何以知也血下脫故也　羌活

獨活　炙甘草

當歸身酒洗　葛根已上各貳錢

升麻已上各叁錢

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤食前稍熱服

當歸附子湯

治臍下冷痛赤白帶下

當歸貳分　炒鹽叁分　蠟柏

升麻已上各伍分　甘草陸分　柴胡叁分

黃芪少許爲引用　附子壹錢　乾薑貳錢

右爲粗末每服五錢水五盞煎至一盞去柤稍熱服或爲細末酒麵糊爲丸亦可

調經補眞湯

冬後一月微有地泥冰泮其白帶再來陰戶中寒一服立止

獨活　乾薑炮　藁本

防風　蒼朮已上各貳分　麻黃不去節

炙甘草　人參去芦

白朮　生黃芪

黃芪叁分　良薑

羌活已上各叁錢　柴胡肆錢

桂枝少許　白蒺藜炒去刺

右㕮咀除黃芩麻黃各另外都作一服先以水三大盞半煎麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至一盞容叁分再入生黃芩煎至一盞空心服之候一時許可食早飯

坐藥龍腦香

茴香叁分　枯礬伍分　當歸身

當歸梢　酒防己　木通已上各壹錢

丁香　木香　川烏炮已上各壹錢伍分

龍骨　炒鹽　紅豆

肉桂已上各貳錢　厚朴叁錢　延胡索伍錢

全蠟伍箇

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大綿裹留系在外內丸藥陰戶內日易之

勝陰丹

爲水藥力小再取三錢內加行性熱藥項下

柴胡　羌活　全蠟

甘松　升麻已上各貳分　草烏頭

大椒　三棱子　枯白礬

枯礬已上各伍分　三棱子已上各伍分　柴胡　川烏頭

炒黃蠟爲必用之藥去之則不効　全蠟叁箇　破故紙　蒜葉分

蝟皮二箇去毛刺足炒

右爲極細末依前製用臍下發暖爲効

迴陽丹

羌活　全蠟　升麻根

甘松已上各貳分　草烏頭　水蛭炒已上各叁分

大椒　三棱子　葶藶

枯礬已上各伍分　柴胡　川烏已上各叁分

炒黃蠟去之則不効　破故紙　蒜已上各壹錢

蝟皮二箇去毛刺足炒

右爲極細末依前製用臍下發暖爲効

柴胡丁香湯

治婦人年三十歲臨經先腰臍痛，甚則腹中亦痛，經縮三兩日。

生地黃貳分，　丁香肆分，　當歸身　柴胡壹錢伍分，
防風　　羌活壹錢肆分，
全蠟壹箇，

右件都作一服，水二盞，煎至一盞，去粗，食前稍熱服。

延胡苦楝湯

治臍下冷撮痛，陰冷大寒白帶下。

黃蘗壹分，爲引用，　延胡索　苦楝子貳分，
附子炮，　肉桂肆分，　炙甘草伍分，
熟地黃壹錢，

右都作一服，水二大盞，煎至一盞，食前服。

桂附湯

治白帶腥臭，多悲不樂，大寒。

黃蘗貳錢，引用，　知母伍分，　肉桂壹錢，
附子叁錢，

右㕮咀，都作一服，水二盞，煎至一盞，去粗，食遠熱服。

如少食常飽，有時似腹脹滿悶，加白芍藥伍分。

如不思飲食，加五味子貳拾箇。

如煩惱面上如蟲行，乃胃中元氣極虛，加黃芪壹錢伍分，人參壹分，炙甘草升麻伍分，已上各

人參補氣湯

治四肢懶惰，自汗無力。

丁香末貳分，　生甘草梢　炙甘草叁分，已上各
生地黃　　白芍藥伍分，已上各　熟地黃壹分，
人參　　防風　　羌活
黃蘗　　知母　　當歸身
升麻叁分，已上各　柴胡壹錢，　黃芪壹錢伍分，
全蠟壹箇，　五味子貳拾箇，

右剉如麻豆大，都作一服，水二盞，煎至一盞，去粗，空心稍熱服。

黃芪白朮湯

治婦人四肢沉重，自汗，上至頭際頸而逆，惡風，頭痛躁熱。

細辛叁分，　吳茱萸　川芎伍分，已上各
柴胡　　升麻壹錢，已上各　當歸身壹錢伍分，
黃蘗酒洗，　炙甘草　羌活貳錢，已上各
五味子叁錢，　白朮　人參伍錢，已上各
黃芪壹兩，

右㕮咀，每服五錢，水二大盞，生薑五片，煎至一盞，去粗，食前熱服。

如腹中痛不決，加炙甘草壹錢，汗出不止，加黃蘗壹錢。

白朮茯苓湯

治胃氣弱，身重有痰，惡心欲吐，是風邪羈絆於脾胃之間，當先實其脾胃。

白朮　　白茯苓
炒麴貳錢，　麥蘗麵伍分，炒，
右㕮咀，每服五錢，水二大盞，入生薑五片，煎至一盞，去粗，不拘時服。

增味四物湯

治婦人血積。

當歸　　川芎
熟地黃　　京三稜　　芍藥
肉桂去皮，　廣茂已上各等分，　乾漆炒煙盡，

右爲麤末，每服五錢，水二大盞，煎至一盞，去粗，食前稍熱服。

補經固真湯

白文舉正室白帶常漏久矣，諸藥不効，診得心包尺脈微，其白帶下流不止，叔和云，崩中日久爲白帶，漏下時多，白滑血枯，崩中者，始病血崩，久則血少，復亡其陽，故白滑之物下流不止，是本經血海將枯，津液復亡，枯乾不能滋養筋骨，以本部行經藥爲引用爲使，以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋益津液，以大辛熱之氣味藥補其陽道，生其血脈，以苦寒之藥泄其肺間，救上熱傷氣，以人參補之，以微苦溫之藥爲佐而益元氣。

白蘗花去蕊，爛研，半分，　甘草炙，　郁李仁去皮，研泥，尖
柴胡壹錢，已上各　乾薑細末，　人參貳錢，已上各
生黃芩壹錢，細研，　陳皮貳分，

右件除黃芩外，以水三盞，煎至一盞七分，再入黃芩，同煎至一盞，去粗，空心熱服，少時以早飯壓之。

溫衛補血湯

治耳鳴，鼻不聞香臭，口不知殺味，氣不快，四肢困倦，行步欹側，髮脫落，食不下，膝冷，陰汗，帶下，喉中吟吟不得臥，口舌蓋乾，大息頭不可以回顧，項筋緊，脊強痛，頭旋眼黑，頭痛欠嚏。

生地黃　白芷　牡丹皮　黃芪已上各等分　王瓜根　橘皮　當歸身中貳分　柴胡　熟甘草　地骨皮已上各等分　生甘草伍分　黃芪壹錢貳分　丁香壹箇　桃仁壹箇　葵花葉柒箇

右㕮咀作一服，用水二大盞，煎至一盞，去粗，食前熱服。

立効散

治婦人血崩不止。

當歸　蓮花心　紅花　茅花已上各用　白綿子

右剉如豆大，白紙裹定泥固，炭火燒灰存性，爲細末，如乾血氣，研血竭爲引，好溫酒調服，加輕粉壹錢，如血崩不止，加麝香爲引，好溫酒調服。

四聖散

治婦人赤白帶下。

川烏炮製　生白礬已上各壹錢　紅娘子壹箇　班猫拾箇　白綿子

煉蜜爲丸，如皂子大，綿裹坐之。

溫經除濕湯

十月霜冷後，四肢無力，乃痿厥濕熱在下焦也，齒心者，是濁氣不下降，欲爲滿也，合眼麻木作者，陽道不行也，惡風寒者，上焦之分，皮膚中氣不行也，開目不麻者，目開助陽道，故陰寒之氣少退也，頭旋眩運者，風氣下陷於血分，不得伸越而作也，近火則有之。

黃連壹分　柴胡　木香已上各貳分　神麯炒　當歸身　獨活　升麻伍分　羌活柒分　草豆蔻　麻黃不去節　黃芪已上各貳分　炙甘草

人參　白芷　澤瀉壹錢　黃芪　貨芎已上各貳錢　白芍藥壹錢　猪苓　橘皮

右剉如麻豆大，分作二服，水二盞，煎至一盞，食遠服，治支節沉重疼痛無力之勝藥也。

補氣升陽和中湯

李正臣夫人病，診得六脈俱中，得弦洪緩相合，按之無力，弦在上，是風熱下陷入陰中，陽道不行，其證閉目則渾身麻木，蹉減而夜甚，覺而開目，則麻木漸退，久則絕止，常開其目，此證不作，懼其麻木，不敢合眼，致不得眠，身體皆重，時有痰嗽，覺胸中常似有痰而不利，時煩躁氣短促而喘，肌膚充盛，飲食不減，大小便如常，惟提其麻木不敢合眼爲最苦，觀其色脈形病，相應而不逆，內經曰，陽盛則目而動輕，陰病閉目而靜重，又云，諸脈皆屬於目，靈樞經云，開目則陽道行，陽氣遍布週身，閉目則陽道閉而不行，如晝夜之分，知其陽衰而陰旺也，且麻木爲風，三尺之靈，皆以爲然，細校之則有區別耳，久坐而起，亦有麻木，爲如繩縛之久，釋之覺麻作而不敢動，良久則自已，以此驗之，非有風邪，乃氣不行，主治之當補其肺中之氣，則麻木自去矣，如經脈中陰火乘其陽分，火動於中，爲麻木也，當兼去其陰火，則愈矣，時痰嗽者，秋涼在外在上而作也，當以溫劑實其皮毛，身重脈緩者，濕氣伏匿而作也，時見躁作，當升陽助氣益血，微瀉陰火與濕，通行經脈，調其陰陽，則已矣，非五臟六腑之本有邪也，此藥主之。

生甘草去節　酒黃蘗除濕火　澤瀉除濕湯　升麻行陽助經　黃芪蜜炙　草豆蔻仁蜜炙陽退外寒已上各壹錢伍分　當歸身　白芍藥貳錢　人參已上各叁錢　白茯苓除濕火　柴胡已上各壹錢　佛耳草　橘皮　黃芪蜜炙　白芍藥　炙甘草已上各肆錢

右㕮咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去粗，食遠服之。

麻黃桂枝升麻湯

治婦人先患渾身麻木，睡覺則少減，開目則已而全愈，又證已痊，又因心中煩惱，遍身骨節疼，身體沉重，飲食減少，腹中氣不運轉。

木香　生薑壹分已上各　半夏　陳皮　厚朴　黑附子　炙甘草　升麻　茯苓　澤瀉叁分已上各　桂枝　草豆蔻仁　黃蘗貳分已上各　白芍　黃芪

麻黃不去節　人參已上各一分

右都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤，食遠服之。

蘭室秘藏卷下

大便結燥門

大便結燥論

金匱真言論云：北方黑色，入通腎，開竅於二陰，藏精於腎。又云：腎主大便，大便難者，取足少陰。夫腎主五液，津液潤則大便如常，若饑飽失節，勞役過度，損傷胃氣，及食辛熱味厚之物，而助火邪，伏於血中，耗散真陰，津液虧少，故大便結燥。然結燥之病不一，有熱燥，有風燥，有陽結，有陰結，又有年老氣虛，津液不足，而結燥者。治法云：腎惡燥，急食辛以潤之，結者散之，如少陰不得大便，以辛潤之，太陰不得大便，以苦泄之，陽結者散之，陰結者溫之。仲景云：小便利而大便硬，不可攻下，以脾約丸潤之。食傷太陰，腹滿而食不化，腹響，然不能大便者，以苦藥泄之。如血燥而不能大便者，以桃仁酒製大黃通之。風結燥而大便不行者，以麻子仁加大黃利之。如氣澀而大便不通者，以郁李仁、枳實、皂角仁潤之。大抵治病必究其源，不可一概用巴豆、牽牛之類下之，損其津液，燥結愈甚，復下復結，極則以至迫引於下而不通，遂成不救，豈可不慎哉。

通幽湯

治大便難，幽門不通，上衝吸門不開，噎塞不便，燥祕氣不得下，治在幽門以辛潤之。

炙甘草　熟地黃已上各一分　當歸身已上各一錢　紅花已上各一錢分　升麻　生地黃　桃仁泥

右都作一服，水二大盞，煎至一盞，去柤，調槐柳細末五分，稍熱，食前服之。

潤燥湯

升麻　當歸梢　桃仁泥　生地黃已上各貳錢　生甘草　麻仁已上各壹錢　熟地黃　大黃煨　紅花五分

右除桃仁麻仁另研如泥外，剉如麻豆大，都作一服，水二盞，入桃仁麻仁泥，煎至一盞，去柤，空心稍熱服。

潤腸丸

治脾胃中伏火，大便祕澀，或乾燥閉塞不通，全不思食，及風結血祕，皆令閉塞也。以潤燥和血疎風，自然通利矣。

桃仁湯浸，去皮尖　麻仁已上各壹兩　當歸梢　大黃煨　羌活已上各壹錢

右除桃仁麻仁另研如泥外，搗為極細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服三五十丸，空心白湯下。

如病人不大便，為大便不通而澀，其邪盛者，急加酒洗大黃以利之。

如血燥而大便燥乾者，加桃仁、酒洗大黃。

如風結燥，大便不行者，加麻仁、大黃。

如風濕而大便不行，加煨皂角仁、大黃、秦艽以利之。

如脈澀，體身有氣澀而大便不通者，加郁李仁、大黃以除氣燥。

如寒陰之病，為寒結閉而大便不通者，以局方中半硫丸或加煎附子乾薑湯冰冷與之。其病雖陰寒之證，當服陽藥補之，若大便不通者，亦當十服中與一服藥微通其大便，不令結閉，乃治之大法。

若病人雖是陰證，或是陰寒之證，其病顯躁，脈實堅，亦宜於陽藥中少加苦寒之藥，以去熱躁，躁止勿加。如陰躁欲坐井中者，其二腎脈按之必虛，或沉細而遲，此易為辨耳。如有客邪之病，亦當從權加藥以去之。

麻黃白朮湯

治大便不通五日一遍，小便黃赤，渾身風，面上及腹尤甚，色黃，麻木，身重如山，沉困無力，四肢痿軟，不能舉動，喘促唾涕水，吐噦，痰唾白沫如膠，時躁熱，發欲去衣，須臾而過，振寒，項額有時如冰，額寒尤甚，頭旋眼黑，目中溜火，冷淚，鼻不聞香臭，少腹急痛，當臍有動氣，按之堅硬而痛。

青皮去瓤　酒黃連壹兩分　橘紅　甘草炙半　黃芪　人參　白朮　厚朴　蒼朮　猪苓叁分　白茯苓　澤瀉肆分　炒麴伍分　麻黃不去節伍錢　杏仁肆個

右㕮咀分作二服。水二大盞半。先煎麻黃。令沸去沫。再入諸藥。同煎至一盞。去柤稍熱。食遠服。

此證宿有風濕。熱伏於榮血之中。其木火乘於陽道。爲上盛。元氣短少。上喘爲陰火傷其氣。四肢痿。在腎水之間。乃所勝之病。今正遇冬寒得時。乘其肝木。又實其母。肺金尅火凌木。是大勝必有大復。其證善恐欠多嚏。鼻中如有物。不聞香臭。目視眩眩。多悲健忘。少腹急痛。通身黃。腹大脹。面目腫尤甚。食不下。痰唾涕有血。目皆黃。大便不通。並宜此藥治之。

升陽湯一名升陽滌濕湯。

治膈咽不通。逆氣裏急。大便不行。

青皮　槐子已上各貳分　酒黃連已上各壹分　熟地黃　黃芪已上各叁分　生地黃　甘草炙柒分　蒼朮伍分　當歸身　桃仁拾箇另研　升麻柒分

右㕮咀如麻豆大。都作一服。入桃仁泥。水二大盞。煎至一盞。去柤。稍熱。食前服。

活血潤燥丸

治大便風秘血秘。常常燥結。

當歸稍壹錢　防風柒錢　大黃濃紙燥　羌活已上各壹兩　皂角仁燒存性去皮壹兩伍錢其性得濕則滑溫滑則燥結自除　桃仁如泥貳兩研　麻仁貳兩伍錢研如泥

右除麻仁桃仁另研如泥外。爲極細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。白湯下。三兩服後。須以蘇麻子粥每日早晚食之。大便日久不能結燥也。以磁器盛之。紙封。無令見風。

潤腸湯

治大腸結燥不通。

生地黃　生甘草已上各壹錢　熟地黃　當歸稍　大黃煨　升麻

酒黃芩　升麻已上各貳分　桂枝　柴胡　吳茱萸　白豆蔻　杏仁舊者

桃仁　麻仁已上各壹錢

右㕮咀。水二盞。煎至一盞。去柤。食遠溫服。

紅花叁分

小便淋閉門

小便淋閉論

難經云。病有關有格。關則不得小便。又云。關無出之謂。皆邪熱爲病也。分在氣在血而治之。以渴與不渴而辨之。如渴而小便不利者。是熱在上焦肺之分。故渴而小便不利也。夫小便者。是足太陽膀胱經所主也。長生於申。申者。西方金也。肺合生水。若肺中有熱。不能生水。是絕其水之源。經云。虛則補其母。宜清肺而滋其化源也。故當從肺之分。助其秋令。水自生焉。又如雨如露如霜。皆從天而降下也。乃陽中之陰。明秋氣自天而降下也。且藥有氣之薄者。乃陽中之陰。是感秋清肅殺之氣而生。可以補肺之不足。淡味滲泄之藥是也。茯苓、澤瀉、琥珀、燈心、通草、車前子、木通、瞿麥、扁蓄之類。以清肺之氣。泄其火。資水之上源也。如不渴而小便不通者。熱在下焦血分。故不渴而大燥。小便不通也。熱閉於下焦者。腎也。膀胱也。乃陰中之陰。陰受熱邪。閉塞其流。易上老云。塞在胸中。遏絕不入。熱在下焦。壅塞不便。須用咸北方寒水之化氣味俱陰之藥。以除其熱。泄其閉塞。內經云。無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。若服淡滲之藥。其性乃陽中之陰。非純陽之劑。陽無以化。何能補重陰之不足也。須用咸地之水運而生太苦之味。咸天之寒藥而生大寒之氣。此氣味俱陰。乃陰中之陰也。大寒之氣。人稟之生膀胱。寒水之運。人咸之生腎。此藥能補腎與膀胱。受陽中之陽。熱火之邪。而閉其下焦。使小便不通也。夫用大苦寒之藥。治法當塞因熱用。又云。必伏其所主而先其所因。其始則氣同。其終則氣異也。

通關丸一名益腎丸。

治不渴而小便閉。熱在下焦血分也。

黃蘗去皮剉酒洗焙　知母剉酒洗焙乾肉桂伍分　肉桂伍分

右爲細末。熟水爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。空心白湯下。頓兩足。令藥易下行故也。如小便利。前陰中如刀刺痛。當有惡物下爲驗。

清肺飲子

治渴而小便閉澀不利。邪熱在上焦氣分。

燈心壹分　通草貳分　澤瀉　瞿麥　木通柒分　琥珀伍分　扁蓄　猪苓去皮壹錢　車前子炒壹錢　茯苓去皮貳錢

右爲麤末。每服五錢。水一盞半。煎至一盞。稍熱。食遠服。或局方八正散五苓散亦宜服之。

導氣除燥湯

治小便閉塞不通，乃血澀至氣不通而致澀也。

茯苓去皮　滑石炒黃，各貳錢，已上　知母酒浸，焙　澤瀉叁錢，已上各　黃蘗去皮酒洗，肆錢，

右㕮咀，每服五錢，水三盞，煎至一盞，去粗，稍熱，空心服。如急閉，不拘時服。

腎疸湯

治腎疸目黃，甚至渾身黃，小便赤澀。

羌活　防風　藁本　獨活　柴胡已上各伍分，　升麻伍錢，

已上治腎疸目黃渾身黃。

白茯苓貳分，　澤瀉叁分，　猪苓肆分，

白朮伍分，　蒼朮壹錢，　鳥根伍分，

已上治小便赤澀。

黃蘗貳分，　人參叁分，

神麯陸分，　甘草叁錢，

右剉如大豆大，分作二服，水三盞，煎至一盞，去粗，稍熱，食前服。

痔漏門

痔漏論

內經曰：因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。夫大腸庚也，主津，本性燥，清肅殺之氣，本位主收，其所司行津以從足陽明。旺則生化萬物者也，足陽明為中州之土，若陽衰亦殞殺萬物，故曰：萬物生於土而歸於土者，是也。以手陽明大腸司其化焉，既在西方本位為之害，蓋司殺之府，因飽食行房，忽泄前陰之氣，歸於大腸，木乘火勢而侮燥金，故火就燥也，大便必閉，其疾甚者，當以苦寒瀉火，以辛溫和血潤燥，疎風止痛，是其治也。以秦艽、當歸梢、和血潤燥，以桃仁潤血，以皂角仁除風燥，以地榆破血，以枳實之苦寒補腎，以下泄胃管，以澤瀉之淡滲，使氣歸於前陰，以補清燥，受胃之濕邪也。白朮之苦甘，以苦補燥氣之不足，其甘味以瀉火而益元氣也。故曰甘寒泄火，乃假枳實之寒也。古人用藥，為下焦如瀆，又曰：在下者引而竭之，多為大便秘澀，以大黃推去之，其津血益不足，以當歸和血及油潤之劑，大便自然滑利矣。宜作芎湯以與之，是下焦有熱，以急治之之法也。以地榆酸苦而壞胃，故宿食消盡，空心作丸服之。

秦艽白朮丸

治痔疾，并痔漏有膿血，大便燥硬，而作疼痛不可忍。

秦艽去芦，　桃仁湯浸，去皮尖，　當歸梢酒洗，　白朮已上各伍錢，

右為細末，和桃仁泥研勻，煎熟湯打麵糊為丸，如雞頭仁大，令藥光滑，焙乾，每服五七十丸，白湯下，空心服，待少時以美饌壓之，忌生冷硬物冷水冷菜之類，并濕麵酒及辣辛熱大料物之類，犯之則藥無驗也。

秦艽蒼朮湯

治痔疾，若破閉之痔漏，大便秘澀，必作大痛，此由風熱乘食飽不通，氣過大腸而作也，受病者，燥氣也，為病者，胃濕也，胃刑大腸，則化燥火，以乘燥熱之實，勝風附熱而來，是濕熱風燥四氣而合，故大腸頭成塊者，濕也，作大痛者，風也，若大便燥結者，主病兼受火邪，熱結不通也，去此四者，其西方肺主諸氣，其體收下，亦助病為邪，須當破氣藥兼之，治法全矣，以剉湯與之，其効如神。

秦艽去苗，　桃仁湯浸，去皮另研，　皂角仁燒存性，另研，各壹錢，

蒼朮製，　防風已上各柒分，　黃蘗洗，去皮酒炒，伍分，

當歸梢酒洗，　澤瀉已上各叁分，　梭身檳榔另研，壹分，

大黃少許，大便過利，亦不可多用，

右除檳榔、桃仁、皂角仁三味外，餘藥㕮咀如麻豆大，都作一服，水三盞，煎至一盞二分，去粗，入檳榔等三味末，再上火煎至一盞，空心熱服，待少時以美饌壓之，不犯胃氣也，服藥日忌生冷硬物及酒濕麵大料物乾薑之類，犯之則其藥無効。

如有白膿，加白蒺藜花頭五朵，去尊心，苦皮半錢，不去白，入正藥中同煎，木香三分為細末，同檳榔等三味依前煎服餌，方人治此疾，多以歲月除之，此藥一服則愈。

七聖丸

治大腸疼痛不可忍，叔和云：稽氣生於脾藏，傍大腸疼痛，陳雍當，漸交稍瀉三焦火，莫謾多方立紀綱。

羌活壹兩，　郁李仁湯浸，去皮，另研，壹兩伍錢，　大黃煨，捌錢，

檳榔　川芎已上各伍錢，　桂去皮，　木香

右除郁李仁另研入外，其為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服三五十丸，白湯下，食前，取大便微利，一服而愈，切禁不得多利大便，其痛甚甚。

秦艽防風湯

治痔漏，每日大便時發疼痛，如無疼痛者，非痔漏也，此藥主之。

秦艽　防風　當歸身

白朮已上各壹錢伍分，　炙甘草　澤瀉已上各陸分，

枳實麩炒黃，

皂角仁燒存性，各壹兩，

右為細末，煎熟湯打麵糊為丸，如雞頭仁大，令藥光滑，焙乾，每服五七十丸，白湯下，空心服，待少時以美饌壓之，忌生冷硬物冷水冷菜之類，并濕麵酒及辣辛熱大料物之類，犯之則藥無驗也。

黄芪壹錢伍分。　大黄煨。
柴胡　升麻貳分。已上各
紅花少許。　橘皮叁分。已上各
桃仁貳拾箇。

右剉如麻豆大。都作一服。水三盞。煎至一盞。去柤稍熱。空心服之。避風寒。忌房事酒湯麵大辛熱物。

秦艽羌活湯

治痔漏成塊下垂。不任其痛。

羌活壹錢貳分。　秦艽
防風叁分。　升麻
麻黄　黄芪壹錢。已上各
細辛少許。　柴胡伍分。已上各
紅花少許。　藁本叁分。

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去柤。空心服之。忌風寒處大小便。

當歸郁李仁湯

治痔漏。大便硬。努出大腸頭下血。苦痛不能忍。

郁李仁　皂角仁壹錢。已上各
秦艽　麻仁
生地黄　荞麦伍分。已上各
澤瀉貳分。已上各

右剉如麻豆大。除皂角仁別爲末。水三盞。煎至一盞。去柤。入皂角仁末調。空心食前服之。忌如前。

紅花桃仁湯

治痔漏結牢。因而飽食。筋脈横解。腸澼爲痔。治法當補北方。瀉中央。

黄芪壹錢伍分。　生地黄壹錢。
荞麦陸分。　當歸梢
防風梢　猪苓伍分。已上各
紅花半分。　桃仁拾箇。

右剉如麻豆大。水三盞。煎至一盞。去柤。稍熱。食前服之。忌如前。

秦艽當歸湯

治痔漏大便結燥疼痛。

大黄煨肆錢。　秦艽
澤瀉　當歸梢
白芷伍分。已上各　紅花少許。

右都作一服。水三盞。煎至一盞。去柤。食前熱服。忌如前。

陰痿陰汗門

陰痿陰汗及臊臭論

一富者前陰臊臭。又因連日飲酒。腹中不和。求先師治之。曰。夫前陰者。足厥陰肝之脈絡循陰器出其挺來。凡臭者。心之所主。散入五方爲五臭。入肝爲臊。此其一也。當於肝經中瀉行間。是治其本。後於心經中瀉少衝。乃治其標。如鍼灸當用藥除之。酒者。氣味俱陽。能生裏之濕熱。是風濕熱合於下焦爲邪。故經云。下焦如瀆。又云。在下者引而竭之。酒是濕熱之水。亦宜決前陰以去之。

龍膽瀉肝湯

治陰部時復熱痒及臊臭。

柴胡梢　澤瀉壹錢。已上各
木通伍分。已上各　生地黄
草龍膽叁分。已上各　車前子
當歸梢

右剉如麻豆大。都作一服。水三盞。煎至一盞。去柤。空心稍熱服。便以美膳壓之。此藥柴胡入肝爲引。用澤瀉、車前子、木通淡滲之味利小便。亦除臊氣。是名在下者引而竭之。生地黄、草龍膽之苦寒。瀉酒濕熱。便象車前子之類。以撤肝中邪氣。肝主血。用當歸以滋肝中血不足也。

清震湯

治小便溺黄臊臭淋瀝。兩丸如冰。陰汗浸多。

羌活　酒黄蘗壹錢。已上各　升麻
柴胡　荞麦　黄芩伍分。已上各
澤瀉肆分。　麻黄根　猪苓
防風叁分。已上各　炙甘草　當歸身
藁本貳分。已上各　紅花壹分。

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去柤。臨臥服。大忌酒濕麵。

固真湯一名正元湯。

治兩丸冷。前陰痿弱。陰汗如水。小便後有餘滴。尻臀并前陰冷。惡寒而喜熱。膝下亦冷。

升麻　羌活　柴胡壹錢。已上各
炙甘草　草龍膽　澤瀉貳錢。已上各壹
黄蘗　知母貳錢。已上各

右剉如麻豆大。分作二服。水二盞。煎至一盞。去柤。空心稍熱服。以早飯壓之。

清魂湯一名柴胡膽湯。

治兩外腎冷，兩髀陰汗，前陰痿，陰囊濕痒臊氣。

柴胡　生甘草　升麻　澤瀉已上各壹錢伍分　羌活　麻黃根　五味子貳拾箇　茯苓已上各壹錢　草龍膽

右剉如麻豆大，分作二服，水二盞，煎至一盞，去柤，食前稍熱服，忌酒濕麵房事。

椒粉散

治前陰兩丸濕痒痛，秋冬甚，夏月減。

肉桂貳分　小椒　酒黃蘗已上各貳錢　豬苓已上各壹分　蛇床子　當歸梢　麻黃根壹錢　輕粉少許　黑狗脊已上各伍分　紅花少許　班貓兩枚

右爲末，乾糝上，避風寒冷濕處坐臥。

補肝湯

治前陰冰冷，并陰汗，兩脚痿弱無力。

黃芪炙分　炙甘草伍分　升麻　白茯苓　葛根　猪苓已上各肆分　柴胡　羌活　當歸身　人參已上各壹分　連翹　陳皮　荜茇　黃蘗炒　澤瀉　防風已上各貳分　知母　麴末

右剉如麻豆大，都作一服，水二大盞，煎至一盞，去柤，空心稍熱服，忌酒濕麵。

温腎湯

治面色痿黃，身黃，脚痿弱無力，陰汗。

柴胡　麻黃根已上各陸分　白芷　酒黃蘗　白茯苓　猪苓　升麻已上各壹錢　蒼朮　防風已上各壹錢伍分　澤瀉貳錢

右分作二服，每服水二大盞，煎至一盞，去柤，食前稍熱服，一時辰許方食。

延胡丁香丸一名丁香痛氣丸。

治臍下撮急疼痛，幷周身皆急痛，小便頻數，及五脈急，獨腎脈按之不急，皆虛無力，名曰腎痛。

羌活壹錢　當歸　延胡索　麻黃根節　丁香　木香　川烏頭已上各伍分　防己叁分　茴香已上各貳錢　肉桂已上各壹錢　甘草　蝟皮拾箇，燒

右爲細末，酒煮麵糊爲丸，如雞頭大，每服五十丸，空心鹽白湯服。

瀉痢門

訶子皮散

癸卯冬，白樞判家一老婦面塵脫色，神氣特弱，病脫肛日久，服藥未驗，復下赤白膿痢，作裏急後重，白多赤少，不任其苦，以求其治。曰：此非肉食膏粱，必多蔬食，或飲食不節，天氣雖寒，衣蓋猶薄，不禁而腸頭脫下者，寒也，真氣不禁，形質不收，乃血滑脫也，此乃寒滑氣泄不固，故形質下脫也，當以澀去其脫而除其滑，微酸之味固氣上收，以大熱之劑而除寒補陽，以補氣之藥升陽益氣。

御米殼壹錢，蜜炒　當歸梢　訶子皮壹錢，去核　橘皮已上各伍分　黑狗脊已上各伍分　乾薑炮，陰分　紅花少許

右爲細末，都作一服，水二盞，煎至一盞，和柤，空心熱服。

升麻補胃湯

治宿有陽明血證，因五月間大熱喫杏，腸澼下血，喇遠散漫如篩，腰沉沉然，腹中不痛，血色紫黑，病名濕毒腸澼，屬陽明少陽經血證也。

白芍藥壹錢伍分　升麻　羌活　黃芪已上各壹錢　生地黃　熟地黃　獨活　牡丹皮　炙甘草　柴胡　防風已上各伍分　當歸身　葛根已上各叁分　肉桂少許

右剉如麻豆大，分作二服，每服水二盞，煎至一盞，去柤，食前稍熱服。

升陽去熱和血湯

治腸澼下血，另作一派，其血喇出有力而遠射，四散如篩，腸中血下行，腹中大作痛，乃陽明氣衝熱毒所作也，當升陽去濕熱，和血脈，是其治也。

橘皮貳分　當歸身　蒼朮　熟地黃　肉桂已上各叁分　秦艽

生地黃　牡丹皮
升麻柒分　熟甘草
白芍藥壹錢伍分

右㕮咀都作一服，水四盞，煎至一盞，去柤，空心稍熱服，立効。

益智和中湯

治腸澼下血，或血色紫黑，腹中痛，腹皮惡寒，右手關脈弦按之無力，而喜熱物熨之，內寒明矣。

肉桂壹分　牡丹皮
柴胡　益智仁
葛根　炙甘草
半夏已上各伍分　當歸身
黃芪　白芍藥壹錢伍分
升麻已上各壹錢
乾薑少許

右為麤末，都作一服，水三盞，煎至一盞，去柤，食後溫服。

芍藥棗皮丸

治濕熱惡痢血痢頻併窘痛，無問膿血，並皆治之。

芍藥　黃蘗已上各壹兩
黃連已上各伍錢

右為末，飯為丸，如雞頭大，每服五七十丸，食前米飲湯下，忌油膩酒濕麵等物。

和中益胃湯

治太陰陽明腹痛，大便常泄，若不泄即秘而難見，在後傳作溫熱證，下鮮紅血，腹中微痛，脈緩而洪，弦中之下得之，按之空虛。

蘇木壹分　藁本
熟地黃　炙甘草已上各叁分
柴胡　升麻已上各伍分

右㕮咀都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤，空心溫服。

槐花散

治腸澼下血，濕毒下血。

川芎肆分　槐花
荊芥穗　熟地黃
當歸身　升麻已上各壹錢
青皮　白芷已上各陸分

右為細末，每服三錢，米飲湯調下，食前，忌酒濕麵生冷硬物。

茯苓湯

治因傷冷飯水泄，一夜走十行，變作白痢，次日其痢赤白，腹中疼痛，減食熱躁，四肢沉困無力。

生黃芩叁分　當歸身肆分　肉桂
炙甘草已上各伍分　猪苓　茯苓已上各陸分
澤瀉壹錢　芍藥壹錢伍分　苍朮
生薑　升麻　柴胡貳錢已上各

右㕮咀如麻豆大，分作二服，每服水二盞，煎至一盞，去柤，稍熱，食前服之。

黃芪補胃湯

治一日大便三四次，溏而不多，有時作泄，腹中鳴，小便黃。

黃芪　柴胡　當歸身
益智　橘皮叁分已上各　升麻陸分
炙甘草貳錢　紅花少許
右㕮咀都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤，稍熱，食前服之。

升陽除濕湯

白下而上者，引而去之。

苍朮壹錢　柴胡　羌活
防風　升麻　神麯
澤瀉　猪苓已上各伍分　炙甘草
陳皮　麥蘖麵已上各叁分

右都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤，空心服之。

如胃寒腸鳴，加益智仁半夏各伍分，生薑三片，棗一枚，同煎，至非腸鳴不得用。

人參益胃湯

治頭悶勞動則微痛，不喜飲食，四肢怠惰，躁熱短氣，口不知味，腹鳴，大便微溏，身體昏悶，煩渴，不喜冷物。

黃芪　甘草　當歸梢
益智貳分已上各　人參　黃芩
柴胡　半夏　白朮已上各叁分
陳皮　升麻已上各伍分　苍朮壹錢伍分
紅花少許
右都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤，稍熱，食前服之。

升麻補胃湯

治因內傷服牽牛大黃食藥泄瀉過多，腹中大痛。

甘草炙分　升麻　柴胡
草豆蔻　黃芪已上各五分　半夏泰分
當歸身　乾薑已上各三分　紅花少許

右銼作一服，水二盞，煎至一盞，去柤，稍熱食遠服之。

瘡瘍門

散腫消堅湯

治馬刀瘡結硬如石，或在耳下至缺盆中，或肩上，或於脅下，皆手足少陽經中，及瘰癧遍於頸，或至頰車，堅而不潰，在足陽明經中所出，或二證瘡已破，流膿水，並皆治之。

黃芪酒製　黃芩酒炒一兩生用一兩　草龍膽酒洗炒四遍　酒知母
昆布已上各五錢　柴胡泰錢　瓜蔞根酒洗焙
京三稜酒洗　廣茂酒洗炒　桔梗
葛根　白芍藥　炙甘草
黃連已上各貳錢　升麻泰分　連翹已上各泰錢
當歸梢

右㕮咀，每服六錢，水二盞，蓽八分，先浸多半日，煎至一盞，去柤，食後熱服，於臥處伸足在高處，頭低垂，每含一口，作十次嚥，服畢依常安臥，取藥在膈上停蓄故也。另撰半料作細末，煉蜜為丸，如菉豆大，每服百餘丸，用此藥湯留一口送下，或加海藻五錢炒亦妙。

升陽調經湯

治瘰癧遶頸，或至頰車，此皆出足陽明胃經中來，若瘡深遠隱曲肉底，是足少陰腎經中來，乃戊脾傳於癸腎，是夫傳與妻，俱作塊子，堅硬大小不等，並皆治之，或作丸亦可。

升麻銖錢　葛根　草龍膽酒製
黃芩酒製　廣茂酒洗炒　京三稜酒洗炒
炙甘草　黃連酒洗　連翹
桔梗已上各伍錢　生黃芩泰錢　當歸梢
芍藥已上各泰錢　黃蘗酒洗貳錢　知母酒洗炒壹兩

右另秤一半作末，煉蜜為丸，如菉豆大，每服百餘丸，一半作㕮咀，每服五錢，若能食，大便硬，可旋加至七八錢，水二盞，先浸半日，煎至一盞，去柤，臨臥熱服，足高去枕仰臥，嚥一口作十次嚥之，留一口在後送下丸藥，服畢其臥如常。

連翹散堅湯

治耳下或至缺盆，或肩上生瘡，堅硬如石，動之無根，名曰馬刀，從手足少陽經中來也，或生兩脅，或已流膿，作瘡未破，並皆治之。

柴胡壹兩貳錢　草龍膽酒洗四次　土瓜根酒製已上壹兩
黃芩酒炒次炒二錢　當歸梢　生黃芩
廣茂　京三稜同廣茂酒炒　連翹
芍藥已上各伍錢　炙甘草壹錢　黃連酒炒兩次
蒼朮已上各貳錢

右另秤一半為細末，煉蜜為丸如菉豆大，每服百餘丸，一半㕮咀，每服五錢，水二盞，先浸多半日，煎至一盞，去柤，臨臥熱服，去枕仰臥，每口作十次嚥之，留一口送下丸藥，服畢臥如常，更以後藥塗之。

龍泉散

龍泉粉炒　瓦粉　廣茂
京三稜酒洗炒　昆布已上各伍錢

右同為細末，煎熟水調塗之，用此藥去疾尤速。

救苦化堅湯

治瘰癧，馬刀挾癭，從耳下或耳後下頸至肩上，或入缺盆中，乃手足少陽之經分，其瘰癧在頸下或至頰車，乃足陽明之經分受心脾之邪而作也，今將二證合而治之。

黃芪壹錢　葛根伍分
護皮毛間腠理虛，及活血脈生血，亦瘡家聖藥也，又能補表實元氣之弱也。
人參泰分　生地黃
補肺氣之藥也，如氣短不調及喘者加之。
炙甘草伍分　熟地黃已上各泰分
能調中和諸藥，瀉火益胃氣，亦能去瘡邪。
真漏蘆　升麻已上各壹錢
此三味俱足陽明本經藥也。
連翹壹錢
此一味十二經瘡中之藥，不可無也，能散諸血經氣聚，此瘡家之神藥也。
牡丹皮泰分
去腸胃中留滯宿血。
當歸身

此三味諸經中和血生血涼血藥也。

白芍藥叁分。

如夏月倍之。其味酸。其氣寒。能補中益肺之虛弱。治腹中痛必用之。冬寒則不可用。

肉桂貳分。

大辛熱。能散結積。陰證瘡瘍須當少用之。此寒因熱用之意。又爲寒陰覆蓋其瘡。用大辛熱以消浮凍之氣。如有煩躁者去之。

柴胡伍分。

功同連翹。如瘡不在少陽經則去之。

黍粘子叁分。

無腫不用。

羌活叁錢。　獨活

此三味必關手足太陽證。脊痛項強。不可遍視。腰似折。項似拔者。是也。其防風一味辛溫。若瘡在臍已上。雖無手足太陽經證。亦當用之。爲能散結去上部風邪。病人身拘急者。風也。

防風已上各伍分。

昆布貳分。

其味大鹹。若瘡堅硬結硬者。宜用鹹能軟堅。

京三棱煨貳分。　廣茂煨叁分。

此二味若瘡堅硬甚者用之。如不堅硬。勿用。

益智仁貳分。

如唾多者。胃不和也。或病人吐沫吐食胃上寒者加之。無則去之。

大麥蘖麵壹錢。

治腹中縮急。復能消食補胃。

神麯末炒黃色貳分。

爲食不消化故也。

黃連去鬚叁分。

以治煩悶。

黃蘗炒叁分。

如有熱或腫脚無力加。如有躁煩欲去衣者。腎中伏火也。更宜加之。無此證勿用。

厚朴叁錢貳分。薑製。

如腹脹者加之。無則勿用。

右爲細末。湯浸蒸餅和丸。捻作餅子。日乾。搗如米粒大。每服三錢。白湯下。

如氣不順。加橘皮甚者加木香少許。遇病人虛實。臨時斟酌與之。無令藥多妨其飲食。此治之大法也。

如止在陽明分爲瘍瘡者。去柴胡、黍粘子二味。餘皆用之。

如在少陽分爲馬刀挾瘰者。去獨活、漏蘆、升麻、葛根。更加盟麥穗三分。

如本人素氣弱。其病勢來時。氣盛而不短促者。不可考其平素。宜作氣盛而從病變之權也。宜加黃芩、黃連、黃蘗、知母、防己之類。視邪氣在上中下三處。

假令在上焦。加黃芩一半酒洗一半生用。在中焦。加黃連一半酒洗一半生用。在下焦。則加酒製黃蘗、知母、防己之類。選而用之。

如本人大便不通。而滋其邪盛者。加酒製大黃以利。

如血燥而大便燥乾者。加桃仁、酒製大黃二味。

如風結燥不行者。加麻仁、大黃。

如風濕而大便不行。加煨皂角仁、大黃、秦艽以利之。

如脈濕侵身有氣濕而大便不通者。加郁李仁、大黃以除氣燥也。

如陰寒之病。爲寒結閉而大便不通。以局方中半硫丸或加煎附子、乾薑冰冷與之。大抵用藥之法。不惟瘡瘍一證。諸疾病盡人素氣弱者。當去苦寒之藥。多加人參、黃芪、甘草之類。瀉火而先補其元氣。餘皆倣此。

柴胡連翹湯

治男子婦人馬刀瘡。

中桂叁分。　當歸梢壹錢伍分。　黍粘子貳錢。

炙甘草　酒黃蘗　生地黃已上各叁錢。

柴胡　黃芩炒。　酒知母

連翹已上各伍錢。　盟麥穗陸錢。

右剉如麻豆大。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去柤稍熱。食後服之。

黍粘子湯

治耳痛生瘡。

昆布　蘇木　生甘草

蒲黃　草龍膽已上各壹分。　黍粘子

連翹　生地黃　當歸梢

黃芩　炙甘草　黃連已上各貳分。

柴胡　黃芪已上各叁分。　桔梗叁錢。

桃仁叁箇。　紅花少許。

右剉如麻豆大，都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤稍熱，食後服。忌寒藥，利大便。

淨液湯一名連翹防風湯。

治皮膚痒，脚下痛，背上痛，耳聾耳鳴。

桂枝貳分　連翹　生地黃
桔梗　升麻　甘草伍分，各
當歸梢柒分　麻黃　草豆蔻仁
羌活　防風　柴胡
蒼朮壹錢，已上各　酒黃芩壹錢　紅花少許

右剉如麻豆大，都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤，食後熱服。

清風湯

治馬刀瘡。

黍粘子炒　黃連伍分，已上各　當歸梢
甘草壹錢，已上各　瓜蔞根　黃芪壹錢伍分，已上各，壹
生黃芩　柴胡貳錢，已上各　連翹叁錢

紅花少許

右剉如麻豆大，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去柤稍熱，食後服。忌酒濕麵。

內托羌活湯

治足太陽經中左右尺脈俱緊，按之無力，尻髀生癰堅硬，腫痛大作。

肉桂叁分　連翹　炙甘草
柴胡　橘皮伍分，已上各　當歸梢
防風　藁本壹錢，已上各二　黃芪壹錢伍分
黃芩酒製　羌活貳錢，已上各

右剉如麻豆大，都作一服，水二盞，酒一盞，煎至一盞，去柤稍熱，空心服，以夾衣蓋癰上，使藥力行，能去蓋之衣。

升麻托裏湯

治婦人兩乳間出黑頭瘡，瘡頂陷下作黑眼子，其脈弦洪，按之細小。

黃芪貳分　肉桂叁分　黍粘子伍分
黃芪　炙甘草　當歸身壹錢，已上各
連翹　升麻　葛根壹錢伍分，已上各，壹

右剉如麻豆大，都作一服，水一大盞，酒半盞，同煎至一盞，去柤稍熱，食後服。

內托黃芪湯

賈德茂小男，於左大腿近膝股內出附骨癰，不辯肉色，漫腫，皮澤木硬，瘡勢甚大，其左脚乃肝之俾上也，更在足厥陰肝經之分，少侵足太陰脾經之分，其脈左三部細而弦，按之洪緩，微有力，此藥主之。

生地黃壹分　黃芪貳分　肉桂叁分
羌活伍分　當歸梢柒分　土瓜根酒製
柴胡梢壹錢，已上各　連翹壹錢叁分　黃芪貳錢

右剉如麻豆大，都作一服，酒一盞，水二盞，煎至一盞，去柤，空心熱服。

柴胡通經湯

治小兒項側有瘡，堅而不潰，名曰馬刀瘡。

柴胡　連翹　當歸梢
生甘草　黃芩　黍粘子
京三稜　桔梗貳分，已上各　黃連伍分

紅花少許

右剉如麻豆大，都作一服，水二大盞，煎至一盞，去柤稍熱，食後服。忌苦藥，泄大便。

白芷升麻湯

尹老家素質寒，形志皆苦，於手陽明大腸經分出癰，幼小有癰疽，其臂外皆腫痛，在陽明左右寸脈，皆短中得之，俱弦，按之洪緩有力，此癰得自八風之變，以脈斷之，邪氣在表，其證大小便如故，飲食如常，腹中和，口知味，知不在裏也，不惡風寒，止熱燥，脈不浮，知不在表也，表裏既和，邪氣在經脈之中，內經云，凝於經絡為瘡癰，其癰出身半已上，故風從上受之，故知是八風之變為瘡者也，故治其寒邪，調其經脈中血氣，使無凝滯而已。

炙甘草壹分　升麻　桔梗伍分，已上各
白芷柒分　當歸梢　生地黃壹錢，已上各
生黃芩壹錢伍分　酒黃芩　連翹
黃芪貳錢，已上各　中桂少許　紅花少許

右剉如麻豆大，分作二服，酒水各一大盞半，同煎至一盞，去柤稍熱，臨臥服一服而愈。

保生救苦散

治火燒或熱油烙及脫肌肉者。

生寒水石　大黃大燥　黃蘗油炒，已上各等分

右為細末，用油調塗之，或乾用此藥塗之，其痛立止，日近完復，永無破傷風之患。

一上散

治諸般疥癬必效。

雄黃（研如粉者）　黑狗脊　蛇床子（炒）
熟硫黃（已上各伍錢）　寒水石（陸錢）　斑貓（拾枚頭去翅足毛研碎）

右另研雄黃、硫黃、寒水石如粉，次入斑貓和蛇床子、黑狗脊爲細末，同研勻，先洗挑癬，令湯透去痂，油調，手中擦熱，以鼻中臭三兩次擦上，可一上即愈。

如痛甚及腫滿高起者，加寒水石一倍。

如不苦癢，只加黑狗脊。

如微癢，只加蛇床子。

如瘡中有蟲，加雄黃。

如豆火炙湯浴者，加硫黃。

聖愈湯

治諸瘡瘡血出多而心煩不安，不得睡眠，亡血故也，以此藥主之。

生地黃　熟地黃　川芎
人參（已上各叁分）　當歸身　黃芪（已上各伍分）

右㕮咀如麻豆大，都作一服，水二大盞，煎至一盞，去柤稍熱，無時服。

獨聖散

治湯泡破、火燒破、瘡瘙痒痛。

生白礬

右爲細末，芝麻油調，掃瘡破處，不拘時候。

黃芪肉桂柴胡酒煎湯

治附骨癰堅硬漫腫，不辨肉色，行步作痛，按之大痛。

黃芪　當歸（已上各貳錢）　柴胡（壹錢伍分）
黍粘子（炒）　連翹　肉桂（已上各壹錢）
升麻（柒分）　炙甘草　黃芪（已上各伍分）

右㕮咀，好糯酒一大盞半，水一大盞半，同煎至一大盞，去柤，空心溫服，少時，使以早飯壓之，不致大熱上攻，中上二焦也。

雜病門

安神丸

治心神煩亂，怔忡，兀兀欲吐，胸中氣亂而熱，有似懊憹之狀，皆膈上血中伏火，蒸蒸然不安，宜用權衡法以鎮陰火之浮越，以發上焦之元氣，經云，熱淫所勝，治以甘寒，以苦瀉之，以黃連之苦寒，去心煩除濕熱爲君，以甘草、生地黃之甘寒，瀉火補氣滋生陰血爲臣，以當歸補血不足，以硃砂納浮留之火，而

安神丸也。

黃連（壹兩伍錢酒洗）　硃砂（壹錢水飛）　酒生地黃
當歸身　炙甘草（已上各伍分）

右件除硃砂水飛外，搗四味爲細末，同和勻，湯浸蒸餅爲丸，如黍米大，每服十五丸，津嚥下，食後。

硃砂安神丸

治心煩懊憹，心氣怔忡，上熱，胸中氣亂，心下痞悶，食入反出。

硃砂（壹錢）　黃連（壹錢）　生甘草（貳錢伍分）

右爲末，湯浸蒸餅爲丸，如黍米大，每服十丸，食後津嚥下。

補氣湯

治皮膚間有麻木，乃肝氣不行故也。

白芍藥　橘皮（不去白各壹兩伍錢）　炙甘草
黃芪（已上各壹兩）　澤瀉（伍錢）

右㕮咀，每服一兩，水二盞，煎至一盞，去柤，溫服。

當歸補血湯

治婦人肌熱躁熱，目赤面紅，煩渴引飲，晝夜不息，其脈洪大而虛，重按全無，內經曰，脈虛血虛，脈實血實，又云，血虛發熱，證象白虎，惟脈不長，實爲辯也，若誤服白虎湯必死，此病得之於肌困勞役。

黃芪（壹兩）　當歸身（貳錢酒洗）

右㕮咀，都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤稍熱，空心服。

柴胡升麻湯

治男子婦人四肢發熱，肌熱，筋骨熱，表熱如火燎，以手捫之烙人手，夫四肢者，屬脾土也，熱伏地中，此病多因血虛而得之，又有胃虛，過食冷物，鬱遏陽氣於脾土之中，此藥主之。

升麻　葛根　獨活
羌活　白芍藥　人參（已上各伍錢）
炙甘草　柴胡（已上各三錢）　防風（貳錢伍分）
生甘草（貳錢）

右㕮咀，每服五錢，水二大盞，煎至一盞，去柤，熱服，忌寒冷之物。

火鬱湯

治五心煩熱，是火鬱於地中，四肢者，脾土也，心火下陷於脾土之中，鬱而不得伸，故經云，火鬱則發之。

升麻　葛根　柴胡
白芍藥（已上各壹兩）　防風　甘草（已上各伍錢）

右㕮咀。每服五錢。水二大盞。入連鬚葱白三寸。煎至一盞。去柤稍熱。不拘時候服。

小黃丸

化痰涎。和胃氣。除濕。治胸中不利。

黃芩壹兩　半夏湯浸　白朮已上各壹錢　陳皮　青皮去白　黃芪已上各壹錢　澤瀉貳錢　乾薑壹錢伍分

右爲末。湯浸餛飩餅爲丸。如菉豆大。每服五十丸。食遠。溫水下。

黃芩利膈丸

除胸中熱。利膈上痰。

生黃芩　炒黃芩已上各壹兩　半夏　黃連　澤瀉已上各伍錢　南星　枳殼　陳皮已上各貳錢　白朮貳錢　白礬伍分

右爲末。湯浸餛飩餅爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。食遠。溫水下。忌酒濕麵。

補益腎肝丸

治目中流火。視物昏花。耳聾耳鳴。困倦之力。寢汗惡風。行步不正。兩足欹側。臥而多驚。脚膝無力。腰以下消瘦。

柴胡　羌活　生地黃　苦參炒　防己炒已上各伍分　附子　肉桂已上各貳錢　當歸身叁錢

右爲細末。熟水爲丸。如雞頭仁大。每服五十丸。食前溫水下。

大陽經鬼藥

防風貳分　羌活叁分　紅豆貳錢

右爲細末。鼻內嚏之。

麻黃茱萸湯

治胸中痛。頭痛。食減少。咽嗌不利。右寸脈弦急。

麻黃　羌活已上各伍分　茱萸　黃芪　升麻已上各叁分　當歸　黃蘗　川芎　蔓荊子

蒼朮　黃連　細辛少許　紅花少許

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去柤。稍熱服。食後。

黃芪湯

治表虛惡風寒。

黃芪伍錢　甘草叁錢　藁本　升麻貳錢已上各　橘皮貳錢伍分已上各　麻黃　蓮花青皮柒分　柴胡陸分

右㕮咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去柤。不拘時服。

除濕補氣湯一名清神補氣湯。

治兩腿麻木。沉重無力。多汗喜笑。口中涎下。身重如山。語聲不出。若寸脈洪大。

升麻陸錢　蒼朮柒錢　柴胡　黃芪已上各叁錢　藁本　生甘草　酒黃蘗　五味子　陳皮已上各壹伍分　酒知母　當歸貳錢已上各

右剉如麻豆大。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去柤。空心服之。待少時以早飯下之。

參歸湯

補氣血俱不足。

黃芪柒分　甘草　柴胡　當歸身叁分　羊豆殼仁　益智仁少許　熟地黃　紅花少許

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去柤。食遠服。

升陽湯

治陽虛痛痢疾。足太陽經寒。恐則氣下行。宜升陽氣。

疾甘草伍錢　麻黃不去節　羌活壹錢　生地黃伍分已上各　升麻肆分已上各　人參貳分已上各　防風貳錢已上各

右㕮咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去柤。稍熱。空心服之。

自汗門

自汗論

或問濕之與汗，爲陰乎，爲陽乎。曰：西南坤土也，在人則爲脾胃也。人之汗，猶天地之雨也。陰滋其濕，則爲霧露爲雨也。陰濕下行，地之氣也。汗多則亡陽，陽去則陰勝也。甚爲寒中，濕勝則音聲如從瓮中出。濕若中水也。相法家有說土音如居深瓮裏，言其濕也。遠也，不出也，以明其濕審矣。又知此二者亦爲陰寒也。內經云：氣虛則外寒，雖見熱中，蒸蒸爲汗，終傳大寒。知始爲熱中，表虛亡陽，不任外寒，終傳寒中，多成痺塞矣。色以候天，脈以候地，形者乃候地之陰陽也。故以脈氣候之，皆有形無形之可見者也。

調衛湯

治濕勝自汗，衛氣虛弱，表虛不任風寒。

黃芪　麻黃根（已上各壹錢）　羌活（柒分）
生甘草　當歸梢　生黃芩
半夏（各壹錢，已上各伍分）　麥門冬　生地黃（已上各柒分）
豬苓（貳分）　蘇木　紅花（已上各壹分）
五味子（柒箇）

右剉如麻豆大，都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤，稍熱服。

中風證必自汗，不得重發其汗。

清燥湯

治六月七月間濕令大行，子能令母實而熱旺，濕熱相合，必刑庚大腸，寒冷以救之，燥金受濕熱之邪，絕寒水生化之源，源絕則腎虧，痿厥之病大作，腰已下痿軟癱瘓不能動，行步不正，兩足欹側，此藥主之。

黃芪（壹錢伍分）　橘皮　白朮
澤瀉（已上各伍分）　人參　白茯苓
升麻（已上各貳分）　炙甘草　麥門冬
當歸身　生地黃　神麯末
猪苓（已上各貳分）　柴胡　酒黃蘗
黃連　苦芩（已上各壹分）　五味子（玖個）

右剉如麻豆大，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去柤，空心熱服。

當歸六黃湯

治盜汗之聖藥也。

當歸　生地黃　熟地黃
黃蘗　黃芩　黃連（已上各等分）

黃芪（如一倍）

右爲末，每服五錢，水二盞，煎至一盞，食前服。小兒減半服之。

紅豆散

治頭重如山，此濕氣在頭也。

麻黃根（炒，伍錢）　苦丁香（伍分）
連翹（炒，已上各叁分）　紅豆（拾個）

右爲細末，鼻內嗅之。

治血通經湯

靈壽縣董監軍，癸卯多大雪時，因事到真定，忽覺有風氣暴至，診候得六脈俱弦甚，按之洪實有力，其證手足急，大便祕澀，面赤熱，此風寒始至加於身也。四肢者脾也，以風寒之邪傷之，則搐急而肢痙，乃風淫末疾，而寒在外也。內經曰：寒則筋攣，正謂此也。本人素飲酒，內有實熱，乘於腸胃之間，故大便祕澀而面赤熱。內則手足陽明受邪，外則足太陰脾經受風寒之邪，用桂枝、甘草以却其寒邪，而緩其急搐，又以黃蘗之苦寒滑以瀉實而潤燥，急救腎水，用升麻、葛根以升陽氣，行手足陽明之經，不令退絕，更以桂枝辛熱，入手陽明之經，爲引用潤燥，復以芍藥、甘草專補脾氣，使不受風寒之邪，而退本邪，專益肺金也。加人參以補元氣，爲之輔佐。加當歸身去裏急而和血潤燥，此藥主之。

芍藥（伍分）　升麻　葛根
人參　當歸身　炙甘草（已上各壹錢）
酒黃蘗　桂枝（已上各貳錢）

右剉如麻豆大，都作一服，水二大盞，煎至一盞，熱服，不拘時，令暖房中近火熨搓其手。

瀉黃湯

治熱風滿面連頭，極癢不任，眉毛脫落，先砭其處，令惡氣消盡，後服此藥。

連翹　升麻（已上各陸分）　桔梗（伍分）
生黃芩　生地黃（已上各肆分）　黃芪
蘇木　黃連　地龍
金蟬　當歸（已上各柒分）　白豆蔻
人參（已上各貳分）　甘草（壹分半）　梧桐淚（壹分）
麝香少許　蚕蛹（去翅足，炒，叁箇）
水蛭（柒個，炒，令燥）　桃仁（叁個）

右剉如麻豆大，除連翹、梧桐淚、白豆蔻另爲細末，麝香、蚕蛹、水蛭三味同爲細末，都作一服，水二盞，酒一盞，入連翹煎至一盞，去柤，再入白豆蔻二味并麝香等再煎至七分，稍熱，早飯後午前服之，忌酒濕

麵生冷硬物。

人參益氣湯

治兩手指麻木四肢困倦。怠惰嗜臥。乃熱傷元氣也。

黃芪壹錢　生甘草　人參貳錢　柴胡貳錢　白芍藥叁錢　升麻貳錢　五味子壹百粒拾個　炙甘草

右㕮咀。分作四服。每服水二盞。煎至一盞。去柤稍熱。食遠服。

導氣湯

治兩腿麻木沉重。

黃芪壹錢　甘草貳錢　升麻　柴胡　青皮肆錢　澤瀉貳錢　橘皮叁錢　當歸　紅花　五味子壹百貳拾個

右㕮咀。分作四服。每服水二大盞。煎至一盞。去柤。食前熱服。

補中湯

治面黃汗多。目赤。四肢沉重。減食。腹中時時痛。欬嗽。兩手寸脈短。右手脈弦細。寸脈虛。

升麻　柴胡　神麯炒叁分　澤瀉肆分　蒼朮已上各伍分　黃芪貳錢伍分　當歸已上各貳分　紅花少許　五味子貳拾個　大麥蘖麵　炙甘草貳分

右㕮咀。分作二服。水二盞。煎至一盞。去柤。食遠服。

麻黃蒼朮湯

治秋冬每夜五更嗽。連聲不絕。乃至天曉日高方緩。口苦。兩脅下痛。心下痞悶。臥而多驚。筋攣。肢節疼痛。淡唾涎沫。日晚神昏呵欠。不進飲食。

麻黃貳錢　蒼朮伍錢　草豆蔻陸分　柴胡　生甘草　當歸梢　炙甘草　黃芩已上各叁分　右㕮咀。分作二服。水二盞。煎至一盞。稍熱。臨臥服。

上清湯

清利頭目。寬快胸膈。

人參　蔓荊子已上各伍分　葛根壹錢伍分　黃芪叁錢　防風壹錢　甘草肆錢

右㕮咀。分作二服。水二盞。煎至一盞。去柤。臨臥熱服。以夾衣蓋覆。不語。須臾汗出為效。

朮桂湯一名麻黃蒼朮湯

治寒濕所客。身體沉重。胃脘痛。面色痿黃。

黃朮貳錢　麻黃　橘皮　白茯苓　桂枝　半夏　猪苓已上各伍分　黃芪叁分　杏仁拾個　炒神麯　澤瀉已上各壹錢　草豆蔻仁　炙甘草貳分

右都作一服。水二盞。生薑五片。煎至一盞。去柤。食前熱服。

正氣湯

治盜汗。

炒黃蘗　炒知母已上各伍分　炙甘草伍分

右為麤末。作一服。水二盞。煎至一盞。食前溫服。

趁痛丸

治打撲閃損。腰痛不可忍。

乳香　沒藥各壹錢　烏梅壹個　白粟米壹錢炒黃　白蒺藜子壹兩炒黃

右為細末。煉蜜為丸。如彈子大。每服一丸。細嚼。溫酒空心下。

退熱湯

治表中虛熱。或遇夜則甚。

黃芪壹錢　柴胡陸分　黃連酒製　黃芩　地骨皮　生地黃去血熱　當歸身　升麻已上各叁分　右㕮咀。作一服。水二盞。煎至一盞。去柤。食遠溫服。

如身體力困者。加麥門冬、五味子已上各伍分。人參、甘草已上各壹錢。

解表升麻湯

治通身壯熱骨節疼痛

升麻　羌活　防風捌分　柴胡　當歸　藁本伍分　各　冬加麻黃不去節　春加麻黃去節　蒼朮壹錢　甘草柒分　各　橘皮叁分

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去粗溫服後以葱醋湯發之得微汗為效

天麻黃芪湯

治表有風證因連日酣飲其證復來右口角并眼頗有側視及左手左脚腿麻木疼痛

天麻　芎藭　羌活肢節痛不去之　茯苓　各　黃芪　當歸　各　甘草　升麻　黃蘗　蒼朮　各　神麯炒　人參　黃芪　葛根　澤瀉　各

柴胡　各

右㕮咀作一服水三盞煎至一盞去粗食遠溫服或加猪苓壹分

健步丸

治膝中無力伸而不得屈屈而不能伸腰背腿膝沉重行步艱難

防己酒洗壹兩　羌活　滑石炒　炙甘草　澤瀉　防風　各　川烏壹錢　肉桂伍分　柴胡　瓜蔞根酒洗　苦參酒洗　各

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十丸煎愈風湯下空心服

白朮除濕湯

治午後發熱背惡風四肢沉重小便或多或少黃色此藥又治汗後發熱

白朮壹兩　生地黃炒　澤瀉　知母　各　炙甘草　地骨皮　人參　赤茯苓　柴胡伍錢　各

右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞去粗食遠溫服

如小便快利減茯苓澤瀉一半

如有刺痛一料藥中加當歸身酒洗焙錢

加味四君子湯

治久瘧熱多寒少不止

白朮　白茯苓　甘草　柴胡　黃芩　各　人參　薄荷葉

右㕮咀每服五錢水二盞生薑三片棗一枚煎至一盞去粗不拘時候服

瀉血湯

治發熱晝少而夜多太陽經中尤甚晝病則在氣夜病則在血是足太陽膀胱血中浮熱微有氣也既病人大小便如常知邪氣不在臟腑是無裏證也外無惡寒知邪氣不在表也有時而發有時而止知邪氣不在裏不在表不在經絡也夜發多而晝發少是邪氣下陷之深也此雜證當從熱入血室而論之

生地黃酒洗炒　熟地黃　丹參酒炒　當歸酒洗去土　柴胡去芦　甘草梢炙　桃仁去皮尖麩炒　沛黃　淡防己酒洗炒　羌活壹兩　各

右為麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗空心溫服

洗面藥

治面有黑黯或生瘡或生瘙痒及粉刺之類并去皮膚燥裂去垢膩潤澤肌膚

皂角叁斤去皮弦子勞搗　好升麻捌兩　白芨細剉壹兩　甘松柒錢　白丁香臨月收　三柰子伍分　各　糯米壹升舂令

右為細末用之如常

塗肌如玉散

白丁香　白芨　白蔻柒錢　白僵蠶壹兩　各　升麻伍錢　各　麻黃去節貳錢　小椒壹錢　楮實子叁錢　各　連翹伍錢　各壹分　白蒺藜　當歸梢　白茯苓　白附子

右為細末用之如常

面油膏風膏

麻黃　升麻去黑皮　當歸身

羌活去皮　防風已上各貳錢

白檀已上各壹錢　白芨

右用小油半斤，以銀器中熬，綿包定前藥於油中熬之，得所澄淨，去柤，入黃蠟一兩，再熬之爲度。

小兒門

治驚論

外物驚，宜鎮心，以黃連安神丸，若氣動所驚，宜寒水石安神丸，大忌防風丸，治風辛溫之藥必殺人，何也。辛散浮溫熱者火也，能令母實，助風之氣盛，皆殺人也。因驚而泄青色，先鎮肝，以硃砂之類，勿用寒涼之氣，大禁涼驚丸，風木旺必克脾胃，當先實其土，後瀉其木，閻孝忠編集錢氏方，以益黃補上，誤矣。其藥有丁香辛熱助火，火旺土愈虛矣，青橘皮瀉肺金，丁香辛熱，大瀉肺與大腸，脾實當瀉子令脾胃虛，反更瀉子而助火，重虛其土，殺人無疑矣。其風木旺證，右關脈洪大，掌中熱，腹皮熱，豈可以助火瀉金，如寒水來乘脾土，其病嘔吐，腹痛，瀉痢青白，益黃散，聖藥也，今立一方，先瀉火補金，大補其土，是爲神治之法。

黃芪湯

黃芪貳錢　人參壹錢　炙甘草伍分

右㕮咀，作一服，水一大盞，煎至半盞，去柤，食遠服，加白芍藥尤妙。

此三味皆甘溫，能補元氣，甘能瀉火，內經云，熱淫于內，以甘瀉之，以酸收之，白芍藥酸寒，寒能瀉火，酸味能瀉肝而大補肺金，所補得金土之位，大旺火虛風木何由而來，兌土，然後瀉風之邪。夫益黃散，理中丸，養神丸之類，皆治脾胃寒濕，大盛，神品之藥也，若得脾胃中伏熱火，勞役不足之證，及服熱藥巴豆之類，胃虛而成慢驚之證，用之必傷人命，夫慢驚風者，皆由久瀉，脾胃虛而生也，錢氏以羌活治疾慢驚風，誤矣，脾虛者，由火邪乘其土位，故曰從後來者爲虛邪，火旺能實其木，木旺故來兌土，當於心經中以甘溫補土之源，更於脾土中瀉火以甘寒，更於脾土中補金以酸涼，致脾土中金旺火衰，風木自虛矣，損食多進藥愈，前藥是也。

益黃散

治胃中風熱。

黃芪貳錢　陳皮去白　人參壹錢已上各

芍藥柒分　生甘草　熟甘草伍分已上各

黃連少許

右爲細末，每服二錢，水一盞，煎至五分，食前服。

升陽益血湯

二月間有一小兒，未滿一百日，病腹脹，二日大便一度，瘦弱，身黃色，宜升陽氣，滋血益血，補血利大便。

蠟梢貳分　神麯末　升麻壹分已上各

當歸　厚朴壹錢已上　桃仁拾個

右都作一服，水一大盞，煎至半盞，去柤，食遠熱服。

厚腸丸

治小兒失乳，以食飼之，未有食腸，不能磨化，或生腹脹，四肢瘦弱，或痢色無常。

厚朴　青皮貳分已上各　橘紅　人參柒分已上各

半夏　蒼朮　神麯末伍分已上各

枳實　麥糵麵

右爲極細末，水煮麵糊爲丸，如麻子大，每服二十丸，溫水送下，食前忌飽食。

補陽湯

時初冬一小兒二歲，大寒證，明堂青脈，額上青黑，腦後青絡高起，舌上白滑，喉嚨而喘，大便微青，耳尖冷，目中常常淚下，仍多眵，胸中不利，臥而多驚，無補則寒。

黃芪　橘皮　葛根

連翹　蠟梢　炙甘草壹分已上各

升麻　黃芪　柴胡貳分已上各

當歸身　麻黃柒分已上各　吳茱萸

生地黃　地龍伍分已上各

右㕮咀，都作一服，水一大盞半，煎至六分，去柤，乳食後熱服，服藥之後，添喜笑精神，出氣和順，乳食旺，大蘇黃湯一名梔子茯苓湯。

治黃疸，土色爲熱爲濕，當小便不利，今反利，知黃色爲燥，胃經中大熱，變黃脫落，知膀胱與腎俱受土邪，乃大濕熱之證，鼻下斷作瘡者，上逆行榮氣伏火也，能乳者，胃中有熱也，寒則食不入，喜食上者，胃不足也，面黑色者，爲寒爲痺，大便青寒褐色，血黑色，熱蓄血中，間黃色，腸中有熱，治法當滋榮潤燥，除寒熱，致津液。

防風　黃連貳分已上各　黃芪

炙甘草　麻黃不去根節　羌活貳分已上各

山梔子仁　柴胡　茯苓柒分已上各

當歸身伍分　大蘇葉　白朮伍分已上各

右剉如麻豆大，都作一服，用水一大盞半，煎至六分，去柤，食前稍熱服。

塌氣退黃湯一名茯苓滲濕湯。

治小兒面色㿠黃，腹脹，食不能下。

白朮　柴胡（已上各半分）　升麻（壹分）
桂枝　麻黃　吳茱萸
厚朴　羌活　望豆蔻
神麯末　蒼朮　澤瀉
白茯苓　猪苓　黃蘗
橘紅（已上各貳分）　青皮　黃連（已上各伍分）

杏仁（貳個）

右都作一服，水二大盞，煎至一盞，去滓，食前溫服。

中滿分消丸

枳實　黃連（去鬚）　厚朴（已上各伍分）
生薑　盞黃　猪苓（已上各壹錢）
橘皮　甘草　白朮（已上各壹錢伍分）
砂仁　澤瀉　茯苓（已上各叁錢）
半夏（肆錢）　黃芩（壹兩貳錢）

右為細末，湯浸蒸餅為丸，如黍米大，每服三五十丸，溫水下。

消痞丸

黃連（伍錢）　黃芩（貳錢）　厚朴（柒分）
薑黃（伍分）　乾生薑　人參（已上各肆分）
甘草（肆分）　枳實（貳分）　橘皮（壹分）

右為細末，湯浸蒸餅為丸，如黍米大，每服三十丸，隨乳下。

斑疹論

夫斑疹始出之證，必先見面燥腮赤，目胞亦赤，呵欠煩悶，乍涼乍熱，欬嗽噦噎，足稍冷，多睡，並瘡疹之證，或生膿胞，或生小紅斑，或生斑疹，此三等不同，何故俱顯上證而後乃出，蓋以上諸證，皆太陽寒水起於右腎之下，煎熬左腎，足太陽膀胱寒水夾脊，逆流上頭下額，逆乎太陽內火不得傳導，逆於面上，故顯是證，蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也，諸斑證皆從寒水逆流而作也，醫者當知此理，乃敢用藥，夫胞者一名赤宮，一名丹田，一名命門，主男子藏精施化，婦人繫胞有孕，俱為生化之源，非五行也，非水亦非火，此天地之異名也，象坤土之生萬物也，夫人之始生也，血海始淨，一日二日，精勝其血，則為男子，三日四日五日，血脈已旺，精不勝血，則為女子，二物相搏，長生也，其子在腹中，十月之間，隨母呼吸，呼吸者，陽氣也，而生動作，滋益精氣神，饑則食母血，渴則飲母血，兒

隨日長，皮肉筋骨血脈形氣俱足，十月降生，口中尚有惡血，啼聲一發，隨吸而下，此惡血復歸命門胞中，僻於一隅，伏而不發，直至因內傷乳食，濕熱之氣下流，合於腎中，二火交攻，致營氣不從，逆於肉理，惡血乃發，諸斑疹皆出於膀胱壬水，其發後聚肉理，歸於陽明，故三番斑始顯之證，皆足太陽壬膀胱尅內小腸，其始出皆見於面，終歸於陽明肉理，熱化為膿者也，二火熾甚，反勝寒水，遍身俱出，此皆出從足太陽傳變中來也，當外發寒邪，使令消散，內瀉二火，不令交攻其中，令濕氣上歸，復其本位，可一二服立已，仍令小兒以後再無二番斑出之患，此內經之法，覽者詳之。

消毒救苦散

治斑證悉具，消化便令不出，如已出者，再不生斑。

防風　羌活　麻黃根
升麻　生地黃　連翹（初出者減，未者加）
酒黃芩（已上各伍分）　當歸身　黃連（已上各叁分）
川芎　藁本
葛根　酒黃芩　柴胡
蒼朮（已上各貳分）　細辛　生黃芩
白朮　陳皮　生甘草
紅花（壹分）　吳茱萸（半分）　蘇木

右剉如麻豆大，每服五錢，水二大盞，煎至一盞，去柤，稍熱，空心服。

夫斑疹出者，皆因內傷，必出斑，營氣逆故也，大禁牽牛、巴豆、食藥，宜以半夏、枳朮、大黃、益智仁之類，去其泄瀉，止其吐，若耳尖冷，呵欠，睡中驚，嚏噦，眼澀，知必出斑也，諸大膿泡，小水泡斑，疹證三色，皆營氣逆而寒復其表，宜以四味升麻湯，中加當歸身，連翹，此定法也。

如肺成膿斑，先嗽喘，或氣高而喘促，加人參，少加黃芩，以瀉伏火而補元氣。

如心出小紅斑，必先見嗌乾，驚悸，身熱，肌肉脈，脈弦洪，少加黃連。

如命門出疹，必先骨疼身熱，其疼痛不敢動搖，少加生地黃，又加黃蘗。諸斑疹皆為陰證斑，須皆因內傷飲食，脾胃不足，營氣逆行，雖大熱內熾，陰復其外，治法如前。

辨小兒斑證。

呵欠　嚏噴　睡中發驚
或耳尖冷　眼澀
或辨復食　或口酸氣　妳辨不消
口熱
或腹中痛

如斑證少且，其斑未發，乃與升麻湯三五錢，帶熱服之，待身表溫和，斑瘡已顯，服藥乃止。

如其身涼，其斑未出，辨得是斑證，無問服數，直候身表溫和，及斑瘡已顯，然後乃止，只時時與桔梗湯，寬胸膈，利咽喉。

桔梗湯

如斑已出，只時時與之，快咽喉，寬利胸膈。

桔梗貳錢　甘草壹錢

右為麤末，每服三錢，水一大盞，煎至六分，去柤，大溫，時時服之，不可計服數。

如見傷食證，又見斑證，先與不犯大黃巴豆藥，待化過，再與升麻湯。

如食重傷，前藥不能過，再與犯大黃巴豆藥過。

如大便行，當即便與升麻湯服之，恐斑子內陷，已後隔時作雖過。

如斑子已出稠密，身表熱，急與下項。

黍粘子湯

如斑子已出稠密，身表熱，急與此藥服之，防後青乾黑陷。

黍粘子炒香　當歸身酒洗　柴胡　連翹　炙甘草壹錢　黃芪　黃芩壹錢伍分　地骨皮貳錢　已上各壹

右同為麤末，每服二錢，水一大盞，煎至六分，去柤，溫服，腹空，服藥早日休與乳食。

麻黃柴胡升麻湯

治小兒寒熱而喘，喉鳴，腹中鳴，腹滿，鼻流清涕，脈沉急而數。

麻黃　吳茱萸　甘草　升麻　全蝎貳箇　草豆蔻仁　厚朴貳分　已上各　柴胡　神麯　紅花少許　益智仁壹錢伍分　當歸梢　生黃芩壹分　蘇木半分　已上各

右剉如麻豆大，分作二服，水一大盞，煎至七分，食遠服，忌風寒，微有汗則效。

黃帝素問宣明論方

劉守眞撰

黃帝素問宣明論方目錄

卷之一

諸證門

雜證統論　諸證標目　諸方標目
煎厥證（出素問生氣通天論）　人參散
薄厥證（出素問生氣通天論）　赤茯苓湯
飧泄證（出素問陰陽應象論）　白朮湯
膜脹證（出素問陰陽應象論）　吳茱萸湯
風消證（出素問陽別論）　黃耆羌活湯
心掣證（出素問陽別論）　調中散
風厥證（出素問陽別論）　遠志散
結陽證（出素問陽別論）　犀角湯
厥疝證（出素問五藏主成論）　吳茱萸湯
結陰證（出素問陽別論）　地榆湯
解㑊證（出素問人氣象論）　利腎湯
胃疸證（出素問人氣象論）　茯苓湯
蠱病證（出素問玉機真藏論）　大建中湯
痰病證（出素問玉機真藏論）　建中加減湯

卷之二

諸證門

勞風證（出素問熱論）　芎枳丸
痺氣證（出素問逆調論）　附子丸
骨痺證（出素問逆調論）　附子湯
肉苛證（出素問逆調論）　前胡散
肺消證（出素問氣厥論）　黃耆湯
涌水證（出素問氣厥論）　萆薢丸
膈消證（出素問氣厥論）　麥門冬飲子
口糜證（出素問氣厥論）　柴胡地骨皮湯
虛瘕證（出素問氣厥論）　檳榔丸
食亦證（出素問氣厥論）　參苓散
鼻淵證（出素問氣厥論）　防風湯
魚䱀證（出素問氣厥論）　定命散
鼓脹證（出素問腹中論）　雞屎醴散
血枯證（出素問腹中論）　烏魚骨丸
伏梁證（出素問腹中論）　鱉甲湯
瘖俳證（出素問脈解論）　地黃飲子

卷之二

諸證門

厥逆證（出素問腹中論）　小茯苓湯
風成寒熱（出素問脈要精微論）　解風散
風成寒中（出素問風論）　當歸湯
風成熱中（出素問風論）　青龍散
腦風證（出素問風論）　神聖散
首風證（出素問風論）　大川芎丸　石膏散
漏風證（出素問風論）　牡礪白朮散
胃風證（出素問風論）　豆蔻湯　胃風湯
行痺證（出素問痺論）　防風湯

痛痺證（出素問痺論）　加減茯苓湯
著痺證（出素問痺論）　茯苓川芎湯
周痺證（出素問痺論）　大豆蘆湯
胞痺證（出素問痺論）　腎著湯
腸痺證（出素問痺論）　木香丸
熱痺證（出素問痺論）　升麻湯
白淫證（出素問痿論）　祕眞丸
胃脘癰證（出素問病能論）　射干湯
陽厥證（出素問病能論）　羚羊角湯
息積證（出素問奇病論）　白朮丸
痔筋證（出素問奇病論）　栢子仁散
厥逆頭疼（出素問奇病論）　天南星丸
膽癉證（出素問奇病論）　溢膽湯
濡洩證（出素問氣交變大論）　豆蔻散
篤洞證（出素問氣交變大論）　吳茱萸丸
三焦約證（出素問宣明五氣論）　枳殼丸
胃寒腸熱（出素問藏別論）　妙應丸
胃熱腸寒（出素問藏別論五）　青橘皮丸
控睾證（出素問至眞要大論）　練實丸
陰疝證（出素問至眞要大論）　蒺藜湯
諸痺證（出素問痺論）　升麻前胡湯
心疝證（出素問脈要精微論）　木香散
四聖散　赴筵散
訶子湯

卷之三

風門

諸風總論　藥證方

防風通聖散　防風天麻散
犀角丸　搜風丸
川芎石膏湯　川芎神功散
換骨丹　麻黃膏
茯苓半夏湯　仙木芎散
鉛紅散　神芎散
萬靈丸　伊祁散
祛風丸　舒筋散
勝金丸　比金散
神白丹　桃仁丸
瓜蒂神妙散　清風散
靈砂丹　川芎天麻散
蓼葉湯　薄荷白檀湯

卷之四

熱門

熱總論　藥證方
神芎丸　柴胡飲子
木香萬安丸　玉芝除老丸
泥痞丸　和中丸
龍腦丸　大金花丸
當歸龍膽丸　四生丸
妙香丸　妙功藏用丸

卷之五

傷寒門

傷寒總論　藥證方　主療說
麻黃湯　桂枝湯
小青龍湯　大柴胡湯

小柴胡湯　瓜蒂散
五苓湯

卷之六

傷寒門

抵當湯　抵當丸
大承氣湯　小承氣湯
調胃承氣湯　三一承氣湯
十棗湯　茵陳湯
甘露散　藥皮湯
大陷胸湯　大陷胸丸
梔子湯　梔子厚樸湯
檳榔散　大黃黃連瀉心湯
黃連解毒湯　白虎湯
凉膈散　石膏湯
雙解散　白朮散
四逆湯　半夏湯
小陷胸湯

卷之七

積聚門

積聚總論　藥證方
導氣枳殼丸　木香三稜丸
透膈寬腸散　密補固真丹
木香丸　軟金丸
泥金丸　狀元丸
玄胡丸　大延胡索散
三棱湯　消飲丸
除濕丹　保安丸

開結妙功丸　木香分氣丸
開胃生薑丸　導滯定功丸
積氣丹　金露紫苑丸
十方青金膏　金黃丸
導氣丸　丁香散
聖餅子　無憂散
五積丹

卷之八

水濕門

水濕總論　藥證方
三花神佑丸　葶藶木香散
白朮木香散　大橘皮湯
葶藶膏　茯苓散
調胃散　二氣散
雄黃神會散　萬勝散
牽牛丸　梔子酸棗湯
大戟丸　粉霜丸
苦葶藶丸　肉豆蔻丸

卷之九

痰飲門

痰飲總論　藥證方
人參半夏湯　半夏瓜蔞丸
白朮厚樸湯　橘皮半夏湯
知母茯苓湯　人參潤肺湯
杏仁半夏湯　防己丸
葶藶散　保安半夏丸
人參保肺湯　神應丹

人參散　甯神散
桂苓白朮丸　潤肺散
甯肺散　紫甲丸
石膏散　人參半夏丸
仙人肢丸　楓花膏
辰砂半夏丸　大百勞散
小百勞散　五味子湯
安神散

勞門

藥證方
白朮黃耆散　人參白朮湯
黃芪丸　必効散
當歸地黃湯　紫苑散
枳實飲子　虛同散
炭香透膈散　藥神聖散
三黃丸　當歸木香湯

卷之十

燥門

消渴總論　藥證方
人參白朮湯　絲雪散
人參散　大黃甘草飲子

洩痢門

洩痢總論　藥證方
益元散　玄青散
阿膠梅連丸　牛黃神金丸
炭藥藥皮丸　二勝丸
杏仁丸　白朮聖散子

勝金膏　大聖金真散
車前子散　象骨散
海蛤玉粉散

卷之十一

婦人門

婦人總論　藥證方
人參白朮散　白朮湯
二氣丹　當歸龍骨丸
當歸人參散　增損四物湯
當歸川芎湯　辰砂大紅丸
三聖散　沒藥丹
黃藥子散　大延胡索散
枳殼檳榔丸　軟金花丸
大紅花丸　黃芩湯
海蛤丸　烏金散
伏龍肝散　阿膠丸
麝香杏仁散　硃砂班猫丸

卷之十二

補養門

補養總門　藥證方
防風當歸飲子　雙芝丸
內固丹　大補丸
蛤蚧散　金鎖丹
調中丸　水中金丹
和氣地黃湯　白朮調中湯
人參白朮散　白朮散
丁香附子散　何首烏丸

腎丸　蓽澄茄丸
補中丸　神仙梢實子丸

卷之十三

諸痛門

諸痛總論　藥證方
辰砂一粒丹　神聖代鍼散
茴香丸　趣痛丸
六合散　定痛丸
香殼散　金鍼丸
一粒金丹　沒藥散

痔瘻門

痔瘻總論　藥證方
香殼丸　榼藤子丸
烏荊丸　黃耆葛花丸
黃連散　乳香沒藥散
木香厚樸湯

瘧疾門

瘧疾總論　藥證方
辟邪丹　斬邪丹
斷魔如聖丹　辰砂丸
瘧神丹　珍兒丹

卷之十四

眼目門

眼目總論　藥證方
黃連膏　滌昏樹
通天散　神芎散
金絲膏　白藥子散

胡黃連散　碧霞丹
薩菩膏　石膏羌活散
重明散　雷岩丸
丁香復光丸
小兒門
諸病總論　藥證方
龍腦地黃膏　分肢散
珍珠丸　牛黃散
硃砂丸　鬱金散
澤瀉散　鎮庭散
定命散　金肺散
厚樸散　人參散
碧雲散　桃符丸
卷之十五
諸病門
瘡癰雜論　藥證方
如意散　信效散
神聖餅子　芙蓉膏
鉛白霜散　麝香散
乳香散　五香湯
紫參丸　麝香雄黃散
硇砂散　聖力散
川山甲散　守瘿丸
鬼代丹　龍腦潤肌散
香藥丸　紅玉槌子
桃花散　追毒散
膽礬丸　茯神散

鐵脚丸　金聖散
琥珀散　葵子散
倒撲散　敗毒散
補眞丹　五香湯
醉烏法

宣明論方目錄終

金　河間劉完素著

諸證門

諸證總論

黃帝曰善言天者必驗於人善言古者必合於今善言人者必厭於己如道不或所謂明也余問夫子言而可知視而可見捫而可得今驗於發蒙解惑可得聞乎岐伯稽首對曰何道之問也天覆地載萬物悉備莫貴於人人以天地之氣生四時之法成君王宰職黎庶盡欲全形貴賤雖殊寶命一矣好生惡死者是世人之常也若人有患如救水火莫待留滯日深著於骨髓所以難矣

素問諸證畧備具題

煎厥之狀陽氣煩勞精絕辟積於夏致目盲不可視耳閉不可聽薄厥之狀陽氣大怒形氣絕而血菀於上膜脹飧泄寒熱不散升降上下頭疝心掣寒多下墜以爲諸疝心熱內掣陰陽之結四肢浮腫便血不已蠱痓之病腎氣不足寬熱筋急白液出跳掣也膀胱不利致三焦約而遺溺腎精不足强上冥視唾之若涕惡風振寒爲之勞風雖近衣絮榮虛衛實名曰肉苛心移寒於肺則肺消肺移寒於腎爲涌水心移熱於肺爲膈消膽移熱於腦爲肺淵膀胱移熱於小腸爲口糜大腸移熱於胃爲食㑊熱盛則陽絡溢陽絡溢爲鼽衄醉以入房氣竭傷肝大脫其血月事衰少名曰血枯蘊熱怫鬱生於諸風寒濕風之三氣雜合而爲諸痺宗筋弛縱發爲白淫熱聚胃口而不散行故胃脘爲癰而色白黑所謂疹筋口苦積熱名之脘

瘴腎虛內奪則爲痞痺血氣竭少令人解㑊腹滿不食寒中腸泄斯病驚濇腰股痛發腑腫不便寒生濇泄瑣叙此證不能備舉

煎厥證　主熱

陽氣煩勞積於夏令人熱厥目盲不可視耳閉不可聽人參散主之　治煎厥氣逆頭目昏憒聾不聞目不明七氣善怒

人參　遠志去心　防風去叉各二兩　赤茯苓皮　芍藥　麥門冬去心　白芍各一兩　陳皮去白

右爲末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候日再服

薄厥證　主肝

陽氣大怒則形氣絕而血脉菀於上令人薄厥於胸中赤茯苓湯主之　治薄厥暴怒怒則傷肝氣逆胸中不和甚則嘔血厥衄也

赤茯苓去皮　人參　桔梗　芍藥　麥門冬去心　槟榔各半兩　陳皮各一兩

右爲末每服三錢水一盞生薑五片同煎至八分去滓溫服不計時候

殮洩證　主冷

清氣在下則生殮洩清濁交錯食不化而清穀出矣白朮湯主之　治殮洩風冷入中洩痢不止脉虛而細日夜數行口乾腹痛不已

白朮　厚樸生薑製　當歸去苗　龍骨各一兩　艾葉半兩熟炒

右爲末每服三錢水一盞生薑三片同煎至八分去滓空心溫服

腹脹證　主心腹

濁氣在上則生脹脹此陰陽返則氣結不散而腹脹常如飽

吳茱萸湯主之　治脹脹陰盛生寒腹滿脹脹且常當如飽不欲飲食進之無味

吳茱萸湯浸炒　厚樸生薑製　官桂去皮　乾薑炮各二兩　白朮　陳皮去白　蜀椒出子各半兩

右爲末每服三錢水一大盞生薑三片同煎至八分空心去滓溫服

風消證　主心脾

二陽之病心脾不得隱曲女人月水病血不流脾病食不化風勝眞氣消

黃耆羌活散主之　治心脾受病精血虛少氣力衰乏日漸消矣

黃耆一兩半去蘆頭　羌活　石斛　防風　枳殼火炒去穰　人參　生地黃牡蠣煅　黑附子炮　茯苓去皮　五味子　牛膝酒炒各一兩　地骨皮三分　續斷半兩

右爲末每服三錢水一大盞煎至八分去滓溫服不計時候日進三

心掣證　主心

一陽發病少氣厥洩三焦不利上咳下洩心火不寧其動若掣

調中散主之　治心掣不定胸中刺氣痞塞上若咳嗽下若洩利

白朮　乾薑炮　當歸　五味子　赤茯苓去皮　甘草炙各一兩　人參　官桂各半兩

右爲末每服三錢水一大盞同煎至八分食前去滓溫服

厥疝證　主腹痛

脉至太虛積氣腹中隱而難見陰沉使脾弱寒於肢膜氣厥逆也

吳茱萸加減湯主之　治厥疝腹中冷痛積氣上逆致令陰冷於肢膜

右爲末每服三錢水一大盞煎至八分溫服去滓稍熱日二服臨卧

風厥證　主脾胃

一陽一陰病發驚駭背痛噫欠名風厥蓋胃土肝木爲木剋土風勝溫不制胃水故令上逆

遠志散主之　治風厥多驚背痛善噫善欠志意不樂身背皆痛

遠志去心　人參　黃耆去蘆頭　官桂各一兩半　細辛去苗　白茯苓去皮　熟乾地黃焙　防風各半兩　菖蒲　白朮

右末每服一錢至二錢溫酒調下空心食前日三服

結陽證　主四肢

四肢腫四肢熱勝則腫四肢者謂諸陽之本陽結者故不行於陰脉陽脉不行故留結也

犀角湯主之　治結陽四肢腫滿熱甚不散或毒攻注大便閉澁

犀角屑　玄參　連翹　柴胡去苗各半兩　升麻　木通各三錢　沉香半兩　射干去毛　甘草炙一分　芒硝　麥門冬去心

右爲末每服三錢水一大盞煎至八分去滓溫服不計時候

吳茱萸湯 主厥陰證

川烏頭炮 細辛去苗 桂各一兩 當歸 乾薑炮 官桂各一兩 良薑

右爲末每服二錢水一盞同煎至七分去滓溫服日進三服

結陰證 主便血

結陰便血一升再結二升三結三升以陰氣內結故不得通行血氣無宗滲入腸下致使漸多

地榆湯主之 治陰結下血不止漸漸極多腹痛不已

地榆四兩 甘草三兩半炙 緋砂仁七枚每服可加爲妙

右爲末每服五錢水三盞緋砂同煎至一半去滓溫服

解㑊證 主腎實

冬脉太過緩而澁腎實精不運解者緩㑊疑寒熱類也

利腎湯主之 治解㑊春脉動氣痛氣乏不欲言此爲腎元有餘矣

澤瀉 生地黃 赤茯苓去皮各一兩半 檀柳 麥門冬去心 柴胡 枳殼麩炒去穰 牛膝去苗酒浸各一兩 黃芩去伤一兩

右爲末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服不計時候

胃疸證 主胃熱

食已如飢胃熱能消穀陽明脉終心火上行心悄煩身黃小便赤澁也

茯苓加減湯主之 治胃疸積熱食已輒飢面黃瘦胸滿脇脹小便闊赤

赤茯苓 陳皮去白 澤瀉 桑白皮各剉三兩 赤芍藥 白朮各四兩 人參

官桂各二兩 石膏人乳研 半夏六兩湯洗生薑製等

右爲末每服三錢水一盞生薑十片同煎至八分去滓不計時候如病甚者加大黃樸硝各兩

蠱病證 主脾風

脾風傳腎一名疝氣小腹痛出白液名曰蠱石傳云以裹志名爲蠱病乃負精不守也

大建中湯主之 治蠱病小腹急痛便溺失精液而出白液

黃耆 遠志去心 當歸 芍藥 人參 龍骨 澤瀉各三兩 甘草炙各二兩

右爲末每服三錢水一盞生薑五片煎至八分去滓溫服不計時候

痰病證 主筋急

蠱腹病腎傳心筋脉相引而急精液少筋脉不榮潤而引急

建中加減湯主之 治痰筋病相引而急及五勞七傷小便數腹痛難立

人參 當歸 黃耆剉 甘草炙 附子炮 麥門冬 官桂 厚樸生薑製各一兩 白芍藥 白茯苓去皮 龍骨 生地各四兩

右爲末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎少許煎至一盞溫服去滓

勞風證 主諸風

發在肺下病強上冥視唾涕惡風腎肺人肺中振慄故俛仰成勞風

芎枳丸主之 治勞風強上冥視肺熱上壅唾稠喉中不利頭目昏眩

川芎 枳殼麩炒去穰各等分

右煉蜜爲丸如桐子大每服十丸溫水送下食後日三服

痺氣證 主陽虛陰實

身非衣寒中非受寒氣痺者氣血不行如從水中出不必寒傷而作也

附子丸主之 治痺氣中寒陽虛陰盛一身如從水中出

附子炮 川烏頭炮二味通剉碎炒黃色入佳 官桂 川椒 菖蒲 甘草各四兩 骨碎補炒 天麻 白朮各二兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服三十丸溫酒下空心食前日三服

骨痺證 主腎弱

身寒大衣不能熱腎脂枯潤不行髓少筋弱柔慄故挛急

附子湯主之 治腎虛風寒濕骨痺腰脊疼不得俯仰兩脚冷受熱不遂頭昏耳聾音深

附子炮 獨活 防風去苗 川芎 丹參 草蔻 天麻 官桂 當歸各一兩 黃耆 細辛去苗 山茱萸 白朮 甘菊花 甘草炙 枳殼麩炒去穰各半兩 牛膝酒浸

右爲末每服三錢水一大盞生薑五片煎至七分去滓溫服不計時候日進三服

肉苛證 主榮虛胃寒

近衣絮肉苛思榮氣虛則不仁其證病重爲苛也以

前胡散主之　治榮虛衞實肌肉不仁致令瘡頭名曰肉苛虛其氣

前胡去苗　白芷剉　細辛去苗　官桂

白朮　川芎各三兩　川椒去目閉口者生用二錢　當歸去苗各二兩

吳茱萸湯洗炒　附子炮

右剉搗以茶酒三升勻拌同蒸一宿以煉成猪脂膏五斤入藥微煎候白芷黃紫色漉出滓成膏在處病摩之病以熱調此藥櫻桃大瘢痕瘡痍皆治并去諸風瘡痒疼痛傷折墜損故摩內皆可用之

肺消證　主心肺

心移寒於肺肺消飲少溲多當補肺平心死而可治乃心肺爲賊也

黃耆湯主之　治消肺飲少溲多補肺平心移寒在肺

痿劣

黃耆三兩　五味子　桑白皮剉各二兩　人參各二兩

麥門冬去心二兩　枸杞子　熟地黃各一兩半

右爲末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時

涌水證　主水病

肺移寒於腎名曰涌水其證如滿張裹裹漿或徧身腫渴按腹不堅疾行則濯濯有聲或咳喘不定

葶藶丸主之　治涌水腹滿不堅溢如囊裹漿疾行則濯濯有聲

葶藶紙炒　澤瀉　椒目　桑白皮剉

杏仁去皮尖炒　木猪苓去黑皮各半兩

右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服二十丸葱白湯下不計時候以利爲度

膈消證　主肺門

心移熱於肺名曰膈消二者心膈有熱久則引飲爲消渴耳

麥門冬飲子主之　治膈消胸滿煩心津液燥少短氣久爲消渴

麥門冬去心二兩　桂心　知母

生地黃　人參　蘆根　甘草炙

茯神各一兩

右爲末每服五錢水二盞竹葉數片同煎至一盞去滓溫服食後

口糜證　主口

腸胱移熱於小腸腸不便上爲口糜心胃壅熱水穀不化轉下小腸

柴胡地骨皮湯主之　治口糜生瘡損爛小腸有熱脹滿不便宜服之

柴胡去苗　地骨皮各等分

右爲末每服三錢水一大盞煎至八分去滓食後如有病人大段實者加大黃樸硝可瀉熱甚

大腸移熱名虛瘕津液耗散不能滑利宛結而大腸閉澁

槟榔圓主之　治大腸有遺熱津液壅滯腹痛閉澁名曰虛瘕證

槟榔　大黃剉炒　枳殼麩炒去穰各二兩　木香　桃仁去皮尖炒另研各一兩　大麻仁

右爲末煉密和圓如桐子大每服十圓至十五圓溫酒下不計時候湯亦得

食㕮證　主胃病

大腸移熱於胃善食而瘦或胃熱遺於膽能食善飲大勝土也

參苓圓主之　治食下胃中結熱消穀善食不生肌肉此名食㕮

人參　蒼朮　遠志　赤茯苓

地骨皮　牛膝酒浸各一兩

右爲末煉蜜爲圓如桐子大每服十圓至十五圓米飲下不計時候

鼻渊證　主鼻門

膽移熱於腦則辛類鼻渊濁涕不止如涌泉不滲而下久不已衄血爲患

防風湯主之　治鼻渊腦熱滲下濁涕不止久而不已必成衄血之疾

黃芩各一兩　人參　甘草炙　麥門冬去心　川芎一兩　防風去蘆一兩半

右爲末每服二錢湯點之食後服日三服

衄鼽證　主失血

膽受胃熱循脉而上於腦陽絡溢血妄行在鼻空竅日瞑者

定命散　治膽受熱血妄行鼻中衄鼽并血汗不止

硃砂　水銀　麝香各等分

右爲末每服半錢新汲水調下不計時候如用藥看老幼虛實加減

鼓脹證　主胃病氣逆

病有心腹脹滿旦食不能暮食致令胃逆不散大腸不傳逆滿

雞屎醴散　治鼓脹旦食不能暮食痞滿古法用此可擇焉

大黃　桃仁　雞屎醴乾者各等分

右爲末每服一錢水一盞生薑三片煎湯調下食後臨卧服

血枯證　主婦人經病

年少醉入房室氣竭肝傷故經衰少不來肝傷則血涸脾胃相傳大脫其血目眩心煩故月事不來也

烏魚骨圓主之　治血涸胸脇交滿妨飲食變則聞腥臊之氣唾血出清液前後溲血

茜茹　烏賊魚骨各一兩

右爲末雀卵不拘數和成劑圓如小豆大每服五圓至十圓煎飽魚湯下食後此日三服食壓之妙矣

黃帝素問宣明論方卷一終

江陰朱氏校刊本
金　河間劉完素著

諸證門

伏梁證　主心積

若梁之伏隱也居臍上逆廣下順不可移動爲水溺故有二等

鱉甲湯主之　治伏梁積氣心下如臂痞痛不消小便不利

鱉甲去裙襴煮黃色　京三稜　大腹子皮

柴胡去等　生地黃　芍藥　當歸各一兩

官桂　生薑各三分切作片子焙乾

右爲末每服三錢水一大盞入生薑木香半錢同煎至八分去滓空心溫服

痟俳證　主腎虛

內奪而厥舌痟不能言二足廢不爲用腎脉虛弱其氣厥不至舌不仁經云痟痺足不履用音聲不出者黃飲子主之　治痟痺腎虛弱厥逆語聲不出足廢不用

熟乾地黃　芭戟去心　山茱萸　石斛

肉蓯蓉酒浸焙　附子炮　五味子　官桂

白茯苓　麥門冬去心　菖蒲　遠志去心等分

右爲末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚薄荷同煎至八分不計時候

厥逆證　主心痛

膺腫頸痛胸滿腹脹上實下虛氣厥而逆陽氣有餘鬱於胸也不可鍼灸宜服順氣湯

小茯苓湯主之　治厥逆病三焦不調升降胸膈膺腫

胸滿腹脹冷氣衝注刺痛

赤茯苓　人參　陳皮去白各等分　桔梗去白

右爲末每服三錢水一盞半生薑五片同煎至八分去滓不計時候

風成寒熱證　主風

因於露風寒熱之始腠理次入胃食不化熱則消中寒慄振動也

解風散主之　治風成寒熱頭目昏眩支體疼痛手足麻痺上膈壅滯

人參　川芎　獨活　甘草　麻黃去節湯洗焙各一兩　細辛去苗

右爲末每服三錢水一盞半生薑五片薄荷葉少許同煎至八分不計時候

風成寒中證　主風

風氣與陽明入胃循脉而上至目皆津液所生爲泣也當歸湯主之　治風邪所傷寒中目泣自出肌瘦溲汗不止

當歸　人參　官桂各三錢　乾薑炮

白朮　白茯苓　甘草　川芎

白芍藥各半兩　細辛去苗半兩　陳皮去白一兩

右爲末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚同煎至八分去滓熱服不計時候併三服

風成熱中證　主風

風氣與陽明入胃循脉而上目皆肥人氣不外洩爲熱中目黃之病也

菁龍散主之　治風氣邪傳化腹內痰結面目黃風氣不得泄爲熱中煩渴引飲

地黃　仙靈脾　何首烏去黑皮銅湯浸一宿竹刀子切焙各一兩　防風去苗　荆芥穗一兩分

右爲末每服一錢沸湯點調下食後每日三服

腦風證　主風氣

氣循風府而上則爲腦風項背怯寒腦戶極冷以此爲病

神聖散主之　治腦風邪氣留飲不散項背怯寒頭疼不可忍者

麻黃去節　細辛去苗　乾蝎一半生半炒　藁葉各等分

右爲末每服二錢煮荆芥薄荷酒調下茶亦得

井血風

又方治腦風邪氣留飲頭疼不可忍者用遠志末不以多少於鼻中嗜與痛處柔之相兼前藥可用也

首風證　主新沐中風

中風爲首風頭面多汗惡風當先一日甚至其風日則少愈

大川芎丸主之　治首風旋暈眩急外合陽氣風氣相搏胃脘痰飲偏正頭疼身拘倦

川芎一斤　天麻四兩用鄜州者

右爲末煉蜜爲丸每兩作十丸每服一丸細嚼茶酒下食後

秘方茶酒調散　治一切諸風痰壅目澁昏眩頭疼心憒煩熱皮膚痛痒并風毒壅滯清爽神志通和關竅消惡汗

石膏另爲細末　香附去須炒　細辛去苗　菊花各等分

右爲末每服二錢溫茶酒調下食後每日三服

目風眼寒證　主眼門

風入系頭則血脉凝滯不能上下通流於目令風寒客之風眼寒也

石膏散主之　治目風眼寒及偏正頭疼夾腦風鼻出清涕目淚疼痛不已

石膏二兩炭火煅研細末　川芎一兩　甘草半兩炙

右爲末每服一錢蔥白好茶同煎湯調下食後日二服

漏風證　主酒風

飲酒中風或汗多不可單衣食則汗出多如液漏久不治爲消渴疾

白朮散主之　治漏不久虛風多汗食之汗出如洗少者羸劣

牡蠣塩亦錢　白朮一兩分　防風二兩半

右爲末每服一錢溫水調下不計時如惡風倍防風白朮如汗多面腫倍牡蠣

冒風證　主風

因於失衣風感之頭汗多惡風腸塞不通寒則目眩腹滿氣不通

天豆蔻丸冒風湯主之　治冒風頭多汗惡風飲食不下小腹善滿失衣則腹脹食寒則瀉形瘦

肉豆蔻　草豆蔻　陳皮　獨活　川芎各半兩　羌活　薏苡仁　人參　甘草炙　木香各五分　防風

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服四十丸米飲下不計時候日進三服

冒風湯　治風冷乘虛入客腸胃水穀不化腸脇虛滿疠痛及陽門泄毒或下脓血

人參　白茯苓去皮　芎藭　官桂　當歸去苗　白芍藥　白朮各等分

右爲末每服二錢水一大盞入粟米百餘粒同煎至七分去滓熱服空心食前此藥與豆蔻丸爲表裏也

行痺證　主痺

風寒濕三氣合而爲痺風氣勝者行痺上下左右無留隨所至作

防風湯主之　治行痺行走無定

防風　甘草　當歸　赤茯苓　杏仁去皮炒熟　桂各一兩　黃芩　秦艽　葛根各一錢　麻黃半兩去節

右爲末每服五錢酒水合二盞煎三枚薑五片煎至一盞去滓溫服

痛痺證　主痺

寒勝者爲痛痺大宜宣通陰寒爲痛宜通氣溫經而愈

茯苓湯加減　治痛痺四肢疼痛拘倦浮腫

赤茯苓去皮　桑白皮名桑皮　防風　官桂　川芎　芍藥　麻黃去節各半兩

右爲末每服五錢水一盞棗一枚煎至八分去滓溫服以薏粥投之汗泄爲度效矣

著痺證　主痺

濕氣勝爲著痺濕地水氣甚重著而不去多汗而濡者

茯苓川芎湯主之　治著痺留注不去四肢麻拘攣浮腫

赤茯苓　桑白皮　防風　官桂　川芎　麻黃　芍藥　當歸　甘草炙各等分

右爲末每服二錢水二盞棗三枚同煎至一盞去滓空心温服如欲出汗以粥投之

周痺證　主痺

黃帝鍼經云在血脉之中隨上下木痺不痛令能上下周身故以名之

大豆蘖散主之　治周痺注五臟留滯胃中結聚益氣出毒潤皮毛補腎氣

大豆蘖一斤炒香熟

右爲末每服半錢温酒調下空心加至一錢日三服

胞痺證　主膀胱

小腹膀胱按之內痛若沃以湯澁於小便上爲清涕太陽直行從巔入循於腦氣下灌於鼻時出清涕不止腎著湯主之　治胞痺小便不利鼻出清涕者

赤茯苓去皮　白朮各四兩　甘草三兩炙　乾薑二兩炮

右爲末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服日三服

腸痺證　主痺

雖多飲不得溲不成大便使糟粕不化故氣喘急而殮溲

木香丸主之　治腸痺腹疞痛時發殮溲氣不消化小便秘澁

木香　白朮　官桂　蕪荑

良薑　訶子皮各一兩　附子炮去皮　厚樸生薑炙

肉豆蔻各二兩　甘草半兩　乾薑三分

右爲末麵糊爲丸如桐子大每服二十丸薑湯下空心

熱痺證　主痺

陽氣多陰氣少陽熱其陰寒故痺臟腑熱煩然而悶也升麻湯主之　治熱痺肌肉熱極體上如鼠走停口反縱皮色變兼諸風藉治

升麻三兩　茯神去皮　人參　防風

犀角鎊　羚羊角鎊　羌活各一兩

右爲末每服四錢水二盞生薑二塊碎竹瀝少許同煎至一盞温服不計時候

白淫證　主虛勞

思想無窮所願不得意淫於外入房太甚筋縱發爲筋痿及爲白淫太過者白物爲淫隨溲而下故爲勞弱秘填丸主之　治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寢陰人通洩耳

龍骨一兩別研　訶子皮大者五個用　縮砂仁半兩去皮

硃砂一兩研細分爲衣

右爲末麪糊爲丸如菉豆大每服一丸空心温酒下冷水亦得不可多服大秘薏白湯茶下

胃脘癰證　主癰門

胃脉沉細陽氣不得下通寒癰陽熱聚胃口腐壞成膿射干湯主之　治胃脘癰人迎脉逆而甚嗽濃血榮衛不流熱聚胃口成癰

射干去毛　梔子仁　赤茯苓去皮　升麻各一兩

赤芍藥半兩　白朮半兩

右爲末每服五錢水二盞煎至一盞去滓入地黃汁一合蜜半合再煎温服不計時候

陽厥證　主諸氣

怒狂者生於陽也陽勝則氣逆狂怒上氣奪食即已食入於陰養於陽則平其氣若陽勝氣逆多怒

羚羊角湯主之　治陽厥氣逆多怒而頸脉膨幼已食陰養於陽平其氣

羚羊角　人參各三兩　赤茯苓去皮　遠志去心

大黃炒各半兩　甘草一分炙

右爲末每服三錢水一盞半煎至八分去滓温服不計時候

新補又方　治陽厥若除煩下氣鐵落爲飲鐵漿湯飲之食後併服

息積證　主腹心

病脇下滿逆氣不已氣聚脇下息而不消積而不散氣元在胃妨飲食不可鍼灸宜導引服藥爾

白朮丸　治息積脇下氣逆妨悶喘息不便呼吸引痛不已

白朮　枳實　官桂各一兩半　人參二兩

陳皮　桔梗醋炒　甘草各一分

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服二十丸温酒下日三服

疹筋證　主肝

人有尺脉數甚筋急而見腹必急數亦爲虛筋見以名耳

栢子仁散主之　治疹筋肝虛生寒脉寒數筋急腹脇痞悶筋見於外聖惠方中十五味栢子仁丸亦治

栢子仁　茯苓　防風　細辛

白朮　官桂　枳殼　川芎各三兩

附子　當歸　槟榔各半兩

右爲末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚同煎至八分去滓温服不計時候

厥逆頭疼證　主胃

腎虛犯大寒頭疼齒亦痛痛之甚數不已者是也以天南星丸主之　治厥頭痛齒痛骨寒胃脉同腎脉厥逆頭痛不可忍之

天南星炮　硫黃研　石膏研　消石研各等分

右爲末麪糊爲丸如桐子大却每服二十丸溫酒下空心日午臨卧三時服

膽癉證　主肝

謀慮不決膽虛氣上衝口中上溢則口苦是清淨之府濁穢之氣上溢

益膽湯主之　治膽癉肝虛熱氣上衝口中常苦洩熱不已藏府固虛致然

黃芩去朽　甘草炙　人參各二兩　官桂一兩　茯神各兩半　苦參

右爲末每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服不計時候

溏洩證　主利

內經云濕勝則濡泄乙經云寒客生濡胃洩如腸氣而下利

豆蔻散主之　治濡洩不止寒客於脾胃故傷濕而腹痛滑利不止

肉豆蔻五個　甘草炙　厚樸各等分

右爲末每服二錢米飲一盞調下食菌白湯亦得

鶩溏證　主利

脾虛風冷陰盛糟粕不化大便黃黑如鶩溏或大腸有寒也

吳茱萸丸　治鶩溏洩瀉不止脾虛胃弱大腸有寒大便青黑或黃利下

吳茱萸湯洗炒　乾薑　赤石脂　陳麴炒熟　當歸焙　厚樸各三錢

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服三十丸溫米飲下空心服

三焦約證　主大小腸

小腹痛不得大小便邪氣入客約而不行故穀氣不得通也

枳殼丸主之　治三焦約調順三約氣脉消痞滯利胸膈治風通大小便

陳皮一兩　槟榔半兩　牽牛四兩一半生一半熟搗取頭末一兩半　木香一分　枳殼二兩半

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服十五丸牛薑湯下食後日三服

胃寒腸熱證　主胃

胃寒主收水穀不化洩瀉寒之氣在上腸熱之氣在下故脹而洩

妙應丸主之　治胃寒腸熱水穀不化腹脹痞滿洩利不已

川烏頭去尖半兩　梔子仁　乾薑生各一分

右爲末生薑汁麪糊爲丸如桐子大每服五丸溫酒下食前日進二服

胃熱腸寒證　主胃

胃熱則消穀善食而肌奈腸寒則血凝脉重小便痛痛而脹

青橘皮丸又云前胡丸香散亦治　治胃熱腸寒善食而肌便溺小腹而脹痛大便或澁

青皮一兩　巴豆霜一分　蓬莪茂炮各

右爲末麪糊爲丸如菉豆大每服三丸至五丸茶酒下食後少與之不可多也

控睾證　主小腸

甲乙經云小腸病結於腰上而不下痛衝心肺邪所系茴香練實丸主之　治小腸病結上而不下痛衝心肺

茴香炒　練石麪炒去核　石菖蒲　馬鞭花醋炒各一兩　陳皮一兩　荒花牛酪炒

右爲末醋麪糊爲丸如桐子大每服十丸至二十丸溫酒下空心食前

陰疝證　主男病

足厥陰之脉環器底小腹腫或病腎虛寒水泥溺瀉邪補脉爲治

蒺藜湯主之　治陰疝溺引小腹痛諸厥病即陰疝也嘔慾勞痛不可忍之

蒺藜去角炒　附子炮去皮臍　梔子各一兩

右爲末每服三錢水一盞半煎至六分去滓食前溫服

控睾證茴香練實丸治陰疝此證

諸痺證　主風

痺廼風寒濕三氣相合而爲痺風者百疾之長善行數變當汗惡風月間腸痛或走注四肢皮膚不仁屈伸不便

升麻前胡湯主之　治肝風虛所中頭痛目眩胸膈壅滯心煩痛昏悶屈伸不便

升麻　前胡一兩半　玄參　地骨皮各兩　羚羊角　葛根各二兩　酸棗仁二錢

右爲末每服三錢水一盞半煎至八分去滓再煎三五沸食後溫服如行五六里進一服

心痛證 主心痛

心脉急小腹有形心不受邪必傳於腎故小腹有形心氣逆不順當痛不已當兼心氣治不止爲有寒邪所中

木香散主之 治心疝小腹痛悶絕不已者

木香 陳皮各一兩 良薑 乾薑 訶子肉 赤芍藥 枳殼各半兩 草豆蔻 黑牽牛各三兩 川芎三兩

右爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

四聖散 治腎臟風并一切癖

白附子 白蒺藜 黃耆 羌活各等分 生用

右爲末每服二錢鹽湯調下空心一日三服久癖不差十日大愈

赴筵散 治口瘡不已者

密陀僧 黃蘗 青黛各等分

右同研爲細末每用乾糝於瘡上不過三二日即便愈

訶子湯 治失音不能言語者

訶子四個半炮半生 桔梗一兩半炙半生 甘草二寸半炙半生

右爲細末每服二錢用童子小便一盞同水一盞煎至五七沸溫服甚者不過三服即愈

江陰朱氏校刊本
金 河間劉完素著

風論

素問云諸風掉眩強直支痛緩戾裹急筋縮皆足厥陰風木之位肝膽之氣也風者動也動者搖也所謂風氣甚而主目眩運由風木王則是金衰不能制木而木能生火故風火多爲熱化肯陽熱多也風爲病者或爲寒熱或爲熱中或爲寒中或爲厲風或爲偏枯或爲腰脊強痛或爲耳鳴鼻塞諸證皆不仁其病各異其名不同經云風者善行數變腠理開則灑然寒閉則熱而悶風氣俱八行於諸脉分肉之間與衛氣相干其道不利致使肌肉憤膜而有瘍也衛氣所凝而不行故其肉有不仁也分肉之間衛氣行處風與衛氣相薄俱行肉分故氣道澁而不利氣道不利風熱內鬱衛氣相持肉憤膜而瘡出衛氣被風鬱不得傳循昇凝而不行則肉不仁也謂皮內痛而不知寒熱痛痒如木石也 經曰風者百病之首也其變化乃爲他病無常皆風氣所發也以四時五運六氣千變萬化衝激推擊無窮安得失時而絕也故春甲乙傷於風者爲肝風 夏丙丁傷於風者爲心風 季夏戊己傷於風者爲脾風 秋庚辛傷於風者爲肺風 冬壬癸傷於風者爲腎風

風中五臟六腑自俞而入爲藏府之風肺風之狀多汗惡風色白時嗽短氣晝則微寒則甚 心風之狀上善怒色赤病甚則言不可快 肝風善悲色微苔嗌乾善怒時憎女子 脾風身體怠惰四肢不收色薄微黃不嗜飲食

腎風面痝而浮腫脊痛不能正立其色如隱曲不利又曰風寒熱諸疾之始生也人之藏府皆風之起謂火熱陽之本也謂曲直動搖風之用也眩運嘔吐謂風熱之甚也夫風熱拂鬱風大生於熱以熱爲本而風爲標風言風者即風熱病也氣壅滯筋脉拘倦肢體焦痿頭目昏眩腰脊強痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽嗌不利胸膈痞悶咳嘔喘滿涕唾稠粘腸胃燥熱結便溺淋閉或夜卧寢汗咬牙睡語筋惕驚悸或腸胃拂鬱結水液不能浸潤於周身而但爲小便多出者或濕熱內鬱而時有汗洩者或因亡液而成燥淋閉者或因腸胃燥鬱水液不能宣行於外反以停濕而泄或燥濕往來而時結時泄者或表之陽中正氣衛氣是也與邪熱相合并入於裏陽極似陰而戰煩渴者中氣寒故戰或虛氣久不已者經言邪熱與衛氣并入於裏則寒熱甚則渴或表則發熱大則病作離則病已或風熱走注疼痛麻痺者或腎水眞陰衰虛心火邪熱暴甚而倔仆或卒中久不語或一切暴瘖而不語語不出聲或暗風癇者或洗頭風或破傷或中風諸湖搐并小兒諸痟積熱或驚風積熱傷寒疫癘而能辨者或熱甚佛結而反出不快者或熱黑陷將死或大人小兒風熱瘡疥及久不愈者或頭生屑癘身黑紫斑駮或面鼻生紫赤風刺瘮疹俗呼爲肺風者或成風瘋世傳爲大風疾者或腸風痔漏并解酒過熱毒兼解利諸邪所傷及調理傷寒未發汗頭項身體疼痛者并兩感諸證兼治產後血液損虛以致陰氣衰殘陽氣鬱甚爲諸熱證腹滿澁痛煩渴喘悶譫妄驚狂或熱極生風而熱燥鬱舌強口噤筋惕肉瞤一切風熱燥證鬱而惡物不下腹滿脹痛而昏者惡物過多而不吐者不宜服之兼消除大小瘡及惡毒兼治墮馬打撲傷損疼痛或因而熱結大小便澁滯不通或腰腹急痛腹滿喘悶者

防風通聖散

防風　川芎　當歸　芍藥
大黃　薄荷葉　麻黃　連翹
芒硝各半兩　石膏　黃芩　桔梗各一兩
滑石三兩　甘草二兩　荊芥　白朮
梔子各一分

右爲末每服二錢水一大盞生薑三片煎至六分溫服涎嗽加半夏半兩薑製

賈同知通聖散

防風　芍藥各二錢半　甘草三兩　荊芥三錢半
薄荷一兩　黃芩一兩　白朮一分　石膏一兩
川芎半兩　滑石三兩　當歸半兩　大黃半兩
麻黃半兩　山梔子一分　連翹半兩　桔梗一兩
無芒硝　無縮砂

崔宣武通聖散

防風　芍藥　荊芥　當歸
白朮　山梔子各一分　川芎　大黃
薄荷　連翹　黃芩　桔梗
縮砂各半兩　甘草　石膏各一兩　滑石三兩

劉庭瑞通聖散

此方有縮砂無芒硝其餘皆同緣庭瑞於河間守眞先生札師傳之隨從二年始受於方斯且取爲端面可准憑以用之兼庭瑞以用治病百發百中何以疑之因錄　但庭瑞臨時以意加減一依前法嗽加半夏半兩生薑製

防風天麻散　治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯強暴瘖不語內外風熱壅滯解昏眩

防風　天麻　川芎　羌活
香白芷　草烏頭　白附子　荊芥穗
當歸焙　甘草各半兩　滑石二兩

右爲末熱酒化蜜少許調半錢加至一錢壯藥力運行微麻爲度或煉蜜爲丸如彈子大熱酒化下一丸或半丸細嚼白湯化下亦得散鬱結宣通氣如甚者更服防風通聖散

犀角丸　治風癇日發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角才半兩　赤石脂三兩　樸硝二兩　白僵蠶一兩
薄荷葉一兩

右爲末麪糊爲丸如桐子大每服二十丸至三十丸溫水下日三服不計時候如覺痰多即減丸數忌油膩物風痙病目直卒中口噤背強如弓卧搖動手足搐搦無汗名剛爲陽痙有汗名柔爲陰痙通三一承氣下妙

搜風丸　治邪氣上逆以致上實下虛風熱上攻眼目昏耳鳴鼻塞頭痛眩運躁熱上壅痰逆涎嗽心腹痞痛大小便結澀清利頭面鼻聰耳鳴宣通血氣

人參　茯苓　天南星半兩　乾生薑
藿香葉一分　白礬生各二兩　蛤粉二兩　寒水石一兩
大黃　黃芩二兩　牽牛四兩　薄荷葉半兩
滑石四兩　半夏四兩

右爲末滴水爲丸如小豆大每服十丸生薑湯下加至二十丸日三服

川芎石膏湯　治風熱上攻頭面目昏眩痛悶風痰喘嗽鼻塞口瘡煩渴燥悶眼生翳膜痛神利頭宣通氣血中風偏枯解口小諸邪謝理諸病勞復傳染

川芎　芍藥　大黃　當歸　山梔子
黃芩　人參　白朮各半兩　菊花　荊芥穗
甘草三兩　桔梗二兩　滑石四兩　寒水石二兩
防風　縮砂仁分　石膏
連翹　薄荷葉各一兩

右爲末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後水調亦得忌鹽醋發熱物

川芎神功散　治風熱上攻偏正頭痛無問微甚久新頭面昏眩精神

川芎四錢　甘草一分　川烏頭　吳白芷
天南星　麻黃各半兩

右爲末每服二錢水一盞生薑三片煎至半盞投清酒半盞避風

換骨丹　治癲癇中風口眼喎斜半身不遂并一切風痫暗風並宜服之

我有換骨丹　傳之極幽秘　疎開病者心
扶起衰翁臂　氣壯即延年　神清自不睡
南山張仙翁　三百八十歲　槐皮芎朮芷
仙人防首蠶　十件各停勻　苦味香減半
龍腦即少許　硃砂作衣纏　麻黃煎膏丸
大小如指彈　脩合在深房　勿令陰人見
夜卧服一粒　遍身汗津滿　萬病自消除

川芎　芍藥　當歸　山梔子
黃芩　大黃　菊花　荊芥穗
人參　白朮各半兩　滑石四兩　寒水石二兩
甘草三兩　桔梗二兩　縮砂仁分　石膏
防風　連翹　薄荷葉各一兩

右爲末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後水調亦得忌鹽醋發熱物

川芎神功散　治風熱上攻偏正頭痛無問微甚久新頭面昏眩精神

川芎四錢　甘草一分　川烏頭　吳白芷
天南星　麻黃各半兩

右爲末每服二錢水一盞生薑三片煎至半盞投清酒半盞避風

換骨丹　治癲癇中風口眼喎斜半身不遂并一切風痫暗風並宜服之

我有換骨丹　傳之極幽秘　疎開病者心
扶起衰翁臂　氣壯即延年　神清自不睡
南山張仙翁　三百八十歲　槐皮芎朮芷
仙人防首蠶　十件各停勻　苦味香減半
龍腦即少許　硃砂作衣纏　麻黃煎膏丸
大小如指彈　脩合在深房　勿令陰人見
夜卧服一粒　遍身汗津滿　萬病自消除

神仙爲侶伴

麻黃煎膏　仙朮　香白芷　槐角子取子
川芎　人參　防風　桑白皮
苦參　威靈仙　何首烏　蔓荊子
木香　龍腦研　硃砂研　麝香研

五味子

右爲末桑白皮單搗細秤以麻黃膏和就杵一萬五千下每兩分作十丸每服一丸以便物擊碎溫酒半盞浸以物蓋不可透氣食後臨卧一呷嚥之衣蓋覆當自出汗即瘥以和胃湯調補及避風寒茶下半

鉛紅散 治風熱上攻陽明經絡面鼻紫色刺癢疹爲治風者以肺主鼻而又淺化皮膚之內皮膚屬於肺 白礬灰半兩 胡上硫黃

右爲末少許入黃丹染與病人面色同每上半錢津液塗之洗嗽罷臨卧再服防風通聖散效速

神芎散 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻并牙齒悶痛

川芎 蔓荊子 薄荷葉 鬱金各二錢 荊芥穗 紅豆各一分

右爲末入盆硝二錢研勻鼻內嗅三三剂耳許力慢加藥病甚兼夜嗅

萬靈丸 治腎藏一切耳鳴腰疼筋骨痛

赤芍藥 五靈脂 防風 草烏頭二兩炮 海桐皮 黃者 細辛 狗脊二兩 山茵陳 骨碎補 地龍各八錢 牛膝 何首烏 蔓荊子 白附子 川烏頭 巨勝子各八錢 仙茅一兩 光花三錢炒 黑牽牛半兩 青皮二錢 御米子二錢炒

右爲末酒麪糊爲丸如桐子大每服十丸至二十丸溫酒下空心食前服

伊祁丸 治腰脚拳攣鶴膝風筋縮

伊祁頭尾全者 桃仁生 白附子 阿魏 桂心 白芷 當歸 北海蛤

安息香用胡桃瓤研 芍藥 牛膝 地骨皮 威靈仙 羌活各等分

右爲末麪糊爲丸如彈子空心每服溫酒化下一丸祛風丸 治中風偏枯手足戰掉語言蹇澁筋骨痛

蕎豆粉 川烏頭炮 草烏頭炮 天南星 半夏各一兩 甘草 川芎 藿香葉 苓苓香 地龍 蝎梢各三錢 白姜蠶炒米 甘浸去絲 川姜半兩炮

右爲末一兩用蕎豆粉一兩又一法用藥一兩以白麪二兩滴水爲丸如桐子大量人虛實加減細嚼茶酒下五丸至七丸食後初服三丸漸加

舒筋散 治婦人血氣并產後風熱搐搦舒筋俗雞爪風

人參 川芎 官桂 木香 天麻酒浸焙各一兩 井泉石四兩別爲末 丁香各半兩

右爲末每服三錢井泉末三錢大豆半升淨淘好酒一大升煮豆軟去豆用豆汁酒調下後以酒送下蓋覆汗出爲效

勝金丸 治風熱驚駭不時旋運潮搐口吐痰沫忽然倒地不省人事名曰癇病

白僵蠶 細辛 天南星 皂角炙黃 川烏頭生 烏蛇真者好酒浸去骨 白礬枯 桔梗 威靈仙 何首烏 荊芥穗 川芎各二兩 草烏頭

爲末酒麪糊爲丸如桐子大每服十丸食後溫酒下

比金散 治傷寒胃風頭目痛四肢拘倦急卒

麻黃 白芷 細辛 荊芥穗

菊花 防風 石膏 何首烏 川芎 薄荷 乾蝎 草烏頭各等分

右爲末每服一錢水一盞煎溫服酒茶亦得

神白丹 治傷寒積熱及風生驚搐或如狂病諸藥不効此方不可盡述

鉛白霜一分研 輕粉半兩 粉霜一兩用白麪六錢和作餅子煮熟同

右爲末滴水爲丸桐子大每服十丸至十五丸米飲下量虛實加減

桃仁丸 治一切風毒偏身疼痛四肢拘急

草烏頭生用 五靈脂三兩 桃仁取霜一兩

右爲末酒煮麪糊丸如桐子大以青黛爲衣嚼胡桃仁以溫酒下五丸食後加減

瓜蒂神妙散 治頭目昏眩偏正頭痛等

焰硝 雄黃 川芎 薄荷葉 道人頭 梨蘆各一分 天竺黃一錢半如無以蔚金代之

右爲末研細含水鼻中嗅壹字神驗

清風散 治頭目昏眩咽膈不利痰涎壅塞

石碌一錢 硃砂 牙硝 雄黃各二分 龍腦一字 瓜蒂二錢 滑石 赤小豆半錢 皂角一字去皮炙黃取末

右爲極細末每服半錢新汲水調下如嚏不省人事

滴水鼻中或健者可治爲驗

靈砂丹 治破傷風一切諸風等

威靈仙 黑牽牛 何首烏 蒼朮半兩 香附子六兩去皮 川烏頭去尖 硃砂 沒藥

乳香各三錢　陳皂角刂錢炙荊大皮

右爲末把皂角打破用酒二升半春夏三日秋冬七日取汁打麪糊爲丸如桐子大每服五丸如破傷風煎鱉酒下如牙疼赤眼搥碎研三五丸鼻嗅之

天麻散　治頭項痛頭面腫拘急風傷榮衛發熱

川芎　細辛　苦參　地骨皮

菖蒲　何首烏　蔓荊子　薄荷葉

杜錢黎　牛旁子　荊芥穗　虵蛻草

威靈仙　防風　天麻一兩　甘草炙二兩

右爲末每服二三錢研蜜水調下茶水任不計時

薄荷白檀湯新補　治風壅頭目眩鼻塞煩悶精神不爽消風化痰清頭目

白檀一兩　荊芥穗二兩　薄荷葉四兩　栝蔞根二兩

甘草四兩炙　白芷二兩　鹽四兩　縮砂仁半兩

右爲末每服一錢百沸湯點食後臨卧稍熱溫服

菊葉湯　治一切風頭目昏眩嘔吐面目浮腫者

菊花去梗　羌活　獨活　旋覆花

牛旁子　甘草各等分

右爲末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服食後

黃帝素問宣明論方卷三終

江陰朱氏校刊本
金　河間劉完素著

熱論

黃帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也因熱稍愈猶未盡除不戒飲食勞動情慾擾亂奈脾胃氣虛未能消化堅食故熱復生五臟者皆熱

夫熱病者傷寒之類也人之傷於寒則爲病熱寒者藏於肌膚陽氣不行散發而內爲怫結故傷寒者反病爲熱熱雖甚不死乘巨陽爲首巨陽者諸陽之屬也

諸陽爲熱以氣諸陰爲寒以血熱病已愈其有復作謂病已衰而熱有作所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺緣熱也雖邪氣而不盡遺熱在故當復作

五藏俱熱者皆視之肝熱在頰先赤心熱顏先赤脾熱鼻先赤肺熱右頰先赤腎熱頤先赤肝熱者小便黃腹痛多卧身熱熱爭則狂驚脇滿手足躁而不得安卧心熱者不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗脾熱者頭重頰痛煩心顏青欲吐身熱熱爭則腰痛不可仰腹滿泄兩頷痛肺熱者淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘咳痛走胸背不得太息頭痛不堪汗出而寒腎熱者腰痛脛痠苦渴數飲食熱熱爭則項痛而強脛寒且痠足下熱不欲言　經曰汗出脉躁盛一死脉不與汗相應其病二死狂言失志者三死皆是怫鬱結不能解散以致危殆

素問諸熱瞀瘛暴瘖冒昧躁擾狂言罵詈驚駭腑臟疼痠氣逆皆手少陽相火心胞絡三焦之氣也

夫腎水真陰本虛心火狂暴債熱以甚以致風熱壅滯

頭面昏眩肢體麻痺皮膚瘙痒筋脉拘倦胸膈痞滿時或痛悶或鼻窒齆衄口舌生瘡咽喉不利牙齒疳蝕或徧身生瘡癬疥或睡語咬牙驚惕虛汗或健忘心忪煩燥多睡或大小便澁滯或煩熱腹滿或酒過積毒勞役過度中外一切勞損神狂氣逆心志不寧口苦咽乾飲食減少變生風熱諸病虛羸困倦或酒病瘦悴及老弱虛人或脾腎經虛風熱燥鬱色黑齒宜身瘦焦憔或熱中煩滿飢不飲食或痺或消中善食而瘦或消渴多虛頭面腫小便數或服甘辛熱藥過度變成三消上則消膈中則消中下則消腎小便白膏也

神芎丸 治一切熱證常服保養除痰飲消酒食清頭目利咽膈能令徧身結滯宣通氣利而愈神强體健耐傷省病并婦人經病及產後血滯腰脚重痛小兒積熱驚風潮搐藏用丸亦曰鼠仁丸加黃連薄荷川芎各半兩名曰神芎丸

大黃 黃芩各二兩 牽牛 滑石各四兩

右爲細末滴水爲丸如小豆大温水下十丸至十五丸每服加十丸日三服冷水下亦得或煉蜜丸愈佳或久病熱鬱羸悶瘦悴老弱并一切證可下者始自十丸每服加十丸以利爲度如常服此藥但除腸垢積滯不傷和氣推陳致新得利便快並無藥燥搔擾亦不困倦虛損頗遂病人心意或熱甚必須急下者便服四五十丸未利再服以意消息三五歲孩兒丸如麻子大凡此一法此藥至善常服二三十丸不利藏府但有益無損或婦人血下惡物加桂枝半兩病微者常服病重者亦取利因而結滯開通惡物自下也此方除藏府滑泄者或重寒脉遲者或婦人經病產後血下不止者及孕婦等則不宜服除此以外一切風熱雜病悶壅塞神氣不和或平人保養常服自顯其功若以効驗觀其藥味則非明本草造化之理者不可得而知其然也猶孔子讀易道明顯應化萬仁之善而不見其大道之功用故曰顯諸仁藏諸用因以云藏用丸亦其義也兼以世訛之久矣而反不喜此等妙方不肯服之每有久獲大効而誠懇求其方不得已而授之既見其方反生疑惑不復用焉亦有効而志信求其方務以廣傳救疾因而衆議百端擬疑妄生謗說使致俗醫皆畏之致道不能神但有妨病者後之君子但行其藥明顯諸人勿示其方而密藏諸用耳或以一法加黃連川芎薄荷等各半兩治一切頭目昏眩者愈佳

柴胡飲子 治解一切肌骨蒸積熱作發寒熱往來表裏和則發寒表熱表和則發熱邪熱半在表半在裏出入進退無和即寒熱往來陰陽相搏也嗜熱寒戰表之陽和正氣與邪熱并爭於裏脉迫不行故身冷脉絕寒戰而反煩渴也及傷寒發汗不解或中外諸邪熱口乾煩渴或下後熱未愈汗後勞復骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病

柴胡 人參 黃芩 甘草

大黃 當歸 芍藥各半兩

右爲末每服抄三錢水一盞生薑三片煎至七分温服日三服病熱甚者加減之

崔宣武柴胡飲子 加半夏 五味子 桔梗各三錢

劉庭瑞柴胡飲子 與前分兩不同故以錄之

柴胡 甘草二兩 黃芩 當歸

芍藥 大黃各一兩 半夏各五錢 人參

右爲大勞熱病五七錢以利爲度未利更加便病不再發也

木香萬安丸 治一切風熱佛鬱氣血壅滯頭目昏眩鼻塞耳鳴筋脉拘倦肢體焦痿咽嗌不利胸膈痞塞腹脇痛悶腸胃燥澁淋閟不通腰脚重痛痃癖急結痃癖堅積腸滯胃滿久不了絕走注疼痛瘧風痼病濕病腹脹水腫

木香 揀桂 甘遂各一分 牽牛二兩

大戟半兩 大黃 紅皮 椰椰各一兩

皂角二兩要得肥好者洗淨水三盞煮一沸取出捉碎揉取出再煮減剩膏下蜜煎三沸便取出 半夏 蜜各一兩

右膏丸小豆大每服十丸至十五丸生薑湯下小兒丸如麻子大水腫痼病諸積快利爲度

玉芝徐老丸 治一切風壅消痰利膈胸脇痞悶美飲食調五味徐老緩慢遲老

天南星 乾薑各半兩 黃柏一兩半 牽牛四兩

半夏 白礬 大黃各一兩 蛤粉二兩

右爲末滴水和丸如小豆大每服十丸至二十丸温水下食後日三服常服順氣調血令人徐老或已衰大便結者除腸垢積物可漸加至三五十丸孕婦澁泄病忌服滑泄爲牽牛大黃孕婦爲南星半夏

消痞丸 治積熱尋甚者身體面目黃心脇腹滿嘔吐不能飲食痰弱發以運動喘嗌不利肢體焦瘁眩悸膈熱坐卧不寧心火有餘而妄行上爲咳血衄血下爲大小便血腸風痔瘻三焦壅滯悶癉熱中消渴傳化失常小兒疳積熱

黃連 乾葛各一兩 黃芩 大黃

黃蘗 梔子 茯苓 藿香

厚樸　茴香炒各半兩　木香　辣桂各一分
青黛一兩研　牽牛二兩

右爲細末滴水丸如小豆大每服十丸新水下溫水亦得小兒丸如麻子大病本濕熱內甚本自利者去大黃牽牛忌發熱諸物

知中丸　治口燥舌乾咽嗌不利胸膈痞滿心腹痛悶小便赤澁大便結滯風氣沸鬱頭目昏眩筋脈拘急鼓脹痰飲一切風鬱宜服寬膈美食消痰止逆

牽牛一兩　官桂一分　大黃　紅皮
黃芩　茴香各半兩　木香一分　滑石二兩

右爲末滴水丸如小豆大每服二十丸煎生薑湯下溫水亦得日三服

崔宣武和中丸　大黃一兩　茴香炒　外七味同

龍腦丸　治大小人一切蘊積熱毒氣不散及失癮疹

龍腦　硃砂　硼砂　牛黃各等分

右爲末銷黃蠟爲丸如米粒大每服三五丸炙甘草入麥湯下不計時候

大金花丸　治中外諸熱寢汗咬牙譫語驚悸溺血淋閟咳衄血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黃

○又自各既濟解化丸○又名既濟解化丸

大梔子　黃柏　黃芩　大黃各半兩

右爲末滴水丸如小豆大每服三二十丸新汲水下自利去大黃加梔子小兒丸如麻子大三五丸

當歸龍腦丸　治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋惕神志不寧榮衛痞滯頭目昏眩肌肉瞤瘛胸膈痞塞咽嗌不利腸胃燥　小便溺閟筋脉拘奇奇癖急也重也肢體痿弱暗風癲病小兒急慢驚風常服宣通血氣調順陰陽病無再

當歸焙　龍腦草　大梔子　黃連
黃芩　黃蘗各一兩　大黃　蘆薈
青黛各一兩　木香一分　麝香半錢

右爲末煉蜜和丸如小豆大小兒如麻子大生薑湯下每服二十丸忌發熱諸物兼服防風通聖散

軟金丸　治一切熱疾常服潤飢膚榮老諸熱證皆可服

大黃　牽牛　皂角各三兩　樸硝牛兩

右爲末滴水和丸如桐子大每服三十丸白湯下自十丸服至三十丸食後

妙香丸　治一切久遠沉積傷寒結胸太陽厥證燥鬱不開者皆可服此藥亦名大聖丸

巴豆去皮不出油　硇砂　龍腦
麝香　牛黃少許　硃砂各分
結砂子　水銀錢錫各一

右爲末煉蜜和丸又一方用蠟丸如皂子大用藥時急要動一丸分作三丸劄作眼子冷水浸煎大黃湯下然後服熱茶一碗便行也局方內無硇砂加金薄妙功藏用丸新補　亦名顯仁丸又名神芎丸治嘔噦不食痿弱難運血溢血溲淋閟不通或泄利三焦痞滯傳化失常功不可述並宜服之

大黃　黃芩　黃連各半兩　黑牽牛一兩
滑石二分　荊芥穗二兩　防風一分　川芎一兩
木香二分　官桂三分去皮

右爲末滴水爲丸如小豆大每服二十丸三十丸生薑湯下日三服溫水亦得

黃帝素問宣明論方卷四終

黃帝素問宣明論方卷五

金 河間劉完素著
江陰朱氏校刊本

傷寒門

主療說

傷寒表證當汗而不可下裏證當下而不可汗半在表半在裏則當和解不可發汗吐下在上則通之在下則泄之傷寒無汗表病裏和則麻黃湯汗之或天水散之類亦住表不解半入於裏半尚在表者小柴胡湯和解之或天水涼膈散甚且表裏熱勢俱甚者大柴胡湯微下之更甚者大承氣湯下之表熱多裏熱少者天水涼膈半和解之裏熱多表熱少者天水涼膈天水一半調之勢更甚者小承氣湯下之表證解但有裏證者大承氣湯下之凡此諸可下者通宜三一承氣湯下之發汗不解下後前後別無異證者通宜涼膈散調之以退其熱兩感做此而已傷風自汗表病裏和者桂枝湯解肌半在表半在裏白虎湯和解之病在裏者大承氣湯下之一法無問風寒暑濕有汗無汗內外諸邪所傷但有可下諸證或表裏兩證俱不見而目睛不了了睛不和者或腹滿實痛者或煩渴或譫妄或狂躁喘滿者或畜熱極而將死者通宜大承氣湯下之或三一承氣湯尤良傷寒大發汗汗出不解反無汗脉尚浮者若尤白虎湯再解之　或中暑自汗大出脉虛弱頭痛口乾倦怠煩躁或時惡寒或畏日氣無問表裏通宜白虎或裏熱勢甚腹滿而脉沉可下者宜大承氣湯或三一承氣湯傷寒表熱極甚身疼頭痛不可忍或眩或嘔裏有微熱不可發汗吐下擬以小柴胡天水涼膈之類和解恐不能退其熱勢之甚或大下後再三下後

熱勢尚甚不能退本氣虛損而脉不能實擬更下之恐下脫而立死不下亦熱極而死寒涼之藥不能退甚熱勢之甚者或熱濕內餘下利不止熱不退者或因大下後熱退利不止熱不退脉弱氣虛不可更下者或諸濕熱內餘小便赤澁大便溏泄頻併少而急痛者必欲作利也須宜黃連解毒湯○或裏熱極甚而恐陰氣不能退者或已下後熱不退者或畜熱內甚陽厥極深以至陽氣沉細而不能營運於身陰欲絕而以致徧身青冷痛甚不堪項背拘急目赤睛疼昏眩恍惚咽乾或痛躁渴虛汗嘔吐下利腹滿實痛煩悶亂喘息急聲脉雖疾數以其畜熱極深而脉道不利以致脉沉細而欲絕俗未明其造化之理而反傷熱寒極陰毒者或始得之陽熱暴甚而便有此證者○或兩感勢甚者通宜解毒湯加大承氣湯下之熱不退者再下之然雖古人皆云三下熱不退即死矣亦有按法以下四五次利一二十行熱方退而救活者免致不下退其熱而必死也下後熱稍退而未愈者黃連解毒湯調之或微熱未除者涼膈散調之或失下熱極以至身冷脉微而昏冒將死者若急下之則殘陰暴絕陽氣後竭而立死不下亦死當以涼膈散或者黃連解毒湯養陰退陽畜熱漸以消散則心胸腹暖脉漸以生至陽脉復有力者方可以三一承氣湯微下之或解毒加大承氣湯尤良或下後微熱不解者涼膈散調之愈後但宜退熱之藥忌發熱諸物陽熱易為再作也

論風熱濕燥寒

諸風

風本生熱以熱為本風為標言風者即風熱病也

諸熱

熱甚而生風或熱微風甚即兼治風熱或風微熱甚但治其熱即風自消也

諸濕

濕本土氣火熱能生土濕故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥乾也濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能宣行即停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣尚多以為兼證當云濕熱亦猶風熱義同雖病水寒不得宣行亦能為濕雖有此異亦以鮮矣或附腫體寒而有水者以為畜熱入裏極深本非病寒也及夫寒熱吐瀉因得濕而成也

諸燥

燥乾者金肺之本肺藏氣以血液內損氣虛或風則皺揭風能勝濕熱能耗液皆能成燥故經云風熱火兼為陽寒濕燥同為陰又燥濕亦異也然燥金雖屬秋陰而其性異於寒濕燥陰盛於風熱火也故風熱甚而寒濕同於燥也然中寒吐瀉亡液而成燥者亦以此矣故經云諸澁枯澀乾勁皺揭皆屬於燥也

諸寒

寒者上下所生水液澄徹清冷發不化小便清白不渴身冷不渴本末不經有見陽熱證其脉遲者是也此因飲食冷物過多陰勝陽衰而為中寒也或冷熱相併而反陽氣怫鬱不能宣散怫熱內作以成熱證者不可亦言為冷當以成證辨之夫濕熱吐瀉當見陽脉若亡液氣虛亦能反見諸陰脉也當以標本明之不可妄治或熱證誤服白朮調中湯溫藥亦能開發陽氣宣通而愈別無加害也

傷寒表證

夫傷寒之候頭項痛腰脊强身體拘急表熱惡寒不煩躁無自汗或頭面痛肌熱鼻乾或胸滿而喘手足指末微厥脉浮數而緊者邪熱在表皆麻黃湯發汗之證也或天水散之類甚佳

傷寒表裏證

傷寒身熱爲熱在表引飲或小便黃赤爲熱在裏身熱渴或小便黃赤爲表裏俱有熱亦不渴小便清白爲表裏俱無熱身疼拘急表熱惡寒而脉浮者皆爲熱在表也胸引飲譫妄腹滿實痛發熱而脉沉者皆爲熱在裏也胸脇痞痛或嘔而寒熱往來脉在肌肉者邪半在表半在裏也

內外傷

始得病脉便沉而裏病表和者內傷也脉浮而表病裏和者外傷也病在身體頭面四肢爲表病在胸腹之內爲裏病也

傷寒論

夫風寒者百病之始也是四時八節不正疫癘之氣故云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰冷乃四時之正氣冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒爾冒之者乃傷耳春應煖而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反溫非時而邪氣是以辛苦之人一歲之中病無少長始自一日巨陽膀胱受之巨陽者三陽之首故先受之二日陽明胃受之三日少陽膽受之未入其藏可汗之四日太陰脾受之五日少陰腎受之六日厥陰肝受之其人藏可泄之經云其未滿三日汗之而已其滿三日泄之而已故聖人論汗下大槩言之以脉分別三四日脉沉伏亦當下六七日脉浮滑亦可汗故傷寒傳足經不傳手經未詳耳且自人身十二經絡分布上下手足各有三陰三陽察天地之氣天樞之上同天之陽天樞之下同地之陰至貴大論云身半以上其氣三矣天之分也天氣主之身半以下其氣三矣地之分也地氣主之注云當陰之分冷病歸之當陽之分熱病歸之有八節邪氣所中於人陽邪爲病傳手經陰邪爲病傳足經其邪自何而入自風池而入爲脊骨兩傍一寸五分是十二經之俞穴春夏應陽秋冬應陰至貴大論云寒者溫涼盛衰之用其在四維故陽之動始於溫盛於暑陰之動始於涼盛於寒春夏秋冬各差其分易云水流濕火就燥熱論云熱病者皆傷寒之類也人之傷於寒則爲病熱熱雖不死大陰明陽論六陽受風氣陰受濕氣注云同氣相求耳又曰傷於風者上先受之傷於濕者下先受之注云陽氣炎上故受風陰氣潤下故受濕蓋同氣相合耳故風熱火爲陽寒濕燥爲陰刺熱論云五藏俱有熱病肝熱病左頰先赤心熱病頤先赤脾熱病鼻先赤肺熱病右頰先赤腎熱病頤先赤甲乙熱論云有手足太陰熱病有手足少陰熱病有手足厥陰熱病熱論其三陰三陽五藏六府皆受病榮衛不行五藏不通則死矣未嘗則傳足經不傳手經

麻黃湯 治傷寒頭痛發熱體痛惡風無汗喘滿 又治太陽病脉浮緊無汗發熱身疼八九日不解表證仍在此當發其汗其人發煩目瞑劇劇者陽氣重也

麻黃一兩半去節 桂枝一兩去皮 甘草半兩炙 杏仁二十枚去皮尖或瀉病身煩痛小便自利者加白朮四分微汗之湯

右爲末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候衣覆以取汗

桂枝湯 治傷寒發熱惡寒乾嘔頭痛太陽中風陽浮陰弱解肌脉浮緊鼻鳴者

桂枝三分去皮 芍藥三分 甘草三分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑三片棗二箇煎至七分不計時候

小青龍湯 治傷寒表未罷心下有水氣乾嘔發熱而咳或渴利小便不利小腹滿喘

麻黃去節湯炮去黃汁焙乾三錢利者去麻黃加附子 桂枝去皮 乾薑去麻黃加附子 細辛 五味子 芍藥 甘草 半夏

右剉如麻豆大每服五錢水一大盞煎至半盞生薑葱白同煎不計時候溫服

瓜蔕散 治傷寒表證罷邪熱入裏結於胸中項滿而肌不能食四肢微厥而脉乍緊者宜以吐之經云在上吐之在下瀉之

瓜蔕 赤小豆等分

右爲末香豉半合豆豉是也水一盞半煮取汁半盞調下錢七不吐加服

五苓散五苓散是也 治傷寒中暑大汗後胃中乾煩躁不得眠脉浮小便不利微熱煩渴及表裏俱熱飲水反吐名曰水逆或攻表不解當汗而反下之利不止脉浮表不解自利或一切留飲不散水停心下并兩咸中濕而昏躁霍亂吐瀉惡風

猪苓去皮 茯苓去皮 白朮各半兩 桂去皮一分

澤瀉一兩

右爲末每服二錢熱湯調下愈妙加滑石一兩甚佳喘嗽煩心不得眠者加阿膠半兩枯豆月大者新水

調服立愈

黃帝素問宣明論方卷五終

金 河間劉完素著　江陰朱氏校刊本

傷寒方

抵當湯　治傷寒日深表證乃甚畜熱下焦脉微沉不結胸發狂者小腹脹而硬小便自利者瘀血證也小便不利無血也或陽明畜熱內甚而喜忘或狂大便雖硬而反易其色黑者有畜血也無表裏證但發熱日深脉雖浮者亦可下之或已下後脉數胃熱消穀善飢數日不大便有瘀血也

桃仁七箇 連皮炒　大黃一分　水蛭炒　虻蟲各十箇去翅

右剉如麻豆大分作二服水一盞煮半盞絞去滓溫服未下再服

抵當丸　治傷寒有熱小腹滿小便不利者為有血也當下之不可餘藥

桃仁八箇 前炒　大黃一分　水蛭炒　虻蟲各七箇依前

右為末蜜和作二丸用水一小盞煮一丸至六分溫服晬時血未下再服

大承氣湯　治表裏俱熱病勢更甚者陽明脉遲汗出不惡寒身重

語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視陽明裏熱極甚或吐下後不解大便五六日至十餘日日晡潮熱心胃燥熱而懊憹復如瘧狀脉沉實或小便不利大便乍難乍易嘔冒不能卧或腹滿實痛煩渴譫妄脉實數而沉裏熱燥甚腸胃怫鬱留飲不散胸腹高起痛不可忍但嘔冷液大渴反不能飲強飲不能止喘

河間者

大黃半兩　芒硝半兩　厚樸半兩去皮　枳實半兩

右剉如麻豆大分半水一盞半生薑三片煎至六分內音硝煎去滓服

小承氣湯　治傷寒日深恐有燥屎腹中轉矢乃可攻之不轉矢者必初便後溏水可攻之攻之則腹滿不能食飲水即嘔其後發熱大便復硬若腹大滿不通或陽明多汗津液外出胃燥熱大便必硬而譫語脉滑吐下稀煩小便數大便結或下利譫語自得病二三日脉弱無太陽證柴胡證煩心心下結至四五日雖能食少少與承氣湯和之令小安

大黃半兩　厚樸三錢　枳實三錢

右剉如麻豆大分作二服水一盞生薑三片煎至半盞絞汁服未利再服

調胃承氣湯　治諸發汗和解不惡寒但發熱蒸蒸然者或日深心下溫溫欲吐胸中痛大便溏腹滿鬱鬱微煩先此時吐下者或日深裏熱譫語法當下之以銀粉巴豆燥熱大毒丸藥下之致真陰損虛邪熱轉甚因而協熱下利不止及表裏熱下之太早乘虛而人不成結胸但為熱利不止滿鞕或痛煩渴嘔乾脉滑數而實諸腹滿實痛者煩渴譫妄小便赤大便鞕脉滑實緊

大黃　芒硝　甘草各等分

右剉如麻豆大分一半水一大盞煎至半盞絞去滓內硝煎不利再煎服

大承氣湯　治傷寒雜病內外所傷日數遠近腹滿嘔乾煩渴譫妄心下按之硬痛小便赤澁大便結澁

或瀑熱內甚而爲滑泄熱甚喘咳悶亂驚悸狂頭目疼口瘡舌腫喉痺痤瘍陽明胃熱發瘖脉沉可下者

小兒熱極生風驚搐煩喘昏塞并斑疹黑陷小便不通腹滿欲死或斑疹後熱不退久不作癮或作斑紋瘡癤久不已者懊熱內成疹癖堅積黃瘦痛疾久新卒暴心痛風疾酒膈腸垢積滯久蒸風熱暴傷酒食煩心悶亂脉數沉實或昏水陰虛陽熱獨芒而偪撲卒中一切暴瘖不語（一名失音）畜熱內甚陽厥極深脉反沉細欲絕或表之沖和正氣與邪熱并之於裏則裏熱亢極陽極似陰反爲寒戰脉微而絕或風熱燥甚客於下焦而大小便澁滯不通者或產婦死胎不下及兩感表裏熱甚須可下者

大黃（半兩煨文一兩）　芒硝（半兩）　厚樸（半兩去皮）　枳實（半兩）　甘草

右剉如麻豆大水一盞半生薑三片煎至七分內硝煎二沸去滓服

十棗湯　治太陽中風下利嘔逆短氣不惡寒熱汗出發作有時頭痛心下痞硬引下痛兼下水腫腹脹并酒食積脹垢積滯痃癖堅積畜熱暴痛瘧氣久不已或表之正氣與邪熱并甚於裏熱極似陰反寒戰表氣入裏陽厥極深脉微而絕并風熱燥甚結於下焦大小便不通實熱腰痛及小兒熱結乳癖積熱作發驚風潮搐斑疹熱毒不能了絕者

大戟　芫花（慢火炒變色仲景經俗異語云炒作炙下凡言炙者皆乾炒也）　甘遂（各等分）

右爲末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢匕實人每一錢

茵陳湯　治陽明裏熱極甚煩渴熱鬱留飲不散以致濕熱相搏而身發黃疸但頭汗出身無汗小便不利渴引水漿身心發黃（宜茵陳湯調下五苓散）黃利大小便

茵陳蒿（一名茵陳一兩去莖）　大黃（半兩）

大梔子（七箇色深堅實好者稍小者用十箇）

右剉如麻豆大水二盞半慢火煮至一盞絞汁溫服以利爲度甚者再作當下如爛魚肚及膿血膠膘等物及小便多出金色如皂莢汁或見證將發黃此一劑分作四服調五苓散三錢匕治發黃者無越此法妙

桂苓甘露散（一名桂苓白朮散方甘草一兩半）　治傷寒中暑胃風飲食中外一切所傷傳受濕熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴不利間小便赤澁大便急痛濕熱霍亂吐下腹滿痛悶及小兒吐瀉驚風

茯苓（一兩去皮）　甘草（二兩炙）　白朮（半兩）　澤瀉（一兩）　桂（半兩去皮）　石膏（二兩）　寒水石（二兩）　滑石（四兩）　猪苓（半兩）

右爲末每服三錢溫湯調下新水亦得生薑湯尤良小兒每服一錢同上法（此藥下神金丸止瀉痢無不驗也并解內外諸邪所傷證熱又一方却不用猪苓又曰三服不計時候）

梔子蘖皮湯　治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相搏微者宜服

黃蘖（半兩）　甘草（一分）　大梔子（十五箇）

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞絞汁分次作一日溫服之

梔子湯　治懊憹煩心反側不得眠燥熱怫鬱於內而氣不宣通胸滿痛頭微汗虛煩

大梔子（七箇剉碎）　豆豉（半合俗言鹽豉少氣者加甘草一分若煩者倍以充集中之者加生薑半兩或用溫湯浸手足使心胸結熱宣通而已）

右剉如麻豆大或先以水二盞煮梔子至一盞半內豉煮至半盞絞汁溫服（凡加者皆用梔子先煮或吐或下後服凡用梔子湯皆非吐法若結之甚而集頓攻之不能開通人之夢以其燥熱鬱結之甚而集頓攻之則發熱而又吐發則鬱結益甚則不須再服也）

大陷胸湯　治汗下之後不大便五六日舌乾而渴日晡潮熱從心至小腹脹滿而痛不可近脉當沉緊滑數或但胸結頭無大段熱頭微汗出脉沉濇者水結也

大黃（三錢）　芒硝（三錢）　甘遂末（三字）

右剉如麻豆大分作二服每服水一盞煎大黃至六分內硝一二沸絞汁調甘遂一字匕半溫服未快利再服勢惡不能利以意加服

小陷胸湯　治小結胸心下按之痛脉浮而滑無大段熱表未德不可下之下之即死小結胸宜服

半夏（四錢湯洗十四箇不用生薑）　黃連（二錢剉）　栝樓實（大者半箇小者一箇其殼子則不用其中子者非也）

右以水三盞煮栝樓汁一盞半內藥至一盞絞汁兩次溫服以效

大陷胸丸　治發熱而下之太早熱入因作結胸者項亦強如柔痓狀下之則和也

大黃（半兩）　芒硝（一分）　杏仁（十二箇去皮尖雙仁草灰炒變色）　葶藶（三錢微炒）

右大黃爲末下葶藶杵羅研杏仁硝如泥和彈子大每服一丸入甘遂末三字白蜜半匙水一盞煮至半盞溫服當一宿許乃下未利再服

梔子厚樸湯　治傷寒下後心煩腹滿坐卧不安者

大梔子七箇　枳實二錢　厚樸半兩去皮炙

右剉如麻豆大以水一盞半煮絞汁半盞溫服

檳榔散　治傷寒陰病下之太早成痞心下痞滿而不痛按之軟虛也

檳榔　枳殼等分

右爲末每服三錢煎黃連湯調下不計時候溫服

大黃黃連瀉心湯　治傷寒成病痞不已心腹亦實熱煩滿或譫妄而脉沉無他證者

大黃　黃連　黃芩各一分又一法加一分甚良

右剉如麻豆大水二盞煎至一盞絞汁分三次溫服

黃連解毒湯　治傷寒雜病躁熱毒煩悶乾嘔口燥吟呻喘滿陽厥極深諸熱內甚俗妄傳爲陰毒者及汗下吐後寒亦諸藥不能退熱勢兩感證同法

黃連去鬚　黃蘗　黃芩　大梔子各半兩

右剉如麻豆大每服秤半兩水一茶盞煎至四分絞去滓溫服或腹滿嘔吐或欲作利者每服加半夏三箇生全用　厚樸二錢剉　茯苓二錢去皮剉用水一盞半生薑三片煎至半盞絞汁溫服名半夏黃連解毒湯

白虎湯加減白虎湯隨證用　治傷風自汗桂枝證表未解半斑於裏中暑自汗脉虛弱傷寒自汗脉滑數而實表裏俱熱三陽合病腹滿身重口燥面垢譫語發黃厥逆自汗和解兩感解頭痛止自汗雜病時疫未瀉發斑兼豆疱瘡疹伏熱

知母一兩半　甘草一兩炙　粳米一合　石膏四兩爲末

右剉如麻豆大水一盞煎至六分去滓溫服無時候日三四服或脣焦嘔者加半夏半兩紅皮半兩每服生薑三片煎服傷寒發汗不解脉浮者加蒼朮半兩名蒼朮白虎湯　汗吐下後煩渴口乾脉洪大加人參半兩名人參白虎湯

賈同知已効方

石膏四兩　知母一兩　甘草一兩

劉庭瑞已効方

知母一兩半　石膏四兩　粳米一合

崔宣武已効方

知母一兩　石膏三兩　甘草一兩半

右爲末每服三錢水一盞入粳米二十五粒煎至六分未會下胃熱發斑兼豆疱如液虛瘦加人參半兩白朮半兩頭疼加川芎荊芥各三錢咳嗽加半夏三錢桔梗一兩恍惚加人參三錢茯苓半兩

涼膈散一名連翹飲子亦有加減法　治傷寒表不解半入於裏下證未全下後燥熱怫結於內煩心懊憹不得眠藏府積熱煩渴頭昏唇焦咽燥喉閉目赤煩渴口舌生瘡欬唾稠粘譫語狂妄腸胃燥澁便溺閉結風熱壅滯瘡癬發斑驚風熱極黑陷將死

連翹一兩　山梔子半兩　大黃半兩　薄荷葉半兩

黃芩半兩　甘草一兩半　樸硝一分

右爲末每服二錢水一盞蜜少許同煎至七分去滓溫服虛實加減咽喉痛挺嗽加桔梗一兩荊芥穗半兩嗽而喘者加半夏半兩每服生薑三片同煎血衄喘血加當歸半兩生地一兩淋者加滑石四兩茯苓一兩去皮風眩加芎半兩藥半兩

石膏三兩防風半兩酒毒加葛根一兩荊芥穗半兩赤芍藥半兩芎半兩人參一錢半　石膏三兩　甘草一兩半　防風半兩　桔梗半兩三歲兒可服七八錢或無熱死者此一服更加大防風湯約以下之得和者宜効凡言加者皆自本方加也

以上之減退表裏熱加益元散効速

人參石膏湯　治傷寒咳嗽不已心煩及風熱頭痛精神不利惛憒宜服

人參一錢半　石膏三兩　芎半兩　半夏二錢去滑

白朮半兩　茯苓半兩　甘草一兩炙　大梔子三錢

知母半兩　黃芩三錢

右爲末每服一錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服

崔宣武人參石膏湯　治傷寒頭痛心煩悶風熱并汗後餘熱自汗多清頭目定喘嗽

人參二錢半　石膏一兩　芎一兩　黃芩二錢

茯苓三錢　甘草半兩　防風三錢

右爲細末每服五錢水一盞半煎至六分去滓溫服不計時候

雙解散　治風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所傷無問自汗汗後雜病但覺不快便可通解得愈小兒生瘡疹使利出快亦能氣通宣而愈

益元散七兩　防風通聖散七兩

右二藥一處相和名爲雙解散益元散方在痢門通聖散方在風門各七兩攪勻每服三錢水一盞半入蔥白五寸鹽豉五十粒生薑三片煎至一盞溫服

白朮散　治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦

白朮　茯苓去皮　人參各半兩　甘草一兩半炙

木香一分　藿香半兩　葛根一兩

右爲末白湯調下二錢煩渴者加滑石二兩甚者加薑汁續續飲之

四逆湯 治傷寒表熱未入裏誤以寒藥下之太早表熱不已入裏寒下利不止因表熱裏寒自利急以溫裏利止又治少陰病脉沉下利厥逆煩渴嘔吐

甘草一錢炙 乾薑一分 附子半箇生去皮臍附子以半兩者佳小者力弱大者性惡非古方之宜也不但以美其大者要知古人之有則也

右剉如麻豆大水二盞煎至一盞絞汁溫服或畜熱深極而手足厥冷者不宜此方當以下之

茯苓半夏湯 治傷寒雜病一切嘔吐或喘咳疼痛病滿頭痛者

茯苓一分去皮 半夏一錢 生薑一分取汁

一方加 黃芩一分去腦 甘草一分 紅皮一分去瓤

治風痰

右剉如麻豆大水一盞煎至四分絞汁下生薑汁溫服不計時候

黃帝素問宣明論方卷六終

黃帝素問宣明論方卷七

江陰朱氏校刊本

金 河間劉完素著

積聚論

素問曰積聚留飲痞膈中滿濕積霍亂吐下瘕癥堅硬腹滿皆太陰濕土乃脾胃之氣積聚之根也積者不散聚者不化留者不行飲者停滯痞者不通隔者阻也中滿者濕爲積霍亂吐下爲留停瘕癥者微也瘕假也斯疾窫五臟六腑陰陽變化興衰之制也亢則害承

廼制極則反矣

謂水得燥則消散而得濕則不消乃爲積飲也謂人形精神與榮衛血氣津液出入流通謂夫腠理閉密乃爲痞也謂腸胃膈絕傳化失常而乃滯也土主形體腹滿於中央乃曰中滿以傳化失度故甚則霍亂吐瀉也癥者腹中主硬按之應手然水體柔順而今乃堅硬如此者亢則害承乃制也瘕者中雖硬而忽聚忽散無其常故其病未及癥也

經曰血不流而滯故血內凝而乃瘕也

小腸移熱於大腸乃爲虛瘕大腸移熱於小腸謂兩熱相搏則血溢而爲伏瘕血溢不利月事沉滯血不行故行爲虛瘕爲虛與伏同瘕與疝同爲傳寫誤也世傳冷病然瘕病亦有熱或陽氣鬱結怫熱壅滯而堅硬不消者世傳爲寒癥瘕也或堅痞腹滿急痛寒主筋縮故急主痛寒極血凝泣而反兼土化制之故堅痞之腹滿或熱鬱於內而腹滿堅結痛不可忍者皆可爲寒誤矣誤矣

何不以脉證辨之凡諸疾病皆有陰陽寒熱宜推詳之

五臟六腑四季皆有積聚心之積名曰伏梁在於臍上大如臂上至於心橫於心下如屋梁故曰伏梁肝之積名曰賁音奔氣在左脇下覆如杯有頭足久不愈令人痎瘧脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如杯久不愈令人四肢不收發黃疸食不爲膚肌肺之積名曰息賁結在右脇下覆大如杯久不愈令人灑淅寒熱喘咳發爲肺癰腎之積名曰賁音奔狍在於小腹上至心下如狍賁走往來無定久不愈令人喘逆發爲骨痿少氣之力此爲五藏之積也常究斯義未可悉也

傳其所勝者死傳不勝者可治假令肺病傳肝肝病傳脾脾病傳腎腎病傳心心病傳肺皆傳所勝五藏之氣虛而內外諸邪所侵故留稽不行遂成積聚其脉沉細而微者是也

木香三稜丸 治一切氣悶胸膈痞滿榮衛不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化胁脇疼痛無問久新

青木香 破故紙 茴香 黑牽牛

甘遂 芫花 大戟 荆三稜

莪茂 川練子 葫蘆巴 巴戟各一兩

巴豆去皮不出油二分 陳米三合將巴豆一處同炒黑

縮砂仁半兩

右件一十五味用好醋二升除縮砂木香餘藥入醋中浸一宿入鍋煮盡爲度乾爲細末醋麪糊和丸如菉豆大每服五七丸食後加減看虛實隨湯水下

導氣枳殼丸 治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻分氣逐風功不可述

枳殼去穰麸炒 木通剉炒 青皮去皮 陳皮去白

桑白皮剉炒 蘿蔔子微炒 白牽牛炒 黑牽牛炒

莪茂煨 茴香炒 荆三稜煨各等分

右爲末生薑汁打麪糊爲丸如桐子大每服二十丸

煎橘皮湯下不計時候

透膈寬腸散 治腸上壅實膈熱難行者

白牽牛一兩 芒硝三兩 川大黃二兩 甘遂半兩

右爲細末食後溫蜜水調下一錢虛實加減疎動止

密補固真丹 治脾腎真元損虛泄痢痰嗽嘔噦痞水鼓

酸臭飲食無味臍腹冷痛肢體麻痺下虛痰厥上實

腰滯腎虛耳鳴脾虛困懶耳焦齒槁面黧身悴目黃

口燥髮墮爪退風虛偏枯中滿腸氣一切脾胃虛證

常服補養宣通氣血

天南星半兩製 半夏 神麯 麥蘖

茴香炒 荊三稜炮各一兩 白附子 乾生薑

川烏頭生各一兩 巴豆七箇 牽牛三兩 代赭石二兩

官桂一分

右爲末水和丸小豆大每服十丸加至五十丸溫水

下除泄瀉外並加大黃一兩

木香丸 治和脾胃寬胃膈消痰逆止嘔吐進益美飲

食

官桂 乾薑各半兩 木香一分 大黃

蓬莪朮 芫花醋拌濕炒乾 枳殼去穰 陳皮各半兩

半夏二兩 牽牛半斤取末四兩 茴香炒一兩 巴豆四箇

右爲末滴水爲丸如小豆大每服二三十丸溫水下

軟金丸 治心胸腰腹急痛或淋悶升降後經病血刺

痛

當歸半兩 乾漆二錢 紅花半兩 輕粉

硇砂 粉霜各一錢 三稜二錢

右同研勻棗肉爲膏和丸菉豆大新水下一丸病甚

者加得利後減

泥金丸 治心腹急痛取久新沉垢積滯推陳致新

黃蘗 大黃 五靈脂 巴豆各半兩

猪牙皂角一分輕粉 粉霜 硇砂各一分

乾漆二分

右研勻煉蜜拌得所杵千下丸菉豆大新水下一丸

未利更加服

狀元丸 治膈氣酒膈酒積泥嗽腹痛吐逆病滿

巴豆五十箇取霜 神麯半兩 半夏洗一兩 雄黃

白麵一兩炒

右研勻酒水丸小豆大細米糠炒變赤色食後溫水

下童子二丸三四歲一丸歲半半丸止嗽溫薑汁下

止嘔吐生薑湯下

玄胡丸 治積聚癥瘕解中外諸邪所傷

玄胡索 青皮去白 陳皮去白 當歸

木香 雄黃別研 荊三稜 生薑各一兩

右爲末酒麵糊爲丸如小豆大每服五七丸生薑湯

下

又一方 無陳皮 生薑 有廣茂一兩

檳榔分兩同

大延胡索散 治婦人經病產後腹痛腹滿喘悶癥瘕

癖塊及一切心腹暴痛

延胡索 當歸 芍藥 京三稜

川苦楝 蓬莪茂 官桂 厚樸

木香 川芎各一分 桔梗 黃芩

大黃各半兩 甘草一兩 檳榔二錢

右爲麄末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食

前如惡物過多去大黃官桂加黃藥子染塊子龍骨

各半兩如前法煎服平人心急痛加本方得利尤良

後常服

三稜湯 治癥瘕痃癖積聚不散堅滿痞脹食不下腹

服

荊三稜二兩 白朮一兩 蓬莪茂半兩 當歸半兩焙

檳榔 木香三錢

右爲末每服三錢沸湯點服食後每日三服

消飲丸 治一切積聚痃癖氣塊及大小結胸痛不能

仰

天南星 半夏 芫花 自然銅等分

生用

右爲末醋煮麵糊爲丸如桐子大每服五七丸食前

溫水下良久薏粥投之相虛實加減

除濕丹 治諸濕客搏腰腰重痛足脛浮腫筋脉緊急

津液凝澁便溺不利赤癬宗直癬發背疥癬走注脚

氣鍼皆尾瘡癤功効不可詳述

檳榔 甘遂 蔵靈仙 赤芍藥

澤瀉 葶藶各二兩 乳香 沒藥別研一兩

黑牽牛半兩 大戟二兩炒 陳皮四兩去白

右爲末麵糊爲丸如桐子大每服五十丸至七八十

丸溫水下後食如服藥前後忌酒一日藥後忌濕麵

食溫粥補暖

保安丸 治癥積心腹內結如拳漸上不止搶心疼痛

及遶臍腹痛不可忍者

川大黃三兩新水浸一宿蒸熟切片子焙 乾薑一兩炮

大附子半兩去皮臍 鱉甲一兩半好醋一升伏時炙令焙乾炒

右爲末取三年米醋一大升先煎四五合然後和藥

丸如桐子大每服十丸至二十丸空心醋或酒米飲下後取積如魚腸膿血爛肉汁青泥當下

開結妙功丸　治怫熱內盛痃癖堅積腸結癥瘕積聚疼痛脹悶作發有時三焦壅滯二腸閉結胸悶煩心不得眠咳喘噦逆不能食或風濕氣兩腿爲腫脹黃瘦眼澁唇暗一切所傷心腹暴熱肝腎燥鬱偏正頭疼筋脈拘攣肢體麻痺走注疼痛頭目昏眩中風偏枯邪氣上逆上實下虛脚膝麻木不通氣血

荊三稜炮　茴香各一兩炒　川烏頭四兩　神麯

麥芽　大黃各一兩好醋半升熬成膏不破堅積不須熬膏水丸

乾姜二錢　巴豆二箇破堅積用四箇　牛夏半兩

桂二錢　牽牛三兩

右爲末膏丸小豆大生薑湯下十丸十五丸溫水冷水亦得或心胃間稍覺藥力煖性却減丸數以加至快利三五行以意消息病去爲度

木香分氣丸　治積滯癖塊不消心腹痞結疼痛搶刺如覆杯狀

陳皮去白　檳榔各一兩　破故紙二兩炒　木香一兩半

黑牽牛十二兩炒香熟取頭末五兩半篩不用

右爲末滴水爲丸如桐子大每服二三十丸生薑湯下食後臨卧服

開胃生薑丸　治中焦不和胃口氣塞水穀不化噫氣不通噎塞痞滿口淡吞酸食時膨脹噦逆惡心嘔吐痰水宿食不消咳嗽諸筋刺痛覺中開胃進飲食

桂心一兩　生薑一斤切作片子鹽三兩醃一日再焙乾　青皮去白

陳皮去白　甘草炙各二兩　縮砂仁四十九箇　廣茂

當歸各半兩

石爲末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸食前細嚼溯湯化下

導滯定功丸　治一切心腹卒暴疼痛及胸中不利消食止逆定疼痛

大椒爲皮　木香各一錢　蝎梢三錢　巴豆入箇出油

石爲末後入巴豆霜研勻醋麵糊和丸如菉豆大硃砂爲衣每服五丸至十丸淡醋湯下

積氣丹　治一切新久沉積氣塊面黃黑瘦諸氣無力癥瘕積聚口吐酸水

檳榔二箇　芫花一兩　硇砂二錢　巴豆半生

青皮去白　陳皮各三錢　蓬莪茂　雞爪黃連

京三稜　章柳根　牛膝各兩　肉豆蔻三箇

大戟　川大黃　甘遂　白牽牛

乾薑　青礞石　乾漆各半兩　木香二錢半

石菖蒲三錢

右爲末醋麵糊和丸如桐子大每服一丸臨卧燒棗湯下每夜丸服後有肚內作聲病退爲度

金露紫苑丸　治一切脾積兩肋虛脹臍疼痛

草烏頭去皮尖　黃連半兩　官桂　桔梗

乾地黃　乾生薑　川椒　蕪荑

紫苑去皮　柴胡　防風　厚樸

甘草　人參　川芎　鱉甲酒浸

貝母　枳殼去穰　甘遂各一兩　巴豆三兩醋煮

牛日出油　大礬砂三錢

右爲末水煮麵糊爲丸如桐子大每服五丸空心臨卧米飲湯下或微疎動詳虛實加減

信香十方青金膏　灌頂法王子所傳十二上願云藥師琉璃光如來應當供養正徧知明行足善游世間解無上士調御丈夫天人師

佛世尊方境授治周身中外陰陽不調氣血壅滯變生百病乃至虛羸困倦偏攻酒食內傷心腹滿塞急痛或酒積食積癥瘕積聚痃癖堅積中滿腹氣　臭酸醋嘔吐翻胃或膈癰消中善食而瘦或消渴多飲而數色角切小便或腸風下血痔瘻痒痛或胃癰疹或偏身癰疽惡瘡或瘡毒已入於裏腹滿嘔吐或成瀉痢或出惡瘡癰肉或下痢腹痛或一切風氣散體疼痛及中風偏枯或痰逆生風痰涎嗽兼產後服痛及小兒疳疾諸風潮搐但平人常服補養宣行榮衛調飲食

信砒人言　乳香　輕粉　粉霜

巴豆各一兩同研　龍腦半字　麝香半字　青黛二錢同研

黃蠟三錢

右研細末溶蠟入蜜半錢就搓勻旋丸菉豆至小豆大先服小丸病在上食後在下食前在中不計時候面東頂禮一丸淨器盛水送下如合藥即淨處面東每一丸密念呪三遍或病人不能呪請人呪

或師氏呪過、呪曰

藥師圓成蜜遍拋　普濟有緣除百病　仰吞一粒體堅牢

信香十方青金膏

密呪曰

莫說十方佛　但言八金剛　十二上願自然成　五蘊大根俱不道

金黃丸　治酒積食積諸積面黃疸積硬塊

荆三稜　香附子半兩　澤瀉二錢半　巴豆四十九粒出油　黍米粉　牽牛二錢半

右爲末用梔子煎湯和丸如菉豆大每服三丸至五丸如心痛艾醋湯下七丸

逆氣丸　治心胸滿悶脇肋刺痛不思飲食常服寬腸進美飲食

蘇黃四兩　香附子四兩　縮砂　甘草　廣茂各二兩　丁皮　甘松　木香　荆三稜各一兩　白檀半兩　藿香葉半兩

右爲末入菉豆粉二兩用湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服三二十丸細嚼白湯下食後日進三服

丁香散　治痃癖氣脇下痞滿息而不消積而不散元氣在胃不妨食者

好丁香二十五箇　白丁香七十箇　密陀僧　舶上硫黃　黃鶯調各五分

右爲細末每服一字皂子煎湯調下不計時候治肚內生硬物黑瘦如柴嘔吐積滯日三服食後

聖餅子　治一切沉積氣脹兩脇氣滿無問久新者

大黃三兩　黑牽牛頭末一兩　硇砂三錢　山梔子半兩輕粉二錢

右爲末煉蜜和丸捻作餅子如小錢大厚樣食後每服一餅子細嚼溫酒下臨卧如行粥補之虛實加減

無憂散一名萬病散　治風疾瘡腫疥癬或臟腑積冷壅滯氣結風勞膀胱宿冷臟腑虛衰面色痿黃內有癥癖氣并常有疳蟲蚘蟲攻心腹俱痛忽中傷寒頭痛不忍狀若山嵐時氣瘟疫之疾並宜急服此藥宣通三五行立瘥或中風口喎語多蹇澁睡後口中涎出不限

時節不問男子女人但五日一服不過三服永瘥人患腰膝疼痛脚氣腫滿運動艱難飲食無味并小兒疳痢脫肛者量大小與服利三五行自瘥大人久遭氣痢狀若休息痢止有時俱一服取下冷膿一二升當日見効藥無四時冷熱老幼衰弱病患悉皆除之任服他藥無妨若服常時蓋緣搜出藏府中積滯蠱膿故也無孕婦人久患血虛氣弱瘦黃無力者亦可依方服宣通氣候殊不困倦無妨此藥凡有百病並皆治之其功不可具載有孕婦人或遇陰晦時即不可服天道晴明可進若雖復疾而未愈者再可服

黃耆　木通　桑白皮　陳皮各一兩　胡椒　白朮　木香各半兩　白牽牛四兩炒別取頭末

右七味爲細末每服二錢牽牛末二錢生薑二錢切作片子煎生薑湯一大盞調藥須臾又用生薑湯或溫湯送下平明可行三五次快利無妨如病瘥後以白粥補之痊矣

五積丹　治心腹痞滿嘔吐不止破積聚者

皂莢一鋌一尺二寸火燒留性淨盞合之四面土塗合物令出煙　巴豆十二箇白麪一兩五錢同炒令黃色爲度

右爲末醋麪糊爲丸菉豆大每服十丸鹽湯下食後加減

金　河間劉完素著

水濕門

夫諸濕者濕爲土氣火熱能生土濕也故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕物燥乾也濕病本不自生因於大熱悒鬱水液不能宣通即停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣尚多以爲兼證云濕熱亦猶風熱義同雖病水寒不得宣行亦能爲濕雖有此異亦以鮮矣或跗腫體寒而有水者以畜熱入裏極深本非病寒也

三化神祐丸　治中滿腹脹喘嗽淋閉一切水濕腫滿濕熱腸垢沉積變生疾病久病不已黃瘦困倦氣血壅滯不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛風痰涎嗽頭目旋運癎疾不已癥瘕積聚堅滿痞悶酒積食積一切痰飲嘔逆及婦人經病不快帶下淋瀝無問赤白并男子婦人傷寒濕熱腹滿實痛久新瘦弱俗不能別辨或汎常只爲轉動之藥兼瀉久新腰痛并一切下痢及小兒驚疳積熱乳癖滿並宜服之

甘遂　大戟　芫花醋拌濕炒各半兩　牽牛二兩　大黃一兩爲細末　輕粉一錢

爲末滴水爲丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下每日三服加至快利利後却常服病去爲度設病愈後老弱虛人平人常服保養宣通氣血消進酒食病癖悶極甚者便多服則頓攻不開轉加痛悶則初服兩丸每服加兩丸至快利爲度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法

崔宣武神祐丸

加黃栢一兩　牽牛四兩　大黃二兩　輕粉二錢
甘遂　大戟　芫花各一分依前法

劉庭瑞神祐丸用此藥治水氣常得効　賈同知稱之不已乃神仙奇絕之藥也

葶藶木香散　治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澁大便滑洩

葶藶　茯苓去皮　猪苓去皮　白朮各一分
木香半錢　澤瀉　木通　甘草各半兩
辣桂一分　滑石三兩

右爲末每服三錢白湯調下食前　此藥下水濕消腫脹止洩瀉利小便若小便不得通利而反轉泄者此乃濕熱痞悶極熱而攻之不開是能反爲注泄此正氣已衰而多難救也慎不可攻之而無益耳

白朮木香散　治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧不敢食小便閉澁

白朮　木猪苓去皮　赤茯苓　甘草
澤瀉各半兩　木香　槟榔三錢　陳皮去白二兩
官桂二錢　滑石三兩

右爲末每服五錢水一盞生薑三片同煎至六分食後去滓温服

大橘皮湯　治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑洩

橘皮一兩去白　木香一分　滑石六兩　槟榔三錢
茯苓一兩去皮　木猪苓去皮　澤瀉　白朮
官桂各半兩　甘草二錢

右爲末每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓温服大小便利先服十棗湯二三日後再服此藥

葶藶膏　治水腫腹脹

牛黃　麝香　龍腦各一分
海藻上同二分洗　牽牛　桂心各八分　昆布
葶藶六分炒　椒目三分

右爲末別搗葶藶熬成膏丸如桐子大每服十丸日再服稍利小便爲度詳虛實加減

茯苓散　治諸般氣腫等疾

芫花醋拌炒　澤瀉　郁李仁　甜葶藶各半兩
漢防已各二錢半　陳皮去白　白槟榔
桑本二錢半　滑石三分　大戟炒三分　牽牛各半兩

右爲細末每服一錢取桑白皮濃煎湯空心調下取下碧綠水如爛羊脂即瘥如未盡腫日又服腫消如故不用服忌鹽百日

調胃散　治胸膈痞悶不思飲食脇肋硬痛消腹脹

半夏製　甘草炙　厚樸去皮　陳皮去白
藿香各等分

右爲末每服一錢生薑三片棗二枚水一盞同煎温服食前

氣散　治水氣蠱脹滿

白牽牛　黑牽牛各二錢

右爲末用大麥麪四兩同一處爲燒餅臨卧用茶湯一盞下降氣爲驗

雄黃神金散

雄黃　葶藶一兩用糯米和炒半熟米不用　澤瀉二兩
椒目半兩　大戟　巴戟去心　茯苓去黑皮
芫花醋五升浸一日炒兩　甘遂　桑白皮各一

右爲末從發時加減一分空心用井花水調下每服一錢加至五錢以利爲度忌鹽醋生冷毒物油膩血物

從脚腫根在心加葶藶
從陰腫根在胸加澤瀉
從面腫根在肺加桑白
從皮腫根在脾加甘遂
從臍腫根在腎加大戟
從肚腫根在腹加椒目
從膝腫根在肝加芫花
從心腫根在肋加雄黃
從口腫根在小腸加巴戟
從四肢腫根在胃加茯苓

萬勝散　治十種水氣不可愈者

海帶　海藻　海蛤　芫花醋浸炒
續隨子　巴戟去心　甜葶藶　樟柳根

右爲末每服三錢至五錢温酒調下臨卧間日再服

牽牛丸　治一切濕熱腫滿等疾

黑牽牛各等分　茵芋　大黃　大椒
滑石各等分

右爲細末酒煮麪糊和丸如桐子大每服五丸至七丸牛薑湯下食後虛實加減

梔子薏皮湯　治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相搏微者宜服

大梔子十五箇　黃蘗半兩　甘草一分

右剉如麻豆大水三盞煮至一盞絞汁分三次作一日服温服不計時候

大戟丸　治十腫水氣腫脹喘滿熱寒咳嗽心胸痞悶背項拘急脇肋緊硬於小腹小便不通反轉大便澁泄不能坐卧

大戟　芫花醋炒　甘遂　海帶

海藻　郁李仁　續隨子各半　槐柳根一兩　輕粉　巴豆八味為末每用抄藥末十五錢七分使入後藥研砂　粉霜各一錢　水銀砂子一皂子大　龍腦半錢　巴豆二十一箇仁用去皮

右八味巳下同研勻用棗肉為丸如綠豆大每服五丸至七丸龍腦臘茶送下食後臨臥虛實加減

粉霜丸　治病水鼓滿不食四肢浮腫大小便閉不進飲食

粉霜　礜砂　海蛤　寒水石燒粉　玄精石　白丁香　頭白麪各一錢　輕粉半錢　海金砂一錢

右研勻着紙裹數重上使麪裹又紙裹冷酒煎了桑柴火燒麪熟為度宿餅和丸如桐子大每服三丸生薑湯下一日三服二日加一丸至六日不加即止以補之妙

苦葶藶丸　治一切水濕氣通身腫滿不可當者

人參二兩　苦葶藶四兩於鍋內紙上炒黃色為度

右二味同為細末用棗肉和丸如桐子大每服十五丸煎桑白皮湯下日進三服空心食前○此藥恐君子不信試驗之

肉豆蔻丸　治水濕脹如鼓不食者病可下

肉豆蔻　槟榔　輕粉各一分　黑牽牛一兩半取頭末

右為末麪糊為丸如綠豆大每服十丸至二十丸煎連翹湯下食後日三服

黃帝素問宣明論方卷八終

江陰朱氏校刊本
金　河間劉完素著

痰飲門

痰飲論

夫嗽者五臟皆有嗽皆因內傷脾門外感風邪皮毛屬肺風寒隨之府而入腠理開張內外相合先傷肺而入遂成咳嗽經肺熱也寒化熱熱則生痰喘滿也經云喉中介介如梗狀甚則嗽血也胸滿氣喘痰盛稠粘皆肺氣熱也

六人參半夏丸　治化痰墜涎止嗽定喘諸痰不可盡涎嘔吐痰逆痰厥頭痛風氣偏正頭疼風壅頭目昏眩耳鳴鼻塞咽膈不利心腹痞滿筋脉拘倦肢體麻痺疼痛中風偏枯咳唾稠粘肺痿勞虛人保養宜通氣血調和臟腑進飲食

人參　茯苓去皮　天南星　薄荷葉各半兩　半夏　乾生薑　白礬生

寒水石各一兩　蛤粉一兩　藿香葉一分

右為末麪糊為丸如小豆大生薑湯下二三十丸食後溫水亦得一法加黃連半兩黃蘗二兩水丸取効愈妙治酒病調和藏丸宜服之

新添半夏瓜蔞丸　治遠近痰嗽煩喘不止者

半夏生薑製　瓜蔞　白礬枯秤　款冬花各等分　杏仁去皮尖　麻黃

右為末生薑汁打麪糊為丸如梧子大每服二十丸煎生薑湯下不計時候

白朮厚樸湯　治痰嘔不散利胸膈除寒熱美飲食

白朮　甘草炙　茯苓各一兩　厚樸半兩

石作爲末每服一二錢水一大盞生薑五片煎至六分去滓食前服顯仁丸仙朮茵散大人參半夏丸

橘皮半夏湯　治痰壅涎嗽久不已者常服養液潤燥

橘皮半兩去皮　半夏二錢半湯洗七次

石爲末分作二服每服水一盞半入生薑十片同煎至七分去滓溫服

知母茯苓湯　治肺痿喘咳不已往來寒熱自汗

茯苓去皮　甘草各一兩　知母　五味子

人參　薄荷　半夏洗七次　柴胡

白朮　款冬花　桔梗　麥門冬

黃芩半兩　川芎三錢　阿膠三錢炒

石爲末每服三錢水一盞半生薑十片同煎至七分去滓稍熱服

人參潤肺湯　治肺氣不足喘急咳嗽不已并傷寒頭疼增寒壯熱四肢疼痛

人參　桔梗　白芷　麻黃去節

乾葛　白朮　甘草各一兩炙　白薇半兩

石爲末每服二錢水一大盞生薑三片蔥白二寸煎至八分如出汗連進二服通口溫服

杏仁半夏湯　治肺痿涎喘不定咳嗽不已及甚者往來寒暑

杏仁去皮　桔梗　陳皮去白

漢防已　白蘞　桑白皮各三錢　茯苓去皮

甘草二寸　猪牙皂角一錢　薄荷葉一錢

石爲末作二服水二盞生薑三片煎至六分去滓食後溫服

防已丸　治肺不足喘嗽久不已者調順氣血消化痰涎

防已二錢　杏仁三錢　木香二錢

石爲末煉蜜爲丸如小豆大每服二十丸煎桑白皮湯下如大便閉加葶藶一兩食後服

葶藶散　治肺氣喘滿痰嗽眠卧不安不思飲食

葶藶　蛤粉各三錢　桑白皮

人參　荆芥穗　薄荷葉　山梔子

陳皮　桔梗　杏仁　赤茯苓去皮

石爲末每服三錢水一大盞入生薑三片煎至六分去滓溫服食後

保安半夏丸　治久新諸嗽或上逆涎喘短氣痰鳴咽乾煩渴大小便澁滯肺痿勞劣心腹痞滿急痛中滿膈氣上實下虛酒食積聚不消補養氣血宣行榮衛

半夏　天南星各半兩　牽牛一兩　大黃半兩

黃蘗半兩　蛤粉一兩　芭豆四箇

右爲末水爲丸如小豆大每服十丸十五丸溫水下食後日三服孕婦不可服又方無芭豆有乾薑一錢半

人參保肺湯　治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸潮熱

人參　柴胡　當歸　芍藥

桑白皮　知母　白朮　川芎

黃耆　紫菀　地骨皮各一分　荆芥

茯苓去皮　黃芩　遠翹　大黃

薄荷　山梔子各半兩　甘草　桔梗各一兩

石膏　滑石　寒水石半兩

右爲末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服泄者去大黃同人參半夏丸服

神應丹　治涎嗽喘滿上攻心腹卒痛及利下血兼婦人帶下病一切肋脇痛滿

薄荷葉　甘草四錢　巴豆燈燒存性　盆硝各二錢

輕粉二錢　豆豉一兩慢火炒　五靈脂二錢

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服一丸溫薑汁下稠後空嚥津三五次禁飲食少時覺咽喉微煖効心腹急痛溫酒下二丸未効再服得利尤良帶下以溫酒下二丸或大便流利再服

人參散　治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒壅熱發戰膈熱嘔吐煩渴濕熱瀉利或目赤口瘡咽喉腫痛或風昏眩虛汗肺痿勞嗽不已者

石膏　甘草各一兩　滑石四兩　寒水石二兩

人參半兩

右爲末每服二錢溫水調下早晚食後兼服梔子金花丸　一名既濟解毒丸

寧神散　治一切痰嗽不已者諸藥無効世傳極驗

御米殼醋炒一斤生　烏梅四兩

右爲末每服二三錢沸湯點常服食後日三服

賈同知方　御米殼一兩炒　烏梅肉半兩

康少尹傳　煎烏梅湯尤妙

桂苓白朮丸　治消痰逆止咳嗽散痞滿壅塞開堅結痛悶推進飲食調和五藏無問寒濕濕熱嘔吐瀉痢皆能開發以令遍身流濕潤燥氣液宣平而愈解酒毒療肺痿勞嗽水腫腹脹泄瀉不能止者服之利止爲度隨證調之

揀桂　乾生薑各一分　茯苓去皮　半夏一兩
白朮　紅皮去白　澤瀉各半兩

右爲末麪糊爲丸如小豆大生薑湯下二三十丸日三服病在膈上食後在下食前在中不計時候或一法更加黃連半兩黃蘗二兩水丸取効愈妙

潤肺散　治小兒膈熱咳嗽痰喘甚者久不瘥者

瓜蔞實枚去子用瓤

右爲末以蜜食麪和爲餅子炙黃爲末每服一錢溫水化乳糖下日三服効乃止

又方　治寒嗽

麻黃四兩　官桂一兩　蠟二錢

右爲末以蠟同煎每服二錢溫服

寧肺散　治一切寒熱痰盛久新咳嗽不止者

御米殼四兩　木瓜三兩御米殼一處用蜜二兩水化同炒微黃

五味子一兩　人參一兩　皂角二兩

右爲末每服二錢烏梅同煎臨卧食服大効

鱉甲丸　治吐血咳嗽神効

鱉甲一箇九肋者醋炙黃　柴胡一兩酒浸一宿

杏仁一兩童子小便浸炒　甘遂一兩炙　人參半兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服十丸至十五丸煎生薑湯下

又方　用厚樸一兩生薑製

石膏散　治熱嗽喘甚者

石膏一兩　甘草半兩炙

右爲末每服三錢新汲水下又生薑汁蜜調下

人參半夏丸　治一切痰飲喘嗽不已

白礬　天南星　半夏各半兩　甘草二錢半炙

人參一錢　赤小豆四十九粒　杏仁四十九粒　猪牙皂角一挺

右爲末秫米三升醋一升熬粥和丸如桐子大每服十五丸炒蘿卜子湯臨卧下

仙人肢丸　治遠年勞嗽不問寒熱痰涎喘滿先服松花膏下過多服此藥無不効

人參　沙參　玄參　紫團參

丹參　白朮　牡蠣一　知母

甘草各二兩　蛤蚧一對頭尾全用河水洗文武火酥炙黃色

右爲末用麻黃十五斤去根枸杞子三斤熬成膏丸如彈子大磁合子內盛臨卧煎生薑自然汁化下一丸小兒量數加減

松花膏　治三二十年勞嗽積九月間宣利一切痰涎肺積喘嗽不利

防風　乾生薑　野菊花　芫花

枸杞子　甘草　蒼朮　黃精

右爲末取黃精根熬成膏子和藥末丸如彈子大每服細嚼一丸冷水化下臨卧不喫夜飯服藥一粒

辰砂半夏丸　治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胸膈痞滯公忪煩悶痰涎不利呀呷有聲

半夏半兩洗　葶藶水研成膏　杏仁各半兩炒研成膏

硃砂　五靈脂各一兩研

右爲末更研勻生薑汁煮麪糊爲丸如桐子大每服十五丸生薑湯下

大百勞散　治一切勞疾肌羸喘息不卧痰涎不食

蛤蚧一對蜜炙　元州鱉甲一箇去裙襴炙　附子一兩

人參　柴胡　川乾薑　白茯苓去皮

白朮　茴香　青皮去白　杏仁去皮尖

知母　貝母　陳皮去白　官桂

甘草炙　半夏生薑製　蒼朮湯浸各一兩　蘇木

右爲末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚烏梅二枚同煎空心稍熱服有汗加小麥二十粒不用鐵煎

小百勞散　治勞嗽不已自汗者

御米殼不拘多少炒

右爲末每服二錢入烏梅同煎水一盞溫服食後有汗加小麥三十粒同煎溫服

五味子湯　治胸膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶咳嗽痰唾嘔逆惡心不思飲食溫中益氣

五味子九兩　良薑一兩半　紅皮去白　茴香炒各一兩

乾薑兩半　甘草七兩炙　鹽一斤炒

右爲細末每服一錢百沸湯點空心食前甚者日進三服

安神散　治遠年近日喘嗽不已

御米殼蜜炒一兩　人參

右爲末每服一錢煎烏梅湯調下臨卧服

白朮黃耆散　治五心煩自汗四肢瘦劣飲食減少肌羸昏昧

白朮　黃耆　當歸　黃芩去腐

芍藥各半兩　石膏　甘草各二兩　茯苓

寒水石各一兩　官桂一分　人參　川芎各三分

右爲末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前一日三服

人參白朮湯方　在消渴門第一方是也此乃爲同不復錄耳

黃連丸　治濕熱流運氣血不通壅滯不散清爽頭目

黃連好者不拘多少

右爲末酒麪糊爲丸如小豆大每服二十丸溫水下不計時候日三服

必効散　治五勞七傷勞役肌瘦不思飲食喘嗽不已

川烏頭一兩生　天南星半兩生

右爲末每服二錢蘿卜八塊知母指大以水煮熟去滓食後服嚼

當歸地黃湯　治嗽血衄血大小便血或婦人經候不調月水過多喘嗽者

當歸　芍藥　川芎　白朮

染槐子　黃藥子各半兩　生地黃　甘草

茯苓去皮　黃芩　白龍骨各一兩

右爲末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食前

紫苑散　治勞體熱心煩脉滑短咳嗽婦人多有此疾口乾眼澁骨痿短氣皆因腸胃燥滯榮衛不能開發玄府閉塞熱鬱內餘可以開發陰陽宣通澁滯和榮衛順三焦兼服人參白朮湯

紫苑　桑白皮　桔梗　續斷

甘草　五味子各一兩　赤小豆一合

右爲末水一大盞藥末五錢青竹茹彈子大同煎至七分溫服去滓

枳實飲子　治婦人手足煩熱夜卧多汗肌肉黃瘁經候不調四肢煩倦心腹滿悶狀似勞氣

枳殼一兩　吳半夏一兩湯洗七次以生薑汁浸三日火炒黃色用半夏　柴胡各一兩　黃芩半兩

紅芍藥

右爲末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同煎至八分去滓溫服及治五心煩熱及身體壯熱潮熱續服桃仁煎丸又治月經不調阻滯不通

桃仁二兩湯浸火炒　川大黃　川樸硝各二兩

蟲蟲一兩去翅頭足

右爲末用醋五升入金銀鐺內以火熬成膏可丸如桐子大當日晚不食夜飯溫酒下一丸不嚼破午際取下赤小豆汁似雞肝小蝦蟇衣未再服候鮮紅即住服

盧同散　治男子婦人一切咳嗽喘急

欵冬花　井泉石　鵝管石　鍾乳石

官桂　甘草　白蓑　佛耳草各等分

右爲末每服一錢竹筒子吸喫日三服立効

茨香透膈散　治一切勞咳嗽壅滯胸膈痞滿

雄黃　佛耳草　鵝管石　欵冬花各等分

右爲末每服用藥一錢安在香爐子上茨着以開口吸烟在喉中立効

鸞粟神聖散　治男子婦人久新日夜咳嗽不止者

御米殼一兩蜜炒　烏梅肉　揀人參

訶子肉　葶藶　桑白皮各半兩

右爲細末每服二三錢百沸湯潑臨卧調下

新添三黃丸　治五勞七傷流濕潤燥消渴煩熱甚者

大黃　黃芩　黃連各等分

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服二三十丸加至五十丸生薑湯下不計時候日三服妙

當歸木香湯　治婦人血氣虛勞令人頭目昏眩譫語聲沉重舌根强硬言語澁澁口苦不思飲食白日間睡夜發虛汗神思恍惚夢寐狂言面色痿黃頻發嗜睡遍身疼痛骨節氣走注四肢沉重背脾拘急發寒熱五心煩燥昏乾多渴胸膈不利喉咽壅塞尪羸瘦弱經曰脉大爲勞宜服此藥

青皮　五加皮　海桐皮　桑白皮

陳皮　地骨皮　丁香皮　牡丹皮

棕薦皮諸藥全燒爲灰末用十大錢秤　當歸一兩　木香

紅芍藥半兩

右爲細末每服一錢水一盞入小油二點錢一文同煎至七分溫服如婦人血臟臍下冷痛似刀攪遍身腫滿室女經脉不通用斑猫一兩大黃一兩炒剉二味爲末用黃狗膽汁以溫酒調下一錢如臍下痛止心間痰未止不服二味

黃帝素問宣明論方卷九終

金　河間劉完素著

燥門

消渴論

燥乾者金肺之本燥金受熱化以成燥澁也兼火熱致金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能勝濕熱能耗液故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於風熱火也又加大便乾澁乃大腸受熱化成燥澁經云諸澁枯渴又如癱瘓中風皆因火熱耗損血液玄腑閉塞不能浸潤金受火鬱不能發聲（經云肺主聲）肢痛緩疾者風熱濕相致而遂以偏枯語言澁手足不隨也然中寒吐瀉亡液而成燥亦以鮮矣亦有寒濕相鬱榮衛不能開發貫注多成偏枯經曰諸澁枯涸乾勁皺揭屬於燥也　又如胃膈癉熱煩滿饑不欲食或癉成消中善食而瘦或燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便或因熱病或恣酒飲誤服熱藥以致脾胃眞陰陽損虛肝心衰弱也狂陽心火燥其三焦腸胃燥澁怫鬱而水液不能宣行也則周身不得潤澤故瘦悴黃黑也而燥熱消渴然雖多飲亦必水液不能浸潤於腸胃之外湯不能止而便注爲小便多出俗未明妄爲下焦虛冷誤人多矣　又如周身煩燥鬱故變爲雀目或內障癰疽瘡瘍上爲咳嗽喘下爲痔痢或停積而濕熱內甚不能傳化者變爲水腫濕成也世傳消渴病及消瘦弱或小便有脂液者爲消腎也此爲三消病也消渴消中消腎經意但皆熱之所致也

人參白朮湯　治胃膈癉熱煩滿饑不欲食癉成爲消

中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒過積毒一切腸胃燥澁倦悶壅塞瘡疥痿痺并傷寒雜病產後煩渴氣液不得宣通

人參　白朮　當歸　芍藥
大黃　山梔子　荊芥穗　薄荷
桔梗　知母　澤瀉各半兩　茯苓去皮
連翹　瓜蔞根　乾葛各一兩　甘草二兩
藿香葉　青木香　宮桂各一分　石膏四兩
寒水石二兩　滑石半斤

右爲細末每服抄五錢水一茶盞入盆硝半兩生薑三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至十餘錢得臟腑流利取効如常服以意加減兼服消痞丸散以散陽胃（桔滯濕熱內甚自利者去了大黃芒硝）

絳雪散　治消渴飲水無度小便數者大有神効

漢防己　枯蔞實　黃芩　黃丹各等分

右爲細末每服二錢湯漿水調下臨卧時併進三二服即止

人參散　治消腎善飲而食後數小便溺者

人參三錢　白朮　澤瀉　瓜蔞
桔梗　梔子　連翹各半兩　葛根
黃芩　大黃　薄荷　白茯苓各一兩
甘草一兩半　石膏二兩　滑石
寒水石各三兩

右爲末入宿砂仁三錢每服五錢水一盞煎至七分入蜜少許再煎三二沸去滓食前食後服消痞丸

大黃甘草飲子　治男子婦人一切消渴不能止者

大豆（五升先煮三沸出淘苦水再煮）　大黃一兩半　甘草大麄者四兩長四指打碎

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糊水少更於豆軟盛於盆中放冷令病人食豆渴食不論無時時食食後消渴如若不止再煮前藥不三

痢門

總論

夫痢者五臟窘毒而不散或感冷物或冒寒暑失饑不能開發久傷冷熱等食更或服暖藥過極鬱化成利自古人三口白利爲寒赤利乃熱其三口悞也今人瘡節初發刺開乃血多日成膿何爲先熱而後寒也

叔和云濕多成五泄腸走若雷奔愚醫不悟三口黃者乃熱胃利是寒太素曰五泄有溏泄驚泄飧泄濡泄滑泄也此乃五泄五泄者青是感肝木之象其色青赤者受心火之氣其色赤白者得西方金肺之氣其色白黃者脾土之色蒼者土氣之下與水隙之其色蒼也三口蒼曰寒黃赤熱其三口非也若下利熱極頻并窘痛或久不愈諸藥不能止者須下之以開除濕熱痞閉積滯而使氣液宣行者宜以逐之兼宣利積熱也

益元散　治身熱吐痢泄瀉腸癖下痢赤白癃閉淋痛利小便偏主石淋（乃腎金石熱藥多待爲砂石從小便淋出者也）腸胃中積聚寒熱宣積氣通九竅六府生津液去留結消畜水止渴寬中除煩熱心躁腹脹痛悶補益五藏大養脾腎之氣（此腎水之藏非爲主之府也）理內傷陰痿安魂定魄補五勞七傷一切虛損主癲痙驚悸（悸驚動貌）健忘止煩滿短氣藏傷咳嗽飲食不下肌肉疼痛并口瘡牙齒痛蝕明耳目壯筋骨通經脈和血氣消水穀保元眞解百

藥酒食邪毒耐勞役饑渴宣熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身注顏延壽及解中暑傷寒疫癘饑飽勞損憂愁思慮恚怒驚恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾并解兩感傷寒能令遍身結滯宣通氣和而愈及婦人下乳催生產後損益血衰陰虛熱甚一切熱證兼吹奶乳癰此神驗之仙藥也惟孕婦不宜服滑胎也

桂府膩白滑石（六兩） 甘草（一兩炙）

右為末每服三錢（當少許） 溫水調下（新蜜亦得） 日三服欲冷飲者新汲水調下解利傷寒發汗煎（蔥白豆豉）湯下四錢（每服水一盞蔥白五寸豆豉五十粒煮取汁一盞調下） 併三服効為度此藥是寒涼解散鬱熱若病甚不解多服此藥無害但有益而無損俗惡性寒兼易得之賤物而不明素問造化之理故不取古人神驗之言而多不用焉若以隨證驗之此熱症之仙藥也不可闕之（傷寒當汗而不可下當下而不可汗者且如表服此藥則汗出自愈熱便得宣通而愈或半在裏半在表可和解而不可發汗吐下者若服吐藥多愈亦獲小効是解或人不敎怖驚邪熱甚者小加減三分同蔥豉煎湯調服） 涼膈散（當汗者更可加和解為佳） 滑石麻黃桂枝（要發汗當卽用甘草一兩） 蒼朮末（在良或孕婦不宜服） 蒼朮（二兩同為末每服四錢水一盞半更加入蔥白五寸豆豉七五枚同煎至六分去滓溫服併三服取微汗為度） 逼毒散（非孕婦可服） 太白散（加人麻二兩去節如法煎服世云神白散） 麻黃蒼朮（各等分去節秤濟散與加） 滑石與蒼朮（二倍） 最為發汗之妙藥也（唯正可汗者卽用此服之則轉加熱也名為） 大通毒散（或解利兩感同更兼煎涼膈散調下） 益元散（四錢或下乳用猪肉麵羹或酒服宜食肉麵羹粥） 催產（以產婦度或死胎不下者煎用溫油漿調服前三一） 承氣湯（一服理下令瘀物盡下後俱下若產母也凡難產或兒胎不下皆由風熱燥澁緊欲結滯不能舒緩是故產戶不得自然開也其藥力至則熱結頓開而產矣慎不可溫補而反生燥熱也俗未知產後日夜損血疼痛怖懼以致神狂氣亂則陰氣損虛邪熱太甚而為諸證由

不明素問造化故不識證候陰陽反以妄為產後諸虛百損便為虛冷而無熱也誤以熱藥溫補或見渴其者不令飲水本為善心為害多矣豈知治病之道俱以臨時審其藏府六氣虛實明其標本如法治之而已矣此藥之用常多而為効至大俗以病異藥同將為妄行反招侮慢今以若加黃丹（研令仁色是以名之） 紅玉散（若加青黛碧色名） 碧玉散（若加薄荷葉一分同研名） 雞蘇散（主療並同但以回避愚俗之妄侮慢耳）

玄青丸 治下痢勢甚頻并窘痛或久不愈諸藥不能止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液宣行者宜以逐之兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水腫腹脹兼療小兒驚痫積熱乳癖諸證唯泄瀉者勿服

黃連 黃蘗 大黃 甘遂 芫花（醋拌炒） 大戟（各半兩） 牽牛（四兩取末二兩） 已上同細末 輕粉（二錢） 青黛（一兩）

右為末水丸小豆大初服十丸每服加十丸空腹日午臨卧三服以快利為度後常服十五二十丸數日後得食久病未痊除者再加取利利後却常服以意消息病去為度後隨證止之小兒丸如黍米或麻子大退驚痫熱積不下者須常服十丸

阿膠梅連丸 治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸證

金井阿膠（淨草灰炒透明白別研不細者再炒研細） 烏梅肉（去核） 黃連（炒） 當歸（焙）

赤芍藥 乾薑（炮） 赤茯苓（半兩各等分） 黃蘗（炒） 黃連

右為末入阿膠研勻水丸桐子大溫米飲下十丸食前兼夜五六服小兒丸如菉豆忌油膩肥諸物也

牛黃神金丸 治大人小兒嘔吐瀉痢無問久新赤白諸色或渴或不渴小便澁或不澁并小兒驚痫痰癖堅積脹滿硬痛作發往來亦能寬腸消食

輕粉 粉霜 硇砂（以上別研） 雄黃（研） 珠砂（三錢） 蠟

右先研粉霜次旋入硇砂研細下雄黃珠砂信砒再研下丹粉研勻別研芭豆爛為油與前藥研勻近火上炙控熱別研蠟軟入藥勻搓作劑旋丸小豆大新水下一丸小兒黍米麻子大或止吐瀉痢疾調甘露散（是桂苓甘露飲） 或益元散亦得

芍藥蘗皮丸 治一切濕熱惡痢頻年窘痛無問膿血並宜服之

芍藥 黃蘗（各一兩） 當歸 黃連（各半兩）

右為末水丸如小豆大溫水下三四十丸無時兼夜五六服忌油膩肥發熱等物

勝丸 治泄痢虛損不問久新者

鹽豉 紫蒜（去皮各等分）

右同杵為膏丸如桐子大每服三丸至五丸米飲湯下如未愈及赤白痢腹滿脇痛更與杏仁丸

杏仁丸 治一切赤白瀉痢腹痛裏急後重者

杏仁（四十九箇） 巴豆（四十九箇去皮）

右以藥同燒存性研如泥用蠟鎔和旋丸如桐子大每服一二丸煎大黃湯間日一服

白朮散子 治一切瀉痢久不瘥并婦人產後痢亦治

御米殼（二兩蜜炒） 當歸 肉豆蔻 縮砂仁 石榴皮 訶子 乾薑（炮） 陳皮（去白） 白朮 甘草 芍藥（各等分）

右為細末每服二錢水一大盞入乳香同煎和滓服

勝金膏 治一切泄瀉痢不已胃脈浮洪者反多口不

已者微小者立止

巴豆皮　楮實葉同燒存性

右爲末鎔蠟丸如菉豆大每服五丸煎甘草湯下

大聖金眞散　治一切寒熱赤白溏泄等痢疾

御米殼半斤炒　甘草一兩炙　乾薑半兩炮　當歸一兩

醋石榴皮一兩炒　陳皮去白　白茯苓去皮

右爲末每服二錢水一盞小兒半盞乳香同煎至七分食前忌油膩生冷毒物等

車前子散名斷痢散能治一切痢不止

車前子不以多少炒香

右爲末每服二錢米飲調下食前空心

象骨散　治脾胃虛弱心腹脹滿水穀不消噫氣吞酸食輒嘔吐霍亂泄瀉膿血四肢沉重臍腹疼痛裏急夜起頻併不思飲食皆可治之

象骨四兩炒　訶子取肉二兩　肉豆蔻一兩　枳殼一兩

甘草二兩　乾薑半兩

右爲末每服三錢水一盞半煎至八分和滓熱服食前日三服

海蛤玉粉散　治血痢解藏中積毒熱

海蛤不以多少

右爲末每服二錢入蜜少許冷水調下不計時候

宣明論方卷十終

黃帝素問宣明論方卷十一

金　河間劉完素著　江陰朱氏校刊本

婦人門

總論

素問曰日得血而能視耳得血而能聽指得血而能攝掌得血而能握足得血而能步藏得血而能液腑得血而能氣然血所通流則氣亦然也氣血宣行其中神自清利而應機能用矣故

素問氣血人之神也不可不謹調護然婦人以血藏爲基本也夫婦人之病手太陽足少陰小腸心之經絡爲裏表起自任衝之脈於經脈之下以上毛際循腹裏關元上至咽喉頤循面目過帶脈貫臍而止以婦人月水一月一來如期謂之月信其不來則風熱傷於經血故血在內不通或內受邪熱脾胃虛損不能飲食食既不充榮衛凝澁肌膚黃燥而不光澤或大腸虛變爲下痢流入關元致絕子嗣爲子藏冷虛勞損而病帶下起於胞內　夫帶下之造化但分經絡標本殊異爲病之本氣也其病所發正在過帶脈之分而淋瀝以下故曰帶下也赤白之說者無定也法曰頭目昏眩口苦舌乾咽喉不利小便赤色大小便秘澁滯脈實而數者皆熱證也凡白帶下者亦多有之爲病寒豈能然素問亢則害承迺制謂亢過極而反兼已勝之化制其甚也則如火煉金熱極則反化爲水及六月熱極則物反出液而濕潤林木流津故肝熱則出泣心熱則出汗脾熱則出涎肺熱則出涕腎熱甚則唾　大凡俗論已煎熱湯煮極則沸溢及熱氣重蒸於物而生津液也故下部任脈濕熱甚者津液涌而溢已爲帶下見俗醫白帶下者但依

方論而用辛熱之藥雖有誤中致令鬱結熱聚不能宣通舊病轉加世傳誤之久矣

人參白朮散　治徧身燥濕相搏玄府緻密遂令忪悸發渴飲食減少不爲肌膚

人參三錢　白朮七錢　薄荷半兩　縮砂仁三錢
生地黃　茯苓去皮　甘草各半兩　黃芩一錢
滑石三兩　藿香三錢半　石膏一兩

右爲末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前日進二三服

白朮湯　治妊娠血液虛衰羸弱難以運動氣滯肉麻榮衛不能通宣常服養液潤燥開通結滯令血昌盛

白朮三兩　寒水石　當歸　黃芩
芍藥　人參　石膏
防風　縮砂　藿香
茯苓一兩　木香一庶

崔宣武方用白虎一兩

右爲末每服三錢水一盞生薑三片同煎五六分去滓溫服食前日三服

二氣湯　治月水不調斷絕不產面黃肌瘦虛不美食有燥熱以柴胡飲子相參服之

大黃四兩別爲末醋一升煙火熬成膏子　當歸二兩　白芍藥二兩

右爲末以膏子和丸如桐子大每服二十丸淡醋湯下食前日進三服如月水不通加人乾漆三錢炒出火　沒藥半兩
硇砂三錢不可生用則吐瀉　官桂二錢　斑蝥三錢去翅足炒熟取末半云此用熱

當歸龍骨丸　治月事失常經水過多及帶下淋瀝無問久新赤白諸證并產後惡物不止或孕婦惡露胎

痼動不安及大小兒痢瘧並宜服之

當歸　芍藥　黃連　桑螵蛸
艾葉炒各半兩　龍骨　黃蘗各一兩　茯苓半兩
木香一分

右末滴水爲丸如小豆大溫米飲下三四十丸食前日三四服

當歸人參散　治產後虛損羸弱難以運動疼痛胸滿不思飲食

當歸　白朮
大黃　茯苓去皮
黃耆剉　川芎
甘草一兩　枳殼四錢去穰炒

右爲末每服三錢水一盞生薑三片煎至六分去滓不計時候溫服如大便閼以此散下和中丸

增損四物湯　治月經不調心腹疼痛補血臟溫經注顏

當歸　芍藥　黃芩
白朮　牡丹皮各半兩　地骨皮一兩　陳皮各半兩　人參
川芎　熟地黃　厚樸去皮姜製　官桂各三錢

右爲末每服五錢水一盞煎至六分去滓溫服食前

當歸川芎散　治風壅頭目昏眩痛悶筋脈拘倦肢體麻痺保護胎氣調和榮衛

當歸　川芎各半兩　甘草二兩　黃芩四兩
薄荷一兩　縮砂仁一分

右爲末溫水調下一錢漸加至二錢食後日進三服

辰砂大紅丸　治產後羸熱運悶血氣塊硬疼痛不止

硃砂一兩一半入藥一半爲衣　附子炮　沒藥半兩
海馬半錢　乳香　蓯蓉　肉桂

玄胡　薑黃　硇砂各半兩　斑蝥一分

生地黃一兩

右爲末酒煮麵糊爲丸如酸棗大每服一丸煎當歸酒下放溫經水不行煎紅花酒下

三聖散　治產後下血痢不止

烏魚骨炒　燒綿灰　血餘灰汗瘕者各等分

右爲細末每服煎石榴皮湯調下熱服一錢

沒藥丹　治產後惡血不下月候不行血刺腰腹急痛或一切腸垢沉積堅滿痞痛作發往來或燥熱煩渴喘急悶亂肢體疼倦大小人心腹暴痛孕婦自利惡物過多不宜服燥熱極甚血液衰竭不可強行宜調氣養血細詳證用

沒藥一錢　當歸　大黃一兩　牽牛二兩
輕粉一錢　官桂一分已上同研末　硇砂一錢同研

右研勻醋麵糊爲丸如小豆大每五丸至十丸溫水下以快利取積病下爲度雖利後病未痊者後再加取利止心腹急痛煎乳香下未止取大便利

黃藥子散　治月事不止煩渴悶亂心腹急痛肢體困倦不美飲食

黃藥子　當歸　芍藥　生地黃
黃芩　人參　白朮　知母
石膏各一兩　川芎　桔梗各一分　甘草一兩
紫菀　槐花子　柴胡各一分

右爲麄末炒三錢水一盞煎至七分濾汁溫服食前但一服

大延胡索散　治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛

延胡索　當歸　赤芍藥　京三稜
川練子　蓬莪朮　官桂　厚樸
木香　川芎各一分　桔梗　黃芩
大黃各半兩　甘草一兩　檳榔一錢
右爲末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食前日三服惡物過多去大黃官桂加入黃藥子染槐子龍骨各半兩如前法或平人心胃急痛如本方前服得利尤好

枳實檳榔丸　治安養胎氣調和經候癥瘕痞塊有似姙孕可以久服血氣通和兼寬膈美食
枳實　檳榔　黃連　黃蘗
黃芩　當歸　木香各半兩　阿膠炒細研
右爲末水和丸如小豆大溫米飲下三十丸不計時候日進三服

軟金花丸　治心胸腰腹急痛或淋病并產前後經病刺痛乾嘔氣勞往來寒熱四肢困倦夜多盜汗者兼治血積食積
當歸半兩焙　乾漆二錢生　輕粉　斑蝥生全用爲末
硇砂　粉霜　巴豆二錢去油
右爲末同研細棗肉爲膏旋丸如菉豆大每服一丸新水下病甚者加服看虛實

大紅花丸　治婦人血積聚癥瘕經絡注滯
川大黃　紅花各二兩　䗪蟲十箇去翅足
右取大黃七錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每服五七丸溫酒下食後日三服

黃芩湯　治婦人孕胎不安
白朮　黃芩各等分

右爲末每服三錢水二盞當歸一根同煎至一盞稍溫服

海蛤丸　治婦人小便濁敗赤白帶下五淋臍腹疼痛寒熱口乾舌澁不思飲食
海蛤　半夏　荒花炒　紅娘子去翅足
訶子炒　玄胡索　川練子麩裏
煅去皮　茴香炒各一兩　乳香三錢　硇砂半兩
硃砂半兩爲衣　沒藥各一兩研　當歸一兩半
右爲末醋煮麵糊爲丸如小豆大每服五丸至十丸醋湯下量人病虛實加減

烏金散　治婦人諸疾寒熱頭痛一切等疾
烏金子　肉桂　蒲黃　當歸
䗪蟲　血餘灰　水蛭　鯉魚灰
木香　青皮
荒花三兩醋浸　巴豆一錢出油
紅花一兩　川烏頭半兩　硃砂少許　棕皮灰
右爲末每服半錢加至一錢煎生薑湯調下空心食前忌油膩物

伏龍肝散　治婦人血崩不止或結作片者
芎藭一兩　生地黃一分　阿膠八錢炙　當歸一兩
續斷一分　地榆　刺薊根一兩　伏龍肝七錢
青竹茹八錢
右爲末每服三錢水一盞半煎至一盞溫服日五服不計時候後服補藥

阿膠丸
阿膠　鱉甲六分　續斷五分　龍骨一兩
芎藭六分　地膽四分　鹿茸五分　烏魚骨八錢
丹參六錢　龜甲一錢
右爲末醋麵糊爲丸如桐子大每服三十丸艾湯下日進三四服

麝香杏仁散　治婦人陰瘡
麝香少許　杏仁不以多少燒存性
右爲細末如瘡口深用小布袋子二箇盛藥滿裹口臨上藥炙熱安在陰內立愈

硃砂斑蝥丸　治婦人產後喫硬食變作血氣食塊無問久新
皂角末二錢　巴豆四箇去油　硃砂一錢　硇砂一塊
乾蝎一箇全　斑蝥十箇　紅娘子五箇
水蛭三箇
右爲細末蜜和丸分作十五丸每服一丸至二丸三丸溫酒下初更喫平明取下血化水十年之病皆治之或大便或小便不多出也

黃帝素問宣明論方卷十一終

黃帝素問宣明論方卷十二

江陰朱氏校刊本
金 河間劉完素著

補養門

補養寒論

素問云諸寒收引皆屬於腎腎者少陰也少陰者至陰也至者爲極也少陰者冬脈所旺居北而屬水爲寒爲歸藏爲周密寒中收引拘縮寒之用也其病上下所生水澄徹冷清者不濁其氣寒冷水穀不消化吐利清冷爲病則如天氣寒而水自清也

素問云太陽受寒血凝爲瘕太陰受寒氣聚爲疝但脈急而寒之象也急主於痛故緊急也又內經云數則爲熱遲則爲寒諸陽爲熱諸陰爲寒脈當遲緩寒毒內鬱洪數爲[illegible]加養心之脈也寒氣生清水清就於濕故以下利清白此乃腸胃寒化物失常熱則痿澁不通寒勝則火衰火衰金旺吐利腥穢脂者金肺之屬也熱則酸寒則水腥只如四肢逆冷堅痞腹滿脹伸不便禁固戰慄謂陰水主之舒倦不便診其脈沉伏而遲病之證也若身涼不渴而寒踡足而卧惡聞人聲不欲言皆陰證也陰陽停則和偏則病如陽氣暴絕陰氣獨勝則爲寒證陰氣暴絕陽氣獨勝則爲熱證

經曰陽盛陰虛汗之而死陰勝陽虛下之而死若陽實外熱陰虛內寒陰實內熱陽虛外寒陽實伐其陽當涼膈散承氣湯主之陰實伐其陰當白朮散四逆湯主之

論曰

大凡治病必求標本受先者爲本次者爲標此爲兼證故知逆與從正行無問知標本者萬舉萬當不知標本者是謂妄行也本病相傳先以治其急六氣爲本三陰三陽爲標故病氣爲本受病經絡藏府謂之標也

補養類

防風當歸飲子　治脾腎眞陰損虛肝心風熱鬱甚陽勝陰衰邪氣上逆上實下虛怯弱不耐或表熱而身熱惡寒或裏熱而躁熱煩渴或邪熱半在表半在裏進退出入不已而爲寒熱往來或表多則惡寒裏多則發熱或表之陽分陽和正氣與邪相助并甚於裏畜熱極深而外無陽氣裏熱極甚陽極似陰而寒戰腹滿煩渴者或裏之陰分正氣反助邪氣并甚於表則躁熱煩渴而汗出也或邪熱壅塞者或煩熱痛者或熱結極甚陽氣不通而反覺冷痛或中外熱鬱煩躁甚喜涼畏熱者或熱極閉寒不得宣通陽極似陰中外喜熱而反畏寒者或躁熱煩渴者或濕熱極甚而腹滿不渴者或一切風熱壅滯頭目昏眩暗風眼黑偏正頭疼口乾鼻塞耳鳴及蟬咽喉不利或目赤腫痛口瘡舌痺或上氣痰嗽心脇鬱痞腸胃燥澁小便淋閉或是皮膚瘙痒手足麻痺又或筋脈拘急肢體倦怠或渾身肌肉跳動心悸驚悸或口眼喎斜語言蹇澁或狂妄昏惑健忘失志及或腸胃燥熱怫鬱而飢不欲食或濕熱內餘而消穀善飢然能食而反瘦弱或誤服燥熱毒藥及妄食熱物過多而耗損脾腎則風熱鬱甚而多有如此不必全見也無問自病及中燥熱毒藥所使者並宜宣通氣血調順飲食久服之舊病除去新病不生設虛人常服補益功驗自可知矣

當歸　大黃　柴胡　人參　黃芩　甘草炙　芍藥各一兩　滑石六兩

右停每服三錢至五錢水一大盞生薑三片同煎至七分去渣溫服　補校此方未爲至當恐當時傳寫之誤

雙芝丸　治補精氣塡骨髓壯筋骨助五臟調六腑久服注顏不老

熟乾地黃焙取末　石斛去根酒炙　五味子搗　黃耆剉　肉蓯蓉酒浸　牛膝酒浸　杜仲蜜水浸炮　兎絲子酒浸三日炒　麋鹿角霜半斤　沉香三錢　麝香二錢研　人參　白茯苓去皮　覆盆子　乾山藥　木瓜　天麻酒浸　秦艽各二兩　薏苡仁二兩炒

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服二十丸至三四十丸溫酒下鹽湯米飲亦可凡年五十歲已上加入黑附子以煮爛搗泡鹿角一大對去頂三指　硫黃半斤潭用以上用些油釜中以水同煮令微沸勿大急甚水耗只旋添溫水須用水以備添也煉令角膠汁出盡其角如霜以手捻如膩粉乃盛之取用勿令穢汚也

內固丹　治諸補養腎氣調和脾臟壽高者常服筋骨勁健渾如壯士

肉蓯蓉酒浸　茴香炒各一兩　破故紙　葫蘆巴炒　巴戟去心　黑附子炮　川練子　胡桃仁各四兩麵炒

右爲末研桃仁爲膏餘藥末和勻酒麵糊爲丸如桐子大每服十丸至三十丸溫酒鹽湯下食前虛者加至五七十丸此藥明目補腎烏鬚進美食空心

大補丸　治男子脾腎不足不問久新者

陳韭子　陳蘿蔔子巳上炒兩　熟仁去皮各半　川山甲七片用酒炙　麝香少許

右爲細末用蜜和丸如櫻桃大每服一丸溫酒送下食前空心

蛤蚧散 治脾胃氣攻心刺痛者

蛤蚧一對酒炙 乳香 木香 白茯苓 丁香 茴香各一錢 川山甲二錢

右爲細末每服一錢好溫酒調下空心食前

金鑠丹 治男子本藏虛冷夜夢鬼交者

龍骨水飛 兎絲子一兩 破故紙 澤瀉 牡蠣各半兩 麝香少許

右爲末酒麪糊爲丸如桐子大每服三十丸溫酒下空心食前日三服

調中丸 治脾胃虛止嘔吐寬利胸膈

青皮 紅皮各一兩 大黃一兩 牽牛三兩

右爲細末滴水和丸如桐子大每服三十丸溫水下空心食前

水中金丹 治元藏氣虛不足夢寐陰人走失精氣

陽起石研 木香 乳香研 青鹽各一分 茴香炒 骨碎補炒 杜仲各半兩去皮生薑炙絲盡

白龍骨一兩紫者槌碎絹袋盛取出焙乾研 黃戍腎一對酒一升煮熟切作片焙 入白茯苓一兩與腎爲末

右爲細末酒麪糊和丸如皂子大每服二丸溫酒下空心忌房室

和氣地黃湯 治沉積氣結不散調營榮衛補順陰陽常服以代湯茶酒果

木香一字 揀桂去皮 茯苓去皮 白芥子各一 白茅 乾山藥 川芎 當歸各一分焙 桂花 縮砂仁各半錢 甘草半兩炙

黃帝素問宣明論方

右爲細末入麝香少許研勻用數重油紙或蠟罐內密封起每用蜜二斤餳飴一斤溫好甜水五升化勻開抄前藥并杏仁十枚去皮尖洗淨炒香熟搗碎濕地黃根許切長寸約取汁半盞溫服

白茅調中湯 治中寒痞悶急痛寒濕相搏吐瀉腹痛上下所出水液澄徹清冷殺不化小便清白不澁身涼不渴本末不經有見陽熱證其脈是者是也此因飲食冷物過多陰勝陽者而爲中寒也或冷熱相雙而以陽氣怫鬱不能宣散怫熱內作以成熱證者不可亦言爲冷當以脈證別之夫濕熱吐瀉常見陽脈若亡液氣虛亦能反見諸陰脈也當以標本之不可治或熱證誤服此白茅調中湯溫藥亦能開發陽氣一通而愈別無加害無問寒熱久新並宜服之或有口瘡目疾孕婦等吐瀉者以畏乾薑官桂不服

白茅 茯苓去皮 紅皮去白 澤瀉各半兩 乾薑炮 官桂去皮 縮砂仁 藿香各一分 甘草一兩

右爲末白湯化蜜少許調下二錢每日三服煉蜜和就每兩作十丸名白茅調中丸小兒一服分三服

人參白茅散 此方證同調中湯治法

人參 白茅 茯苓 甘草 橘皮 葛根 澤瀉 滑石 藿香各半兩

右爲末每服三錢水一盞煎至六分溫服姙婦加蒼茅三五片熱服

白茅散 治傷寒下後餘熱以藥下之太過胃中虛熱飲水無力也當生胃中津液多服此藥

人參 白茅 木香 甘草 藿香葉 乾葛剉各一兩 白茯苓

右爲末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服如飲水者多煎與之無時也

丁香附子散 治脾胃虛弱胸膈痞結吐逆不止

附子一兩 母丁香四十九箇 生薑半斤取自然汁半碗

右用附子鑽孔四十九以丁香刺上面塡內將生薑汁用文武火熬盡又用大蘿蔔一箇取一穴子入附子又塡內將蘿蔔蓋之又用文武桑柴火燒香熟爲度取出切附子作片子焙乾搗爲細末每服一錢米湯一盞調下日進三服

何首烏丸 治男子元臟虛損髮白再黑塡精

何首烏半斤 肉蓯蓉六兩 牛膝四兩

右將何首烏半斤用棗一層何首烏一層內蒸棗軟用切焙同爲末棗肉和丸如桐子大每服五七丸嚼馬練子服酒送食前一服加一丸日三服至四十丸即止都減至數効如神妙

煖腎丸 治男子腰膝疼夜多小便者

川練子 馬練花 茴香炒各分分 破故紙 葫蘆巴

右除茴香外四味酒浸同爲末煮麵糊爲丸如桐子大每服十丸至二十丸溫酒下空心食前

神仙楂實丸 治積冷氣衝心胸及背有蛔蟲疼痛痔瘻疼癖氣塊心腹脹滿兩肋氣急食不消化上逆氣奔於心并痛氣下墜飲食不得吐水嘔逆上上氣咳嗽眼花少力心虛健忘冷風偏風等疾坐則思睡起則頭眩男子冷氣腰疼膝痛冷痺風痛陰汗盜汗夜多小便洩利陽道衰弱婦人月水不通小便冷痛赤白帶下一切冷疾無問大小能明目益力輕身補髓益精

楮實子 升淘去泥微炒 官桂四兩去皮 牛膝半斤酒浸

乾薑炮三兩

右爲末酒麪糊爲丸如桐子大每服二十丸溫酒空心食前鹽湯亦得

補中丸　治一切氣疾心腹疞痛嘔吐氣逆不思美食

厚樸生薑製香　乾薑炮　陳皮去白　白茯苓去皮　甘草炙紫各等分

右爲末煉蜜爲丸如櫻桃大每服一丸空心白湯化下細嚼亦得

茱萸茄丸　治中焦痞塞氣逆上攻心腹疞痛吐逆下痢臭穢

茱萸茄半兩　良薑二兩　神麯炒　官桂去皮各一兩　阿魏半兩醋麪裹煨熟　青皮去白

右爲末醋麪糊爲丸如桐子大每服二十丸生薑湯下不計時候

黃帝素問宣明論方卷十二終

金　河間劉完素著

諸痛門

總論

夫痛者經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲血泣凝而不行客於脈外血少客脈中氣不通故卒然而痛其痛者卒然而止或痛甚而不休或痛甚而可按或按之而痛止或按之而無益或喘痛動應手或與心背相引而痛或脇肋與少腹相引而痛或腹痛或引陰股宿昔而成積或卒然而痛死不知人而少間復生或痛而閉不通者諸痛各不同形經曰寒氣客於脈外則脈寒脈寒則踡縮踡縮則脈絀音脈絀急則外引小腹衛氣不得通流故卒然而痛得炅則痛止寒氣客於經脈之中相薄則脈滿滿則血氣亂故痛而不可按寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小腹急引故痛按之血氣散痛乃止也脇肋痛者寒氣客於厥陰之絡脈也背與心相引痛者寒氣客於背俞之脈注於心相引痛寒氣客於陰股血泣在小腹相引痛卒然而痛死者寒氣客於五臟厥逆上塞陰氣竭陽氣未入故卒然痛死氣復反則生矣視其五色黃赤爲熱白青則爲寒青黑爲痛經曰感虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱則骨弛肉消但痛痒瘍癰疽腫血聚者皆屬心火熱也不可一例傷寒凡治痛者先察本次明經絡皮部虛實用藥無悞矣

神砂一粒丹　治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

附子一兩炮　鬱金　橘紅

右爲末醋麪糊爲丸如酸棗大以硃砂爲衣每服一

丸男子酒下婦人醋湯下服罷又服散子

神聖代鍼散

乳香　沒藥　當歸　香附芷　川芎各半兩　元青一兩去足翅

右爲細末更研每服一字病甚者半錢先煎好茶一盞次搐藥末在茶上不得吹揚立地細細急呷之心驚欲死者小腸氣搐得如角弓腸胞脾硬一切氣刺虛痛并婦人血癖血迷血虛血刺血衝心胎衣不下難產但一切痛疾服之大有神効只是要詳疾證用藥

茴香丸　治男子婦人臍腹疼痛刺胸脇不止者

茴香炒　良薑　官桂各半兩　蒼朮一兩泔浸

右爲末酒煮麪糊和丸如桐子大每服十丸生薑湯止痛溫酒下空心食後

趙廟丸　治一切走注疼痛婦人經脈往滯水硃服服

甘遂　大戟　芫花　黑牽牛各等分

右爲末以醋麪同末和作餅子扞切爲棋子焙熟服之得利爲度每服一錢加減相虛實

六合散　治一切燥結汗後餘熱宜轉不通亦名金鑰匙散并治小腸氣結心腹滿胸中結癖走注疼痛

大黃熟搗紙包煨　白牽牛半兩生　黑牽牛炒取末　甘遂各半兩

檳榔生半兩　輕粉一錢

右爲細末每服一錢蜜水調下服量虛實加減

定痛丸　治打撲損傷筋骨疼痛等如打撲骨損者先整骨定用竹夾然後先用好酒下麻黃三錢然後服藥大効

乳香一分　川椒　當歸　沒藥

赤芍藥　川芎　自然銅　玄胡

右爲末鎔蠟爲丸如彈子大細嚼酒下一丸骨碎者先用竹夾夾定三五日依藥小可與服

香殼散　治小腸氣腨腹攪痛急陰股中疼悶不省人事

茴香炒　枳殼各一兩　沒藥半兩

右爲末每服一錢溫熱酒下不計時候併二三服

金鐵丸亦名陸神丸　治陽絕痞氣心腹不忍者

丁香　木香　乳香　阿魏

輕粉　骨碎補去毛　檳榔　官桂

桂心　巴豆去皮　杏仁去皮　不灰木

肉豆蔻　陽起石　硃砂各等分

右爲細末水麪糊爲丸如小豆大每服一丸針穿作孔子小油內滾過燈焰內燎遍於油中熬死嚼生薑下不計時候日三服虛實加減

一粒金丹　治腰膝走注疼痛如虎嚙

草烏頭　五靈脂各一斤　木鱉子四兩　白膠香半斤

地龍四兩去土炒　細墨一兩　乳香一兩　當歸二兩焙

沒藥二兩　麝香一錢

右爲末再研一千下糯米麪糊和丸如桐子大每服一丸至二丸溫酒下與藥罷遍身微汗者驗

沒藥散　治一切心肚疼痛不可忍者

沒藥　乳香各三錢別研　川山甲五錢炙　木鱉子四錢

右爲細末每服半錢一錢酒大半盞同煎溫服不計時候

痔門

痔瘻總論

夫腸風痔病者所發手太陰手陽明經以應動脈謂肺與大腸爲表裏主爲傳道以行糟粕腸風痔病有五種其證亦異蓋因陽氣虛而玄腑疎風邪乘而熱自生風濕邪熱攻於腸中致使大便澁而燥熱鬱血熱散而流溢衝浚腸裏故以先血後便熱在下先便後血熱在上血後便久而不愈乃作痔

素問云因而飽食筋脈橫解房室勞傷腸癖爲痔風熱不散穀氣流溢傳於下部故令肛門腫滿結如梅李核甚者而變成瘻也五臟切宜保養勿令受邪

荊穀丸　治濕熱內甚而飽食腸癖成痔久而成瘻速服悉愈之

木香　黃蘗各三錢　枳殼去穰炒　厚樸各半兩

黃連一兩　蝟皮燒一箇　當歸焙　荊芥穗炒

右爲末麪糊爲丸如桐子大每服二三十丸溫水食前日三服

槐藤子丸　治腸風濕血濕熱內甚因爲諸痔久而不治乃變成瘻

黃耆　枳殼　槐花　荊芥穗

鳳眼草各二兩　槐藤子一對炙　皂子三箇炙

右爲細末麪糊爲丸如桐子大每服二三十丸空心酒下米飲亦得忌油膩冷豬魚臭血物等

烏荊丸　治腸風痔疾大腸閼澁

川烏頭二兩炮　荊芥穗四兩

右爲末醋麪糊爲丸每服二三十丸如桐子大溫水下日三服

黃耆葛花丸　治腸中久積熱痔瘻下血疼痛

黃耆　葛花　黃赤小豆花各一兩

大黃　赤芍藥　黃芩　當歸各三分

蝟皮一箇炙　槟榔　生地黃焙一兩

白蒺藜炒各半兩　皂角子仁

右爲末煉蜜和丸如桐子大每服二十丸至三十丸

旅桑白皮湯下食前槐子煎湯下亦得

黃連散　治腸風下血疼痛不止

雞冠花　黃連　貫衆　川大黃

烏梅各一兩　甘草三分炙

右爲末每服二錢用溫米飲調下日三服不計時候

乳香沒藥散　治五種腸風痔瘻無問久新

宣黃連　白蘞各一兩　穀精草半兩　石榴皮一箇

子割下蓋子裏面取子三停一停次將黃連白蘞碎內入石榴內用元蓋子合用

右以濕紙一張裹了後用膠泥拍作餅子裹石榴以炭火燒通赤爲度取出去泥紙次將穀精草於銚子內炒焦黃爲度與石榴研細後入麝香一錢乳香二錢沒藥一錢研細拌勻每服一錢熱酒小半盞調下日三服

木香厚樸湯　治痔瘻脫肛腸冒間冷腹脇虛脹不思飲食

木香　桃仁　陳皮

厚樸各一兩　桂心　肉豆蔻　赤石脂各半兩　皂角子三兩去皮子醋炙黃　大附三分炮

右爲末每服二錢溫粥飲調下食前

瘡門

瘡疾總論

素問云痿瘡皆生於風其蓄作有時何氣使然夫陰陽

上下交爭虛實相移也陽併於陰陰實陽虛寒慄鼓頷
[illegible]熱氣藏於皮膚之內腸胃之外腠理開
[illegible]氣得出迎風得之與衛氣併衛氣晝行陽夜行陰
氣得陽外出得陰內薄外內相薄是以日作也　其有
間日者氣深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭
不得出是以間日作也其作寒與早者邪氣客於風府
循脊而下衛氣一日一夜大會於風府其日下一節先
客於脊背每至風府則腠理開腠理開邪氣入邪氣入
則病作矣也

夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷寒而後傷風故曰先
寒而後熱名曰寒瘧先傷於風後傷寒故曰先熱而後
寒名曰溫瘧其熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨勝少氣
煩冤手足熱欲吐名曰虛瘧有餘則瀉不足補熱為有
餘寒為不足已得火不能溫熱已水水不涼氣陰勝併
於陽陽勝併於陰陰勝則寒陽勝則熱　瘧者陰陽風
寒虛實邪氣不常之所作也

辟邪丹　治嵐障鬼瘧食瘧併月頻日者

菉豆　雄黑豆各四十九粒　信砒半錢別研
黃丹一錢為衣　硃砂二粒

右為末同人乳鉢內滴水為丸分作三十粒每服一
粒已用取東南桃心取七枚研汁將井花水早辰日
欲出不出向日吞之醋湯亦得已發日服

斬邪丹　治諸般瘧疾無時不止者

菉豆　小豆三十粒口退皮再入　硃砂　信砒各一錢

右為末同研細滴水和丸勻分作十丸每服一丸已
早辰服夜間於北斗下香水獻至早晨用新倒流水

送下

斷魔如聖丹

信砒一錢　蜘蛛大者三箇　雄黑豆四十九粒

右為末滴水和丸如豌豆大如來日發於今晚夜北
斗下獻於早晨已紙裹於耳內扎一丸立見愈神聖
一粒可醫三人

辰砂丸　治一切脾胃虛瘧邪熱毒者

信砒　甘草各一錢　硃砂二錢　大豆四十九粒

右為末滴水和丸勻分作四十丸服發日早晨日欲
出煎桃心湯下忌熱物

瘧神丹　治諸般瘧疾

信砒一兩　雄黃一錢

右以於五月重五日用鏤子尖拌勻研三千下日未
出不令雞犬婦人見丸如桐子大未發前一日向東
冷水下一丸

趂鬼丹　治一切瘧疾神效

信砒一錢　大豆七錢　雄黃　輕粉
荷葉各半錢　甘草少

右為末滴水為丸如小豆大重午日未出不見雞犬
婦人修合每服一丸無根水下平日夜觀北斗夜日
服忌熱物

黃帝素問宣明論方卷十三終

金　河間劉完素著

眼目門

眼科總論

素問云目得血而能視手得血而能握其證足厥陰之經絡所主肝臟受虛而即補腎實而即瀉心　夫人之眼目者似天地之日月也若人無雙目豈能別辯賢愚天無日月萬物安能照耀是以眼通五臟氣貫五輪外應肝候肝臟虛而風邪鬱風邪鬱而熱蘊衝火炎上行故攻目昏澁澁疼痛赤絲皆發榮衛實則能視榮衛虛則昏暗凡人多飡熱物或嗜五辛坐濕當風夜寒目者將息失度皆喪目之源也

黃連膏　治一切眼目瘡肉攣睛風痒淚落不止

樸硝凡斗以水半斗淘淨去土澄乾用　黃連半斤　白下香五升

以水一斗淘淨去土攪細用

右取水八硝香釜內熬至七分淘出令經宿水面淨牙者取出挖乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連細末熬清汁曬乾硝用猪羊膽和加蜜妙點之效矣

滌昏膏　治一切風眼疼痛不可忍者洗之妙矣

好崖蜜一斤　黃連一兩色　沒藥半兩　黃丹一兩炒紫

右入蜜同熬黑煎黃連成稠汁入二味藥內煎熬稠更入沒藥末同熬數沸濾去滓洗甚妙後更用通天散嚏鼻

通天散　治偏正頭疼并夾腦風通一切壅滯明目

赤芍藥　川芎　黃連　黃芩

玄胡索　草烏頭　當歸　乳香別研各等

右爲細末每用少許紙撚子蘸藥任之鼻嚏神効

神芎散　治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞眼昏并牙齒悶痛

川芎　鬱金各二錢　荊芥穗一分　薄荷葉一分

盆硝二錢　紅豆一錢各爲細末後入盆硝

右研勻鼻內嚏三兩刺耳力慢加藥病甚者兼夜嚏之凡熱多風少隨證選用諸藥

金絲膏　治一切目疾昏暗如紗羅所遮或疼或痛

宣黃連半兩剉碎水一盞浸一宿取汁再添水半盞浸淬經半日許取汁與前汁和別用火半盞以青鹽代之　白礬一錢研　井鹽一分如無蜜一兩　山梔子二錢好者搗碎黃連淬同煎黃連汁一處入餳藥五十沸取盡汁子濾去滓與

右用銀鐺器內同熬十餘沸用生絹上細紙數重再濾過用時常點

白藥子散　治一切肺眼赤爛目生翳膜內外瘴疾并小兒吐痢

白藥子一兩　甘草半兩

右爲末用猪肝一葉批開糝藥五錢水一大盞煮熟食後服

胡黃連散　治一切久新赤目疼痛不能坐卧并大小人口瘡

胡黃連　檳榔各半兩　麝香少許別研

右爲細末研細點之如口瘡每服半錢麝香一字勻口瘡大小貼之忌食魚猪油膩物

碧霞丹　點一切惡眼風赤者

龍腦　麝香　硇砂各二錢　血竭

沒藥　乳香　銅青各一錢　硇砂三錢

右爲末滴水和丸如桐子大每服一丸新水化開點之立効

菩薩散　治遠年近日一切眼疾

菩薩石　金精石　銀精石　太陰石

太陽石　禹餘石　河洛石　礬礪石

雲母石　盧甘石　井泉石　白滑石

紫英石　寒水石　陽起石　猪牙石

代赭石　碧霞石　烏魚骨　青鹽各二兩

硇砂半兩　蜜陀僧一兩　銅青一兩　黃丹四兩

麝香　腦子一錢　輕粉半錢　硇砂三錢

雄膽一斤　白砂蜜二斤

右爲細末以井花水丸大碗熬就作四碗點水內落下錢許大不散可如散者再熬濾淬過露旋點

石膏羌活散　治久患雙目不覩光明遠年近日內外氣障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活治腦熱頭風清利頭目細辛　蜜朦花治羞明怕日　乾菜子二味起倒睫　木賊退翳障

香白芷清利頭目　甘菊花

蔥子起拳毛　川芎治頭風　茺蔚子明目明目又水軟心　黃芩退熱

荊芥穗治目中生瘡　甘草解諸藥毒各等分

藁本治偏頭痛偏正　石膏二味

右爲末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水一盞調下或茶清或淘米第二遍泔亦得日進三服至十日漸明服至二十日大驗此方醫數十餘人矣

重明散　治一切風熱內外障氣眼疾

川獨活　川羌活　吳茱萸

仙靈脾　防風　甘草　井泉石

蒼朮（各半兩）　丹參　白朮　石決明　草決明（各二分）

右爲末每服二錢水一盞半煎至一盞溫服日進二服食後

雷礟丸　治男子婦人肝經不足風邪內乘上攻眼暗淚出羞明怕日多見黑花生障翳膜遮睛臉生風粟或痒或痛隱澁難開兼久患偏正頭疼牽引兩目漸覺細小視物不明皆因腎水不能滋潤於肝水此藥久服大補腎藏添目力

肉蓯蓉（一兩）　牛膝（一兩）　巴豆（一兩浸一宿去皮心）　菊花（二兩）　黑附子（青腳二錢貝母水二升同煮爲度去皮臍一兩）　枸杞子（二兩）　川椒（三兩去目）

右爲末共浸藥酒煮麵糊爲丸如桐子大每服十丸空心酒下世人服藥不知多少根源往往不効耳

丁香復光丸　治一切遠近目疾

丁香（二錢）　巴豆（一錢去皮油）　半夏（二兩）　烏梅（半兩去核）　南硼砂（三錢）　腦子（二百）　盆硝（半兩）　縮砂仁（二錢）　甘草（半兩）　荊芥穗（二錢）

右爲末醋煮麵糊爲丸如菉豆大每服十丸至十五丸米泔下食後日三服

已上諸方係先生親驗可錄

小兒門

小兒科論

素問云身熱惡寒戰慄驚惑皆屬熱證爲少陰君火暴強直支緩戾裏急筋縮也皆屬風證爲厥陰風木凡小兒六歲之上爲小兒十八歲已上爲少年其六歲已下者諸經不載是以乳不禦兒有病難治無可定也然小兒與大人不可一例各異治之雖小兒誕生襁褓之後皆肉脆軟腸胃細微可以乳食調和臟府適得平安肌膚滋潤筋骨輕嫩以綿衣之故生壅滯內有積熱熱乘於心心受邪熱乃發爲驚驚不止返爲潮搐則爲病也大抵小兒病者純陽熱多冷少故引　素問少陰厥陰證以小兒病驚風熱多矣小兒驚風者皆由心火暴甚而制金不能平木故風火相搏而昏冒驚悸潮熱此證皆謂熱甚而風生　素問驚駭驚惕少陰君火也

小兒脾疳痢瀉者皆熱甚急驚瀉痢色多青爲熱證明矣痢色黃者何爲火甚則水衰而脾土旺故痢色黃也痢色紅赤者爲心火熱甚深也痢色黑者爲火熱過極則反兼水化制之故色黑也

五臟皆言熱證無寒冷證亦有謂瀉痢小便青白不澁爲寒水殺不化而色不變吐痢腥穢澄澈清冷白不澁身涼不渴脈遲細而微者寒證也

穀雖不化而色變非白煩渴小便赤黃而澁者爲之熱證世傳大人小兒吐痢霍亂食乳未及消化而痢尚白便言論爲寒證誤矣（何不脈候別之）仲景邪熱不化穀豆爲寒也（大人亦同）

小兒方類

龍腦地黃膏　治小兒急慢驚風涎痰上潮心胸天吊驚纏喉風小兒胸膈不利一切熱毒大有神效如病不已與分肢散一二服吐利得快常服此藥

川大黃（別搗）　甘草（橫文者別抛）　麝香（一錢分別研）　生腦子（一錢別研）　雄黃（水飛一兩）

右五味各修製了再入乳鉢內同研細煉蜜爲膏油單裹如有前病前薄荷湯下旋丸如皂子大化下如

小兒大人腸胃及心神恍惚煎金銀湯下一丸常服新汲水下大解暑毒如孕婦人常服新生男女永無疾病如有大人陽毒傷寒加輕粉（二錢）龍腦（少許）水化下一丸杏核大小兒看年紀大小加減服之効

分肢散　治小兒卒風大人口眼喎斜風涎壅心驚癇天弔走馬喉閉急驚一切風熱等疾

巴豆（半兩研細）　川大黃（一兩）　樸硝（半兩）

右大黃爲末後入巴豆霜樸硝一處細研用油點起如有前患每服半錢熱桑下吐下頓減亦爲如小兒胸喉驚弔等先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字茶下時上吐下瀉以吐利得快爲効大人半錢小兒一字看虛實加減只是一兩服見効不宜頻服如吐瀉不定以蔥白湯立止

珍珠丸　治小兒虛中積熱驚癇等疾

巴豆霜（半錢）　膩粉（二錢）　滑石（二錢）　天南星（一錢）　蝎稍（二十四箇）　續隨子（二十四箇去殼）

粉霜（半錢）

右爲末研令極細以糯米粥爲丸如黃米大小兒一歲已下每服三丸至五丸十五歲每服五丸至十丸點茶湯下荊芥湯亦得虛實加減

牛黃散　治小兒上焦壅熱諸眼疾

內桂　鬱金（各一兩）　馬牙硝（四兩）　甘草（半兩）

右爲末如患眼三五年喫三五兩便瘥每服一錢新汲水調下垂枕卧片時若是小兒十歲服半錢五歲已下服一字永無驚痟癇風患服之立効

硃砂丸　治小兒急慢驚風及風熱生涎咽喉不利取驚積

硃砂　天南星　巴豆霜各一錢

右爲末麪糊和丸如黍粒大看病虛實大小每服二丸或天弔藥上服每服四五丸薄荷水下立愈

鬱金散　治小兒急慢驚風等疾

鬱金一枚大者　巴豆七箇去皮不出油

右研爲細末每服一字煎竹葉湯放溫下把藥抄蓋好上放以湯充下喉咽爲妙

浮瀉散　治小兒痢脹上壅熱涎潮

浮瀉一分　蟬殼全者二十一箇　黃明膠手掌大一片炙令焦

右爲細末每服一大錢溫米湯調下日進二服不愈再服

鎮庭散　治小兒一切驚啼肚脹咳嗽

鬱金　大黃各半兩　甘草三錢　輕粉一錢

右爲末每服半錢用薄荷汁硃砂細研冷水以木匙瀝下

定命散　治小兒天弔驚風不能哭泣

梨蘆　川芎　鬱金各等分

右研爲細末鼻中嚏之如哭可醫

金肺散　治小兒諸般喘嗽急驚風神効

錫灰一錢半　漢防已二錢半　鬱金一錢半　砒黃二錢半夏一錢半洗七次湯

右爲細末每服半錢加一錢小兒加減煎猪肉湯下日進二服食後

厚樸散　治小兒虛滑瀉痢不止

厚樸　阿子皮半兩　史君子一箇　揀丁香十箇一錢　茯苓　吳白朮　青皮名沒二　甘草炒一錢

右爲末每服一字一歲加減用淸米湯下

人參散　治小虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止及躁轉後服之

人參十兩半　茯苓二兩半　牛犀二錢半　甘草半兩半　乾葛半兩半　桔梗二錢半

右爲末每服二錢水一大盞入煙心五莖同煎至六分放溫不計時候煩渴者以新竹湯下量年紀加減

碧雲散　治小兒驚風有涎

膽礬研半兩　銅青研一分　粉霜　輕粉各半錢

右爲細末每服一字薄荷湯下中風將水下如吐多不定煎蘇白湯投之立止効

桃符丸　治小兒風熱

大黃　郁李仁　黃栢　宣連　鬱金各一分　巴豆二十七箇去皮出油爲霜　輕粉二錢

右爲細末滴水爲丸如菉豆大以硃砂爲衣每服二丸用桃符煎湯下看大人小兒加減

金　河間劉完素著

雜病門

雜論

素問云痛痒瘡瘍癰疽疹瘤氣結核怫鬱甚者皆熱五藏不和九竅不通六府不和留結爲癰近於火氣從熱則痒熱甚則痛附近則灼而爲瘡皆火之用也

人之瘡腫因內熱外虛所由生也爲風濕之所乘則生瘡腫然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則肉腠開爲風濕所乘脾氣溫而內熱即生瘡也腫者皆由寒熱毒氣客於經絡使血澁而不通壅結成腫風邪內作即無頃無根氣血相搏作者即有頃有根結壅盛則爲膿結核腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則爲實痒則爲虛所謂虛爲寒也正謂熱之微甚也痒者美疾也故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也炎之以火潰之以湯而其痒轉甚者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚痒而以冷水沃之其痒不去謂寒收斂腠理閉密陽氣壅結不能散越怫熱內作故也瘡痒皆爲火熱而反腐出膿水者猶穀肉果菜熱極則腐爛而潰爲污水也潰而腐爛者水之化也癰漬而大疽深而惡熱勝血則爲癰膿也瘍有頭小瘡也疹浮而小癮疹也瘤氣赤瘤丹熛熱膿氣火之色也

如意散　治疥癬無時痛痒愈發有時不問久新者

吳茱萸　牛蒡子　荊芥各一分　牡蠣半兩　輕粉半錢　信砒二錢

右爲細末研勻每臨卧抄一錢油調徧身搓摩上二

半如後有痒不止更少許塗之股髀之間聞香悉愈

信効散　治風熱上客陽明之經牙齒疳蝕斷宣腐臭血出色黃氣腐注闊動搖疼痛作發有時兼解中金石一切毒藥

信砒一錢　黃丹二錢　千古石灰如無但以陳久者炒細研四錢

石研細末入青鹽一分麝香少許如無此二味亦得每上抄三兩大豆許先洗漱淨以手指蘸藥揉上下牙齒斷瀝涎勿嚥之須臾漱淨或已蝕處再上少許二三四次常用如意一上以爲妙或服金石藥致病便一日三四上更不上牙齒如神或已上牙齒者傳之即愈或平人常用頗能清利頭目寬膈美食使髓遲白久用亦能固牙齒便遲老人氣於面而手足陽明經絡貫注憂思則氣結而血液不行燥澀鬱而血衰不能榮養藏府故早蒼黃而班白也此藥能使陽明氣血宣通故効能然也　又方使龍骨不用石灰

神聖餅子　治一切打撲傷損金石刀刃血出不止者立効此藥上無膿退痂便愈

烏魚骨一兩五月五日前先准備下　萵苣菜一握　北茶一握　青蒿草一握約一虎口人手取圓圓是也　石灰四兩

右以五月五日日未出本人不語將取三味同杵爛石以五月五日日未出本人不語將取三味同杵爛次後下餘藥味杵得所搏作餅子曬乾用時旋刮敷之

芙蓉膏　治徧滿頭面大小諸瘡子或身體者

料炭灰　桑柴灰　蕎麥蕻灰各半升

右灰用熱湯淋取二升熬至五分又用

獨角仙一箇不用角　紅娘子半錢不去翅足

糯米四十九粒　石灰一兩風化者

右爲末將前項灰汁調如麪糊相似在藥合子內於土底埋五七日取出使用取瘡痕歷面刺破用細竹篦子點之放藥用濕紙揩藥再點至三上見瘡痕時冷水淋洗忌蓋醋魚馬肉

鉛白霜散　治大小人口瘡牙齒腐蝕氣臭血出者

鉛白霜二錢　銅綠二錢　白礬一塊大芡

右爲末以翎羽掃上瘡以溫漿水漱之

麝香散　治大小人口齒腐蝕出血斷根宣爛者

上好鹹土不以多少　麝香頭好者少許

右熱湯淋取汁去滓用清汁銀石器中熬乾刮下再與麝香同研勻摻於瘡上以紙貼神効

乳香散　治一切瘰癧瘡新久遠近不已者

乳香四箇去翅足一錢　黃丹一錢　硇砂半錢　紅娘子十二

右爲末糯米粥和作餅子如折三錢厚小銅錢裹搽大破瘡上白麪糊如不破者炙柴炷大者不過一月其瘰癧核自下

後斂瘡生肌藥　黃蘗不以多少

爲細末麪糊塗患處甚妙

五香丸　治一切惡瘡瘰癧結核無首尾及諸瘡瘻

沉香　木香　雞舌香各一兩　麝香各三錢　連翹一兩半

石研爲細末每服二錢水一盞煎至六分不拘時

紫參丸　治熱毒瘰癧腫痛已內消瘡已破出膿水服此藥

紫參　菩參各一錢半　連翹二兩　丹參半兩

膩粉三錢　麝香三錢別研　滑石二兩

右爲末別用玄參一斤搗碎以酒三碗浸三日揉取汁去滓用皂角子三百枚煅熟搗爲末用玄參酒熬皂子末成膏和前藥如桐子大每服一丸以黃耆湯下一日加一丸至患人歲數即止如四十則二十每日却減一丸瘡自乾有結內消

麝香雄黃散　治十七般惡蟲咬傷人及瘡腫者

麝香　雄黃　乳香　硇砂各二錢

土蜂窩　露蜂窩燒灰

右研爲細末以醋調少許塗咬著處或不辨恐得多凝是惡瘡三五日不療即毒入心難療忌雞魚油膩物

硇砂散　治一切疔瘡

硇砂　麝香少許　雄黃　天南星　礦霜各等分

右研爲細末用竹針針開用藥到黃水出瘡已聖力散　治諸疔瘡腫

草烏頭　白芨　白斂　木鱉子去皮

地龍　黃丹少許　金毛狗脊各二錢半　麝香一錢

右研爲細末用針針到生肉痛者用藥黃水出爲度

川山甲散　治一切通氣破瘡腫行膿血如神妙

川山甲　木鱉子　烏龍角各等分都炒焦性

右爲末每服一錢半空心熱酒調下至中午瘡破腫血便行

守瘦丸　治瘰癧結硬

通草二兩　杏仁一大合去皮尖研　牛蒡子一合出油　呵梨勒　吳射干　昆布去鹹　海藻各四兩去鹹

右爲末煉蜜爲丸如彈子大含化咽津下日進三服

鬼代丹　治打著不痛

無名異研　沒藥研　乳香研　自然銅研　地龍去土　木鱉子去殼各等分

右爲末煉蜜爲丸如彈子大溫酒下一丸打不痛

龍腦潤肌散　治杖瘡熱毒疼痛

黃丹一兩　密陀僧半兩　輕粉一錢半　麝香半兩　龍腦一字

右爲細末摻藥在瘡上用青白子塗之內留一眼子

香藥丸　治瘰癧瘡

硇砂　乳香　沒藥　半夏　輕粉　赤石脂各等分

右爲末糯米粉爲丸如桐子大每服十丸加至二十丸皂角子臨卧

紅玉挺子　治一切牙疳

砒霜一塊皂角子大黃丹煨過　魯土

右爲細末餬餅和作劑子任牙

桃花散　治一切瘡生肌藥

白芨　白歛　黃柏　黃連　乳香別研　麝香別研　黃丹各等分

右爲細末摻於瘡上二三日生肌肉滿

追毒散　治生瘡發悶吐逆霍亂

螺兒青　揀甘草各一兩　白礬二錢半

右爲細末每服一錢新汲水調下立吐

膽礬丸　治男子年少而鬚髮班白

土馬騌燒存性　石馬騌燒存性　半夏各一兩　生薑一兩

胡桃十箇　眞膽礬半兩　川五倍子一兩

右爲末和作一塊絹袋子盛如彈子大熱酒水各少許浸下藥汁洗頭髮一月神効

茯神散　治膽熱多睡神思不安怔悸

茯神去皮　麥門冬　地骨皮　白蘚皮　酸棗仁　沙參　茯苓各一兩　甘草炙半兩

右爲末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後服

鐵脚丸　治大小便不通

皂角炙去皮不以多少去邪子

右爲末酒麵糊爲丸如桐子大每服二十丸酒服

全聖散　治小腸膀胱氣痛不忍者

地膚牛兩去足翅微炒　滑石一兩　硃砂半錢

右爲末每服二錢用苦杖酒調下食前服

琥珀散　治五淋

滑石二兩　木通　當歸　木香　鬱金　萹竹各一兩　琥珀二兩

右爲末每服三五錢用蘆葦葉同煎食後日三服

葵子散　治小便不通

葵子　茯苓去黑皮各等分

右爲末每服四錢水一盞煎三沸食前

倒挽散　治無問久新癃閉不通小腹急痛肛墜疼

大黃小便不通減通減半　荆芥穗大便不通減半各等分

右件藥味各別爲末每服一二錢溫水調下臨時加減服

敗毒散　治男子往來寒熱婦人產後骨蒸血暈

大黃　藜蘆子　紫河車　赤芍藥　甘草各等分

右爲末每服一錢如發熱冷水下如發寒煎生薑瓜蔞湯同調下此藥偏治婦人

補眞丹　治男子元藏虛冷興陽固腎不虛

鹿附子一兩燒令赤　陽起石火燒令赤淬三錢　海馬錢　乳香　血竭各三錢　石蓮子去殼皮心　雄黃研水飛　黑錫炒去砂子牛兩　石鷰子燒以醋淬　麝香一分

右爲細末麵糊爲丸每服二十丸用五香湯空心下

五香湯

沉香　箋香　乳香　麝香　檀香各等分

右爲細末每服半錢煎湯下

新添一醉烏法治頭髮白再黑方

訶藜勒十箇不去核　醋石榴三箇大取汁　生地黃汁升　硃砂研　硫黃研各一錢　綠礬五分

右藥同入瓷瓶內用二味汁浸密封勿令透氣至四十九日後取出其訶子狀若黑梅至夜臨卧含一枚嚼津到曉爛嚼以酒一盞下之三二日後再服忌葱蒜大蒜蘿蔔

黃帝素問宣明論方卷十五終

醫壘元戎

江陰朱氏校刊本

元 趙州王好古著

傷寒不可汗不可下不可吐諸證

大發春宜吐夏宜汗秋宜下凡用藥汗及吐下湯劑皆中病即止

若少陽病脈微不可發汗亡陽故也宜附子湯

若陽已虛尺中弱濇者復不可下之宜小柴胡湯

若動氣在左在右在上在下並不可發汗宜柴胡桂枝湯　若少陰病脈細沈數病在裏不可發汗宜當歸四逆湯　若少陽病不可發汗不可下宜小柴胡湯　若咽中閉塞吼喉乾燥亡血劇家淋家瘀家不可發汗

已上六證並宜小柴胡湯　若下利清穀不可發汗宜理中湯四逆湯之類　若四逆厥及虛家皆不可吐厥者宜當歸四逆湯　虛宜附子湯　有熱人宜黃耆人參建中湯　若少陰脈上寒乾嘔不可吐宜小半夏加橘皮湯溫中丸　若咽中有動氣不可下咽中閉塞不可下宜烏扇湯　若外實者不可下諸四逆厥者不可下虛家亦然厥宜當歸四逆湯　虛者宜附子湯　有熱宜黃耆人參建中湯　本虛攻其熱必嗜宜小柴胡湯　若脈浮而緊法當身疼痛宜以汗解假令尺中遲者不可發汗榮氣不足血少故也宜小柴胡湯　若脈濇而緊濇則衛氣弱緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡寒榮緊衛氣冷微嘔心內煩此不可汗宜小柴胡湯　若濇而弱不可發汗宜小柴胡湯　若浮而大浮為氣實大為血虛少便當赤而難脈中當虛今反小便利而大汗出法應衛家微可與小建中湯　若反更宜津液四射榮竭血盡乾煩而不得眠此不可下宜與小柴胡湯　若脈浮大應發汗宜柴胡桂枝湯　若脈浮而緊者不可下而反下之為大逆宜桂枝麻黃各半湯　若脈數不可下宜柴胡桂枝湯　若下之必煩利不止宜葛根黃芩黃連湯　若脈濇弱浮數不可下宜小柴胡湯　若濇弱微濇微則陽氣不足中風汗出而反躁煩濇則無血厥而且寒不可下宜桂枝甘草牡蠣龍骨湯　若結胸脈浮大不可下下之即死宜小陷胸湯　若陽病多者熱下之則硬宜小柴胡湯　若太陽發汗不徹轉屬陽明微汗出不惡寒若太陽證不罷不可下之下之為逆宜桂枝麻黃湯　若太陽病有外證未解不可下下之為逆宜桂枝麻黃湯　若病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞　結胸則有陷胸湯丸三病則有瀉心湯五　若太陽與陽明合病喘而胸滿不可下宜麻黃杏子甘草石膏湯　若太陽與少陽合病心下硬頸項強而弦者不可下宜小柴胡湯　若病欲吐者不可下宜小半夏加橘皮湯　太陰腹痛吐食自利腹痛下之必胸下結硬　厥陰病渴氣上衝心心中熱飢不欲食食則吐蚘下之則利不止　若少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐腹痛能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中寒實不可下也宜溫中湯生薑汁半夏湯　若無陽陰強大便硬者下之必滿穀腹滿宜用蜜煎導法　若傷寒五六日不結胸腹濇脈虛復厥者不可下此亡血也宜當歸四逆湯下之即死宜四逆加人參湯　若藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也謂下也宜用小柴胡湯　若傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之宜小柴胡湯　若陽明病身面色赤攻之必發熱宜調胃承氣湯　若色黃者小便不利也宜五苓散　若陽明病心下硬滿者不可攻之宜生薑瀉心湯　半夏瀉心湯　攻之利不止者死宜四逆湯不可汗下吐三法利害非輕前人多列經後大抵醫之失只在先藥藥之錯則變生若汗下不差則永無亡陽生黃耆血結胸病氣及下虛滿漏脇熱病痙急勞等證生矣其如此故鋒大禁忌於前使醫者當按之

初不犯也

太陽證（桂枝十四方麻黃五方在後保命集內）

傷寒六經所感形證合用汗下吐和解等湯先仲景活人雲岐子保命集載之詳者此不復重錄數書中所無者并諸方對證加減今載于後

金匱黃耆建中湯　治虛勞裏急諸不足宜此方主之

黃耆　桂枝　生薑（切各三兩）　芍藥（六兩）　炙甘草（二兩）　膠飴（一升）　大棗（十二個擘）

右七味以水七升先煮六味取三升去滓內膠飴令消溫服一升日三若嘔者加生薑　若腹滿者去棗加茯苓四兩　若肺虛損不足氣加半夏五兩

易簡建中加減法

若婦人血疼男子心腹疞痛并四肢拘急疼痛甚者加遠志半兩　若或吐或瀉狀如霍亂及胃涉濕寒感風入腹拘急切痛加附子七錢半　若沛氣發作當於附子建中湯煎時加察一匙頭許　若男子婦人諸虛不足小腹急痛脇肋脹脹　下虛滿臍中煩悸面色痿黃唇口乾燥少力身重短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復加黃耆一兩半　若婦人一切血氣虛損及產後勞傷虛羸不足腹中疞痛吸吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出不思飲食加當歸一兩名當歸建中湯產後半月每日三服令人精壯

大建中湯　治內虛裏急少氣手足厥逆少腹攣急或腹滿弦急不能食起即微汗出陰縮或腹中寒痛不堪勞苦唇口舌乾精自出或手足作寒作熱而煩苦酸痛不能當立此補中益氣

桂心（三錢）　芍藥　黃耆（各二錢）　甘草（炙）　當歸　人參（各一錢）　附子（五分）　半夏（二錢半）　棗（二枚）　生薑（半兩）

右㕮咀水五盞煎至三盞去滓分三服

易簡杏子湯　治欬嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積悉皆治療

人參　半夏　茯苓　細辛（減半）　乾薑（減半）　甘草（炙）　官桂（減半）　芍藥　五味子

右㕮咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚薑五片煎至六分去滓服

若感冒得之加麻黃等分　若脾胃素實者用粟殼去筋膜碎剉以醋淹炒等分加之每服加烏梅一枚煎服其效尤驗嘔逆惡心者不可用此　若久年欬嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃添芍藥加麻黃之數乾薑五味子各增一半名小青龍湯

大補十全散

參耆　朮　茯苓　芍　地　桂　歸　川　三五錢秤用　生薑　棗　水煎　婦人虛弱用　名美號十全

治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨髓拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘欬中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

肉桂　芍藥　甘草　黃耆　當歸　川芎　人參　白朮　茯苓　熟地黃（各等分）

右爲麄末每服二大錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分不拘時候溫服桂芍藥甘草小建中湯也黃耆與此三物即黃耆建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯也川芎芍藥當歸四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱天得地之成數故名曰十全散

易簡胃風湯　治大人小兒冷風乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如薑汁或下瘀血日夜無度

人參　茯苓　川芎　官桂　當歸　芍藥　白朮（各等分）

右㕮咀每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心小兒量力減之

若加熟地黃黃耆甘草等分足爲十味名十補湯

若虛勞嗽加五味子　若有痰加半夏　若發熱加柴胡　若有汗加牡蠣　若虛寒加附子　若寒甚加乾薑皆依本方等分　若骨蒸發熱飲食自若當用十補湯加柴胡二兩服之　若氣短加人參　若小便不利加茯苓　若脈弦濇加川芎　若惡寒如官桂　若脈濇加當歸　若腹痛加白芍藥　若胃熱濕盛加白朮　若血瘀色紫者瀉血也加熟地黃　若血鮮色紅者新血也加生地黃　若寒熱者加柴胡　若肌熱者加地骨皮　若脈洪實痛甚者加酒浸大黃

潔古云防風爲上使　黃連爲中使　地榆爲下使

千里漿一名水葫蘆

木瓜　紫蘇葉　官桂（各半兩）　烏梅肉　赤茯苓（各兩）

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大噙化一丸嚥津

又方

百藥煎　烏梅肉　紫蘇葉　人參
甘草　麥門冬

右各等分爲細末煉蜜丸噙化

荔芰湯

烏梅肉　甘草各二兩　百藥煎一兩　白芷半兩
白檀三錢

右爲細末湯點

蜜酒

好蜜二斤　水一碗　細麴一斤半　好乾酵三兩

右先熬蜜水去花沫令絕冷下麴酵每日三攪三日熟

陽明證葛根湯三方升麻湯大小青龍等湯在後保命集內承氣湯三方亦佳

易老門冬子　治老弱虛人大渴

人參　枸杞　白茯苓　甘草各三錢
五味子　麥門冬去心各半兩

右爲麄末生薑水煎

麥門冬湯治勞復欲死人氣欲絕者用之有效

麥門冬一兩　甘草二兩炙　粳米半合

右門冬去心爲細末水二盞煎粳米令熟去米約湯一小盞半入藥五錢七棗二枚去核新竹葉十五片同煎至一大盞去滓大溫服不能服者綿滴口中

後人治小兒不能灌注者宜用此綿滴法此方不用石膏以其三焦無大熱也兼自欲死之人陽氣將絕者故不用石膏若加人參大妙

海藏五飲湯一留飲心下二辯飲脇下三痰飲胃中四

溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花　人參　陳皮
白朮　茯苓　厚樸　枳實
澤瀉　猪苓　前胡　半夏
芍藥　甘草　桂心

右等分剉每兩分四服水二盞生薑十片同煎至七分取清溫飲無時忌食肉生冷滋味等物因酒有飲加葛根花編砂仁

海藏巳寒丸此丸不僭上陽生於下

治陰證服四逆輩留中發燥而渴者數日大便秘小便澀赤服此丸上不躁大小便自利

肉桂　茯苓各半兩　良薑　烏頭炮各七錢
附子炮　乾薑炮　芍藥　茴香炒各一兩

右等分爲細末糊爲丸梧子大溫酒下空腹食前五七十丸八九十丸亦得酒醋爲糊俱可

婦人血風證因大脫血崩漏或前後血因而枯燥其熱不除循衣撮空撲牀閉目不省擲手揚視撫空語錯語失神脈弦浮而虛內燥熱之極也氣麄鼻乾而不潤上下通燥此爲難治宜

生地黃連湯主之

川芎　生地黃　當歸各七錢　赤芍藥
梔子　黃連　黃芩各三錢　防風一兩

右爲麄末每服三錢水二盞煎至七分取清飲無時徐徐與之　若脈實者加大黃下之

大承氣湯氣藥也自外而之內者用之　牛地黃黃連湯血藥也自內而之外者用之氣血合病者衣撮空證同　自氣而之血血而復之氣大承氣湯下之自血而之氣氣而復之血地黃黃連湯主之也二者俱不大便

培損理中丸王朝奉云大小陷胸湯丸不愈者宜與之

人參　白朮　括蔞　牡蠣各二兩
甘草炒三兩　乾薑炮一兩半　枳實炮二十四箇　黃芩去心一兩

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大湯一盞煎服不欲穀與之不過五六日中豁然矣用藥神速未嘗見也湯者加括蔞根　汗者加牡蠣

少陽證大小柴胡湯加減在前附子柴胡五方在後保命集內

妙簡參蘇飲　治感冒發熱頭痛與因痰飲凝積發而爲熱並宜服之若感冒發熱亦如服養胃湯法連進數服微汗即愈大治中脘痞悶嘔逆憎心開胃進食小兒室女尤宜服之

前胡　人參　紫蘇　乾葛
半夏　茯苓加三分　枳殼　陳皮
甘草　桔梗　木香各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎至六分去滓不以時候素有痰飲者俟退熱以二陳湯或六君子湯間服若男子婦人虛勞發熱或吐衄下血過多致虛熱者用此藥三兩加四物湯二兩合和名茯苓補心湯

活人治婦人傷寒姙娠服藥例

若發熱惡寒者不離桂枝芍藥　若往來寒熱者不離柴胡前胡　若大渴者不離知母石膏五味子麥門冬　若大便泄者不離桂附白朮乾薑　若大便燥結者不離大黃黃芩　若經水適來適去斷者不

離小柴胡　若安胎者不離人參阿膠白术黃芩
若發汗者不離蔥豉生薑麻黃旋覆　若頭痛者不
離前胡石膏梔子　若傷暑頭痛者不離柴胡石膏
甘草　若滿悶者不離枳實陳皮　若胎氣不安者
不離黃芩麥門冬人參　若痰發黑者不離黃芩梔
子升麻

萬病紫苑丸　療臍腹久患疼癖如碗大及諸黃病每
地氣起時上氣衝心遶臍絞痛一切蟲咬十種水病
十種蠱病反胃吐食嘔逆惡心飲食不消天行時病
婦人多年月露不通或腹如懷孕多血天陰即發又
治十二種風頑痺不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭
白多屑或哭或笑如鬼魅所着腹中生瘕腹痛服之
皆效

紫苑去苗　吳茱萸湯洗七次焙乾　萬蒲
柴胡去蘆　厚樸薑製一兩　桔梗去蘆　茯苓去皮
皂莢去皮子等炙　桂枝　乾薑炮　黃連去須
蜀椒去目及閉口微炒去汗　巴豆去皮膜出油研　人參去蘆
兩　川烏去皮及臍三錢　加羌活　獨活
防風各半兩

右爲細末入巴豆勻煉蜜爲丸如桐子大每服三丸
漸加至五七丸生薑湯送下食後臨睡初有孕者不
宜服具引于後

痔漏腸風酒下　赤白痢訶子湯下　膿血痢米飲
湯下　墮傷血悶四肢不收酒下　蛔蟲咬心槟榔
湯下　氣壅憂喧荷葉湯下　打撲傷損酒下　中
毒蕎灰甘草湯下　一切風升麻湯下　寸白蟲槟
榔湯下　霍亂乾薑湯下　欬嗽杏仁湯下　腰腎

痛荳蔻湯下　陰毒傷寒溫酒下　吐逆生薑湯下
食飲氣塊麪湯下　時氣井花水下　脾風陳皮
湯下　頭痛水下　心痛溫酒下　大小便不通燈
草湯下　因物所傷以本物湯下　吐水藥湯下
氣病乾薑湯下　小兒天風弔搐防風湯下　方已亦
可　小兒疳痢蘆白湯下　小兒乳食傷白湯下
月信不通煎紅花酒下　婦人腹痛川芎湯下　懷
孕半年後胎漏艾湯下　有子氣衝心酒下　產量
痛溫酒下　血氣痛當歸酒下　產後心腹脹滿荳
蔻湯下　難產益志湯下　產後血痢當歸湯下
赤白帶下酒煎艾湯下　解內外傷藥無問欲下　室
女血氣不通酒下　子死藥子湯下　又治小兒驚
痢大人癲狂一切風及無名惡疾人身上頑麻狀如蟲
行四肢俱腫呻吟等疾

太陰證脂胃三方滴心五方在後保命集內

理中湯加減例

若爲聚氣濕氣所中者加附子一兩名附子理中湯
若霍亂吐瀉者加橘紅青橘各一兩名治中湯
若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頓服候吐出合
透即進此藥　若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏
一兩每服生薑十片同煎　若泄瀉者加橘紅茯苓
各一兩名補中湯　若溏泄不已者於補中湯內加
附子一兩不喜飲水穀不化者再加縮砂仁一兩共
成八味　若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方
中去白术加熟附名四順湯　若傷寒結胸先以桔
梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後胸痞欲絕心
鬲高起急痛手不可近者加枳實茯苓各一兩名枳

實理中湯　若渴者再於枳實理中湯內加栝蔞根
一兩　若霍亂後轉筋者理中湯內加火煅石膏一
兩　若臍上築者腎氣動也去术加官桂一兩半腎
惡燥故去术恐作脹滿故加官桂　若悸多者加茯
苓一兩　若渴欲飲水者添加术半兩　若若寒者
添加乾薑半兩　若腹滿者去白术加附子一兩
若飲酒過多及咳痰煩熱食發爲鼻衄加川芎一兩
若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血
脈只用本方　若中附子毒者亦用本方或止用甘
草乾薑等分煎服仍以烏荳煎湯解之

平胃散加減例

若瀉脾濕加茯苓丁香白术爲調胃散一法加藿香
半夏　若加乾薑爲厚樸湯　若溫疫時氣二毒傷
寒頭痛壯熱加連鬚蔥白五寸荳豉三十粒煎三二
服微汗出愈　若五勞七傷腳手心熱煩躁不安百
節酸疼加柴胡　若痰嗽痞疾加桔梗半夏　若本
藏氣痛加藿香　若水氣衝滿加赤白皮　若婦人
赤白帶下加黃耆　若酒傷加丁香　若飲冷傷食
加高良薑　若滑脫泄瀉加肉荳蔻　若風痰四肢
沈困加荊芥　若腿膝冷痛加牛膝　若渾身煩躁
拘急加地皮骨　若腿膝濕痺加免絲子　若白痢
加吳茱萸　若赤痢加黃連　若頭風加藁本　若
轉筋霍亂加楠木皮　若七邪六極耳鳴夢遺盜汗
四肢沉重腿膝酸痠婦人宮藏久冷月脈不調者加
肉桂　若胃寒嘔吐多加生薑　一法加茯苓丁香
各三兩共成六味　若氣不舒快中脘痞塞加縮砂
仁香附子各三兩生薑煎服　若與五苓散相半爲

對金飲子　若與六一散相合爲黃白散　若與錢氏異功散相合爲調胃散　若欲進食加神麯麥芽　若加藁本桔梗　吳茱萸蜀椒乾薑桂爲吳茱萸湯　若加霍香半夏爲不換金　爲和解散治傷寒吐利　若加霍香正氣散　若瘧疾寒熱者加柴胡　若小腸氣痛者　加苦練茴香

少陰證眞武四逆等湯在活人妾附方七道在保命集內

八物定志丸補益心神安定魂魄治痰去留中邪鬱結

肺腎

人參二兩半　菖蒲　遠志去心　茯苓去皮各一兩　朱砂一錢　白术　麥門冬去心各半兩　牛黃二錢分細研

右爲細末煉蜜丸桐子大米飲湯下三十丸無時

若髓竭不足加生地黃　當歸　若肺氣不足加天門冬　麥門冬　五味子　若心氣不足加上黨參　茯神　菖蒲　若脾氣不足加白术　白芍藥　益志　若肝氣不足加天麻　川芎　若腎氣不足加熟地黃　遠志　牡丹皮　若膽氣不足加細辛　酸棗仁　地榆　若神昏不足加硃砂　預知子　茯神

仲景八味丸

熟地黃補腎水眞血　肉桂補腎水眞火　牡丹皮補神志不足　附子能行諸經而不止　澤瀉去胞中　兼益火　白茯苓能伐腎邪濕滯　留垢及遺溺　山茱萸治精滑不禁　乾山藥能　治皮毛中燥酸澀

右八味皆君主之藥　若不依易老加減服之終不得效若加五味子爲腎氣丸述類象形之劑並孟火之源以消陰翳吐水之主以制陽光錢氏地黃丸減桂附

潔古老人天麻丸　治證見活法機要

天麻六兩酒浸三日焙乾秤　除風痺　牛膝六兩酒浸三日焙乾秤　强筋　乞參六兩　樞機管領　草薢六兩爲末　壯骨　杜仲七兩剉炒去絲　使筋骨相着　當歸十兩全用　和養血　羌活十兩或十五兩　去骨節間風　生地黃一斤　益眞血　附子一兩炮　行諸經不止　獨活五兩　去腎間風邪

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服五七十丸病大至百丸空心食前溫酒白湯下服藥忌藜蒿菜等物利故服半月稍覺羸寒微以七宣丸輕瀉之使藥得爲用也

大效牡丹皮散　治血藏虛風及頭目不利不思飲食手足煩熱肢節拘急疼痛胷膈不利大腸不調陰陽相干心驚怯悸或時旋運

牡丹皮　川芎　枳殼麩炒各一兩　陳皮炙　玄胡　甘草　羌活　三稜炮　乾薑炮　肉桂各半兩　木香　訶子肉　白术炒各二分　白茯苓三錢　當歸一兩半

右爲細末每服二錢水一盞半煎五七沸食前溫服

益血海退血風勞攻注消寒痰實脾胃理血氣攻刺及氣虛惡寒潮熱證至妙

海藏大五補丸同三才丸例

天門冬　麥門冬　菖蒲　茯神　人參　益智　枸杞　地骨皮　遠志　熟地黃

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心酒下三十丸本方數服以七宣丸泄之

清心丸治熱

黃蘗二兩生　天門冬一兩　黃連半兩　龍腦一錢　麥門冬去心一兩

右爲細末煉蜜丸桐子大每服十丸臨卧門冬酒下薄荷湯亦得

火府丹丙丁俱瀉

黃芩一　黃連一　生地黃二　木通三

右爲細末煉蜜丸桐子大每服二三十丸溫水下臨卧

海藏調胃白术澤瀉散　治痰病化爲水氣傳變水鼓不能食

白术　澤瀉　茯苓　陳皮　茯苓　生薑　木香　檳榔

右爲末一法加白术本藥各半治腹脹上壓如神

若心下痞者加枳實　若下盛者加牽牛

厥陰證當歸四逆并加吳茱萸等湯是陰證畧例

四物湯益榮衛滋氣血月水不調臍腹疼痛等證並見局方

熟地黃補血如臍下痛非此不能除乃通腎經之藥也

川芎治風泄肝木也如血虛頭痛非此不能除乃通肝經之藥也
芍藥和血理脾如腹中虛痛非此不能除乃通脾經之藥也
當歸和血如血刺痛非此不能除刺如力刺乃通腎經之藥也

右爲麄末水煎　加減於後

若加地骨皮牡丹皮治婦人骨蒸

若姙娠胎動不安下血不止者加艾十葉阿膠一片

又加葱白黃耆

若血藏虛冷崩中去血過多亦加膠艾

若婦人背服春倍川芎　脈弦頭痛　夏倍芍藥

脈洪飧泄　秋倍地黃　脈沉濇血虛　冬倍當歸

脈沉寒而不食

若春則防風四物加防風倍川芎

若夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥

若秋則門冬四物加天門冬倍地黃

若冬則桂枝四物加桂枝倍當歸

若血虛而腹痛微汗而惡風四物湯加茂桂謂之腹痛六合湯

若風眩運加秦艽羌活謂之風六合

若氣虛弱起則無力眶然而倒加厚樸陳皮謂之氣六合湯

若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之熱六合

若虛寒脈微自汗氣難布息清便自調加乾薑附子謂之寒六合湯

若中濕身沉重無力身涼微汗加白术茯苓謂之濕六合湯

若產後虛勞日久而脈浮疾宜

柴胡四物湯

川芎　熟地黃　當歸　芍藥各一兩半
加柴胡八錢　人參　黃芩　甘草
半夏麴各三錢　水煎服

若婦人筋骨肢節痛及頭痛脈弦增寒如瘧宜治風六合湯

四物湯四兩　防風　羌活各一兩

若血氣上衝心腹胠下滿悶宜治氣六合

四物湯四兩　木香　槟榔各一兩

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜玄胡六合小腹痛者同

四物湯四兩　玄胡　苦練各一兩碎炒焦

若氣充經脈故月事頻併臍下多痛宜芍藥六合湯

四物湯四兩　芍藥一兩

若經事欲行臍腹絞痛臨經痛者血滯也宜入物湯

四物湯四兩　玄胡　苦練碎炒焦　槟榔

木香各一兩

若經水過多別無餘證宜黃芩六合湯

四物湯四兩　黃芩　白术各一兩又加紅花血見愁

若經水澀少宜四物內加葵花前

若虛勞氣弱欬嗽喘滿宜厚樸六合湯

四物湯四兩　厚樸姜製一兩　枳實麩炒半兩

若經水暴下加黃芩一兩　若腹痛者加黃連如夏月不去黃芩　若經水如黑豆汁者加黃芩黃連各一兩　若經水少而色和者四物湯加熟地黃當歸各一兩　若經水適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡湯以去其寒熱後以四物湯和之　若婦人

血積者四物湯內加
廣茂　京三稜　桂枝　乾漆各一兩

若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜八物湯

四物湯四兩　黃耆　甘草　茯苓
白术各一兩

若姙娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱太陽經病宜表虛六合湯

四物湯四兩　桂枝　地骨皮各七錢

若姙娠傷寒頭痛身熱無汗脈浮緊太陽經病宜表實六合湯

四物湯四兩　麻黃　細辛各半兩

若姙娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭痛宜風濕六合湯太陽標病也

四物湯四兩　防風　苍术製各七錢

若姙娠傷寒下後過經不愈溫毒發斑如錦文宜升麻六合湯

四物湯四兩　升麻　連翹各七錢

若姙娠傷寒胷脇滿痛而脈弦少陽也宜柴胡六合湯

四物湯四兩　柴胡　黃芩各七錢

若姙娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脈沉實陽明太陽本病也急下之宜大黃六合湯

四物湯四兩　大黃半兩　桃仁十箇去皮尖麩炒

若姙娠傷寒汗下後欬嗽不止者宜人參六合湯

四物湯四兩　人參　五味子各五錢

若姙娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚

樸六合湯

四物湯四兩　厚樸　枳實麸炒各半兩

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯

四物湯四兩　梔子　黃芩各半兩

若妊娠傷寒身熱大渴蒸蒸而煩脈長而大者宜石膏六合湯

四物湯四兩　石膏　知母各半兩

若妊娠傷寒小便不利大陽本病宜茯苓六合湯

四物湯四兩　茯苓　澤瀉各半兩

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯

四物湯四兩　琥珀　茯苓各半兩

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯

四物湯四兩　阿膠　艾各半兩一方加甘草乾薑甘草黃耆

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰病也宜附子六合湯

四物湯四兩　附子炮去皮臍　肉桂各半兩

若赤白帶下宜香桂六合湯

四物湯四兩　肉桂　香附子各半兩

若妊娠傷寒畜血證不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯下

四物湯　生地黃　酒浸大黃

若虛熱病四物與參蘇飲相合名補心湯主之

若四肢煩痛不能舉動四物蒼朮各半湯主之

若治燥結四物與調胃承氣湯各半爲玉燭散

若流濕潤燥宜四物理中各半湯

若保胎氣令人有子四物與縮砂四君子湯各半名八珍湯

若熱與血相搏口舌乾渴飲水加

栝蔞　麥門冬

若腹中刺痛惡物不下加

當歸　芍藥

若血崩者加

生地黃　蒲黃

若頭昏項强者加

柴胡　黃芩

若因熱生風者加

川芎　柴胡　防風

若藏秘澀者加

大黃　桃仁

若滑濇者加

官桂　附子

若嘔者加

白朮　人參　生薑

若大渴者加

知母　石膏

若發寒熱者加

乾生薑　丹皮　芍藥　柴胡

若水停心下微吐逆者加

猪苓　茯苓　防已

若虛寒似傷寒者加

人參　柴胡　防風

若產婦諸證各隨六經以四物與仲景藥各半服之其效如神

若婦人或因傷酒或因產亡血或虛勞五心煩熱者宜四物二連湯

四物湯內生用地黃　黃連　胡黃連俱各

溫飲清汁

四物與桂枝麻黃白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼膈等皆可作各半湯此易老用藥大略也

若虛煩不得睡加竹葉　人參

若婦人血虛心腹疞痛不可忍者去地黃加乾薑名四神湯

若諸痛有濕者四物與白朮相半加

天麻　茯苓　川山甲　酒煎

若日赤暴發作雲翳疼痛不可忍宜四物龍膽湯

四物各半兩　羌活　防已各二錢　水煎　防風各三錢　草龍膽

海藏云婦人妊娠畜血

婦人妊娠或畜血　抵當桃仁勿妄施

要教子母俱無損　大黃四物對服之

海藏當歸丸　治三陰受邪心臍少腹疞痛氣風等證

四物湯各半兩　防風　獨活　全蝎各半兩

茴香炒　續斷各一兩　苦練　玄胡各七錢

木香　丁香各二錢半

右爲細末酒糊丸桐子大空心溫酒下三五十丸大效

苦練丸　治奔豚小腹痛神效

川芎練　茴香　附子一兩炮去皮臍

右三味酒二升煮鹽為度焙乾細末之每秤藥末一兩入玄胡半兩全蝎十八箇炒丁香十八箇別為末和勻酒糊丸桐子大溫酒下五十丸空心痛甚加當歸煎服

治喉閉逡巡不救方

皂莢去皮子生半兩為細末篩頭點少許在痛處更以醋糊調藥末厚塗項上須臾腫破血出立差

拯濟換骨丹　海云自汗者不宜服　歌曰

槐皮芎朮芷　仙人防首蔓　十味各停勻

苦味香減半　龍麝即少許　朱砂作衣纏

麻黃膏煎丸　大小如指彈

右治半身不遂口眼喎斜手足不仁言語蹇澀或痛入骨髓或痺裹皮膚或中急風涎潮不言精神昏塞行步艱難筋脈拘急左癱右瘓一切風疾並皆治之

槐莢子生　人參　桑白皮　蒼朮

川芎　何首烏　蕤蘊仙　荊子

防風各二兩　五味子　香附子　苦參各一兩

香白芷二兩　麝香二錢另研

右一十四味為細末入香令勻又用麻黃十斤去節根用大河水三石三斗熬至六斗濾過去滓再熬至二升半入銀石器內熬成膏入前藥末和勻杵三五千下每一兩作十丸硃砂為衣每服一丸先搗碎酒一盞自晨煎至晚食後臨卧攪勻服之神清無睡是藥之驗須更隔五日服之如中風無汗宜服若體虛自汗服之是重亡津液也若風盛人於密室溫卧取汗

三焦熱用藥大例方在元戎

上焦

清神散　連翹防風湯　涼膈散

龍腦飲子　犀角地黃湯

中焦

小承氣湯　調胃承氣湯　洗心散

四順清涼飲　桃仁承氣湯

下焦

大承氣湯　五苓散

石膏散　抵當湯丸　八正散

氣分熱　柴胡飲子　清涼飲子

血分熱　白虎湯　桃仁承氣湯

通治大熱　三黃丸

黃連解毒湯

三焦寒用藥大例方在[illegible]生

上焦

桂附丸　鐵刷湯　胡椒理中丸

中焦

二氣丸　附子理中丸　大建中

下焦

還少丹　八味丸　大真丹

桂枝加附子湯　巴戟丸

氣分寒　桂枝加芍藥　血分寒　神珠丹

人參新加湯

大巳寒丸

通治大寒

四逆湯

右此內有寒熱之大略也若外有寒熱者當求別法發斑諸藥

葛根橘皮湯斑在肌　治傷寒暴發肌中痠煩欬而心悶但嘔清汁宜此

葛根　橘皮　杏仁　知母

黃芩　麻黃　甘草

右等分剉每用五錢水煎

陽毒升麻湯斑在面　治傷寒一二日或吐下後變成陽毒頭背痛煩悶不安面赤狂言見鬼下痢脈浮大數咽喉痛下膿血五日可治七日難愈

升麻半兩　犀角　射干　黃芩

人參　甘草各二錢半

右㕮咀水三升煎取半飲一盞刻許再服溫覆手足汗出解否則重作

陽毒玄參升麻湯斑在身　治汗下吐後毒不散表虛裏實熱發於外甚則煩燥　讝語兼治喉痺腫痛

玄參　升麻　甘草名半分

右細剉水煎

陽毒梔子湯少陽陽明合病

治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

升麻　梔子仁　黃芩　芍藥

石膏　知母　甘草　杏仁

柴胡

右麄末五錢生薑五片豉百粒水煎

消毒犀角飲子治斑

牛蒡子（六兩） 荊芥（三兩） 防風（三兩） 甘草（一兩）

右水煎服

陰毒升麻鱉甲湯陰痿 大建中湯尤妙

升麻（三兩） 當歸 甘草（各二兩） 蜀椒（一兩去汗）

鱉甲（炙） 雄黃（半兩研）

右爲末每服半兩水煎

蒸煎 治者宜隨各經虛實內外淺深用藥加減可也

古今錄驗五蒸湯

甘草（二兩炙） 茯苓（三兩） 人參（二兩） 竹葉（二兩）

乾地黃 葛根（各三兩） 知母 黃芩（名二兩）

石膏（五兩碎） 粳米（二合）

右十味㕮咀以水九升煮取二升半分爲三服亦可

以先炙小麥水乃煮藥 忌海藻菘菜兼炙大醋

實熱

黃芩 黃連 黃蘗 大黃

虛熱

氣也 烏梅 秦艽 柴胡

血也 青蒿 鱉甲 蛤蚧

小麥 牡丹皮

肺 鼻乾 烏梅 天門冬 麥門冬

紫菀

皮 舌白唾血石膏 桑白皮

唇 唇味嗜睡牡丹皮

氣 遍身氣熱喘促鼻乾 人參 黃芩

梔子

大腸 鼻右孔乾痛 大黃 芒硝

脈 唾白涙語脈絡溢脈緩急不調 生地黃

當歸

心 舌乾 黃連 生地黃

血 髮焦 地黃 當歸

童子小便 桂心

小腸 下唇焦赤茯苓 木通

脾 唇焦 芍藥 木瓜 苦參 生地黃

肉 食無味而嘔煩燥不安 芍藥

胃 舌下痛 石膏 粳米 大黃

芒硝 葛根

肝 眼黑 川芎 當歸

筋 甲焦 川芎 當歸 前胡

膽 眼白失色 柴胡 栝蔞

三焦 乍熱乍寒 石膏 竹葉

腎 兩耳焦 生地黃 石膏 知母

寒水石

腦 頭眩悶熱地黃 防風

髓 髓沸骨中熱 天門冬 羌活 鱉甲

地黃

骨 齒黑腰痛足逆變痟食減

地骨皮 牡丹皮 當歸

肉 肢細跌腫府藏俱熱 石膏

胞 小便赤黃 澤瀉 黃蘗

生地黃 沉香 滑石

膀胱 左耳焦 澤瀉 茯苓 滑石

凡此諸蒸皆熱病後食肉油膩房酒犯之而成久蓄不除變成痟病即死矣

葛根散治陽毒身熱如火頭痛躁渴咽喉乾痛

葛根（錢半） 黃芩 大黃（醋炒） 甘草

山梔子仁 樸硝（各半兩）

右爲末水煎

活人敗毒散太陽證 治傷風溫疫風溫風眩風痰痺溫

羌活 獨活 前胡 柴胡

枳殼 人參 茯苓 桔梗

甘草 川芎（分兩隨病加減）

右細末生薑水煎或沸湯點亦可大人小兒皆宜痟

烟之地溫疫時行或人多風痰或處卑濕腳氣此藥不可闕一方少加薄荷同煎

三陽頭痛

羌活 防風 荊芥 升麻

葛根 白芷 柴胡 川芎

芍藥 細辛 蔥白連鬚（分兩能加）

若陰證頭痛只用溫中藥足矣乃理中薑附之類也

發黃兼諸雜證（治法在前難知內附陰黃治法在後陰證畧例附）

小便不利煩燥而渴 加茯苓猪苓滑石當歸官桂

煩燥喘嘔不渴 加陳皮白术半夏生薑茯苓

四肢遍身冷者 加附子甘草

茵陳蒿湯加減

肢體逆冷腰上自汗 加附子乾薑甘草

身冷汗不止者 加附子乾薑甘草

前藥未已脈尚伏 加吳茱萸附子乾薑木通當歸

韓氏立名爲茵陳茯苓湯 茵陳橘皮湯

小茵陳湯 茵陳四逆湯 茵陳附子湯

茵陳茱萸湯　大抵只是仲景陰證藥內加茵陳也用者要當識之

掌中金丸　治婦人乾血氣

川山甲炮　甘草　苦丁香　川椒

苦葶藶　白附子　草烏頭　猪牙皂角各三錢　巴豆一錢全用研

右通爲細末生薑絞汁和丸彈子大每用一丸新絹包定內陰中一日即白二日即赤三日即血神效

龍腦雞蘇丸　上焦熱

除煩解勞去肺熱欬嗽心熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱泣出口苦腎熱神志不定上而酒毒鬲熱消渴下而血滯五淋血崩等疾

薄荷一斤六兩各爲末　麥門冬去心三兩　甘草一兩半　生乾地黃　黃耆　新蒲黃　阿膠炒　黃連　人參　木通各一兩　柴胡二兩剉同木通沸湯半升浸一日夜絞取汁

右爲細末好蜜二斤先煉一二沸然後下生地黃末不住手攪時加木通柴胡汁浸熬成膏勿令火緊焦了然後將前藥末和丸如豌豆大每服二十丸白湯下

虛勞煩熱梔子湯下　肺熱黃芩湯下　心熱悸動恍惚人參湯下　唾咯吐衄四血去心麥門冬湯下　脾胃熱赤芍藥生甘草湯下　肝熱防風湯下　腎熱黃柏湯下　治五淋及婦人漏下車前子湯下　痰嗽者生薑湯下　率中痛者蒲黃滑石末一錢調下　氣逆者橘皮湯下　室女虛勞寒熱潮作煎柴胡人參湯下　已上並食後臨卧服

黃耆膏子煎丸治證同煎

人參　白朮各一兩半　柴胡　黃芩各一兩　白芷　知母　甘草炙各半兩　鱉甲一筒半手大者醋炙

右爲細末黃耆膏子丸桐子大每服三五十丸百沸湯下空心右用黃耆半斤麄末水二斗熬一斗去滓再熬令不住攪成膏至半斤入白蜜一兩煬一兩再熬令蜜煬熟得膏十兩放令丸藥

地骨皮枳殼散　治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多困夜多盜汗

地骨皮　秦艽　柴胡　枳殼　知母　當歸　鱉甲醋炙黃

右等分爲末水一盞桃柳枝頭各七箇薑三片烏梅一箇每服去滓臨卧服

易簡芎歸湯　治一切去血過多眩暈悶絕傷脾去血產後去血崩中去血拔牙去血金瘡去血不止者舉頭欲倒悉能治之

芎藭　當歸各等分

右㕮咀水煎熱服

若產後眩暈加芍藥　產後腹疼不可忍加官桂酒童便合煎　妊娠子死或不死胎動酒水合煎即下

未死者即安　若虛損腹痛少氣頭眩自汗每服加羊肉一兩生薑十片水煎　若臨月服之則縮胎易產　若至女婦人心腹疞痛經脈不調水煎服　若妊娠胎氣不安產後諸疾酒煎服　若難生倒橫子死腹中先用果薑一大合炒熟水與小便合煎服

若難產用百草霜香白芷等分童子小便好醋各一合沸湯浸服甚者再服已分娩矣　若腸風藏毒每服加槐花末半錢三日取下血塊即愈　若吐血亦宜服此　若血氣上喘下脚空心煎艾湯調下　若產後惡血注心迷悶嚥急腹痛依前用黑豆加生薑自然汁煎服　若產後頭痛加荊芥　若崩中漏下失血不止加香附子炒每兩入甘草一錢沸湯點服

若有白帶者加芍藥半兩乾薑等分米飲調下

三奇六神麴法

白虎白麴一百斤　青龍青蒿自然汁三升　勾陳蒼耳汁二升　騰蛇野蓼子汁四升　玄武杏仁四升去皮尖看麴乾濕用水　朱雀赤小豆三升煮軟去湯研

右一處拌勻稍乾爲妙用大盆罨一宿于伏內至寅日踏極實爲度甲寅戊寅庚寅乃三奇也卧鋪如麴法

千金種子法逆火之時當至陰節間而止不爾則過一宮矣于閤故師曰深則少陰之分肅殺之方何以生化淺則厥陰之分融和之方故能發生所以受胎之處在淺而不在深也非月經後皆不可用事惟經後一日男二日女三日男此之外皆不成胎大風大雨大寒大暑陰晦日月蝕皆不可交接所生男女痴聾瘖瘂四體不完矣

搐鼻香　治子宮久冷赤白帶下

牡蠣煅　紫稍花　韶腦　母丁香　黃狗頭骨煅　蛇牀子　破故紙　桂心各等分

右爲細末煉蜜丸如雞頭大臨事用一粒

衛生寶鑑

羅天益著

重刊衛生寶鑑序

醫自軒岐設教其爲天下斯民慮至深遠也然去聖既遠教雖存而不免衰至失眞此所以必又待素傑之士爲之維持發越而後可以永其傳也歷代以來若秦越人淳于意張仲景華元化孫思邈蓋皆其人焉奈何自思邈而下世代益遠所失益甚士之習醫業者各尊所聞行所知假假乎莫知適從矣是故凡遺書所存其處方立論紛紛乖繆或氣運之有遷或經絡之不審或表裏升降而混於所施君子於此不能無譏議焉天慭斯民嗣生素傑而鍾河間張潔古李東垣諸公者挺然復出啓前聖不傳之祕煥然爲後學之模範然當時學者惟眞定羅謙甫氏獨得李氏之正傳故所輯衛生寶鑑一書論病則本於素難必求其因其爲說也詳而明制方則隨機應變動不虛發其爲法也簡而當大抵皆採摭李氏平日之精確者而間驟括以己意旁及於諸家者也江左舊有刻板兵燹不存士大夫家罕有其書雖間有能謄錄者往往病於差繆棄置不省後生曉學殆有未嘗經目者矣吾友院判韓公公達爲予言其幼稚時嘗承先君子復齋先生之訓謂羅氏深得李氏不傳之奧其處方立論不偏於一而於鍼法本草莫不備述實醫家至要之書當謄校其訛舛欲重刊行而未暇汝鑒當維志勿忘也先人沒已久言猶在耳某今幸承運餘閒任醫垣日近聖天子濟光思所以報稱萬一者惟是書爲然恒惜其傳布之不廣迺命醫士錢垣謄寫捐俸贊鳩工鋟木與衆共之子壹爲序嗚呼羅氏之書將翕然爲人所爭誦矣夫李氏之學得羅氏而益明羅氏之書得韓氏而傳播不朽是其嘉惠後學羽翼醫教之盛心爲何如也因不辭而書以爲末序云

永樂十五年歲在丁酉冬十一月癸丑太醫院院判淮南蔣用文書

序

衛生寶鑑者羅謙甫所著之書也謙甫東垣李明之之門人東垣在當時有國醫之目已遠矣奧謙甫蓋升其堂而入其室者發言造詣略類其師有裨於前人之未備書已板行元末毀于兵燹故今少見全籍近年以來間有抄錄之者又多遺逸獨吳郡韓氏家藏爲善本蓋復齋韓公恒補其缺略正其訛誤此書之不廢其有幸矣復齋嘗欲鋟梓以惠於世有志未遂而卒遺命屬其子公達公達拳拳服膺不忘既刻東垣脾胃論及內外傷辨用藥珍珠囊三書已又刻完是書爲費不貲卒成其先人之志閒徵廣文爲序竊觀方書古今不一家其或有非出於良醫師之手集錄往往用之攻失其宜不能收效而反有戕賊人者或方之弊蓋不知醫之誤也大抵醫家著述其說尤難一或失理生死安危在毫忽間爾世或病張長沙著論有大人之病而無嬰兒之患有北方之藥而無南方之治斯苑所謂難也歟今觀謙甫是書備諸證療蓋斟酌古方而參以己意且一一經試用之無不神應如響由基之於射百發百中誠有神於醫道爲不尠矣復齋深究其然乃欲廣其傳以壽斯人於無窮閔世疾苦之心切矣公達克推是心無所違焉果能俾是書之傳如其先人之欲賢哉公達之爲人子也使是書家刻而戶置之其功不亦溥乎窮鄉下邑之士猝然有疾不得良醫師得是書而觀之對證以求方依方而服藥必灑然如祓不至於束手待斃使凡淺之乎爲醫者得是書而觀之於用藥必有所循倣必不至於謬誤其爲惠澤於人者詎可涯乎遂書以爲序以見公達父子之用心也今國家覃至仁以爲治躋斯世斯民於壽域之中而公達之爲蓋有所助也歟公達名夷仕爲太醫院判忠勤端慤小心慎密尤爲上所知遇云

永樂十五年歲次丁酉十二月戊戌

文淵閣大學士兼左春坊大學士奉政大夫廬陵胡廣序

序

吳郡韓公復陽精於醫學嘗以李東垣門人羅謙甫所著衛生寶鑑書加詳考訂將壽諸梓未就而歿公之季子公遠克世其業遺逢聖明仕爲太醫院判嘗持此書語予曰吾將刻之以成先志幸一言以序之予旣諾而未暇爲今年冬公遠亡歿其子布復泣且拜懇求不已予惟上古聖神閔斯民之扎瘥天閼不得以全其壽於是爲之醫藥以濟之厥後名醫世出各以意見著方書聯篇累牘非止一家然用而試之有得有失獨近世東垣所著內外傷辨等篇發前人之所未發故其所著之方靡不神效謙甫受業其門得聞至論其爲此書斟酌損益具載悉備嘉惠於世者厚矣公遠旣精通其藝上承於眷遇下濟於斯人而允惓惓以繼先志爲務此仁人孝子之用心予於公遠素相知於其歿豈能忘言哉世之爲醫者得此書誠如鑑之燭物一舉瞭然在目必不至於差謬凡有疾者觀於此書誠足以衛生不至於危殆然則此書之傳其功不亦博乎遂書以序于後

永樂十五年歲次丁酉十二月戊申翰林院學士奉政大夫兼右春坊右庶子建安楊榮書

序

太醫羅先生學於東垣李君源流於易水張君其道大行懼夫二君之傳久而泯沒也集錄銓次而刻之梓者非一編矣暇日攜成書四帙見示而曰且將板行一序毋吝繼而閱之曰藥誤永鑑者邦前車之覆恐後人蹈之也曰名方類集者古今之方擇之已精詳而錄之使後人有所據依也曰藥類法象者氣味厚薄各有所用證治增損欲後人信之也曰醫驗紀述者遇如是病用如是藥獲如是效使後人愼之也大抵皆仁者之用心抑論之天下之事辨之不明固有似是而非利於此而害於彼者況醫之爲道

陰陽虛實千狀萬態神聖工巧存乎其人合四者而一之名曰衛生寶鑑夫鑑之本明其應物也無心乎妍醜而妍醜莫能揜得是書者誠能習而讀之玩而味之了然於心而無疑一旦臨用如鑑之虛明物來而應若妍若醜無纖毫之差其用豈不博哉不然未用時置之高閣倉卒間但備檢閱殆有辨之不明似是而非其所失不啻霄壤詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視之猶以爲遠殆非先生垂示後人之意也

至元辛巳冬至日鄭城硯堅題於卷首

序

夫醫與造化參學之精者爲難至著書垂訓冀後世必然之用者爲尤難羅君謙甫東垣先生之高弟嘗謂予言初受餅席下東垣先生曰汝將爲爲人之學歟問道之士乎請曰愚雖不敏幸蒙先生與教理之深指乃所願也故十數年間雖祁寒盛暑親炙不少輒眞積力久盡傳其私淑不傳之妙大抵人之疾疢不外乎陰陽變徵我能參兩間會一身推窮其所受根源方爲可爾用是以所得曰用之間如敵在目中然後審藥爲攻未嘗不如吾之所必取也因集爲一書題曰衛生寶鑑曰辨誤者證世之差謬明其理之所自也曰擇方者別夫藥之精粗寒暑以酌其疾證之宜否也曰紀驗者述其已之治療與彼之深淺見其功效之實也僕平昔所得者如是吾子其爲我序之余聞醫之爲學古聖賢致知格物之一端也軒岐以來難素靈樞等書累千萬言自非以醫爲任者孰克而究之若羅君者可謂以醫爲任而究其理之所自歟昔王彥伯醫聲旣著列三四竈煮藥於庭老幼塞門來請彥伯曰執者飲此寒者飲此風者氣者各飲此初不計其酬謝今羅君亦以道心濟物復能著書垂後冀必然之用其仁心普濟當以彥伯同流其誰曰不然故樂爲題其端云

至元癸未清明日中議大夫治書侍御史汲郡王惲序

自啓

天益上東垣先生啓曰切以射不師於后羿豈能成蹕日之功匠非習於公輸未易登運雲之構惟此醫藥之大關乎性命之深若非擇善以從之爲得過人之遠矣茲者復遇先生聰明夙賦穎悟生資言天者必有驗於人論病者則以及於國驅馳藥物如孫吳子用兵條派病源若神禹之行水是以問病而證莫不識投藥而疾靡不瘳有元化滌胃之神功得盧扁起人之手段猶且謙以接物莫不忠於教人□□□□□□□□幼承父訓俾志學於詩書長值危時遂苟生於方技然以才非卓犖性實顓

蒙恐貽口人之譏常切求師之志幸接大人之餘論始悉
童子以何知即欲敬服弟子之勞親炙先生之教朝思夕
誦日就月將其奈千里孑身一家數口內口生涯之逼外
爲官長之拘不得免焉是以難也今乃謹修薄禮仰瀆嚴
顏伏望憐鄙夫之問爲之竭爲見互鄉之童與其進也使
得常常之見得闇昧昧之思若味親糟粕之餘是賜獲上
山之重過此以往未知所裁謹啓

卷一 藥誤永鑑
春服宜藥辨　夏服宜藥歌
無病服藥辨　古方名實辨
承氣湯辨
陰盛陽虛汗之則愈下之則死
陽盛陰虛下之則愈汗之則死
汗多亡陽　下多亡陰
方成弗約之失
卷二 藥誤永鑑
灸之不發　脫營
瀉火傷胃　肺痿辨
下工絕氣危生　酸多食之令人癃
冬藏不固　主勝客則逆
用藥無據反爲氣賊
卷三 藥誤永鑑
主不明則十二官危　時氣傳染
戒妄下　輕易服藥戒
妄投藥戒　禍醫治病
卷四 名方類集
飲食自倍腸胃乃傷論
食傷脾胃論
枳朮丸　橘皮枳朮丸
半夏枳朮丸　木香枳朮丸
木香化滯湯　丁香爛飯丸
消滯丸　煮黃丸
木血積榔丸　上二黃丸
消積集香丸　枳殼丸
開結妙功丸　感應丸
備急丹　瓜蔕散

枳實梔子大黃湯　金露丸
飲傷脾胃論
飲傷脾胃方
葛花解酲湯　法製生薑散
薔香散　快氣湯
五苓散　大七香丸
小七香丸　枳朮湯
木香槟榔丸　導飲丸
痛飲枳實丸　神應丸
飲食自倍腸胃乃傷治驗
卷五 名方類集
勞倦所傷虛中有寒
理中丸　建中湯
育氣湯　養胃進食丸
寬中進食丸　和中丸
安胃丸　補中丸
加減平胃散　羅禾散
白朮散　緩中丸
沈香醒甲散　十華散
沈香溫脾湯　厚朴溫中湯
雙和湯　小沈香丸
木香分氣丸　木香餅子
法製陳皮
溫中益氣治驗
參朮調中湯
勞倦所傷虛中有熱
桂枝加龍骨牡蠣湯　黃芪建中湯
人參黃芪散　槟斷湯
柴胡散　參芪醒甲散
人參地骨皮散　地仙散

調中益氣湯　當歸補血湯
犀角紫河車丸　人參柴胡散
清神甘露丸　雙和散
四君子湯　豬肚丸
酸棗仁丸　定志丸
麥煎散　獨聖散
溫粉
虛中有熱治驗
卷六名方類集
瀉熱門
上焦熱　龍膽雞蘇散
涼膈散
洗心散
中焦熱
調胃承氣湯　瀉脾散
貫衆散
下焦熱
大承氣湯　三才封髓丹
滋腎丸
氣分熱
柴胡飲子　白虎湯
血分熱
桃仁承氣湯　清涼四鳳飲子
通治三焦甚熱之氣
三黃丸　黃連解毒湯
發狂辨
陽證治驗
除寒門
上焦寒　桂附丸
鐵刷湯

胡椒理中丸　附子理中丸
二氣丹　大建中湯
下焦寒
八味丸　建少丹
天真丹
氣分寒
桂枝加附子湯　桂枝新加湯
血分寒
巴戟丸　神珠丹
通治三焦甚寒之氣
大巳寒丸　四逆湯
陰證治驗
陰氣有餘多汗身寒
卷七名方類集
中風門
中風論
小續命湯　麻黃續命湯
桂枝續命湯　白虎續命湯
葛根續命湯　附子續命湯
桂枝附子續命湯　羌活連翹續命湯
大秦艽湯　三化湯
羌活愈風湯　四白丹
二丹丸
中風雜說
天麻丸
中風見證
瀉青丸
中風刺法
大接經從陽引陰治中風偏枯
大接經從陰引陽治中風偏枯

中風鍼法
半身不遂　失音不語
黃帝灸法　獨聖散
卷八名方類集
中風灸法
灸風中脣口眼喎斜　灸風中腑手足不遂等疾
灸風中臟氣塞涎上不語昏危者下火立效
風中血脈治驗
秦艽升麻湯　犀角升麻湯
加減沖和湯　當歸連翹湯
玄參升麻湯　牢牙散
清肺飲子　潤腸丸
益氣調榮湯
風中腑諸方
大通聖白花蛇散　犀角防風湯
木香丸　續命丹
疏風湯　趁風膏
風中臟諸方
活命金丹　玉賣丹
玉壺保命金丹　牛黃通膈湯
詞子湯　正舌散
挾神散　勝金丹
分涎散
風邪入肝
眞珠丸
風中臟治驗　獨活湯
治風雜方
祛風丸　輕骨丹
當歸龍膽丸　風藥聖餅子

烏荊丸　搜風潤腸丸
澡洗藥　拈痛散
卷九名方類集
諸風門
風癇
龍腦安神丸　治癇疾
神應丹　珠了辰砂丹
參珠丸　烏龍丸
神應丹　墜痰丸
治風癇及心風病　琥珀麝星丸
法煮草麻子
驚癇治驗
沈香天麻丸
破傷風諸方
烏梢散　硃砂丸
天麻丸
癘風論
樺皮散　灸承漿穴法
淩霄散　四聖保命丹
祛風散　柏葉湯
烏龍散　神效天麻湯
換肌散　如聖散
醉仙散　加減何首烏散
癘風刺法並治驗
補氣瀉榮湯
鶴膝風方
蚺蟮丸
頭痛門並治法方
救苦神白散　川芎散
石膏散　川芎神功散

伏苓半夏湯　孔香瓊落散
濟空膏　白虎加白芷湯
石膏散　如聖散
半夏茯苓天麻湯　川芎散
氣虛頭痛治驗
順氣和中湯
頭面諸病
頭風論并方
人參消風散　龍腦芎犀丸
清神散
雷頭風方
清傷湯
后骨痛方
惡奇湯
時毒疙瘩方
漏蘆湯　消毒丸
胃虛面腫方
胃風湯
面熱治法并方
升麻加黃連湯
升麻湯辨
陰出乘陽治法并方
沖和順氣湯
卷十名方類集
眼目諸病方
金露膏　加味春雪膏
重明散
夜光散　碧霞丹
魚膽丸　搬雲散
遲睛散　甘菊花丸

五秀重明散　煮肝散
龍腦飲子　助陽活血湯
灸雀目瘖眼法
鼻中諸病方
防風湯　犀角地黃湯
生地黃湯　地黃散
三黃補血湯　清肺飲子
治鼻衄不止法　寸金散
麥門冬飲子　醍澤通氣湯
輕黃散　鉛紅散
耳中諸病方
燒腎散　犀角散
茯神散
耳卒聾諸方
蒲黃膏　龍腦膏
聤耳諸方
禹餘糧丸　松花散
白連散　紅綿散
耳中生瘡諸方
曾青散　黃連散
黃芪丸　蒼術挺子
通耳丹　蚰蜒入耳方
蝍蛆入耳方　飛蛾入耳方
蟻入耳方　一切蟲物入耳口氣吸方
卷十一名方類集
咽喉口齒門
龍腦聚聖丹　祛毒牛黃丸
硃砂膏　碧玉散
發聲散　玄參散
增損如聖湯　二奇湯

玉粉丸　開關散
備急如聖散　解毒雄黃丸
肺熱喉腥治驗
加減瀉白散
口瘡論并治法方
胡黃連散　綠袍散
黃連升麻散　多孝散
紅芍藥散　遠山牢牙散
玉池散　救苦散
華撥散　驅香散
乳香丸
卷十二名方類集
咳嗽門
咳嗽論
人參款花散　紫參散
九仙散　人參蛤蚧散
人參清肺湯　人參款花膏
紫參半夏湯　款花清肺散
人參理肺散　紫團參丸
團參散　安肺散
馬兜鈴丸　人參半夏丸
人參清鎮丸　金珠化痰丸
化痰玉壺丸　皁角化痰丸
延壽丹　大阿膠丸
恩袍散　地血散
五味黃芪散　透羅丹
大利膈丸　全真丸
槐角利膈丸　滌痰丸
木香半夏丸　太白丹
桔梗湯　定喘餅子

盛則爲喘治驗
平胃散　加減瀉白散
嘔吐呃逆
藿香安胃散
丁香柿蒂散
灸一切呃逆法
消渴
生津甘露飲子
酒蒸黃連丸
參苓飲子　麥門冬飲子
麥門冬湯　冬瓜飲子
辨六經渴
膽癉治驗
龍膽瀉肝湯
卷十三名方類集
瘡腫門
保生鍼子
千金托裏散
二仙散
剋效散
翠玉膏
五利大黃湯
復元通氣散
內消丸
五香連翹湯
赤芍藥散
乳香丸
拔毒散
桃紅散
玉龍膏
善應膏
神聖膏
破官丹
太乙膏
玉燭散
黃連消毒湯
內消升麻湯
乳香消毒散
竹葉黃芪湯
五香湯
金銀花散
水澄膏
龍腦追毒丹
木香散
司馬溫公解毒膏
大紅膏

消毒膏　綠白膏
冰霜散　如神散
黃連散
瘡總論
汗之則瘡已
托裏溫經湯
凡治病必察其下
捨時從證
托裏溫中湯
打撲損傷從高墜下
當歸導滯散　復元活血湯
聖靈丹　神效接骨丹
乳香散　五黃散
紫金丹　乳香神應散
花藥石散　涌鐵膏
萬聖神應丹　神聖膏
烏翎散　黃石膏
刀箭藥
疣瘤疥癬皺揭附
井金散　黃龍膏
生肌膏龍膏　敗土黃散
灸瘡子法　枯瘤膏
寶金散　海帶丸
海藻撥堅丸　何首烏散
蒲茹散　苦參散
硫黃散　狗脊膏
柏脂膏　祛濕散
苦參丸　玉粉散
七寶散　潤肌膏
頰腫門

梔子豉湯　硃砂安辰丸
八物定志丸
胸膈痞
人參利膈丸　桔梗枳殼湯
赤茯苓湯　通氣湯
膈氣噎
桂香散　丁香附子散
漢防已散　紅豆丸
心下痞
大黃黃連瀉心湯　大消痞丸
枳實理中丸　三脘痞氣丸
枳實消痞丸
藥戒
心胃痛及腹中痛
草豆蔻丸　神保丸
丁香止痛散　失笑散
二薑丸　七氣湯
益智散　茱萸丸
高良薑湯
胃脘當心而痛治驗
扶陽助胃湯

卷十四 名方類集

腹中積聚
硇砂煎丸　仙方香棱丸
木香硇砂煎丸　温白丸
雞爪三棱丸　青鹽丸
玄胡丸　破積導飲丸
木香三棱湯　乾柿丸
神效五食湯丸　磨積三棱丸
聖散子　荆蓬煎丸

醋煮三棱丸　沈氣丸
廣茂潰堅湯　治積要法
養正積自除
腹中諸蟲
烏梅丸　化蟲丸
補金散　雷金散
化蟲散
請瀉腫滿
沈香海金砂丸　海金砂散
積墮子丸　聖靈丹
赤茯苓丸　人參葶藶丸
海藻散　白丸子
除濕丹　三花神祐丸
十棗湯　葶藶木香丸
木香通氣丸　神祕湯
消痞丸　無礙丸
香蘇散　五皮散
牡蠣澤瀉散
胃氣爲本
導滯通經湯
黃疸論
茵陳蒿湯　硝石礬石散
梔子大黃湯　茵陳五苓散
太黃硝石湯　黃連散
喘鼻瓜蒂散
食勞疸黃
膽礬丸　棗礬丸
五疸丸　茯苓滲濕湯
穀疸治驗
茯苓梔子茵陳湯

卷十五 名方類集

諸腰痛筋骨冷疼
木瓜虎骨丸　茗葱丸
活血應痛丸　左經丸
神應丸　烏鯉丸
乾效餅子　獨活寄生湯
獨活湯　薏苡仁湯
防已黃芪湯　灸腰痛法
張仲文傳神仙灸法
病氣痛及腰痛膝無力及挫擊證
控引睪丸　蒺藜湯
茴香楝實丸　丁香楝實丸
沈香鹿茸丸　三白散
葫蘆巴丸　川苦楝散
病氣治驗
消痞丸　天台烏藥散
沈香桂附丸
陰毒傷寒
玉霜丸　迴陽丹
手陽丹　王海藏己寒丸
白淫諸證
內補鹿茸丸　茯兎丸
金箔丸　珍珠粉丸
補眞玉露丸　王瓜散
府判補藥方

卷十六 名方類集

泄痢門
泄痢論
芍藥黃芩湯　大黃湯
芍藥湯　白朮黃芩湯
漿水散　桂枝湯

白虎湯
溢飲
灸大椎穴法
濡泄
對金飲子
飧泄
加減木香散
痢疾
堅中丸
純陽眞人茱萸丸
水煮木香膏
白朮安胃散
聖餅子
南白膠香散
荳蔻煨腸丸
玉粉散
玉粉丹
桃花丸
玄靑丸
阿膠梅連丸
四時用藥例
芍藥樂皮丸
加減平胃散
黃連阿膠丸
訶黎勒丸
朝蘄丸
陳麴丸
麴朮丸
胸風湯
當歸和血湯
陰陽皆虛灸之所宜
結陰便血治驗
平胃地榆湯
葱熨法治驗
霍亂吐瀉
香薷散
增損補脾飲
半夏湯
中暑霍亂吐利治驗
內傷霍亂治驗
桂苓白朮散
桂苓甘露飲

宣明益元散
附錄聖惠治霍亂吐瀉方
瘧病脈證并治
鼈甲煎丸
柴胡桂薑湯
柴胡去半夏加括蔞根湯
白虎加桂枝湯
蜀漆散
牡蠣湯
一剪金
劫效餅子
溫脾散
常山飲子
草果飲子
交加雙解飲子
瘴瘧治驗
辰砂丹
卷十七名方類集
腸風痔漏門
腸風痔漏論
乳香丸
棗芫蒼朮湯
釣腸丸
神應黑玉膏
淋漓地榆散
淋漓藥
淋漓雞冠散
結陰丹
淋漓葱靈仙散
蒲黃散
椿皮散
大便
潤腸丸
脾約麻仁丸
犀角丸
當歸潤燥湯
七聖丸
七宣丸
麻仁丸
槐角丸
厚朴湯
神功丸
牛硫丸
蜜導煎
胞痺論
茯苓丸
巴戟丸
腎瀉湯
八正散
石葦散
白花散

治小便不通方
黃芩清肺湯
滋陰化氣湯
紅秫散
立效散
海金砂散
琥珀散
葵花散
灸小便不通方
淋痛治驗
參苓琥珀湯
水芝丸
小便數而欠
茯苓琥珀湯
卷十八名方類集
婦人門
調經順氣
加減四物湯
逍遙散
溫經湯
黃芪白朮湯
異方油煎散
活血丹
滋血湯
增損四物湯
當歸丸
玄胡苦楝湯
師尼寡婦異乎妻妾之治
通經丸
生地黃丸
熱地黃丸
熱入血室證治并方
小柴胡加地黃湯
海蛤散
姙娠養血安胎
半夏茯苓湯
茯苓丸
保安白朮散
安胎阿膠散
安胎白朮散
吳茱萸湯
前胡湯
黃龍湯
保安散
立聖散
赤茯苓散
犀角散
大寧散
火龍散

聖酒方　獨聖散
萬應丸
難產
催生丹　榆白皮散
獨勝散　黑神散
下死胎方
產後扶持榮衛
當歸建中湯　芎歸湯
犀角飲子　牡丹皮散
枳殼丸　通和湯
鍼乳藥法　涌泉散
勝金丹
脾翠論治併方
睛露丸　木香通氣散
石痕論併治方
見睍丸　和血通經湯
和血通經丸　木香硇砂丸
血極膏　藝藥散
崩漏帶下
膠艾湯　伏龍肝散
丁香膠艾湯　柴胡調經湯
涼血地黃湯　益胃升陽湯
升陽舉經湯　備金散
寸金散　蛜蝛散
加減四物湯　酒煮當歸丸
升陽燥濕湯　當歸附子湯
桂附湯　白芍藥散
火龍丹　灸崩漏及諸疾法
中氣不足治驗
溫中益氣湯

腰脚治驗
木香順氣湯
痢氣治驗
當歸四逆湯
卷十九名方類集　灸中庭穴法
小兒門
時氣溫疫外傷風寒
升麻葛根湯　惺惺散
人參生犀散　大青膏
天麻防風丸　塗頂法
浴體法　紫霜丸
消積丸　厚腸丸
五臟熱及肌熱
瀉青丸　導赤散
瀉黃散　瀉白散
地骨皮散　生犀散
論宣風瀉白散
喘促胸痺
奪命散　無價散
閻孝忠辨急慢驚風
探古老人辨急慢驚風
急驚
利驚丸　地黃丸
安神丸　妙香丸
小抱龍丸　鎮肝丸
天麻散　灸急驚法
慢驚
史君子丸
宣風散　鉤藤飲子
光活膏
灸慢驚及臍風撮口等疾
異功散

癖積痞瘦
燒青丸　三棱煎丸
青礞石丸　龜甲豬肚丸
魁效聖餅子　廣茂化癖丸
橘皮丸　廣茂濕堅丸
聖效透肌散
灸癖積法
癖積治驗
塌氣丸
痞瘦
丹砂丸　神效荳蔻丸
蘆薈丸　肥兒丸
橘連丸　灸痞瘦法
咳嗽
辰砂半夏丸
人參半夏丸　潤肺散
吐瀉病疾　塗脂膏
丁香散　玉露散
益黃散　荳蔻散
白朮丁香散　立效散
玉液散　如聖丸
灸吐乳法　荳蔻香連丸
白附子香連丸　小香連丸
沒石子丸　赤石脂散
灸吐瀉肛法
雜醫諸方
黃芪散　豬尾膏
白菊花散　黃雙散
瀛青膏　絳玉散
勝金散　千金膏
軟青膏　羊蹄散

麝香散
小兒季夏身熱痰黃治驗
加減瀉黃散
卷二十 名方類集
雜方門
八毒赤丸　蟬花散
定風散　治食諸魚骨鯁久不出法
烏白散　雄黃消毒膏
聖核子　復生散
衣香方　八白散
瑩肌如玉散　面油摩風膏
乾洗頭藥方　出油龍粉散
出油白粉散　取字法
鍼法
流注指要賦　離合眞邪說
四時深淺補瀉法　寒熱補瀉法
灸法補瀉　逆度量權衡法
求寸法
卷二十一 藥類法象
味厚薄寒熱陰陽升降之圖
味厚薄寒熱陰陽升降之圖
升降者天地之氣交　藥性要旨
用藥升降浮沈補瀉法　臟氣法時補瀉法
君臣佐使法　治法綱要
抑畏辨　用藥用方辨
藥味專精
卷二十二 醫驗紀述
北方下痢腳氣論　北方腳氣治驗
當歸拈痛湯
病有遠近治有緩急　腑寒治驗
加減白通湯

肝勝乘脾
黃芪建中湯
風痰治驗
天麻半夏湯　用路總管古風一首
卷二十三 醫驗紀述
上寒下熱治驗
既濟解毒湯
陽證治驗　陰黃治驗
茵陳附子乾薑湯
肢節腫痛治驗
大羌活湯
中寒治驗
附子溫中湯
時不可違
黃芪建中湯
卷二十四 醫驗紀述
陰證陽證辨　解惑
執方用藥辨　汗多亡陽變證治驗
人參益氣湯
用熱違熱從乎中治　病宜早治
補遺
外感傷寒等證
表證
芎芷香蘇散　局方三拗湯
局方金沸草散　局方消風百解散
局方葛根解肌湯　局方敗毒散
局方十神湯　十味芎蘇散
黃連解毒湯　深古涼膈散
宣明雙解散　啓源白虎湯
仲景小柴胡湯

裏證
仲景大柴胡湯　仲景調胃承氣湯
仲景小承氣湯　仲景大承氣湯
啓源三一承氣湯　三因治中湯
半表半裏證
小柴胡湯方見前　大柴胡湯方見前
外感有內傷證
局方人參養胃湯　局方參蘇散
局方藿香正氣散　小柴胡湯方見前
活人書小柴胡加芒硝湯
外感傷寒極證
陽證
調胃承氣湯方見前
陰證
仲景四逆湯　活人書惡寒法
陽證似陰
白虎湯方見前　小承氣湯方見前
陰證似陽
四逆湯方見前於方中加葱白　仲景乾薑附子湯加人參
仲景白通加豬膽汁湯
表裏雜證
煩躁
陽證
大柴胡湯方見前　調胃承氣湯方見前
黃連解毒湯方見前　活人書三黃瀉心湯
仲景竹葉石膏湯
陰證
四逆湯加葱白方見前　白通加豬膽汁湯方見前
人參三白湯　三四無憂散
舌胎

陽證
白虎湯加人參方見前
陰證
四逆湯方見前
譫語
陽證
大柴胡湯方見前
調胃承氣湯方見前
小柴胡湯方見前
陰證
四逆湯方見前
鄭聲
陽證
人參三白湯方見前
陰證
四逆湯方見前
呃逆
陽證
小柴胡湯方見前
活人書橘皮竹茹湯
丁香柿蒂湯加人參
人參三白湯加竹茹方見前
八物湯加竹茹
陰證
四逆湯加人參方見前
發黃
陽證
仲景茵陳蒿湯
茵陳五苓散
仲景梔子檗皮湯加茵陳
陰證
茵陳四逆湯
茵陳茯苓湯
茵陳四逆湯加當歸木通
發斑

陽證
三因立參升麻湯
陰證
大建中湯
發狂
陽證
調胃承氣湯方見前
陰證
乾薑附子湯加人參方見前
脈逆
陽證
白虎湯方見前
雙解散方見前
陰證
通脈四逆湯方見前
白通加豬膽汁湯方見前
多汗
陽證
王海藏黃芪湯
陰證
四逆湯加人參方見前
結胸
活人書枳實理中丸
仲景小陷胸湯
心下痞
仲景半夏瀉心湯
枳實理中丸方見前
嘔
陽證
小柴胡湯方見前
白虎加人參湯方見前
四逆湯方見前
仲景生薑瀉心湯
仲景大陷胸湯
當歸四逆湯方見前
麻黃附子甘草湯

陰證
四逆湯方見前
吐
陽證
活人書小半夏加茯苓湯
活人書小半夏加橘皮湯
仲景乾薑黃芩黃連人參湯
陰證
四逆湯方見前
下利或下膿血
陽證
仲景黃芩湯
陰證
仲景理中湯
白通湯方見前
衄血
活人書犀角地黃湯
吐蚘
仲景理中丸
煩滿囊縮
當歸四逆湯方見前
代灸塗膏
頭大
試效方普濟消毒飲子
瘧後勞復
小柴胡湯方見前
柰矩三和湯
陰陽易
燒裩散
仲景當歸四逆湯
仲景黃連阿膠湯
四逆湯方見前
吳茱萸生薑湯
仲景烏梅丸
仲景通脈四逆湯
三因橘皮湯
三因溫膽湯
活人書青竹茹湯

活人書當歸白朮湯
內傷似外感證
始爲熱中病似外感陽證
補中益氣湯
末傳寒中病似外感陰證
神聖復氣湯　白朮附子湯
草豆蔻丸
似外感陽明中熱證
清暑益氣湯
似外感惡風寒證
補中益氣湯方見前
似外感雜證
小建中湯　大建中湯
長夏濕熱胃困
清暑益氣湯方見前　五苓散
縮脾飲　枇杷葉散
桂苓甘露飲　黃連香薷湯
消暑十全飲　六和湯
大順散　益元散

元羅天益謙甫著　三原李錫齡孟熙校刊

春服宜藥辨

戊申春先師東垣老人論春月奉生之道月令云是月也不可以稱兵稱兵必天殃毋孩蠃胎夭飛鳥毋伐山林又云祭先脾孟春行冬令則首種不入行秋令則民大疫故國有春分停刑之禁十二經有取決於膽之戒仲景云大法春宜吐故少陽體禁下宜小柴胡湯和解之少陽用事萬物方生折之則絕生化之源此皆奉生之道也有假者反之且春初服宜藥者迺伐天和而損脾胃非徒無益而又害之予因演先師之論著爲此論世傳宜藥以牽牛大黃之類或丸或散自立春後無病之人服之輒下數行云凡人於冬三月厚衣煖食又近於火致積熱於內春初若不宜泄必生熱疾又云解三焦積熱去五臟餘毒殆無此理方冬嚴氣凝寒厚衣煖食近火所以敵天氣之寒也冬裘夏葛冬飲湯而夏飲水皆自然之道何積熱於內而生疾乎且陰陽偏勝則疾果三焦積熱是陽亢陰絕豈有得生之理哉故難經云腑病易治臟病難愈邪氣中臟病之極矣今言五臟俱有邪毒則神將何依內經亦曰春三月此謂發陳天地俱生萬物以榮夜臥早起廣步於庭被髮緩形以使志生生而勿殺予而勿奪賞而勿罰此春氣之應養生之道也逆之則傷肝夏爲寒變奉長者少又曰必先歲氣無伐天和故智者之養生也必順四時適寒溫和喜怒而安居處節陰陽而調剛柔如是則邪僻不至又曰若天之氣清淨則志意治順之則陽氣固雖有賊邪弗能害也失之則內閉九竅外壅肌肉衛氣散解此謂自傷氣之倒也當少陽用事萬物向榮生發之時惟當先養脾胃之氣助陽退陰應乎天道以使之平今反以北方寒水所化氣味俱厚苦寒之劑投之是行肅殺之令於奉生之月當升反降伐脾胃而走津液使營運

之氣滅削其不能輸精皮毛經絡必矣奉長之氣從何而生臟腑何所以稟受脾胃一衰何病不起此誅罰無過是謂大惑無病生之有病甚之所謂春服宜藥者自軒岐而下歷代明醫俱無是說嗚呼此理明白非難知也世多雷同莫革其弊深可痛哉凡有志保生者但以聖賢之言爲準則可免疑誤之悔夭折之禍矣

革春服宜藥歌

天與聖人同一體長養萬物不宰利黃帝內經福萬世惟恐生民觸邪氣調神四氣謹依行身體康強無病滯去聖逾遠醫道衰誰解非非而是是初春宜藥服寒涼無故令人遭疾癘腸鳴腹痛下數行脾土既衰復損胃周身百脈失經常安樂身中強生事少陽用事物向榮一夜風霜反凋弊春不生榮秋不收奉養之氣從何至四時失序化難成血氣一衰神不熾主明下安養生昌心不明時災患纏哀哉此理久不明故以言理革其弊保生君子勿他求當向內經求聖意

無病服藥辨

諺曰無病服藥如壁裏安柱此無稽之說爲害甚大夫天之生物五味備焉食之以調五臟過則生疾故經云陰陽所生本在五味陰之五宮傷在五味又曰五味入胃各道其所喜攻酸先入肝辛先入肺苦先入心甘先入脾鹹先入腎久而增氣氣增而久夭身之由也又云酸走筋辛走氣苦走骨鹹走血甘走肉五味口嗜而欲食之必自裁制勿使過焉至於五穀爲養五果爲助五畜爲益五菜爲充氣味合而食之補精益氣倘用之不時食之不節猶或生疾況藥乃攻邪之物無病而可服焉聖濟經曰彼修眞者蔽於補養輕餌藥石陽劑剛勝積若燎原爲消狂癲疝之屬則天癸竭而榮涸陰劑柔勝積若凝冰爲洞泄寒中之屬則眞火微而衛散一味偏勝一臟偏傷一臟既傷四臟安得不病唐孫思邈言藥勢有所偏勝令人臟氣不平戮

濟陳唐憲宗曰夫藥以攻疾非朝夕常用之物況金石性酷烈有毒又加煉以火氣非人五臟所能禁至於張皐謙穆宗曰神慮濟則氣血和嗜欲多而疾疢作夫藥以攻疾無疾不可餌故昌黎伯銘李子之墓曰余不知服食說自何世起殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也今直取目見親與之游而以藥敗者六七公以爲世誡工部尚書歸登殿中御史李虛中刑部尚書李遜弟刑部侍郎建襄陽節度使工部尚書孟簡東川節度使御史大夫盧植金吾將軍李道古今又復取目見者言之僧閻仲章服火煉丹砂二粒頃出小瘡腫痛不任牙痒不能嚼物服涼膈散半斤始緩後飲酒輒發藥以寒涼之劑則緩然身不能動人李潤之身體肥盛恐後風疾至春服搜風丸月餘便下無度飲食減少舌不知味口乾氣短腹脹足脛冷眩運欲倒面色青黃不澤日加困篤乃告親知曰妄服藥餌悔將何及後添煩躁喘滿至秋而卒張秀才者亦慕方士之說服四生丸推陳致新服月餘大便或溏或瀉飲食妨阻忽精嗜夙目見黑花耳聞蟬聲神虛頭旋飄飄然身不能支至是方知藥之誤也遂廢飲食俟起居權於保養三二年間其體猶存踰十年後方平復劉氏子聞人言風月晨飲涼水一杯一月至春而無目疾遂飲之旬餘覺腹中寒痛不任咳嗽唾吐全不思食惡水而不欲見[illegible]前遂醫以除寒燥熱之劑急救之終不能效此皆無故求益生之祥反生病禍或至於喪身殞命壁裏安柱果如何哉且夫高堂大廈梁棟安基址固堅塗毀壁柱於壁中甚不近人情潔古老人云無病服藥乃無事生事此誠不易之論人之養身幸五臟之安泰六腑之和平薰於攝生春夏奉以生長之道秋冬奉以收藏之理飲食之有節起居而有常少思寡慾保惜虛無精神內守此無病之時不藥之藥也噫彼數人者既往不咎矣後人當以此爲龜鑑乎

古方名實辨

仲景以小柴胡治少陽證曰苦舌乾往來寒熱而嘔蓋柴胡味苦寒爲佐治發熱口苦生薑辛溫半夏辛熱治發寒而嘔人參甘溫安胃和中大棗甘平溫和陰陽調榮衛生津液使半表半裏之邪而自解矣大承氣湯治陽明本實痞滿燥實枳實苦微寒泄痞厚朴苦溫除滿芒硝辛寒潤燥邪入於腑而作熱實以大黃苦寒下者治導之令內外入邪一方治之有此理乎內經云調氣之方必別陰陽內者內治外者外治故仲景云且除其表又攻其裏言仍似是其理實違其是之謂歟如搜風丸祛風丸有搜風祛風之名無搜風祛風之實百解散亦此類也醫云看方三年無病可醫寒病三年無藥可用此亦名實不相輔故也噫去聖逾遠其術晦昧人自爲法無可考證昔在聖人垂好生之德若本草作內經仲景遵而行之以立方號軍方之祖後之學者以仲景之心爲心庶得制方之旨

承氣湯辨

仲景傷寒論云寒邪外陽傳而入裏裏者入胃是也邪氣入胃則發而爲熱胃中之氣鬱滯糟粕祕結壅而爲實實則瀉之人所共知如緩急輕重之劑則臨時消息焉若不惡寒反惡熱諸語頻瀉腹滿而喘手足濈然汗出者急下之宜大承氣湯如邪氣入深恐有燥屎欲知之法與小承氣湯試之若腹中轉失氣者有燥屎也乃可攻之不轉失氣者必初硬而後溏尚未可攻攻之則腹滿不能食若腹大滿不通者亦以小承氣湯微和其胃氣勿令大泄也如發汗後不惡寒但熱者胃實也當和其胃氣調胃承氣湯主之成無已云大熱結實者大承氣小熱微結者小承氣以熱不甚大故於大承氣湯內去芒硝又以結不至堅故不減厚朴枳實也如不至大堅滿邪氣盛而須攻下者亦未可投大承氣湯必以輕緩之劑攻之於大承氣湯中去厚朴枳實加甘草乃輕緩之劑也若大承氣湯反用調胃

之酒製者爲因用熱散氣升而作汗解矣因以承氣名之錢仲陽以升麻湯治小兒痘喉不時陽明經受邪身熱目疼鼻乾不得臥及瘡疹未發發而不勻升麻苦平葛根甘平解散外邪甘草甘溫芍藥酸微寒調和中氣拒邪不能傷其裏白朮散治小兒陽明本虛陰陽不和吐利後而亡津液虛熱口乾人參甘草白朮甘溫和中補胃藿香木香辛溫芳馨可以助脾茯苓甘平分陰陽而導其濕葛根甘平倍於衆藥其氣輕浮鼓舞胃氣上行生津液而解肌熱局方加四物湯調榮養衛益氣滋血當歸辛溫熟地黃甘溫能滋血川芎辛溫白芍藥味酸微寒能養氣益血爲榮氣爲衛四物相合故有調益滋榮之實黃芪建中湯治面色痿黃腑腹急痛脾胃不足者肝木乘之也木勝其中土走於外故痿黃見於面難經曰其平和不可得見衰乃見耳黃芪甘草甘溫能補脾土芍藥之酸能瀉肝木木挾木勢亦來侮土故作腑腹急痛官桂辛熱散其寒水生甚大棗餳飴甘大溫益氣緩中又與脾胃行其浸液以養四臟建脾制水補子瀉母使四臟各安其氣必清必淨則病氣衰主建中之名亦不誣矣右數方藥證相對名實相輔可垂法於世近世用雙解散治風寒暑濕飢飽勞逸所無此理且如風邪傷衛必自汗而惡風寒邪傷榮必無汗而惡寒又云傷寒傷風其證不同中暑自汗必身熱而氣虛中濕自汗必體疼而沈重且四時之氣更傷五臟一往一來未有齊至者也飢則損氣飽則傷胃勞則氣耗逸則氣滯其證不同治法亦異蓋勞者溫也損者補之逸者行之內傷承氣湯治之則邪氣不散小承氣湯證反用大承氣湯下之則遏傷正氣而腹滿不能食故有勿大泄之戒此仲景所以分而治之未嘗越聖人之制度後之學者以此三藥合而爲一且云遲治三藥之證及無問傷寒雜病內外一切所傷一藥治之若依此說與仲景之方甚相遠背又失軒岐緩急之旨紅紫亂朱迷惑聽一唱百和使病

者暗受其弊將何訴哉有公心審是非者於內經仲景方內求責使藥證相對以聖賢之心爲心則方之眞僞自可得而知矣

陰盛陽虛汗之則愈下之則死

仲景云陰盛陽虛汗之則愈下之則死者此言邪氣在表之時也夫寒邪屬陰身之外者屬陽且夫各臟腑之經絡亦屬陽也蓋陽氣爲衛衛氣者所以溫分肉充皮毛肥腠理司開闔此皆衛外而爲固也或煩勞過度陽氣外損不能衛固陽爲之虛陽虛者陰必勝之故陰得以勝邪氣勝則實陰盛陽虛者此也陰邪既盛腠理緻密陽氣伏鬱不得通暢所以發熱惡寒頭項痛腰脊強應解散而藥用麻黃者本草云輕可去實葛根麻黃之屬是也蓋麻黃能退寒邪使陽氣伸越作汗而解故曰陰盛陽虛汗之則愈裏氣和平而反下之中氣既虛表邪乘虛而入由是變證百出故曰下之則死外臺祕要云表病裏和汗之則愈下之則死正此意也

陽盛陰虛下之則愈汗之則死

仲景云陽盛陰虛下之則愈汗之則死者此言邪氣在裏之時也夫寒邪始傷於表不解而漸傳入於裏變而爲熱入之身在裏者爲陰華陀云一日在皮二日在肉三日在肌四日在胸五日在腹六日在胃入胃謂之入腑也腑之爲言聚也若府庫而聚物爾又爲水穀之海榮衛之源邪氣入於胃而不復傳流水穀水穀不消去轉而爲實也此陽盛陰虛者此也故潮熱引飲腹滿而喘手足漐漐汗出大便難而語語宜大承氣湯下之則愈潮熱者爲實也此外已解可攻其裏而反汗之表無陰邪汗又助陽陽實而又補表裏俱熱不死何待外臺祕要云表和裏病下之則愈汗之則死正此意也

汗多亡陽

齊大哥十一月間因感寒邪頭項強身體痛自用靈砂丹四五粒併服以酒引下遂大汗出汗後身輕至夜前病復來以前藥復汗其病不愈復以通聖散發汗病添身體沈重足腑冷而惡寒是日方命醫醫者不究前治又以五積散汗之翌日身重如石不能反側足腑如冰冷及腰背頭汗如貫珠出而不流心胸躁熱煩亂不安喜飲冷西瓜梨柿冰水之物常置左右病至於此命予治之診得六脈如絲縈微微欲絕予以死決之主家曰得汗多矣焉能爲害予曰夫寒邪中人者陽氣不足之所致也而感之有輕重汗之者豈可失其宜哉仲景曰陰盛陽虛汗之則愈汗者助陽退陰之意也且寒邪不能自出必待陽氣泄乃能出也今以時月論之大法夏月宜汗此大法焉然並以太過爲戒況冬三月閉藏之時無援乎陽無泄皮膚使氣亟奪爲發藏之道也逆之則少陰不藏此冬氣之應也凡有爲同宜微汗之以平爲期邪退乃已急當衣緩衣居密室服實表補衛氣之劑雖有寒邪弗能爲害此從權之治也今非時而大發其汗乃謂之逆故仲景有云一逆尚引日再逆從命期今本傷而汗汗而復傷傷而復汗汗出數回氣亟奪衛氣無守陽泄於外陰乘於內故經云獨陽不生獨陰不長不死何待雖虛羸亦不能治之活也是日至夜將半頃證身體不仁手足搐急爪甲青而死矣金匱要略云不當汗而妄汗之令人奪其津液枯槁而死今當汗之一逆亦中絕其命況不當汗而強汗之者乎

下多亡陰

興定趙客乙丑歲六月間客於他方因乘困傷濕麵心下痞滿躁熱時作臥不得安遂宿於寺中僧以大毒食藥數丸下十餘行心痞稍減越日困睡爲盜劫其財貨心有所動遂躁熱而渴飲冷酒一大甌是夜腑腹痛僧再以前藥復下十餘行病加困篤四肢無力躁熱身不停衣喜飲冷水米穀不化痢下如爛魚腸腦赤水相雜全不思食強食則嘔痞甚於前噫氣不絕足腑冷少腹不任其痛請予治之診其脈浮數八九至按之空虛予泝流而尋源蓋暑天之熱已傷正氣以有毒大藥之劑下之一下之後其所傷之物已去而無餘矣巴豆之氣流毒於腸胃之間使嘔逆而不能食胃氣轉傷而然及下膿血無度大肉陷下皮毛枯槁脾氣弱而衰也舌上赤澀口燥咽乾津液不足下多亡陰之所致也陰既已亡心火獨旺故心胸躁熱煩亂不安經曰獨陽不生獨陰不長天之由也遂辭而退後易他醫醫主不審其脈不究其源惟見痞滿以枳殼丸下之病添喘滿利下不禁而死金匱要略云不當下而強下之令人開腸洞泄便溺不禁而死此之謂也夫聖人治病用藥有法不可少越內經云大毒去病十去六小毒治病十去其七常毒治病十去其八無毒治病十去其九如不盡行復如法以穀肉果菜養之無使過之過則傷其正矣記有之云醫不三世不服其藥蓋慎之至也彼僧非醫流妄以大毒之劑下之太過數日之間使人殞身喪命用藥之失其禍若此病之擇醫可不謹乎戒之

方成弗約之失

丁巳冬十月予從軍迴至汴梁有伶人李人愛謂予曰大兒自今歲七月間因勞役渴飲涼茶及食冷飯覺心下痞滿醫治之醫投藥一服下利兩行其證遂減不數日又傷冷物心腹復痞滿添嘔吐惡心飲食無味且不欲食四肢困倦懶於言語復請前醫診視曰此病易爲更利幾行即快矣遂以無憂散對加牽牛末白湯服至夕腹中雷鳴而作陣痛少頃既吐又瀉頻渴不止飲冷無度不復能禁時發昏憒再命前醫視之診其脈不能措手而退頃之冷汗如洗口鼻氣漸冷而卒矣小人悔恨無及敢以爲問予曰未嘗親見不知所以然既去或曰予親見之果藥之罪歟而非歟對曰此非藥之罪乃失其約量之過也夫藥用之無據反爲氣賊內經云約方猶約囊也囊滿弗約則輸泄方成弗約則神與氣弗俱故仲景以桂枝湯治外傷風邪

則曰若一服汗出病差停後服不必盡劑大承氣湯下大滿大實則曰得更衣止後服不必盡劑其慎如此此爲大戒蓋得聖人約襄之旨也治病必求其本薛李人以俳優雜劇爲戲勞神損氣而其中疹然因時暑熱渴飲涼茶脾胃氣弱不能運化而作痞滿以藥下之是重困也加以不慎又損其腸虛而復傷傷而復下陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起此仲景所謂一逆尚引日再逆促命期如是則非失約量之過而何故內經戒云上工平氣中工亂脈下工絕氣危生下工不可不慎也

衛生寶鑑卷一終

元羅天益謙甫著　三原李錫齡孟熙校刊

灸之不發

國信副使覃公中四十九歲至元丙寅春病腎腹冷疼完穀不化足脚寒而逆皮膚不仁精神困弱診其脈沈細而微遂投以大熱甘辛之劑及灸氣海百壯三里三穴各三七壯陽輔各二七壯三日後以葱熨灸瘡皆不發復灸前穴依前壯數亦不發十日後瘡亦更不作膿瘡口皆乾癸丑歲初予隨朝承應冬屯於瓜忽都地面學鍼於賈子聲先生因論穴腧曰凡用鍼者氣不至而不效灸之亦不發大抵本氣空虛不能作膿失其所養故也更加不慎邪氣加之病必不退異日因語鍼灸科忽敎授亦以爲然至元戊辰春副使除益都府判到任未幾時風疾半身麻木自汗惡風妄喜笑又多健忘語言微澀醫以續命湯復發其汗津液重竭其證愈甚因求醫還家日久神氣昏憒形容羸瘦飲食無味便溺遺失扶而後起屢易醫藥皆不能效因思內經云陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰今因此病而知子聲先生之言矣或云副使肥甘足於口輕膝足於體使令足於前所爲無不如意君言失其所養何也予曰汝言所養養口體者也予論所養養性命者也且覃氏壯年得志不知所養之正務快於心精神耗散血氣空虛因致此疾靈樞經云人年十歲五臟始定血氣已通其氣在下故好走二十歲血氣始盛肌肉方長故好趨三十歲五臟大定肌肉堅血氣盛滿故好步四十歲五臟六腑十二經脈皆大盛以平定勝理始疏華榮頹落髮頗班白平盛不揺故好坐五十歲肝氣始衰肝葉始薄肺汁始減目始不明六十歲心氣始衰善憂悲血氣懈惰故好臥七十歲脾氣始衰皮膚已枯八十歲肺氣衰魄魂散離故言善誤九十歲腎氣燋臟枯經脈空虛百歲五臟皆虛神氣皆去形骸獨居而終矣蓋精神有限嗜慾無窮輕喪性命一失難復其覃氏之謂歟

脫營

疏五過論云嘗貴後賤雖不中邪病從內生名曰脫營鍼陽有一士人軀幹魁梧而意氣雄豪喜交遊而有四方之志年踰三旬已入任至五品出入從騎塞羌姬侍滿前飲食起居無不如意不三年以事罷去心思鬱結憂慮不已以致飲食無味精神日減肌膚漸至瘦弱無如之何遂耽嗜於酒久而中滿始求醫醫不審得病之情輒以丸藥五粒溫水送之下二十餘行時值初秋暑熱猶盛因而煩悶飲冷過多遂成腸鳴腹痛而爲痢疾有如魚腦以至困篤命予治之診其脈乍大乍小其證反覆悶亂兀兀欲吐數息不絕予料曰此病難治啓玄子云神屬故也以其貴之尊榮賤之屬辱心懷慕眷志結憂慮雖不中邪病從內生血脈虛減名曰脫營或曰願聞其理黃帝鍼經有曰宗氣之道內穀爲實穀入於胃乃傳之脈流溢於中布散於外精專者行于經隧終而復始常營無已是爲天地之紀故氣始從手太陰起注於陽明傳流而終於足厥陰循腹裏入缺盆下注肺中於是復注手太陰此營氣之所行也故曰夜氣行五十營漏水下百刻凡一萬三千五百息所謂變通者並行一數也故五十營備得盡天地之壽矣今病者始樂後苦皆傷精氣精氣竭絕形體毀阻暴寡傷陽暴怒傷陰喜怒不能自節蓋心爲君主神明出焉肺爲相傅主行榮衛制節由之主貪人欲天理不明則十二官相使各失所司使道閉塞而不通由是則經脈之氣脫去不能灌溉周身百脈失其天度形乃大傷以此養生則殃何疑之有焉

瀉火傷胃

經歷晉才鄭育梁而飲至春病迎醫門諸見血者爲熱以清涼飲子投之即止越數日其疾復作醫又曰藥不勝病故也遂投黃連解毒湯既而或止止而復作易醫數回皆

用苦寒之劑俱欲勝其熱而已然終不愈而飲食起居不及初肌寒而時躁言語無聲口氣奚微惡如冷風然其細之餘波則未絕也或曰諸見血者熱血熱也熱而寒之理也今不惟不愈而反害之何哉內經曰以平為期又言下工不可不慎也彼惟知見血為熱而以苦寒攻之抑不知苦瀉土土脾胃也脾胃人之所以為本者今火為病而瀉其土火固未嘗除而土已病矣土病則胃虛胃虛則營氣不能滋於百脈元氣不循天度氣隨陰化而無聲肌寒也意粗工喑喑以為可治熱病未已寒病復起此之謂也

肺痿辨

華嚴寺和上座代史侯出家年未四十至元癸酉四月間因深浴大汗出遍寺剃頭傷風寒頭疼四肢困倦就市中頭遍聖散服之又發之汗頭疼少減再日復作又以通聖散發之發汗數回反添勞動喘促自汗惡風咳而有血懶於言語飲食減少求醫治之醫與藥多以生薑為引予至六月間精神愈困飲食減少形體羸瘦或咳或唾紅血極多扶而後起請予治之具說前由診其脈浮數七八至按之無力予曰不救矣或曰何謂不救內經曰血之與汗異名而同類奪汗者無血奪血者無汗金匱要略云肺痿之病從何而得之師曰或從汗出又被快藥下利重亡津液故得之今肺氣已虛又以辛藥瀉之重虛其肺不死何待藏氣法時論曰肺欲收急食酸以收之用酸補之辛瀉之蓋不知內經之旨仲景云禍術淺狹懵然不知病源為治乃誤發汗此下之相反其禍至速世上之士但務彼翁習之榮而莫見此傾危之敗惟明者居然能護其本近取諸身夫何遠之有焉其倉不數日果亡

下工絕氣危生

丁巳予從軍至開州夏月有千戶高國用請予曰父親年七十有三於去歲七月間因內傷飲食又值霖雨瀉痢暴下數行醫以藥止之不數日又傷又瀉止而復傷傷而復泄至十月間肢體瘦弱四肢倦怠飲食減少腹痛腸鳴又以李醫治之處以養臟湯治之數日瀉止後添嘔吐又易以王醫用丁香藿香人參去白橘皮甘草同為細末煎生薑數服而嘔吐止延至今正月間飲食不進扶而後起又數日不見大便予問醫曰父親數日不見大便何以治之醫曰老官人年過七旬氣血衰弱又況瀉痢半載脾胃又虛津液耗少以麻仁丸潤之可也衆親商議一親知曰焉■牛山人見證不疑有果決遂請治之診其脈問其病證曰此是風結也以搜風丸百餘丸服之利下數行而死予悔恨不已取以為問予曰未嘗親見將何以言高千戶退而去或者曰予親見之細說其證予曰人以水穀為本今年高老人久瀉胃中津液耗少又重瀉之神將何依靈樞經云形氣不足病氣不足此陰陽俱不足也不可瀉之瀉之則重不足重不足則陰陽俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯老者絕滅少者不復矣又曰上工平氣中工亂脈下工絕氣危生絕氣危生其牛山人之謂歟

酸多食之令人瘧

至元己巳上都住夏月太保劉仲晦使引進史柔明來曰近一兩月作伴數人皆有淋疾是氣運使然是水土耶予思之此間別無所患此疾獨公所有之殆非運氣水土使然繼問柔明近來公多食甚物曰宜使賜木瓜百餘對遂多蜜煎之每客至以此待食日三五次予曰淋由此也內經曰酸多食之令人瘧可與太保言之奪飲則已一日太保見予問曰酸味致淋其理安在予曰小便主氣鍼經云酸入於胃其氣濇以收上之兩焦弗能出入也不出則留胃中胃中和溫則下注膀胱之胞胞薄以懦得酸則縮絡約而不通水道不行故瘧而濇乃作淋也又曰陰之所生本在五味陰之五營傷在五味五味口嗜而欲食之必自裁制勿使過焉五味過則皆能傷其正豈止酸味耶太保歎曰凡為人子不可不知醫信哉

冬藏不固

刑部侍郎土立甫之壻年二十五歲至元丁卯十一月間因勞役憂思煩惱飲食失節而病時發躁熱肢體困倦盜汗濕透其衾不思飲食氣不足一息面色青黃不澤請予治之具說前證診其脈浮數而短濇兩寸極小予告曰此危證也治卿粗安至春必死當令親家知之夫人不以為然遂易醫至正月躁熱而卒異日立甫同外郎張介夫來請予曰吾壻果如君言願聞其理予曰此非難知也內經曰主勝逆客勝從天之道也蓋時令為客人身為主冬三月人皆懼寒獨渠躁熱盜汗是令不固其陽時不勝其熱天地時令尚不能制藥何能為冬乃閉藏之月陽氣當伏於九泉之下至春發為雷動為風鼓坼萬物此奉生之道也如冬藏不固則春生不茂又有疫癘之災且人身陽氣亦當伏潛於內不敢妄擾無泄皮膚使氣亟奪此冬藏之應也今壻汗出於閉藏之月腎水已涸至春何以生木陽氣內絕無所滋榮不死何待二君乃歎息而去

主勝客則逆

古■聲子玉父年踰六旬有三病消渴至冬添躁熱須裸袒以冰水噴胸脇乃快日食肉麪數回頃時即飢如此月餘命予治療診得脈沈細而疾予以死決之子玉及弟拉麗予前曰病固危篤君盡心救治則死而無悔予答曰夫消渴之為病其名不一曰食亦曰消中曰宣疾此膏粱之所致也陽明化燥火津液不能停自汗小便數故欲一渡二胃熱則消穀善飢能食而瘦王叔和云多食亦飢虛是也此病仲景所謂春夏劑秋冬差時制故也今尊今當差之時反劑乃腎水乾涸不能制其心火而獨旺於不勝之時經曰當所勝之時而不能制名曰真強乃孤陽絕陰者也且人之身為主天令為客此天令大寒尚不能制其熱何藥能及內經曰主勝逆客勝從正以此也設從君治療徒勞而已固辭而歸遂易醫與灸不數日而卒其後子玉感

予之誠相好愈厚

用藥無據反爲氣賊

北京按察書吏李仲寬年踰五旬至元己巳春患風證半身不遂四肢麻痺言語蹇澀精神昏憒一友處一法用大黃半斤黑豆三升水一斗同煮豆熟去大黃新汲水淘淨黑豆每日服二三合則風熱自去服之過半又一友云遇聖散四物湯黃連解毒湯相合服之其效尤速服月餘精神愈困遂還眞定歸家養病親舊獻方無數不能悉錄又皆瘖啞不能言氣冷手足寒命予診視細詢前由盡得其說予診之六脈如蛛絲細予謂之曰夫病有表裏虛實寒熱不等藥有君臣佐使大小奇偶之制君所服藥無考徵故病愈甚今爲不救君自取耳未幾而死有曹通甫外郎婁蕭氏六旬有餘孤寒無依春月忽患風疾半身不遂語言蹇澀精神昏憒口眼喎斜與李仲寬證同予刺十二經井穴接其經絡不過又灸肩井曲池詳病時月處藥服之減半予曰不須服藥病將自愈明年春張子敬郎中家兒行步如故予歎曰夫人病全得不亂服藥之力由此論李仲寬亂服藥終身不救蕭氏貧困恬憊自如獲安內經曰用藥無據反爲氣賊聖人戒之一日姚雪齋舉許先生之言曰富貴人有二事反不如貧賤人有過惡不能匡救有病不能醫療噫其李氏之謂歟

元羅天益謙甫著　三原李錫齡孟熙校刊

主不明則十二官危

癸丑春棗城令張君年三十有餘身體豐肥精神果健飲食倍於常人太醫王彥寶曰君肥盛如此若不預服涼藥恐生熱疾張君從之進服三一承氣湯二兩下利三十餘行異日覺陰陰腹痛且不欲食食而無味心下痞滿精神困倦次添胸膈閉塞時作如刀刺之痛稍多食則酸心腹脹不能消化以此告予予曰昔君剛強飲啖如常血氣周流循其天度十二臟之相使各守所司神氣沖和身體太平君自戕賊沖氣敗亂而致病如此雖悔何及予遂以四君子湯甘溫之劑補脾安胃更加人參黃芪升麻升陽補氣戒以慎起居節飲食服之月餘胸中快利而痛止病氣雖去終不復正氣未幾三旬中風而死靈蘭祕典云主不明則十二官危所乃寒暑所權養主則殃以爲天下者眞宗大危戒之戒之啓蟄益氣神不明邪正一邪正一則損益不分損益不分則脾之腑神益陷身於羸瘠矣故形乃大傷夫主不明則委於左右殿權勢妄行權勢妄行則吏不奉法吏不奉法則人民失所而皆受枉曲矣且民惟邦本本固邦寧本不獲安國將何有宗廟之主安得不至於顛危乎故曰戒之戒之張君安危不察損益不分妄加治療以召其禍可痛也哉此既往不可咎後人當以此爲明鑑

時氣傳染

總帥相公年近七旬戊午秋南征過揚州俘虜萬餘口內選美色室女近笄年者四百於左右予因曰總帥領十萬餘衆深入敵境非細務也況年高氣弱凡事宜慎且新虜之人驚憂氣奮於內加以飲食不節多致疾病近之則邪氣相傳其害爲大總帥笑而不答其副帥時亦在坐異日召予曰我自十三歲從征回鶻此事飽經汝之言深可信矣至臘月中班師值大雪三日新擄人不禁凍餒皆病頭疼咳嗽腹痛自利多致死亡者遂春正月至汴隨路多以禮物來賀相公因痛飲數次遂病脈得沈細而弦三四動而一止其證頭疼咳嗽自利腹痛與新虜人病無異其脈短澀其氣已衰病已劇矣三日而卒邪氣害人其禍如此內經云乘年之虛遇月之空失時之和因而感邪其氣至骨又曰避邪如避矢石錢仲陽亦曰糞穢不可近褻褻嬰兒多生天弔驚風亦猶正氣尚弱不能勝邪故也由是觀之聖賢之言信不誣矣

戒妄下

眞定鈔庫官李提舉年踰四旬體幹魁梧肌肉豐盛其僚友師君告之曰肥人多風證君今如此恐後致中風搜風丸其藥推陳致新化痰宜服之李從其言遂合一料每日服之至夜下五行如是半月覺氣短而促至一月餘添怠倦嗜臥便白膿小便不禁足至膝冷腰背沈痛飲食無味仍不欲食心胸痞滿時有躁熱健忘恍惚不安凡三易醫皆無效因陳其請予治之予曰孫眞人云藥勢有所偏助令人臟氣不平藥本攻疾無病不可餌平人殺人於胃脈道乃行水入於經其血乃成水去則榮散穀消則衛亡榮散衛亡神無所依君本身體康強五臟安泰妄以小毒之劑日下數行初服一日且推陳下行疏積已去又何推焉今飲食不爲肌膚水穀不能運化精微灌溉五臟六腑週身百脈神將何依故氣短而促者眞氣損也怠惰嗜臥者脾氣衰也小便不禁者膀胱不藏也便下膿血者胃氣下脫也足胻寒而逆者陽氣微也時有躁熱心下虛痞者胃氣不能上榮也恍惚健忘者神明亂也金匱要略云不當下而誤下之令人開腸洞泄便溺不禁而死前證所生非天也君自取之治雖想安促君命期矣李聞之驚恐汗浹於背起謝予曰妄下之過悔將何及雖然君當盡心救其失予以謂病勢過半命將難挽固辭而退至秋疾甚作醫

以奪命散下之躁熱喘滿而死內經曰詠削無過是謂大惑知李君者蓋內經所謂大惑之人也衛生君子可不戒哉

輕易服藥戒

何秀才一女子病其父謂予曰年十三時五月間因傷冷粉腹中作痛遂於市藥鋪中贖得神芎丸服之腹漸加冷疼時發時止今踰七八年不已何也答曰古人云寒者熱之治寒以熱良醫不能廢其繩墨而更其道也據所傷之物寒也所攻之藥亦寒也重寒傷胃其爲冷痛豈難知哉凡人之脾胃喜溫而惡冷況女子幼小血氣尚弱不任其寒故陽氣潛伏寒毒留連久而不除也治病必先求其本當用溫中養氣之藥以救前失服之月餘方愈嗚呼庸子鎮藥孔子拜而受之以未達不敢嘗此保生之重者也奈何常人命醫拱默而令切脈以謂能知病否且脈者人之血氣附行於經絡之間熱勝則脈疾寒勝則脈遲實則有力虛則無力至於所傷何物豈能別其形象乎醫者不可不審其病源而主家不可不說其病源如何氏女子不以病源告醫而求藥於市鋪發藥者亦不審其病源而以藥付之以致七八年之病皆昧此理也孫眞人云未診先問最爲有準東坡云只圖因醫二公之語其有功於世大矣

妄投藥戒

高郎中家好收方書及得效藥方家人有病自爲處治亦嘗有效中統庚申五月間弟婦產未滿月食冷酪飯苦苣及新李數枚漸覺腹中病太夫人以自合檳榔丸七十丸服之至夜痛尤甚恐藥力未達又進五十丸須臾間大吐且將其痛增極腹髓漸冷口鼻氣亦冷急求醫療未至而卒後太夫人見予訴其由曰天命耶藥之過耶君試裁之予曰非難知也凡醫治病虛則補之實則瀉之此定法也人以血氣爲本今新產血氣皆損胃氣虛弱不能腐熟生

硬物故滿而痛也復以寒劑攻之又況夏月陰氣在內重寒相合是大寒氣入腹使陰盛陽絕其死何疑難經曰實實虛虛損不足而益有餘如此死者醫殺之耳非天命也太夫人豁其言憶曲禮謂醫不三世不服其藥其慎如此彼過已往而不可咎後之用藥者當以此爲戒之

福醫治病

丙辰秋楚丘縣員君次子二十七歲病四肢困倦躁熱自汗氣短飲食減少咳嗽痰涎胸膈不利大便祕形容羸削一歲間更數醫不愈或曰明醫不如福醫某處某醫雖不精方書不明脈候看證極多治無不效人目之曰福醫詢云饒你讀得王叔和不如我見過病證多願有可信試命治之醫至診其脈曰此病予飽諳矣治之必效於肺腧各灸三七壯以調飲枳實丸消痰導滯不數服大便溏泄無度加腹痛食不進愈添困篤其子謂父曰病久瘦弱不任其藥病劇遂卒冬予從軍回其父以告予予曰思內經云形氣不足病氣不足此陰陽俱不足瀉之則重不足此陰陽俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復矣故曰不足補之此其理也令嗣久病羸瘦乃形不足氣短促乃氣不足病潮作時嗜臥四肢困倦懶言語乃氣血皆不足也補之惟恐不及反以小毒之劑瀉之虛之愈虛損之又損不死何待賈君歎息而去予感其事略陳其理夫高醫愈疾先審歲時太過不及之運察人之血氣飲食勇怯之殊病有虛實淺深在經在臟之別藥有君臣佐使大小奇偶之制治有緩急因用引用返正之則孫眞人云凡爲太醫必須諳甲乙素問黃帝鍼經明堂流注十二經三部九候五臟六腑表裏孔穴本草藥對仲景叔和諸部經方又須妙解五行陰陽精熟問易如此方可爲太醫不爾則無目夜遊動致顛損正五音者必取師曠之律呂而後五音得以正爲方員者以取公輸之規矩而後方員得以成五音方員特末技耳倘取精於其事者況醫者人之司命列於四科非五音方員之比不精於醫不通於脈不觀諸經本草顧以命通運建而號爲福醫病家遂委命於人之手豈不痛哉噫醫者之福福於藥者也藥之福安能消病者之患爲世人不明此理而委命於福醫至於傷生喪命終不能悟此惑之甚者也悲夫

衛生寶鑑卷三終

衞生寶鑑卷四

元羅天益謙甫著　　三原李錫齡孟熙校刊

予受學於東垣先生先生授以內經要奧仍授以製方之法中書左丞董公彥明中統辛酉夏領軍攻濟南時署隆盛軍人飲冷多成痢疾又兼時氣流行左丞遣人來求醫於予遂以數藥付之至秋城陷矣公回謂予曰向所付藥服之多效其方君自製耶古方耶予曰有自製方有古方公曰君用藥如此可謂得醫之三昧矣以自製方及古方用之經驗者類而集之以濟人不亦善乎予遂允之凡古今名方親獲效者類以成書詳列于後

飲食自倍腸胃乃傷論

痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷謂食物無節於多貪在能節所以保沖和而遂頤養也若貪多務飽飲食難消徒積暗傷以召疾患蓋食物飽甚耗氣非一或食不下而上湧嘔吐以耗藏源或飲不消而作痰咯唾以耗神水大便頻數而洩耗穀氣之化生溲便滑利而濁耗源泉之浸潤至於精清冷而下滑汗淋漓而外泄莫不由食物之過傷滋味之太厚如能節滿意之食肯爽口之味常不至於飽甚者即頓頓必無傷物物皆為益精粕變化早晚溲便按時精華和調上下津液含育神藏內守榮衛外固邪毒不能犯疾疢無日作故聖人立言垂教為養生之大經也

食傷脾胃論

論曰人之生也由五穀之精化五味之備故能生形經曰味歸形若傷於味亦能損形今飲食反過其節以至腸胃不能勝氣不及化故傷焉經曰壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣痺論云飲食自倍腸胃乃傷失四時之調養故能為人之病也經曰氣口緊盛傷於食心胃滿而口無味口與氣口同氣口曰坤口乃脾之候故胃傷而氣口緊盛夫傷者有多少有輕重如氣口一盛得脈六至則傷於厥陰乃傷之輕也枳朮丸之類主之氣口二盛脈得七至則傷於少陰乃傷之重也雄黃聖餅子木香檳榔丸枳殼丸之類主之氣口三盛脈得八至九至則傷太陰塡塞悶亂則心胃大痛備急丸神保丸消積丸之類主之兀兀欲吐則已俗呼食迷風是也經曰上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死瓜蔕散吐之如不能吐則無治也經曰其高者因而越之在下者引而竭之也

枳朮丸治痞消食強胃

白朮二兩　枳實一兩麩炒

右為末荷葉裹燒飯為丸如梧子大每服五十丸多用湯下無時用白朮者本意不取其食遲化但久服令胃氣強實不復傷也

橘皮枳朮丸治老幼元氣虛弱飲食不消或臟腑不調心下痞悶

白朮二兩　枳實麩炒　橘皮各一兩

右為末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服五十丸溫水送下食遠夫內傷用藥之大法所貴服之強人胃氣令胃氣益厚雖猛食多食重食而不傷此能用食藥者此藥久久益胃氣令不復致傷

半夏枳朮丸治因冷食內傷

白朮二兩　半夏泡七次　枳實麩炒各一兩

右為末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服五十丸溫水送下食遠湯浸蒸餅丸亦可如食傷藥熱不調每服加上二黃丸十丸白湯送下

木香枳朮丸破滯氣消飲食開胃進食

白朮二兩　木香　枳實麩炒各一兩

右為末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服五十丸溫水送下食遠

木香化滯湯治因憂氣食冷濕麪結於中脘腹皮底微痛心下痞滿不思飲食食之不散常常痞氣

半夏一兩泡　草豆蔻　炙甘草各五錢　柴胡四錢　木香　橘皮各三錢　枳實麩炒一錢　當歸身二錢　紅花五分

右九味㕮咀每服五錢水二盞生薑五片煎一盞去柤稍熱服食遠忌生冷酒濕麪

丁香爛飯丸治飲食所傷卒心胃痛

甘松　糯砂仁　甘草炙二錢　京三稜炮一錢　丁香皮各三錢　木香一錢　香附子半兩　益智仁三錢　廣茂炮各一錢　丁香

右十味為末湯浸蒸餅丸如綠豆大每服三十丸白湯送下糊脂燒生薑亦可無時

消滯丸治一切所傷心腹痞滿刺痛積滯不消

黑牽牛二兩炒末　五靈脂　香附炒各一兩

右為末醋糊丸如小豆大每服三十丸食後生薑湯下

煮黃丸治一切酒食所傷心腹滿悶不快

雄黃研一兩　巴豆五錢去皮生用研爛入雄黃末於內再研

右件研勻入白麪三兩再同研勻滴水丸如桐子大每服時先煎漿水令沸下二十四丸煮二十沸漉入冷漿水內沈冷一時下二丸一日服盡二十四丸也如至微利為度用浸藥生漿水下治脇下痞癖氣塊痛如神

木香檳榔丸治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶大小便結滯不快利者並宜服之

木香　檳榔　陳皮去白　枳殼麩炒　青皮去白　黃連各一兩　黃檗去粗皮　廣茂煨切　大黃炒各三兩　黑牽牛生取頭末四兩　香附炒搗

右為末滴水丸如豌豆大每服三五十丸食後生薑湯送下加至微利為度

上二黃丸治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩二兩　黃連一兩酒洗　枳實麩炒半兩

升麻　柴胡各三錢　甘草二錢

右六味爲極細末湯浸蒸餅丸如菉豆大每服五七十丸白湯下量所傷服之

消積集香丸治寒飲食所傷心腹滿悶疼痛及消散積聚痃癖氣塊久不愈宜服

木香　陳皮　青皮

三稜炮　廣茂炮　黑牽牛炒

白牽牛炒　茴香炒各半兩　巴豆半兩不去皮用白米一撮同炒黑米去米

右爲末醋糊丸如桐子大每服七丸至十丸溫薑湯下無時以利爲度忌生冷硬物

枳殼丸治中焦氣滯胸膈痞滿飲食遲化四肢困倦嘔逆惡心常服升降滯氣化宿食祛痰逐飲美進飲食

三稜炮　廣茂炮　黑牽牛炒各三兩

白茯苓去皮　白朮　青皮各一兩半

陳皮去白一兩二錢　木香　枳殼麩炒

半夏炮　檳榔各一兩

右爲末醋糊丸如桐子大每服五十丸溫薑湯送下食後

開結妙功丸治佛熱內盛痃癖堅積酒食積一切腸垢積滯癥瘕積聚痰痛發作有時三焦壅滯二腸燥結或懊憹煩心不得眠欬喘嘔逆不能食兼爲腫脹一切所傷心腹暴痛又能宣通氣血消酒進食解積

三稜炮　神麯炒各一兩　川烏一兩去皮臍

大黃一兩同前四味爲末好酒半升熬成膏不破堅積不用膏　半夏半兩

麥蘗炒　茴香炒各一兩

巴豆兩箇破堅積用四箇　乾薑炮

揀桂各二錢　牽牛三兩揀淨

右爲末同前膏和丸如小豆大生薑湯下十丸至十五丸或嚼生薑溫水送下亦得漸加二三十丸或心胃間稍覺藥力緩性卻即減丸數或取久積或破堅積初服十丸次服二十丸每服加十丸大便三五行後如常服少得食力後更加取利爲度

感應丸治虛中積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因氣傷冷因飢飽食飲酒過多心下堅滿兩脇脹痛心腹大痛霍亂吐瀉大便頻數後重遲澀久痢赤白膿血相雜米穀不化愈而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜睡頭旋胸膈痞滿四肢倦怠不欲飲食不拘新久積冷並皆服之

南木香　肉豆蔻　丁香各一兩半

乾薑炮一兩　巴豆七十箇去皮心膜研出油

杏仁一百四十箇湯浸去皮尖研

右上四味爲末外入百草霜二兩研與巴豆杏仁七味同和勻用好蠟六兩溶化成汁以重絹濾去滓更以好酒一升於銀石器內煮蠟數沸傾出待酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用春夏修合用清油一兩銚內熬令末散香熱次下酒煮蠟四兩同化成汁就銚內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油一兩半同煎煮熟成汁和匱藥末成劑分作小錠子油紙裹旋丸服之每服三十丸空心薑湯下

備急丹治心腹百病卒痛如錐刺及脹滿下氣皆治之易老名獨行丸脾胃論名備急大黃丸

川大黃末　乾薑末　巴豆先去皮膜心研如泥霜出油用各等分

右合和一處研勻煉蜜丸臼內杵千百下如泥丸如小豆大夜臥溫水下一丸如下氣實者加一丸如卒病不計時候婦人有胎不可服如所傷飲食在胸膈兀兀欲吐反復悶亂一用瓜蔕散吐去之

瓜蔕散上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死何謂下部無脈此所謂木鬱也飲食過飽填塞胸中胸中者太陰之分野內經曰氣口反大於人迎三倍食傷太陰故曰木鬱則達之吐者是也

瓜蔕　赤小豆等分

右二味爲極細末每服一錢匕溫漿水調下取吐爲度若不兩手尺脈絕無不宜便用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止是胸膈中窒塞悶亂不通以指探之如不得吐者以物探去之得吐而已如食不去用此吐之

枳實梔子大黃湯治大病差後傷食勞復

枳實二箇麩炒　梔子二箇肥者　豆豉一兩二錢半

右以清漿水三餘空煮退八分內枳實梔子煮取八分下豉再煮五七沸去柤溫服覆令汗出若有宿食內大黃如博棊子大五六枚同煎勞復則熱氣浮越以枳實梔子湯以解之以其熱聚於胃上以苦吐之熱散於表以苦發之食復則以苦下之食肉菜之物過多躁熱悶亂者亦宜服之

金露丸治天行時病內傷冷物飲食心下痞悶

枳殼二兩　大黃一兩　枳實五錢炒

牽牛頭末二錢半

右四味爲末燒飯丸如桐子大每服三十丸食後溫水送下如常服十丸至二十丸甚妙

飲傷脾胃論

神農本草云酒味苦甘辛火熱有毒主百邪毒行百藥通血脈厚腸胃潤皮膚久飲傷神損壽若耽嗜過度其酷烈之性撓擾於外沈注之體淹滯於中百脈沸騰七神迷亂過傷之毒一發耗真之病百生故內經曰因而大飲則氣以逆肺痺寒熱喘而虛驚有積氣在胸中得之醉而使內也酒入於胃則絡脈滿而經脈虛脾主於胃行其津液者也陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷蓋陰

氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不營於四肢也若醉飽入房氣聚脾中不得散酒氣與穀氣相搏熱盛於中故熱偏於身內熱而溺赤名曰熱厥凡治消癉仆擊偏枯痿厥氣滿發逆皆肥貴人膏粱之疾也古人惟麥蘖之麴醽黎而已爲辛熱有毒猶嚴戒如此況今之醞造加以馬酌芫花烏頭巴豆大毒等藥以增氣味尤辛熱之餘烈也豈不傷冲和損精神潤榮衛竭天癸夭人壽者也故近年中風虛勞消狂瘡瘍癖積血蠱藏毒下血者多有之大概由朝醉夕醒就樂爲常而得之也古人云脾熱病則五臟危豈不信哉孔子云惟酒無量不及亂謂飲之無多而且有節則所以養精神而介眉壽也凡飲酒之際切宜慎之戒之也

飲傷脾胃方

夫酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散汗出則愈此最妙法也其次莫如利小便二者乃上下分消其濕何酒病之有今之酒病者乃服酒藏丸大熱之劑下之又有用牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下有形陰血乖謬甚矣酒性大熱已傷元氣而重復瀉之況亦損腎水眞陰及有形陰血俱爲不足如此則陰血愈虛眞水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是謂元氣消亡七神何依折人長命不然則虛損之病成矣金匱要略云酒疸下之久久爲黑疸慎不可犯此戒不若用葛花解醒湯令上下分消其濕

葛花解醒湯

白豆蔻　縮砂　葛花各半兩　乾生薑　神麴炒　澤瀉

白朮各二兩　人參去蘆　白茯苓去皮　猪苓去皮　橘皮去白各一錢半　木香半錢　蓮花青皮三分

右十三味爲極細末每服三錢匕白湯調下但得微微汗出酒病去矣此蓋不得已而用之豈可恃賴此藥日日飲之此方氣味辛辣偶因病酒而用之則不損元氣何者敵酒病故也若賴此服之損人天年矣

食

生薑十兩切作片用青鹽糝過再用白麴拌挹乾焙洗淨用之

華澄茄二兩半　縮砂仁　白豆蔻

白茯苓去皮　木香各一兩半　丁香二兩

官桂去皮　青皮去白　陳皮去白

半夏麴　白朮各一兩　甘草炙

葛根各半兩

右十四味爲末每服一錢至二錢溫酒調下不拘時

藿香散溫脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐治胸膈痞悶腹脇脹痛短氣噎悶欬嗽痰水噫酸吞酸嘔逆惡心山嵐瘴氣

厚朴薑製　半夏泡　藿香

橘皮去白　甘草炙等分

右五味㕮咀每服二錢水一盞生薑三片棗子一箇煎至七分去滓溫服無時日三服

快氣湯治一切氣疾

縮砂仁八兩　香附子三十二兩　甘草四兩

右爲細末每服一錢鹽湯點下或㕮咀入薑同煎名小降氣湯

五苓散去水利小便

澤瀉二兩半　白朮　赤茯苓

猪苓各一兩半　官桂一兩

右爲細末每服二錢熱湯調下不計時

大七香丸治脾胃虛冷心膈痞塞漸成脹氣脾泄瀉痢反胃嘔吐

香附子二兩　客蘗一兩　丁香三兩半

縮砂仁　藿香各二兩半　甘松

烏藥各六兩半　官桂　甘草

陳皮各二兩半

右十味爲末蜜丸彈子大每服一丸鹽酒鹽湯任嚥下

昂生冷肥膩物

小七香丸溫中快膈化積和氣治中酒痞逆氣膈食噎茶酒食積小兒痢氣

甘松八兩　益智仁六兩　香附子

丁香皮　甘草各十二兩　茱萸

縮砂各二兩

右爲末蒸餅爲丸菉豆大每服二十丸溫酒鹽湯熟水任下

枳朮湯治心下堅大如盤乃水飲所作

白朮三兩　枳實七枚

右以水一斗煮至三升分作三服腹中軟即消減之對病增損

木香檳榔丸疏導三焦寬膈膈破痰逐飲快氣消食通潤大腸

木香　檳榔

枳殼麩炒　青皮去白各一兩　杏仁去皮尖麩炒

皁角去皮酥炙　槐李仁去皮各二兩

右八味爲末別用皁角四兩用漿水一碗搓揉熬膏更入熟蜜少許丸如桐子大每服五十丸溫淡生薑湯送下食後

導飲丸治風痰氣壅膈脘痞滿停飲不消頭目昏眩手足麻痺聲重舉塞神困多睡志意不清常服去痰

三稜炮　蓬朮炮各三兩二錢　白朮

白茯苓去皮　青皮去白　陳皮去白各一兩半

木香　槐柳　枳實麩炒

牛夏各一兩

右十味爲末麵糊丸如桐子大每服五十丸溫生薑湯送下食後漸加至百丸忌猪肉蕎麵等物

鎮飲枳實丸消痰逐飲導滯清膈

枳實麩炒　半夏湯泡　陳皮去白各二兩　黑牽牛頭末三兩

右四味爲末麵糊丸如桐子大每服五十丸溫生薑湯送下食後

神應丸治因一切冷水及漆乳酪水所傷腹痛腸鳴米穀不化

巴豆去殼　杏仁去皮尖　乾薑炮　石霜草各半兩　丁香　木香各二錢

右六味先將黃蠟二兩用好醋煮浮濾去粗將巴豆杏仁二味同炒黑烟盡研如泥餘四味爲細末然後再將黃蠟上火春夏入小油半兩秋冬入小油八錢溶開入杏仁巴豆泥于內同攪旋旋下四味末子於內研勻搓作錠子油紙裹了旋丸如芥子大用每服三五十丸溫米飲湯送下食前日三服大有神效

飲食自倍腸胃乃傷治驗

癸丑歲予隨王府承應至瓜忽都地面住冬有博兔赤馬刺約年三旬有餘因獵得兔以火炙食之各人皆食一枚惟馬刺獨食一枚半抵暮至營極困倦渴飲渾乳斗餘是夜腹脹如鼓喉痛悶亂臥而欲起起而復臥欲吐不吐欲瀉不瀉手足無所措舉家驚荒請予治之具說飲食之由診其脈氣口大一倍於人迎乃應食傷太陰經之候也右手關脈又且有力蓋燒肉乾燥因而多食則致渴飲乳酪得漆乳之濕是以滂滿於腸胃腸胃乃傷非峻急之劑則不能去遂以備急丸五粒覺腹中轉失氣欲利不利復投備急丸五粒又與無憂散伍錢須臾大吐又利十餘行皆物與清水相合而下約二十餘腹中空快漸漸氣調至平且以薄粥飲少少與之三日後再以參朮之藥調其中氣七日而愈或曰用峻急之藥故家平日所戒今反用之何也予對曰理有當然不得不然內經曰水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛更虛更實此腸胃傳化之理也今飲食過節腸胃俱實胃氣不能腐熟脾氣不能運化三焦之氣不能升降故成傷也大抵內傷之理傷之微者但減食一二日所傷之物自得消化此良法也若傷之稍重者以藥內消之傷之大重者以藥除下之癉論有云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷今因飲食太過使陰氣躁亂神不能藏死在旦夕矣孟子云若藥不瞑眩厥疾弗瘳峻急之劑何不可用之有或者然之

元羅天益謙甫著　三原李鶴齡孟熙校刊

勞倦所傷虛中有寒

理中丸心肺在膈上爲陽腎肝在膈下爲陰此上下臟也脾胃屬土處在中州在五臟曰孤臟在三焦曰中焦因中焦獨居在中一有不調此丸專主故名曰理中丸人參味甘溫內經曰脾欲緩急食甘以緩之緩中益脾必以甘爲主是以人參爲君白朮味甘溫內經曰脾惡濕甘勝濕溫中勝濕必以甘爲助是以白朮爲臣甘草味甘平內經曰五味所入甘先入脾脾不足者以甘補之補中助脾必須甘劑是以甘草爲佐乾薑味辛熱溫而惡寒者胃也寒則中焦不治內經曰寒淫所勝平以辛熱散寒溫胃必先辛劑是以乾薑爲使脾胃居中病則邪氣上下左右無病不止故有諸加減焉○若臍下築者腎氣動也去白朮加桂氣壅而不泄則築然動也白朮味甘補氣去白朮則氣易散桂辛熱腎氣動者欲作奔豚也必服辛熱以散之故加桂以散腎氣經曰以辛入腎能泄奔豚氣故也○吐多者去白朮加生薑氣上逆者則吐多朮甘而壅非氣逆者之所宜千金方曰嘔家多服生薑此是嘔家聖藥生薑辛散於是吐多者加之○下多者還用白朮氣泄而不收則下多朮甘壅補使正氣收而不下泄也或曰濕勝則濡泄朮專除濕於是下多者加之○悸者加茯苓飲聚則悸茯苓味甘滲泄伏水是所宜也○渴欲得水者倍加朮津液不足則渴朮甘以補津液故加之○腹中痛者加人參虛則痛內經曰補可以去痛即人參羊肉之屬是也○寒多者加乾薑以辛熱能散寒也○腹滿者去白朮加附子內經曰甘者令人中滿朮甘壅補於腹中滿者則去之附子味辛熱氣壅鬱腹爲之滿以熱勝寒以辛散滿故加附子內經曰熱者寒之寒者熱之此之謂也

人參　乾薑炮　甘草炙
白朮各等分

右爲末煉蜜爲丸如雞子黃大以沸湯數合研碎溫服之日三二服

建中湯內經曰肝生於左肺藏於右心位在上腎處在下左右上下回臟居焉脾者土也應中爲中央處四臟之中州治中焦生育榮衛通行津液一有不調則榮衛失所育津液失所行必以此湯溫中益脾是以建中名之爲膠飴味甘溫甘草味甘平脾欲緩急食甘以緩之建脾者必以甘爲主故以膠飴爲君而甘草爲臣桂辛熱辛散也潤也榮衛不足潤而散之芍藥味酸微寒酸收也泄也津液不遽收而行之是以桂芍藥爲佐生薑味辛溫大棗味甘溫胃者衛之源脾者榮之本黃帝鍼經云榮出中焦衛出上焦是也衛爲陽不足者益之必以辛榮爲陰不足者補之必以甘甘辛相合脾胃健而榮衛通是以薑棗爲使也或謂桂枝湯解表而芍藥數少建中湯溫裏而芍藥數多殊不知二者遠近之制皮膚之邪爲近則制小其服也故桂枝湯芍藥相佐桂枝以發散非與建中同體心腹之邪爲遠則制大其服也故建中湯芍藥佐膠飴以建脾非與桂枝同用爾內經曰近而奇偶制小其服遠而奇偶制大其服此之謂也嘔家不用此湯以味甜故也

芍藥六兩　桂枝　甘草炙各二兩
大棗七枚去子　生薑三兩切片　膠飴一升

右六味㕮咀以水七升煎至三升去柤入膠飴更上微火令消溫服一升日三升

奇氣湯通流百脈調暢脾元補中脫益氣消祛陰寒止腹痛進飲食大益虛疼痛

木香　丁香　藿香
人參　白朮　白茯苓

縮砂　白豆蔻
炙甘草各半兩　乾山藥一兩
青皮去白各二錢半　白檀香半兩

右十四味爲末每服一錢至二錢用木瓜湯調下空心食前鹽湯亦得

養胃進食丸治脾胃虛弱心腹脹滿面色痿黃肌肉消瘦怠惰臥全不思食常服滋養脾胃進美飲食消痰逐飲辟風寒濕冷邪氣

蒼朮五兩泔浸去皮　神麯二兩半炒
厚朴二兩薑製各　大麥蘖炒
白朮二兩　人參
甘草炙各一兩

右九味爲末水麵糊丸如桐子大每服三十丸至五十丸食前溫薑湯送下粥飲亦得

寬中進食丸滋形氣喜飲食

豬苓去皮　半夏各七錢
神麯炒半兩　枳實四錢
白朮　澤瀉　白茯苓去皮各三錢
縮砂　甘草炙　大麥蘖炒各一錢半
人參　青皮　乾生薑炮各一錢
木香半錢　一方有檳榔一錢半合用

右十六味爲末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服三十丸溫米湯送下食前

和中丸治久病厥厥不能食而臟腑或祕或結或瀉此皆胃虛之所致也常服和中理氣消痰去濕厚腸胃進飲食

白朮二兩四錢　厚朴薑製二兩　陳皮
半夏湯泡一兩　檳榔　枳實各五錢
甘草炙四錢　木香二錢

右八味爲末生薑自然汁浸蒸餅和丸如桐子大每服三十丸溫水送下食遠服

安胃丸治寒邪傷胃溫中補氣安胃進食

白朮五錢　乾薑炮三錢　大麥蘖炒五錢
陳皮三錢　青皮二錢　白茯苓去皮二錢
縮砂二錢　木香一錢半

右八味爲末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服三十丸溫水送下食遠忌冷物

補中丸補脾虛調胃弱止瀉痢進飲食定痛

厚朴薑製一兩　甘草炙一兩
陳皮去白一兩　乾薑炮半兩　白茯苓去皮一兩

右五味爲末煉蜜丸如櫻桃大每服一丸白湯化下細嚼亦得空心食前

加減平胃散治脾胃不和

蒼朮八兩　厚朴　陳皮各五兩
甘草三兩　人參　茯苓各五兩

右爲粗末每服二錢水一盞入薑二片棗子二箇同煎至七分去薑棗帶熱服空心食前或入鹽沸湯點服亦得

嘉禾散補脾胃治五噎五膈

枇杷葉去毛炙　薏苡仁炒　白茯苓
人參　縮砂各一兩　大腹子
隨風子　杜仲　石斛
藿香葉　木香　沈香
丁香　陳皮各三錢　穀蘖
檳榔　五味子　白豆蔻
青皮　桑白皮各半兩　白朮二兩
神麯　半夏麯各一錢　甘草炙一兩半

右二十四味爲細末每服二錢水一盞薑二片棗三箇同煎至七分溫服不拘時

白朮散治諸病煩渴津液內耗不問陰陽皆可服之大能止煩渴生津液

乾薑 白朮 人參 各一兩 茯苓去皮 甘草炙 藿香 木香各一兩

右七味爲粗末每服三錢水一盞半煎至一盞去粗溫服不拘時

緩中丸治脾胃虛弱六脈拘急而指下虛食少而渴不止心下痞腹中或痛或腹中窄狹如繩束之急小便不利而急大便不調精神短少此藥亦治大渴不止腹中急束而食減少神妙

白豇生薑 白茯苓去皮 陳皮各一兩去白

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸白湯送下細嚼亦得空心食前○如脈弦急或腹中急甚加人參甘草各三錢

沈香鼈甲散治一切勞傷諸虛百損

乾蝎二錢半 沈香 人參 木香 巴戟 牛膝 黃芪 柴胡 白茯苓 荆芥 牛夏 當歸 秦艽各半兩 附子 官桂 鼈甲各一兩 羌活 熟地黃各七錢半 肉苁蓉四兩酒浸

右十九味爲細末每服二錢水一盞葱白二寸薑三片棗二箇同煎至七分去薑葱棗空心食前服

十擧散補暖元氣調理脾胃風勞解二毒傷寒除腰膝疼痛療酒色衰憊霍亂吐利偏風頑麻痺痛腳氣注腫行步不得等證神效不可俱述

附子炮去皮臍 桂心 人參 白朮炒 黃芪 乾薑炮 青皮去白炒 羌活各一兩 甘草半兩炙 五加皮一兩吳茱萸一兩此水疊法同煮至水盡爲度去茱萸不用出五加皮切片晒乾

右十味爲粗末每服二大錢水一中盞薑三片棗二箇煎六分去滓溫服不拘時

沈香溫脾湯治脾胃虛冷心腹疼痛嘔吐惡心腹脇脹滿不思飲食四肢倦怠或泄瀉吐利

沈香 木香 丁香 附子炮去皮臍 官桂 人參 縮砂 川薑炮 甘草炙 白豆蔻

右十一味爲末每服三錢水一盞薑五片棗一箇煎至七分去滓熱服空心食前作粗末亦可

厚朴溫中湯治脾胃虛寒心腹脹滿及秋冬客寒犯胃時作疼痛或成火已衰不能運化又加客寒聚爲滿痞散以辛熱佐以苦甘以淡泄之氣溫胃和痛自止矣

厚朴薑製 橘皮去白各一兩 乾薑七錢 甘草炙 茯苓去皮 草豆蔻 木香各半兩

右七味爲粗末每服五錢匕水二盞薑三片煎一盞去滓溫服食前忌一切冷物

雙和湯治虛勞養氣血

白芍藥七兩半 當歸四兩 黃芪 熟地黃 川芎各三兩 甘草 官桂各二兩二錢

右爲細末每服二錢水一盞半薑三片棗一箇煎至六分空心食前服

小沈香丸和中順氣嗜食消痰又治痰及酒後乾嘔痰涎氣壅痞悶

甘草炙二兩八錢 益智仁一兩八錢 船上丁香皮三兩四錢 甘松一兩八錢去土 廣茂炮 縮砂各四錢 沈香六錢 香附子一兩八錢去毛

右八味爲末湯浸蒸餅丸如桐子大每服三十丸至四十丸食後薑湯送下或嚼亦得

木香分氣丸善治脾胃不和心腹脹滿脇肋膨脹胸膈注悶痰嗽喘息乾嘔酷心咽喉不利飲食不化氣不宣暢並皆治之

木香 檳榔 青皮 陳皮 薑黃 乾生薑 當歸 白朮 玄胡索 廣茂炮 三稜炮 赤茯苓去皮 肉豆蔻各等分

右十三味爲末白麵糊丸如桐子大每服三十丸食後薑湯下日三服忌馬齒莧生茄子○秋冬加丁香

木香餅子快氣消食利胸膈化痰涎止宿酒痰嘔吐噦惡心

木香 官桂去皮 薑黃 香附炒去毛 香白芷 甘松去土 川芎 縮砂仁巴上各二兩 甘草炙半兩

右九味爲末水和捻成餅子每服十數餅細嚼薑湯送下不拘時候

法製陳皮消食化氣寬利腸膈美進飲食

茴香炒 青鹽炒 甘草各二兩炙 乾生薑 烏梅肉各半兩 白檀二錢半

右六味爲末外以陳皮半斤湯浸去白淨四兩切作細條子用水一大碗煎藥末三兩同陳皮條子一處慢火煮候陳皮極軟控乾少時用乾藥末拌勻焙乾每服不拘多少細嚼溫薑湯下不拘時

溫中益氣治驗

中書佐丞相史公年六旬有七至元丁卯九月間因雨傷自利數行覺肢體沈重不思飲食嗜臥懶言語舌不知味腹中疼痛頭亦痛而惡心醫以溫聖散大作劑料服之覆以厚衣遂大汗出前證不除而反增劇易數醫四月餘不

愈予被召至燕命予治之予診視得六脉沈細而微弦不欲食食即嘔吐中氣不調滯於升降口舌乾燥頭目昏眩脉體倦怠足胻冷臥不欲起丞相素不飲酒肢體本瘦又因內傷自利又復發汗是重竭津液脾胃愈虛不能滋榮周身百脉故使然也非甘辛大温之劑則不能温養其氣經云脾欲緩急食甘以緩之又脾不足者以甘補之黃芪人參之甘補脾緩中故以為君形不足者温之以氣當歸辛温和血潤燥木香辛温升降滯氣生薑益智草豆蔻仁辛甘大熱以蕩中寒理其正氣白朮炙甘草橘皮甘苦温乃厚腸胃麥蘖麴蒐腸胃而利中神麴辛熱導滯消食而為佐使也右件㕮咀一兩水煎服之嘔吐止飲食進越三日前證悉去左右侍者曰前證雖去九日不大便如何予曰丞相年高氣弱既利且汗脾胃不足陽氣虧損津液不潤也豈敢以寒涼有毒之劑下之仲景曰大發汗後小便數大便堅不可用承氣湯如此雖內結宜以蜜煎導之須臾去糞屎二十餘塊遂覺腹中空快上下氣調又以前藥服之喜飲食但有所傷則以橘皮枳朮丸消導之至月餘其病乃得平復丞相曰病既去矣當服何藥以防其復來予曰不然但慎言語節飲食不可服藥夫用藥如用刑民有罪則刑之身有疾則藥之無罪妄刑是謂虐民無病妄藥反傷正氣軍志有曰允當則歸服而舍之可也丞相設而然之

參朮調中湯治內傷自利腸腹痛肢體倦不喜食食即嘔嗜臥懶言足胻冷頭目昏

人參　黃芪各五錢　當歸身
厚朴薑製　益智仁　草豆蔻
木香　白朮　甘草炙
神麯炒　麥蘖麴　橘皮各三錢

右十二味剉如麻豆大每服一兩水二盞生薑三片加至一盞去滓温服食前

勞倦所傷虛中有熱

金匱要略云夫男子平人脉大者為勞極虛亦為勞男子色薄者主渴及亡血卒喘悸脉浮者裏虛也男子脉虛沈弦無力寒熱氣促裏急小便不利面色白時目眩兼衄少腹滿此為勞使之然勞之為病其脉浮大手足煩春夏劇秋冬瘥陰寒精自出酸削不能行男子脉微弱而濇為無子精氣清冷夫失精家少腹弦急陰頭寒目瞑髮落脉極虛芤遲為清穀亡血失精也

桂枝加龍骨牡蠣湯治脉得諸芤動微緊男子失精女子夢交通

桂枝去皮　芍藥各三兩　甘草二兩炙
龍骨　牡蠣各三兩

右五味㕮咀水七升生薑三片切大棗十二箇擣煎至三升去粗分三服小品云脉浮汗者除桂加白薇附子各三分改曰二加龍骨湯

黃芪建中湯治諸虛不足或因勞傷過度或因病後不復

黃芪　官桂各三兩　甘草二兩
白芍藥六兩

右四味為㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片棗一箇同煎至七分去粗入飴少許再煎令溶稍熱服空心食前○集驗云嘔苦加生薑腹滿去飴棗加茯苓肺虛損補氣加半夏五兩為妙

人參黃芪散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱咽乾頰赤心忡潮熱盜汗減食咳嗽膚血腳脇不利

人參去蘆一兩　秦艽　茯苓各二兩
知母半兩　桑白皮一兩半　桔梗一兩
紫菀一兩半　柴胡二兩半　黃芪三兩半
地骨皮二兩　生地黃二兩　半夏湯浸七次
赤芍藥各一兩半　天門冬去心三兩　鱉甲三兩酥炙去裙
炙甘草一兩半

右十六味為麄末每服三錢水一盞半煎七分去粗服食遠

續斷湯治骨蒸熱勞傳尸瘦病潮熱煩躁喘嗽氣急身體疼痛口乾盜汗神效方

生地黃　桑白皮各五兩　續斷
紫菀　青竹茹　五味子
桔梗各三兩　甘草炙二兩　赤小豆半升

右九味為麄末每服三錢水一盞半小麥五十粒煎至一盞去粗溫服食後日三服兼治咳嗽唾膿血童男室女亦可服

桑朝散治虛勞羸瘦面色萎黃四肢無力不思飲食夜多盜汗咳嗽不止

地骨皮一兩半　柴胡　鼈甲去裙酥炙
知母各一兩半　五味子半兩

右五味為末每服二錢水一盞半烏梅兩箇青蒿五葉煎至一盞去粗溫服食後

秦艽鼈甲散治骨蒸壯熱肌肉消瘦脣紅頰赤氣羸四肢困倦夜有盜汗

柴胡　鼈甲去裙酥炙用九肋者　地骨皮各一兩
秦艽　當歸　知母各半兩

右六味為粗末每服五錢水一盞青蒿五葉烏梅一箇煎至七分去粗溫服空心臨臥各一服

人參地骨皮散治藏中積冷營中熱拔之下足舉之有餘陰不足陽有餘之脉也

人參　地骨皮　柴胡
黃芪　生地黃各一兩半　知母
石膏各一兩　茯苓半兩

右八味㕮咀每服一兩水二盞薑三片棗一枚煎至一盞去粗細細溫服連夜頓服間服生精補虛地黃丸

地仙散治心臟積熱口乾或煩渴頰赤舌澀生津液兼治

汗後餘熱

地骨皮　防風各一兩　人參

甘草各半兩

右四味爲粗末每服三錢水一盞青蒿五七葉煎至七分去柤溫服無時無青蒿用竹葉五七片

調中益氣湯治因飢飽勞役損傷脾胃元氣不足其脈弦或洪緩按之無力中指下時一濇其證身體沈重四肢困倦百節煩疼胸滿短氣膈咽不通心煩不安耳鳴耳聾目有瘀肉熱塵如火視物昏花口中沃沫飲食失味忽肥忽瘦怠惰嗜臥溺色變赤或清利而數或上飲下便或時飱泄腹中虛痛不思飲食

黃芪一錢　人參　甘草炙

當歸　白朮各半錢　白芍藥

柴胡　升麻各三分　橘皮二分

五味子十五箇

右十味㕮咀作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食前

論曰內經云勞則氣耗熱則傷氣以黃芪甘草之甘泄熱爲主以白芍藥五味子之酸能收耗散之氣又曰勞者溫之損者溫之以人參甘溫補氣不足當歸辛溫補血不足故以爲臣白朮橘皮甘苦溫除胃中客熱以養胃氣而爲佐升麻柴胡苦平味之薄者陰中之陽爲脾胃之氣下溜上氣不足故從陰引陽以補之又以行陽門之經爲使也

當歸補血湯治肌熱躁熱困渴引飲自赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無內經曰脈虛則血虛血虛則發熱證象白虎惟脈不長實爲辨也誤服白虎湯必危此病得之於飢困勞役

黃芪一兩　當歸二錢酒洗

右二味㕮咀作一服水三盞煎至一盞去柤溫服食前

犀角紫河車丸治傳屍勞服三月必平復其餘勞證只數

服便愈此藥神效

紫河車一具即小兒胞衣是也水洗去一宿洗淨焙乾用　胡黃連

鼈甲酥炙　桔梗去蘆

芍藥　大黃

敗鼓皮心酥炙　龍膽草

知母各二錢半　犀角鎊末

芒硝各一錢半研　硃砂二錢研

右十五味爲末煉蜜丸如桐子大硃砂爲衣每服二十丸溫酒送下空心食前服之如膈熱食後服之重病不過一料

人參柴胡散治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心煩躁頭目昏痛夜有盜汗此藥和真氣解勞倦及婦人血熱虛勞骨蒸

人參　白朮

柴胡　甘草炙　白茯苓

當歸　乾葛　赤芍藥各等分

右九味爲末每服三錢水一盞薑四片棗二箇煎至八分帶熱服不拘時候但是有勞熱證皆可服病退即止大抵透肌解熱乾葛爲君柴胡次之所以升麻葛根湯爲解肌之冠也

清神甘露丸治男子婦人虛勞病患不至大骨枯槁大肉陷下並皆治之

生地黃汁　牛乳汁生用　白蓮藕汁各等分

右三味用砂石器內以文武火熬成膏子用和後藥

人參　白朮　黃連

胡黃連　五味子　黃芪各等分

右六味爲末用前膏子和丸如桐子大每服三十丸至五十丸煎人參湯送下不拘時

雙和散治邪入經絡體瘦肌熱推陳致新解利傷寒時疾中暑伏暑

柴胡四兩　甘草一兩

右爲末每服二錢水一盞煎至八分食後熱服此藥冬月可以潤肺止咳嗽除壅熱春夏可以禦傷寒時氣解暑毒居常不可缺不以長幼皆可服之

四君子湯治榮衛氣虛

人參　甘草　茯苓

白朮

右等分爲末每服二錢水一盞煎至七分通溫服不拘時

猪肚丸治男子肌瘦氣弱咳嗽漸成勞瘵

牡蠣煅　白朮各四兩　苦參三兩

右三味爲末以猪肚一箇煮爛熟剉研如膏和丸如桐子大每服三十丸米飲湯送下日三四服此藥神效或者服之即肥莫測其理

酸棗仁丸治膽經不足心經受熱精神昏憒恐畏多驚情思不樂時有盜汗虛煩不眠朝差暮劇或發眩運

地榆　酸棗仁炒各一兩　茯苓

菖蒲　人參各半兩　丹砂二錢研

右六味爲末水蜜麵糊丸如桐子大每服三五十丸煎人參湯送下不拘時米飲湯亦得

定志丸治心氣不足

遠志　菖蒲各二兩　人參

白茯苓各三兩

右爲末蜜丸如桐子大硃砂爲衣每服七丸加至二十丸溫米湯下食後臨臥日三服

參蓯散治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自汗夜臥即甚久而不止羸瘠枯瘦心悸驚惕短氣煩倦

牡蠣煅　黃芪　麻黃根各等分

右三味爲粗末每服三錢水一盞半小麥百餘粒煎至一盞去粗熱服不拘時日進三服

獨聖散治盜汗及虛汗不止

右以浮小麥不以多少文武火炒令焦爲細末每服二錢米飲湯調下頻服爲佳一法取陳小麥同乾棗煎服更妙

溫粉治多汗不止煩躁不得眠撲之

白朮　白芷　藁本　川芎各等分

右四味擣爲細末每末一兩入米粉三兩和勻用粉撲周身能止汗

虛中有熱治驗

趙康道按察副使奧屯周卿子年二十有三至元戊寅三月間病發熱肌肉消瘦四肢困倦嗜臥盜汗大便溏多腸鳴不思飲食舌不知味懶言語時來將去約半載餘請予治之診其脈浮數按之無力正應王叔和浮脈歌云臟中積冷榮中熱欲得生精要補虛先灸中脘乃胃之紀也使引清氣上行肥腴理又灸氣海乃生發元氣滋榮百脈長

元羅天益謙甫著　三原李錫齡孟熙校刊

瀉熱門

上焦熱

涼膈散治大人小兒積熱煩躁多渴面熱唇焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡譫語狂妄腸胃燥澀便溺閉結睡臥不安一切風壅皆治之

連翹四兩　朴硝二兩　川大黃二兩　薄荷　黃芩　山梔子　甘草炙各一兩

右七味爲末每服三錢水一盞半竹葉五七片蜜少許煎至七分去柤溫服食後小兒半錢量歲數加減得利下止後服

龍腦雞蘇丸治胸中鬱熱肺熱咳嗽吐血鼻衄血崩下血血淋虛勞煩熱

柴胡二兩剉同木通以沸湯大半升浸一兩宿絞汁股以清　木通二兩剉同柴胡汁　阿膠　滿黃　人參各二兩　麥門冬四兩　黃芪一兩　雞蘇淨葉一斤即龍腦薄荷　生乾地黃末六兩後煮　甘草一兩半

右爲細末以蜜二斤先煉二三沸然後下生地黃末不住手攪時時入鍋下柴胡木通汁慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和爲丸如豌豆大每服二十丸熟水下

洗心散治心肺積熱風壅上攻頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠粘小便赤澀大便祕滯

白朮一兩半　麻黃　當歸　荊芥　芍藥　甘草　大黃各六兩

右爲細末每服二錢水一盞入生薑薄荷少許同煎至七分溫服

中焦熱

調胃承氣湯治胃中實熱而不滿

甘草半兩　芒硝九錢　大黃二兩

內經云熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘芒硝鹹寒以除熱大黃苦寒以蕩實甘草甘平助二物推陳而致新

右剉如麻豆大水一大盞煎二味取七分去柤下硝更上火二三沸頓服之無時

瀉脾散治脾熱目黃口不能吮乳

藿香　山梔各七錢　石膏半兩　甘草三兩　防風四兩去蘆

右五味用蜜同炒香爲末每服二錢至三錢水一盞煎至七分溫服清汁無時

貫衆散解一切諸熱毒或中食毒酒毒藥毒並皆治之

黃連三錢　貫衆三錢　甘草三錢　豬苓蓬三錢

右四味爲末每服三錢冷水調下食前

大承氣湯治痞滿燥實地道不通

大黃四兩酒洗　厚朴半斤麩製　芒硝三合　枳實五枚麩炒去

內經云燥淫所勝以苦下之大黃枳實之苦以除燥熱又曰燥淫於內治以苦溫厚朴之苦以下結滿又曰熱淫所勝治以鹹寒芒硝之鹹以攻蘊熱

右四味用水伍升先煮二味至三升去柤內大黃煮取二升去柤入芒硝更上火微煮一二沸分溫再服得下餘勿服

三才封髓丹降心火益腎水滋陰養血潤補下燥

天門冬去心　熟地黃　人參各半兩

黃柏（生一兩） 砂仁（一兩半） 甘草（炙七錢半）

右六味爲末麵糊丸如桐子大每服五十丸從巷半兩切作片子酒一盞浸一宿次日煎三四沸去柤空心食前送下

滋腎丸治下焦陰虛脚膝軟而無力陰汗陰痿足熱不能穀地不渴而小便閉

肉桂（二錢） 知母（二兩酒洗焙乾） 黃柏（二兩酒洗焙）

內經曰熱者寒之又二腎惡燥急食辛以潤之黃柏之苦寒瀉熱補水潤燥爲君知母苦寒以瀉腎火爲佐肉桂辛熱寒因熱用也

右爲末熟水丸如雞頭實大每服一百丸加至二百丸百沸湯送下空心服之

氣分熱

柴胡飲子解一切肌骨蒸熱積熱作發或寒熱往來畜熱寒戰及傷寒發汗不解或不經發汗傳受表裏俱熱口乾煩渴或表熱入裏下證未全下後熱未除及汗後餘熱勞復或婦人經病不快產後但有如此證並宜服之

柴胡（人參） 黃芩 甘草（炙） 大黃 當歸 芍藥（各半兩）

右七味剉散每服四錢水一盞薑三片煎至六分去柤溫服小兒分三服病除爲度日三服熱甚者加服

白虎湯治傷寒大汗出後表證已解心胸大煩渴欲飲水及吐或下後七八日邪毒不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者宜服之

知母（七兩半） 甘草（三兩七錢半） 石膏（二十兩）

右㕮咀每服三錢水一盞半入粳米三十粒煎至一盞去柤溫服或加人參亦得此藥立夏後立秋前可服春時及立秋後亡血家並不可服

血分熱

桃仁承氣湯治熱結膀胱其人如狂熱在下焦與血相搏血下則熱隨出而愈

芒硝 甘草（各二兩） 大黃（三兩） 桂枝（二兩去皮） 桃仁（五十個去皮尖）

內經曰甘以緩之辛以散之小腹急結緩以桃仁之甘下焦畜血散以桂枝之辛大熱之氣寒以取之熱甚搏血加二味於調胃承氣湯中也

右㕮咀用水七升煮取二升半去柤內芒硝再上火煮一二沸溫服五合日三服得微利止

清涼四順飲子治一切丹毒積熱壅滯咽喉腫痛

當歸（去蘆） 甘草（炙） 赤芍藥 大黃（各等分）

右㕮咀每服五錢水一盞煎至七分去柤食後溫服

通治三焦甚熱之氣

三黃丸治三焦熱

黃連 黃芩 大黃（各等分）

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸熟水吞下

黃連解毒湯治大熱甚煩錯語不得眠

黃連（七錢半） 黃柏 梔子（各半兩） 黃芩（一兩）

右四味剉散每服五錢水一盞半煎至一盞去滓熱服未知再服○海藏加防風連翹爲金花丸治風熱加柴胡治小兒潮熱與四物相合爲各半湯治婦人潮熱

發狂辨

甲寅歲四月初予隨斡耳朶行至界河裏住腦厥元國病五七日發狂亂棄衣而走呼叫不避親疏手執潲乳與人飲之時人皆言風魔了巫師禱之不愈而反制上聞命予治之脈得六至數日不得大便湯飲潲乳予思之北地高寒腠理緻密少有病傷寒者然北地此時乍寒乍熱因此過冒寒邪失於解利因轉屬陽明證日實譫語又食羊肉以助其熱兩熱相合是謂重陽狂陽勝宜下急以大承氣湯一兩半加黃連二錢水煎服之是夜下利數行燥屎二十餘塊得汗而解翌日再往視之身涼脈靜裏人皆喜曰羅謙甫醫可風魔的也由此見用傷寒非雜病之比六經不同傳變各異診之而疑不知病源立相侮誤嗚呼嗜利貪名恥於學問此病何日而愈耶

陽證治驗

南省參議宮常德甫至元甲戌三月間赴大都感傷寒證勉強至真定館於常參謀家遷延數日病不差總府李經歷并馬錄事來求治予往視之診得兩手六脈沈數外證卻身涼四肢厥逆發斑微紫見於皮膚唇齒及齒齦破裂無色咽乾聲啞默默欲眠目不能閉精神鬱冒反側不安此證乃熱深厥亦深變成狐惑其證最急詢之從者乃曰自內丘縣感冒頭痛身體拘急發熱惡寒醫以百解散發之汗出狀背殊不解每經郡邑治法一同發汗極多遂至如此予詳其說兼以平昔膏粱積熱於內已燥津液又兼發汗過多津液重竭因轉屬陽明故大便難也急以大承氣下之得更衣再用黃連解毒湯病減大半復與黃連犀角湯數日而安自此德甫交情愈厚也

除寒門

上焦寒

鐵刷湯治積寒痰飲嘔吐不止胸膈不快不下飲食

半夏（四錢湯泡） 草豆蔻 丁香 乾薑（炮） 訶子皮（各三錢） 生薑（一兩）

右六味㕮咀水五盞煎至二盞半去柤分三服無時大吐不止加附子三錢生薑半兩

桂附丸療風邪冷氣入乘心絡臟腑暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背膂乍間乍甚經久不差

川烏（炮去皮臍） 黑附（炮去皮臍各三兩） 乾薑（炮） 赤石脂 川椒（微炒去目） 桂（各二兩去皮）

右六味爲末蜜丸如桐子大每服三十丸溫水送下覺至痛處卽止若不止加至五十丸以知爲度若早服無所覺至午時再服二十丸若久心痛服盡一劑終身不發

胡椒理中丸治肺胃虛寒咳嗽喘急嘔吐痰水

胡椒　甘草　款冬花
華撥　良薑　細辛
陳皮　乾薑各四兩　白朮五兩

右九味爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸至五十丸溫湯或溫酒米飲任下

附子理中丸治脾胃冷弱心腹疼痠嘔吐瀉利霍亂轉筋惡冷微汗手足厥冷心下逆冷滿悶腹中雷鳴飲食不進及一切沈寒痼冷並皆治之

人參　白朮　乾薑炮
甘草炙　附子炮各等分

右五味爲末蜜丸每兩作十丸每服一丸水一盞化破煎至七分稍熱服食前

二氣丹助陽退陰正氣和中治內虛裏寒冷氣攻擊心腹滿刺痛泄利無度嘔吐不止自汗時出小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷

硫黃二錢半　肉桂二錢半　硃砂爲衣二錢
乾薑炮二錢　黑附子大者一箇去皮臍炮製半兩

右研勻水麵糊爲丸如桐子大每服三十丸空心煎艾鹽湯送下

大建中湯療內虛裏急少氣手足厥冷小腹拘急或腹滿弦急不能食起卽微汗陰縮或腹中寒痛不堪勞唇口乾精自出或手足乍寒乍熱而煩冤酸疼不能久立多夢寐補中益氣

黃芪　當歸　桂心

人參　甘草各一錢
半夏泡焙　黑附炮去皮各二錢半

右八味㕮咀每服五錢水二盞薑三片棗二箇煎至一盞去滓食前溫服

下焦寒

八味丸補腎氣不足

牡丹皮　白茯苓
熟地黃八兩　山茱萸
附子　官桂各二兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫酒下空心食前日二服

還少丹大補心腎脾胃治一切虛損神志俱耗筋力頓衰腰脚沈重肢體倦怠血氣羸乏小便渾濁

山藥　牛膝酒浸
巴戟去心　山茱萸去核
楮實　五味子
杜仲去皮薑汁酒浸炒去絲　茴香各一兩
石菖蒲　熟地黃各二兩

右爲末煉蜜同棗肉爲丸如桐子大溫酒鹽湯任送下三十丸日進三服食前五日後有力十日精神爽半月氣力頗壯二十日目明一月夜間飲食冬月手足常暖久服身體輕健筋骨壯盛悅澤難老更看體候加減

身熱加山梔子一兩心氣不寧加麥門冬一兩少精神加五味子一兩腸鳴加續斷一兩常服牢牙永無瘴疾

婦人服之姿容悅澤脫子宮去一切病

天真丹治下焦陽虛

沈香　穿心巴戟酒浸
茴香炒
萆薢酒浸炒　胡盧巴炒香
破故紙炒香
杜仲鹽炒去絲　琥珀
黑牽牛鹽炒去鹽各一兩半
官桂半兩

右十味爲末用浸酒打糊爲丸如桐子大每服五十丸空心溫酒送下鹽湯亦得

氣分寒

桂枝加附子湯治太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者宜服之

桂枝去皮　芍藥各一兩半　甘草二兩
附子炮去皮用半兩

右剉如麻豆大每服五錢生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝加芍藥生薑人參新加湯治發汗後身疼痛脈來遲者此主之

桂枝　人參各一兩半　芍藥二兩
甘草一兩炙

右剉如麻豆大每服五錢生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

血分寒

巴戟丸治肝腎俱虛攻斂精氣補眞壯陽充悅肌膚進美飲食

白朮　五味子　川巴戟去心
茴香炒　熟地黃　肉蓯蓉酒浸
人參　覆盆子　兎絲子酒炒
牡蠣　益智仁　骨碎補
白龍骨各二兩

右十三味爲末蜜丸如桐子大焙乾每服三十丸食前米飲下日三服

神珠丹治下焦元氣虛弱小腹疼痛皮膚燥澀小便白利病機云證漱清冷皆虛於寒此之謂也一名離珠丹

杜仲二兩炒　萆薢二兩　訶子五箇
龍骨一兩　破故紙三兩炒　胡桃仁一百二十箇
巴戟二兩　砂仁半兩　硃砂一兩另研

右九味爲末酒糊丸如桐子大硃砂爲衣每服三十丸空心溫酒或鹽湯送下氣不化小便不利濕肌潤滑熱蒸陰少氣不化氣走小便自利皮膚燥澀爲迫津液不能停離珠丹主之弦數者陽陷於內從外而之內也弦則帶數甲終於甲也緊則帶洪壬終於丙也若弦虛則無火細則有水此二脈從內之外也不宜離珠丹

通治三焦甚寒之氣

大已寒丸治臟腑虛寒心腹疼痛泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化手足厥冷

葶藶　肉桂各六兩半　乾薑

瓦薑各十兩

右爲末麵糊丸如桐子大每服二十丸米飲湯下食前服

四逆湯治傷寒自利不渴嘔吐不止或吐利俱發小便或澀或利或汗出過多脈微欲絕腹痛脈滿手足逆冷及一切虛寒逆冷並宜服之

甘草炙二兩　乾薑一兩半　附子生去皮臍細切半兩

右㕮每服三錢水一盞半煎至八分去粗溫服不計時

陰證治驗

至元己巳夏六月予住於上都食陰薑彥博年踰四旬因勞役過甚煩渴不止極飲漿乳又傷冷物遂自利腸鳴腹痛四肢逆冷冷汗自出口鼻氣亦冷六脈如蛛絲時發昏憒衆大醫議之以葱熨臍下又以四逆湯五兩生薑二十片連鬚葱白九莖水三升煮至一升去粗涼服至夜半氣溫身熱思粥飲至天明而愈玉機真臟論云脈細皮寒氣少泄利飲食不入此謂五虛漿粥入胃則虛者活信哉醫齋許先生問之歎曰病有輕重方有大小治有緩急愈院之證非大方從權急治則不能愈也至真要大論云補下治下制以急急則氣味厚此之謂也

陰氣有餘多汗身寒

真定府武德卿年四十六歲至元丙子三月間因憂思勞役飲食失節得病肢體冷口鼻氣亦涼額上冷汗出時發昏憒六脈如蛛絲一醫作風證欲以宜風散下之予因思錢氏小兒論制宜風散謂小兒內傷脾胃或吐或瀉久則風邪陷入胃中而作煩泄散中有結恐傳慢驚以宜風散導去風邪內經云久風爲煩泄正此謂也今德卿形證乃陰盛陽虛苦寒之劑非所宜也內經云陰氣有餘爲多汗身寒又陰陽應象論云陰盛則身寒汗出身常清數瀉而寒寒而厥調經篇亦云陰盛生內寒岐伯曰厥氣上逆寒氣即於胸中而不瀉不瀉則溫氣去寒獨留故寒中東垣解云此脾胃不足勞役形體中焦營氣受病末傳寒中惟宜補陽遂以理中湯加熟附子每服五錢多用芪白煎羊肉湯取清汁一大盞調服之至夕四肢漸溫汗出少夜深再服翌日精神出六脈生數服而愈嘗記李思順云證者思之

思之

思之

元羅天益謙甫著　三原李錫齡孟熙校刊

中風門

中風論出巢古家

經曰風者百病之始善行而數變行者動也風本爲熱熱勝則風動宜以靜勝其躁是養血也治須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮汗下各得其宜然後宜治其在經雖有汗下之戒而有中臟中腑之分中腑者宜汗之中臟者宜下之此雖合汗下亦不可過也仲景云汗多則亡陽下多則亡陰亡陽則損氣亡陰則損形故經言血氣者人之神不可不謹養也初謂表裏不和須汗下之表裏已和是宜治之在經也其中腑者面顏顯五色有表證而脈浮惡風惡寒拘急不仁或中身之後或中身之前或中身之側皆曰中腑也其病多易治其中臟者脣吻不收舌不轉而失音鼻不知香臭耳聾而眼瞀大小便祕結皆曰中臟也其病則難治經曰六腑不和留結爲癰五臟不和九竅不通外無留結爲癰內無九竅不通知必在經也初證既定宜以大藥養之當須按時令而調陰陽安臟腑而和榮衛少有不愈者也風中腑者先以加減續命湯隨證發作表如忽中臟則大便多祕澀宜以三化湯通其滯表裏證已定則無變端故以大藥和而治之大抵中腑者多著四肢中臟者多滯九竅雖中腑者多兼中臟之證至於舌強失音久服大藥能自愈也有中風濕者夏月多有之其證身重如山不能轉側宜服除風勝濕去熱之劑如不可則用鍼灸治之今具六經續命湯治法

小續命湯通治八風五痺痿厥等疾以一歲爲穗六經爲別春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥又於六經別藥內隨證細分加減自古名醫不能越此

麻黃去節　人參去蘆　黃芩炒

芍藥　甘草炙　川芎

杏仁去皮尖炒　防己　官桂各一兩
防風一兩半　附子炮去皮臍半兩

右十一味除附子杏仁外爲粗末後入二味和勻每服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食前

凡治中風不審六經之形證加減雖治與不治無異也內經云腠理開則淅然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯藥證治之若

中風無汗惡寒麻黃續命湯主之

於本方中加麻黃防風杏仁一倍宜鍼太陽經至陰出血泉崙舉鍼

中風有汗惡風桂枝續命湯主之

於本方中加桂枝芍藥杏仁一倍宜鍼風府已上二證皆太陽經中風也

中風無汗身熱不惡寒白虎續命湯主之

於本方中加石膏二兩知母二兩甘草一兩

中風有汗身熱不惡風葛根續命湯主之

於本方中加葛根二兩桂枝黃芩各一倍宜鍼陷谷刺厲兌鍼陷谷者去陽明之賊邪刺厲兌者瀉陽明之實熱

已上二證皆陽明經中風也

中風無汗身涼附子續命湯主之

於本方中加附子一倍乾薑加二兩甘草加三兩宜鍼隱白去太陰之賊邪此一證太陰經中風也

中風有汗無熱桂枝附子續命湯主之

於本方中加桂枝附子甘草一倍宜鍼太谿此一證少陰經中風也

凡中風無此四經六證混淆繫於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁宜羌活連翹續命湯主之

於本方中加羌活四兩連翹六兩

右古之續命混淆無別今立分經治療又分各經鍼刺無不愈也治法厥陰之井大敦刺以通其經少陽之經絕骨穴以引其熱此通經引熱是鍼灸同象治法之大體也

大秦艽湯治中風外無六經之形證內無便溺之血隔是知爲血弱不能養於筋故手足不能運動舌強不能語言宜此藥養血而筋自榮也

秦艽　石膏各二兩　甘草
川芎　當歸　芍藥
羌活　獨活　防風
黃芩　白朮　白芷
茯苓　生地黃　熟地黃各一兩
細辛半兩

右十六味㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服無時如遇天陰加生薑七片煎如心下病每服一兩加枳實一錢煎此秋冬藥如春夏加知母一兩

凡中風外有六經之形證先以加減續命湯隨證治之內有便溺之阻隔復以三化湯導之

三化湯

厚朴薑製　大黃　枳實
羌活各分等

右四味㕮咀每服三兩水三升煎至一升半終日服以微利則已

若內邪已除外邪已盡當服愈風湯以行中道久服大風悉去雖有微邪只從愈風湯加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此乃常治之法也久之清濁自分榮衛自和矣

羌活愈風湯療腎肝虛筋骨弱語言難精神昏憒是中風濕熱內弱者是爲風熱體重也或瘦一偏肢偏枯或肥而半身不遂或恐而健忘喜以多思思忘之道皆精不足也故心亂則百病生心靜則萬病息是以此藥能安心養神調陰陽無偏勝

羌活　甘草炙
防己　黃芪
川芎　獨活
枳殼　麻黃去根
人參　知母
薄荷去枝　白芷
當歸　柴胡
前胡　熟地黃二十六味各二兩
白茯苓　黃芩各二兩
蒼朮　石膏
桂枝一兩　生地黃
芍藥各半兩

右三十三味重七十五兩㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗溫服如遇天陰加生薑三片煎空心一服臨臥再煎粗服俱要食遠空心嚥下二丹丸爲之重劑臨臥嚥下四白丸爲之輕劑立其法是動以安神靜以清肺○假令一氣而微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩勻作四服每服加生薑五七片空心服以粥投之得微汗則佳○如一旬之通利用愈風湯三兩加大黃一兩亦勻作四服每服生薑五七片臨臥煎服得利爲度此藥常服之不可失於四時之補○如望春大寒之後本方中加半夏人參柴胡各二兩本通四兩謂迎而奪少陽之氣也○如望夏穀雨之後本方中加石膏黃芩知母各二兩謂迎而奪陽明之氣也○如季夏之月本方中加防己白朮茯苓各二兩謂勝脾土之濕也○如初秋大暑之後本方中加厚朴一兩藿香一兩桂一兩謂迎而奪太陰之氣也○如望冬霜降之後本方中加附子官桂各一兩當歸二兩謂勝少陰之氣也○如得春氣候減冬所加藥四時加減類此雖立此四時加減更宜臨病之緩急病之虛實土地之所宜邪氣之多少此藥

其七情六欲四氣無使五臟偏勝及不動於榮衛如風秘服之則永不結燥久瀉服之能自調適初覺風氣能便服此藥及新方中天麻丸各一料相為表裏治未病之聖藥也○若已病者更宜常服無問男女老幼小兒風癇急慢驚風皆可服之神效如解利四時傷寒隨四時加減法服之果如聖矣

四白丹能清肺氣養魄調中風者多昏冒氣不清利也

白朮　砂仁　白茯苓

香附　防風　川芎

甘草　人參各半兩　白芷一兩

羌活　獨活　薄荷各二錢半

藿香　白檀香各一錢半　知母

細辛各二錢　甜竹葉二兩　麝香一錢另研

龍腦另研　牛黃各半錢另研

右二十味為末蜜丸每兩作十丸臨臥嚼一丸分五七次細嚼之煎愈風湯嚥下能上清肺氣下強骨髓二丹丸治健忘養神定志和血內以安神外華膝理

丹參　天門冬　熟地黃各一兩半

甘草　麥門冬去心　白茯苓各一兩

人參　遠志去心　硃砂各半兩研末為衣氣宜保命集有菖蒲半兩

右十味為末蜜丸桐子大硃砂為衣每服五十丸至一百丸空心食前煎愈風湯送下常服安神定志北治之法一藥安神一藥清肺故清中清者歸肺以助天真清中濁者堅強骨髓濁中之清者榮養於神濁中之濁者榮華膝理

中風雜說

風者能動而多變因熱勝則動宜以靜勝躁是養血也宜和是行榮衛壯筋骨也天麻丸主之非大藥不能治也

天麻丸

附子一兩炮　天麻酒浸三宿晒　牛膝酒浸一宿焙

草薢為末研　立參各六兩　杜仲炒七兩

當歸十兩全用　羌活十兩或十五兩　生地黃十六兩

獨活五兩

右十味為末煉蜜丸如桐子大每服五七十丸病大加至百丸空心食前溫酒或白湯送下平明服藥日高飢則食不飢且止食大忌壅塞失于通利故服藥半月稍覺壅塞微以七宣丸疏之使藥再為用也牛膝草薢強壯筋骨杜仲使筋骨相著羌活防風治風之要藥當歸地黃能養血和榮衛立參主用附子佐之行經也

如風癇病不能愈者世論厚朴丸出嵩古家珍其本方後另有此病加添藥如中風自汗昏冒發熱不惡風寒不能安臥此是風熱煩躁鴻青丸主之如小便少不可以藥利之既自汗津液外泄小便內少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚俟熱退汗止小便自行也兼此證屬陽明經大忌利小便須當識此

中風見證

鴻青丸治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安臥此是風熱煩躁之故也

當歸　川芎　梔子

羌活　大黃　防風

龍膽草各等分

右末蜜丸彈子大竹葉湯化下一丸

此方去梔子加獨活防風甘草菊花蟬退川芎丸服

凡人初覺大指次指麻木不仁或不用者三年內有中風之疾也宜先服愈風湯天麻丸各一料此治未病之先也是以聖人治未病不治已病

中風人多能食蓋甲己化土脾盛故能多食由此脾氣愈盛下剋腎水腎水虧則病增劇宜廣服藥不欲多食病能自愈

中風病多食者風木盛也盛則剋脾土脾受敵則求助於食經曰實則夢與虛則夢取是也當瀉肝木治風安脾脾安則食少是其效也

中風人初覺不宜服膏腴恐引風氣入骨髓如油入麵不能得出如痰經潮盛不省人事煩熱者宜用之下痰神效

中風刺法出嵩岐子學醫新說

大接經從陽引陰治中風偏枯

足太陽膀胱之脈出於至陰足小指外側去爪甲角如韭葉為井金

足少陰腎之脈湧泉穴足心也起於小指之下趨足心三寸

手厥陰心包絡之脈其直者循中指出其端去爪甲如韭葉陷中為井中衝穴也其支者別掌中小指以指出其端

手少陽三焦之脈起於小指次指之端去爪甲角如韭葉為井

足少陽膽之脈出於竅陰足小指次指之端去爪甲角如韭葉為井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛中十呼二十呼

足厥陰肝之脈起大指之端入叢毛之際去爪甲如韭葉為井大敦也及三毛中十呼六呼

手太陰肺之脈起大指之端出於少商大指內側去爪甲如韭葉為井其支者出次指內廉出其端

手陽明大腸之脈起大指次指之端入次指內側去爪甲如韭葉為井十呼中指內交三呼

足陽明胃之脈起足大指次指之端去爪甲如韭葉為井其支者入大指內出其端一呼

足太陰脾之脈起足大指端循指內側去爪甲角如韭葉為井隱白也十呼

手少陰心之脈起手小指內出其端循指內廉去爪甲如

韭葉爲井

手太陽小腸之脈起手小指之端去爪甲一分陷中爲井

大接經從陰引陽治中風偏枯

手太陰肺之脈起手大指端出於少商大指內側去爪甲角如韭葉爲井一穴三穴

手陽明大陽之脈起手大指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者入大指間出其端

足太陰脾之脈起足大指端循指內側去爪甲如韭葉爲井隱白也

手少陰心之脈起手小指內出其端循指內廉去爪甲如韭葉爲井

手太陽小腸之脈起手小指之端去爪甲下一分陷中爲井

足太陽膀胱之脈起足小指外側至陰去爪甲如韭葉爲井金足小指之端也

足少陰腎之脈起足小指之下斜趨足心爲井湧泉穴也

手厥陰心包之脈其直者循手中指出其端去爪甲如韭葉爲井中衝穴也其支者從掌中循小指次指出其端

手少陽三焦之脈起手小指次指之端去爪甲如韭葉爲井

足陽明胃之脈起足大指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者入大指間出其端

足少陽膽之脈起于竅陰是小指次指之端也去爪甲如韭葉爲井其支者上入大指歧骨內出其端還貫爪甲出三毛中

足厥陰肝之脈起足大指之端入叢毛之際去爪甲如韭葉爲井大敦也及三毛中六穴

中風鍼法出曹先生氣元歸經

半身不遂

手太陰　列缺偏風半身不遂　夫府卒中惡鬼注不得

安臥

手陽明　肩髃　曲池偏風半身不遂

足陽明　大巨偏枯四肢不舉　衝陽偏風口眼喎斜足緩不收

手太陽　腕骨偏枯狂惕

足太陽　輔陽風痺不仁四肢不舉

足少陰　照海大風偏枯半身不遂善悲不樂

足少陽　陽陵泉半身不遂　環跳風眩偏風半身不遂失音不語

手陽明　天鼎暴瘖并喉痺　合谷瘖不能言

足陽明　頰車　地倉不語飲食不收水漿漏落左治右右治左

手少陰　陰郄瘖不能言　靈道暴瘖不語

手少陽　支溝暴瘖不語　三陽絡暴瘖不能言

手太陽　天窗暴瘖不能言

足少陰　通谷暴瘖不語

手厥陰　間使若不能言

黃帝灸法療中風眼戴上不能視者灸第二椎并第五椎

上各七壯一齊下火灸如半棗核大立愈

獨聖散治諸風腸實諸痼痰涎津液壅雜病亦然

風藥不拘多少

右一味剉如麻豆大炒令黃爲末量病人新久虛實大小或一錢或二錢末用茶一錢酸薺汁水一盞調下須是病人隔夜不食晚食服藥下吐再用溫薺水投之○如吐風痼加半錢全蝎炒○如濕麻加赤小豆末一錢○如吐蟲加狗油五七點雄黃末一錢甚者加芫花末半錢立吐其蟲出○凡吐須天色晴明陰晦不用如病卒暴不拘此法吐時辰巳午前爲妙內經曰平旦至日中天之陽陽中之陽也若論四時之氣故仲景大法春宜吐是天氣在上人氣亦在上一日之氣則寅卯辰時

也故宜早不宜晚此藥不可常用大要辨其虛實實則瓜蒂散虛則梔子豉湯腹滿加厚朴不可一槩用之吐罷可服降火利氣安神定志之劑此方出氣宜保命集

衛生寶鑑卷七終

元羅天益譜南晉　三原李錫齡孟熙梓刊

中風灸法

風中脈則口眼喎斜中腑則肢體廢中臟則性命危凡治風莫如續命湯之類然此可扶持疾病要收全功必須火艾爲良具穴下項

灸風中脈口眼喎斜

聽會二穴在耳微前陷中張口得之動脈應手

頰車二穴在耳下二韭葉陷者宛宛中開口得之

地倉二穴在俠口吻傍四分近下有脈微動者是

凡喎向右者爲左邊脈中風而綫也宜灸左喎陷中二七壯

凡喎向左者爲右邊脈中風而綫也宜灸右喎陷中二七壯艾炷大如麥粒頰頰灸之以取盡風氣口眼正爲度

灸風中腑手足不遂等疾

百會一穴在頂中央旋毛中陷可容豆許

髮際是髑兩耳前兩穴

肩髃二穴在肩端兩骨間陷者宛宛中舉臂取之

曲池二穴在肘外輔屈肘曲骨中以手拱胸取之橫紋頭陷中是

風市二穴在膝外兩筋間平立垂下手着髀當中指頭是陷者宛宛中

足三里二穴在膝下三寸脛外膝兩筋間

絕骨二穴一名懸鍾在足外踝上三寸動脈中

凡覺手足麻痺或疼痛良久乃已此將中腑之候宜灸此七穴病在左則灸右病在右則灸左如因循失灸手足以差者秋覺有此候春灸春覺有此候者秋灸以取風氣盡輕安爲度

灸風中臟氣塞涎上不語昏危者下火立效

百會一穴如前

大椎一穴在項後第一椎上陷中

風池二穴在顳顬後髮際陷中

肩井二穴在肩上陷解中缺盆上大骨前一寸半以三指按取之當其中指下陷者中是

曲池二穴如前

足三里二穴如前

間使二穴在掌後三寸兩筋間陷中

凡覺心中憒亂神思不怡或手足麻痺此中臟之候也不問是風與氣可連灸此七穴但依次第自急灸之可灸各五七壯日後別灸之至隨年壯止凡遇春秋二時可時時灸此七穴以泄風氣如素有風人尤須留意此灸法可保無虞此法能灸卒死醫經云凡人風發強忍怕痛不肯灸忽然卒死是謂何病曰風入臟故也病者不可不知此予自五月間口眼喎斜灸百會等三穴即止右手足麻無力灸百會髮際第七穴得愈七月氣塞涎上不能語魂魄飛揚如墜江湖中頃刻欲絕灸百會風池等左右頰車二穴氣遂通吐涎半碗又下十餘行伏枕半月遂平復自後凡覺神思少異於常即灸百會風池等穴無不立效

風中血脈治驗

太尉忠武史公年六十八歲於至元戊辰十月初侍國師於聖安寺丈室中煤炭火一爐在左側邊遂覺面熱左頰微有汗師及左右諸人皆出因左頰疏緩被風寒客之右頰急口喎於右脈得浮緊按之洪數予幕醫學提舉忽君吉甫專科鍼灸先灸左頰上灸地倉穴一七壯次灸頰車穴二七壯後於右頰上熱手熨之識以升麻湯加防風秦艽白芷桂枝發散風寒數服而愈或曰世醫多以續命湯等藥治之今君用升麻湯加四味其理安在對曰足陽明經起於鼻交頞中循鼻外入上齒中手陽明經亦貫於下齒中況兩頰皆屬陽明升麻湯乃陽明經藥香白芷又行

毛陽明之經秦艽治口喎防風散風邪桂枝實表而回榮衛使邪不能再傷此其理也夫病有標本經絡之別藥有氣味厚薄之殊察病之源用藥之宜其效如桴鼓之應不明經絡再過不知藥性再主徒執一方不惟無益而又害之者多矣學者宜精思之

秦艽升麻湯治中風手足陽明經口眼喎斜惡風惡寒四肢拘急

升麻　葛根　甘草炙

芍藥　人參各半兩　秦艽

白芷　防風　桂枝各錢

右㕮咀每服一兩水二盞連頰慈白三莖長二寸約至一盞去粗稍熱服食後服藥畢避風寒處臥得微汗出則止

犀角升麻湯治中風麻痺不仁鼻頰間痛脣口頰車髮際皆痛口不可開雖語言飲食亦相妨左額頰上如糊角手觸之則痛此足陽明經受風毒血凝滯而不行故也

犀角一兩二錢半　升麻一兩　防風

羌活各七錢　川芎　白附子

白芷　黃芩各半兩　甘草二錢半

右爲末每服五錢水二盞煎至一盞去粗濾服食後日三服

論曰足陽明者胃也經云陽胃爲市如市廛無所不有也六經之中血氣俱多腐熟水穀故飲食之毒聚於陽胃此方以犀角爲主解飲食之毒也陽明經絡環臂挾口起於鼻交頞中循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱故王公所患此一經絡也以升麻佐之餘藥皆除風熱升麻黃芩專入胃經爲使也

風中腑兼中臟治驗

順德府張安撫字耘夫年六十一歲於己未閏十一月初患風證半身不遂語言蹇澀心神昏憒頰蹶自汗表虛惡

風如飲冰雪口不知味鼻不聞香臭聞木音則驚悸小便頻多大便結燥若用大黃之類下之卻便飲食減少不敢用不然則滿悶晝夜不得瞑目而羸最苦於此約有三月餘凡三易醫病全不減至庚申年三月初七日又因風邪加之痰嗽咽乾燥疼痛不利唾多中脘氣痞似噎寸思內經有云風寒傷形憂恐怒傷氣氣傷臟乃病臟病形乃應又云人之氣以天地之疾風名之此風氣下陷入陰中不能生發上行則爲病矣又云形苦志苦病生於脈神先病也邪風加之邪入於經動無常處前證互相出見治病必求其本邪氣乃覆論時月則宜升陽補脾胃瀉風木論病則宜實表裏養衛氣瀉肝木調榮登元氣懷書怒是治其本也宜以加減沖和湯治之

加減沖和湯

柴胡　黃芪各五分　升麻

當歸　甘草炙各三分　半夏

黃蘗　黃芩　人參

陳皮　芍藥各二分

右十一味㕮咀作一服水二盞煎至一盞去柤溫服如自汗加黃芪半錢嗽者加五味子二十粒晝夜不得睡乃因心事煩擾心火內動上乘陽分衛氣不得交入陰分故使然也以硃砂安神丸服之由是晝亦得睡十日後安撫曰不得睡三月有餘今因睡不已莫非他病生否予曰不然衛氣者晝則行陽二十五度夜則行陰亦二十五度此衛氣交入陰分循其天度故安撫得睡也何病之有焉止有眼白睛紅澀難開宜以當歸連翹湯洗之

當歸連翹湯

黃連　黃蘗各五分　連翹四分

當歸　甘草各三分

右作一服水二盞煎至一盞去柤時時熱洗之十三日後至耳鼻微有悶氣不安於前沖和湯中又加柴胡三分以升少陽之氣飲三服至十五日全得安臥減自汗惡寒躁熱胸膈痞元小便多服藥之後小便減少大便一二日一行鼻聞香口知味飲食如常脈微弦而柔和按之微有力止有咽喉中妨悶會厭後腫舌赤早辰語言快利午後微濇宜以玄參升麻湯治之

玄參升麻湯

升麻　黃連各五分　黃芩炒四分

連翹　桔梗各三分　鼠粘子

玄參　甘草　白蒺藜各二分

防風一分

右十味㕮咀作一服水二盞煎至七分去柤稍熱漸漱時時嚥之前證良愈止有牙齒無力不能嚼物宜用牢牙散治之

牢牙散

羊筒骨灰　升麻各三錢　生地黃

當歸　石膏各一錢　白茯苓

黃連　人參各五分　胡桐淚三分

右爲極細末入麝香少許研勻臨臥擦牙後以溫水漱之

安撫初病時右肩臂痛無主持不能舉動多汗出肌肉瘦不能正臥臥則痛甚經曰汗出但但使人偏枯予思內經云虛與實鄰決而遲之又云留瘦不移節而刺之使經絡通和血氣乃復又言陷下者灸之爲陽氣下陷入陰中肩臂時痛不能運動以火導之火引而上補之溫之已上證皆宜灸刺蓋此先刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上有井穴內先鍼後灸二七壯及至灸痛發於枯瘦處漸添肌肉汗出少肩臂微有力至五月初八日再灸肩井次於尺澤穴各灸二十八壯引氣下行與正氣相接次日臂臂又添氣力自能搖動矣

時值仲夏暑熱漸盛以清肺飲子補肺氣養脾胃定心氣

清肺飲子

白芍藥五分　人參　升麻

柴胡各四分　天門冬　麥門冬去心各三分

陳皮二半分　甘草生　黃芩

黃蘗

右十一味㕮咀作一服水二盞煎至一盞去柤溫服食後汗多者加黃芪五分後以潤腸丸治胸膈痞悶大便澀滯

潤腸丸

麻子仁別研　大黃酒煨各一兩半　桃仁泥

當歸尾　枳實麩炒　白芍藥

升麻各半兩　人參　生甘草

陳皮各三錢　木香　檳榔各二錢

右十二味除麻仁桃仁外爲末卻入二仁泥蜜丸桐子大每服七八十丸溫水食前送下初六日得處暑節暑猶未退宜微收黃皮毛益衛氣秋以胃氣爲本以益氣調榮湯去之本藥中加時藥使邪氣不能傷也

益氣調榮湯

人參三分臣　益氣和中

當歸二分佐　和血潤燥

陳皮二分去白佐　順氣和中

熟地黃二分佐　養血潤燥瀉陰火

白芍四分臣　補脾胃微收治肝木之邪

升麻二分使　使陽明氣上升滋榮百脈

黃芪五分君　實皮毛止自汗益元氣

半夏泡三分佐　療風痰強胃進食

白朮二分佐　養胃和中厚腸胃

甘草炙二分佐引用　調和胃氣溫中益氣

紫胡二分使 引少陽之氣使出於胃中乃風行於天上

麥門冬三分去心性 翻有暑氣未退故加之安肺氣得秋分節不用

右十二味㕮咀作一服水二盞煎至一盞去柤溫服忌食辛熱之物及助暑邪秋氣不能收也正氣得復而安矣

風中腑諸方

大通聖白花蛇散治諸風疾

杜仲 天麻 海桐皮 乾蠍 赤箭 郁李仁 當歸 厚朴 蔓荊子 木香 防風 藁本 官桂 羌活 白附子 草薢 虎骨 白芷 山藥 菊花 白花蛇肉 牛膝 甘草 蔵靈仙

右二十四味等分爲末每服一二錢溫酒調下荆芥湯亦得空心服之

犀角防風湯治一切諸風口眼喎斜手足拘攣語言蹇澀

國服麻木並皆治之

犀角 防風 甘草炙 天麻 羌活各一兩 滑石三兩 石膏一兩半 麻黃七錢半不去節 獨活 山梔子各七錢 荆芥 連翹 當歸 黃芩 全蠍炒 薄荷 大黃各半兩 桔梗半兩 白朮 細辛各四錢

右二十味㕮咀每服五錢水二盞生薑十片煎至一盞去柤稍熱服未汗再一服如病人嬰氣虛則全去大黃

木香丸疏風順氣調榮衛寬胸膈清頭目化痰涎明視聽散積滯

檳榔 大黃煨各二兩 陳皮去白焙一兩 木香 附子炮 人參各一兩 官桂 川芎 羌活 獨活 三棱炮各半兩 肉豆蔻六個去皮

右十二味爲細末每料末二兩入牽牛淨末一兩蜜丸桐子大每服十丸至十五丸臨臥生薑橘皮湯下此藥治嗽極多不可具述

續命丹治男子婦人卒中諸風口眼喎斜言語蹇澀牙關緊急半身不遂手足搐搦頑麻疼痛涎潮悶亂婦人血運血風喘嗽吐逆睡臥不寧

川芎 羌活 南星薑製 川烏炮去皮 天麻 白鮮皮 當歸 防風 海桐皮 地榆 虎骨 熱地黃 硃砂 烏蛇生 鉛白霜 乾蠍 肉桂各一兩 牛黃 雄黃各三錢 輕粉二錢 麻黃去節四兩

右二十一味爲末麻黃酒汁入約半升同熬成膏和前藥末爲丸彈子大每服一丸豆淋酒下或苓汁化下不拘時候張文叔傳此二方戊辰春中書左右散仲謀忠半身不遂麻木太醫則予益與服之汗大便一服而愈故錄之

疏風湯治半身不遂麻木及語言微澀季春初夏宜服

麻黃三兩去節 杏仁去皮 益智仁各一兩 甘草炙 升麻各半兩

右五味㕮咀每服五錢水一小碗煎至六分去柤溫服腳膝熱水葫蘆以大汗出去葫蘆不用

趁風膏治中風手足偏廢不舉

紅蜂蛸 川烏去皮脐

穿山甲各二兩生用一兩半麸一半

右爲末每服用半兩杏心白汁和成厚餅子約一寸半貼在所患一邊腳心中縛定避風密室中椅上坐椅前用熱湯一盆將貼藥腳於湯內浸仍用人扶病人恐汗出不能支持候汗出急去了藥汗欲出身麻木得汗週徧爲妙宜謹避風自然手足可舉如病未盡隙候半月再用一次自除根本仍服治諸風之藥補理忌口遠慾以自養

風中臟諸方

活命金丹治中風不語半身不遂肢節頑麻痰涎上潮咽嗌不利飲食不下牙關緊急口噤及解一切酒毒藥毒發熱腹脹大小便不利胸膈痞滿上實下虛氣閉面赤汗後餘熱不退勞病諸藥不治無問男女老幼皆可服之

貫衆 甘草 板藍根 乾葛 甜硝各一兩 川大黃一兩半 牛黃 珠子粉 生犀角 薄荷各五錢 辰砂四錢研一半爲衣 麝香研 桂 青黛各三錢 龍腦研二錢

右十五味爲末與研藥和勻蜜和水浸蒸餅爲劑每兩作十丸硃砂爲衣麝臍用真金箔肆十片爲衣腦只修合瓷器收貯多年不壞如傷風毒茶清化下解毒藥新汲水化下汗後餘熱勞病及小兒驚熱並用薄荷湯化下已上並量大小加減服之

至寶丹

辰砂 生犀 玳瑁 雄黃 人參六味各五兩 牛黃二兩半 麝香 龍腦各一兩 天南星二兩半水煮軟切片 銀箔二百五十片入藥

金箔（二百五十片半人藥半爲衣）　安息香（五兩用酒半升熬成膏）

龍齒（二兩水飛）

右十三味爲末用安息香膏重湯煮煬搗劑旋丸梧子大每服三丸至五丸人參湯下小兒一兩丸至聖保命金丹治中風口眼喎斜手足顫搜語言蹇澁匡肢不舉精神昏憒痰涎并多

貫衆（一兩）　生地黃（七錢）　大黃（半兩）

青黛　板藍根（各三錢）　硃砂（研）

蒲黃　薄荷（各二錢半）　珠子（研）

龍腦（研各一錢半）　麝香（一錢研）　牛黃（二錢半研）

右十二味爲末入研藥和勻蜜丸雞頭大每用一丸細嚼茶清送下新汲水亦得如病人嚼不得用薄荷湯化下無時此藥鎮墜痰涎大有神效用金箔爲衣

牛黃通關湯初覺中風一二日實則急宜下之

牛黃（研三錢）　朴硝（三錢研）　大黃

甘草（各一兩炙）

右四味除研藥爲末每服一兩水二盞除牛黃朴硝外煎至一盞去柤入牛黃朴硝一半調服以利爲度須動三兩行末利再服量虛實加減

訶子湯治失音不語

訶子（四兩半生半煨）　桔梗（一兩半生半炒）　甘草（二寸半生半炙）

右三味爲末每服五錢用童子小便一盞煎五七沸溫服甚者不過三服

正舌散治中風舌強語澀

雄黃（研）　荊芥穗（各等分）

右爲末每服二錢豆淋酒調下

茯神散治語同前

茯神心（壯一兩）　薄荷（焙二兩）　蝎梢（去毒二錢）

右爲末每服一二錢溫酒調下

勝金丹治中風涎潮卒中不語合吐利者當服此吐利風

青薄荷（半兩蒸成膏）　豬牙皁角（二兩同薄荷以水二升搗取汁盡用銀石器內慢火熬成膏）

瓜蒂末（一兩）　硃砂（研一兩留少許爲衣）

粉霜（研）　洛粉（一錢水銀粉是）

右以上四物研勻入前膏內入臼內杵三二千杵丸如櫻桃大以硃砂爲衣每服一丸酒磨下急即研細酒調灌之癱中前如覺有證狀每於四孟月服一丸自愈有病方可服

分涎散治中風涎潮作聲不得口噤手足搐搦

藿香　乾蠍　白附子

南星（泡四味各一兩同爲末）

膩粉（研）　粉霜（研）

右七味同爲末研勻每服一錢加至二錢薄荷湯或茶清湯調下未吐利再服

風邪入肝（出許學士本草方）

眞珠丸治肝經因虛內受風邪臥則魂散而不守狀如驚悸

眞珠母（三錢研）　熟地黃　當歸（各一兩半）

酸棗仁　柏子仁　人參（各一兩）

犀角　茯神　沈香

龍齒（研一兩）　虎睛（一對）　加麝香（三錢）

右爲末蜜丸如桐子大辰砂爲衣每服四五十丸金銀薄荷湯下日午夜臥服

獨活湯

獨活（無者）　人參　羌活

防風　前胡　細辛

沙參　五味子　白茯苓

牛夏麴　酸棗仁　甘草（各一兩）

右十二味㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片烏梅半箇煎七分去柤溫服不拘時

紹興癸丑予侍次回明有董生者患神氣不寧臥則夢飛揚雖身在牀而神魂離體驚悸多魘通宵不寐更數醫無效予爲診視之詢曰醫作何病治之董曰衆皆以爲心病予曰以脈言之肝經受邪非心也肝經因虛邪氣襲之肝藏魂者也遊魂爲變平人肝不受邪臥則魂歸於肝神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以臥則魂揚若離體也肝主怒故小怒則劇董生欣然曰前此未之聞也雖未服藥似覺沈疴去體矣願求藥治之予曰公且持此說與衆醫議所治之方而徐質之閱旬日復至云醫病議古今方書無與病對者故予處此二方以驚之服一月而病悉除此方以眞珠母爲君龍齒佐之

眞珠母入肝爲第一龍齒與肝同類故也龍齒虎睛今人例以爲鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各言其類也東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎金也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不定虎能寧靜故魄止而能守予謂治魄不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不失亦在夫人達之而已

風中臟治驗

眞定府臨濟寺趙僧判於至元庚辰八月間患中風半身不遂精神憒亂面紅頰赤耳聾鼻塞語言不出診其兩手六脈弦數嘗記潔古有云中臟者多滯九竅中腑者多著四肢今語言不出耳聾鼻塞精神昏憒是中臟也半身不遂是中腑也此臟腑俱受病邪先以三化湯一兩內疏三兩行散其壅滯使清氣上升充實四肢次與至寶丹加龍骨南星安心定志養神治之使各臟之氣上升通利九竅五日音聲出語言稍利後隨四時脈證加減用藥不勺即稍能行步日以繩絡其病腑如腹脹或高處得人扶之方可踰也又刺十二經之井穴以接經絡翌日不明繩絡能行步幾百日大勢至去戒之慎言語飲食一年方愈

治風雜方

祛風丸有人味甚鹹酸飲酒過多色黑無減添作成痰飲
素於胸膈滿則喘逆惡心涎流一臂麻木升則頭目昏
眩降則腰胸疼痛深則左癱右瘓淺則蹶然倒地此藥
寬中祛痰搜風理氣和血駐顏延年益壽

牛夏（薑汁作餅陰乾）　荊芥（各四兩）　槐角子（炒黃）
白礬（生用）　陳皮（去白）　硃砂（各一兩一為衣）

右六味為末生薑汁打糊為丸桐子大每服三十丸生
薑皁角子仁湯送下日二服早辰臨臥服
輕膏丹主中風癱瘓四肢不遂風痺等疾

苦參（三兩半）　桑白皮（土下者）　白芷
蒼朮　甘松（另用梔子）　川芎
麻黃（剉去節住煎用河水三升煎至一升去粗慈減膏）

右七味為末入前麻黃膏和丸彈子大每服一丸溫酒
一盞研化溫服之臥取汗五七日間日服手足當御輕
快卒中涎潮分利涎後用之
當歸龍腦丸治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋惕搐搦
神志不寧煩躁昏眩目昏眩肌肉瞤瘈胸膈痞滿咽
嗌不利腸胃燥澀小便淋閉筋脈拘急肢體羸弱精神
病常服宜通血氣調順陰陽病無再作

當歸　龍腦　大梔子
黃芪（蜜炙）　黃柴（各一兩）
大黃　蓽茇　黃芩（各五錢）
木香（二錢半）　麝香（五分另研）　青黛

右十一味為末蜜丸小豆大每服二十丸薑湯送下食
後張文叔傳此方
風藥聖餅子治男子婦人半身不遂手足頭麻口眼喎斜
痰涎壅盛及一切風他藥不效者小兒驚風大人頭風
婦人血氣並皆治之

川烏　草烏（生）　麻黃（去節各一兩）
白芷（二兩）　蒼朮　何首烏

川芎　白附子
防風　乾薑
荊芥（各二兩半）　雄黃（一錢六分）

右十四味為末醋糊丸如桐子大捻作餅子每服一餅
嚼碎茶清送下食後服
馬剃丸治諸風疾

川烏頭（炮去皮脐一兩）　荊芥穗（二兩）

右為細末醋麵糊為丸梧子大每服二十丸酒或熱水
下食空時日三四服
搜風潤腸丸治三焦不和胸膈痞悶氣不升降飲食運化
勝胃腸澁大便祕難

洗香　檳榔
青皮　陳皮
槐角（炒）　大黃（酒煨）
枳殼（去穰麸炒）　枳實（麩炒各五兩）

右十二味為末蜜丸如桐子大每服五六十丸熱白湯
送下食前常服潤腸胃導化風氣
澡洗藥治一切諸風及徧身瘙痒光澤皮膚可常用

乾荷葉（三十二兩）　藏藎仙（十五兩）　藁本（十六兩）
零陵香（十六兩）　茅香（十六兩）　藿香（十六兩）

甘松　白芷（各八兩）

右八味為粗末每服二兩生絹袋盛水二碗約四斗煎
四五沸放熱於無風處淋澡洗了避風少時如水冷少
時更添熱湯斟酌得可使用勿令添冷水不添藥末
拈痛散治肢節疼痛熨烙藥

羌活　獨活　防風
細辛　肉桂　白芷
良薑　麻黃（不去節）　天麻（去苗）
川烏（生用去皮）　葛根　吳茱萸
乳香（研）　小椒（去目）　全蠍（生用）

川薑（生用一兩）

右十七味為粗末入乳香研勻每抄藥十錢痛甚者十
五錢同鹽一升炒令極熱熱絹袋盛熨烙痛處不拘
時早晚頻用藥冷再炒一次用畢甚妙藥不用

衛生寶鑑卷八終

元羅天益謙甫著　三原李鈞鈗孟熙校刊

諸風門

風癇

補腦安神丸治男子婦人五種癇病無問遠年日近發作無時服藥不效者

茯神去皮取末三兩　人參　地骨皮
甘草取末　麥門冬去心焙二兩　硃砂研二兩
烏犀屑一兩　桑白皮取末一兩　龍齒研三錢
麝香研三錢　馬牙硝研二錢　牛黃研一兩
金箔三十五片

右十三味爲末和勻蜜丸彈子大金箔爲衣如癇病多年冬月溫水化下夏月涼水下不拘時候又治男子婦人虛勞發熱咳嗽新汲水一錢化下其痰滿痰嗽立止又治男女語澀舌強日進三服食後溫水化下

治痫疾

川芎　防風　豬牙皁角
鬱金各一兩　明礬各一兩　蜈蚣去頭足赤脚各一條

右六味爲細末蒸餅丸如梧子大空心茶清下十五丸一月除根神驗

神應丹治諸癇

好辰砂不以多少

右細研豬心血和勻以蒸餅裹劑蒸熟就熱取出丸如桐子大每服一丸人參湯下食後臨臥服

珠子辰砂丹治風病久不愈

山藥　人參　遠志
防風　紫石英　茯神
虎骨　虎睛　龍齒
五味子　石菖蒲　丹參
細辛各二錢半　眞珠末四分　辰砂二錢研爲衣

右爲末麵糊丸如桐子大硃砂爲衣每服三五十丸煎金銀湯送下日進三服忌魚肉濕麵動風之物

參珠丸治風病大有神效

人參　蛤粉　硃砂各半分

右三味爲末豬心血爲丸如桐子大每服三十丸煎人參湯空心送下日金銀湯下食遠

烏龍丸治五風癇病

川烏　草烏　天仙子
五靈脂各二兩　黑豆一升

右爲末水丸如桐子大每服五七丸溫湯下如中風加腎子牛黃

神應丹治諸風心痛病

狐肝一具　烏鴉一隻　鵝梟一箇
白礬一兩生　生犀角一兩

野狸一箇去腸肚皮毛入新罐內黃泥固濟炭火煨令焦黃色卻用

右爲末酒打糊丸如皁角子大硃砂爲衣每服一丸溫酒送下無時

壓痰丸治風癇

天南星九蒸九曝

右爲末薑汁丸桐子大每服二十丸人參湯下菖蒲麥門冬湯亦得

治風癇及心風病

皁角三挺搥碎按濾取汁如稀糊攤紙上曝乾取兩葉如小錢大用溫漿水浸洗下去紙注於兩鼻內各一蚬子殼許須臾涎下吱筋遊涎盡後用

菖蒲生一兩　白礬生二兩

右爲末稀糊丸如桐子大每服三十丸冷水送下無時以效爲度

琥珀膏星丸局方用南星一斤硃砂二兩琥珀一兩無豬心血

天南星一斤掘坑深二尺用炭火五斤於坑內燒熟紅取出炭埋煨用好酒一升浸之將南星趁熱下坑內用盆蓋壹宿泥塞令經一宿開取出再焙乾爲末入

琥珀四兩末　硃砂一兩以一半爲衣

右爲末和勻豬心血三箇生薑汁打麵糊將心血和入藥末丸如桐子大每服五十丸煎人參湯空心送下日三服

驚癇治驗

魏敬甫之子四歲一長老摩頂授記衆僧念呪因而大恐遂驚搐掖涎塞口多白睛項背強急喉中有聲一時許方省後每見衣皁之人輒發多服硃犀龍齒鎮墜之藥四十餘日前證仍在又添行步動作神思如癡命予治之診其脈沈弦而急黃帝鍼經云心脈滿大癇慄筋攣又所脈小急癇瘛筋攣蓋小兒血氣未定神氣尚弱因而驚恐神無所依又動於肝肝主筋故癇慄筋攣病久氣弱小兒易爲虛實多服鎮墜寒涼之藥復損其氣故行步動作如癡內經云暴挛癇眩足不任身取天柱穴者是也天柱穴乃足太陽之脈所發陽癇附而行也又云癲癇瘛疭不知所苦兩蹻主之男陽女陰深古老人云晝發取陽蹻申脈夜發取陰蹻照海先各灸二七壯陽蹻申脈穴在外踝下容爪甲白肉際陷中陰蹻照海穴在足內踝下陷中是也次與沈香天麻湯服三劑而痊愈

沈香天麻湯

沈香　川烏炮去皮　益智各二錢
甘草一錢半炙　蔓荊一錢　獨活四錢

羌活五錢　天麻　黑附子炮去皮各三錢
半夏泡　防風各三錢　當歸一錢半

右十二味㕮咀每服五錢水二盞薑三片煎一盞溫服

食前忌生冷硬物寒處坐臥素問舉痛論云恐則氣下精竭而上焦閉又曰從下上者引而去之以羌活獨活苦溫味之薄者營中之陽引氣上行又入太陽之經爲引用故以爲君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛甘溫以補氣血不足又養胃氣故以爲臣黑附川烏益智大辛溫行陽退陰又治客寒傷胃腎主五液入脾爲涎以生薑半夏燥濕化痰十劑云重可去怯以沈香辛溫體重清氣去怯安神故以爲使氣味相合升陽補胃恐怯之氣自得而平矣

破傷風諸方

烏梢散治破傷風及洗頭風神效

烏梢蛇酒浸一宿去骨六錢　麻黃去節一兩
草烏切開內白　黑附炮
川芎　白附　天麻各半兩
蝎梢二錢半

右爲末每服一錢熱酒調下日三服重者三五日見效

四般惡證不可治第一頭目青黑色第二額上汗珠不流第三眼小目瞪第四身上汗出如油

硃砂丸治破傷風目瞪口噤不語手足搐搦項筋強急不能轉側發則不識人

硃砂研　半夏洗
鳳凰臺三錢　雄黃五分　麝香一半

右爲末煮肉丸如桐子大每服一丸或兩丸冷水送下以吐爲度

天麻丸治破傷風神效不可言

天麻　川烏生去皮名二錢　草烏生
雄黃各一錢

右爲末酒糊丸如桐子大每服十丸溫酒送下無時

癘風論

內經云脈風成癘此疾非止肺腎臟有之以其病發於鼻俗乎爲肺風也鼻準赤腫眼大乃血隨氣化也氣既不施則血聚血聚則肉爛而生蟲此屬厥陰前痔之論詳矣內中生蟲鼻準赤大以藥疏之可用局方升麻湯下錢氏導青丸是也餘病各隨經而治之癘風成瘋樺皮散主之此藥出局方從少至多服五七日後灸承漿七壯瘡輕再灸病愈再灸同上

樺皮散治肺壅風毒徧身瘡疥及癮疹瘙痒

杏仁去皮尖用水一碗煎令減半取出令乾另研　荊芥穗各二兩
枳殼去穰用麸炒存性　樺皮麸炒各四兩
甘草炙半兩

右五味爲末每服二錢食後溫酒調下日進三服

承漿一穴一名懸漿在頤前脣下宛宛中足陽明任脈之會療偏風口喎面腫消渴口齒疳蝕蟲瘡灸亦佳日灸七壯至七七壯止灸則血脈通宣其風應時立愈艾炷依小竹筯頭大不灸破血肉但令當脈灸亦能愈疾

凌霄散治癘風神效

蟬殼　地龍炙　殭蠶
全蝎各七箇　凌霄花半兩

右爲末每服二錢熱酒調下無時於浴室中常存湯中一時許服藥神效

四聖保命丹

大黃半兩　黃藥半斤　苦參
荊芥各四兩　蝦蟇一個燒灰

右爲末蜜和勻分作一百二十丸每服一丸溫酒送下食遠日三服忌肉醬

祛風散

大蠶砂五升微炒水淘二遍控乾　東行蝦虎一條炙乾白麵四斤

或五斤拌砂爲絲索晒乾

右爲末每服一二合熬柏葉湯調服食前日三服

柏葉湯東南枝上摘柏葉一秤水一桶煮三沸去柏葉盛起旋熬蠶砂調服初服苦澀三五日後甜十日四肢沈重便赤白痢一月後發出瘡疥瘡四十日後瘡破用

烏龍散

倒懸青灰二錢烏雞子皮用柏油調搽於破瘡疥瘡上

神效天麻湯治癘風

胡麻半升研　天麻二兩　乳香七錢半研

右爲末每服五錢七臘茶調下日三服服半月兩腰眼灸四十壯忌動風物

換肌散治大風年深久不愈以至眉毛墮落鼻梁崩塌額顱壓破

白花蛇　黑烏蛇各酒浸一宿　地龍去土
蔓荊子　藏靈仙　荊芥
甘菊花　沙苑蒺藜　苦參
紫參　沙參　甘草炙
不灰木　木賊　九節菖蒲
天門冬　赤芍藥　定風草
何首烏　胡麻子炒黃　木鼈子
草烏去皮　蕃荒　川芎以上二十四味各三兩
天麻二兩　細辛　當歸
白芷各一兩

右二十八味爲末每服五錢七溫酒調下食後酒多爲妙服至踰月取效如神

如聖散淋洗大風疾大有神效

頑荊子　苦參　玄參
紫參　厚朴　荊芥
沙參　陳皮　麻黃去節各一兩
蔓荊子　防風　白芷

藏靈仙各一兩　桃柳枝各一把

右爲末水五升煎三錢煎數沸臨臥熱洗之忌酒濕麵五辛之物

醉仙散治大風疾徧身癮疹瘙痒麻木

胡麻子　蔓荊子　牛蒡子

枸杞子各一兩一處同炒　白蒺藜

苦參　瓜蔞根　防風各半兩

輕粉少許

右爲末每服一錢茶清一盞調下空心日午臨臥各一服服後五七日先於牙縫內出臭黃涎渾身疼痛次後便利膿血病根乃去

加減何首烏散治紫白癜風筋骨疼痛四肢少力眠斷白人鼻梁崩塌皮膚麻木及手足皴裂睡臥不穩步履艱辛

何首烏　蔓荊子　石菖蒲

荊芥穗　甘菊花　枸杞子

藏靈仙　苦參各半兩

右爲末每服三錢蜜茶調下無時

癘風刺法幷治驗

內經曰脈風成癘又云風氣與太陽俱入行諸脈俞散於分肉之間衛氣相干其道不利故使肉潰膚而有瘍衛氣有所凝而不行故肌肉不仁也夫癘風者有榮氣熱附其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脈不去名曰癘風或名曰寒熱病大風之病骨節重眉鬚墮名曰大風刺其肌肉故汗出百日刺骨髓汗出百日凡二百日

鬢眉生而止鍼

戊寅歲正月我庫使病大風滿面連頸極痒眉毛已脫落須以熱湯沃之則稍被瘡夜數次沃之或砭刺亦緩先師曰厲風者痛風也榮衛熱附其氣不清故使鼻柱壞皮膚色敗大風者風寒寒於脈而不去治之當刺其脈上以鍼

鍼鍼其處按出其惡氣血盡乃止常食方食勿食他食宜此補氣瀉榮湯治之此藥破血散熱升陽去痒瀉榮辛溫散之甘溫升之以行陽明之經瀉心火補脾氣乃正治之

補氣瀉榮湯

升麻　連翹各六分　桔梗五分

黃芩四分　生地黃四分　蘇木

黃連　黃芪　全蠍各三分

人參　白蒺藜各二分　甘草一分半

地龍三分　桃仁三箇　蠐螬去足翅三箇

胡桐淚一分研　麝香少許研　當歸三分

水蛭三箇洗盡

右十九味除連翹別剉胡桐淚研白蒺藜爲末麝香蠐螬水蛭令爲末餘藥都作一服水二盞酒一盞入連翹同煎至一盞去粗再入胡桐淚白蒺藜二味末幷麝香等再上火煎至七分稍熱服早飯後午飯前服忌酒麵生冷硬物

鶴膝風方

蝍蛴丸治鶴膝風及腰膝風痛胡蒼望博士病風痺手足指節如桃李痛不可忍服之悉愈

蝍蛴一條頭尾生者　白附子　阿魏研

桂心　白芷各一兩　乳香七錢五分

當歸　北細辛　芍藥

藏靈仙　地骨皮　牛膝

羌活　安息香　桃仁各一兩生同安息香研

沒藥七錢五分

右十六味蝍蛴桃仁白附阿魏桂心白芷安息香乳香沒藥九味同童子小便幷酒二升炒熱冷處入餘藥爲末蜜丸彈子大空心溫酒化下一丸無時

頭痛門幷治法方

太陽頭痛惡風寒諸血虛頭痛川芎主之

少陽頭痛脈弦細寒熱往來主之

陽明頭痛自汗發熱不惡寒白芷主之

諸氣虛痛氣血俱虛頭痛黃芪主之

太陰頭痛必有痰癖重或腹痛爲痰癖半夏主之

厥陰頭痛項痛其脈浮微緩知欲入太陽病矣必有痰吳茱萸主之

少陽頭痛手三部三陽經不流行而足寒氣逆爲寒厥矣細辛主之

救苦神白散治男子婦人偏正頭疼眉骨兩太陽穴痛及熱上攻頭目目赤不已項筋拘急耳作蟬鳴

川芎　甘松　白芷

赤芍藥　兩頭尖　川烏去皮各六分

甘草炙八錢

右爲末每服二錢茶清調下服後飲熱湯半盞投之

川芎散治頭風偏正頭疼昏眩妙

川芎　細辛　芫活

槐花　石膏　香附子

甘草炙各半兩　荊芥　薄荷

茵陳　防風去叉　菊花各一兩

右十二味爲末每服二錢食後茶清調下日三服忌動風物

石膏散治頭疼不可忍

麻黃去節根　石膏各一兩

何首烏半兩　葛根七錢半

右爲末每服三錢用水一盞生薑三片蘸至七分去柤溫服極者三服神效

川芎神功散治風熱上攻偏正頭疼無問輕重久新並皆治之

川芎一兩　甘草二錢半　川烏生去皮

南星　麻黃去節　白芷各半兩

右爲末每服三錢水一盞薑三片煎七分入清酒半盞和柤溫服避風如入行五七里再服汗出爲度其痛立愈

茯苓半夏湯治風熱痰逆嘔吐或眩運頭痛

赤茯苓去皮　黃芩　甘草一錢　半夏三箇大者水煮三沸各切三四片焙　橘皮去白各一分

右㕮咀作一服水二盞薑三片煎至一盞去柤分三服一日以效爲度

乳香殘落散治男子婦人偏正頭疼不可忍大有神效

御米殼去蒂四兩　柴胡去苗　桔梗去蘆　甘草　陳皮各一兩

右爲末每服三錢水一盞燈草十莖長四指煎至七分去柤食後服

清空膏治偏正頭痛年深不愈及暗風濕熱頭痛上壅損目及腦痛不止

羌活　防風去蘆各一兩　甘草炙一兩半　柴胡七錢　川芎五錢　黃芩三兩半炒半酒浸焙　黃連酒洗炒一兩

右同爲末每服二錢匕熱餳入茶少許調如膏以匙抄入口內少用白湯下臨臥如苦頭痛每服加細辛二分如太陰厥逆有痰名痰厥頭疼去羌活防風川芎甘草加半夏一兩半如頭疼服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍

白虎加白芷湯治陽明頭痛發熱惡熱而渴止於白虎湯加吳白芷依本方煎

石膏散治頭疼

川芎　石膏　白芷各等分

右末四錢熱茶清調下

加聖散治眼目及頭風偏頭痛

麻黃燒灰半兩　益智二錢半　麝香少許

鼠子散

右爲末擣鼻內神效

半夏茯苓天麻湯治痰厥頭痛頭旋眼黑煩悶惡心氣短

倦言語心神顛倒目不敢開如在風雲中頭痛如裂身重如山四肢厥冷

天麻　黃芪　人參　澤瀉　白朮　橘皮

白茯苓　炒麴各五分　半夏一錢半泡　麥蘖一錢半　黃芩二分

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤稍熱食後服

此頭痛爲足太陰痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不能除天麻苗謂之定風草獨不爲風所搖以治內風之神藥內風者虛風是也黃芪甘溫瀉火補元氣實表虛止自汗人參甘溫調中補氣瀉火二朮甘溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中而升陽炒麴消食蕩胃中滯氣麥蘖寬中而助胃氣乾薑辛熱以溫中寒黃蘗苦寒用酒洗以療冬日少火在泉而發躁也

川芎散治偏頭痛神效

白殭蠶六錢生用　甘菊花　石膏　川芎各三錢

右四味爲末每服三錢茶清調下食後時服忌猪肉蕎麥麵

無虛頭痛治驗

柏參謀名德字仲實年六十一歲壬子年二月間患頭痛不可忍晝夜不得眠郎中曹通甫邀予視之其人云近在燕京初患頭昏隱微痛醫作傷寒解之汗出後痛轉加復忤解病轉加而頭愈痛遂歸每過郡邑召醫用藥一同到今痛甚不得安臥惡風寒而不喜飲食診其六脈弦細而微氣短而促語言而懶內經云春氣者病在頭年高氣弱清陽氣不能上升頭面故昏悶此病本無表邪因發汗過多清陽之氣愈虧損不能上榮亦不得外固所以頭苦痛而惡風寒氣短弱而不喜食正宜用順氣和中湯此藥升陽而補氣頭痛自愈

順氣和中湯

黃芪一錢半　人參一錢　甘草炙七分　白朮　陳皮　當歸　白芍各五分　升麻　柴胡各三分　細辛　夏荊子　川芎各二分

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去柤溫服食後服之一服減半再服全愈

內經云陽氣者衛外而爲固也今年高氣弱又加發汗衛外之氣愈損故以黃芪甘溫補衛實表爲君人參甘溫當歸辛溫補血氣白芍酸寒收衛氣而爲臣白朮陳皮炙甘草苦甘溫益胃氣生發陽氣上實皮毛肥腠理爲佐柴胡升麻苦平引少陽陽明之氣上升遍百脈灌溉週身者也川芎夏荊子細辛辛溫體輕浮清利空竅爲使也明年春赴召之六盤山曹郎中以古風見贈云東垣李明之蚤以能醫鳴易水得奧訣爲竭黃金篇一燈靜室窮內經黃帝拊掌岐伯驚曰儲月積不易售牛世豈但三折肱所長用藥有活法舊方堆案白魚生不聞李延同居且同病一下一汗俱得明早平乃知古人一證有一方後世以方合證此理殊未明公心審是者推子直以異己喧謗聲先生徒恨臥黃壤門生賴汝卓卓醫中英活人事業將與相一且在己權非輕連年應召天策府廉臺草木皆欣榮好藏藥青粘散莫使樊

肝經風盛木自搖動尚書云滿招損老子云物壯則老故木陵脾土金來剋之是子來與母復讐也使梳頭有雪皮見肺之證也肺主皮毛大便實溏青丸主之虛者人參消風散主之

人參消風散治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋運耳聾蟬鳴眼澀好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙痒癮疹

川芎　甘草　荆芥穗　羌活　防風　白殭蠶　茯苓　蟬殼　藿香葉　人參各二兩　厚朴　陳皮各半兩

右爲末每服二錢茶清調下如脫著沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱倦疼用荆芥茶清調下溫酒調下亦得可并服之

薄腦芎犀丸治頭面諸風偏正頭痛心肺邪熱痰熱咳嗽

石膏　川芎各四兩　生龍腦　生犀屑　山梔各一兩　硃砂內兩二兩爲衣　人參　茯苓　細辛　甘草各二兩　阿膠炒一兩半　麥門冬二兩

右爲細末蜜丸如櫻桃大每服一丸至二丸細嚼茶清任下○有本方內加白豆蔻龍腦以金箔爲衣

神消散治頭昏目眩腦痛耳鳴鼻塞聲重消風痰化痰涎

植香　人參　羌活　防風各十兩　薄荷　荆芥穗　甘草各二十兩　石膏研四十兩　細辛五兩

右爲末每服二錢沸湯點服

雷頭風方

消腫湯治頭面疙瘩腫痛惡寒發熱四肢拘急狀如傷寒

升麻一兩　蒼朮一兩　荷葉一箇全一方荷葉一箇燒研細煎藥調服亦可

右㕮咀每服五錢水一鍾半煎至七分去柤溫服食後

雷頭風諸藥不效者證與藥不相對也夫雷者震卦主之震仰盂故藥內加荷葉象其震之形狀其色又青乃遠類象形也

眉骨痛方

選奇湯治骨痛不可忍大有神效

羌活　防風各三錢　甘草二錢夏月生冬月炒　酒黃芩冬月不可用熱甚者用

右㕮咀每服三錢水二餞煎至一餞去柤溫服食後時時服之

時毒疙瘩方

潤薑湯治臟腑積熱發爲腫毒時疫疙瘩頭面洪腫咽嗌堵塞水藥不下一切危惡疫病若腫熱甚加芒硝快利爲度利已去硝

潤薑　升麻　大黃　黃芩各一兩　藍葉　玄參各二兩

右六味爲粗末每服二錢水一餞半煎至六分去柤溫服腫熱甚加芒硝二錢半

消毒丸治時疫疙瘩惡證

大黃　牡蠣燒殭蠶各一兩

右三味爲末蜜丸彈子大新汲水化下一丸無時

胃虛面腫方

胃風湯治虛風證能食麻木牙齦急搐目內蠕動胃中有風故面獨腫

白芷一錢六分　蒼朮當歸身各一錢　升麻二錢　葛根一錢　麻黃半錢不去節　藁本　黃芩　柴胡　羌活各五分　蔓荊子一錢　甘草五分　乾生薑二分　棗四個

右十五味㕮咀作二服每服水二餞煎至一餞去柤溫服食後

面熱治法并方

楊郎中之內五十一歲身體肥盛己酉春患頭目昏悶面赤熱多服清上藥不效請予治之診其脈洪大而有力因經云面熱者足陽明病脈經云陽明經氣盛有餘則身已前皆熱況其人素膏粱積熱於胃陽明多血多氣本實則風熱上行諸陽皆會於頭故面熱之病生矣先以調胃承氣湯七錢黃連二錢犀角一錢疏利三兩行徹其本熱次以升麻加黃連湯去經絡中風熱上行如此則標本之病邪俱退矣

升麻加黃連湯

升麻　葛根各一錢　白芷　黃連各七分　甘草炙　草豆蔻仁　人參各五分　黑附炮七分　益智三分

右九味㕮咀作一服水三餞薑棗白同煎至一餞去柤溫服數服良愈

升麻湯辨

或曰升麻湯加黃連治面熱加附子治面寒有何依據答曰出自仲景雲岐子註仲景傷寒論中辨葛根湯云尺寸脈俱長者陽明經受病也當二三日發以其脈夾脊格目故身熱目疼鼻乾不得臥此陽明經受病也始於鼻交頞中從頭至足行身之前爲表之裏陽明經標熱本實從標脈浮而長從本脈沈而實陽明爲病主蒸蒸而熱不惡寒身熱名標陽明本實者胃中燥鼻乾目疼爲肌肉之本病兀兀而熱陽明禁發汗不可在本者不禁下發之則變黃證太陽主表榮衛是也榮衛之下肌肉屬陽明二陽併病葛根湯主之衛者桂枝榮者麻黃榮衛之中桂枝麻黃各半陽榮衛之下肌肉之分者葛根湯主之又名解肌湯故陽明爲肌肉之本非專於發汗止汗之治桂枝麻黃兩方互併爲一方加葛根者便作葛根湯故榮衛肌肉之次也

桂枝芍藥甘草生薑大棗止汗麻黃桂枝甘草生薑發汗葛根味薄獨加一味非發汗止汗從葛根以解肌故名葛根湯錢仲陽制升麻湯治傷寒溫疫風熱壯熱頭痛體痛瘡疹已發未發用葛根爲君升麻爲佐甘草芍藥安其中氣朱率議活人書將升麻湯列爲陽明經解若予診楊氏婦陽明標本俱實先攻其裏後瀉經絡中風熱故升麻湯加黃連以寒治熱也尼長老陽明標本俱虛寒先實其裏次行經絡升麻湯加附子以熱治寒也仲景羣方之祖信哉

陰出乘陽治法方

一婦人三十餘藏憂思不已飲食失節脾胃有傷面色黧黑不澤環臂尤甚心懸如飢狀飢不欲食氣短而促大抵心肺在上行榮衛而光澤於外宜纖而不藏腎肝在下養筋骨而強於內當隱而不見脾胃在中主傳化精微以灌四旁沖和而不息其氣一傷則四藏失所憂思不已氣結而不行飲食失節氣耗而不足使陰氣上溢於陽中故無色見於面又經云脾氣通於口其華在脣今水反來侮土故無色見於脣此陰陽相反病之逆也上古天眞論云陽明厥衰於上面始焦始知陽明之氣不足故用沖和順氣湯此藥助陽明生發之劑以復其色耳

沖和順氣湯

葛根半錢　升麻　防風

白芷一錢　黃芪八分　人參七分

甘草四分　芍藥　蒼朮各三分

右㕮咀作一服水二盞薑三片棗兩箇煎至一盞去柤溫服早飯後午前取天氣上升之時使人之陽氣易達故也數服而愈

內經曰上氣不足推而陽之以升麻苦平葛根甘溫自地升天通行陽明之氣爲君人之氣以天地之氣暫而不行者以辛散之防風辛溫白芷甘辛溫以散滯氣用以爲臣蒼朮苦辛獨除陽明經之寒濕白芍藥之酸安太陰經之怯弱十劑云補可去弱人參羊肉之屬是也人參黃芪甘草甘溫益正氣以爲臣至眞要大論云辛甘發散爲陽生薑辛熱大棗甘溫和榮衛開腠理致津液以復其陽氣故以爲使也

衛生寶鑑卷九終

元羅天益謙甫著　三原李錫齡孟熙校訂

眼目諸病并方

上命周都運德甫諸路求醫治眼名方得金露膏於濟南劉太醫用之多效此藥除昏退翳截赤定痛

金露膏治一切眼神效

淄州黃丹　蕤仁去殼各一兩　黃連半兩

蜜六兩

右先將黃丹鐵鍋內炒紫色入蜜攪勻下長流水四升以嫩柳枝五七條把定攪之次下蕤仁滚十數沸又下黃連以柳枝不住手攪熬至二升笊籬內傾藥在紙上慢慢滴之無令塵汙如有瘀肉加硇砂末一錢上火煆開入前膏子內用此藥多效故錄於此

加味春雪膏治風熱上攻眼目昏暗痒痛癢澀難開多淚疼痛或生翳膜

黃連四兩洗淨用童便二升浸一宿去柤用汁并蘆甘石汁盡留石乾用　好黃丹六兩水飛

南蘆甘石十二兩

烏魚骨燒存性　乳香

白丁香半錢　蜀椒

硇砂一錢研細水調燒內黃湯瓶中候乾用度　輕粉各少許

右十味各爲末另裹起用白砂蜜二斤煉去蠟下藥甘石末不住手攪次下黃丹及諸藥末不住手攪至紫色不粘手爲度搓作餅子每用一粒新汲水少許化開時時點之忌酒濕麵豬肉蕎麥

此二方予從軍征南

川芎　薄荷　荆芥穗各半兩

盆硝　石膏　桔梗各一兩

右爲末每服一字口噙水舉內搐之神效加龍腦三分尤妙

重明散治一切風熱之毒上衝眼目暴發赤腫疼痛或生翳膜瞖肉癰澀羞明兩臉赤爛

蘆甘石一斤火燒用黃連水淬爲末　川椒二錢熬青子入蘆甘石末　內火燒乾爲度　銅綠名半兩　黃連　硇砂三錢　蕎黃半兩　雄黃二錢　蕎豆粉四兩

右上六味同蘆甘石末密羅羅過乳細茴上膏不糝爲度後用腦子一錢南硼砂一錢研細用大豆養之每用少許以骨筯乾點臥少時忌酒濕麵諸雜魚肉辛熱等物此方得之路大大家數口爲生

夜光散治赤眼翳膜昏花

宣黃連　訶子各二兩　當歸一兩　銅綠一錢

右㕮咀以河水三升同浸兩晝夜於銀石器熬取汁約一大盞內八分來得所看粗黑色爲度生絹紐取汁再上文武火熬槐柳攪濃水成珠爲度入後膏和劑

豬膽子二箇先去腦以禾稈裹揉水內搓洗令腦盡後切入黃連膏內煮黑色取出用之　蘆甘石一兩童便一大碗炭火燒小便盡蘆甘石紅焰之令粉白爲度研細末　黃丹四兩新水淘研細末　青鹽六錢研細　蜜一斤煉去蜂沫　鵝梨十箇竹刀切去皮心生布取汁用

右將梨汁甘石膏子內熬五七沸入青鹽以楊柳枝攪至稠色傾入磁瓮冷水水浸拔去火毒臘月合爲妙正月十一月次之餘月各不可合每用銅筯蘸藥點入眼大眥內

碧霞丹治目赤腫癢澀難開

銅綠三錢　枯白礬三錢　乳香一錢

右爲末將黃連熬成膏子入藥丸如雞頭大水浸開洗之

魚腦丸大醫太史齊正臣傳大效

黃連　秦皮　當歸

右以三味淨水洗去泥土剉碎用溫水二升素盞浸藥一宿於淨室中用鐵鍋內熬到一少半藥力盡在水中新絹濾去粗換絹濾兩編再熬至膏半如稀糊狀取出銀器中炭火上熬成膏子入腦子藥葉豆粉和成劑用熊膽之旋丸豆大用淨几上搓成細條子竹刀切如米大點之

撥雲散治眼因發濕熱不退而作翳膜遮睛昏暗羞明癢澀難開

川芎　楮實　龍膽草　羌活　薄荷　石決明　蒼朮　大黃　荊芥穗　甘草　木賊　蜜蒙花　連翹　川椒　草決明　桔梗　石膏　甘菊花　白芷　地骨皮　白蒺藜

檳榔各半兩　石燕一對重半兩

右浮爲末每服三錢茶清調下食後日三服忌雜魚豬馬蕎麵辛熱之物

龍膽草　川芎　楮實　石決明　荊芥穗　甘草炙　野菊花　野麻子　白茯苓　川椒炒去目　仙靈脾　白蒺藜　木賊　茵陳蒿各半兩

右爲末每服二錢食後茶清調下日三服忌雜魚肉及蕎麵熱物

甘菊花丸治男子腎臟虛弱眼目昏暗或見黑花常服明目活血駐顏暖水藏

甘菊花二兩　枸杞子四兩　熟地黃三兩　楮實子五兩　乾山藥半兩

右爲末蜜丸桐子大每服三十丸至五十丸空心食後各一服溫水送下

五秀重明丸治翳膜遮睛瞖澀昏花常服清利頭目

甘菊開頭者五百朵　荊芥穗五百　木賊五百　楮實五百箇　川椒五百粒炒去目

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼時時嚥下嚥化亦得食後忌酒肉熱物

煮肝散治小兒疳眼翳膜羞明不見物服十日必退下大人雀目一服取效

夜明砂　青蛤粉　穀精草各兩

右爲末每服一錢五七歲以上二錢猪豬肝一匙大一片批開糝藥在內攤勻麻紮定米泔水半碗煮肝熟取出肝湯傾碗內蒸服分肝作三次嚼喫卻用肝湯下一日三服不拘時候大人雀目空心服至夜便見物如患多時不效日二服

龍腦飲子治疳眼流膿生疳翳濕熱爲病神效不治寒濕爲病者

青蛤粉　穀精草各半兩　龍膽草

羌活各三錢　麻黃二錢半　黃芩炒

升麻各二錢　蛇退皮　川芎

甘草炙各半錢

右爲末每服二錢食後茶清調下忌辛熱物

助陽活血湯治眼發之後上熱壅甚白睛紅多眵淚無疼痛而隱澀難開因服苦寒藥過多眞氣不能通九竅也故眼昏花而不明宜助陽和血補氣

黃芪二錢　甘草炙　蔓荊子各半錢

防風七分　白芷　升麻

當歸　柴胡各五分

右㕮咀作一服水一盞半煎至八分去柤熱服臨臥忌

風寒食冷物惡風處睡

灸雀目瘠服法

小兒雀目夜不見物灸手大拇指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際灸一壯炷如小麥大

小兒瘠服灸合谷二穴各一壯炷如小麥大在手大指次指兩骨間陷者中是

鼻中諸病并方

論曰膽遊熱於腦則嚏頻而鼻渊腦熱濁涕不止如涌泉不常久而不已必成衄血之疾宜以防風湯主之

防風湯

防風（去蘆一兩半）　人參　黃芩　麥門冬（去心）　甘草（炙）　川芎（各一兩）

右爲末每服二錢沸湯點服食後日三服

犀角地黃湯治傷寒及溫病應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑此方主消化瘀血兼治瘮疹出得太盛以此解之

犀角（一兩如無以升麻代之）　生地黃（半兩）　牡丹皮（去心一兩）　芍藥（七錢半）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞服有熱加黃芩二兩服大來遲腹不滿口言滿爲無熱不加黃芩也

生地黃湯治鼻衄昏迷不省以生地黃三五斤不限取汁使患衄者生嚼吸汁一二斤許又以柤塞鼻須臾血止取汁服尤佳一婦人病經血半年不通因見盞中餘柤汁以爲棄去言可惜輒飲數杯其經即通乃知地黃之治血其功如此

地黃散治衄血往來久不愈

生地黃　熟地黃　枸杞子　地骨皮（各等分）

右四味焙乾爲末每服二錢蜜湯調下日三服不拘時

三黃補血湯治六服俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃手少陰心之服也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火補氣以墜氣浮以甘溫微苦殿補其血此藥補之以防血溢止渴

生地黃（三錢）　熟地黃（二錢）　川芎（二錢）　當歸　柴胡（各錢半）　升麻　黃芪　芍藥（半兩）　牡丹皮（各一錢）

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤稍熱服食前

凡兩寸服兩頭則有中間全無曰其以血在上焦或衄血或嘔血以犀角地黃湯則愈

清肺飲子治衄血吐血久不愈服此藥以三稜鍼於氣衝穴出血立愈

五味子（十箇）　黃芪（一錢）　當歸身　麥門冬（去心）　生地黃

右爲粗末都作一服水二盞煎至一盞去柤溫服不拘時候

治鼻衄不止或素有熱而暴衄諸藥不效以白紙一張作八疊或十疊極冷水內浸濕紙覆項中以熱熨斗熨至一二重紙乾立愈

寸金散治鼻衄不止

甘草（生）　土馬騂（燒上有者是各一兩）　黃藥子（半兩）

右爲末每服二錢新汲水調下未止再服立止

麥門冬飲子治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

人參（去蘆）　麥門冬　當歸身（各五分）　五味子（五箇）　黃芪　甘草　芍藥（各一錢）　紫菀（半錢）

右㕮咀分作二服水二盞煎至一盞去柤溫服食前

茯苓澤瀉湯治鼻不聞香氣服之忌一切冷物及風寒處坐臥行立

黃芪（四錢）　芙活　獨活

防風　升麻　高根　白芷

蒼朮（各三錢）　甘草（炙三錢）　麻黃（不去節）　川椒（各一錢）

右㕮咀每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎白三寸煎至一盞去柤稍熱食遠服之

輕黃散治鼻中瘜肉

輕粉（一錢）　雄黃（半兩）　麝香（少許）　杏仁（一錢湯浸去皮尖并雙仁）

右於乳鉢內先研杏仁如泥餘藥同研細勻磁合盡定每有患者不問深淺夜臥用骨筯或竹筯點如粳米大在鼻中瘜肉上隔一日夜臥點一次半月取效

鈴紅散治風熱上攻陽明經絡面鼻紫赤刺癢瘮俗呼肺風以肺而淺在皮膚也

鮑上硇黃　白礬灰（各半兩）

右爲末入黃丹少許紫與病人面色同每上半錢津液塗之洗漱罷及臨臥再上兼服升麻湯下瀉青丸服之除其本也

耳中諸病并方

黃帝鍼經云精脫者則耳聾夫腎爲足少陰之經而藏精氣通乎耳耳者宗脈之所聚也若精氣調和則腎臟強盛耳聞五音若勞傷氣血兼受風寒損於腎脫精脫則耳聾也然五臟六腑十二經脈有絡於耳者其陰陽經氣有相併時併則厥逆名之曰厥氣搏於耳之脈故令聾其腎病精脫耳聾者其候頸顴色黑手少陽之脈動其氣厥逆而耳聾者其證耳內煇煇焞焞也手太陽厥而耳聾者其候乾而耳內氣滿也

燒腎散治耳聾

附子（炮去皮一兩）　川椒（一兩去其目）　磁石（一兩醋淬七遍研水飛）

右爲末用豬腎一枚去筋膜細切蒸薤白各一分入藥末一錢鹽花一字和令勻以十重濕紙裹於溫灰火內

燒熱空心細嚼酒解藥粥下之十日效

犀角散治風毒熱壅心胸痰滯兩耳虛聾頭重目眩神效

犀角屑　甘菊花（去莖葉）　前胡（去蘆）　枳殼（麩炒黃）　菖蒲　澤瀉　羌活　木通　生乾地黃（各半兩）　麥門冬（一兩去心或作二兩）　甘草（二錢炙）

右為末每服三錢水一盞煎至五分去柤食後溫服

茯神散治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急胸膈痞滿昏悶不利

茯神　羌活　蔓荊子　防風　菖蒲　薏苡仁　黃芪　五味子（各半兩）　麥門冬（去心一兩）　甘草（二錢炙）

右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至五分去柤食後溫服

耳卒聾諸方

夫卒耳聾者由腎氣虛為風邪所乘搏於經絡隨其血脈上入耳正氣與邪氣相搏故令耳卒聾也

蒲黃膏治卒聾也

細辛　蒲黃（各一分）　麴末（三分）　杏仁（三分湯浸去皮尖雙仁）

右為末研杏仁如膏和勻捻如棗核大綿裹塞耳中一日一易以瘥為度

龍腦膏治卒聾

龍腦（一錢二分研）　椒目（半兩）　杏仁（二錢半浸去皮尖雙仁）

右為末研杏仁膏和如棗核大綿裹塞耳中日二易之

聤耳諸方

夫耳者宗脈之所聚腎氣之所通足少陰之經也若勞傷氣血熱氣乘虛入於其經邪隨血氣至耳熱氣聚則生膿汁謂之聤耳也

禹餘糧丸治聤耳有膿水塞耳

禹餘糧（燒醋淬七遍）　烏魚骨　鯊魚齒　伏龍肝（各二錢半）　附子（一箇去皮臍）

右為末以綿裹如皁角子大安耳內日再易之如不瘥者內有蟲也

松花散治聤耳膿水不絕

白礬（半兩枯）　麻勃　木香　松脂　花蕊（各二錢半）

右為末先用綿淨拭膿盡後以藥滿耳填取效

白連散治聤耳出膿汁

白礬（枯）　烏賊魚骨　黃連　龍骨（各一兩）

右為末以綿裹棗核大塞耳中月三易之

粗綿散治聤耳出膿以白礬枯成白灰每用二錢入胭脂二字研勻用綿杖子拭去耳中膿及黃水盡即用別綿杖引藥入耳中令到底糝之即乾如壯盛之人積熱上攻耳中出膿水不瘥用局方無憂散雄黃丸為三五瘥耳中生瘡諸方

夫耳內生瘡者為足少陰腎之經其氣通於耳其經虛則風熱乘之隨脈入於耳與氣血相搏故令耳內生瘡也

曾青散治耳內有惡瘡

雄黃（七錢半）　曾青（五錢）　黃芩（二錢半）

右為末每用少許綿杖子拭乾用之

黃連散

黃連（半兩）　白礬（七錢半）

右為末每用少許綿裹內耳中

黃芪丸治腎虛耳鳴夜間睡者如打鐘鼓覺耳內風吹四肢抽掣疼痛

黃芪（去蘆一兩）　白蒺藜（炒）　羌活（各半兩）

黑附子（一箇大者）　羯羊腎（一對炙乾用）

右為末酒麵糊丸如桐子大每服三四十丸空心食前煨葱鹽湯下

菖蒲挺子治耳中痛

菖蒲（一兩）　附子（半兩炮去皮臍）

右為末每用少許油調滴耳中立效

又方耳痛倉鹽不以多少炒熱用棗麵蒸物青花布包定枕之其效如神

通耳丹治耳聾

安息香　桑白皮　阿魏（各一兩半）

硃砂丸

右用巴豆七箇蓖麻仁七箇大蒜七箇研爛入藥末和勻棗核大每用一丸綿裹內耳中如覺微痛即出之

治蚰蜒入耳方濕生蟲研如泥攤在紙上撚成紙撚安耳中即出

又方蝸牛蟲去殼研爛滴水五七點再研勻灌耳內無活者乾者研亦可

治蜈蚣入耳炙豬肉掩兩耳即出

又方用生薑汁灌耳中即出

治飛蛾入耳醬汁灌入耳即出

又方擊銅器耳邊即出

治蟻入耳以大蒜擣取汁滴耳中

又方綾鱉甲燒灰水調澄清者滴耳中即出

又方豬脂一指大炙冷香安耳孔邊即出

一切蟲物入耳用口氣盡力吸出最妙

元羅天益廣甫著　三原李錫齡孟熙校刊

咽喉口齒門

龍腦聚聖丹治心脾客熱毒氣攻衝咽喉赤腫疼痛或成喉痺或結硬不消愈而復發經久不瘥或舌本腫脹滿口生瘡飲食難嚥並皆服之

南硼砂研　川芎各一兩　生地黃　犀角屑　羚羊角　南琥珀研　桔梗　南玄參　升麻　鉛白霜研　連翹各五錢　馬牙硝　赤茯苓去皮　人參　腦子研各三錢　珠砂飛　牛黃研各二錢　麝香三錢研

右十八味爲末煉蜜丸每兩作十丸金箔五十片爲衣每服一丸用薄荷湯或新汲水化下若細嚼幷嚥化津液嚥下皆可食後臨臥服

祛毒牛黃丸治大人小兒喉嚨痛舌本強硬口內生瘡涎潮喘急胸膈不利不欲飲食

人參　犀角取末　南琥珀研　桔梗　生地黃洗水煮焙　南硼砂各半兩　牛黃研三錢半　雄黃一兩飛　南玄參

升麻各三錢　蛤粉四兩水飛　珠砂研七錢　腦子　鉛白霜各一錢　寒水石燒去火毒二兩

右爲細末研勻煉蜜丸如小彈子大金箔爲衣磁器內收每服一丸溶煎薄荷湯化下或新汲水化服亦得食後日進三服嚥化亦得

珠砂膏治鎮心安神解熱又虛損嗽血等疾

金箔二錢半　珠砂研　真珠末　生犀　人參　甘草炙　玳瑁各一兩　牛黃　麝香　龍腦　南硼砂　羚羊角

遠志　西琥珀　安息香酒煮研　赤茯苓去皮各半兩　蘇合油和藥亦得　鐵粉各一分

右爲末煉蜜破蘇合油和劑爲小錠子更以金箔爲衣磁合內密封每服一皁角子大食後嚥化衛尉葉承得效幷阿膠丸相雜服此藥活血安神更勝如至寶丹每兩作五錠子

碧玉散治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或喉痺重舌木舌腫脹可服

青黛　盆硝　蕭黃　甘草各等分

右爲末和勻每用少許乾糝於咽喉內細細嚥津漸漸嚥化亦得若作丸用砂糖和丸每兩作五十丸每服一丸嚥化嚥津亦得

鬚髮散治咽痛不妨嚥物嚥物則微痛不宜用寒涼藥過泄之此妨悶明熱也

括蔞一箇　白殭蠶半兩炒　甘草二錢炒　桔梗新白者七錢半炒

右爲末每用少許乾糝咽喉中若大腫痛左右有紅或只一壁紅紫長大而水米不下用此藥一錢朴硝一錢七和勻乾糝喉中嚥津如喉中生赤腫或有小白頭瘡用此藥一錢匕白礬半錢細研如粉和勻乾糝之

玄參散治懸癰腫痛不可食

玄參一兩　升麻　射干　大黃各半兩　甘草二錢半

右爲末每服三錢水一盞半煎至八分放溫時時含嚥良驗

增損如聖湯治風熱上攻衝會厭語聲不出咽喉妨悶腫痛並皆治之

桔梗二兩　甘草炙一兩半　防風半兩　枳殼麩炒去穰二錢半

右爲末每服三錢水一大盞煎至七分去柤入酥如棗許攪勻溫服食後

二奇湯治感寒語聲不出

桔梗三兩炒　甘草二兩半生半炒　訶子大者四箇去核兩箇炮兩箇生

右爲末每服十錢匕入砂糖一小塊水五盞煎至三盞時時細呷一日服盡其聲速出

玉粉丸治冬月寒痰結咽喉不利語音不出鍼經云寒氣客於會厭卒然如痤宜服玉粉丸

桂一字　草烏一字炒　半夏洗五錢

右爲末生薑自然汁浸蒸餅爲丸雞頭大每服一丸至夜含化多年不愈者亦效

開關散治纏喉風氣急不通

白殭蠶直者炒去絲嘴　桔白礬各等分

右二味爲末每服三錢生薑蜜水一盞調下細細服之不拘時候

備急如聖散治時氣纏喉風漸入咽喉閉塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃研用　白礬飛　藜蘆厚者去皮用七生用　豬牙皁角去皮弦各等分

右四味爲末每用一豆大鼻內嗅之立見效

解毒雄黃丸治纏喉風及急喉痺

鬱金　雄黃各一兩　巴豆去皮膜研出油十四枚

右爲末醋糊爲丸綠豆大用熱茶清下七丸吐出頑涎立便蘇省未吐再服

肺熱喉腥治驗

梁濟民因膏粱而飲因勞心過度肺氣有傷以致氣出腥臭唾沫稠粘口舌乾燥以加減瀉白散主之難經云心主五臭入肺爲腥臭此其一也

加減瀉白散

桑白皮三錢　桔梗二錢　地骨皮

甘草炙各一錢半　知母七分　麥門冬
黃芩各五分　五味子二十箇

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去柤溫服食後忌酒麵辛熱之物日進二服

論曰梁氏膏粱之子因洪飲大熱之氣所傷滋益心火形於肺金故以桑白皮地骨皮苦微寒降肺中伏火而補氣用以爲君黃芩知母苦寒治氣息腥臭清利肺氣用以爲臣肺欲收急食酸以收之五味子之酸溫以收肺氣麥門冬甘苦寒治涕唾稠粘口舌乾燥用以爲佐桔梗體輕辛溫治痰逆利咽膈爲使也

口糜論并治法方

逆調論云膀胱移熱於小腸膈腸不便一爲口糜心胃壅熱水穀不轉下傳小腸以導赤散去小腸熱五苓散瀉膀胱熱故以導赤散調五苓散主之

胡黃連散治口糜麻孝卿傳

胡黃連五分　細辛　宣黃連各三錢
藿香一錢

右四味爲末每用半錢乾摻口內漱千歇吐之

綠袍散治老幼口瘡多時不效者

黃柴四兩　甘草炙二兩　青黛一兩

右先杵二味爲末入青黛同研勻每用半錢乾摻口內忌酸醬鹽一二日

黃連升麻散治口舌生瘡

升麻一兩半　黃連七錢半

右爲末綿裹含嚥汁

多效散治骨緊疼及瘡

訶子肉　五倍子各等分

右爲末用少許乾粘骨上立效

紅芍藥散歌

心病口瘡　紫梔紅著　三錢四兩　五服安康

右用紫菀梔梗紅芍藥著皮等分爲末羊肝四兩批開摻藥三錢麻扎定火內燒令香熟空心食之大效後用白湯下

遵山牢牙散王漢卿所傳方云折太守得之於奔飾使折得之方九十餘歲牙齒都不會疏豁及無疼痛漢卿今入十九歲食肉能齒決之知此方如神也

茯苓　石膏
寒水石　白芷各半兩　龍骨各一兩
石燕子大者一枚小者用一對　細辛三錢
石七味爲末早晨用藥制牙晚亦如之

玉池散治風蛀牙疼腫痛

當歸　藁本　地骨皮
防風　白芷　槐花
川芎　甘草　升麻
細辛各等分

右爲末每用少許揩牙痛甚卽取二錢水一盞半黑豆半合生薑三片煎至一盞稍溫漱口候冷吐之

救苦散治一切牙疼及塞風蛀牙疼

川烏　草烏　桂花
良薑　紅豆　荜茇
華撥　細辛各半錢

官桂各三錢

右爲末先漱淨裹外乾摻之出涎立愈

華撥散治風蛀牙疼兼治偏正頭疼

華撥二錢　良薑各一錢
草烏去皮尖五分

右爲末每用半字先含水一口塗痛處鼻內嚏上吐了水用指粘藥擦牙疼處立定

麝香散治牙疼麻孝卿傳

銅綠五錢　白芨二錢半
白蘞三錢半

白礬二錢半　麝香一錢
右爲末用麝香研細入藥和勻每用少許貼於牙患處

乳香丸治走馬牙疳如神

明乳香　輕粉各半錢　硇砂半分研
麝香少許

右先將乳香在鉢內令一人執鉢水盆內浸鉢底一人研乳香如粉細取出入輕粉麝香硇砂研細和勻每用以薄紙一韭葉闊去藥內按過持紙少許丸如黃豆大夜臥先漱口齒淨後以細杖子粘藥丸劄牙疳處至明便效忌醬醋鹽

衛生寶鑑卷十一終

元羅天益謙甫著　三原李修齋孟熙校刊

咳嗽門

咳嗽論（此論出潔古家珍）

論曰咳謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而爲痰也若咳嗽有聲而有痰者因傷肺氣動於脾濕也故咳而兼嗽者也脾濕者秋傷於濕積於脾也故經云秋傷於濕冬生咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅若反動之則氣必上衝而爲咳嗽甚則動脾濕而爲痰也是知脾無留濕雖傷肺氣而不爲痰也若有痰而寒少熱多各隨五藏證而治之假令濕在肝經謂之風痰濕在心經謂之熱痰濕在脾經謂之濕痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰各宜隨證而治之咳而無嗽者以辛甘潤其肺咳而嗽者治痰爲先故從南星半夏勝其痰而咳嗽自愈

人參款花散治喘嗽久不已者予從真過鄧州衛醫高仲寬傳此并紫參散甚效

人參　款冬花各五錢　知母
貝母　半夏各三錢　御米殼去頂筋二兩
右爲粗末每服五六錢水一盞半烏梅一箇煎至一盞去相溫服臨臥忌多言語

紫參散治形寒飲冷傷肺喘促痰涎胸膈不利不得安臥

五味子　紫參　甘草炙
麻黃去節　桔梗各五錢　御米殼去頂筋黃色二兩
右六味爲末每服四錢七八白湯點服嗽住止後服

九仙散治一切咳嗽太醫王子昭傳甚效此方得之於河中府姜管勾

人參　款冬花　桑白皮
桔梗　五味子　阿膠
烏梅各一兩　貝母半兩　御米殼入酒去頂筋蜜炒黃色

右爲末每服三錢白湯點服嗽住止後服

人參蛤蚧散治三二年間肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生瘡徧身黃腫

蛤蚧一對全者河水浸五宿逐日換水洗去腥涎炙黃色　杏仁去皮尖炒　桑白皮
甘草炙令五兩　知母

人參　茯苓去皮　貝母各二兩
右八味爲末淨磁合子內盛每日用如茶點服永除神效

人參清肺湯治肺臟不清欬嗽喘急及治肺痿勞嗽

人參　阿膠　地骨皮
杏仁　知母　桑白皮
烏梅　甘草　罌粟殼
右等分㕮咀每服三錢水一盞半烏梅罌子各一箇同煎至一盞去柤食後臨臥服

人參款花膏治久新一切咳嗽

人參　款冬花　五味子
紫菀　桑白皮各一兩
右五味爲末蜜丸如雞頭大每服一丸食後細嚼淡薑湯下或含化亦得

紫蘇半夏湯治喘嗽痰涎不利寒熱往來

紫菀苗　紫蘇　半夏泡各五錢
杏仁一兩炒黃色去皮尖陳皮　五味子各五錢
桑白皮二兩半一方或用一兩半
右爲粗末入杏仁一兩去皮尖麩炒勻每服三錢水一盞半薑三片煎至一盞去柤溫服日三

款花清肺散治咳嗽喘促胸脇不利不得安臥

人參　甘草炙　甜葶藶生
白礬枯　款冬花各一兩　御米殼四兩臨炒
右爲末每服二錢溫米飲調下食後忌油膩物及多言語損氣一方加烏梅一兩去核

人參理肺散治喘嗽不止

麻黃去節炒黃　木香　當歸各一兩
人參去蘆二兩　杏仁二兩麩炒　御米殼去頂炒三兩
右六味爲末每服四錢水一盞半煎至一盞去柤溫服食後

紫團參丸治肺氣虛咳嗽喘急胸膈痞痛短氣喘悶下焦不利腳膝微腫

蛤蚧一對麻炙　人參二錢半　白牽牛炒
木香　甜葶藶炒　苦葶藶各半兩
檳榔一錢
右爲末用棗肉爲丸如桐子大每服四十丸煎人參湯送下食後

團參散治肺氣咳嗽上喘不利

紫團參　款冬花　紫菀茸各等分
右爲末每服二錢水一盞烏梅一箇煎至七分去柤溫服食後

安肺散治咳嗽無問新久

麻黃不去節二兩　甘草炙一兩　御米殼四兩去頂炒黃
右爲末每服三錢水一盞烏梅一箇煎至七分去柤溫服臨臥

馬兜鈴丸治多年喘嗽不止大有神效

半夏湯泡七次焙　馬兜鈴去土　杏仁各一兩去皮尖麩炒
巴豆二十粒研去皮油
右除巴豆杏仁另研外餘爲細末用皂角熬膏子爲丸如梧子大雄黃爲衣每服七丸臨臥煎烏梅湯送下以利爲度

人參半夏丸化痰鹽涎止嗽定喘療風痰食痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛或風氣偏正頭痛或風壅頭目昏或耳鳴鼻塞咽乾胸膈不利

人參　茯苓去皮　南星

薄荷各半兩　寒水石　白礬生
半夏　薑屑各一兩　蛤粉二兩
藿香二錢半
右爲末水麵糊爲丸桐子大每服三十丸薑湯送下食後
後日三服溫水送亦得

人參清鎮丸治熱止嗽消痰定喘
人參　柴胡各一兩　黃芩
半夏　甘草炙各七錢　麥門冬
青黛各三錢　陳皮二錢　五味子十三箇
右爲末麵糊丸桐子大每服三十丸溫白湯送下食後

金珠化痰丸治痰熱咳嗽
皁莢仁炒黃　天竺黃　白礬枯過各一兩
半夏四兩湯洗七次用生薑二兩洗刮去皮同半夏擣碎作餅子炙微黃
生龍腦半錢　辰砂二兩　金箔二十片爲衣
右爲末薑汁糊爲丸梧子大每服十丸至二十丸薑湯下食後臨臥服

化痰玉壺丸治風痰吐逆咳嗽
生南星　生半夏各一兩　天麻半兩
頭白麵三兩
右爲細末滴水爲丸梧子大每服三十丸用水一大碗先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即漉出放溫別用薑湯下不拘時

皁角化痰丸治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉中不利滯塞
糊粘塞吐逆不思飲食或時昏憒
人參去蘆　赤茯苓去皮　白礬枯
半夏炮七次　白附子炮　南星炮各一兩
枳殼炒二兩　皁角水白皮酥炙一兩
右爲末生薑自然汁打糊爲丸如桐子大每服二十丸薑湯送下不拘時候

延壽丹
天麻半兩　白礬一兩半生半枯　枸杞子
半夏炮七次　甘草各一兩半　人參一兩
右爲末水酒和成劑再用蒸餅裹定於籠內蒸熟去蒸餅搗藥爲丸如桐子大每服三十丸溫水送下食後臨臥服

大阿膠丸治咳嗽并嗽血唾血經效
阿膠蛤粉炒　卷柏去土　生地黃
大薊獨根者日乾　乾山藥　五味子
薄荷各一兩　柏子仁　人參
遠志　百部　麥門冬
茯苓去皮　防風各半兩　熟地黃一兩
右十五味爲末煉蜜爲丸如彈子大不拘時候濃煎小麥并麥門冬湯嚼下半丸加至一丸若覺氣虛空心不可服此

愿袍散治咯血吐血唾血及治煩躁
生蒲黃　乾荷葉等分
右爲末每服三錢濃煎桑白皮湯放溫調下食後
地血散治一切吐血唾血能解一切毒及諸熱煩躁
茜根四兩　大豆　黃藥子
甘草各二兩
右爲末每服二錢新汲水調下加人參二兩治痰疾嗽有血

五味黃芪散治因嗽咯血成勞眼睛疼四肢困倦脚膝無力
黃芪　麥門冬　熟地黃
桔梗各五錢　甘草二錢半　白芍藥
五味子各二錢　人參三錢
右爲粗末每服四錢水一盞半煎七分去柤溫服日三服

透羅丹治痰實咳嗽胸肺不利太醫王子直傳此方得之
天麻半兩　白礬一兩半生半枯　枸杞子
半夏炮七次　甘草各一兩半　人參一兩
右爲末水酒和成劑再用蒸餅裹定於籠內蒸熟去蒸餅搗藥爲丸如桐子大每服三十丸溫水送下食後臨臥服

於西夏下痰甚快以透羅名者謂脫羅網之患也
皁角酥炙去皮弦　黑牽牛炒　牛夏
大黃煨紙包煨熟　杏仁去皮尖麸炒各一兩　巴豆一錢去油別研
右六味爲末生薑自然汁丸桐子大薑湯送下三十丸咳嗽甚者三四服必效

大利腸丸治風熱痰實咳嗽喘滿風氣上攻
牽牛四兩生用半　半夏　皁角酥炙
青皮各二兩　槐角一兩炒　木香半兩
右六味爲末生薑打糊和丸桐子大每服五十丸食後生薑湯送下

全真丸金朝興定年間宣宗賜名保安丸治五臟積熱洗滌腸垢潤燥利溫風毒攻疰手足浮腫或頑痺不仁痰涎不利涕唾稠粘胸膈痞悶腹脇脹滿減食嗜臥困倦無力凡所內傷並宜服之
大黃三兩未甜浸三日逢日換水焙乾爲末一法以酒浸浸透切片焙乾爲末　黑牽牛八兩淨輕炒四兩生用四兩同取頭末四兩
右以皁角二兩輕炒去皮子水一大碗浸一宿入蘿蔔一兩切片同皁角一處煮至半碗去柤再熬至二碗投藥末丸桐子大每服二三十丸至五十丸諸穀飲下無時

槐角利膈丸治風勝痰實胸膈痞滿及喘滿咳嗽
牽牛一兩半　皁角一兩酥炙　槐角炒
半夏各五錢
右爲末生薑汁打糊丸桐子大每服三五十丸食後生薑湯送下

滌痰丸治三焦氣溫下痰飲消食利胸膈滿咳唾稠粘面赤體倦常服化痰寬膈
木香二錢　槟榔　京三稜各半兩
陳皮　青皮　枳殼各三錢
半夏製半兩　大黃各一兩　黑牽牛二兩炒

右爲細末麵糊丸桐子大每服三十丸食遠薑湯下

木香半夏丸治痰涎上壅心胸不利常服消痰飲寬胸膈

木香半 七錢 人參 白附子 薑屑 陳皮 草豆蔻

右爲細末糊丸桐子大每服三五十丸薑湯下

白茯苓各五錢 半夏一兩

太白丹治三焦氣澀破飲除痰止嗽開胃此方并木香半夏丸得之於張文叔

半夏 南星炮 寒水石煅 乾薑 白附子炮 白礬枯各等分

右爲末糊丸如桐子大每服三十丸溫薑湯下

桔梗湯除痰下氣

桔梗微炒 半夏薑製 陳皮去白各十兩 枳實炒黃五兩

右㕮每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去柤溫服不拘時

定喘餅子累經神驗孕婦不可服

苧花酥浸一宿炒 桑白皮 吳茱萸炒 陳皮去白各一兩 寒食麵三兩 馬兜鈴一兩 白牽牛三兩半生半炒取淨末二兩

右爲末入牽牛末和勻滴水和如櫻桃大捏作餅子取熱灰半碗於鐺內同炒餅子熱每服一餅爛嚼臨臥煎兜鈴湯送下如心頭不快加一餅或二餅至明微利下神效

盛則爲喘治驗

己未歲初秋越三日奉召至六盤山至八月中霖雨不止時承上命治石鄰吉歹元帥夫人年踰五旬身體肥盛因飲酒吃酒乳過度遂病腹脹喘滿聲聞舍外不得安臥大小便澀滯氣口脈大兩倍於人迎關脈洪緩而有力予思霖雨之濕飲食之熱濕熱大盛上攻於肺神氣躁亂故爲

喘滿邪氣盛則實實者宜下之故制平胃散以下之

平氣散

青皮去白 雞心檳榔各三錢 大黃七錢 陳皮去白五錢 白牽牛二兩半生半炒取頭末一半

右爲末每服三錢煎生薑湯一盞調下無時一服減半再服喘愈止有胸膈不利煩熱口乾時時咳嗽以加減瀉白散治之

內經曰肺苦氣上逆急食苦以瀉之故白牽牛苦寒瀉氣分濕熱上攻喘滿故以爲君陳皮苦溫體輕浮理肺氣青皮苦辛平散肺中滯氣故以爲臣檳榔辛溫性沈重下痰降氣大黃苦寒蕩滌滿實故以爲使也

加減瀉白散

知母 陳皮去白各五錢 桑白皮一兩 桔梗 地骨皮各五錢 青皮去白 甘草 黃芩各三錢

右㕮每服五錢水二盞煎至一盞去柤溫服食後數服良愈

華陀云盛則爲喘減則爲枯活人書云發喘者氣有餘也凡看文字須要曉會得本意且盛而爲喘者非肺氣盛也喘爲氣有餘者亦非肺氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣果盛又爲有餘當清肅下行而不喘以火入于肺衰與不足而爲喘焉故言盛者非言肺氣盛也言肺中之火盛言有餘者非言肺氣有餘也言肺中之火有餘也故瀉肺用苦寒之劑者非瀉肺也瀉肺中之火實補肺氣也用者不可不知

嘔吐呃逆

宿香安胃散治脾胃虛弱不進飲食嘔吐不待腐熟

人參 丁香各一錢 藿香七分半 陳皮二錢半

右爲末每服二錢水二盞生薑三片煎至一盞去柤溫

服

二陳湯治痰飲爲患

半夏 橘紅各五兩 茯苓三兩 甘草炙一兩半

右㕮咀每服五錢水一盞半薑五片烏梅半箇同煎至八分去柤熱服不以時嘔吐甚者加丁香一兩

丁香柿蒂散治諸種呃噫嘔吐痰涎

丁香 柿蒂 青皮 陳皮各等分

右爲粗末每服三錢水一盞半煎至七分去柤溫服無時

羌活附子湯治呃逆

木香 附子炮 茴香各半兩炒 乾薑一兩 羌活

右五味爲細末每服二錢水一盞半鹽一捻煎二十沸和柤熱服一服止

治一切呃逆不止男左女右乳下黑盡處一韭葉許灸三壯病甚者灸二七壯

消渴治法并方

生津甘露飲子治膈消大渴飲水無度舌上赤澁上下齒皆麻舌根強硬腰痛食不下腹時脹滿疼痛渾身色黃目白睛黃甚則四肢瘦弱無力面塵脫色脚下急痛善嚏善怒健忘醫肉膜背疼寒兩足冷甚順德安撫張耘夫年四十五歲病消渴舌上赤裂飲水無度小便數多先師以此藥治之旬日良愈古人云消渴多傳瘡瘍以成不救之疾撫效亦不傳瘡瘍享年七十五歲終名之曰生津甘露飲

人參 山梔子 甘草炙 知母酒洗 藿黃 升麻各二錢 白芷 白豆蔻 瞿麥 澤瀉

甘草各一錢　白蒺藜　蘭香

當歸　麥門冬各半錢　黃蘗酒拌

石膏各二錢半一方石膏用一兩一錢　連翹一錢

杏仁半錢　木香　黃連

柴胡各三分　桔梗三錢　全蝎一箇

藿香二分

右爲末湯浸蒸餅和成劑捻作餅子晒半乾杵篩如米大食後每服二錢抄在掌內以舌舐之隨津嚥下或白湯少許送亦可此治制之緩也不惟不成中滿亦不傳瘡瘍下消矣

論曰消之爲病燥熱之氣盛也內經云熱淫所勝佐以甘苦以甘瀉之熱則傷氣氣傷則無腎折熱補氣非甘寒之劑不能故以石膏甘草之甘寒爲君啓玄子云滋水之源以鎮陽光故以黃連黃蘗梔子知母之苦寒瀉熱補水爲臣以當歸麥門冬杏仁全蝎連翹白芷白蒺藜甘辛寒和血燥潤爲佐以升麻柴胡苦平行陽明少陽二經白豆蔻木香藿香蓽澄茄反佐以取之固用桔梗爲舟楫使浮而不下也東垣先生嘗謂予曰絜古老人有云能食而渴者白虎倍加人參大作湯劑多服之不能食而渴者錢氏白朮散倍加葛根大作湯劑廣服之

酒蒸黃連丸治消渴

用黃連半斤酒一升湯內重蒸伏時取出晒乾爲米滴水爲丸如梧子大每服五十丸溫水下

參苓飲子治口乾燥生津液思飲食

麥門冬　五味子　白芍藥

熟地黃　黃芪各三兩　白茯苓二錢半

天門冬　人參　甘草各五錢

右爲粗末每服三錢水一盞半生薑三片棗子二箇烏梅一箇煎至一盞去粗溫服食後

麥門冬飲子治膈消胸滿煩心津液燥少短氣多爲消渴

人參　茯神　麥門冬

知母　生地黃　五味子

甘草炙　葛根各等分　括蔞根

右㕮咀每服五錢水二盞竹葉十四片煎至七分去粗溫服無時

麥門冬湯治消渴日夜飲水不止飲下小便即利此方并冬瓜飲子得之張文叔

麥門冬　黃連　冬瓜乾各二兩

右爲粗末每服五錢水一盞煎至七分去粗溫服如無乾者用新冬瓜一枚重三斤去皮穰子分作十二片爲十二服又方冬瓜一片擘破水三盞煎七分去粗溫服日三

冬瓜飲子治消渴能食而飲水多小便如脂麩片日夜無度

冬瓜一箇　黃連十兩爲末

右先取冬瓜割開去穰淨糝黃連在冬瓜內再將頂蓋熱灰火中煨熟去皮細切爛研用布取汁每服一盞至二盞食前日三服夜二服

辨六經渴并治法

太陽渴脈浮無汗者五苓滑石之類

陽明渴脈長有汗者白虎涼膈之類

少陽渴脈弦而喘者小柴胡加瓜蔞根也

太陰渴脈細不欲飲水縱飲唯思湯不思水四君子理中湯之類

少陰渴脈沈自利者豬苓湯三黃湯之類

厥陰渴脈微引飲者當少少與之滑石

滑石治渴本爲竅不利而用之以其燥而能亡津液也天令燥氣太過當用之若無濕而用之是爲犯禁假令小便不利或渴或不渴知內有濕熱也小便自利而渴知內有燥也濕也宜滲泄之燥宜潤之則可矣

雜證有汗而渴者以辛潤之無汗而渴者以苦堅之

傷寒食少而渴者當以和胃藥止之不可用涼藥恐損胃氣愈不能食白朮茯苓是也

太陽無汗而渴者不宜白虎汗後脈洪大而渴者方可與之矣

陽明有汗而渴者不宜五苓若小便不利汗少脈浮而渴者宜與之

若人病心肺熱而不渴者知不在太陰少陰之本只在標也在標則不渴矣若渴者是在本也

膽癉治驗內經云有病口苦名曰膽癉乃肝主謀慮膽主決斷盛汁三合爲清靜之府肝取決於膽或不決爲之患躁煩則氣逆膽汁上溢故口苦或熱盛使然也主之以龍膽瀉肝湯

龍膽瀉肝湯

黃芩七分　柴胡一錢　甘草生

人參　天門冬　黃連

知母　龍膽草　山梔子

麥門冬各五分　五味子十箇

右十一味㕮咀作一服水二盞煎至一盞去粗溫服食遠忌辛熱物此方因焦秀才病口苦予制此方用之得效

元羅天益謙甫著　三原李錫齡孟熙校刊

瘡腫門

丙午歲予居藁城人多患疔瘡縣尹董公謂予曰今歲患疔瘡者極多貧民無力醫治近於史侯處得數方用之無不效官給藥錢若當捨手醫之遂諾其請董公榜示通衢有患疔瘡者來城中羅謙甫處取藥如此一年餘全活者甚衆保生鋌子千金托裏散神聖膏藥破棺丹凡四方至元戊寅歲董公拜中書左丞兼樞密院事保生鋌子治疔瘡背疽藥療一切惡瘡

金銀信　雄黃　硇砂各二錢　麝香一錢　輕粉半大匙重二錢　巴豆四十九粒去皮炒研

右爲極細末用黃蠟五錢溶開將藥和成鋌子冷水浸少時取出旋丸捏作餅子如錢服大將瘡頭撥開安一餅子次用神聖膏貼後服托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹

神聖膏藥治一切惡瘡

當歸　藁本各半兩　淫羊藿二錢　黃丹　黃蠟各二兩　乳香二錢　琥珀二錢半　白芨二錢半　膽礬　粉霜各一錢　白膠香三兩　清油一斤　木鼈子五十箇去皮　巴豆十五箇去皮　槐枝　柳枝各一百二十條

右件一處先將槐柳枝下油內熬焦取出不用後下餘藥熬至焦黑藥出不用將油瀝清下黃丹再熬成膏用絹帛攤之立有神效

千金托裏散治疔瘡發背一切惡腫

官桂　人參　甘草　川芎　香白芷　芍藥各一兩　木香　沒藥各三錢　乳香二錢

當歸半兩　連翹一兩二錢　防風　桔梗　黃芪半兩　厚朴各二兩

右十五味爲細末每服三錢酒一大盞煎三二沸和粗温服無時

破棺丹治瘡腫一切風熱

大黃二兩半生半熟　芒硝　甘草各一兩

右爲末煉蜜丸如彈子大每服半丸食後茶清温酒任化下童便半盞研化服亦得忌冷水

二仙散治疔腫惡瘡太醫院李曾勾傳

白蘞生用　黃丹各等分一方加雄黃少許更捷

右各另研臨用時各抄少許和勻三稜鍼刺瘡見血待血盡上藥膏藥蓋之不過三易決愈

曲陽縣慈順里劉禪師善治瘡瘍疾效更捷壬子歲孟春詔到六盤山迴瓜忽都地而住冬朝各相從傳得四方太乙膏玉燭散剋效散翠玉膏用之每有神效甲寅歲仲秋王師還遣使送禪師迴鄉里賜院門額曰慈濟禪院太乙膏治癰子瘡神效

腦子一錢研　輕粉　乳香各二錢研　麝香三錢研　沒藥四錢研　黃丹五兩

右用清油一斤先下黃丹熬用柳枝攪又用慈鬼葱七枝先下一枝熬焦再下一枝葱盡爲度下火不住手攪膏冷熱得所入腦子等藥攪勻磁器盛之用時旋攤剋效散治癰子瘡

官桂　硇砂各半錢　赤小豆四十九粒　梗米四十九粒　斑猫四十九箇不去翅足

右五味研爲末初服一字次服二字次服三字次服四字煎樟柳根湯送下空心服小便淋瀝爲效如惡心嘔吐黃水無妨瘡癒日日自消矣

玉燭散治瘰癧和血通經服之自消日進一服七八日取效

當歸　芍藥　川芎　甘草　芒硝　熟地黃　大黃　黃芩各等分

右爲粗末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去粗滓玉脊治腰瘡

瀝青一兩　黃蠟　沒藥　乳香各一錢　銅綠各二錢

右先研銅綠爲末入油調勻又將黃蠟瀝青火上銷開次下油調銅綠攪勻將沒藥旋入攪勻用河水一碗將藥傾在內用手捉拔勻油紙裹覆瘡大小分大小塊口噙捻成餅子貼於瘡上紙封三日一易之

黃連消毒湯治膏粱之變發背腫痛始覺者能消之此方元遵尤生服之大效

黃連　黃芩各一錢　黃蘗　當歸　藁本　桔梗各五分　生地黃　知母各四分　防己五分　羌活　獨活　防風　連翹各四分　黃芪　澤瀉　人參　蘇木各三分　甘草

陳皮二分

右㕮咀都作一服用水三盞煎至一盞半去相溫服食後

五利大黃湯治人年四十已前血氣壯實多苦患癰疽大小便不通出外書

大黃煨三兩　升麻二兩　黃芩三兩　芒硝　梔子仁各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服食前內消升麻湯治證同前

大黃　升麻各二兩　黃芩去黑心

枳實麩炒去穰一兩　當歸各一兩半　甘草炙一兩

芍藥半

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分去柤溫服食前

復元通氣散治諸氣壅閉耳聾耳痛腹鄉便癰瘡痏無頭

通一切氣

青皮　陳皮各四兩　甘草三兩半生半熟

穿山甲炮　括蔞根各二兩　金銀花一兩

右爲末每服二錢熱酒調下如瘡無頭津液調塗此方

活血止痛內消瘡腫

乳香消毒散專治惡瘡

錦紋大黃煨　黃芪擣箭者　牛旁子炒

蛀蟲盞死裹燒　金銀花各五兩　甘草三兩炙

沒藥　乳香　懸蔞各半兩

右九味爲粗末每服五錢水一盞半煎至七分去柤溫

服瘡在上食後在下食前

內消丸治瘡腫初生及瘰癧結核熱毒鬱滯服之內消

廣茂炮　三稜炮各三錢　青皮去白

陳皮各一兩去白　牽牛半斤取頭末　薄荷葉

皁角不蛀者水煮軟挑取肉去柤熬成膏各半兩　沈香半兩

右爲末入牽牛頭末和勻用膏和丸如綠豆大每服三

十丸煎連翹湯送下食後

竹葉黃芪湯治發背發渴遍治諸瘡大濁

淡竹葉二兩　生地黃八兩　黃芪

麥門冬去心　當歸　川芎

人參　甘草　黃芩

芍藥　石膏各三兩

右十一味爲粗末每服五錢水一盞半竹葉五七片煎

至一盞去柤溫服不拘時候

五香連翹湯治瘰癧癰疽惡腫

沈香　乳香　生甘草

木香各一錢　連翹　射干

升麻　獨活　桑寄生

木通各三錢　丁香半兩　大黃一兩

麝香半錢

右㕮咀每服四錢水二盞煎至一盞去柤空心熱服

五香湯治毒氣入腹托裏

丁香　木香　沈香

乳香各一兩　麝香三錢

右爲粗末每服三錢水一盞半煎至八分去柤空心稍

熱服○喉者去麝加薰香一兩渴者加人參一兩○總

錄聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載與此方大同小

異大抵此藥治毒氣入腹煩悶氣不通者其餘熱渴昏

冒口燥咽乾大便硬小便澀者皆莫與服之

赤芍藥散治一切惡疔瘡癰疽腫初覺不消增寒疼痛

金銀花半兩　大黃七錢半　赤芍藥半兩

當歸　甘草各三錢

枳實

右件入括蔞大者一箇同爲粗末作四服每服水酒各

一盞煎至一盞去柤溫服不拘時

金銀花散治發背惡瘡托裏止痛排膿

金銀花四兩　甘草一兩炒

右爲粗末每服四錢水酒各一盞煎至一盞去柤稍熱

服之者中顆卿傳

乳香丸治諸般惡瘡癰

乳香另研　穿山甲

豬牙皁角　木鼈子各七錢　當歸各五錢

右用松枝火燒存性爲細末入乳香研勻煉蜜丸如彈

子大每服一丸溫酒化下食前

水澄膏治熱毒腫痛大效

大黃　黃檗　鬱金

白及　大南星　朴硝各一兩

右入黃蜀葵花乾者一兩共前藥爲細末每藥末二錢

以新水一盞半攪勻澄沈底者去浮水以紙花子攤於

腫上貼之如覺燥津唾潤之如皮膚白色者勿用

拔毒散治熱毒丹腫遊走不定

寒水石生用　石膏生用各四兩　黃檗

甘草各一兩

右爲末每用生水調塗於赤腫處或紙花子塗貼之如

乾則水潤之

龍腦追毒丹治一切惡瘡內毒氣未出盡者皆可用之如

箭頭鍼刺癰瘡惡瘡不痛者亦效

藥其鍼刺自出破傷風惡瘡不痛者亦效

龍腦三分　麝香一分　輕粉

粉霜　雄黃各五分　乳香

砒黃各一字　巴豆十四箇去皮心膜

石研極細麵糊丸如麥粒大每用之先以鍼撥瘡口入

藥量輕重上藥後一兩時辰腫痛盡是應如患下疳瘡

蝕莖或半或盡者用漿磨一兩粒搽之不三上立效

桃紅散斂瘡口生肌肉定血辟邪風

寒水石燒　滑石各四兩　乳香

小豆粉　輕粉各一錢

右爲末每用少許乾糝血不止者加煙草貼瘡口上以

扇裹之

木香散治多時不斂一切惡瘡此藥能生肌肉止痛

木香　南黃連　楮槐各半兩

白芷三錢

右爲末每日一徧乾糝又方加地骨皮爲末先口噙溫

漿水洗瘡口上揩乾貼藥及治下疳瘡神效

玉龍膏摩風止痛消腫化毒治一切傷折瘡腫

括蔞大者一箇去皮　黃蠟一兩半　白芷半兩

麻油清者　麝香研一錢　松脂研一錢半

麝香　薰香各一兩　杏仁去皮尖
升麻　黃芪　赤芍藥
白芨　白蘞　甘草各一錢

右以油浸七日御取出油先煉令香熟放冷入諸藥慢火煎黃色用絹濾去粗入銀石鍋內入蠟并麝香松脂熬少時以藝合器盛每用少許薄攤絹帛上貼若頭面風癬痒瘡腫疼痛並塗搽令熱頻用之如耳鼻中肉鼾用紙撚子每日點之至一月即愈如治炙瘡及小兒瘡瘡塗之兼滅瘢痕神效

司馬溫公解毒膏治諸瘡及杖瘡尤宜貼之

乳香三錢　木鼈子二十四箇去皮　杏仁四十八箇
草麻子三十四箇　巴豆十四箇　槐枝四兩長四指
柳枝二兩　桃枝三兩　黃丹春秋三兩半夏冬三兩

右件用清油一斤下諸藥熬黑滴水內不散成也用好絹濾過用時於水內浴貼之

善應膏

黃丹二斤細上等者　沒藥研　白蘞生
官桂　乳香研　木鼈子生
白芨生　當歸　白芷
杏仁生各一兩如指節條長　柳枝一兩如指節條長

右除黃丹乳香沒藥外餘藥用麻油五斤浸一宿於炭火上鐵鍋內熬至變黑色濾去藥不用將黃丹入油內上火用柳條如小錢粗四指長攪令微變褐色出火再用柳枝攪令出烟盡入乳香沒藥再用柳條攪令勻候冷傾入磁盆內切成塊油紙裹之後用如常法

大紅膏治從高墜下及落馬壓車筋骨疼痛

當歸　赤芍藥　烏藥各一兩
小油半斤浸上藥七日七夜　沒藥一兩研
乳香二兩研　琥珀二兩研　黃丹十兩
瀝青一斤

石膏研細於銀石器內鎔開入油攪冷熱硬軟滴水不散用絹濾在銀石器內入黃丹并諸藥末用手不住攪令勻為度用時攤紙上貼傷處大有神效

消毒膏治一切腫毒結核疼痛

柴胡　藁本　牛膝
續斷　丹參　牡丹皮
甘草　細辛　槐白皮
荜茇各一錢半　羌活　何首烏
天麻　白芷各二錢　玄參
萆根　白蘞
木通　當歸洗焙
木香　升麻
川芎　白附子去皮　亂髮水洗淨令乾
赤茯苓各二錢半　木鼈子去皮三錢　沈香
桃仁湯浸去皮尖各三錢半　杏仁湯浸去皮尖
白芨四錢　防風五錢
黃芪五錢　黃丹十三兩　麻油一斤四兩

右件藥三十三味入油內浸七日七夜於淨銀石器內慢火熬候白芷焦黃色放溫以白絹濾去粗於磁罐內密封三晝夜候取出傾於鍋內慢火溫再濾去粗傾入好沙鍋中慢火再熬次下黃蠟十五兩用竹篦不住手攪令勻次下黃丹攪勻以慢火再熬動出火攪勻續次再上火三日方欲膏盛於磁合子內密封每用時以軟白絹上攤勻貼患處

雞白散治湯熨火燒疼痛

苦參不以多少

右細末用香油調搽

冰霜散治火燒燎損湯油熱燒傷皮爛肉大痛

寒水石生　牡蠣燒
青黛各一兩　輕粉一錢　朴硝

右為末新水調或油調濕則乾貼痛處立止如神

如神散治凍瘡皮膚破爛痛不可忍

川大黃

右為末新水調搽凍破瘡上

黃連散斂多年不效瘡

木香　槐柳　黃連各等分

右為末先洗瘡淨乾貼水出勿怪未效隔三日再用貼之

瘡總論

大凡瘡疾有五善七惡之證不可不察也頻蹙時嗽腹痛渴甚或泄利無度或小便如淋一惡也膿血大泄腫熱尤甚膿血敗臭痛不可近二惡也喘粗短氣恍惚嗜臥三惡也目視不正黑睛緊小白睛反青瞳子上看四惡也有項不便四肢沈重五惡也不能下食服藥則嘔食不知味六惡也聲嘶色敗口鼻青赤面目四肢浮腫七惡也動息自如飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神彩精明語言爽朗四善也體氣和平五善也若五善見三則瘥七惡見四則危然則病有源同七惡皮緊急者如善病有源同五善皮緩虛者如惡夫如是者皆凡醫之所知哉若五善病主則妙無以加也如七惡並臻則惡之劇矣

汗之則瘡已

丁巳委予從車迴住冬於曹州象以事至州有趙同知謂予曰家舅牛經歷病頭面赤腫耳前後尤甚疼痛不可忍發熱惡寒牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安臥一瘍書於腫上砭刺四五百餘鍼腫赤不減其痛益甚不知所由然願請君一見予遂往診視其脈浮緊按之洪緩此證乃寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫經云天寒則地凍水冰人氣在身中皮膚緻密腠理閉汗不出血氣澁內堅痛當足之時善行水者不能注冰善穿地者不能鑿凍善用鍼者亦不得取四厥必待天溫冰釋凍解而後水

可行地可穿人脉亦猶是也又云冬月閉藏用藥多而少鍼石也宜以苦溫之劑溫經散寒則已所謂寒熱厥理以苦發之以辛散之宜以托裏溫經湯麻黃苦溫發之者也故以爲君防風辛温散之者也升麻苦辛葛根甘平解肌出汗專治陽明經中之邪故以爲臣血藏而不行者則痛以香白芷當歸身辛溫以和血散滯濕熱則腫著痛苦甘溫體輕浮力雄壯能泄膚腠間濕熱人參甘草甘溫白芍藥酸微寒調中益氣使托其裏故以爲佐依方制之以薄衣覆其首以厚被覆其身臥於暖處使經血溫暢理關寒乃散陽氣伸大汗出後腫減八九分再服去麻黃防風加連翹黍粘子腫痛悉去經言汗之則瘡已信哉斯言或人以仲景言瘡家雖身腫痛不可發汗其理何也予曰此說乃營氣不從逆於肉理而患瘡腫作身疼痛非外感寒邪而作疼痛故戒之以不可發汗若汗之則成痓也又問仲景言鼻衄者不可發汗復言厥汗緊者當以麻黃湯發之衄血自止所說不同其故何也願聞其說予曰此議論血正與瘡家緊同且夫人身血之與汗異名而同類奪汗者無血奪血者無汗今衄血妄行爲熱所逼更發其汗反助邪熱重竭津液必變凶證故不可汗若瘀滯則爲在表脈緊則爲寒寒邪鬱遏陽不得伸熱伏榮中迫血妄行上出於鼻則當麻黃湯散其寒邪使陽氣得舒其衄自止又何疑焉或者歎曰知其要者一言而終不知其要流弊無窮深古之學可謂知其要者矣

托裏溫經湯治寒覆毛皮鬱遏經絡不得伸越熱伏榮中聚而爲赤腫痛不可忍惡寒發熱或相引肢體疼痛

人參去蘆　當歸各一錢　白芍藥

甘草炙各半錢　白芷　當歸身

麻黃去根節名二錢　防風去蘆　葛根各三錢

新升麻四錢

右㕮咀每服一兩重水三盞先煎麻黃令沸去沫再下餘藥同煎至一盞去粗大溫服訖臥於暖處以厚衣覆之得汗而愈

凡治病必察其下

戊午冬予從軍住冬於成武縣有賈倉使父年踰六旬冬至後數日疽發於背五七日腫勢約七寸許不任其痛痒醫曰視之膿已成可開發矣公懼不從越三日醫曰不開恐變證生矣遂以燔鍼開之膿泄痛減以開遲之故迨二日變證果生覺重如負石熱如燔火痛楚倍常六脉沈數按之有力此蓄聚積熱之變也邪氣鬱熱固宜以寒藥治之時月嚴凝復有用寒遠寒之戒乃思內經云有假者反之雖違其時以從其證可也與瘍醫議急作清涼飲子加黃連秤一兩五錢作一服服之利下兩行痛減七分翌日復進前藥其證悉除後月餘平復又陳錄判母年七十有餘亦冬至後腦出疽形可圍面大命瘍醫診視俟瘡熟以鍼出膿因怒笞侍妾瘡凱內陷四一韭葉許面色青黃不澤四肢逆冷汗出身瘙時復嘔吐脈極沈細而遲蓋緣衰老之年嚴寒之時病中苦楚飲食淡薄已瘦肥膿之氣獨存疲羸之形加之暴怒精神愈損故有此寒變也病與時同與瘍醫議速製五香湯一劑加丁香附子各五錢劑盡瘍復大發隨證調治而愈內經曰凡治病必察其下謂察時下之宜也諸痛癢瘡皆屬心火言其常也如瘡盛形羸邪高痛下始熱終寒此反常也固當察時下之宜而權治故曰經者常也法者用也醫者意也隨所宜而治之可收十全之功矣

捨時從證

至元壬午五月二十八日王伯祿年踰五旬有七右臂腫盛上至肩下至手指色變皮膚涼六脉沈細而微此乃附骨癰開發已經以燔鍼起之膿清稍解次日肘下再開之加呃逆不絕彥和與丁香柿蒂散兩服柿蒂次日呃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿飲食減少時發昏憒於左乳下黑盡處灸二七壯又處托裏溫中湯用乾薑附子木香沈香茴香羌活等藥㕮咀一兩半欲與服或者曰諸痛痒瘡皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然不得不然內經曰脉細皮寒寫利前後飲食不入此謂五虛況呃逆者胃中虛寒故也諸痛痒瘡皆屬心火是言其定理也此證內外相反須當捨時從證也非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸證悉去飲食倍進瘡勢溫膿色正彥和復用五香湯數服後月餘平復憶守常者衆人之見知變者知者之事知常而不知變細事因而取敗者亦多矣況醫乎哉守常知變豈可同日而語乎哉

托裏溫中湯治瘡爲寒變而內陷者膿出痛解皮膚涼心下瘡滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔逆氣短促呃逆不絕不得安臥時發昏憒

沈香　丁香　益智仁

茴香　陳皮各一錢　木香半錢

甘草炙二錢　羌活　乾薑炮三錢

黑附子炮去皮臍四錢

右㕮咀作一服水三盞生薑五片煎至一盞去粗溫服

無時忌一切冷物

內經云寒淫於內治以辛熱佐以苦溫故以附子乾薑大辛熱溫中外發陽氣自裏之表故以爲君羌活味苦辛溫透關節炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血脉胃寒則嘔吐呃逆不下食益智仁丁香沈香大辛熱以散寒爲佐瘡氣內攻氣聚而爲滿木香茴香陳皮苦辛溫治病散滿爲使也

打撲損傷從高墜下

繆刺論云人有所墜墮血留內腹中痛脉不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脉下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之前血脉出血刺足趾上動脉不已刺三毛上各一肩

見血則已左刺右右刺左善悲驚不樂刺如右方
當歸導滯散治打撲損傷落馬墜車瘀血大便不通紅塵
暗青疼痛昏悶吹血內壅欲死
川大黃一兩　當歸三兩　麝香少許另研
右爲末入麝香研勻每服三錢熱酒一盞調下食前內
瘀血去或骨節傷折疼痛不可忍以定痛接骨紫金丹
治之
復元活血湯治從高墜下惡血留於脇下疼痛不可忍
大黃一兩酒浸　柴胡五錢　栝蔞根
穿山甲炮　當歸各三錢　紅花
甘草各二錢　桃仁湯泡去皮尖研如泥五十箇
右除桃仁爲㕮咀每服一兩重水二盞半酒半盞同煎
至七分下桃仁泥再煎一兩沸去柤大溫服食前以利
爲度利後痛不盡者當服乳香神應散
黃帝鍼經云有所墜墮惡血留內若有所大怒氣上而
不下損於脇下則傷肝肝膽之經俱行於脇下經屬厥
陰少陽以柴胡爲引用爲君以當歸和血脈又急者痛
也甘草緩其急亦能生新血甘生血陽生陰長故也爲
臣穿山甲栝蔞根桃仁紅花破血潤血爲佐大黃酒製
以蕩滌敗血爲使氣味相合使氣血各有所歸痛自去
矣
聖靈丹治一切打撲傷損及傷折疼痛不可忍
乳香五錢　烏梅去核五枚　萵苣子一大錢炒黃色二兩八錢
白米一捻
右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼熱酒送下喫
一服不痛勿服如痛再服
神效接骨丹治打撲損傷筋折骨及寒濕腳氣腿疼或一
切惡瘡疼痛不止皆可服之
乳香　沒藥　白膠香
蜜陀僧各四兩各另研　紅豆　香白芷

大豆　貫芎　赤芍藥
自然銅火煅醋淬如銀爲度　蒺子仁
當歸洗三次焙　水蛭各四兩
右先以自然銅火燒紅醋淬燒如銀爲度用四兩入前
十二味藥各等分同爲末以黃蠟爲丸如彈子大每服
一丸以黃米酒一盞煎開和柤溫服年少者只一服年
老者加添服病在上食後在下食前此藥內去自然銅
水蛭蒺子加桂花川楝子茴香爲細末酒麵丸如桐子
大每服十五丸酸石榴湯送下食前日進二服治小腸
氣如神一切腎腹疼痛並皆治之此藥男子婦人老幼
皆可服神效不可俱悉
乳香散治杖瘡大有神效
乳香　沒藥各三錢　茴香四錢
當歸五錢　自然銅火燒醋淬七次五錢
右細末每服五錢溫酒調下立效
五黃散治杖瘡定痛
黃丹　黃連　黃芩
黃蘗　大黃　乳香各等分
右爲細末新汲水調成膏用絹帛子攤在上貼於瘡
上
紫金丹治打撲損傷及傷折疼痛不可忍
川烏炮　草烏炮各一兩　五靈脂
木鼈子去殼　黑牽牛生　骨碎補
蔵靈仙　金毛狗脊　自然銅醋淬七次
防風　馬餘糧醋淬七次　地龍去土
烏藥　青皮去白　茴香炒各五錢
乳香　沒藥　紅娘子
麝香各二錢半　陳皮去白五錢
右爲末酒糊丸如桐子大每服十丸至二十丸溫酒送
下病在上食後在下食前

乳香神應散治從高墜下疼痛不可忍及腹中疼痛
獨科栗子　雄黑豆　桑白皮
乳香　沒藥各一兩　破故紙炒二兩
右爲末每服五錢酒一盞於砂石器內煎至六分入麝
香少許溫服
花藥石散治一切金傷撲損急以此藥糝傷處如內損血
入腸胃煎童便入酒調下二錢服之立效
石硫黃四兩　花藥石一兩
右二味爲粗末拌勻先以紙筋和膠泥固濟瓦罐子一
箇內可容藥候泥乾入藥在內泥封口了焙籠內焙乾
令透熱便安在四方甎上用炭一秤籠疊周帀自巳午
時從下生火令漸漸上徹有墜下火旋夾火上直至經
宿火冷炭盡方放經宿罐冷定取出細研袋合內盛
依前法使用
涌鐵膏取箭頭一切鐵刺入肉盡皆治之
蒺藜風頭一箇　蝼蛄蟲十九箇　土狗蟲十箇
芫青　馬肉中蛆焙　醬內蛆焙
蜣螂　巴豆　倍蛄
硇砂　夏枯草　磁石
黃丹　蘇木　地骨皮各一兩
石腦油三兩　茼柴灰汁三升
右將灰汁石腦油以文武火熬成膏次下諸藥令勻磁
器內收貯臨用時看瘡大小點藥良久箭頭自然涌出
萬聖神應丹出箭頭魚骨鐵麥芒等並近皆治之歸俠西
行省出軍官用
黃若科今天仙子苗是也
右於端午前一日持不語尊上項科取酌中一科要根
枝葉實全道先生伺在遠裏耶道罷用柴灰自東南爲
頭圓了用木鏟撅取子根下土次日端午日未出依前
不語用鏟只一下取出用淨水洗了不令雞犬婦人見

於淨室中石臼中擣如泥丸如彈子大黃丹爲衣紙袋內封了懸高處陰乾如有著箭其箭頭不能出者以絹絹裝盛一丸放在臍下用絲裹肚繫了先用象牙末於箭瘡上貼了後用此藥若箭瘡口生合用刀子微刮開以象牙末貼之

神聖膏取鏃因誤入皮膚

車脂不以多少

右成膏子者好雜紙上如錢大貼之二日一換三五次鏃自出大有神效

烏鯽散取鏃鏃誤入皮膚

烏鯽三五枚火炙熟

右爲末好醋調成膏塗瘡上紙蓋一兩次其鏃自出神效

黃石膏治金瘡漆者若以藥速合則潰宜用

黃丹　滑石等分

右研細敷之

又方

降眞香一味更好

刀箭藥方

石灰四兩　烏魚骨一兩

右五月五日平旦本人不語採地上青蒿萵苣菜各一握同前藥擣於日未出時擣作餅子曬乾用時旋刮削敷之早用並不作服

疣瘤疥癬皺揭附

癸丑歲承應冬住於瓜忽都有太醫大使顏飛卿傳四方用之皆效故錄之

并金散枯瘡瘡大有神效

土黃三錢　硇砂　雄黃各二錢別研

粉霜　輕粉各一錢

沒藥各半錢　乳香

右爲末假令瘡如刮桃大用藥末少許半錢用唾調如稀麵糊得所攤於瘡頂上如小錢大唾濕紙花兩重蓋之後用黃龍膏蓋之間日一度上藥次添藥徹的周迴大如韭葉如此上之無復漸漸拆之後根搖自然有裂豐隨後自然下來

黃龍膏涼肌退腫

黃蘗　黃芩　大黃各等分

右爲末唾調攤在紙上

生肌青龍膏

訶子皮　龍骨　高茶等分

右爲末乾糝上

做土黃法

砒黃研二兩　木鼈子去殼　巴豆不去油各半兩

硇砂研二錢

右件砒黃一處爲末後用木鼈子同右臘油和成一塊油紙裹埋於坑內四十九日取出收於磁器內盛勞作小塊

灸瘡子法治果報面生疣瘡

右用艾丸灸十壯即用醋磨雄黃塗紙上剪如蠟蠟大貼灸處用膏藥重貼二日一易候痒擠出膿如菉豆粉即愈

枯瘡膏

草烏半斤　川烏四兩

桑朽木各三兩　細白石灰三碗淋去　桑柴灰碗

右朽木等四味燒令存性同二灰研勻用水一桶淋汁如法熬成膏用之

寶金散偏醫癰氣無不瘥神效

猪羊臘十對機水洗去脂膜後晒乾搗爲細末　海藻

淘帶各二兩　蘑香研

琥珀研　乳香各二兩

木香　丁香各二錢半

右爲末假令如刮桃大用藥末少許半錢用唾調如稀麵糊得所攤於瘡頂上如小錢大唾濕紙花兩重蓋之後用黃龍膏蓋之間日一度上藥次添藥徹的周迴大如韭葉如此上之無復漸漸拆之後根搖自然有裂豐隨後自然下來

黃龍膏涼肌退腫

黃蘗　黃芩　大黃各等分

右爲末唾調攤在紙上

生肌青龍膏

訶子皮　龍骨　高茶等分

右爲末乾糝上

做土黃法

砒黃研二兩　木鼈子去殼　巴豆不去油各半兩

硇砂研二錢

右件砒黃一處爲末後用木鼈子同右臘油和成一塊油紙裹埋於坑內四十九日取出收於磁器內盛勞作小塊

灸瘡子法治果報面生疣瘡

右用艾丸灸十壯即用醋磨雄黃塗紙上剪如蠟蠟大貼灸處用膏藥重貼二日一易候痒擠出膿如菉豆粉即愈

枯瘡膏

草烏半斤　川烏四兩

桑朽木各三兩　細白石灰三碗淋去　桑柴灰碗

右朽木等四味燒令存性同二灰研勻用水一桶淋汁如法熬成膏用之

寶金散偏醫癰氣無不瘥神效

猪羊臘十對機水洗去脂膜後晒乾搗爲細末　海藻

淘帶各二兩　蘑香研

琥珀研　乳香各二錢半

木香　丁香各二錢半

右爲末每用二錢食前茶酒調下日三服忌發風物甚

海藻　海帶

廣茂　青蘚各半兩

右爲末煉蜜丸如指尖大每服一丸嚼化食後

何首烏散治脾痢風毒攻衝徧身疥癩痒痛或生瘡疹搔之成瘡有背拘急肌肉頑痺手足皴裂風氣上攻面頭生瘡及治紫白癜頑麻等風

荊芥穗　蔓荊子　蒺藜仙

何首烏　甘草炙　防風各一兩

右用蚵蛾草乾一兩同爲末每服一錢食後溫酒調下沸湯亦得

茼茹散治疥經年不瘥

水銀一錢　好茶二錢　茼茹二錢

輕粉少許

右爲細末每用不以多少油調搽之

苦參散治徧身瘡疥瘙痒經年不瘥

蔓荊子　何首烏　荊芥穗

蔵靈仙　苦參各等分

右爲末每用二錢食前茶酒調下日三服忌發風物甚妙

硫黃散治疥

硫黃　川椒　石膏

白礬各半分

右爲末以生油調搽神驗

狗脊膏治疥

硫黃半兩　雄黃半兩　信一錢

田烏　黑狗脊　白礬各半兩

巴豆二箇

右爲末先以油熬膏次入蠟調勻搽之效

柏脂膏治乾濕癬

柏油一　黃蠟半斤　杏仁四十五箇剉

朴硝一

右於鐵器內熬老生葱三根一順攪五七沸濾過成膏

搽瘡元顏和病傳

祛濕散治乾濕癬

鹽砂四兩　薄荷半兩

右爲末生油調搽之濕者乾摻之

苦參丸治肺奇邪熱頭面生瘡生疥癬並宜服之

苦參不以多少

右爲末粟米飯丸如桐子大每服五十丸空心米飲湯送下

玉粉散治熱汗浸漬成瘡腫痒煩癢

粟米粉二兩　寒水石煅　定粉各一兩

白石脂　白龍骨　石膏各半兩

滑石八兩　蛤粉九兩半

右爲末再研極細每用薬乾搽汗處

七寶散治熱汗浸漬成瘡痒痛不已

黃芪　當歸　防風

木通　荊芥穗　地骨皮各三兩

右爲粗末入白礬生末一兩勻每用一兩水三碗煎五

六沸去粗熱洗拭乾避風少時

先師東垣老人路次方城北獨樹店客舍有推江軸者皮膚陰軒叢書

唇皺裂不任其痛兩手不能執轅足不能履地停輙止宿因制此與之即效明日遂行

潤肌膏治手足皺澀皮膚裂開疼痛不能迎風入手屢用屢效故錄於此

珠子澀青四兩　白黃蠟八錢　乳香二錢

右於鐵鍋內先下澀青隨手下黃蠟乳香次入麻油一二兩候澀青鎔開微微熬動放大淨水盆於其旁以攪藥用鐵鉗酒一二點於水中試之如硬少入油看硬軟合宜新絹濾於水中揉拉以白爲度磁器內盛或油紙裹每用先火上炙裂口子熟捻合藥亦火上炙軟塗裂口上用紙少許貼之自然合矣

煩躁門

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之若汗若下之後而煩熱者胸中窒者亦以梔子豉湯仲景云病人舊微溏者不可與之

梔子豉湯

肥梔子四箇　豆豉半合

右水二盞先煎梔子至一盞下豉同煎七分服得吐止後服一云快利止後服

硃砂安神丸治心神煩亂怔忡不安兀兀欲吐胸中氣亂而有熱若懊憹之狀皆屬上血中伏火蒸蒸而不安宜從權衡法以鎮陰火之浮行以養上焦之元氣

硃砂一錢另研水飛爲末　黃連去鬚淨一錢二分　生地黃三分

當歸去蘆　甘草炙各半錢

右爲末酒浸蒸餅丸如黍米大硃砂爲衣每服十五丸津唾送下食後此藥治之理也

內經曰熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒去心煩除濕熱而爲君甘草生地黃之甘寒瀉火補氣滋生陰血以爲臣當歸補血不足硃砂納浮濇之火而安神明也

八物定志丸平補心氣安神鎮驚除煩熱痰實

遠志去心　菖蒲　麥門冬

茯神　白茯苓去心各一兩　白朮半兩

人參一兩半　牛黃二錢另研

右爲末入牛黃勻煉蜜丸如桐子大硃砂爲衣每服二三十丸熟水送下無時

胸膈痞

人參利膈丸治胸中不利痰嗽喘滿利脾胃壅滯調大便祕利推陳致新消飲進食

藿香一錢半　當歸三錢　木香

檳榔各二錢半　人參三錢　甘草炙五錢

厚朴薑製二兩　枳實麩炒五錢　大黃酒浸焙一兩

右爲末滴水丸如桐子大每服三十丸食後溫湯送下

此治膈氣之聖藥也一方湯浸蒸餅丸亦可

桔梗枳殼湯治傷寒痞氣胸膈欲絕

枳殼去穰麩炒　桔梗各等分

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去柤溫服食後

赤茯苓湯治傷寒嘔噦心下滿胸膈宿有水氣頭眩心悸

人參去蘆　赤茯苓去皮　陳皮去白各一兩　半夏湯泡七次各半兩

白朮　川芎

右爲粗末每服四錢水一盞半生薑五片煎至一盞去柤溫服不拘時

通氣湯主胸膈氣逆

桂去皮三錢　生薑六錢　吳茱萸炒四錢

半夏湯泡八錢　大棗四箇

右㕮咀用水一升煎取四合分作三服放溫服之對病增損

膈氣噎

桂香散治膈氣反胃諸藥難效朝食暮吐暮食朝吐甚者食已輒出其效如神

水銀　黑錫各三錢　硫黃五錢

右三味銚內用柳木槌研熬微火上細研爲灰取出後入丁香末二錢桂末二錢生薑末三錢一處研勻每服三錢黃米粥飲調下一服取效病甚者再服

丁香附子散治膈氣吐食

丁香半兩　檳榔一箇重三錢　黑附一箇重半兩炮去皮臍　船上硫黃去石研　胡椒各二錢

右先將四味爲末入研藥和勻每服二錢用附子一箇去毛翹足腸肚填藥在內濕紙五七重裹定慢火燒熱取出嚼食後用溫酒送下日三服如不食羹酒粟米飲下不計時

漢防已散治五噎

官桂去皮　陳皮各一兩去白　漢防已五錢　杏仁湯浸去皮尖一兩　紫蘇　羚羊角鎊　細辛各七錢半

右七味粗末每三錢水一盞生薑三片煎七分去柤溫服忌酸味生冷滑物一日兩服

紅豆丸治諸噦逆膈氣反胃吐食

胡椒　糯砂　揀丁香　紅豆各二十一粒

右爲末薑汁丸如皁角子大每服一丸棗一箇去核塡藥麪裹煨熟細嚼白湯下空心日三服

心下痞

大黃黃連瀉心湯治心下痞按之濡其脈關上浮者又傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先用桂枝湯解表表解乃可用此湯攻痞

大黃二兩　黃連　黃芩各一兩

伊尹湯液論云大黃黃連黃芩湯三味今監本無黃芩殷藩之也

右㕮咀以煎沸湯二大盞熱漬之一時久殺去柤煖動分作二服

大消痞丸治一切心下痞悶及積年久不愈者

半夏湯泡七次四錢　乾生薑　麴炒黃　砂仁　甘草炙各一錢　豬苓半錢　人參　橘皮各二錢　厚朴製三錢　枳實麩炒五錢　黃連去鬚　黃芩生熟各五錢　白朮　蓽茇各一兩　一方加澤瀉三錢

右爲末水浸蒸餅丸如桐子大每服五七十丸至百丸白湯送下食後

枳實理中丸治中脘痞滯氣不宣逼積寒停飲食入不化

人參去蘆　乾薑炮　甘草炙　白朮各等分　枳實麩炒

右爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼白湯送下湯化亦得不拘時

三脘痞氣丸治三焦痞滯氣不升降水飲停積不得流行脇下虛滿或時刺痛宜服

沈香　大腹子　檳榔　縮砂各半兩　青皮去白　陳皮去白　木香　白豆蔻　三稜炮各一兩

右爲末麪糊丸如桐子大每服三十丸溫水送下陳皮湯亦得食後

枳實消痞丸治右關脈浮緊心下虛痞惡食懶倦開胃進食

乾生薑一錢　人參　甘草炙　白朮　白茯苓　半夏麴三錢　厚朴製四錢　黃連各五錢　麥蘖麴各二錢　枳實麩炒

右爲末湯浸蒸餅丸如桐子大每服三十丸溫水送下無時量虛實加減

藥戒

客有病痞者積於其中伏而不得下自外至者捍而不得納從醫而問之曰非下之不可歸而伏其藥既飲而恭下不終日而向之伏者散而無餘向之捍者柔而不支焦膈導達呼吸開利快然若未始有疾者不數日病復作投以故藥其快然也亦如初自是不逾月而病五作而五下每下輒愈然客之氣一諾而三引體不勞而汗股不步而慄茶虞草無所耗於前而其中柔然莫知其所來嗟夫心病非下不可已予從而下之術未爽也茶然獨何如聞楚之南有良醫焉往而問之醫歎曰子無怪是茶然者也凡子之術固而是茶然也坐吾語汝且天下之理有甚快於吾心者其末必有傷求無傷於終者則初無望其快於吾心夫陰伏而陽蓄氣與血不運而爲病橫乎子之胸中者其得大矣擊而去之不須臾而除甚大之累和平之物不能爲也必將擊搏震撓而後可夫人之和氣沖然而甚微泊乎其易危擊搏震撓之功未成而子之和蓋已病矣由是觀之則子之病凡一快者子之和一傷矣不終月而快者五子之和平之氣不既索乎故體不勞而汗股不步而慄茶然如不可終日也且將去子之病而無害於和也子歸燕居三月而後與之藥可爲也客歸三月齋戒而復請之醫曰子之氣少復矣取藥而投之曰服之三月而疾少平又三月而少康終年而復常且飲藥不得亟進客歸而行其說然其初使人憑案固反然而遲之蓋三投藥而三反之也然日不見其所攻之效久較則月異而時不同蓋終歲而疾平客請醫再拜而謝之坐而問其故醫口是醫國之說也豈特醫之於疾哉子獨不見秦之治民乎悍下罕反性急悍也而不聽分塹而不勤事放而不畏法令之不聽治之不變則秦之民嘗病矣商君見其病也厲以刑法威而斬伐悍厲猛鷙厲利反不貸毫髮痛剗楚根反而力鋤之於是乎秦之政如建紀偃反瓶戶經反流通四達無敢或拒而秦之病嘗一快矣自孝公以至二世也凡幾病而幾快矣頭者已

反畏也強者已衆而秦之民無歡心矣史商公傳孝公用衛鞅欲變法孝公曰善卒定變法之令令民爲什五而相守司連坐不告奸者腰斬告奸者與斬敵首同賞匿奸者與降敵同罰故猛政一快者歡心一亡積快而不已而秦之四支枵然徒具其物而已民心日離而君孤立於上故匹夫大呼不終日而百疾皆起秦欲運其手足肩背而漠然不我應故秦之已者是好爲快者之過也昔者先王之民其初亦嘗病矣先王豈不知若然擊去之以爲速也惟其有傷於終也故不敢求快於吾心優柔而撫存之教以仁義導以禮樂陰解其亂而除去其滯旁視而憮然有之矣然月計之歲察之前歲之俗非今歲之俗也不擊不搏無所忤逆是以日去其厲氣而不覺其歡心於是政成教達安樂久而無後患矣是以三代之治皆更數聖人歷數百年而後俗成則予之藥終年而愈疾蓋無足怪也故曰天下之理有快於吾心者其末也必有傷求無傷於其終則初無望其快吾心雖然豈獨於治天下哉容再拜而記其說

心胃痛及腹中痛

草荳蔻丸治因肌飽勞役脾胃虛弱而心火乘之不能滋榮心肺上焦元氣衰敗因遇冬冷腎與膀胱之寒水大旺子能令母實助肺金大旺相輔而來剋心乘脾故胃脘當心而痛此大復其醫故經云大乘必大復理之常也故皮毛血脈分肉之間元氣已絕於外又以大寒大燥二氣併而乘之其人苦惡風寒耳鳴及腰背相引而痛鼻內苦息肉不通不聞香臭額寒腦痛目時眩寒水反乘脾土痰唾沃沫飲食反出腹中常痛心胃痛脇下急痛有時而痛腹不能伸大便多泄而不秘下氣不絕或腹中鳴胸中氣亂心煩不安而成霍亂之意腦咽不通極則有聲鼻中氣短遇寒濕甚或居處方過口吸風寒則復作四肢厥逆身體沈重不能轉側頭不可顧小便溲而欠此脾虛之至極也

桷皮八分　硫黃八分　草荳蔻一錢四分麩裹煨熟去皮

澤瀉一錢　青皮六分　吳茱萸八分洗苦　益智仁八分　牛夏一錢　黃芪八分　人參八分　神麯炒四　生甘草六分　薑黃四分　桃仁湯浸去皮尖六分　當歸身六分　柴胡四分銼碎多少用之　大麥糵一錢半　甘草炙六分

右除桃仁另研外餘同爲末入桃仁研勻湯浸蒸餅丸如桐子大每服三十丸熱白湯送下旋料酌虛實多少用之

神保丸治心腦痛腹脇痛腎氣痛痰積痛

木香　胡椒各二錢五分　乾蠟七個　巴豆去心膜油十箇

右爲細末入巴豆霜令勻湯浸蒸餅爲丸麻子大硃砂爲衣每服三丸薑湯下

丁香止痛散治心氣痛不可忍

良薑五兩　荷香炒　甘草炙各一兩半　丁香半兩

右爲末每服二錢沸湯點服不拘時

失笑散定心氣痛不可忍小腸氣痛

蒲黃炒香　五靈脂酒研洗去砂土各等分爲末

右先用醋調二錢熬成膏入水一盞煎七分食前熱服

二薑丸治心脾虛溫藿脾胃療冷食所傷

乾薑炮　良薑

右二味等分爲細末麵糊爲丸梧子大每服二三十丸食後陳皮湯下婦人不宜服

七氣湯治七氣爲病內結積聚心腹絞痛時發時止

人參　官桂　炙甘草各一兩　半夏五兩

右㕮咀每服三錢水一大盞入薑三片煎七分稍熱服

益智散治冷氣奔衝心腹脹滿絞痛

川烏四兩　益智二兩　青皮一兩　乾薑半兩

右㕮咀每服三錢水二盞入鹽一撮薑五片棗二箇同煎至八分去相溫服食前

茱萸丸治脾胃虛冷嘔逆醋心腹悶不決大效

官桂二兩　蓽撥　厚朴薑製　胡椒各一兩　乾薑炮一兩　吳茱萸揀淨三兩好酒少許洗焙　蓽澄茄各一兩　烏附子炮去皮臍半兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服二十丸食前溫米飲送下日三服

高良薑湯治心腹卒痛如刺兩脇支滿而悶不可撼

良薑五錢　厚朴薑製　官桂各二錢　當歸炒

右㕮咀以水一升煎取四合強人分作二服弱人分作三服一服痛定止後服對病增損

胃脘當心而痛治驗

兩浙江淮都漕運使相君長男雲卿年二十有五體本豐肥奉養膏粱時有熱證友人勸食寒涼物及服寒涼藥於至元庚辰秋病癒久不除醫以砒霜等藥治之新汲水送下藥食熱物痛病不除反添吐瀉脾胃復傷中氣愈虛腹痛腸鳴時復胃脘當心而痛不任其苦腰易醫藥未嘗有效至冬還家百般治療而不癒延至四月間困勞役煩惱過度前證大作請予治之具說其由診得脈弦細而微手足稍冷面色青黃而不澤情思不樂惡人煩冗飲食減少微飽則心下痞悶嘔吐酸水發作疼痛冷汗時出氣促悶亂不安須人額相抵而坐少時易之予思內經云中氣不足溲便爲之變腸鳴之苦鳴下氣不足則謂痿厥心冤又曰寒氣客於腸胃之間則卒然而痛得炅則已炅者熱也非甘辛大熱之劑則不能愈遂製此方

扶陽助胃湯

乾薑炮一錢半　揀參　草豆蔻仁
甘草炙　官桂　白芍藥各一錢
陳皮　白朮　吳茱萸各五分
黑附子炮去皮二錢　益智仁五分一方一錢

右㕮咀都作一服水三盞生薑三片棗子兩箇煎至一盞去柤溫服食前三服大勢皆去痛減過半至秋先灸中脘三七壯以助胃氣次灸氣海百餘壯生發元氣滋榮百脈以還少丹服之則喜飲食添肌肉潤皮膚明年春灸三里二七壯乃胃之合穴也亦助胃氣又引氣下行春以芳香助脾復以育氣湯加白檀香平治之戒以懲忿窒欲愼言語節飲食一年而平復

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫附子乾薑大辛熱溫中散寒故以爲君草豆蔻仁益智仁辛甘大熱治客寒犯胃爲佐脾不足者以甘補之炙甘草甘溫白朮橘皮苦溫補脾養氣水挾木勢亦來侮土故作急痛桂辛熱以退寒水芍藥味酸以瀉木剋土吳茱萸苦熱泄厥氣上逆於胸中以爲使也

衛生寶鑑卷十三終

元羅天益謙甫著　三原李錫齡孟熙較刊

腹中積聚

眞定路惠民司令張君傳硇砂煎丸香稜丸木香硇砂煎丸三方多效

硇砂煎丸消磨積塊痃癖一切凝滯老人虛人無妨

黑附子兩箇各重五錢半已上正坐安者炮去皮臍剜作象子　木香三錢　破故紙隔紙微炒　蓽撥異者各一兩　硇砂三錢

右先將硇砂用水一盞煎續續化開於瓷內熬乾爲末安在附子瓷內御用剜出附子末蓋口用和成白麵裹約半指厚慢炭火內燒勻黃色去麵同木香等藥爲細末御用元裹附子熟黃麵爲末醋調煮糊丸桐子大每服十五丸至三十丸生薑湯送下此藥累有神功

仙方香稜丸破痰癖消癥塊及冷熱積

木香　丁香各五錢　青皮去白　枳殼麩炒　京三棱切酒浸一宿　茴香炒各一兩　川楝子　廣茂一兩切酒浸一宿將三棱廣茂用去皮巴豆三十粒同炒巴豆黃色去巴豆不用

右爲末醋糊丸如桐子大用硃砂爲衣每服二十丸炒生薑鹽湯下溫酒亦得食後日進三服

木香硇砂煎丸治婦人消痃癖積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消久不差者

木香　硇砂　官桂　附子炮　乾漆炒去煙　豬牙皂角　細辛　乳香研　京三棱炮　廣茂炮　大黃炒令焦末　乾薑炮　青皮各一兩　沒藥研　巴豆霜半兩

右除研藥外同爲末以好酒一升化開硇砂去柤內銀石器中慢火熬次下巴豆霜大黃末熬成膏將前藥末

膏內和丸如桐子大每服三五十丸食後溫酒送下

溫白丸治心腹積聚久癥癖塊大如杯碗黃疸宿食朝起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩脇十種水病八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛積年食不消化或瘧疾連年不瘥及療一切諸風身體頑麻不知痛痒或半身不遂或眉髮墮落及瘰癧七十二種風三十六種遁尸疰忤及瘋癲或婦人諸疾臍積不生帶下淋瀝五邪失心愁憂思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹中一切諸疾有似懷孕連年累月羸瘦困篤或歌或哭如鬼所使但服此藥無不除愈

川烏炮去皮二兩半　柴胡去蘆　吳茱萸湯泡七次揀淨　蒲黃　紫菀去苗葉及土　桔梗　乾薑炮　肉桂去粗皮　茯苓去皮　黃連去鬚　人參　蜀椒去目及閉口炒用　厚朴去粗皮薑汁製　皁莢去皮子炙　巴豆去皮心膜出油炒研各半兩

右爲細末入巴豆勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服三丸生薑湯下食後或臨臥服漸加至五七丸

雞爪三棱丸治五臟痃癖氣塊年深者一月取效

木香　石三棱　青皮去白　京三棱　陳皮去白　雞爪三棱各五錢　檳榔　肉荳蔻各一兩　硇砂三錢

右九味爲末苦汁打糊丸如桐子大每服二十丸薑湯下空心臨臥各一服忌一切生冷硬粘物

青鹽丸治一切冷積作痛無時宿食不消及治一切酒食所傷神效

青鹽　硇砂各一錢　鹽豉四十箇　大椒三十粒　細麵末三錢　巴豆三十箇去皮心膜出油

右入揀棗三十箇同末入巴豆勻臨糊丸桐子大每服三十丸溫薑湯下積在上食後

玄胡丸解化傷滯內消飲食治吐利癥瘕氣結蠱煩不安心腹脹痛頗三焦和脾胃

木香　當歸　玄胡索
青皮去白　雄黃別研飛另　廣茂炮
檳榔各四兩　京三棱炮六兩

右八味爲末入雄黃勻糊丸如桐子大每服三十丸生薑湯下不拘時

破積導飲丸治有積塊堅硬飲食不消心下結悶

檳榔　陳皮去白　廣木香
青皮去白　枳殼麩炒　枳實麩炒
廣茂炮　半夏泡十次　京三棱炮
神麯炒　麥糵炒　乾生薑
茯苓去皮　甘草炙　澤瀉各五錢
牽牛頭末二錢一方六錢　巴豆去心膜三四箇取霜

右爲末入巴豆勻生薑汁打糊丸梧桐子大每服三十丸溫薑湯下食前

木香三棱湯和脾胃進飲食消化生冷物治心腹刺痛霍亂吐利胸膈脹悶

木香　神麯炒各一兩　京三棱炮
甘草炙各二兩　陳皮去白　益智各四兩

廣茂六兩

右爲末每服二錢入鹽一捻沸湯點服空心食前

乾柿丸取虛實積下膈甚妙

硃砂研爲衣　沒藥研　豬牙皂角去皮弦子爲末
乾漆碎炒烟盡者末　京三棱炮爲末　青礞石爲末
乾薑炮爲末　水銀沙子各一錢　輕粉二錢
巴豆三十箇去皮膜醋煮十沸

右件各研勻軟飯和丸如菉豆大煎柿蒂湯冷下三五丸加減用婦人有胎勿用

神效五食湯丸取虛實積食氣蠱脹滿積塊水氣年深癖

癥並皆治之

大戟刮去皮　甘遂生各半兩　豬牙皂角去皮子弦用
胡椒生各一兩　荒花米醋浸一宿炒黃一兩
巴豆去心膜醋煮二十沸研半兩

右除巴豆外杵爲末入巴豆再研勻糊丸如菉豆大每服五七丸氣實者十丸夜臥水一錢用白米白麵黑豆生菜豬肉各少許煎至半盞去柤用湯溫下藥取下病忌油膩粘滑物婦人有胎不可服之

磨積三棱丸治遠年日近諸般積聚癖痃氣塊或氣積酒積諸般所傷無問男子婦人老幼並宜服之常服進飲食

木香　麥糵　京三棱炮
廣茂　枳殼麩炒　石三棱去皮半兩
杏仁麩炒各半兩　乾漆炒煙盡三錢　雞爪三棱半兩
萝根三錢　官桂二錢半　黑牽牛半兩半生半熟
丁香　檳榔　香附子
青皮去白各二錢　縮砂三錢　白牽牛半兩半生半熟
陳皮去白三錢

右爲末醋糊丸如桐子大每服二十丸生薑湯下食後日二服病大者四十日消溫水送下亦得

聖散子治遠年積塊及婦人乾血氣

硇砂　川大黃各八錢　麥糵六兩
乾漆三兩炒煙盡　福薔　茴香炒
檳榔　鼈甲各一兩

右爲末每服五錢臨睡溫酒調下仰臥此藥只在心頭至明大便如爛魚小便赤爲驗取去藥無毒性如君子有神效小兒用一錢十五以上五錢或七錢空心服之更效如治婦人乾血氣加穿山甲二兩炮

荆蓬煎丸破痰癖消癥塊及冷熱積聚胃脘痃癖遲利三焦並皆治之

木香　麥糵　京三棱炮
廣茂　枳殼麩炒　石三棱去皮半兩
杏仁麩炒各半兩　乾漆炒煙盡三錢　雞爪三棱半兩
萝根三錢　官桂二錢半　黑牽牛半兩半生半熟
丁香　檳榔　香附子
青皮去白各二錢　縮砂三錢　白牽牛半兩半生半熟
陳皮去白三錢

右爲末醋糊丸如桐子大每服二十丸生薑湯下食後日二服病大者四十日消溫水送下亦得

聖散子治遠年積塊及婦人乾血氣

硇砂　川大黃各八錢　麥糵六兩
乾漆三兩炒煙盡　福薔　茴香炒
檳榔　鼈甲各一兩

右爲末每服五錢臨睡溫酒調下仰臥此藥只在心頭至明大便如爛魚小便赤爲驗取去藥無毒性如君子有神效小兒用一錢十五以上五錢或七錢空心服之更效如治婦人乾血氣加穿山甲二兩炮

荆蓬煎丸破痰癖消癥塊及冷熱積聚胃脘痃癖遲利三焦並皆治之

木香　青皮去白　川茴香炒
枳殼麩炒　檳榔各一兩　京三棱二兩酒浸冬三日夏一日
廣茂二兩醋浸冬三日夏一日同三棱以去皮巴豆二十箇銀器內同炒令焦黃色爲度去巴豆不用

右七味修事畢爲末水糊丸如豌豆大每服三十丸溫生薑湯送下食後

醋煮三棱丸治一切積聚遠年日近皆治之如神效

川芎二兩醋煮微軟切作片子　京三棱四兩醋煮軟竹刀切作片子
大黃半兩醋紙裹火煨過切

右三味爲末水糊丸如桐子大每服三十丸溫水下無時病甚者一月效小者半月效

流氣丸治五積六聚癥瘕塊僻酒飲以上之疾皆係寒氣客搏於腸胃之間久而停留變成諸疾此藥能消導滯氣通利陰陽消舊飲雖年高氣弱亦宜服之

木香　川茴香炒
菖蒲　青皮去白　蘿蔔子
廣茂炮　檳榔　補骨脂
神麯炒　枳殼麩炒去瓤　蓽澄茄
縮砂　麥糵麩炒各一兩　牽牛炒一兩半

右爲末水糊丸如桐子大每服五七丸細嚼白豆蔻仁一枚白湯送下食後

廣茂潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐臥不安

半夏泡七次　黃芪各六分　當歸梢
厚朴　黃芩各五分　廣茂
麴各三分　甘草生三分　益智仁七分
紅花　橘皮去白　升麻各二分
柴胡　澤瀉　吳茱萸各三分
青皮二分

右㕮咀都作一服水二錢先浸藥少時煎至一錢去柤

稍熱服食前忌酒濕麵加麻湯加萬根二分

治積要法

許學士云大抵治積或以所惡者攻之或以所喜者誘之則易愈如硇砂阿魏治肉積神麯麥蘖治酒積水蛭虻蠱治血積木香檳榔治氣積牽牛甘遂治水積雄黃膩粉治涎積礦石巴豆治食積各從其類也若用羣隊之藥分其勢則難取效須是認得分明是何積聚兼見何證然後增減酌量使之藥不爾反有所損要在臨時通變也

養正積自除

冀定王君用年一十九歲病積臍左連脇如覆杯腹脹如鼓多青絡脈喘不能臥時值暑雨加之自利完穀日晡潮熱夜有盜汗以危急來求予往視之脈得浮數按之有力謂病家曰凡治積非有毒之劑攻之則不可今脈虛弱邪此豈敢以常法治之遂投分滲益胃之劑數服而清便自調雜以升降陰陽進食和氣而腹大減胃氣稍平間以倒之不月餘良愈先師嘗曰潔古老人有云養正積自除於之滿坐皆君子縱有一小人自無容地而出今令冀氣實胃氣強積自消矣潔古之言豈欺我哉內經云久積大聚求其太平而止滿實中有積氣大毒之劑尚不可過況虛中有積者乎此亦治積之一端也邪正虛實宜精審焉

腹中諸蟲

烏梅丸治臟寒蛔蟲動作上入膈中煩悶嘔吐時發時止得食即嘔常自吐蛔有此證候謂之蛔厥此藥主之又治久痢

烏梅三百箇　黃蘗炙　細辛去苗　肉桂去粗皮　附子炮去皮臍　人參去蘆各六兩　乾薑炮十兩　當歸去蘆四兩　蜀椒去目及閉口者微炒出汗用四兩　黃連去鬚十六兩

右異搗篩合治之以酒浸烏梅一宿去核蒸之令熟用米飯熟搗成泥和藥令相得內臼中與煉蜜杵二千下丸如梧桐子大每服十五丸溫米飲下食前服

化蟲丸

鶴蝨去土　槐柳　胡粉炒各一兩　白礬枯二錢半　苦楝根去浮皮

右為末水糊丸如麻子大小兒疾病多有諸蟲或因臟腑虛弱而動其動即腹中疼痛發作積聚往來上下痛有休止亦攻心痛則哭不休合眼仰身撲手心煩悶亂嘔噦涎沫或吐清水四肢羸困面色青黃飲食雖進不生肌肉或寒或熱沈沈默默不的知病之處其蟲不療則子母相生無有休止長一尺則能害人一歲兒服五丸溫漿水入生油一兩點打勻下之溫米飲亦得不拘時候其蟲細小者皆化為水大者自下

補金散治諸般蟲

鶴蝨生　雷丸　定粉

錫灰各等分

右為末每服三錢空心食前少油調下又用豬肉一兩燒熟糝藥在上細嚼亦得每服藥時用雞翎甘草末一錢與前藥一處服之其蟲自下矣

雷金散治諸蟲

雷丸末八分　鬱金末七分　黑牽牛末一錢半

右三件末和勻以生油調下三兩匙飯壓之

化蟲散取寸白蟲

黃丹半兩炒　錫灰一兩　定粉二兩

右同研極細末每服一錢先燒豬肉五片吃了後以生油一口許調藥服至晚取下蟲人有胎不可服李副統女子梅花十三一服取蟲一抄終身不發

諸濕腫滿

沈香海金砂丸治一切聚積散脾濕腫服脚大者別有方

聚證

沈香二錢　海金砂　輕粉各一錢

牽牛頭末一兩

右為末研獨頭蒜如泥丸如桐子大每服五十丸煎燈草湯送下量虛實加減丸數取利為驗大便利止後服海金砂散治脾濕太過徧身腫滿不得臥及腹脹如鼓

牽牛半生半熟　白朮各一兩　甘遂半兩

海金砂三錢

右為末每服二錢煎銅流水一盞調下食前待宜利止後服已上二方傳太醫劉仲安傳用之累累獲效如神丸速故錄於此

穰隨子丸治通身腫滿喘悶不快

人參　木香　漢防己

赤茯苓麩　大槐榔　海金砂各五錢另研

穰隨子一兩　葶藶四兩炒

右為末聚肉丸如桐子大每服二十丸至三十丸煎桑白皮湯送下食前

聖靈丹治脾肺有濕喘滿腫盛小便赤澀

人參去蘆　木香　漢防己

茯苓麩煮食　槐榔　木通各二錢炒

苦葶藶半兩炒

右七味為末聚肉和丸桐子大每服三十丸煎桑白皮湯送下食前

赤茯苓丸治脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宜通小便赤澀

木香半兩　赤茯苓二兩一方一兩　防己二兩

苦葶藶四兩炒

右為末聚肉丸如桐子大每服三十丸煎桑白皮湯送下食前

人參葶藶丸治一切水腫及喘滿不可當者

人參一兩去蘆　苦葶藶四兩炒

右為末煮丸如桐子大每服三十丸煎桑白皮湯送下食前

海藻散治男子婦人遍身虛腫喘滿悶不快

海藻　大戟　錦紋大黃　續隨子（去殼各一兩）

右剉碎用好酒二盞淨碗內浮一宿取出晒乾後用白牽牛（頭末一兩生用）桂府滑石（半兩）甘遂（麵炒一兩）肉豆蔻（一箇）青皮（去白）陳皮（去白各半兩）

右共前藥一處為細末大人每服二錢氣實者三錢平明冷茶清調下至辰時取下水三二行腫減五七分隔二三日平明又一服腫消忌鹽魚肉百日○小兒腫服一錢五歲以下者半錢婦人有孕不可服

白丸子治遍身腫及脾腹脹滿喘悶不快小便赤澀神效

輕粉（半錢）　桂府滑石（研炒）　粉霜（研細炒各四錢）　硇砂（研炒）　白丁香（杵如未炒真者）　寒水石（火燒研細各三錢）

右先將輕粉滑石二味研勻用油紙裹了卻更和白麵作餅再裹合藥用桑柴火燒以熟為度取出與前四味一處研勻水浸蒸餅搗乾為丸如綠豆大第一日每服二丸煎生薑湯送下食前一日三服第二日三丸三服第三日四丸一服第四日五丸亦三服如覺小便多時腫漸減便休服白丸子如小便未多更服一日至兩服加作六丸做一服一日亦三服腫消為效如服藥至第三日覺牙縫內并痛口氣惡便用漱口藥

黃連（去鬚）　黃柏各等分

右為散每用一錢水一盞煎至七分入龍腦少許攪勻溫漱之每日煎一錢漱口如腫消忌鹽魚肉冷硬果食只吃粥百日永瘥如腫脹祕澀氣實人先服治腫海藻散此藥親用救人甚多神效

蠲濕丹治諸濕腫客搏腰膝重痛足脛浮腫

乳香（研）　沒藥（研各一兩）　牽牛頭末（半兩）

檳榔　蔵鹽仙　赤芍藥　澤瀉　荜茇　甘遂（各二兩）　大戟（炒三兩）　陳皮（去白四兩）

右為末糊丸如桐子大每服五十丸至七八十丸溫水送下食前得更衣止後服如服藥前後忌酒二日湯麵兩三日食後溫淡粥補胃尤佳

三花神祐丸治中滿腹脹喘嗽淋悶一切水濕腫滿濕熱腸垢沈積變生疾病久病不已黃瘦困倦血氣壅滯不宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛風痰咳嗽頭目旋運痰氣不已嗽痰積聚堅滿痞悶酒積食積一切痰欲嘔逆濕熱腹滿實痛並宜服之

輕粉（一錢）　大黃（一兩為末）　牽牛（二兩）　芫花（醋拌炒）　甘遂　大戟（各半兩）

右為末滴水丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水送下無時日三服加至快利後卻常服病去為度

十棗湯治太陽中風下痢嘔逆短氣不惡寒漐漐汗出發作有時頭痛心下痞硬引脇下痛兼下水腫腹脹并酒食積腸垢積滯痃癖堅積畜熱羸瘦氣久不已或表之正氣與邪熱并甚於裏熱極似陰反寒戰表氣入裏腸氣極深脈微而絕并風熱頻甚結於下焦大小便不通實熱腰痛

甘遂　芫花（醋炒紫色仲景與俗異作熱下凡言熬者同炒）　大戟（各等分）

右為末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢人實更加一錢量虛實加減

導藥木香丸治水氣遍身虛腫

人參　漢防己（各一兩）　苦葶藶（炒四兩）　木香　檳榔　木通

白茯苓（去皮蒸各一兩）

右為末棗肉和丸如桐子大每服三十丸溫水送下食前

木香通氣丸導滯寬腸塌腫進食

南木香　茴香（各一兩炒）　檳榔（二兩）　海金砂　破故紙（炒）　牽牛（半斤半生半熟）　陳皮（去白各[redacted]）

右為末清醋為丸如桐子大每服三十丸熱水送下食後

神祕湯治病人不得臥臥則喘水氣逆行上乘於肺肺得水而浮使氣不通流脉沈大

白茯苓（去皮）　木香（各半兩）　桑白皮　紫蘇葉　橘皮（炒）　人參（各七錢）

右㕮咀水三升入生薑七錢煎至一升半去粗分作五服食後

消痞丸治積濕熱毒甚者身體面目黃腫心脇股滿嘔吐不能飲食羸弱難以運動咽嗌不利肢體焦乾脾腸熱坐臥不寧心火有餘而妄行上為咳血衄血下為大小便血腸風痔漏三焦壅滯悶塞熱中消渴傳化失常小兒疳積熱

木香（各一分）　官桂　青黛　牽牛　黃連　黃芩（各一兩）　大黃　葛根　黃蘗　梔子　薄荷　藿香　茴香（炒）　厚朴（各半兩）

右為末滴水丸如桐子大每服二十丸溫水送下食前無禁

導滯丸治脾病橫流四肢腫滿

木香（半兩）　蓬莪茂（炮）　京三棱（炮）　檳榔（生）　郁李仁（湯泡去皮各一兩）　大腹皮（二兩）

右六味為末炒麥糵杵為粉煮糊丸如桐子大每服二十丸生薑湯送下無時

香蘇散治水氣虛腫小便赤澀

陳皮去白一兩　防己　木通

紫蘇葉各半兩

右四味爲末每服二錢水二盞生薑三片煎至一盞去粗溫服食前

五皮散治他病接後或久痢之後身體面目四肢浮腫小便不利脈虛而大此由脾肺虛弱不能運行諸氣諸氣不理散漫於皮膚肌腠之間故令腫滿也

大腹皮　生薑皮　赤茯苓皮

桑白皮　陳皮各等分

右㕮咀每服五錢水一盞煎至八分去粗溫服無時日二服此方異於局方載中藏經

牡蠣澤瀉散治脾胃氣虛不能制納腎水水溢下焦腰已下有腫也○金匱要略曰腰以下有腫當利小便

牡蠣煅　澤瀉　蜀漆洗去腥

葶藶炒　括蔞根　商陸根

海藻以上各等分

右七味異搗篩爲散更入臼中制之白飲和服方寸匕小便利止後服

內經云鹹味涌泄牡蠣澤瀉海藻之鹹以瀉水氣濕淫於內平以苦佐以酸辛以苦濟之蜀漆葶藶商陸括蔞之酸辛與苦以導腫利小便以散水

胃氣爲本

至元戊寅五月間霖注積雨不止魯齋許平仲先生時年五十有八面目肢體浮腫大便溏多腹脹腸鳴時痛飲食短少命予治之脈得弦細而緩先生曰年壯時多曾服牽牛大黃藥面目四肢時有浮腫今因陰雨故大發予曰營運之氣出自中焦中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣榮養臟腑經絡皮毛氣行而濕爲浮腫大便溏多而腹脹腸鳴皆濕氣勝也四時五臟皆以胃氣爲本五臟有胃氣則和平而身安若胃氣虛弱不能運動滋養五臟則五臟脈不和平本臟之氣盛者其脈獨見輕則病甚過則必死故經曰真臟之脈弦無胃氣則死先生之疾幸而未至於甚尚可調補人知服牽牛大黃爲一時之快不知其爲終身之害也遂用平胃散加白茯苓草豆蔻仁數服而腸脹溏瀉腸鳴時痛皆愈飲食進止有肢體浮腫以導滯通經湯主之良愈

導滯通經湯治脾濕有餘及氣不宣通面目手足浮腫

木香　白朮　桑白皮

陳皮各五錢　茯苓去皮一兩

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗溫服空心食前內經曰濕淫所勝平以甚熱以苦燥之以淡泄之陳皮苦溫理肺氣去氣滯故以爲主桑白皮甘寒去肺中水氣水腫腫脹利水道故以爲佐木香苦辛溫除肺中滯氣白朮苦甘溫能除濕和中以苦燥之白茯苓甘平能止渴除濕利小便以淡泄之故以爲使也

黃疸論

寸口脈浮而緩浮則爲風緩則爲痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行趺陽脈緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒食飲則爲滿尺脈浮爲傷腎趺陽脈緊爲傷脾風寒相搏食穀則眩穀氣不消胃中苦濕濕氣下流小便不通陰被其害熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸額上黑微汗出手足中熱薄暮即發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治則心下懊憹而熱不能食時時欲吐名曰酒疸○陽明病脈遲者食難用飽飽則發煩頭眩心煩小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也○夫病酒黃疸者必小便不利其候心中熱足下熱是其證也○酒黃疸者或無熱靜言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沈弦者先下之○酒疸心中熱欲嘔者吐之即愈○酒疸下之久久爲黑疸目青面黑心中如噉蒜韭狀大便正黑皮膚爪之不仁其脈浮弱雖黑微黃故知之○師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發時火劫其汗兩熱所得然黃皆從濕得之一身發熱面黃肚熱熱則在裏當下之○脈沈渴欲飲水小便不利者皆發黃也○腹脹滿而痠黃躁不得睡屬黃家○師曰黃疸之病當以十八日爲期治之十日以上宜瘥反劇爲難治○又曰疸而渴者其疸難治疸而不渴者其疸可治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒發熱也

茵陳蒿湯治穀疸爲病寒熱不食食頭眩心胸不安久久發黃

茵陳蒿六兩　大黃三兩　梔子十四箇擘

右三味㕮咀水一斗二升煮茵陳減一半內二味煮至三升去粗分溫三服小便利腦如皁莢色汁狀正赤宜宿腹減黃從小便去也

礬石礬石散治黃家曰師所發熱而反惡寒此女勞疸也得之膀胱急小腹滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑或時溏此女勞之爲病非水也腹滿者難治

礬石　礬石燒各等分

右二味爲末以大麥麪粥和服方寸匕日三服病隨大小便去大便正黑小便黃是其候

梔子大黃湯治酒黃疸心中懊憹或熱痛宜服此方主之

梔子十四箇擘　枳實五枚炙　大黃一兩　豆豉一升綿裹

右㕮咀以水六升煮取二升去粗分溫三服無時

茵陳五苓散治黃疸病一本茵陳湯及五苓散局方有

五苓散五分　茵陳蒿末十分

右和勻先食飲服方寸匕日三服

大黃礬石湯治黃病腹滿小便不利而赤自汗出此表和裏實當下之

大黃　黃蘗　硝石各四兩

桐子十四箇擣

右㕮咀水六升煮取二升去柤內硝石煮一升恒服之

黃連散治黃疸大小便澁濇壅熱累效

川大黃炸酢拌炒　黃連各二兩　甘草炙黃

黃芩各一兩

右四味爲末每服二錢食後溫水調下日三服

嚏鼻瓜蔕散治黃疸徧身如金色此方累輕效

瓜蔕十四箇　母丁香一箇　黍米四十九箇

右先將瓜蔕爲細末次入二味同碾羅爲末每於夜臥令病人先含水一口兩鼻孔內嚏入半字以下吐了水便睡至半夜或明日取下黃水旋用熟帛揩了直候取水定便服前黃連散病輕五日見效重者半月取效

食勞疸黃

膽礬丸治男子婦人食勞食氣面黃虛羸痃癖氣塊

膽礬無石者三錢　黃蠟二兩　南州肥棗五十箇

右以沙鍋或石罐內用頭醋三升先下膽礬共棗子慢火熬半日取出棗子去核次下蠟二兩再慢火熬一二時辰如膏入好蠟茶二兩同和爲丸桐子大每服二十丸茶清下日三服食後如久年腸風痔疾陳米飲下日三服一月見效

棗礬丸治食勞黃目黃身黃者

皂礬不以多少沙鍋子木炭燒通赤用米醋內煮之亦紅

右爲末棗肉丸如桐子大每服二三十丸食後生薑湯下

五疳丸治小兒疳瘦面黃眼澀羞明好吃泥土乳食不消化常服退黃化蟲

綠礬成塊者燒通赤取出一兩　蜜陀僧燒赤取四一兩

夜明沙燒通兩半

右爲末棗肉丸如麻子大每服五七丸溫米飲下量大

小加減日三服不計時

茯苓滲濕湯治黃疸寒熱嘔吐渴欲飲冷身體面目俱黃小便不利全不食不得臥

茵陳六分　白茯苓五分　木豬苓　澤瀉各三分　黃連　黃芩生　梔子　漢防已　白朮　蒼朮　陳皮　青皮各二分

右十二味㕮咀作一服水二盞煎至一盞去柤溫服空心食前

穀疸治驗

完顏正卿丙寅二月間因官事勞役飲食不節心火乘脾脾氣虛弱又以憂怒氣逆傷肝心下痞滿四肢困倦身體麻木次傳身目俱黃微見青色顏黑心神煩亂怔忡不安兀兀欲吐口生腥味飲食遲化時下完穀小便澁閉而亦黑辰巳間發熱日蒼則止至四月尤盛其子以危急求藥治之具說其事診其脈浮而緩金匱要略云寸口脈浮爲風緩爲痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行趺陽脈緊爲傷脾風寒相搏食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸宜茯苓梔子茵陳湯主之

茯苓梔子茵陳湯

茵陳葉一錢　茯苓去皮五分　梔子仁

蒼朮去皮炒　白朮各三錢　黃芩生六分

黃連去鬚　枳實麩炒　豬苓去皮

澤瀉　陳皮　漢防已各二分

青皮去白一分

右十三味㕮咀作一服用長流水三盞煎至一盞去柤溫服食前一服減半二服良愈

內經云熱淫于內治以鹹寒佐以苦甘又濕化于火熱反勝之治以苦寒以苦泄之以淡滲之以梔子茵陳苦寒能瀉濕熱而退其黃故以爲君難經云脾主心下滿以黃連枳實苦寒泄心下痞滿肺主氣今熱傷其氣故身體麻木以黃芩苦寒瀉火補氣故以爲臣二朮苦甘溫茵皮苦辛溫能除胃中濕熱泄其壅滯養其正氣漢防已苦寒能去十二經留濕澤瀉鹹平茯苓豬苓甘平導膀胱中濕熱利小便而去壅閉也

衛生寶鑑卷十四終

元龜天益謙甫著　三原李錫齡孟熙校刊

諸腰痛筋骨冷疼

木瓜虎骨丸治風寒濕合而成轉腳重不仁疼痛少力足下痿痛不能踏地腳膝筋攣下能屈伸及項背拘急手背無力耳內蟬鳴頭眩目運諸證腳氣行步艱難並皆服之

木瓜　麒麟竭研　虎脛骨酒炙

沒藥研　自然銅醋淬七次　楓香脂

敗龜醋炙去殼　骨碎補去毛　甜瓜子

當歸切焙　桂以上各一兩　乳香研牛

木香研　安息香重湯酒煮入藥　地龍去土各二兩

右為末入研藥和勻酒糊丸如桐子大每服三十丸溫酒送下臨木瓜湯送下亦得漸加至五十丸空心食前

客愁丸治寒濕筋骨冷疼不能舉動

川烏去皮失生　黑牽牛頭末　鹽豉各三錢

乳香研　沒藥研各一錢

右為末入研藥勻用肥葱一握洗去土淡醋一升不犯銅鐵於文武火熬葱醋一半漉去粗慢火再熬成膏滴水中不散為度將前藥末和丸如桐子大每服一十丸加至二十丸溫酒送下大便微利則愈

活血應痛丸治風濕為病血脈凝滯腰腿重疼身體麻木頭面虛腫下注腳膝重痛行履艱難

狗脊六兩半　蓽茇十兩　香附十二兩

陳皮九兩　沒藥一兩二錢　蕤靈仙三兩

草烏頭二兩半

右七味為末酒糊丸梧子大每服二三十丸溫酒或熟水任下不以時

左經丸治筋骨諸疾手足不遂不能行步運動但不脊鍼灸傷筋脈者四五丸必效此藥尤能通行榮衛導經絡

專治心腎肝三經服後小便少淋瀝乃其驗也

木鼈子去殼別研　白膠香研

當歸去土一兩　草烏頭生去皮臍三兩半　五靈脂各三兩半

斑猫五箇去頭足翅炒黃煮熟

右後四味為末與前二味和停用黑豆去皮生杵粉一斤醋煮為糊和藥丸如雞頭大每服一丸酒磨下

神應丸治一切腰痛

當歸　肉桂各十兩　蕤靈仙二十兩

右為末酒煮麵糊為丸梧子大每服十五丸溫酒下

烏靈丸久患風虛麻痛行步艱難正宜服之

川烏炮去皮一兩　五靈脂二兩

右為末酒糊丸如桐子大每服十丸加至五十丸空心溫酒送下忌一切冷物

勉效餅子治腰痛及腿膝累效

甘遂麵炒　蒴藋各一兩　黑牽牛研四兩半生半熟取末二兩半

右為末每服三錢夜臥病水和成餅慢火燒黃色取出氣實者作一服嚼碎後煎牛生半熟葱白酒送下氣虛人作兩服先喫一多半至明取動再嚼一少半亦用半生半熟葱白酒送下微取一行如婦人有胎不可服之

獨活寄生湯治腎氣虛弱冷臥濕地腰背拘倦筋骨攣痛或當風取涼風邪流入腳膝為偏枯冷痺腰弱疼痛或腰痛牽引腳重行步艱難

獨活　寄生　杜仲

牛膝　細辛　秦艽

桂心　茯苓　防風

川芎　人參　甘草各一兩半

當歸　熟地黃　芍藥各一兩

右㕮咀每服三錢水二盞生薑五片煎至一盞去柤稍熱服食前

獨活湯治因勞役得腰痛如折沈重如山

羌活　肉桂　大黃酒煨

防風　獨活　澤瀉各三錢

當歸　連翹各五錢　桃仁五十箇

甘草炙二錢　黃芪炙　防己各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半酒半盞煎至一盞去柤熱服食前立愈

薏苡仁湯療病者一身盡痛發熱所劇者此名風濕此病傷於肝汗出當風久傷取冷所致也

麻黃六錢去節　薏苡仁二錢　杏仁六箇麩炒去皮

甘草炙二錢

右㕮咀作一服水三盞半煎至二盞去柤分溫二服

防已黃芪湯療風濕脈浮身重汗出惡風

防已二錢　黃芪二錢半　甘草一錢炙

白朮　生薑各二錢半　大棗一箇擘

右㕮咀作一服水三盞煎至一盞半去柤溫分作二服

灸腰痛法

腎俞二穴在十四椎下兩傍各寸半陷中灸五壯主腰痛不可俛仰轉側難身寒熱食倍多身羸瘦面黃黑目眩眩又主丈夫婦人冷積氣勞病

中膂俞二穴在十一椎下兩傍各寸半灸五壯主腰痛不可俛仰交脊膂痛上下按之應手者從項後始至此穴痛皆灸之立愈也

腰俞一穴在二十一椎節下間陷中灸五壯主腰疼不能久立腰已下至足冷不仁起坐難腰脊痛不能立急強不得俛腰重如石難舉動也

張仲文傳神仙灸法療腰重痛不可轉側起坐難及脊膂腳筋攣急不可轉側用仲文曲脊兩支頭左右腳四處各三壯每灸一腳二火齊下支柱到肉初覺疼痛用二人兩邊齊吹至火滅午時著灸人定已來臟腑自動一

兩行或轉動如雷聲其疾立愈此法神效卒不可量也

疝氣痛及腰痛膝無力及控睪證（睪玄子云控引也睪睪丸也）

至異大要論云小腹控睪引腰脊上衝心唾出清水及爲噦噫甚則入心善悲善忘甲乙經曰邪在小腸也小腸病者小腹痛引腰脊貫肝肺其經虛不定則風冷乘間而入邪氣既入則厥之氣上衝肝肺客冷散於胸結於臍控引睪丸上而不下痛而入腹甚則衝心胸塞其經絡所屬所係也

控引睪丸治小腸病結上而不下痛引心腹

茴香炒　楝實剉炒　食茱萸

陳皮　馬蘭花各一兩醋炒　芫花五錢醋炒

右爲末醋糊丸如桐子大每服十丸至二十丸溫酒送下空心食服

陰疝足厥陰之脈環陰睪抵少腹或病腎虛寒水溢竭滿邪補肝宜以葵藜湯主之

葵藜湯治陰疝牽引小腹痛諸厥病即陰病也喜怒勞痛不可忍也

葵藜炒去芒　附子炮去皮臍　梔子去皮各等分

右爲末每服三錢水一盞半煎至七分去柤溫服食前

茴香楝實丸治陰疝痛不可忍及小腸氣痛

川楝實炒　茴香炒　山茱萸

食茱萸　吳茱萸　青皮去白

馬蘭花　芫花醋炒　陳皮去白各等分

右爲末醋糊丸如桐子大每服三十丸溫酒送下食前

丁香楝實丸治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆任厥所主陰經也乃腎肝受病治法同歸

當歸去蘆剉　附子炮去皮臍　川楝剉

茴香炒

右四味各一兩以好酒三升同煮酒盡焙乾爲細末每秤藥末一兩再入下項藥

丁香　木香各半錢　全蠍十三箇　玄胡索五錢

右四味同爲末與前項藥末拌和勻酒糊丸如桐子大每服三十丸至一百丸用酒送下空心食前凡疝氣帶下皆屬於風全蠍治風之聖藥茴香川楝皆入小腸經當歸玄胡活血止痛疝氣帶下皆積寒邪入於小腸之間故用附子佐之丁香木香爲引導也

沈香鹿茸丸大補益脾胃強壯筋骨辟除一切惡氣令人內實五臟外充肌膚補益陽氣和暢榮衛

沈香一兩另爲末　麝香一兩研　鹿茸一兩先用草火燒去毛爲末

右三味同研勻水糊丸如桐子大每服三十丸至五十丸暖酒送下空心食前

三白散治陰囊腫脹大小便不通

白牽牛二兩　桑白皮　白朮　木通去節　陳皮各半兩

右爲細末每服二錢薑湯調下空心服未覺再進

荊蘆巴丸治小腸疝氣偏墜陰囊腫小腹有物如卵上下去來痛不堪忍或結硬脹攻刺嘔吐悶亂

荊蘆巴一斤炒　吳茱萸十兩洗炒　川楝子炒一兩

巴戟去心炒　川烏頭炮去皮各六兩　茴香鹽炒去鹽十兩

右爲末糊丸梧子大每服十五丸空心溫酒下

川苦楝散治小腸氣痛

木香一兩爲末　茴香一兩鹽炒黃去鹽　川楝子一兩剉用巴豆十箇碎與川楝炒黃去巴豆

右爲末每服二錢溫酒一盞調下空心食前許學士云大抵此疾因虛得之不可以虛虛補經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實故必先瀉所著之熱然後補之是以諸方多備巴豆氣者蓋謂此也

疝氣治驗

癸丑歲率詔至六盤山上命治火兒赤經鄰久病疝氣復因七月間飢飽勞役過飲潼乳所發甚如初面色青黃不澤臍腹陣痛搐搦不可忍腰曲不能伸熱物熨之稍緩脈得細小而急予思難經云任之爲病男子內結七疝婦人帶下皆屬於風全蠍之劑即不能愈遂制此方沈香桂附丸治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不美氣不調和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴面色不澤手足厥冷便利無度又治下焦陽虛及療七疝痛引小腹不可忍腰屈不能伸喜熱熨稍緩

沈香　附子炮去皮臍　川烏炮去皮臍切作小塊　乾薑炮　良薑炒　茴香炒

官桂　吳茱萸各一兩湯浸去苦

右爲末醋糊丸如桐子大每服五十丸至七八十丸熱米飲湯送下溫酒吞下亦得空心食前日二服忌冷物

天台烏藥散治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥　木香　茴香炒　良薑炒　青皮去白各五錢　檳榔剉一兩　川楝十箇　巴豆十四箇微打破同川楝實用麩炒候麩焦色去麩不用只用川楝

右爲末每服一錢溫酒調下痛甚者炒生薑熱酒調下亦得服此二藥旬日良愈明秋王征班師遂達迎拜精神如故上大悅賜錢於此

陰毒傷寒

玉屑壯

川烏　細辛　良薑　乾薑　天仙子　牡蠣粉　肉桂　胡椒各等分

右爲末每服二錢溫酒一盞調下空心食前許學士云

迴陽丹治陰毒傷寒手足厥冷

川烏炮　牡蠣燒　不灰木燒　良薑炒　白芍藥各二錢　廣香少許

右爲末每用一錢男病女津唾調塗外腎上女病男津唾調塗乳上

手陽丹治除毒傷寒手足逆冷指甲青色體冷脈沈細而微神效

慈葱五枝搗如泥　陳蜂窩四五箇燒存性爲末

右和丸如彈子大手心內捏定用手帕緊紮定須臾汗出以絲被覆蓋如手心熱甚休解開如服藥時先服升麻湯五錢出子葱連鬚三枝生薑五片水二大盞煎至一盞去粗溫服以被覆之汗出而愈

王海藏已寒丸治沈寒痼冷臍腹冷疼迴陽返陰

附子炮　乾薑炮　茴香炒各一兩

良薑七錢　茯苓五錢　桂三錢

右爲末醋糊丸如桐子大每服三五十丸溫酒送下食前

白淫諸證

痿論云思想無窮所願不得意淫于外入房太甚宗筋弛縱發爲筋痿及爲白淫夫腎藏天一以慳爲事志意內治則精全而濇若思外淫於房室太甚則囫有淫泆不守隨溲溺而下也然本於筋痿者以宗筋弛縱也

內補鹿茸丸治勞傷思想陰陽氣虛益精止白淫

鹿茸酥炙　兎絲酒浸　蓯蓉炒　紫菀　白蒺藜炒　肉蓯蓉

官桂　附子炮　陽起石

蛇牀酒浸　桑螵蛸　黃芪各等分

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫酒送下食前

茯兎丸治小便白濁及夢泄遺精

兎絲子五兩　白茯苓三兩　石蓮子二兩

右爲細末酒糊丸如梧子大每服三十丸空心鹽湯下

金箔丸治下焦虛小便白淫夜多異夢遺泄

韭子炒　原蠶蛾　破故紙炒

牛膝酒浸　肉蓯蓉　山茱萸

龍骨　兎絲子　桑螵蛸各一兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫酒送下空心食前

珍珠粉丸治白淫夢泄遺精及滑出而不收

眞蛤粉一斤　黃檗一斤新丸上炒赤

右爲末滴水丸如桐子大每服一百丸空心溫酒送下出曰陽盛陰虛故精泄也黃檗降心火蛤粉鹹而補腎陰

補眞玉露丸治陽虛陰盛精脫淫樂腰痠

白茯苓去皮　白龍骨水飛　韭子酒浸

兎絲子酒浸各等分火日修合

右爲末酥糊丸如桐子大每服五十丸溫酒送下鹽湯亦得空心食前待少時以飯羹壓之

王瓜散治小便白利如泔色此腎虛也

王瓜根　桂心各一兩　白石脂

兎絲子酒浸　牡蠣鹽泥裹燒赤候冷去泥各二兩

右爲末每服二錢大麥煎粥湯調下一日三服食前

府判補藥方

兎絲子酒浸三錢　肉蓯蓉酒浸三錢　牛膝酒浸

巴戟去心酒浸　沒藥研各二錢　麻黃去節一錢半

穿山甲酥炙　鹿茸酥炙各二錢　乳香研

蠍稍研各一錢　甘草炙末五錢　遠草三錢

海馬酥炙兩對

右爲末煉蜜丸

衛生寶鑑卷十五終

元羅天益謙甫著　三原李錫齡孟熙校刊

泄痢門

泄痢論

論曰臟腑泄痢其證多種大抵從風濕熱論之是知寒少熱多寒則不能久也故曰暴泄非陰久泄非陽論云春宜緩形形緩動則肝木乃榮反靜密則是行秋令金能制木風氣內藏夏至則火盛而金去獨火木旺而脾土損矣輕則飧泄身熱脈洪數不能化重則下痢膿血稠粘裏急後重故曰諸泄稠粘皆屬於火經曰溲而便膿血知氣行而血止也宜大黃湯下之是爲重劑黃芩芍藥湯是爲輕劑是實則泄其子木能自虛而脾土實矣故經曰春傷於風夏爲飧泄此逆四時之氣人所自爲也有自太陰脾經受濕而爲水泄虛滑身重微滿不知穀味假令春宜益黃散補之夏宜泄之法云宜補宜泄宜和宜止和則芍藥湯止則調子湯久則防變而爲膿血是脾經傳受於腎謂之賊邪故難愈也若先利而後滑謂之微邪故易瘥也此皆脾土受濕天之所爲也雖聖智不能逃口食味鼻食氣從鼻而入留積於脾而爲水泄也有厥陰經動下痢不止其脈沈而遲手足厥逆膿血稠粘此爲難治宜麻黃湯小續命湯汗之法云謂有表邪縮於內當散表邪而自愈有裏下無聲身冷自汗小便溏利大便不禁氣難有息脈微嘔吐急以重藥溫之漿水散是也故法云後重者宜下腹痛者當和身重者除濕脈弦者去風膿血稠粘者以重藥竭之身冷自汗者以毒藥溫之風邪內縮者宜汗之則愈驚痫爲痢當溫之而已又云在外者發之在內者下之在上者吐之在下者竭之身表熱者內疏之小便濇者分利之又曰盛者和之去者逆之過者止之兵法有云避其來銳擊其惰歸泄之謂也（右出活法機要）

芍藥黃芩湯治泄痢腹痛後重身熱久不愈脈洪按者及

下痢膿血稠粘

黃芩　芍藥各一兩　甘草半兩

右㕮咀每服半兩水一盞半煎至一盞去柤溫服不拘時

大黃湯治瀉痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度

大黃一兩

右一味剉碎用好酒二大盞浸半日許煎至一盞半去柤將酒分作二服頓服之痢止勿服如未止再服取利爲度後服芍藥湯和之痢止再服白朮黃芩湯蓋徹其毒也

芍藥湯行血調氣經曰後而便膿血知氣行而血止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥一兩　當歸　黃連　黃芩各半兩　大黃三錢　桂二錢半　甘草炙　槟榔各二錢　木香一錢

右九味㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤溫服如痢不減漸加大黃食後○如便後臟毒加黃蘗半兩

白朮黃芩湯服前藥痢疾雖除更宜調和

白朮一兩　黃芩七錢　甘草三錢

右三味㕮咀作三服水一盞半煎至一盞溫服清漿水散治暴泄如水腸身汗自出一身盡冷脈微而弱氣少不能語甚者加吐此爲急病

牛夏二兩泡　附子炮　桂　乾薑炮　甘草炙各五錢　良薑二錢半

右六味爲末每服三五錢漿水二盞煎至一盞和柤熱服甚者三四服微者一二服太陽經傷動傳太陰下痢爲驚瀉大腸不能禁固卒然而下下成小油光色其中或有硬物欲起而又下欲了而不了小便多清此寒也宜溫之春夏宜桂枝湯秋冬宜白朮湯

桂枝湯

桂枝　白朮　芍藥各五錢　甘草炙二錢

右四味㕮咀每服五錢水一盞煎七分去柤溫服

白朮湯

白朮　芍藥各三錢　甘草炙二錢　乾薑五錢炮

右四味爲粗散如前煎甚者去乾薑加附子三錢謂辛能發散也

溢飲

水漬入胃名爲溢飲滑泄渴能飲水水下復泄泄而大渴此無藥證當灸大椎一穴一本作顱此第一椎下陷中手足三陽督脈之會灸五分留三呼泄五及灸以年爲壯

濡泄

內經云濕勝則濡泄甲乙經云寒氣客於下焦傳爲濡泄夫脾爲五臟之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣內客於脾故不能神助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水臨氣而下謂之濡泄法當除濕利小便也對金飲子

平胃散五錢　五苓散二錢半　草豆蔻麩裹煨五錢

右相合作四服水一盞半薑三片棗兩箇煎一盞去柤溫服食前上都方月間吏丞柤有此疾三服而愈

飧泄

內經云濟氣在下則生飧泄又曰久風入胃中則爲腸風飧泄夫脾胃土也其氣冲和以化爲事今濟氣下陷而不升則風邪久而干胃是木賊土也故冲和之氣不能化而令物完出謂之飧泄或飲食太過腸胃所傷亦致米穀不化此俗呼水穀利也法當下者舉之而消剋之也加減木香散

木香　長薑　人參去蘆　槟榔各二錢半　肉豆蔻　吳茱萸泡　乾薑炮　陳皮各半錢　升麻去蘆　神麯炒二錢　縮砂仁

右十一味爲粗末每服四錢水一盞半煎至一盞去柤溫服食前宜加白朮

病疾

內經曰脂血稠粘皆屬於火夫太陰主濕少陰主痢是先泄而亡津液火乾燥腎惡燥居下焦血分其受邪者故便膿血也然青白爲寒赤黃爲熱宜須兩審治熱以堅中丸豆蔻香連丸治寒以白膠香散或多熱少寒水煮木香膏滑類散宜止滑宜養臟湯病氣大退正氣未復當補脾且如濕痢止脾胃虛難任飲食不可一概用剋伐之劑若補養其脾胃氣足自然能飲食宜錢氏方中吳功散設或喜嗜飲食太過有傷脾胃而心腹痞滿嘔逆惡心則不拘此例當權用橘皮梗丸一服得快勿再服若飲食調節無傷則胃氣和平矣

堅中丸治脾胃受濕滑泄注下

黃連去鬚　黃蘗　赤茯苓去皮　澤瀉　白朮各一兩　陳皮　肉豆蔻　人參　白芍藥

右十一味爲末湯浸蒸餅丸如桐子大每服五七十丸溫米飲送下食前

純陽眞人養臟湯治下痢赤白

人參　當歸　白朮各六錢　官桂　甘草各八錢　肉豆蔻半兩　木香一兩六錢　訶子一兩二錢　白芍藥一兩六錢　罌粟殼三兩六錢

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分去柤食前溫服

水煮木香膏治脾胃受濕臟腑滑泄腹中疼痛日夜無度腸鳴水聲不思飲食每欲痢時裏急後重或下赤白或便膿血並皆治之

御米殼蜜水浸炒黃六兩　乳香研　肉荳蔻　縮砂各一兩半　當歸　白芍藥　木香　丁香　訶子皮　藿香　黃連去鬚　青皮去白各一兩　乾薑炮半兩　黃柏炙　厚朴薑製　陳皮各一兩　枳實麩炒半兩　甘草炙

右十七味爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸水一盞煎一枚擘開煎至七分和柤稍熱食前服

丁巳年八月從軍過鄧時值霖雨民多痢疾逢得白朮安胃散聖餅子於高仲寬處傳之可之多效故錄于此

白朮安胃散治一切瀉痢無問膿血相雜裏急後重窘痛日夜無度及治小腸氣痛婦人臍下虛冷并產後兒枕塊痛亦治產後虛弱寒熱不止者

御米殼三兩去頭蒂蜜拌炒　茯苓去皮　車前子　白朮各一兩　烏梅肉　五味子各半兩

右六味爲粗末每服五錢水二盞煎至一盞去柤空心溫服之

聖餅子治瀉痢赤白腸腹撮痛久不愈者

定粉　蜜陀僧　船上硫黃各三錢　黃丹二錢　輕粉少許

右五味爲末入白麵四錢七滴水丸如指頭大捻成餅陰乾食前溫漿水磨下大便黑色爲效

南白膠香散治脾胃虛寒滑瀉久瀉臍腹疼痛無休止

御米殼四兩蜜炒　龍骨　南白膠香各三兩　甘草七錢炙　乾薑半兩炮

右五味爲粗末每服五錢水一盞半煎至一盞去柤溫服之

服食前忌冷物傷胃

豆蔻煨腸丸治沈寒澼冷泄痢腹痛後重

附子炮去皮　赤石脂各一兩　船上硫黃　乾薑各半兩炮　肉豆蔻切炒

右六味爲末醋糊丸如桐子大每服三十丸米湯下食前忌生冷硬物及油膩物

玉粉散治冷極泄瀉久作滑腸不禁不思飲食宜服神效

紅豆揀淨　大附子炮去皮臍　乾薑炮各半兩　船上硫黃別研二錢半　右四味爲末入研藥勻每服二錢空心半稀半稠粟米飲下至晚又一服重者十服必效輕者三五服安

玉粉丹慈化虛中積止膿血痢撮痛裏急後重並皆治之

定粉半兩　粉霜三錢　延胡三錢　膩粉一錢　石燕子一箇半

右先杵石燕延胡爲末入乳鉢內共粉霜等一處研如粉霜清丸如豌豆大每服三丸至五丸溫米飲下食前隨臥不論老弱姙婦產人皆可服之酌飲下五丸或另丸一等麻子大量小兒大小夜臥溫米飲下五七丸漸服十丸忌油膩粘滯冷硬等物

桃花丸治腸胃虛弱冷氣乘之磨腹攪痛下痢亦白赤石脂　乾薑炮各等分

右爲末麵糊丸梧子大每服三十丸溫米飲下空心食前日三服一方治禁口痢驗棗一枚去心入好蜜一匙煨過食

玄青丸治下痢勢惡頻併窘痛或久不愈藥不止須吐下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液宜行者宜以逐之兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水氣腫腹脹兼治小兒驚痫積熱乳癖等證

牽牛頭末二兩　青葉一兩　黃連　黃柴　大黃　甘遂

芫花醋拌炒　大戟各半兩　輕粉二錢

右九味爲末研勻水丸小豆大初服十丸再服加十丸空心日午臨臥三服以快利爲度後常服十五丸數日後得食力痢病未痊者徐加再取利利後卻常服以意消息病去爲度後隨證止之小兒丸如黍米大退舊癖積熱不須下者常服十丸

阿膠梅連丸治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸證

阿膠淨草灰炒透明如研不細者再炒研細量　烏梅肉炒　黃連　黃柴炒　當歸炒　赤茯苓去皮　乾薑炮各等分

右八味爲末入阿膠末和勻水丸如桐子大每服十丸溫米飲送下食前

四時用藥例

溲而便膿血者小腸泄也脈以五至以上洪大者宜以七宣丸脈平和者立秋至春分宜香連丸春分至立秋宜芍藥柴皮丸四時皆宜加減平胃散如有七宣丸證候者亦宜服此藥去其餘邪兼平胃氣

芍藥柴皮丸

芍藥　黃柴各等分

右爲末醋糊丸如桐子大每服五七十丸溫米飲送下食前

加減平胃散經云四時皆以胃氣爲本久下血則脾胃虛損而血不流於四肢卻入於胃中而爲血痢宜服此藥

養脾胃

木香　檳榔各三錢　白朮　厚朴製　陳皮各一兩　甘草七錢　人參　黃連　白茯苓　阿膠炒　桃仁各半兩

右十一味爲末每服五錢水二盞生薑三片棗子一箇煎至一盞去柤溫服無時○血多加桃仁○氣不下後

重加檳榔木香廣多加阿膠○腹痛加官桂芍藥甘草○濕多加白朮○脹洪大加大黃○熱泄加黃連○小便澀加茯苓澤瀉

黃連阿膠丸治痢

阿膠碎炒一兩　黃連三兩　茯苓二兩

右各爲末以水調阿膠末爲丸梧子大每服三十丸溫水下食前服

訶黎勒丸治休息痢日夜無度腥臭不可近臍腹撮痛藥不效者

訶子去核半兩　母丁香三十箇　樗根白皮一兩

右爲末醋糊丸如桐子大每服五十丸陳米飲送下空心食前

鞠蒻丸治中風或中風濕厥痹滑瀉

附子　青蒻　白朮　神麯各等分

右四味爲末麵糊丸如桐子大每服三五十丸溫米飲送下此藥亦治飧泄甚妙素問云春傷於風夏必飧泄米穀不化蓋春木旺肝生風邪注於脾經夏飲冷當風故多飧泄也

陳麯丸磨積止瀉痢治腹中冷疼

陳麯一兩半　官桂　人參　乾薑　白朮　當歸　甘草炙　厚朴各半兩

右八味爲末煉蜜丸如桐子大每服三五十丸溫酒或淡醋湯任下食前日二服

麯朮丸治時暑暴瀉壯脾溫胃及治飲食所傷胸脇痞悶

神麯炒　蒼朮泔浸一宿炒各等分

右爲粗末麵糊丸梧子大每服三十丸溫米飲下不拘時

胸鳳湯治風冷虛氣入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹痛

虛滿腸鳴疼痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血

白朮　川芎　白芍藥　人參　當歸　官桂　茯苓各等分

右七味剉每服二錢水一餞粟米百粒同煎至七分熱服空心食前量小兒加減服之

當歸和血散治腸癖下血及濕毒下血

升麻　當歸身各一錢　槐花　青皮　熟地黃　白朮各六分　川芎　荊芥各四分

右八味爲末每服二錢清米飲調下空心食前

陰陽皆虛灸之所宜

至元己亥歲臺王千戶年四十有五領兵鎮漣水此地卑濕因勞役過度飲食失飾至秋深瘧痢併作月餘不愈飲食全減形容羸瘦乘馬輪以歸時已仲冬求予治之具陳其由診得脈弦細而微如蛛絲身體沈重手足寒逆時復麻痺皮膚痠疼如病風之狀無力以動心腹痞滿嘔逆不止此皆寒濕爲病久淹真氣衰弱形氣不足病氣亦不足陰陽皆不足也鍼經云陰陽皆虛鍼所不爲灸之所宜內經曰損者益之勞者溫之十劑云補可去弱先以理中湯加附子溫養脾胃散寒濕澀可去脫養藏湯加附子固腸胃止瀉痢仍灸諸穴以併除之經云府會太倉卽中脘也先灸五七壯以溫脾胃之氣進美飲食次灸氣海百壯生養元氣滋榮百脈充實肌肉傳灸■三里腎之合也三七壯引陽氣下交陰分亦助胃氣後灸陽輔二七壯接續陽氣令足脛溫暖散清濕之邪迨月餘病氣去漸平復今累經侍衛親軍都指揮使精神不減壯年

精陰便血治驗

眞定總官史侯男十哥年四十有二肢體本瘦弱於至元辛巳因收秋租個人致酒味酸不欲飲勉飲三兩盃少時腹痛次傳泄瀉無度日十餘行越十日便後見血紅紫之類腸鳴腹痛求醫治之曰諸見血皆以爲熱用芍藥槐皮丸治之不愈仍不欲食食則嘔酸形體愈瘦面色青黃不釋心下痞惡冷物口乾時有煩躁不得安臥請予治之具說其由診得脈弦細而微遲手足稍冷內經云精陰者便血一升再精二升三精三升經云邪在五臟則陰脈不和陰脈不和則血留之精陰之病陰氣內結不得外行無所稟溢入腸間故便血也宜以平胃地榆湯治之

平胃地榆湯

蒼朮一錢　升麻一錢　黑附子炮一錢　地榆七分　陳皮　厚朴　白朮　乾薑　白茯苓　葛根各半錢　甘草炙　益智仁　人參　當歸　麯炒

白芍藥各三分

右十六味件作一服水二餞生薑三片棗子二箇煎至一餞去柤溫服食前此藥溫中散寒除濕和胃服之數服病減大半仍灸中脘三七壯乃胃募穴引胃上升滋榮百脈次灸氣海百餘壯生發元氣灸則避食生肉又以進少丹服之則喜飲食添肌肉至春再灸三里二七壯壯脾溫胃生發元氣此穴乃胃之合穴也改服芳香之劑戒以愼言語節飲食良愈

葱熨法治驗（心在十三卷尾今寫在此）

眞定一秀士年三十有一肌體本弱左脇下有積氣不敢食冷物得寒則痛或嘔吐清水眩運欲倒目不敢開惡人煩冗靜臥一二日及服辛熱之劑則病退延至甲戌初秋因勞役及食冷物其病大作腹痛不止冷汗自出四肢厥冷口鼻氣亦冷面色青黃不澤全不得臥扶几而坐又兼咳嗽咽膈不利故內經云寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血凝不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成

積矣又寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也諸寒在內作痛得炙則痛立止予與藥服之藥不得入見藥則吐無如之何治之並以熱艾約半斤白紙一張鋪於腹上紙上攤艾令勻又以葱葱數枝批作兩半鋪於熱艾上數重再用白紙一張覆之以慢火熨斗熨之冷則易之若覺腹中熱腹皮暖不禁以絹三稍多縫帶繫之待冷時方解初熨時得暖則痛減大暖則痛止至夜得睡翌日再與對證藥服之良愈故錄此熨法以救將來之痛也

霍亂吐瀉

活人百問云問曰吐而利者何也此名霍亂也嘔吐而利熱多而渴者五苓散寒多不飲水者理中丸若夏月中暑霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷冷汗自出兩脚轉筋宜服香薷散并中沈冷頓服乃效

香薷散治陰陽不順清濁相干氣射中焦名為霍亂此皆因飲食或風冷傷於脾胃食結不消陰陽二氣壅而不反陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成吐利百脈混亂榮衛俱虛冷氣搏筋令轉皆宜服此

厚朴二兩　黃連二兩二味入生薑四兩拌炒令黃色　香薷一兩半

右三味為末每服三錢水一盞酒半盞同煎至七分去柤新汲水類挽令極冷頓服之藥冷則效速也

增損縮脾飲解熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂後服熱藥太多者尤宜服之

草果　烏梅　縮砂　甘草各四兩　乾薑二兩

右㕮咀每服五錢水一碗生薑十片煎至八分水淺令極冷旋旋服之無時

察古老人云霍亂轉筋吐利不止者其病在中焦也陰陽變而不和發為疼痛也此病最急不可食分毫藥飲穀氣入胃則死矣治有兩種渴欲飲水者陽氣多也五苓散主之不欲飲水者陰氣多也理中丸主之只待吐盡多時微以藥飲漸漸養之以遲為妙也

半夏湯治霍亂轉筋吐利不止

茯苓　白朮　甘草二錢半　淡味桂一錢半　半夏麴各十兩

右為末渴者涼水調下不渴者大溫水調下三錢無時

中暑霍亂吐利治驗

提學侍其公年七十九歲至元丙寅六月初四日中暑毒霍亂吐利昏冒終日不省人事時夜方半請予治之診其脉洪大而有力一息七八至頭熱如火足寒如冰半身不遂牙關緊急予思內經五亂篇中云清氣在陰濁氣在陽營氣順脉冒氣逆行亂於胸中是謂大惡云云亂於腸胃則為霍於是霍亂之名自此而生蓋因年高氣弱不任暑氣勝不能陰則瀉陰不能勝陽則吐陰陽不相維則既吐且瀉矣前賢見寒多以理中丸熱多以五苓散為定法治之今暑氣極盛陽明得時況因動而得之中暑明矣非甘辛大寒之劑則不能瀉其暑熱壓浮焰之火而安神明也遂以甘露散甘辛大寒瀉熱補氣加白茯苓以分陰陽約量一兩冰水調灌漸漸省事而諸證悉去後慎言語節飲食三日以參朮調中湯之劑增減服之理正氣過十日後方平復

內傷霍亂治驗

戊午春攻襄陽回住夏邑州界有蒙古百戶昔良海因食酒肉飲湩乳得霍亂吐瀉從朝至午精神昏憒以困急來求予視之脉得浮數按之無力所傷之物已出矣即以新汲水半碗調桂苓白朮散徐徐服之稍安又於牆陰撮地一穴約二尺許貯以新汲水在內攪動待一時澄定名曰地漿用清者一盞再調服之漸漸氣調吐利遂止至夜安眠翌日微燥渴卻以飲食消息之問曰病以月一日發當十五日愈投不差當月盡日解也如其不差當云何師曰坤為地地屬陰土平日靜順感至陰之氣又於牆陰貯以新汲水取重陰之氣也陰中之陰能滌腸中之腸今霍亂因暑熱內傷而得之故煒論云陰氣者靜則神藏躁則消亡又加以暑熱七神迷亂非至陰之氣則不愈予用之者此也或曰內經補方世之書豈不信然

桂苓白朮散治冒暑飲食所傷傳受濕熱內盛霍亂吐瀉轉筋急痛腹滿悶亂小兒吐瀉驚風宜服

茯苓去皮　白朮　桂各半兩　甘草　澤瀉　石膏各一兩　滑石二兩　寒水石一兩

右八味為末熱湯調下三錢喜冷新水調薑湯亦得小兒服一錢

桂苓甘露飲流濕潤燥治痰涎止嘔噦調脾寒熱喘咳服之令人徧身氣溢宜平及治水腫泄利

官桂　藿香　木香一分　茯苓　白朮　甘草　澤瀉　葛根　石膏　寒水石各一兩　滑石二兩　人參各半兩

右十二味為末每服二錢白湯調下新水或薑湯亦得宜明金元散又名天水散

滑石六兩　炙甘草一兩

右為末每服三錢蜜少許溫水調下日三服新水亦得

欽解肌發汗者煎葱白豆豉湯調無時

附錄聖惠治霍亂吐瀉

厚朴生薑汁炙

右為末新水調下二錢無時如神

疎病脉證并治

師曰病脉自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者可溫之弦緊者可發汗及鍼灸也浮大者可吐之弦數者風疾發也以飲食消息之問曰病以月一日發當十五日愈投不差當月盡日解也如其不差當云何師

曰此結爲痕瘕名曰瘧母愈宜治之可用鼈甲煎丸

鼈甲煎丸

鼈甲十二分炙　赤硝十二分　蜣蜋六分炙
鹿靥蒸　牡丹皮去心各五分　蜂窩炒四分
烏頭燒　黃芩　紫胡
乾薑炮　大黃各三分　芍藥五分
桂枝　厚朴炒　紫菀一作紫葳
阿膠炒各三分　桃仁去皮尖　瞿麥
鼠婦蒸　葶藶炒各二分　石葦去毛
半夏洗各一分　人參去蘆

右二十三味爲末先取蝦蟆下灰一斗清酒一斛五斗浸灰候酒淡一半著鼈甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁內餘藥煎爲丸如梧子大空心服七丸日三服干金用鼈甲十二片海藻三分大戟一分蝕蟲五分無鼠婦赤硝以鼈甲煎和爲丸

小柴胡去半夏加括蔞根湯治瘧疾發渴者外臺經心錄治兩瘧亦妙金匱方

柴胡入兩　人參　黃芩
甘草炙　生薑切各三兩　括蔞根四兩
大棗十二枚兩枚

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去柤再煎至三升温服一升日三服

柴胡桂薑湯三因方

柴胡入兩　桂枝去皮　黃芩各三兩
牡蠣熬　甘草炙　乾薑炮各二兩
括蔞根四兩

右以水一斗二升煎至六升去柤再煎至三升温服一升日三服初服微煩再服汗出愈

師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩滿手足熱而欲吐名曰瘧瘧若但熱不寒者邪氣內藏於心肺外舍於分肉之間令人肌肉消爍

温瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時時嘔逆以白虎加桂枝湯主之

白虎加桂枝湯

石膏一斤碎綿裹　知母六兩　桂枝三兩
甘草二兩　粳米六合

右㕮咀水一斗二升煮米取去柤煎三升温服一升日三服汗出而愈

瘧疾多寒者名曰牡瘧蜀漆散主之

蜀漆散

蜀漆洗去腥　雲母燒三日三夜　龍骨各等分一方雲母作雲實

右爲末發作前漿水半餞服一錢温瘧加蜀漆半分協發時服一錢已上

牡蠣湯治牡瘧

牡蠣熬　麻黃去節各四兩　蜀漆洗去腥

甘草炙各二兩

右㕮咀以水八升先煮麻黃蜀漆至六升去上床內諸藥煮取二升去柤温服一升壯則勿更服

一剪金治瘧疾寒熱乃瘧中聖藥

硫黃　信各等分

右同研末用絣紅絹子手捻藥一撮放於絹上裹如豆大上用細絲線緊纏繫數遍繫定用剪子剪下切須緊繫如不緊恐藥有失每服一丸星宿全時新汲水送下空心服無得人知如服藥先一日夜服至明正發日早去淨野處避不令人知廣宇亦得

鬼箭餅子治一切瘧疾

龍腦　麝香各半兩　硃砂一分
荷葉　綠豆粉　炙甘草各五兩
信炙二兩半　定粉半兩　金箔二十五片爲衣

右細末煉蜜丸每兩作二十丸捏作餅金箔爲衣每服一餅以新汲水磨化每日發者未發前服間日發者不發夜服隔數日發者一日夜服連日發者淩晨服

温脾散治瘧疾寒熱發歇多時不愈者

甘草炙半兩　綠豆一兩　紫河車一兩

砒一錢半另研

右先杵紫河車等爲末入砒和勻羅爲末每服半錢新汲水少許送下如是隔日發須好日夜深服如頻日發只夜深睡服忌葷腥瓜果酒麵魚肉生冷硬物三兩日如受邪氣深者只一服便定十歲以上服一字十歲以下至三五歲服半字婦人有胎不可服但請放心修合與人服切勿畏砒不敢用予用此藥三五十年救人甚多雖砒一味有綠豆等三味性涼解得新汲水亦解此藥並不壯人有人一種種實瘧疾每發時自吐食或涎不食服藥亦吐非藥力也假令金液丹用硫黃紫霜丸用巴豆杏仁有大毒大熱製了服之皆有效小兒亦可服恐不合此藥故論及此

常山飲子治瘧疾

知母　常山　草果各二兩
甘草　烏梅各三兩　良薑一兩三錢

右剉每服三錢水一餞生薑三片棗二枚煎至八分去柤無時温服

草果飲子治脾寒瘧疾

草果　川芎　紫蘇葉
白芷　良薑　炙甘草
青皮去白　陳皮去白

右等分爲粗末每服二錢水一餞煎至七分去柤温服

酒柤兩服例一服當發日進二服不以時

交加雙解飲子治瘧疾辟瘴氣神效

肉荳蔻　草荳蔻各二箇一箇生一箇用麩裹煨黃色去麩　厚朴二寸生一寸重製一寸　甘草二兩一半生用一半炙用

生薑（重大二塊生一塊 濕紙裹煨一塊）

右㕮咀分作二服水一椀沙石器內煎至一大盞去滓發日空心帶熱服未效再一服必效兩祖併爲一服煎

瘴瘧治驗

燕南河北道提刑按察司書吏高士謙年踰四十至元戊寅七月間暑氣未退因官事出外勞役又因過飲午後大發熱而渴冰水不能解其病早辰稍輕減服藥不效召予治之診其脈弦數金匱要略云瘧脈自弦弦數者多熱瘧論曰瘧瘧脈數素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於寒故但熱而不寒者邪氣內藏於裏而外舍於分肉之間令人消烁脫肉故名曰瘧瘧月令云孟秋行夏令民多瘧瘧潔古云動而得之名曰中暑以白虎加梔子湯治之士謙遠行勞役又暑氣有傷飲熱相搏午後時助故大熱而渴如在氣中先以柴胡飲子一兩下之後以白虎加梔子湯每服一兩數服而愈

征南副帥大武木兒已未率勅立惠州其地卑濕軍多病瘴痢予合辰砂丹白朮安胃散多瘥效

辰砂丹治瘧疾大有神效

珠砂（半入藥半爲衣）信砒　雄黃（各五錢）

右三味件爲末入白麵六錢同研勻滴水丸如桐子大珠砂爲衣每服一丸星宿全時用無根水送下忌濕麵熱物

元羅天益謙甫著　三原李錫齡孟熙校刊

腸風痔漏門

腸風痔漏論

腸風痔漏總論也分之則異若破者謂之痔漏大便祕澁必作大痛此由風熱兼食飽不遍氣逼大腸而作也故經曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔也受病者燥氣也爲病者胃熱也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是濕熱風燥四氣相合故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也大便燥結者主病兼受火邪熱也當去此四者其西方肺主諸氣其體收下亦助病爲邪須當以破氣藥兼之治法全矣不可作丸以劑湯與之效如神速

秦艽苦朮湯

秦艽（一錢去苗）　澤瀉（二分）　當歸尾（三分酒浸）

苦朮（七分）　防風（半錢）　大黃（少許雖大便不可多加）

槟榔（一分爲末）　桃仁（湯浸去皮一錢研）　皁角仁（燒存性去皮）

黃蘗（去皮四分酒洗若大腸頭沈重濕勝也以意加之天氣或大熱亦以意加之或病躁熱喜寒亦加之）

右十味㕮咀和勻都作一服水五盞煎至一盞二分去祖入桃仁槟榔皁角仁再上火煎至一盞去祖空心溫服待少時以美饍壓之不犯胃也服口忌生冷硬物酒麵菜大料物之類犯之其藥無效如有白膿加白葵花五朵去心萼粗剪青皮半錢不去白入正藥中同煎又入木香末半錢同皁角等末同入依上法服若病大者再服而愈

乳香丸治諸痔下血肛邊生肉或結核腫疼或生瘡痒痛或大便艱難肚腸脫出又治腸風下血無問新久及諸瘻根在臟腑悉能治之

枳殼（去穰麩炒）　牡蠣（火煅）　蘿蔔子

大黃（蒸焙）　鶴蝨（炒）

兩　乳香研　白丁香研各一分

右爲末粟米糊丸如梧桐子大每服十丸至十五丸如治腸風臘茶清下諸痔煎薤白湯下諸瘻煎鐵屑湯下並食前服

神應黑玉膏治丈夫婦人久新腸風痔漏大腸頭疼不可忍服此藥不過三四次便效初得此疾發痒或疼戰道周迴多生硬核此是痔被卽成漏只下血腸風皆因酒色風氣食五辛過度卽成此疾人多以外科塗治不知病在腸自有藥若不去根本此病不除此藥的有神效

豬懸蹄二十兩　刺蝟皮一兩一錢　牛角腮剉炒一兩二錢　槐角各六錢　敗棕八錢　亂髮洗淨燒　脂麻各四錢　苦楝根五錢　雷丸

右九味剉碎用瓷罐內燒存性細末入乳香二兩麝香八錢研令勻酒麵糊丸如桐子大每服八丸先嚼胡桃一箇以溫酒吞下早晚腹空時日二服甚者三服切忌別藥不過三日除根

釣腸丸治久新諸痔肛邊虛痛或生瘡痒時有膿血又治腸風下血及肛門脫出並宜服之

亂髮洗淨燒存性　蝟皮兩箇剉碎燒存性　雞冠花剉微炒存性一十五兩　白礬微枯　胡桃取仁一十五兩入鹽內燒存性　綠礬枯　枳殼去穰麩炒　附子去皮臍生用　白附子生用　訶子煨去核　半夏　天南星各二兩

右爲細末以醋煮麵糊爲丸如梧桐子大每服二十丸空心臨臥溫酒下連年不差者服十日見效久服永除根本小可腸風等疾一二年內者只十服瘥永不發動

淋漓藥治腸風痔漏經久不瘥瘡口膿汁不絕及瘡內有蟲痒痛不止宜此淋洗之

商陸麩炒　蔵靈仙去土　荆芥穗去土　乳香各一兩　鳳眼草二兩　細辛去苗二錢半

右六味爲粗末每用三兩水一大碗煎至一升去粗稍熱洗患處冷再溫熱更洗一徧不用洗罷用軟帛拭乾上藥如瘡破後不須上藥只淋洗之

淋漓地榆散治肛門痒痛或腫

地榆　蒴藋　苦參　荆芥　蛇牀子各等分

右爲粗末每用一匙水一碗煎二三沸去粗避風處通手熱洗患處

淋漓雞冠散治五痔肛邊腫痛或竄乳或瘰穴或作瘡久而不愈變成漏瘡

雞冠花　鳳眼草各一兩

右爲粗末每用粗末半兩水碗半煎三五沸熱洗患處結陰丹治腸風臘毒下血諸大便血疾已下三方傳之於諸醫驗學捉摩忽吉角用之甚效

枳殼麩炒　黃芪　蔵靈仙　陳皮去白　何首烏　荆芥穗　椿根白皮各等分

右七味爲末酒糊丸如桐子大每服五十丸至七十丸陳米飲入鹽少許煎一二沸放溫送下平明服之空腹服之亦妙

淋漓蔵靈仙散治痔漏大腸頭痒痛或腫滿

枳殼麩炒　蔵靈仙等分

右粗末每用一兩水一碗半煎至一碗去粗蘸洗冷再暖避風洗三次軟帛拭乾敷蒲黃散

蒲黃散治下部痔瘡

蒲黃一兩　血竭半兩

右爲細末每用少許點患處

椿皮散等治血痢及腸風下血神驗此方李舜卿教授傳累用有效

椿白皮三兩　槐角子兩兩　明白礬二兩　甘草一兩半

右爲末每服三錢熱米飲調下

大便門

缺陽脈浮而澀浮則胃氣盛澀則小便數浮澀相搏大便則難以脾約麻仁丸主之

脾約麻仁丸

芍藥半斤　枳實半斤　麻子仁二升　大黃一斤去皮　厚朴一斤去皮　杏仁一百去皮尖熬

右六味爲末煉蜜爲丸桐子大每服十丸日二服漸加以利爲度

潤腸丸治脾胃中伏火大便澀或乾燥不通全不思食此乃風結秘血結秘皆令閉塞而不通也風以潤之血以和之和血疏風自然通矣

桃仁湯浸去皮尖　羌活　大黃煨　當歸各半兩　麻子仁半升

右以桃仁麻仁研如泥入羅末藥勻煉蜜丸如桐子大每服五十丸至百丸空心白湯送下以通爲度○如不通而澀其榮盛者急加酒洗大黃以利之○如血澀而大便燥者加桃仁酒洗大黃○如風結燥大便不行者加麻仁大黃○如風澀大便不行者加皂角仁大黃秦艽以利之○如脈澀燒身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃以除氣澀

當歸潤燥湯

升麻　生地黃各二錢　麻子仁研如泥　當歸　熟地黃　生甘草　桃仁泥研　大黃煨各一錢　紅花五分

右㕮咀入研藥都作一服水二盞煎一盞去柤空心宿食消盡稍熱服之

犀角丸治三焦邪熱一切風氣又治風盛痰實頭目昏重肢體拘急腸胃燥澀大小便難

犀角鎊末　黃連各一兩　人參二兩

大黃八兩　黑牽牛十二兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服十五丸至二十丸臨臥溫水下量虛實加減

七宜丸療風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛在腹中及積年脚疼痛冷如冰石脚氣衝心煩懣頭旋暗倒胷背重心腹脹滿胸脇痞塞及風毒遍頭面腫大便或祕小便時澀脾胃虛弱不食脚轉筋攣急掣痛心神恍惚眠寐不安

桃仁去皮尖炒六兩　柴胡去苗　訶子皮

枳實麩炒　木香各五兩　甘草炙四兩

大黃麩裹煨十五兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服二十丸米飲下食前臨臥各一服以利爲度覺病勢退服五補丸此藥不問男女老幼皆可服量虛實加減丸數

七聖丸治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重涕唾稠粘心煩面熱咽乾口燥胷背拘急心腹脇肋脹滿腰脚重疼大便祕小便赤澀臥不安又治大腸疼痛不可忍

肉桂去皮　川芎　大黃酒蒸

檳榔　木香各半兩　羌活

郁李仁去皮各一兩

右七味爲末煉蜜丸如桐子大每服十五丸溫水送下食後山嵐瘴地最宜服虛實加減之

潤腸搗杏丸此二味降氣潤腸服之大腸自無澀滯久服不損胃氣

杏仁去皮尖麸炒　橘皮等分

右爲末煉蜜丸桐子大每服五十丸空心溫水下

麻仁丸順三焦和五臟潤腸胃除風氣治冷熱壅結津液耗少令人大便祕難或閉塞不通若年高氣弱及有風人大便祕澀尤宜服之

枳殼去穰麸炒　白檳榔煨半生　兔絲子酒浸別末

山藥　防風去叉枝　山茱萸

肉桂去粗皮　車前子各一兩半　木香

羌活各一兩　郁李仁去皮另研　大黃半生半炒

麻仁別搗研各四兩

右爲細末入別研藥勻煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸溫水臨臥服之

神功丸治三焦氣壅心腹痞悶大腸風熱大便不通腰脚疼痛胷背重疼頭昏面熱口苦舌乾心胸煩燥睡臥不安及治脚氣并察有風人大便結燥

火麻仁別研如膏　人參各二兩

大黃蒸煨各四兩　訶黎勒皮

右爲細末入麻仁搗研勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸溫水下食後臨臥如大便不通可倍丸數以利爲度

論曰凡臟腑之祕不可一槩治之有虛祕有實祕胷實而祕者能食而小便赤當以麻仁丸七宜丸之類主之胷虛而祕者不能食而小便清利宜以厚朴湯主之

厚朴湯

白朮五兩　厚朴薑製　陳皮去白

甘草炙各三兩　枳實麩炒　半夏麴各二兩

右爲粗末每服三錢水一盞半薑三片棗二箇煎至八分去粗大溫服食前　夫胷實者祕物也胷氣虛者祕氣也

蜜導煎陽明病自汗出若發汗小便自利此爲津液內竭雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜導煎而通之及土瓜根與豬膽汁皆可爲導

蜜四兩

右一味熬欲凝丸如指大長二寸頭銳內穀道中欲大便時去之

半硫丸除積冷暖元藏溫脾胃進飲食治心腹一切痃癖冷氣及年高風祕冷祕或泄瀉等並皆治之

半夏湯洗七次焙乾爲細末　硫黃明淨好者研令極細用柳木槌子敲

右等分以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入臼內杵數百下丸如梧桐子大每服空心溫酒或生薑湯下十五丸至二十丸婦人醋湯下

胞痺門治小便不利并腑附

痺論云胞痺者小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便上爲清涕夫膀胱者爲州都之官津液藏焉氣化則能出矣今風寒濕邪氣客於胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通其證小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便以足太陽經其直行者上交巔入絡腦下灌鼻竅則清涕也

茯苓丸治胞痺膀腹痛小便不行

防風去蘆　細辛去苗　赤茯苓去皮

白朮　附子　澤瀉

官桂各半兩　紫菀　括蔞根

牛膝酒浸　黃芪　芍藥

甘草炙各七錢五分　山藥　生地黃

半夏湯泡　獨活　山茱萸各二錢五分

右十八味爲末煉蜜丸如桐子大每服十丸溫酒送下食前

巴戟丸治胞痺膀腹痛小便不利

巴戟一兩半去心　遠志去心三錢　桑螵蛸麸炒黑

山藥　附子炮去皮臍　生地黃

續斷　杜仲炙各一兩　兔絲子酒浸

石斛　鹿茸酥炙　五味子

龍骨　官桂　山茱萸各七錢半

肉蓯蓉酒浸一兩

右十六味爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫酒送下空心食前服之

腎瀝湯治胞癃小腹急小便不利

杜仲（炙去絲） 桑螵蛸（炒） 犀角屑

木通 五加皮 麥冬（去心）

桔梗（各一兩） 赤芍藥（五錢）

右八味爲粗末每服五錢水一盞半羊腎一箇切竹瀝少許同煎溫服

八正散治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引飲心煩面熱頰赤不寧目赤睛疼腎焦脣翹口舌生瘡咽喉腫痛及治小便赤澀或癃閉不通及熱淋血淋並宜服之

瞿麥 萹蓄 車前子

滑石 山梔子仁 甘草（炙）

木通 大黃（剉碎焙乾切焙各一斤）

右爲散每服二錢水一盞入燈心煎至七分去柤溫服食後臨卧小兒量力少少與之

石葦散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宜出少起數臍腹急痛醫作有時勞倦即發或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

芍藥 白朮 滑石

葵子 瞿麥（各二兩） 石葦（去毛）

木通（各二兩） 當歸（去蘆） 甘草（炙）

王不留行（各一兩）

右爲細末每服二錢煎小麥湯調下食前日二三服

白花散治膀胱有熱小便不通（申顯卿傳）

朴硝（不以多少）

右爲末每服二錢用茴香湯調下食前

良法治小便不通諸藥不效或轉胞至死危困此法用之小便自出而愈用豬尿胞一箇底頭出一小眼子倒箇通過放在眼兒內根底以細線繫定鋼筒子口細杖子覷定上用黃蠟封尿胞口吹滿氣七分繫定了再用手捻定鋼筒根頭放了黃蠟基其鋼筒放在小便出裏頭放開鋼筒根頭手捻其氣透於裏小便即出大有神效

黃芩清肺湯治因肺燥而得之小便不通

黃芩（二錢） 梔子（兩箇擘破）

右作一服水一盞半煎至七分去柤溫服食後不利加鹽豉二十粒

滋陰化氣湯治因服熱藥過多小便不利或臍下悶痛不可忍服諸藥不效者加知母

黃連（炒） 黃檗（炒） 甘草（炙各等分）

右㕮咀每服三錢水二盞煎至一盞去柤溫服食前

論曰問此如何得利答曰無陽者陰無以生無陰者陽無以化又云膀胱者津液之府氣化則能出爲因服熱藥過度乃亡陰也此藥助陰使氣得化故小便得以通也或以滋腎丸服之其效更速

紅秫散治小便不通上喘（張文叔傳大妙）

扁蓄（一兩半） 燈草（一百根） 紅秫黍根（二兩）

右㕮咀每服五錢用河水二錢煎至七分去柤熱服空心食前

立效散治下焦結熱小便黃赤淋閉疼痛或有血出及大小便俱出血者亦宜服之

甘草（炙三錢） 山梔子（去皮炒半兩） 瞿麥穗（一兩）

右爲末每服五錢至七錢水一碗入連鬚葱根七箇煎至五十莖生薑五七片同煎至七分時時溫服不拘時候

海金砂散治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施化或五種淋疾癃閉不通

木通 海金砂（研） 滑石

通草 瞿麥穗（各半兩） 杏仁（去皮尖麸一兩）

右六味爲末每服五錢水一盞半燈草二十莖煎至七分去柤溫服食前

琥珀散治五種淋瀝疼痛小便有膿血出

琥珀（研一兩） 沒藥（研一兩） 海金砂（研一兩）

蒲黃（研一兩）

右四味爲末每服三錢食前用淡竹葉煎湯調下日進二服

葵花散治小便淋瀝經驗

葵花根（洗淨一撮）

右剉碎用水煎五七沸服

灸法治小便淋瀝不通用食鹽不以多少炒熱放溫填臍中御以艾灸七壯小便自出艾炷如餛飩大

淋癃治驗

參苓琥珀湯中統三年六月中黃明之小便淋莖中痛不可忍相引脇下痛制此服之大效

人參（五分） 茯苓（去皮四分） 川楝子（去核剉炒一錢）

琥珀（三分） 生甘草（一錢） 玄胡索（七分）

澤瀉 柴胡 當歸梢（各三分）

右九味㕮咀都作一服用長流水三盞煎至一盞去柤溫服空心食前

水芝丸治下焦真氣虛弱小便頻多日夜無度此方得之於高麗國王

蓮實（去皮不以多少先以好酒浸一二宿用豬肚一箇御將酒浸蓮實入在內用水煮熟取出將蓮實切開於火上焙乾搗用）

右爲末醋糊丸如雞頭大每服五十丸溫酒送下空心食前

小便數而欠

中書右丞合剌合孫病小便數而欠日夜約去二十餘行臍腹脹滿脹痛沉重不得安臥至元癸未季春下旬予奉聖旨治之遂往診視服得沈鍼時時帶數嘗記小便不利者有三不可一緊而論也若津液偏滲於腸胃大便泄瀉而小便澀少一也宜分利而已若熱搏下焦津液則熱盛

而不行二也必滲泄則愈若脾胃氣澀不能通利水道下輸膀胱而化者三也可順氣令施化而出也今右丞平素膏粱熏熱內蓄不得施化膀胱窒澀是以起數而見少也非滲泄分利則不能快利遂處一方名曰茯苓琥珀湯內經曰甘緩而淡滲熱搏津液內蓄臍腹脹當須緩之泄之必以甘淡為主是用茯苓為君滑石甘寒滑以利竅稍苓琥珀之淡以滲泄而利水道故用三味為臣脾惡濕氣內蓄則脾氣不治益脾勝濕必用甘為助故以甘草白朮為佐鹹入腎鹹味下泄為陰澤瀉之鹹以瀉伏水腎惡燥急食辛以潤之津液不行以辛散之桂枝味辛散濕燥此為因用故以二物為使煎用長流甘瀾水使不助其腎氣大作湯劑令直達於下而急速也兩服減半旬日良愈

茯苓琥珀湯

茯苓去皮　琥珀　白朮各半兩

澤瀉一兩　滑石七錢　木豬苓半兩去皮

甘草炙　桂去皮各三錢

右八味為末每服五錢用長流甘瀾水煎一盞調下空心食前待少時以美饌壓之

衛生寶鑑卷十七終

元羅天益謙甫著　三原李錫齡孟照

婦人門

調經順氣

加減四物湯治產前產後腹痛及月事不調或亡血去多或至露不下婦人一切疾證

當歸　白芍　熟地黃

川芎各二兩

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分去柤帶熱服無時日進二服三服平常產乳服至三盞如虛弱者至一月且○妊娠下血加阿膠末一錢艾葉五七片○因虛致血熱熱與血搏口乾欲飲水加麥門冬三分括蔞根一兩○血崩加地黃蒲黃各一兩○惡露不下腹中刺痛加當歸白芍藥各一分○因熱生風加川芎一分柴胡半兩○身熱脈躁頭昏項強加柴胡黃芩各半兩○祕澀加大黃半兩炒桃仁一分○滑泄加附子官桂各一分○嘔吐加人參白朮各半兩○發寒熱加乾薑芍藥牡丹皮各一分○腹脹加厚朴枳實各一分○虛煩不得眠加人參竹葉各一分○煩躁大渴加知母石膏各半兩○水停心下吐逆加豬苓茯苓防己各二分○寒熱類傷寒加人參柴胡防風各三分○婦人血積加三稜蓬朮桂乾漆炒共等分

逍遙散治血虛發熱經候不調

甘草炙半兩　當歸　白茯苓

白朮　柴胡　白芍藥各一兩

右㕮每服二錢水一大盞燒生薑一塊切破薄荷少許同煎至七分去柤熱服不拘時候

溫經湯治衝任虛損月候不調

阿膠炒　當歸　川芎

人參　肉桂　甘草

芍藥　牡丹皮各二兩　牛膝二兩半

麥門冬五兩半　吳茱萸三兩

右㕮每服五錢水一盞半生薑三片煎至八分熱服空心食前

黃芪白朮湯治婦人四肢沈重自汗上至頭際頸項而還惡風躁熱

黃芪一兩　人參　白朮各半兩

黃柏酒製　羌活　甘草各二錢炙

柴胡　升麻各一錢　當歸半

川芎　吳茱萸各五分　細辛三分

五味子三錢

右十三味㕮咀每服五錢水二盞生薑五片煎至一盞去柤稍熱服食前汗出不止加黃蘗半錢腹中不快加炙甘草一錢

異方油煎散治婦人血風勞氣攻脏四肢煩背疼痛嘔吐惡心不思飲食日漸瘦弱面色痿黃手腳麻痺血海冷敗

川烏頭炮去皮　白芍藥　五加皮

牡丹皮　海桐皮各半分

右五味為末每服二錢水一盞油浸鬱遍錢一文煎至六分去柤溫服日三服不拘時○如常服用油浸五七文錢煎藥用

活血丹治衝任不足下焦大寒腰疼痛月事不勻或來多不斷或過期不來或崩中出血或帶下不止面色痿黃肌肉瘦瘁肢體沈重胸脇脹滿氣力衰乏飲食減少一切血氣虛寒並宜服之

桃仁去皮尖麸炒微黃色　虎杖　吳茱萸湯浸七徧焙乾微炒

當歸　杜仲去粗皮剉炒　柏子仁炒

附子炮去皮　木香　山茱萸去核

延胡索　安息香各二十兩搗碎入好酒研化去柤銀器內慢火熬成膏

乾薑炮　肉桂去粗皮　牡丹皮

黃芪去蘆　艾葉微炒　澤蘭葉各二斤半

肉蓯蓉酒浸焙　厚朴去粗皮薑汁炙令熟各五斤

右爲細末以前安息香膏入白麵同煮作糊和丸如梧桐子大每服三十丸食前以溫酒下醋湯亦得

治血湯治婦人血熱氣虛經候澀滯不通致使血聚肢體麻木肌熱生瘡渾身拘倦將成勞瘵不可妄服他藥但宜以此滋養通利又治證與前治血丹同可互服之

馬鞭草　荆芥穗各四兩　牡丹皮一兩

赤芍藥　枳殼去穰麩炒　肉桂去粗皮

當歸去苗炒　川芎各二兩

右爲粗散每服四錢烏梅一箇水二盞煎一盞去粗食前空心日四五服有此證服至半月或一月經脈自通百病皆除神效

增損四物湯治婦人血積

當歸　川芎　熟地黃

芍藥　廣茂　桂去粗皮

三棱　乾漆炒

右八味各等分爲粗末每服二錢水二盞煎至一盞食前稍熱服

當歸丸治婦人經血不調血積證

當歸　川芎　赤芍藥

廣茂　熟地黃　京三棱各半兩

神麯　百草霜各二錢半

右八味爲末酒糊丸如桐子大每服三十丸用溫水送下食前溫酒亦得

立胡苦楝湯治腸下冷撮痛陰內大寒

甘草炙五分　肉桂　附子炮各三分

立胡　苦楝子各二分　熟地黃一錢

右㕮咀入黃蘗二分爲引用都作一服水二盞煎至一

艌去粗稍熱服空心食前

師尼寡婦異乎妻妾之治

昔宋褚澄療師尼寡婦別製方者蓋有謂也此二種寡居獨陰無陽愁心苦而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧久則爲勞當讀史記倉公傳載濟北王侍人韓女病腰背痛寒熱衆醫皆爲寒熱病治之不瘥倉公曰此病得之欲男子不可得也衆曰何以知欲男子不可得倉公曰診其脈肝脈弦出寸故是以知之蓋男子以精爲主婦人以血爲主男子精盛以愛室婦人血盛以懷胎夫肝攝血者也是脈陰肝脈弦出寸口上魚際則陰盛可知矣故知褚澄之言信有謂矣

通經丸治婦人室女月水不調疼痛或成血瘕

桂心　川烏頭　桃仁

當歸　廣茂炮　乾薑炮

川椒炒去目　大黃煨　青皮去白各等分

右九味爲末每一兩用酒錢以米醋熬成膏和餘藥六錢入臼中杵千下可丸則丸如桐子大每服二十丸淡醋湯送下加至三十丸溫酒亦得一婦人血氣凝疼痛數服便效

生地黃丸許學士治一尼患風發倦乍寒乍熱面赤心怔忪或時自汗是時疫氣大行醫見其寒熱作傷寒治之用大小柴胡湯雜進數日病急召予治之診視之曰三部無寒邪脈但厥陰弦長而上魚際宜服抑陰等藥治之故予製此方

生地黃二兩　柴胡　秦艽

黃芩各半兩　芍藥一兩

右爲細末蜜丸如桐子大每服三十丸用烏梅湯吞下日三服不拘時

熟地黃丸治婦人月經不調每行數日不止兼有白帶漸漸羸瘁飲食少味累年無子

熟地黃二兩二分　山茱萸　白薇

乾薑炮　代赭石醋淬　白芍藥炒各一兩

厚朴製　白殭蠶炒各半兩

右八味爲末煉蜜丸如梧子大每服四五十丸酒下食前日三服

熱入血室證治升方

許學士治一婦人病傷寒寒熱遇夜則如見鬼狀經志六七日忽然昏塞涎嚕如引鋸牙關緊急瞑目不知人病勢危困召予視之曰得病之初甘值月經來否其家云經水方來病作而經遂止得一二日發寒熱晝雖靜而夜有鬼祟從昨日來不省人事予曰此乃熱入血室證仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則明了暮則譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血室予製以小柴胡湯加生地黃三服而熱除不汗而自解矣又一婦人患熱入血室證醫者不識用補血調氣血藥治之數日遂成血結胸戚勸用前藥予曰小柴胡用已遲不可行也無已則有一方可刺期門矣予不能鍼請善鍼者治之如言而愈或問熱入血室何爲而成結胸也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行遇經水適來適斷邪氣乘虛入於血室血爲邪所迫入於肝經肝受邪則譫語而見鬼復入膻中則血結於胸中何以言之婦人平居水養木血養肝方未受孕則下行之爲月水既姙則中蓄之以養胎及已產則上壅之以爲乳汁皆血也今邪逆血併歸於肝經聚於膻中結於乳下故手觸之則痛非藥可及故當刺期門也

小柴胡加地黃湯治產後惡露方來忽然斷絕活人書海蛤散亦治鍼干後

柴胡一兩二錢半　人參　牛膝

黃芩　甘草炙　生地黃各七錢

右六味㕮咀每服五錢水二盞生薑五片棗子一箇煎至一盞去粗溫服不拘時

海蛤散治婦人傷寒血結胸膈揉之痛手不可近

海蛤　滑石　甘草各一兩　芒硝半兩

右爲末每服二錢雞子清調下小便利血數行更與桂枝紅花湯發共汗則愈

姙娠養血安胎

半夏茯苓湯治姙娠惡阻

陳皮　桔梗　旋覆花　人參　甘草　白芍藥　川芎各半兩　赤茯苓　熟地黃各七錢半

右十味剉每服五錢水一盞半生薑四片同煎至八分稍熱服食前次服茯苓丸即痰水消除便能食

茯苓丸治姙娠阻病

葛根　枳實炒　白朮各二兩　人參　乾薑　赤茯苓　肉桂　陳皮　甘草二兩　半夏湯泡七次各一兩

右十味爲細末蜜丸梧子大每服三十丸溫米飲空心下食前服

保安白朮散治姙娠傷寒安胎但覺頭疼發熱三二服便效

白朮　黃芩各等分新瓦上炒令香　右爲末每服三錢水一盞生薑三片棗子兩箇煎至七分溫服

安胎阿膠散治姙娠傷寒

阿膠炒　桑寄生　白朮炙　人參　白茯苓去皮各等分

右爲細末每服二錢煎糯米飲湯調下無時

安胎白朮散補榮衛養胎氣治姙娠宿有食冷胎瘦不長或失將理傷胎多墮

白朮　川芎各四分　蜀椒炒出汗去目　牡蠣煅各三分

右爲細末每服二錢溫酒調下空心食前

吳茱萸湯治姙娠傷胎數落而不結實或冷或熱

黃芪　川芎各一兩　甘草炙一兩半

吳茱萸半兩湯泡

右爲末每服二錢溫酒調下空心食前忌生冷果實

前胡湯治姙娠傷寒頭疼壯熱肢節煩疼

前胡　石膏各三分　大青四分　黃芩四分　知母　梔子仁各四分

右㕮咀每服四錢水一盞半甜竹茹一塊葱白二寸煎至八分去滓溫服無時

黃龍湯治姙娠傷寒壯熱頭疼眩暈不欲飲食脇下痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞傷餘熱未除

柴胡　人參　黃芩各等分　甘草炙

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分去相溫服無時

保安散治姙娠因有所傷胎動疼痛不止不可忍及血崩不止

連皮縮砂不以多少

右一味炒黑去皮爲末每服二錢溫酒一盞調下若覺腹中熱胎已安矣

立聖散治姙娠下血不止

雞肝二個

右用酒一升煮熟共食之大效

赤茯苓散治姙娠小便不利及水腫■酒惡寒動轉筋痛

赤茯苓去皮　葵子各等分

右爲末每服二錢新汲水調下無時

犀角散治姙娠婦人產前諸風熱困倦時發昏眩

揀參　犀角　川羌活　山梔　黃連　青黛　川芎　甘草炙　吳白芷　茯苓去皮各等分

右爲粗末每服五錢水一盞生薑三片竹葉五七片煎至八分去柤溫服食遠

大寧散治姙娠下痢赤白及泄瀉疼痛垂死者

黑豆二十粒　甘草二寸半生用　粟殼二箇去蒂瓤半生半炒

右爲粗末作一服水一盞半生薑三片煎至七分去柤溫服食前神效

火龍散治姙娠心氣痛

艾葉末一盞半炒　川楝子炒　茴香炒各半兩

右爲粗末每服二錢水一盞煎至七分去柤溫服不拘時

聖酒方治姙娠腰疼如折

大豆半兩

右一味用清酒一盞煎至七分去柤溫服食前

獨聖散治姙娠小便不通

蔓荊子不以多少

右爲末每服二錢濃煎葱白湯調下食前日三服

萬應丸治姙娠胎動不安及產後小戶痛不可忍

知母不以多少去皮炒

右爲末蜜丸如彈子大每服一丸清酒一盞化不食前

難產

催生丹

麝香別研一字　乳香別研二錢半　母丁香取末一錢

兔腦髓腦月者去皮膜研

右拌勻以兔腦和丸如雞頭穰大陰乾用油紙密封貼每服一丸溫水下即時產下隨男左女右手中握藥丸

出是驗

榆白皮散治臨產驚動太早產時未至穢露先下致使胎胞乾燥臨產艱難或曾因漏胎去血並宜服之

冬葵子　榆白皮

木通　火麻仁（去殼各半兩）　瞿麥（各一兩）

右六味剉每服五錢水一盞半煎至八分溫服不以時

獨勝散治難產

黃葵子四十粒或黑或朱為衣無灰酒下

黃葵子炒七十粒　研爛酒服濟君急

君也臨危難產時　免得全家俱啼泣

黑神散治產後瘀血作病及血暈

黑豆（炒半升去皮）　當歸　熟地黃

肉桂　乾薑　甘草

芎藭　蒲黃（各四兩）

右八味為末每服二錢酒半盞童便半盞同煎調下不拘時連進二服

下死胎方

桂（二錢）　麝香　當門子（一箇止之水銀等藥不損血氣）

右同研細酒服須臾如手推下

產後扶持榮衛

當歸建中湯治婦人一切血氣虛損及產後勞傷腹中疼痛少腹拘急痛引腰背時自汗出

當歸（四兩）　肉桂（三兩）　甘草（二兩）

白芍藥（六兩）

右四味切每服五錢水一盞半生薑五片棗一枚同煎至八分去柤熱服空心食前

芎歸湯治胎前產後一切去血過多

當歸　川芎（各等分）

右剉每服五錢水一盞半煎至八分去柤稍熱服不拘時

犀角飲子治產後亡津液虛損時自汗出發熱口倦屑口乾燥

犀角　麥門冬（去心）　白朮（各半兩）

柴胡一兩　地骨皮　枳殼（麩炒）

甘草（炒）　生地黃　當歸

揀參　茯苓（去皮）　黃芩

黃芪（各七錢）

右十三味為粗末每服三錢水一盞半浮小麥七十粒生薑三片煎至七分去柤溫服食後

牡丹皮散治產後寒熱腑下疼痛煩燥神效

牡丹皮　地骨皮　天台烏藥

海桐皮　青皮　陳皮（各一兩）

右為末入研了沒藥二錢半再羅過每服二錢水一盞煎至七分如寒多熱服熱多寒服食前日三服忌生冷硬滑酸物

枳殼丸治產後大小便澀滯

木香（三錢）　枳殼（麩炒）　麻仁（炒研）

大黃（各一兩）

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫水送下食後如飯食不化亦宜服之

通利湯治婦人乳癰疼痛不可忍者

穿山甲（炮黃）　川木通（各一兩剉）　白然銅（半兩醋淬七次）

右為末每服二錢熱酒調下食遠服之

鍼法治乳癰腫痛諸藥不能止痛者三里穴鍼入五分其痛立止如神穴在膝下骱外膝兩筋間舉足取之

痛泉散治婦人因氣鬱汁絕少

瞿麥穗　麥門冬（去心）　王不留行

紫龍骨　穿山甲（炮黃各等分）

右五味為末每服一錢熱酒調下後食豬蹄羹少許投藥用木梳左右乳上梳三十來梳一日三服食前服三

次羹湯投三次梳乳

勝金丹治婦人吹嚢極有效

白齒霜（即梳上髮之垢也不以多少）

右一味用無根水丸如桐子大每服三丸倒流水送下食後病左乳左臥右乳右臥溫覆出汗倒流水法取水須臾上流下是

腸覃論治併方

黃帝鍼經水脹篇云腸覃何如岐伯曰寒氣客於腸外與衛相搏衛氣不得榮因有所繫瘕而內著惡氣乃起瘕內乃生其始生者大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者歲拔之則堅推之則移月事以時下此其候也夫腸者大腸也覃者延也大腸以傳導為事乃肺之府也肺主衛衛為氣得熱則泄得冷則凝今寒客於大腸故衛氣不榮有所繫止而結瘕在內鬼著其延久不已是名腸覃也氣散則清氣聚則濁結為瘕聚所以惡氣發起瘕內乃生小漸益大至期而鼓其腹則如懷子之狀也此氣病而血未病故月事不斷應時而下本非胞娠可以此為辨矣

晦露丸治寒傷於內氣凝不流結於腸外久為癥瘕時作疼痛腹不得伸

廣茂（一兩剉）　京三棱（一兩剉酒浸）　乾漆（五錢洗去麻炒烟盡）

川烏（五錢）　硇砂（研）　青皮

雄黃（另研）　茴香（鹽炒）　穿山甲（燈各三錢）

輕粉（一錢另研）　麝香（半錢另研）　巴豆（三十箇去皮切開）

右除研藥外將巴豆炒三棱廣茂二味深黃色去巴豆不用共為末入研藥勻生薑汁打麵糊丸如桐子大每服二十丸至三十丸薑湯送下酒亦得空心食前

木香通氣散治寒氣結瘕腹大堅滿痛不可忍

木香　戎鹽（炒）　京三棱（炮各半兩）

厚朴（一兩麩製）　枳實（麩炒）　蓬茂（炮各二錢）

乾薑（炮）　甘草（炙各三錢）

右八味爲末每服三錢淡生薑湯調下食前

石瘕論併治方

黃帝鍼經水脹篇云石瘕何如岐伯曰石瘕生於胞中寒氣客於子門子門閉塞使氣不通惡血當瀉而不泄衄以留止日久益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下之夫膀胱爲津液之府氣化則能出焉今寒客於子門則氣必塞而不通血壅而不流衄以留止結硬如石是名石瘕也此病先寒病而後血病故月事不來則可宣導而下出者也難經云任之爲病其內苦結男子生七疝女子爲瘕聚此之謂也非大辛之劑不能已也可服見眩丸

見眩丸治寒氣客於下焦血氣閉塞而成瘕聚堅大久不消者

附子四錢炮去皮脐　鬼箭羽　紫石英各三錢　澤瀉　肉桂　玄胡索　木香各二錢　檳榔二錢半　血竭一錢半另研　水蛭一錢炒焙盡　京三棱五錢剉　桃仁三十箇浸去皮尖麸炒研　大黃二錢剉用酒同三棱浸一宿焙

右十三味除血竭桃仁外同爲末入另研二味和勻用元浸藥酒打糊丸如桐子大每服三十丸淡醋湯送下食前溫酒亦得

和血通經湯治婦人室女受寒月事不來惡血積結堅硬如石

當歸　京三棱炮各五錢　廣茂炮四錢　木香　熱地黃　肉桂各三錢　紅花　貫衆　蘇木各二錢　血竭一錢另研

右十味除血竭外同爲細末和勻每服三錢熱酒一盞調下食前忌生冷及當風大小便

和血通經丸治婦人經水凝滯不行腰背腹疼痛漸成血瘕

芍藥一兩　木香　當歸　肉桂　乾漆炒烟盡　五靈脂　大黃各半兩　水蛭炒二錢半　廣茂半兩　䗪蟲三十箇去頭足翅炒　桃仁二十七箇去皮尖

右爲末醋糊丸如桐子大每服二十丸醋湯送下溫酒亦得食前日進一服

木香硇砂丸治婦人痃癖積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消久不瘥者

丁香　木香　硇砂研　乾漆炒烟盡　鄂墨　大黃剉炒　附子炮　官桂　乳香研　廣茂　青皮　京三棱　沒藥研　巴豆霜減半　豬牙皂角　乾薑炮各等分

右十六味除另研外同爲末以好醋一升化開硇砂去了粗銀石器內慢火熬次下巴豆霜大黃末熬成膏下前藥末丸如麻子大每服三十丸溫酒送下量虛實加減大便利爲度

血極膏治婦人乾血氣不可不用也此藥是婦人經水之仙藥也

大黃一兩

右爲末用醋一升熬成膏丸如雞頭大每服一丸熱酒化開臨臥溫服大便利一二行後紅脈自下

一方治經候閉塞不行亦治乾血氣

斑猫二十箇糯米炒　桃仁五十箇炒　大黃半兩

右爲末糊丸如桐子大溫酒下五丸甚者十丸空心溫服大便利一二行後紅脈自下此藥是婦人經水之仙藥不可不用一法加䗪蟲半錢水蛭一錢

蓽澄散治婦人室女血氣刺痛不可忍者

官桂　沒藥　蓽澄子　良薑各等分

右爲末每服二錢乳香酒調下熱服無時

崩漏帶下

膠艾湯治衝任虛損月水過多及妊娠胎動不安腹痛下墜

阿膠　川芎　當歸　艾葉製炒各三兩　甘草炙各二兩　熟地黃各四兩　白芍藥

右剉每服五錢水一盞酒六分煎至八分去柤稍熱服空心食前日三服甚者連夜併服

伏龍肝散治經血崩下

伏龍肝　赤石脂各一兩　熟地黃　艾葉微炒各二兩　甘草　肉桂各半兩　當歸　乾薑各七錢半　川芎三兩　麥門冬一兩半

右十味剉每服五錢水一盞半入棗三箇擘破煎至七分食前溫服

丁香膠艾湯治崩漏走下不止血心氣不足勞役過度及飲食不節所得經隔少時其脈兩尺俱弦緊而洪按之無力其證自覺虛下如冰冰厚衣被以禦其寒白帶白滑之物多間有如屋漏水下時有鮮血不多石尺時洪後也屋漏水暴下多者夫如屋漏水者無物多而赤物少合而成也急弦脈見是寒多洪脈時見乃熱少合而言之急弦者北方寒水多也洪脈時出者命門包絡之火少也

阿膠六分炮　當歸身一錢二分　生艾末一錢　川芎　丁香末　熟地黃各四分　白芍藥三分

右七味㕮咀作一服水五盞先煎五味作二盞去柤入

膠艾再煎至一餞空心食前熱服

柴胡調經湯治經水不止鮮血項筋急脊骨強腦痛不思飲食

羌活五分　蒼朮一錢　柴胡七分
藁本　獨活　升麻各五分
當歸　蔦根　甘草炙三分
紅花少許

右十味㕮咀作一服水四餞煎至一餞去柤空心熱服取微汗立止

涼血地黃湯治婦人血崩不止腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩也

柴胡　防風各三分　黃芩
知母　黃連　藁本
川芎　升麻　羌活各二分
生地黃　當歸尾各五分　黃芩
細辛　甘草炙　荊芥穗
夏荊子各一分　紅花少許

右十七味㕮咀作一服水二餞煎至一餞去柤稍熱服空心食前

益胃升陽湯治血脫發氣古人之良法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長用諸甘劑為之先務舉世皆以為補氣殊不知甘能生血此陽生陰長之理也故先理胃氣人之身內穀氣為寶

白朮三錢　黃芪　甘草炙二錢
人參一錢半　陳皮　當歸身各一錢
炒麴一錢半　柴胡　升麻
生黃芩各半錢

右十味㕮咀每服三錢或五錢視食加減之如喫食少已定三錢內更減之不可令勝食氣每服水二餞煎至一餞去柤稍熱服無時○黃芩夏月每服中少加秋冬

去之○加腹中痛每服加芍藥三分去皮中桂少許○如渴或口乾加葛根二分

升陽舉經湯治經水不調右尺脈按之空虛是氣血俱脫也是大寒之證輕手按之脈數疾舉指弦緊或濇皆陽脫之證陰火亦亡若見熱證於口舌眼兼之或渴此皆陰躁陽欲先去也當溫之舉之升之浮之燥之此法當大升浮血氣而切補命門之下脫也

黃芪　白朮　當歸身各三錢
柴胡　藁本　防風
羌活各二錢　獨活一錢半　川芎
地黃　白芍　甘草
人參各一錢　細辛六分　黑附子炮去皮
肉桂五分夏月不用　桃仁十箇湯浸去皮尖　紅花少許

右十八味㕮咀每服三錢若病勢稍緩當漸漸加之至半兩止每服水三餞煎至一餞去柤空心食前稍熱服

備金散治婦人血崩不止

香附四兩炒　當歸尾一兩二錢炒用尾
五靈脂一兩炒

右為末每服五錢醋湯調空心服立效

寸金散治婦人子腸下不收

蛇牀子　鹿腦　葫蘆巴
紫梢花各等分

右四味為末每服五七錢水半碗淋洗之三二徧為效

蚵蠣散

全蠍不以多少

右為末口噙水鼻內嗅之立效

加減四物湯治婦人冷熱不調陰陽不分大小便相反

四物湯五錢　益元散二錢半

右和勻用水酒各半餞煎至八分去柤空心溫服

酒煮當歸丸治痼疾白帶下腰以下如在冰雪中以火焙炕重重厚鋪衣蓋其上猶寒冷不能此寒之極也面白如枯魚之象肌肉如刀刮削瘦之峻速也小便不止與白帶常流不禁固自不知覺面白目青如藍菜色目眩暈無所見身重如山行步欹側不能安地腿膝枯細大便祕難口不能言無力之極食飲不下心下痞煩心中懊憹不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知此上中下三焦眞氣俱虛欲竭喘嗽不止冒虛之極也其脈沈厥緊而濇按之空虛若脈洪大而濇按之無力猶為中寒況按之空虛者乎服此藥忌濕麵油膩生冷毒物

當歸一兩　良薑七錢
茴香半兩炒　黑附子炮七錢

右剉如麻豆大以好酒一升半同煮酒乾為度炭火上焙乾為細末後入

立胡四錢　全蠍三錢　柴胡二錢
木香　黃蠟炒　升麻各一錢
丁香　甘草　苦楝各五分生用

右為末與前四味末和勻酒糊丸如桐子大每服五七十丸淡醋湯送下空心食前

升陽燥濕湯治白帶下陰戶痛控心而急痛身黃皮膚爆身重如山前陰中如冰冷

柴胡一錢半　白葵花二錢　防風
良薑　郁李仁　甘草各一錢
乾薑　生黃芩　橘皮各半錢

右九味㕮咀分作二服水二餞煎至一餞去柤食前稍熱服少頃以美饌壓之

當歸附子湯治赤白帶下腰下冷痛

當歸二錢　附子　乾薑
良薑各一錢　柴胡七分　升麻
蠶柤　甘草炙各五分　炒鹽三分

黃芪（少許爲引用）

右十味爲粗末每服五錢水五盞煎至一盞去柤稍熱服或爲末酒糊丸亦得

桂附湯治白帶腥臭多悲不樂大寒

肉桂（一錢）　附子（三錢）　黃芩（生）　知母（各半錢）

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞稍熱服食遠○不思飲食加五味子三十箇○煩惱面上麻如蟲行乃胃中元氣極虛加黃芪人參各七分甘草炙三分升麻五分

白芍藥散治婦人赤白帶下腹臍疼痛服半月見效

白芍（二兩）　乾薑（炮三兩）

右二件同爲粗末炒黃色碾爲細末每服二錢空心溫米飲湯調下至晚又服

火龍丹治婦人二氣不和赤白帶下

白礬（枯四兩）　蛇牀子（炒三兩）

右爲末醋糊丸如雞頭大乾胭脂爲衣綿裹內陰中

灸婦人崩漏及諸疾

血海二穴乃足太陰脾經在膝膕上內膝白肉際二寸中主女子漏下惡血月事不調逆氣腹脹其脈緩者是也可灸三壯

陰谷二穴乃足少陰腎之經在足內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝取之主女子如妊娠亦白帶下婦人漏血不止腹脹滿不得息小便黃如蟲及治膝痛如雄刺不得屈伸舌縱涎下煩逆溺難小腹急引陰痛股內廉痛

胷陰一穴在兩陰間主女子不月可灸三壯

氣衝二穴在歸來下鼠蹊上一寸動脈應手宛宛中主婦人月水不利難產子上衝心痛不得息可灸七壯炷如小麥大

水泉二穴在內踝下主婦人月事不利利即多心下滿目眩眩不能建視腹中痛可灸五壯

氣海一穴在臍下一寸五分主婦人月事不調帶下崩中因產惡露不止繞臍弦痛

帶脈二穴在季脇下一寸八分陷者宛宛中灸七壯主婦人不月及不調勻赤白帶不氣轉連背引痛不可忍

氣門二穴在臍下三寸兩傍各三寸灸五十壯治婦人產後惡露不止及諸淋炷如小麥大

石關二穴在心下二寸兩傍各五寸灸五十壯主產後兩脇急痛不可忍

陰交一穴在臍下一寸主女子月事不調帶下及產後惡露不止繞臍冷疼灸百壯

關元一穴在臍下三寸主婦人帶下藏瘕因產惡露不止斷產絕下經冷可灸百壯

足下廉二穴在膝下三寸[illegible]外廉兩筋內舉足取之主乳癰膝痺腳腫足跗不收可灸三壯

承漿一穴在脣下灸五壯主婦人卒口噤語音不出風癇之疾

凡婦人產後氣血俱虛灸臍下一寸至四寸各百壯炷如大麥大元氣自生

中氣不足治驗

侯處到尚書第五子太常少卿叔謙之內李氏中統三年春欲歸寧父母不得情動於中又因勞役四肢困倦驟熱惡寒時作疼痛不欲食食即嘔吐氣弱短促怠惰嗜臥醫作傷寒治之解表發汗次日傳變又以大小柴胡之類治之至十餘日之後病增愈劇主家云前藥無效莫弄他病否醫曰此傷寒六經傳變至再經傳盡當得汗而愈型日見爪甲微青黑色足歷至腰如冰冷目上視而視不轉腹咽塞不利小腹冷氣上衝心而痛嘔吐不止氣短欲絕召予治之予診其脈沈細而微不見傷寒之證此屬中氣不足妄作傷寒治之發表攻裏中氣愈損壞證明矣太夫人泣下避席曰病固危困君盡心救治予以辛熱之藥投匙一兩作一服至夜藥熟而不能飲續續灌下一口飲至半夜稍有呻吟之聲身體漸溫怨索粥飲至旦食粥兩次又煎一服投之至日高衆醫皆至診之曰脈生證回矣衆喜而退後越三日太夫人曰病人大便不利或以用脾約丸潤之可乎予曰前證用大辛熱之劑陽生陰退而愈若以大黃之劑下之恐寒不協轉生他證衆以爲不然遂用脾約丸二十丸潤之至夜下利兩行翌日面色微青精神困弱嘔吐復作予再以辛起前藥溫之而愈矣故製此方

溫中益氣湯

附子（炮去皮臍）　乾薑（炮各五錢）　草豆蔻

甘草（炙各三錢）　益智仁　白芍藥

丁香　藿香　白朮（各二錢）

人參　陳皮　吳茱萸（各一錢半）

當歸（一錢）

右十三味㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤溫服食前病勢大者服一兩重

論曰內經云寒淫於內治以辛熱佐以苦甘溫附子乾薑大辛熱助陽退陰故以爲君丁香藿香豆蔻益智茱萸辛熱溫中止吐用以爲臣人參當歸白朮陳皮白芍藥炙甘草苦甘溫補中益氣和血脈協力用以爲佐使

灸

腹脹治驗

范郎中夫人中統五年八月二十日先因勞役飲食失節加之憂思氣結病心腹脹滿且食則嘔寡不能食兩脇刺痛診其脈弦而細黃常候經五氣論云清氣在陰濁氣在陽氣於胸中是以大悅內經曰清氣在下則生飧泄濁氣在上則生腹脹此陰陽逆作病之逆從也至夜濁陰之氣當降而不降腹脹尤甚又云厥寒生滿病大抵陽主運化

精微聚而不散故爲脹滿先灸中脘次乃胃之募引胃中生發之氣上行次以此方助之

木香順氣湯

藿香 吳茱萸各五分醋浸 木香

厚朴薑製 陳皮 薑屑各三分

當歸 益智仁 白茯苓去皮

澤瀉 木胡 青皮

半夏湯泡 升麻 草豆蔻各二分麩裹煨

右十五味㕮咀作一服水二盞煎至一盞去柤稍熱服食前忌生冷硬物及怒氣數日良愈

論曰內經云留者行之結者散之以柴胡升麻苦平行少陽陽明二經發散清氣運行陽分故以爲君生薑半夏豆蔻益智辛甘大溫消散大寒故以爲臣厚朴木香蒼朮青皮辛苦大溫通順滯氣當歸陳皮人參辛甘溫調和榮衛滋養中氣濁氣不降以苦泄之吳茱萸苦熱泄之者也氣之薄者陽中之陰茯苓甘平澤瀉鹹平氣薄引導濁陰之氣自上而下故以爲佐使也氣味相合散之泄之上之下之使清濁之氣各安其位也

病氣治驗

趙運使夫人年五十八歲於至元甲戌三月中病臍腹冷疼相引腰下痛不可忍反復顛亂不得安臥予以當歸四逆湯主之先灸中脘穴

當歸四逆湯治臍腹冷痛相引腰脊而痛

當歸尾七分 附子炮 官桂

茴香炒 柴胡各五分 芍藥四分

茯苓 去皮 川楝子各三分酒煮

澤瀉二分

右十味㕮咀作一服水二盞半煎至一盞去柤溫服空心食前數服而愈

論曰難經云任之爲病內結七疝此寒積所致也內經云寒淫於內治以辛熱佐以苦溫以附子官桂甘辛大熱助陽退陰用以爲君玄胡茴香辛溫除下焦虛寒當歸辛溫和血止痛故以爲臣芍藥之酸寒補中焦之氣又防熱藥損其肝溫澤瀉鹹平茯苓甘平去膀胱中留垢川楝子苦寒酒煮之止痛又爲引用乃在下者引而竭之之意也柴胡苦平行其本經故以爲使也

中庭一穴在臍中下一寸六分陷者中任脈氣所發可灸五壯或入三分或灸二七壯三七壯效

衛生寶鑑卷十八終

元羅天益謙甫著

三原李鍇倫孟熙校刊

小兒門

時氣溫疫外傷風寒

升麻葛根湯治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢體煩疼

升麻 甘草 白芍藥各十兩 葛根十五兩

右四味剉碎每服三錢水一盞半煎八分稍熱服不以時日二三服

惺惺散治小兒風熱瘧疹傷寒時氣頭痛壯熱目澀多睡咳嗽喘粗鼻塞清涕

人參 細辛 桔梗根 茯苓 白朮 甘草

桔梗各一兩半

右七味爲末每服一錢水一小盞入薄荷三葉同煎至四分溫服如要和氣入生薑煎服不以時○一法加防風川芎各一分同煎

人參生犀散解小兒時氣寒壅咳嗽痰逆喘滿心忪驚悸

麝香或裹或調胃進食又主一切風熱服尋常涼藥即瀉而減食者錢氏方

杏仁去皮尖麸炒 桔梗各五錢

前胡七錢 人參三錢 甘草炙二錢

右爲粗末每服二錢水一盞煎至六分去柤溫服食後

大青膏治傷風吐瀉身溫涼熱七歲以上藥多少隨意加減不盡道藏時以意加減之法氏方

天麻一分末 白附生末一錢半 青黛一錢研

蠍尾去毒半錢 天竺黃一字 烏梢蛇肉酒浸焙末半錢

麝香一字 硃砂一字

右再研細和勻生蜜和成膏每服半皁角子大至一皁子大月中兒稀米大同牛黃膏溫薄荷水化一盞服之

五歲以上同甘露散服之

天麻防風丸治一切驚風身體壯熱多睡驚悸手足抽掣痰涎不利及風溫邪熱

乾蟾炒　白殭蠶炒各半兩　天麻　防風　人參各一兩　硃砂　雄黃各二錢半　麝香一錢　甘草二錢半　牛黃一錢

右十味爲末蜜丸梧子大每服一丸至二丸薄荷湯化下不以時

塗頂法治傷寒錢氏方

麝香研一字　牛黃末一字　青黛末一錢七字　蜈蚣末半字　蟾尾去毒炒末半字　薄荷半字

右同研勻熱漿肉劑成膏新絲上塗勻貼頂上四方可出一指許火上炙手熱頻熨百日裏內外兒可用此塗落髓法錢氏方

青黛三錢　天麻末二錢　烏梢肉酒浸焙末二錢　蟾尾去毒炒　硃砂研各半錢　白礬三錢　麝香一字

右七味同研勻入白礬末三錢和勻每用三錢水三碗桃枝一握并葉五七枚同煎十沸溫熱得所浴之勿浴背上紫霜丸治乳哺失節宿滯不化胸膈痞滿嘔吐惡心或大便酸臭乳食不消

代赭石醋淬細研　赤石脂各一兩　杏仁去皮尖炒別研五十枚　巴豆去皮心出油炒研三十粒

右爲末和勻湯浸蒸餅丸如黃米大兒生三十日外可服一丸一歲至三歲可服二丸至三丸皁角子煎湯送下米飲亦得微利爲度未利再服更量虛實加減

消積丸錢氏方

砂仁十二箇　丁香九箇　烏梅三箇　巴豆二箇去心殼出油

右爲末糊丸如黍米大三歲以上三五丸以下二三丸溫水送下無時

厚腸丸治小兒失乳以食伺之未有食腸不能克化而生腹脹四肢瘦弱或病色無常

蒼朮三錢炒　神麯五分炒　大麥蘗五分炒　橘皮去白　半夏湯泡七次　枳實炒各三分　人參　厚朴薑製　青皮各二分

右爲末糊丸如麻子大每服二十丸溫水送下食前晨飽食

五臟熱及肌熱

瀉青丸治肝熱生風一名瀉肝丸若斑後眼有翳膜亦可服湯使同微利爲度錢氏方

當歸　川芎　草龍膽　羌活　山梔仁　川大黃濕紙裹煨

防風各等分

右爲末蜜丸如雞頭大每服一丸至二丸煎竹葉湯同砂糖化下

錢氏導赤散治大人小兒小便赤澀臍下滿痛

木通　生甘草　生乾地黃各等分

右㕮咀每服三錢水一盞竹葉少許煎至六分溫服不以時

瀉黃散治脾熱目黃口不吮乳一名瀉脾散錢氏方

甘草炙三兩　石膏半兩　防風四兩　山梔仁一兩　藿香七錢

右剉用藿香酒微炒香爲粗末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服清汁無時

瀉白散治肺熱盛一名瀉肺散錢氏方桑白皮炒黃三兩　地骨皮一兩　甘草炙半兩

右爲末每服二錢水一中盞粳米百粒煎至六分食後溫服之

地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱錢氏方

人參　知母　赤茯苓去皮　柴胡　甘草炙　地骨皮　半夏湯泡七次各等分

右七味爲末每服二錢水一盞生薑三片煎至六分去粗溫服食後量大小加減

生犀散治小兒骨蒸肌熱羸悴頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗五心煩熱錢氏方

生犀末二錢　地骨皮　赤芍藥　柴胡　乾葛各一兩　甘草炙半兩

右爲粗末每服二錢水一盞煎至七分去粗食後溫服大小加減

雲岐子論宣風瀉白散

雲岐子云錢氏用宣風散三味俱無治風之藥惟有治風之名合加防風一味審如用軍先鋒辨證以大便飱泄爲熱大便散中有結以宣風散下太過爲寒各認其寒熱而再詳合用藥耳瀉白散三味亦無瀉肺之理合加黃連一味爲瀉肺是也內經云肺苦氣上逆急食苦以瀉之由是錢氏自言差煎入臟君臣藥是包藏其法而言之也

喘促胸滿

奪命散治肺脹喘滿胸高氣急兩脇翕動陷下作坑兩鼻張闊氣嗽渴聲嗄不鳴疾涎潮塞若不急治死在旦夕

川大黃　白牽牛　黑牽牛各一兩半生半熟　大槟榔一箇

右爲末三歲兒服二錢冷漿水調下涎多加膩粉少許利下涎爲度出楊氏極濟方

無價散治風熱喘促悶亂不安

辰砂二錢半　輕粉半錢　甘遂一錢半麩煨令黃

右爲末每服一字溫水少許滴下小油一點杪藥在上

沈下去脚以禁水灌之立效如神

閻孝忠辨急慢驚風

小兒急慢驚風者古無之惟曰陰陽痫所謂急慢驚者後世名之耳正如赤白痢之類是也陽動而速故陽病曰急慢驚陰靜而緩故陰病曰慢驚此陰陽虛實寒熱之別治之不可誤也急驚由有熱熱卽生風又或因驚而發則目爲建視瞬涎搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起卽了了如故此急驚證也當其搐勢漸減時與鎮心治熱之劑一二服候驚勢已定須臾以藥下其痰熱利下痰熱心神安寧卽急慢驚待於大病之餘吐瀉之後或誤取轉致脾胃虛損風邪乘之似搐而不甚搐此名瘈瘲似睡而搐神慢因肢與口中氣皆冷睡中露睛或腹痛而啼哭如殭聲此證已危蓋脾胃虛損故也

潔古老人辨急慢驚風

急驚陽證小兒咳嗽痰熱積於胸膈屬少陽諸腑受病也諸熱卽生風或因聞大驚而作謂東方震卦得火氣而發搐此本不動饌須風而動當用利驚丸與導赤散瀉青丸

地黃丸搐止服安神丸

慢驚陰證小兒吐瀉病久脾胃虛損大便下痢當去脾胃間風先以宣風散導之後用史君子丸益黃散其病卽止若不早治卽成慢驚瘈瘲者似搐而不甚搐脾胃虛損致被肝木所乘屬諸臟受病也用溫補羌活膏主之

急驚

利驚丸 錢氏方

天竺黃二錢　青黛　輕粉各一錢　膽南星生頭末半分一方用牛黃

右同研勻煉蜜丸如豌豆大一歲兒一丸薄荷溫水化下食後服

地黃丸治腎虛 錢氏方

熟地黃八錢　山藥　山茱萸各四錢　牡丹皮　澤瀉

右六味爲末煉蜜丸如桐子大三歲已下一二丸或三丸溫水化下食前服

安神丸治心虛痰熱面黃頰赤壯熱驚啼 錢氏方

山藥　麥門冬去心　馬牙硝　甘草　白茯苓去皮　寒水石研各半兩　硃砂一兩研　龍腦一字

右爲末煉蜜丸如雞頭大每服半丸砂糖水化下不拘時

妙香丸治小兒驚癎

巴豆三箇一十粒去皮心膜炒熟研如麻油　牛黃別研　麝香別研　膽粉研各三兩　辰砂九兩　金箔九十片

右合研勻煉黃蠟六兩入白沙蜜三分同煉令勻爲丸每兩作三十丸小兒驚癎急慢驚風涎潮搐搦蜜湯下

棗豆大二丸

小抱龍丸治小兒傷風壯疫身熱昏睡氣粗喘滿痰實壅嗽及驚風潮搐中暑

天竺黃一兩　雄黃二分　辰砂　麝香各半兩　天南星四兩薑月製牛膽中浸乾五日

右爲末煮甘草膏子和丸如皁子大每服一丸溫水化下一法用漿水或新水浸南星三日候透軟煮三五沸取出乘軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取末入兩甘草一兩半拍碎用水二椀浸一宿慢火煮至半碗去粗漉入天南星末慢研之令甘草水浸入餘藥亦治蟲女白帶伏暑用鹽少許細嚼一二丸新水送下 亦錢氏方

鎮肝丸治小兒急驚風目直上視抽搐昏亂不省人事是肝經風熱也

當歸　天竺黃研　生地黃　川芎　竹葉　龍膽草去蘆　防風　川大黃煨　川羌活各等分

右九味爲末煉蜜丸如雞頭大每服二丸砂糖水化下無時大人服鎮肝丸三五丸次服天麻散

天麻散治小兒急慢驚風其效如神及大人中風涎盛半身不遂言語難不省人事

牛夏七錢　老生薑　白芷各三錢　甘草炙三錢　天麻二錢半

右剉用水一椀磁器內同煮水乾焙爲末每服一錢半生薑煎湯調下無時大人三錢

灸法治小兒急驚風前頂一穴在百會前一寸若不愈須灸囟頂兩處及鼻下人中一穴各三壯如小麥大

慢驚

宣風散 錢氏方模仿用二箇

甘草炙　橘皮各半兩　牽牛四兩半生半炒　槐柳二錢

右爲末二三歲兒每服半錢蜜湯調下年已上者一錢食前服慢驚氏驚吐瀉病久脾胃虛損復用牽牛之藥似未穩當

史君子丸治小兒五疳脾胃不和心腹滿時復疼痛不進飲食

史君子兩　厚朴去皮　陳皮去白　川芎各一錢

右爲末煉蜜丸如皁角子大三歲以上一丸以下半丸陳米飲化下大治小兒腹痛

羌活膏治脾胃虛肝氣熱盛而生風或取轉過多或吐瀉後爲慢驚者用無不效 錢氏方有防風無乾薑

天麻一兩　人參　羌活去蘆　川芎　赤茯苓去皮　白附子炮各半兩　沈香　木香　母丁香　藿香　肉豆蔻各三錢　麝香去筋

乾蠍一本有防風無乾蠍川附子炮去皮臍各二錢　真珠末　麝香研　牛黃研各一錢半　雄黃研　辰砂研各二分　乾蟾春砂去　白殭蠶炒去絲　白花蛇酒浸焙名一分　輕粉研一字　龍腦研半字

右同爲末入研藥和勻煉蜜和成劑旋丸如大豆大每服一二丸食後煎薄荷湯化下或麥門冬湯亦得實熱急驚勿服性溫故也

鉤藤飲子治吐瀉脾胃氣弱虛風慢驚錢氏方

人參　茯苓　穀　蟬尾去毒炒　防風去蘆　白殭蠶炒　鉤藤三分　天麻各半兩　麝香一錢研　甘草炙　川芎各一分

右爲末每服二錢水一盞煎至六分溫服量大小加減

寒多者加附子末半錢無時

異功散溫中和氣治吐利不思食凡治小兒虛冷病先與數服以正其氣錢氏小兒方

人參去蘆　茯苓去皮　白朮　甘草炙　陳皮各等分

右爲末每服二錢水一盞生薑二片棗子二箇煎至七分食前溫服量多少與之

大人小兒口噤牙關不開服諸藥不效者此藥用之立開以生天南星末一錢屑子少許相和研勻用指蘸生薑自然汁搽藥於左右大牙根上擦之便開神效

炙慢驚風及脣風撮口瘛瘲風瘛驚癇等疾

小兒慢驚風灸尺澤穴各七壯在肘中橫紋約上動脈中壯如小麥大

初生小兒脣風撮口灸瞳各穴三壯在內踝前起大骨下陷中減入三分不宜見血立效

小兒瘛瘲摸瘦脊強互相引灸長強穴三十壯在脊底端

缺盆取之乃得

小兒瘛瘲驚風目眩灸神庭一穴七壯在鼻上入髮際五分

小兒風癇先屈手指如數物乃發也灸鼻柱主髮際宛宛中發三壯壯如小麥大

小兒驚癇先舊輒喘叫乃發也後灸頂上旋毛中三壯及耳後青絲脈壯如小麥大

舞積痞瘦

燒青丸治小兒食癖乳癖每日午後發寒熱咳嗽脇下痞硬並皆治之錢氏方

立積石煅赤　硇砂各半錢　輕粉各一錢　粉霜

右先將硇砂研細入三味研勻更入寒食麵一錢半研勻滴水和成餅再用麵裹了慢火內煨黃取出去麵癖藥餅再研爲細末滴水和丸如黃米大一歲五丸二歲十丸夜臥溫漿水送下至天明取下惡物是效如不下漸加丸數加嫩癖未消盡隔三兩日又一服癖消盡爲度

三棱煎丸治小兒食飲過多痞悶疼痛食不消化久而成癖並治婦人血積血塊

廣茂煨爲末　三棱二味煨煨香各一兩

大黃去皮入酒爲末

右將大黃銀石器內以好醋漬令平慢火熱可以二味爲丸如麻子大或菉豆大每服十丸至二十丸食後溫水送下虛實加減大人如桐子大每服四十丸

青礞石丸治小兒癖癖

硫黃三錢　青礞石　五靈脂　錫底墨各一錢半　白丁香一錢去土

右爲末米飯爲丸如菉豆大捻作餅子每服三丸餅子溫水送下食前

龜甲豬肚丸治癖積發熱

柴胡一兩　黃連　龜甲九肋者酒煮黃色各七錢　枳實麩炒　木香　青皮各半兩

右入乾青蒿七錢同爲末以豬豬肚一箇去脂盛藥蒸熟同搗和爲丸如桐子大每服一二十丸煎人參湯送下食後

兒效聖餅子治癖積

陳皮去白十兩　巴豆一百箇去殼切同陳皮炒黃色去巴豆　香附子炒去毛　廣茂炮　京三棱炮各半兩

右爲末糊丸如菉豆大捻作餅子每服三十餅子溫水送下

廣茂化癖丸治乳食不消心腹脹滿壯熱喘粗嘔吐痰涎腸鳴泄利米穀不化完出下痢亦白腹痛裏重及食癖乳癖痃氣痞氣並皆治之

硇砂研水飛　當歸炒　代赭石醋淬燒　枳殼麩炒　廣茂炮　京三棱炮各半兩　木香研　巴豆霜各一分

右爲末入研藥勻糊丸如麻子大一歲兒二丸溫米湯送下食後空虛實大小加減

橘皮丸治癖積堅硬不消

陳橘皮二兩　巴豆半兩去皮

右將橘皮剉碎以巴豆同炒令重黃色揀去巴豆不用只搗陳皮爲末軟糊飲研爲丸如菉豆大每服二十丸生薑湯送下食前量兒歲數旋丸大小加減

廣茂潰堅丸治小兒癖積腹脇滿發熱咳嗽喘促不思飲食

木香　青皮　廣茂　陳皮　烏梅　京三棱各一兩　大椒　巴豆去心膜各半兩

右八味爲末糊丸如麻子大每服五七丸溫米湯飲送

下食遠量小兒大小爲丸加減服

蓬莪透肌散治小兒癖癖食癖時發寒熱咳嗽脇下堅硬

結塊

桑皮 荊芥各三錢 雄黃研

粉霜研各二錢半 蕤蕊 官歸

硇砂研 荳蔻 穿山甲炮各二錢

輕粉一字半研 海金砂一字半

右十一味除研藥外餘揀淨爲末入研藥和勻令將獨科蒜去皮研如泥入頭醋和如稀糊調藥如膏狀癖積大小攤在紙上貼病處用新絹一塊覆之以三條緊束待一二時辰覺疼痛無妨只待口鼻內蒜香爲度其效不可具述癖消爲度趙黃姑十三歲癖積甚大以至危篤予以此貼之得效如神

中脘一穴章門二穴專治小兒癖氣久不消者中脘從鳩骾下取病兒四指頭是章門在大橫骨外直臍季脇端側臥屈上足舉臂取之各灸七壯臍後脊中灸二七壯

禹禪師用灸之經驗

脾俞二穴治小兒脇下滿滯病體重四肢不收痃癖積聚腹痛不喜食痰羸寒熱又治腹脹引背食飲不多漸漸黃瘦在第十一椎下兩旁相去各一寸五分可灸七壯若黃疸者可灸三壯

癖積治驗

興定總管董公長孫年十一歲病癖積左脇下硬如覆手壯大青筋發熱肌熱咳嗽自汗日晡尤甚牙疳臭惡宣露出血四肢困倦飲食減少病甚危篤召太醫劉仲安先生治之約百日可愈先與沈香海金砂丸一服方在濕證門中下積物兩三行次日合塌氣丸服之十日復以沈香海金砂丸再利之又令服塌氣丸如此互換服至月餘其癖減半未及百日良愈近年多有此疾服此愈之者多錄之以救將來之病者也

塌氣丸治中滿下虛單腹脹滿虛損者

陳皮 蘿蔔子炒各半兩 木香

胡椒各三錢 草荳蔻去皮 青皮各三錢

蝦蟆去毒二錢半

右爲末糊丸如桐子大每服三十丸米飲下食後日三服白粥百日重者一年小兒丸如麻子大桑白皮湯下十丸日亦三服如陰囊洪腫冰冷用滄鹽乾薑白麵爲末各三錢水和膏子攤紙上塗除囊上

疳疾

丹砂丸治小兒五疳八痢

麝香研一錢 硃砂研 青黛各二分

丁香半錢 肉荳蔻一枚 沒石子一箇

右用乾大蝦蟆一箇去頭足酥炙黃同爲末糊丸綠豆大每服三十丸米飲下空心服

神效荳蔻丸治小兒脾疳瘦弱或泄利無度

神麯炒 麥糵炒各半兩 肉荳蔻麵裹煨三兩

黃連半兩 蘆薈二錢半研 史君子十箇去皮

右爲末猪膽汁丸如黍米大或桐子大每服二三十丸米飲送下空心食前

蘆薈丸治小兒脾疳瘦弱面色痿黃

蘆薈 蝦蟆 麝香

硃砂 黃連 槟榔

鵝粪 史君子 肉荳蔻各等分

右爲末糊丸如綠豆大每服三十丸溫水送下空心食前

肥兒丸治小兒蒸熱腹脇脹滿面色痿黃飲食遲化大小便不調

麥糵炒 川黃連 大蘆薈

神麯炒 胡黃連各半兩

右爲末猪膽汁丸如麻子大米飲送下三十丸食前

乳母忌酒麵生冷

楊連丸治疳瘦久服消食和氣長肌肉錢氏方

陳皮一兩 黃連一兩半去鬚淨米泔浸一宿

右爲末另研麝香半錢和勻用豬膽七箇分藥入膽內紫水煮候臨熟時以針微刮破以熱爲度取去粟米丸如綠豆大每服十丸米飲下量大小加減之

黃帝療小兒疳瘦脫肛體瘦渴飲形容瘦瘁諸方不瘥者尾翠骨上三寸陷中灸三壯炷如小麥大岐伯云兼三伏內用柳水浴孩兒正午時灸之當自灸之後用帛子拭兒有疳蟲隨汗出此法神效不可具述

章門二穴治小兒身羸瘦黃豚腹脹四肢懈惰肩背不舉依前禹禪師灸癖處取之

咳嗽

辰砂半夏丸治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胸膈痞滿心悸煩悶

硃砂 五靈脂各一兩微炒 葶藶

杏仁 半夏各半兩

右爲末薑汁煮麵糊爲丸如小麻子大每服五七丸淡薑湯下食後

潤肺散治小兒寒壅相交肺氣不利咳嗽喘急語聲不出痰涎壅塞胸膈煩滿鼻塞清涕咽喉乾痛

貝母 杏仁各二兩 麻黃去根節

人參各二兩 阿膠 桔梗各半兩

陳皮 甘草各一兩

右粗末每服一錢水一盞煎至六分去柤溫服食後

人參半夏丸治肺胃受冷咳嗽氣急胸膈痞滿喉中呀呀嘔吐涎沫乳食不下

半夏 厚朴 丁香各四兩

陳皮 人參 細辛各二兩

右爲末薑汁糊丸麻子大三歲兒每服二十丸薑湯下

食後服量兒大小加減

堂屑膏治疳瘰小兒咳嗽吐乳久不愈

石燕子

右一味爲末每用一捻蜜少許調塗兒脣上日三五次不拘嬭食前後

吐瀉痢疾

丁香散治胃虛氣逆嘔吐不止

人參半兩　丁香　舊香各一分

右爲末每服一錢水半盞煎五七沸入乳汁少許去柤稍熱服不以時

玉露散治小兒吐瀉一名甘露散錢氏方

石膏　寒水石各半兩　甘草生一錢

右爲末每服一字或半錢一錢溫湯調下食後立夏已後立秋已前宜用餘月不可用

金黃散治小兒脾胃虛弱腹痛泄瀉一名補脾散

丁香四錢　陳皮二兩　甘草

訶子　青皮各一兩

右爲細末每服一錢水七分煎煎至五六分食前服

荳蔻散治吐利腹脹頻渴小便少錢氏方

肉荳蔻　丁香各五分　桂府滑石三分

鍋上硫黃一分

右爲末每服一字至半錢米飲調下無時

白朮丁香散治小兒吐利不止頻渴小便少

丁香　白朮　鍋上硫黃

肉荳蔻各三錢　人參二錢　桂府滑石二兩

右爲末大人每服二錢小兒一錢溫米飲調下食前立效

散治一切大腹及熱吐不止累經效

川甜硝一錢　桂府滑石末三錢

右二味研勻每服半錢煎水少許生油一兩點打勻同調服極者三服必愈大人每服一錢忌生魚果實

玉液散治小兒嘔逆吐利霍亂不安煩躁不得臥及腹脹小便赤頻渴悶亂或傷寒瘧病

丁香一錢　藿香半兩　桂府滑石四兩

右爲末每服一錢清泔水半盞調下冷服大人霍亂吐利水打麵茶清下三錢立效

如聖丸治冷熱痢泄

胡黃連　川黃連　白蓽茇

史君子各一兩去皮　麝香半錢研

右爲末與蝦蟆膏子爲丸如麻子大每服一二丸人參湯下二三歲兒六七丸以上十丸十五丸

丁庭一穴治小兒吐乳汁灸一壯在臍中穴下一寸陷中壯如小麥大

荳蔻香連丸治泄瀉不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴此方用之如神

黃連三分炒　南木香　肉荳蔻各一分

右爲末粟米飯丸如米粒大每服十丸至二十丸米飲下日夜各四五服食前

白附子香連丸治腸胃氣虛暴傷乳哺冷熱相雜下痢赤白裏急後重腹中撮痛日夜頻併乳食減少錢氏方

木香　黃連各一分　白附子尖一錢

右爲末粟米飯丸如菉豆大或粟米大每服十丸至二三十丸食前清米湯送下日夜各四五服

小香連丸治冷熱腹痛水穀痢滑腸錢氏方

黃連半兩　木香

右爲末粟米飯丸如菉豆大米飲下每服十丸至三五十丸食前頻服之

沒石子丸治泄瀉白濁及痢痢滑腸腹痛錢氏方

木香　黃連各二錢半　訶子去核三箇

沒石子一箇　肉荳蔻二箇

右爲末飯和丸如麻子大米飲下十五丸量兒大小加減食前服之

赤石脂散治小兒因痢後努墜氣下推出肛門不入錢氏方

赤石脂　伏龍肝各等分

右爲末每用半錢傅腸頭上每日三次用之

岐伯灸法療小兒脫肛瀉血秋深不效灸龜尾一壯如小麥大乃脊端窮骨也

小兒脫肛灸臍中三壯千金云隨年壯

小兒脫肛久不差及風痛中風角弓反張多哭語言不擇發無時節虛則吐沫灸百會穴七壯在鼻直入髮際五寸頂中尖髮毛中可容豆壯如小麥大

雜證諸方

黃芪散治虛熱盜汗

牡蠣燒　黃芪　生地黃各一兩

右爲末每服一二錢水一盞小麥二三十粒煎至七分去柤食後溫服

豬尾膏治瘡倒靨無膿用小豬尾刺血三五點入生腦子少許研勻新汲水調下立效

治斑後小兒眼有翳膜煎竹葉湯同砂糖化下溏青丸三丸微利爲度

白菊花散治疹豆瘡後眼內生翳膜者病淺二十日見效深者一月必效一日喫三服

白菊花　蕎豆皮　穀精草去根各等分

右爲末每服一錢乾柿一箇生粟米泔一盞煮米泔盡將柿去蒂核食之無時

黃連散治小兒眉癬

黃連　大黃　黃芩

蜜陀僧　百藥煎各等分　輕粉少許

右爲極細末每用不以多少油塗調搽神效此山有木工則度之

澤青膏治小兒粘瘡

黃蠟　瀝青各一兩　圓蔡子

黃丹各三錢

右爲末小油三兩熬搽不須洗

蜂玉散治小兒頭上併身上濕癬時復痒痛皮膚濕爛久不愈

黃丹炒紅二兩重　赤豆粉炒黃三兩重

右爲末清油調雞翎塗於患上後參勝金散覆之大有神效

勝金散

石膏　黃芩一兩

右爲末先搽了蜂玉散後不以多少覆之神效

千金膏治臘坊如神一名蝦蟆又治多日諸般惡瘡

瀝青四兩　黃蠟三兩　散藤三錢研

右先用小油三兩熬溫入瀝青黃蠟化開攪勻入散藤取下火攪勻濾入水中碗器內收之每用時將藥入水捻作餅於絲綿上貼之

軟膏膏治一切風熱瘡疥及治小兒頭瘡

瀝青　黃蠟　芝麻油各十兩

巴豆十四箇

右先將瀝青麻油黃蠟熬成汁次入巴豆不住手攪候巴豆焦黑去巴豆不用次入風粉二錢再攪極勻放冷敷瘡上神良

羊蹄散治小兒頭瘡久不差

白礬半兩　羊蹄根四兩裁

右二味爛研入米醋小半盞同搽不住搽之後覺癢極處至痛即止隔日洗去再搽

麝香散治小兒口瘡臂齒皆蝕損臭爛

硇砂四錢　砒三字　麝香少許

右各研細和勻先以甫搽口每用少許參之應是口齒瘡者可用不可嚥了嚥了只是吐人耳用之無有不

效大人用一字

小兒季夏身熱瘦黃治驗

一小兒身體蒸熱胸膈頻滿皮膚如漬楮之黃眼中白睛亦黃筋骨痿弱不能行立此由季夏之熱加以濕氣而蒸熱搏於經絡入於骨髓使臟氣不平故脾遂乘心濕熱相合而成此疾也蓋心火實則身體蒸熱胸膈頻滿脾濕勝則皮膚如漬楮之黃有餘之氣必乘己所勝而侮不勝是脾受邪而筋骨痿弱不能行立內經言脾熱者色黃而肉蠕動又言濕熱成痿信哉斯言也此所謂子能令母實實則瀉其子也若脾土退其本位腎水得復心火自平矣又內經曰治痿獨取於陽明正謂此也予用加減瀉黃散主之

加減瀉黃散此藥退脾土復腎水降心火

黃連　茵陳各五分　黃芩各四分　茯苓　梔子各三分

澤瀉二分

右㕮咀都作一服水一大盞煎至六分去柤稍熱服食後一服減半待五日再服而瘥愈

論曰內經云土位之主其瀉以苦又云脾苦濕急食苦以燥之故用黃連茵陳之苦燥除濕熱爲君腎欲堅急食苦以堅之故以黃柏之苦辛寒強筋骨爲臣濕熱成熱以苦瀉之故以黃芩梔子之苦寒止煩除滿爲佐濕淫於內以淡泄之故以茯苓澤瀉之甘淡利小便導濕熱爲使也

元羅天益謙甫著　三原李瑛齡孟熙校刊

雜方門

八毒赤丸治鬼疰病入國信副使許可道到雄州請予看脈予診之脈中乍大乍小乍短乍長此乃血氣不勻邪氣傷正本官說在路到邯鄲驛中夜夢一婦人著青衣不見面目用手去牖下打了一拳遂一點痛往來不止蓋之寒熱而不能食乃鬼擊也予曰可服八毒赤丸本官言嘗讀名醫錄中見李予豫八毒赤丸爲殺鬼杖子遂與藥三粒臨臥服明旦下清水二斗立效又進白海青陳慶玉第三子因晝臥於水仙廟中夢得一餅食之心懷憂思心腹痞滿飯食減少約一載有餘漸漸瘦弱腹脹如蠱屢易醫藥及師巫禱之皆不效又不得安臥召予治之予診之問其病始末因思之此疾既非外感風寒又非內傷生冷將何據而醫予思李予豫八毒赤丸頗有相當遂合與五七丸服之下清黃涎斗餘漸漸氣調而以調藥理之數月良愈不二年身體壯實如故故因錄之此藥可謂如神合時宜齋戒沐浴淨室志心修合

雄黃　礬石　硃砂　附子炮　藜蘆　牡丹皮　巴豆各一兩　蜈蚣一條

右八味爲末煉蜜丸如小豆大每服五七丸冷水送下無時

蟬花散治夏月犬傷及諸般損傷蛆蟲極盛臭惡不可近者晉州吳權府佃客五月間收麥用驢車般載一小廝引頭被一驢踢倒又咬破三兩處痛楚不可忍五七日臭水臭惡難近又兼蛆蠅極盛藥不能救無如之何臥於大門外亦房中一化飯道人見之云我有一方用之多效我傳與汝修合既得方合服之蛆皆化爲水而出

蝇亦不敢近又以寒水石爲末敷之旬日良愈宗以爲神效錄之

蟬退　青黛各半兩　華陰細辛二錢半

蛇退皮一兩用燒存性

右爲末和勻每服三錢酒調下如雖馬牛畜損傷成瘡用酒灌之如犬傷用酵子和與喫蚯皆化爲水蠅不敢再落又以生寒水石末乾摻上

定風散治風狗咬破先口含漿水洗淨用綿子揩貼藥更不再發無風大有神效凡惡犬傷人咬破處多或一年二年三年四五年至七八年被犬傷咬破處或發疼痛或先發憎寒或甚至發風循身搐搦數日不食而死十死八九余親見死者數人此藥但凡犬傷咬破無有不愈中驗傳

防風去蘆　天南星生用各等分

右爲細末乾上藥更不再發無膿不可具述

治食諸魚骨鯁久而不出以皁角末少許吹入鼻中得噴嚏出多效

烏白散治蠍螫痛不可忍

烏魚骨一兩　白礬二錢

右同爲極細末不以多少擤鼻如在右者左鼻孔內擤之在左者右鼻擤之

雄黃消毒膏治蠍螫痛不可忍

礬一兩生　雄黃　信各半兩

巴豆三錢　黃蠟半兩

右爲末銚開蠟入藥末在內攪勻爲鋌子如棗子大每用時將鋌子於燈燄上炙開滴於患處其痛立止

聖核子治蛇咬蠍螫大有神效五月五日不聞雞犬及孝子婦人見之修合

雄黃三錢　信一錢　皁角子四十九箇

巴豆四十九箇　耳塞少許　麝香少許

右爲末入在合子內封之用時針挑出上病處復生散治卒病死壓死溺死一切橫死但心頭溫者救之半夏不以多少

右一味爲細末心頭溫者用一字許吹入鼻中立活良法

衣香方

茅香剉蜜少　零陵香各二兩　香白芷

甘松去土各一兩　藿香五錢　三賴七錢麩裹

右件爲粗末入麝香少許和勻以絹囊盛之

八白散治勞汗當風寒薄爲皰參乃挫及斷髓之類

白丁香　白茯　白蒺藜　白礬

白牽牛　杜蒺藜　新升麻內白者佳各三兩

三賴子　白蘚　白芷各二兩

白附子　白茯苓各半兩

右爲末至夜津調塗面明且以瑩肌如玉散洗之

瑩肌如玉散治鼾黯粉刺之類并去垢膩潤澤肌膚

楮實五兩　白茯肥者一兩　升麻內白者半斤

甘松七錢　白丁香　連皮砂仁各半兩

糯米一升二合水　三賴子三錢　蜀豆五兩另用絹羅子羅一宗用一升

皁角三片水浸燒乾再入水中再燒乾去弦皮子可得二斤半爲末另用絹羅子羅

右六味爲末入糯米蜀豆皁角末一處攪勻用之神效面油摩風膏

麻黃三錢　升麻白者　防風

白蘚各二錢　白茯苓各一錢　羌活

右六味入檀香當歸身各一錢用小油半斤銀石器內用綿子同包定入油中熬之得所澄淨去柤入黃蠟一兩麝香少許熬煉爲度

乾洗頭藥方

甘松　川芎　百藥煎

薄荷　白芷　五倍子

藿香　茅香　草烏頭各等分

右爲末不以多少乾洗頭髮

出油龍粉散

龍骨　烏魚骨　滑石各一兩　風化石灰四兩　定粉

右擣爲末如冬月用以熱磚上煨或炕上夏月用日頭炙只用風化石灰一味亦得者試有驗

出油白粉散白石脂爲末有油處摻定用紙隔熨斗熨之顏色衣服亦不改色

取字法

硇砂　瓦粉　白龍骨

木賊　蜜陀僧　白石脂

桑柴灰各等分　信少許

右爲細末先濕字後摻藥末以熨斗熨之乾隨落

鍼法門

癸丑歲與竇子聲先生隨駕在瓜忽都田地裏住冬與先生講論因視見流注指要賦及補瀉法用之多效今錄於此使先生之道不泯云云流注指要賦題辭

望聞問切惟明得病之源補瀉迎隨揭示用鍼之要予於是學始究於今雖常覆思以研精竟未釣玄而頤隱俄經傳之暇日承外舅之訓言云及世紛孰非兵擾其人也神無依而心無定或病之精必奪而氣必衰兼方國困亂而隔殊醫物絕商而那得設方有效歷市無求不若砭功立排疾勢乃以受教遂敏求師前後謹十七年曉會無一二莫後避屯於蔡邑方獲訣於李君斯人以鍼道救疾也除疼痛於目前愈瘵疾於指下信所謂伏如彌芻應若發機萬舉萬全百發百中者也加以好生之念素無竊利之心嘗謂予曰天寶不泄於非人聖道須傳於賢者僕不自揆遂伸有求之懇獲垂無吝之誠授穴之祕者四十有三療

疾而弗瘳者萬千無一遂銘諸心而著之篇務極其因而扶其危而後除疼痛迅若手拈破結聚渙如冰釋夫鍼也者果神矣哉然念茲穴俞而或忘借其聲律則易記輒裁入韻賦就一篇詎敢匿於己務庶共傳於同志壬辰重九前二日謹題

流注指要賦

必欲治病莫如用鍼巧運神機之妙工開聖理之深外取砭鍼能獨邪而扶正中含水火善回陽而倒陰原夫絡別支殊經交錯綜或溝池谿谷之歧異或山海邱陵而際共斯流派以難揆在條綱而有統理繁而昧縱補瀉以何功法捷而明自迎隨而得用且如行步難移太衝最奇（太衝肝經在足大指本節後二寸或一寸五分動脈中）人中除脊苦之強痛（人中督脈一名水溝在鼻下往神門去心性之呆痴）（神門心經一名鍼中一名風傷項下都在掌後銳骨端陷中）急便求於風府（風府督脈入項髮際一寸五分頭大筋宛宛中）頭重目眩要覓於風池（風池膽經在顳顬後髮際陷中耳附須聽會而治也）（聽會膽經在耳前陷中開口有孔）眼疼必合谷以拯之（合谷大腸經一名虎口在大指次指骨間）胸結身黃取湧泉而即可（湧泉腎經一名地衝在足心陷中屈足踡指宛宛中）腦脹曰赤瘡攢竹以偏宜（攢竹膀胱經在眉頭陷中）若兩肩之拘攣使曲池而平墻（曲池大腸經在肘外輔骨與肘骨之中）四肢之懈情憑照海以消除（照海腎經在足內踝下陰蹻所主）牙齒痛呂細堪治（呂細膽經一名太谿）頸項強承漿可保（承漿任脈在唇下頤中）太白宣通於氣衝（太白脾經在足內側核骨下陷中治腹脹）（氣衝胃經在腹下兩側動脈中治小便不利腹脹而脹滿陰陵開通於水道（陰陵泉脾經在膝下內側輔骨下陷中治小便不利）奪內庭兮休遲（內庭胃經在足大指次指外間陷中）筋轉而疼瀉承山而在早（承山膀胱經在腓腸中分肉間陷中）大抵腳痛痲痹崑崙解愈（崑崙膀胱經在足外踝後跟骨上陷中）股膝痛陰市能醫（陰市胃經在膝上三寸伏兔下陷中）癲狂兮憑後谿而療理（後谿小腸經在手小指外側本節後陷中）搪生寒熱兮仗間使以扶持（間使心包絡經在掌後三寸兩筋間陷中）期門羅胸滿血脹而可已（期門肝經在大宗後一寸第二肋端）勞宮包絡一名勞宮五分近第二肋端）勞宮退胃翻心痛以何疑（勞宮包絡經在掌中央屈無名指取之）稽夫大敦去七痛之偏陸王公謂此（大敦肝經在足大指端去爪甲如韭葉）三里御五勞之羸瘦華老言斯（三里胃經在膝下三寸脛骨外指除痢嚴書）

（筋內宛中）固知腕骨祛黃（腕骨小腸經在手外側腕前起骨下陷中）然谷瀉腎（然谷腎經在足內踝前大骨下陷中）行間治膝腫腰疼（行間肝經在足大指間動脈應手陷中）尺澤止肘疼筋緊（尺澤肺經在肘中約橫紋上）巨髎不見二間宜取（二間大腸經在手食指本節前內側陷中）鼻窒無聞迎香可引（迎香大腸經在鼻孔後有井穴鼻孔大小絲）除兩臂濕痛難任（肩井膽經在肩上陷中缺盆上大骨前以三指按取之當中指下陷者是）竹旅偏頭疼痛不忍（竹旅三焦經在眉後陷中）咳嗽寒熱刻缺堪憑（缺盆胃經在胸上三寸骨下陷中）將腿疼以祛殘（髓骨膀胱經在腰髖骨上）腎俞把腰疼而瀉盡（腎俞膀胱經在腰脊兩旁各一寸五分）以見越人治屍厥於雜會（雜會腎經會膽脈隨手而駐）交伯瀉死胎於陰交（陰交脾經在足內踝上三寸骨下陷中）所謂諸痛為實但麻曰虛實則自外而入也虛則自內而出歟是故濟母而神其不足奪子而平其有餘觀二十七之經絡一一明辨據四百四之疾證件件皆除故得天任都無疆斯民於壽域幾微以判彰往古之玄書抑又問心腹病求掌後之大陵（大陵包絡經在後兩筋間陷中手三里大腸經在曲池下二寸）冷痺腎敗取足陽明之土（三里也）遠臍腹痛瀉足少陰之水（陰谷也）脊間心後者鍼中渚而立瘥（中渚三焦經在手小指次指本節後間）脇下肋遠者刺陽陵而即止（陽陵泉膽經在膝下一寸外廉陷中）頭項痛擬後谿以安然（後谿小腸經在手小指外側本節後陷中）腰腳疼在委中而已矣（委中膽經在腘中央約紋中動脈陷中）夫用鍼之士於此理苟能明焉收祛邪之功而在乎撚指

離合眞邪論

古有離合眞邪云者蓋聖人欲使其眞邪相離而勿合之謂也若邪入於眞則眞受其害而不遂其純一之眞眞之不遂則其所謂眞也罹害有不可言者眞被乎邪竊其柄而肆其橫逆邪既橫逆則其為患復可勝言哉嗚呼眞邪之不可合也如此胡為眞胡為邪眞之為言也天理流行付與萬物萬物得以為生者皆眞也聖人保之如持盈邪之為言也天地間非四時五行之正氣而差錯迕至者皆邪也聖人避之猶矢石其防微杜漸之嚴如有淵是旨哉

蓋眞立則邪遠邪勝則眞殘邪固可除眞尤宜養養眞之道無須異求但飲食男女節之以限風寒暑濕禦之以時復能實慈恕以受人虛中襟而應物念慮必為之防舉止必為之敬如斯內外交養周備則吾之生不永生而生不期壽而壽矣不然攝養少或不嚴則六邪乘隙競入諸疾交生衆害並作則吾之眞所能存者幾希故聖人憂之揆度權衡機宜所在示之以剋邪之方使屏之如沃雪拔刺而無遺者以此古人有云樹德務滋除惡務本亦此意也然去邪之方經旨俱存再拜遑詮敬為節錄

鍼有補瀉法

帝問邪氣在經其病何如取之奈何對曰邪之在經如水得風波涌隴起其行脈中循循然其中手也時大時小動無常處在陰與陽不可為度卒然逆之早過其時吸則內鍼無令氣忤靜以久留無令邪市吸則轉鍼以得氣為故候呼引鍼呼盡乃去大氣皆出故命曰瀉帝曰不足者補之奈何必先捫而循之切而散之推而按之彈而彗之爪而下之通而取之外引其門以閉其神呼盡內鍼靜以久留以氣至為故如待所貴不知日暮其氣以至過而自緩候敗引鍼氣不得出各在其處推闔其門令神氣存大久留止故命曰補○瀉法先以左手揣按得穴以右手置鍼於穴上令病人咳嗽一聲撚鍼入腠理得穴令病人吸氣一口鍼至六分覺鍼沈緊復退一分許如更覺沈緊仰手轉鍼頭向病所依前循捫至病所氣至病已鍼一豆許仰手轉鍼頭向病所以手循經絡循捫至病所氣至病已合手回鍼引氣過鍼三寸隨呼徐徐出鍼勿閉其穴命之曰瀉○補法先以左手揣按得穴以右手按之置鍼於穴上令病人咳嗽一聲撚鍼入腠理得穴令病人呼氣一口將盡內鍼至八分覺鍼沈緊復退一分許如更覺沈緊仰手轉鍼頭向病所依前循捫至病所氣至病已隨吸而疾出鍼速閉其穴命之曰補

春夏秋冬深淺補瀉法

春夏刺者皆先深而後淺秋冬刺者皆先淺而後深凡補瀉皆然

寒熱補瀉法

凡補瀉之法皆如前也若病人患熱者覺鍼氣至病所即退鍼三二分令病人口中吸氣鼻中出氣依本經生成數足覺鍼下陰氣隆至依前法出鍼若病人患寒者覺鍼氣至病所即進鍼至二三分令病人鼻中吸氣口中出氣依本經生成數足覺鍼下陽氣隆至依前法出鍼

灸法補瀉

黃帝鍼經云云氣盛則瀉之氣虛則補之以火補者毋吹其火須待自滅也以火瀉者疾吹其火催其艾火滅也

造度量權衡法

丁德用註難經云其升斗秤尺四者先止其尺然後造其升斗秤兩皆以同身寸為以尺造斗面闊一尺底闊七寸高四寸俱後三分可容十升凡以木之脂脈全者方一寸為兩十六方為一斤此制同身寸尺升斗之度為人之腸胃輕重長短之法也潔古老人云丁公註當

求寸法

黃帝明堂灸經有云岐伯明堂經云以八寸為尺以五分為一寸人緣有長短肥瘦不同取穴不準秦時扁鵲明堂云取男左女右手中指第一節為一寸為緣人有身長手短手長身短取穴不準唐時孫思邈明堂經云取病人男左女右大拇指節橫紋為一寸以意消詳巧拙在人亦有差身今取男左女右手中指第二節內度兩橫紋相去為一寸自取此寸法與人著灸療病已來多得獲愈此法有準今已為定矣素問要旨論云取灸之法以從男左女右以中指與大指相其如環無端度中指上側兩橫紋之際為一寸也

衛生寶鑑卷二十終

元羅天益謙甫著

三原李錫齡孟熙校刊

炮炙藥類

古人用藥治病擇淨口咀嚼水煮服謂之炮炙後人用鋼刀細剉桶內剉過以竹篩齊之藥有氣味厚薄升降浮沉補瀉各各不同今詳錄之及揀擇製度修合之法具列于後

風升生（味之薄者陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也）

防風（氣溫味辛）療風通用瀉肺實散頭目中滯氣除上焦風邪之仙藥也誤服瀉人上焦元氣去蘆并叉殺鋼碎剉桶內剉過竹篩齊之用

升麻（氣平微苦）此足陽明胃足太陰脾行經藥也若補其脾胃非此為引用不能補若得葱白香白芷之類亦能走手陽明後陰能解肌肉間熱此手足陽明傷風之的藥也刮去黑皮兼腐爛裏白者佳鋼碎剉桶內剉過竹篩齊之用

羌活（氣微溫味苦甘平）治肢節疼痛利諸節手足太陽風藥也加川芎治太陽少陰頭痛透關利節去黑皮并腐爛鋼碎剉桶剉過竹篩齊之用

獨活（氣微溫味苦甘平）足少陰腎行經藥也若與細辛同用治少陰經頭痛一名獨搖草得風不搖無風自搖動去皮淨鋼碎剉桶剉過竹篩齊之用

柴胡（氣平微寒味苦）除虛勞煩熱解肌去熱早晨潮熱此少陽厥陰行經藥也婦人產前產後必用之藥善除本經頭痛非他藥能止治心下痞胸脇痛去蘆鋼碎剉桶剉過竹篩齊之用

前胡（氣微寒味苦）主痰滿胸脇中痞心腹強氣治傷寒熱實明目益精推陳致新半夏為使鋼剉用

葛根（氣平味甘）治脾胃虛而渴除胃熱解酒毒通行足陽明之經去皮鋼碎剉桶剉竹篩齊之用

茯苓仙（氣溫味甘一作苦）主諸風濕冷宣通五臟腹內痞滯腰膝冷疼及治折傷鐵足者佳去蘆鋼細用

細辛（氣溫味大辛）治少陰頭痛如神當少用獨活為使去蘆并葉華州者佳鋼細用

香白芷（氣溫味大辛）治手陽明頭痛中風寒熱解利藥也以四味升麻湯中加之通行手足陽明經先鋼碎剉桶內剉過竹篩齊之用

桔梗（氣微溫味辛苦）治咽喉痛利肺氣去蘆米泔浸一宿焙乾鋼碎剉桶剉竹篩齊用

棗核子（氣平味辛）主風毒腫利咽膈吞一枚可出瘡疽頭搗細用

藁本（氣溫味大辛）此太陽經風藥治寒氣鬱結於本經頭痛大寒犯腦令人腦痛齒亦痛鋼細用

川芎（氣溫味辛）補血治血虛頭痛之聖藥也姙婦胎動數月加當歸二味各二錢水二盞煎至一盞服之神效搗細以紗羅羅細用

蔓荊子（氣清味辛溫）治太陽頭痛昏悶除頭昏目暗散風邪之藥也胃虛人不可服恐生痰揀搗用

秦艽（氣微寒味苦）主寒熱邪氣寒濕風痺下水利小便療黃病骨蒸治口噤及腸風瀉血去蘆頭鋼碎剉桶內剉竹篩齊之用

天麻（氣平味苦）治頭風諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋骨挫用苗謂之定風草

麻黃（氣溫味苦）發太陽少陰經汗去蘆鋼微搗碎者三二沸掠去上沫不然令人心煩

荊芥穗（氣溫味辛苦）辟邪毒利血脈宣通五臟不足氣能發汗除勞冷搗和酥封毒腫去枝手搓碎用

薄荷（氣溫味苦辛）能發汗通關節解勞乏與蘇相宜新病人不可多食令人虛汗不止去枝莖及黃葉搓碎用之

熱浮長（氣之厚者陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也）

黑附子（氣熱味大辛）其性走而不守亦能除腎中寒甚白朮爲佐謂之朮附湯除寒濕之聖藥溫藥中少加之通行諸經引用藥也及治經閉慢火炮裂銼細用

川烏頭（氣熱味大辛）療風痺血痺半身不遂行經藥也先以慢火炮裂刮去皮臍銼細用

肉桂（氣熱味大辛）補下焦相火不足治沈寒痼冷之病及表虛自汗春夏爲祭藥也去皺擣用

桂枝（氣熱味甘辛）仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者乃桂條也非身幹也取其輕薄而能發散今又有一種柳桂乃嫩小桂條也尤宜入治上焦藥用也以銼碎用

木香（氣熱味辛苦）除肺中滯氣若療中下焦氣結滯須用槟榔爲使廣州者佳銼細用

丁香（氣溫味辛）溫脾胃止霍亂消痰癖氣膈反胃腹內冷痛壯陽煖腰膝殺酒毒擣細用

白荳蔻（氣熱味大辛）蕩散肺中滯氣主積冷氣寬膈止反胃吐逆消穀下氣進食去皮擣細用

草荳蔻（氣熱味大辛）治風寒邪客在於胃口上善去脾胃客寒令人心胃痛麸裹煨熟擣細用

益智仁（氣熱味大辛）治脾胃中受寒邪和中益氣治多唾於補中藥內兼用不可多服去皮擣細用

川椒（氣熱味辛）主邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目利五臟凡用炒去汗及合口者手搓細用

縮砂仁（氣溫味辛）治脾胃氣結滯不散主虛勞冷瀉心腹痛下氣消食擣細用

乾薑（氣熱味大辛）治沈寒痼冷腎中無陽脈氣欲絕與附子爲引用水同煎薑附湯是也亦治中焦有寒水洗慢火炮裂後挫細用

玄胡（氣溫味辛）破血治氣婦人月水不調小腹痛溫暖腰膝破散瘕瘕擣細用

乾生薑（氣溫味辛）主傷寒頭痛鼻塞上氣痰嗽止嘔吐生薑同治與半夏等分治心下急痛銼用

良薑（氣熱味辛）主胸中冷霍亂腰痛反胃嘔食轉筋瀉利下氣消宿食銼細用

吳茱萸（氣熱味苦辛）治寒在胃噦噎塞胸中經言咽膈不通食不下食則嘔令人口開目瞪寒邪所結氣不得上下此病不已令人寒中腹滿膨脹下利寒氣用之如神諸藥不可代也洗出苦味晒乾擣用

厚朴（氣溫味辛）能除腹脹若虛弱人雖腹脹宜斟酌用之寒脹是也大熱藥中兼用結者散之神藥也誤服脫人元氣切禁之紫色者佳去皮銼碎薑製微炒剉補剉竹篩齊用

茴香（氣平味辛）破一切與氣調中止嘔下食炒黃擣細用

紅花（氣溫味甘辛）主產後口噤血運腹內惡血不盡絞痛破流血神驗手搓碎用

神麯（氣溫味甘）消食治脾胃食不化須用於脾胃藥中少加之微炒黃用

濕化成（中央戊己土其本味甘）

戊己土其本味甘

濕化成中央戊己土其本味甘其藥氣溫溫寒熱在人以胃應之其藥味辛甘鹹苦在人以脾應之

人參（氣溫味甘）治脾肺陽氣不足及肺氣促短氣非升麻爲引用不能補上升之氣升麻一分人參三分可爲相得也若補下焦元氣瀉腎中火邪茯苓爲之使甘草柿子生用爲君此藥能補中緩中短氣少氣瀉肺脾胃火邪著去莖中痛或加苦楝酒煮玄胡爲主尤好尤效去蘆銼細用

黃芪（氣溫甘平）治虛勞自汗補肺氣實皮毛瀉肺中火脈弦自汗善治脾胃虛弱血脈不行瘡瘍內托陰證瘡瘍必用之去蘆銼碎剉桶剉竹篩齊之用

甘草（氣平味甘）生用大涼瀉熱火炙則溫能補上中下三焦元氣調和諸藥共爲力而不爭性緩善解諸急故有國老之稱去皮銼碎剉桶剉竹篩齊之用

苦梗（氣溫味甘）和血補血尾破血身和血用以溫水洗去土丙製焙晒乾去蘆銼細用

熟地黃（氣寒味苦）酒晒蒸如烏金假酒力則微溫大補血虛虛損血衰人須用善器製髮忌蘿蔔銼用

半夏（氣微寒味辛平）治寒痰及形寒飲冷傷肺而咳大和胃氣除胃寒進飲食太陽厥痰頭痛非此藥不能除也湯泡七次銼細用

白朮（氣溫味甘）能除濕益燥和中益氣利腰膝間血除胃中熱擣碎紗羅子羅過用

蒼朮（氣溫味甘）主治與白朮同若除上濕發汗功最大若補中焦除濕力少加白朮浸刮去皮擣細用

橘紅（氣溫味苦）能益氣加青皮減半去氣滯推陳致新若補脾胃不去白理胸中肺氣去白擣細用

青皮（氣溫味辛）主氣滯消食破積結膈去穢擣細用

藿香（氣微溫味甘辛）療風水去惡氣治脾胃吐逆霍亂心痛去枝莖用葉以手搓細用

檳榔（氣溫味辛）治後重如神性如鐵石之沈重能墜諸藥至於下極擣細用

廣茂（氣溫味苦平）主心腹痛飲食不消破痃癖氣最良火炮銼開擣細紗羅羅過用

京三棱（氣溫味辛苦）主老癖瘕積結塊婦人血脈不調心腹刺痛火炮銼開擣細紗羅羅過用

阿膠（氣微溫味甘平）主心腹痛血崩補虛安胎堅筋骨和血脈益氣止痢慢火炮肥搓細用

訶子（氣溫味苦）主腹脹滿飲食不下消痰下氣通利津液破胸膈結氣治久痢赤白腸風去核銼用

桃仁（氣溫味甘苦）治大便血結血秘血燥通潤大便七宣丸中用之專療血結破血瘀退去皮尖研如泥用

杏仁（氣溫味甘苦）除肺燥治氣燥在胸膈麸炒去皮尖用

大麥蘖（氣溫味鹹）補脾胃虛寬腸胃先擣細炒黃色取麸用

紫草（氣寒味苦）主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹脹服滿去土用茸銼細用之

蘇木（氣平味甘鹹）主破血產後血脹滿欲死排膿止痛消癰腫瘀血月經不調及血運口禁銼細用

燥降收（氣之薄者陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平寒涼是也）

茯苓（氣平味甘）能止渴利小便除濕益燥和中益氣利腰臍間血爲主治小便不通溺黃或赤而不利如小便利或數服之則大損人目如汗多人服之損元氣夭人壽醫云赤利白補上古無此說去皮搗細紗羅過用

豬苓（氣平味甘）大燥除濕此諸淡滲藥大燥亡津液無濕證勿服去黑皮白者佳搗羅過用

琥珀（氣平味甘）安五臟定魂魄消瘀血通五淋搗細紗羅子羅過用

滑石（氣寒味甘）性沈重能泄氣上令下行故曰滑則利竅治前陰竅澀不利利竅不比與滲淡諸藥同白者佳搗水飛用

瞿麥（氣寒味苦）主關格諸癃結小便不通治應癃排膿明目去翳破胎塵子下閉血逐膀胱邪熱去枝用穗銼細用

車前子（氣寒味甘）主氣癃閉利水道通小便除濕痺肝中風熱衝目赤痛搗細紗羅過用

木通（氣平味甘）主小便不通導小腸中熱去粗皮銼碎剉編剉竹篩齊用

燈草通草（氣平味甘）通陰竅澀不利利小水除水腫治五淋閉銼細生用

五味子（氣溫味酸）大益五臟之氣孫眞人云五月常服補五臟氣遇夏月季月間人困乏無力乃無氣以動也以黃芪人參麥門冬少加黃蘗剉煎湯服使人精神神氣兩足篤力湯出生用

白芍藥（氣微寒味酸）補中益之藥得炙甘草爲輔治腹中痛如夏月腹痛少加黃芩若惡寒腹痛加肉桂一分白芍藥三錢炙甘草一錢半此仲景神品藥也如冬月大寒腹中痛加桂一錢半水二盞煎一盞去粗銼碎剉編剉竹篩齊用

桑白皮（氣寒味苦微酸）主傷中五勞羸瘦補虛益氣除肺中水氣止嗽血熱渴消水腫利水道去皮銼剉編剉竹篩齊用之用

天門冬（氣寒味微苦）保肺氣治血熱復肺上喘氣促加黃芪人參用之爲主如神湯浸去心曬乾用

麥門冬（氣寒味微苦）治肺中伏火脈氣欬逆加五味子人參二味謂之生脈散補肺中元氣不足湯浸去心用

犀角（氣寒味苦酸）主傷寒溫疫頭痛安心神煩亂明目鎮肝治中風失音小兒麻豆風熱驚癇鎊爲末用之

烏梅（氣平味酸）主下氣除熱煩滿安心調中治痢止渴以鹽豉爲白梅亦入除痰藥去核銼編用

牡丹皮（氣寒味苦）治腸胃積血及衄血吐血之要藥犀角地黃湯中之一味也銼編用

地骨皮（氣寒味苦）解骨蒸肌主消渴去風濕痺堅筋骨去骨用皮剉編用

蓮翹（氣平味苦）治寒熱瘰癧諸惡瘡腫除心中客熱去胃癰逐五淋以手搓編用

枳殼（氣寒味苦）治胸中痞塞泄肺氣麩炒去穰搗編紗羅子羅過用

枳實（氣寒味苦酸鹹）除寒熱破結實消痰痺治心下痞逆氣脇痛麩炒去穰搗羅過用

寒沈藏（味之厚者陰中之陰味厚則泄酸苦鹹寒氣是也）

大黃（氣寒味苦）其性走而不守瀉諸實熱大腸不通蕩腸胃熱專治不大便去皮銼碎竹篩齊用

黃蘗（氣寒味苦）治腎下膀胱不足諸痿厥腰脚無力於黃芪湯中少加用之使兩足膝中氣力洞出痿軟即時去也塞炒爲編末治口瘡瘡瘍必用藥也去皮銼碎剉編剉竹篩齊用

黃芩（氣寒味微苦）治肺中濕熱療上熱目中赤腫瘀肉壅盛必用之藥泄肺受火邪上逆於腦上補膀胱之寒水不足乃滋其化源去皮并黑腐銼編剉編剉竹篩齊用

黃連（氣寒味苦）瀉心火除脾胃中濕熱治燥惡心煩熱在中焦兀兀欲吐治心下痞滿仲景云治九種心下痞瀉心湯皆用之去鬚銼碎用之

石膏（氣寒味甘苦）治足陽明經發熱憎熱躁熱潮熱自汗小便澁赤大渴引飲身體肌肉壯熱苦頭痛白虎湯是也善治本經頭痛若無此證醫者誤用有不可勝數也搗編羅用

萆薢（氣寒味甘）治赤目腫痛睛眼瘀肉高起痛不可忍以柴胡爲主治眼疾必用之藥也去蘆銼碎剉編剉竹篩齊用

生地黃（氣寒味苦）涼血補益腎水眞陰不足此藥大寒宜斟酌用恐傷人胃氣銼編用

知母（氣寒味大辛）治足陽明火熱大補益腎水膀胱之寒刮去黑皮苗裏白者佳銼編用

漢防己（氣寒味大苦）療腰以下至足濕熱腫盛脚氣膀胱去留熱行十二經去皮銼編剉編剉竹篩齊用

芎藭（氣微寒味苦平）除煩熱主風濕寒熱邪氣熱結黃疸遍身發黃小便不利去枝用葉手搓碎用

朴硝（氣寒味苦辛）除寒熱邪氣逐六腑積聚結固血癖胃中食飲熱結血閉去停痰痞滿消毒生用

萆薢根（氣寒味苦）主消渴身熱煩滿大熱補虛安中通月水消腫毒瘰疬及熱狂瘡瘍搗編羅過用

牡蠣（氣微寒味鹹平）主傷寒寒熱溫瘧女子帶下赤白止汗心痛氣結澁大小腸治心胸下痞燒白搗羅用

苦參 氣寒味微苦 足少陰腎經之君藥也治本經須用銷細剉

橘刺竹節膏之用

地榆 氣微寒味甘酸 主產乳七傷帶下月經不止血崩之病除惡血止痛治腸風泄血小兒痫病性沈寒入下焦治熱血病用

川楝子 氣寒味苦平 主傷寒大熱煩躁殺三蟲疥瘍通利大便小便搗細用

山梔子 氣寒味微苦 治心煩懊憹煩不得眠心神顛倒欲絕血滯小便不利搗細用

香豉 氣寒味苦 主傷寒頭痛煩燥滿悶生用之

白虎湯 氣味厚薄寒熱之甘

桂枝湯 陰陽升降之圖之甘

升降者天地之氣交

茯苓 淡爲在天之陽陽也陽當上行何爲水利而泄下經云氣之薄者乃陽中之陰所以茯苓利水而泄下然面泄下亦不離乎陽之體故入手太陽也

麻黃 苦爲在地之陰陰也陰當下行何謂發汗而升上經云味之薄者乃陰中之陽所以麻黃發汗而升上亦不離乎陰之體故入手太陰也

附子 熱氣之厚者乃陽中之陽故經云發熱

大黃 苦味之厚者乃陰中之陰故經云泄下

粥 淡爲陽中之陰所以利小便

茶 苦爲陰中之陽所以清頭目

清陽發腠理 清之清者也

清陽實四肢 清之濁者也

濁陰歸六腑 濁之濁者也

濁陰走五藏 濁之清者也

藥性要旨

苦藥平升微寒平亦升甘辛藥平降

甘寒瀉火苦爲瀉濕熱苦甘寒瀉血熱

用藥升降浮沈補瀉法

肝膽 味辛補酸瀉 氣溫補涼瀉 肝膽之經酸寒熱不同逆順互換入表裏法

心小腸 味鹹補甘瀉 氣熱補寒瀉 三焦命門補瀉同

脾胃 味甘補苦瀉 氣溫涼寒熱補瀉 各從其宜逆從互換入表裏法

肺大腸 味酸補辛瀉 氣涼補溫瀉

腎膀胱 味苦補鹹瀉 氣寒補熱瀉

五藏更相平也若一藏不平所勝平之此之謂也故云安穀則昌絕穀則亡水去則榮散穀消則衛亡榮散衛亡神無所居仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脈道乃行故血不可不養氣不可不溫血溫氣和榮衛流行常有天命

藏氣法時補瀉法

肝苦急急食甘以緩之 心苦緩急食酸以收之

肺苦氣上逆急食苦以泄之 脾苦濕急食苦以燥之

腎苦燥急食辛以潤之 開腠理致津液通氣也

肝欲散急食辛以散之 以辛補之以酸瀉之

心欲軟急食鹹以軟之 以鹹補之以甘瀉之

脾欲緩急食甘以緩之 以甘補之以苦瀉之

肺欲收急食酸以收之 以酸補之以辛瀉之

腎欲堅急食苦以堅之 以苦補之以鹹瀉之

此五者有辛酸甘苦鹹各有所利或散或收或緩或急或軟或堅四時五藏病隨五味所宜也

君臣佐使法

帝曰方治君臣何謂也岐伯曰主病之爲君佐君之爲臣應臣之爲使非上中下三品之爲也帝曰三品何謂曰所以別善惡之殊貴也

凡藥之所用者皆以氣味爲主補瀉在味隨時換氣主病者爲君假令治風者防風爲君治上焦熱黃芩爲君中焦熱黃連爲君下焦濕熱防己爲君治寒附子之類爲君看兼見何證以佐使藥分治之此制方之要也本草說上品藥爲君各從其宜

治法綱要

氣交變論說五運太過不及云云夫五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之化者應之變者復之此生長化成收藏之理氣之常也失常則天地四塞矣失常之理則天地四時之氣無所運行故動必有靜靜必有復乃天地陰陽之道也

抑舉辨

假令高者抑之非高者固當抑也以其本下而失之太高故抑之而使下若本高何抑之有

假令下者舉之非下者固當舉也以其本高而失之太下故舉之而使高若本下何舉之有

用藥用方法

仲景治表虛制桂枝湯桂枝味辛熱發散助陽體輕本乎天者親上故桂枝爲君芍藥甘草佐之陽脈滑陰脈弦法當腹中急痛仲景制小建中湯芍藥味酸寒主收補中本乎地者親下故芍藥爲君官桂甘草佐之一則治表虛一則治裏虛各言其主用也後之人用古方者觸類而長之則知其本而不至於差誤矣

藥味專精

至元庚辰六月中許伯威五旬有四中氣本弱病傷寒八九日醫者見其熱甚以涼劑下之又食梨三四枚傷脾胃

四肢冷時昏憒請予治之診其脈動而中止有時自還乃結脈也亦心勁悸吃噫不絕色青黃精神減少目不欲開倦臥惡人語予以炙甘草湯治之成無已云補可去弱人參大棗甘補不足之氣桂枝生薑辛金正氣五臟變弱榮衛澀流潤之麻仁阿膠麥門冬地黃之甘潤經益血復脈通心加桂枝人參急扶正氣減生地黃恐損陽氣劑一兩服之不效予再思脈病對藥非藥陳腐而不效乎再於市鋪選嘗氣味厚者再煎服之其病減半再服而愈凡藥昆蟲草木生之有地根葉花實採之有時失其地性味少異失其時氣味不全又況新陳不同精粗不等倘不擇用用之不效醫之過也內經云司藏備物氣味之專情也倦台之際宜加意焉

元羅天益謙甫著

三原李錫齡孟熙校刊

北方下疰腳氣論

內經云太陽之勝火氣內鬱流散於外足胻附腫飲發於中附腫於上又云脾脈搏堅而長其色黃當病少氣其耎而散色不澤者當病足胻腫若水狀也脾病者身重肉痿足不能行善痿脚下痛此穀入多而氣少濕居下也故濕從下受之如上所說皆謂脾胃濕氣下流乘其肝腎之位由是足脛疼痛而附腫也夫五穀入胃糟粕津液宗氣分為二隧故宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸焉營氣者泌其津液注之於脈化而為血以營四末內注五臟六腑以應刻數焉衛氣者出悍氣之慓疾而先行於四末分肉之間行而不休者也又宗氣之道內殺為貪咎而於胃乃傳之於脈流溢於中布散於外精專者行於經隧常營無已終而復始是謂天地之紀或飲食失常胃氣不能鼓舞脾氣不能運化行於百脈其氣下流乘其肝腎土木水相合下注於足胻附腫而作疼痛吾蘇敬號為脚氣是也凡治此疾每且早飯任意飽食午飯少食日晚不食彌佳恐傷脾胃營運之氣失其天度況夜食則血氣壅滯而行陰道愈增腫痛古之人少有此疾自永嘉南渡衣纓士人多有之大唐開闢爪牙之士作鎮於南極其地卑濕霧露所聚不習水土往者皆道之關西河北人皆不此疾外臺祕要總錄亦說江東嶺南大率有此此蓋濕襲虛傷於下故經云感則害人皮肉筋骨者也故制方立論皆詳其當時土地所宜而治之今觀此方爽愷（明爽明愷燥也）而無卑濕之地況膩理緻密外邪難侵而有此疾者何也蓋多飲乳酪酥酒水濕之屬也加以奉養過度以滋其濕水之潤下氣不能响之故下疰於足胻積久而作腫滿疼痛此飲之下流之所致也豈可與南方之地同法而治哉當察其地勢高下詳其飲食居處立為二法一則治

地之濕氣一則治飲食之下流隨其氣宜用藥施治使無疾之苦庶幾合軒岐之旨哉孫眞人云醫者意也隨時增損物無定方眞知言哉

北方腳氣治驗

中書枯合公年四旬有餘驅幹魁梧丙辰春從征至揚州北之東武隅腳氣忽作徧身肢體微腫其痛手不能近足脛尤甚履不任穿跣以騎馬控兩鐙而以竹器盛之以困急來告予思內經有云飲發於中附腫於上又云諸痛為實血實者宜決之以三棱鍼數刺其腫上血突出高二尺餘漸漸如線流於地約半升許其色紫黑頃時腫消痛減以當歸拈痛湯重一兩半服之是夜得睡明日再服而愈本草十劑云宜可去蠱疰可去滯內經云濕淫於內治以苦溫羌活苦辛蹇關節而勝濕防風甘辛溫散經絡中留濕故以為主水性潤下升麻葛根苦辛平味之薄者陰中之陽引而上行以苦發之也白朮苦甘溫和中勝濕蒼朮能輕浮氣力雄壯能去皮膚腠理間濕故以為臣夫血壅而不流則痛當歸身辛溫以散之使血氣各有所歸人參甘草甘溫補脾胃養正氣使苦劑不能傷胃仲景云濕熱相合肢節煩疼苦參黃芩知母茵陳苦寒乃苦以泄之者也凡酒製炒以為因用治濕不利小便非其治也豬苓甘溫平澤瀉滲平淡以滲之又能導其留飲故以為佐氣味相合上下分消其濕使壅滯之氣得宜通也

當歸拈痛湯治濕熱為病肢體煩疼肩背沈重胸膈不利下疰於脛腫痛不可忍

甘草炙　茵陳蒿酒炒　酒黃芩
羌活各半兩　防風　知母酒洗
豬苓去皮　澤瀉　當歸身各三錢
苦參瓦焙　升麻　黃芩炒
人參　葛根
白朮一錢半　蒼朮各二錢

右㕮乳每服一兩水二盞半先以水拌濕蒸少時煎至一盞去柤慢服食前待少時美膳壓之

病有遠近治有緩急

征南元帥不繹吉歹辛酉八月初三戊時生年七旬丙辰春東征南迎至楚王諸路迎送多獻酒醴因而過飲遂腹痛勝嗚自利日夜約五十餘行咽嗌麻痛耳前後赤腫舌本強涎唾稠粘欲吐不能出以手探之方出言語艱難反側煩亂夜不得眠使來命予診得脉浮數按之沈細而弦自聞中書粘公曰仲景言下利清穀身體疼痛急當救表救裏四逆湯救表桂枝湯總帥今後清便自調急當救表救裏四逆湯救表桂枝湯總帥今冒氣不守下利清穀腹中疼痛難宜急治之比之咽嗌猶可少待公曰何謂也答曰內經云搖發於咽嗌名曰猛瘋此疾治遲則塞咽塞咽則氣不通氣不通則半日死故宜急治於是遂砭刺腫上紫黑血出頃時腫勢大消遂用桔梗甘草連翹柔粘酒製黃芩升麻防風等分㕮咀每服約五錢水煮清令熱漱冷吐去之喉之恐傷脾胃自利轉甚再服涎消腫散神言聲出後以神應丸辛熱之劑以散中寒解化宿食而燥脾濕丸者取其不節施化則不犯其上熱至其病所而後化乃治主以緩也不數服利止痛定後胸中閉塞作痞而痛予思靈樞有云焦如霧宜五谷味薰膚充身澤毛若霧露之溉是為氣也今相公年高氣弱自利無度致胃中生發之無不能滋養於心肺故閉塞而痛經云上氣不足推而揚之脾不足者以甘補之再以異功散甘辛微溫之劑溫養脾胃加升麻人參上升以順正氣不數服而胸中快利而痛止內經云調氣之方必別陰陽內者內治外者外治微者調之其次平之勝者奪之甚者奪其位利萬事萬全又曰病有遠近治有緩急無越其製度又曰急則治其標緩則治其本此之謂也

斯寒治驗

征南副元帥大忒木兒年六旬有八戊午秋征南予從之過揚州十里時仲冬病自利完穀不化腹痛疼足厥寒以手探之不知痛痒嘗燒石以溫之亦不得暖予診之脉沈細而微予思之年高氣弱深入敵境軍事煩冗朝暮形寒飲食失節多飲乳酪履於卑濕陽不能外固由是清濁雜處病起於下故厥寒而逆內經云感於寒而受病微則為咳壅則為泄為痛此寒濕相合而為病也法當急退寒熱之邪峻補其陽非灸不能病已先以大艾炷於氣海灸百壯補下焦陽虛次灸三里二穴各三七壯治厥寒而逆且接引陽氣下行又灸三陰交二穴以散足受寒濕之邪遂處方云寒淫所勝治以辛熱濕淫於外平以苦熱以苦發之以附子大辛熱助陽退陰溫經散寒故以為君乾薑官桂大熱辛甘亦除寒濕白朮半夏苦辛溫而燥脾濕故以為臣人參草薑甘草甘辛大溫溫中益氣生薑大辛溫能散清濕之邪德白辛溫以通上焦陽氣故以為佐又云補下治下制以急急則氣味厚故大作劑服之不數服瀉止痛減足厥漸溫調其飲食過十日平復明年秋還舊陽值霖雨閣旬餘前證復作再依前灸添陽輔各灸三七壯再以前藥投之數服良愈

加減白通湯治形寒飲冷大便白利完穀不化腹冷痛足厥寒而逆

附子炮去皮臍　乾薑炮各一兩　官桂去皮

甘草炙　半夏湯炮七次　草豆蔻麵裹煨

人參　白朮各半兩

右入味㕮每服五錢水二盞半生薑五片葱白五莖煎一盞三分去柤空心宿食消盡溫服

氣滯一穴在臍下一寸五分任脉所發三里二穴在膝下三寸厥外廉兩筋間取足辜之足陽明脉所入合也可灸三壯鍼入五分

三陰交二穴足內踝上三寸骨下陷中足太陰少陰脉陰之交會可灸三壯鍼入三分

隨會絕骨鍼經云髓會絕骨在外踝上輔骨下當脛中是也髓會之處也緊古老人云頭熱如火足冷如冰可灸陽輔穴又云厥陰冷絕骨取之

陽輔二穴在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分去上廉七寸足少陽脉之所行也可灸三七壯鍼入五分

由是副帥疾愈以醫進爵重待予彌厚

肝勝乘脾

真定路總管劉仲美年踰六旬宿有脾胃虛寒之證至元辛巳閏八月初天氣陰寒因官事勞役渴而飲冷夜半自利兩行平旦召予診視其脉弦細而微四肢冷手心寒唇舌皆有褐色腹中微痛氣短而不思飲食予思內經云色脉者所以肝屬木唇者脾也脾屬土木來剋土故青色見於唇也舌者心之官水挾木勢制火淫脾故色青見於舌也難經有云見肝之病則知肝當傳之於脾故先實其脾氣今脾已受肝之邪矣潔古先師云假令五臟勝各刑己勝補不勝而瀉其勝重實其不勝微瀉其勝而以黃芪建中湯加芍藥附子主之且芍藥味酸瀉其肝木微瀉其勝黃芪甘草甘溫補其脾土是重實其不勝桂附辛熱瀉其寒水又助陽退陰飴糖甘溫補脾之不足肝苦急急食甘以緩之生薑大棗辛甘大溫生發脾胃升騰之氣行其榮衛又能緩其急每服一兩依法水煎服之再服而愈

黃芪建中湯 治方藥懷遠藥御附子

風疾治驗

參政楊公七旬有二宿有風疾於至元戊辰春忽病頭旋眼黑目不見物心神煩亂兀兀欲吐復不吐心中如懊憹之狀頭偏痛微腫而赤色足厥冷命予治之予料之此少壯之時喜飲酒久積濕熱於內風痰內作上熱下寒是陽不得交通否之象也經云治熱以寒雖良工不敢廢其繩墨而更其道也然而病有遠近治有輕重參政今年高氣弱上焦雖盛豈敢用寒涼之劑損其脾胃經

云熱則疾之又云高巢之上射而取之弓以三梭鍼約二寸餘處刺之其血紫黑如蟲珠之狀少頃頸目便覺清利諸經悉皆遂處方云審黑頭旋虛風內作非天麻不能除天麻苗謂之定風草此草獨不爲風所搖故以爲君頭偏痛者乃少陽也非柴胡黃芩酒製不能治黃連苦寒酒炒以治上熱又爲因用故以爲臣橘皮苦辛溫炙甘草甘溫補中益氣爲佐生薑半夏辛溫能治風痰茯苓甘平利小便導濕熱引而下行故以爲使服之數服邪氣平生氣復而安矣

天麻半夏湯治風痰內作胸膈不利頭旋眼黑兀兀欲吐上熱下寒不得安臥

天麻　半夏各一錢　橘皮去白　柴胡各七分　黃芩酒製炒　甘草炙　白茯苓去皮　前胡各五分　黃連三分去鬚

右九味㕮咀都爲一服水二盞生薑三片煎至一盞去柤溫服食後忌酒麵生冷物

明年春參政除僕孟路總管以古風一關見贈云書生暮年私自憐百病交遭無由痊自知元氣不扶老肝木任縱心火燃上炎下走不相侧一身坐受陰陽偏一月十五疾一作一作數日情恍然心抨抨兮如危弦頭濛濛兮如風船去年臥病幾半載兩耳但覺鳴秋蟬羅君赴召來幽燕與我似有前生緣藥投涼冷恐傷氣聊以砭石加諸巔二十餘刺若風過但見鬱氣上突羣白烟胸懷洒落頭目爽塵坌一灑清冷淵東垣老人醫中仙得君門下爲單傳振枯起怯入生眛倒生迴死居十全方今草野無遺賢姓名已達玉堂前病藥報君爲一賦欲使恩澤相周旋青囊祕法不可惜要令袁杨齊天年

元羅天益謙甫著　三原李鏞齡孟照校刊

上熱下寒治驗

中書右丞姚公茂六旬有七宿有時毒至元戊辰春因酒病發頭面赤腫面痛耳前後腫尤甚胸中煩悶咽嗌不利身半以下皆寒足腫尤甚由是以牀相接作炕身半以上臥於牀身半以下臥於炕飲食減少精神困倦而體弱命予治之診得脉浮數按之弦細上熱下寒明矣內經云熱勝則腫又曰春氣者病在頭難經云者則腫熱砭刺之也蓋取其易散故也遂於腫上約五十餘刺其血紫黑如蟲珠之狀既時腫痛消散又於氣海中灸艾壯灸百狀乃助下焦陽虛退其陰寒次於三里二穴各灸三七壯治足厥冷亦引導熱氣下行故也遂處一方名曰既濟解毒湯以熱者寒之然病有高下治有遠近無越其制度以黃芩黃連苦寒酒製炒亦爲因用以瀉其上熱以爲君柿樓甘草辛甘溫上升佐諸苦藥以治其熱柴胡升麻苦平味之薄者陽中之陽散發上熱以爲臣連翹苦辛平以散結消腫當歸辛溫和血止痛酒煨大黃苦寒引苦性上行至巔驅熱而下以爲使投劑之後腫消痛減大便利再服減大黃微令節飲食不旬日頁愈

既濟解毒湯治上熱頭目赤腫而痛腫腫脹悶不得安臥身半以下皆寒足厥尤甚大便微祕

大黃酒蒸大便利勿用　黃連酒製炒　黃芩酒製炒　甘草炙　柴胡　桔梗各二錢　當歸身各錢

升麻　連翹

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去柤食後溫服忌酒濕麵大料物及生冷硬物

陽證治驗

真定府趙吉夫約年三旬有餘至元丙寅五月間因勞役飲食失節傷損脾胃時發頭痛而渴又食冷物過度遂病身體困倦頭痛四肢逆冷嘔吐心下痞乃用桂末三錢以熱酒調服仍以厚衣覆之作陰毒傷寒治之須臾汗大出汗後即添口乾舌澀眼白睛紅項強硬肢體不柔和小便淋赤大便祕澀循衣摸牀如發狂狀問之則言語錯亂視其舌則赤而裂朝輕暮劇凡七入日家人皆自謂危殆不望生全鄰人吉仲元舉予治之診其脉六七至知其熱證明矣遂用大承氣湯苦辛大寒之劑一兩作一服服之利下三行折其勝勢翌日以黃連解毒湯大苦寒之劑二兩使徐徐服之以去餘熱三日後病十分中減之五六更與白虎加人參湯約半斤服之瀉熱補氣前證皆退戒以慎起居節飲食月餘漸得平復內經曰凡用藥者無失天時無逆氣宜無害其勝無贊其復是謂至治又云必先歲氣無伐天和當暑氣方盛之時聖人以寒涼藥急救腎水之原補肺金之不足雖有傷寒傷人仲景用麻黃湯內加黃芩知母石膏之類發黃發狂又有桂枝湯之戒況醫者用桂末熱酒調服此所謂差之毫釐謬之千里此遊仲景之治法經云不伐天和不贊其復不棄其勝不失氣宜不然則故病未已新病復起矣

苦黃治驗

至元丙寅六月時雨霖霪人多病瘟疫真定韓君祥因勞役過度渴飲涼茶及食冷物遂病頭痛肢節亦疼身體沈重胸滿不食自以爲外感傷用通聖散兩服藥後添身體困甚方命醫治之醫以百解散發其汗越四日以小柴胡湯二服後加煩熱嘔渴又六日以三一承氣湯下之嘔渴尤甚又投白虎加人參柴胡飲子之類病愈增又易醫用黃連解毒湯硃砂膏至黃丹之類至十七日後病勢轉增傳變身目俱黃肢體沈重背惡寒皮膚冷心下痞硬按之而痛服藥不欲開目嗜不了了懶言語自汗小便利大便了而不了命予治之診其脉緊細按之虛空兩寸脉短不

及本位此證得之因時熱而多飲冷加以寒涼藥過度助水乘心反來侮土先因其母後薄其子經云薄所不勝乘所勝也時值霖雨乃寒濕相合此爲陰證發黃則也予以茵陳附子乾薑湯主之內經云寒注於內治以甘熱佐以苦辛濕注所勝平以苦熱以淡滲之以苦燥之附子乾薑辛甘大熱散其中寒故以爲主半夏草豆蔻辛熱白朮陳皮苦甘溫建脾燥濕故以爲臣生薑辛溫以散之澤瀉甘平以滲之枳實苦微寒泄其痞滿茵陳苦微寒其氣輕浮佐以薑附能去膚腠間寒濕而退其黃故爲佐使也煎服一兩前證減半再服悉去又與理中湯服之數日氣得平復或者難曰發黃皆以爲熱今暑雨盛之時又以熱藥治之何也予曰理所當然不得不然成無已云陰證有二一者始外傷寒邪陰經受之或因食冷物傷太陰經也二者始得陽證以寒治之寒涼過度變陽爲陰也今君辯因天令暑熱冷物傷脾過服寒涼陰氣大勝陽氣欲絕加以陰雨寒濕相合發而爲黃也仲景所謂當於寒濕中求之李照願云解之而寒涼過劑瀉之而逐寇傷君正以此也聖賢之制豈敢越哉或者曰深古之學有自來矣

茵陳附子乾薑湯治因涼藥過劑變爲陰證身目俱黃四肢皮膚冷心下痞硬眼澀不欲開自利跛臥

附子炮去皮臍三錢　乾薑炮二錢　茵陳一錢二分
白朮四分　草豆蔻麩裹煨一錢　白茯苓去皮三分
枳實麩炒　半夏湯泡七次　澤瀉各半錢
陳皮去白三分

右十味㕮咀爲一服水一盞半生薑五片煎至一盞去粗涼服不拘時候

肢節腫痛治驗

眞定府張大年二十有九素好嗜酒至元辛未五月間病手指節腫痛屈伸不利膝腕亦然心下痞滿身體沉重不欲飲食食即欲吐面色萎黃精神減少至六月間來求予

治之診其脈沈而緩緩者脾也難經云脾主體重節痛脾者脾之所主四肢屬脾薑其人素飲酒加之時助濕氣大勝流於四肢故爲腫痛內經云諸濕腫滿皆屬脾土仲景云濕流關節肢體煩痛此之謂也宜以大羌活湯主之內經云濕淫於內治以苦溫以苦發之以淡滲之又云風能勝濕羌活獨活苦溫透關節而勝濕故以爲君升麻苦平蔥蘆佩防風蒼朮苦辛溫發之者也故以爲臣血壅而不流則痛當歸辛溫以散之甘草甘溫益氣緩中澤瀉鹹平茯苓甘平導濕而利小便以淡滲之也使氣味相合上下分散其濕也

大羌活湯

羌活　升麻各一錢　獨活七分
蒼朮　蔥蘆仙去蘆　防風去蘆
白朮　當歸　白茯苓去皮
澤瀉各半錢

右十味㕮咀作一服水二盞煎至一盞去粗溫服食前一服食後一服忌酒麵生冷硬物

中寒治驗

參政商公時年六旬有二元有胃虛之證至元己巳夏上都住時值六月霖雨大作連日不止因公務勞役過度致飲食失節每且則臍腹作痛腸鳴自利須去一二行乃少定不喜飲食懶於言語身體倦困召予治之予診其脈沈緩而弦參政以年高氣弱脾胃宿有虛寒之證加之霖雨及勞役飲食失節重虛中氣難經云飲食勞倦則傷脾不足而往有餘陷之若歲火不及寒乃大行民病驚瘧今脾胃正氣不足腎水必挾木勢反來侮土乃薔所不勝乘所勝也此疾非甘辛大熱之劑則不能瀉水補土雖夏暑之時有用熱建熱之戒又云有假者反之是從權而治其急也內經云寒淫於內治以辛熱乾薑附子辛甘大熱以瀉寒水用以爲君脾不足者以甘補之人參白朮甘草陳皮

苦甘溫以補脾土胃寒則不欲食以生薑草豆蔻辛溫治脅寒犯胃厚朴辛溫厚腸胃白茯苓甘平助薑附以導寒濕白芍藥酸微寒補金瀉木以防熱傷肺氣爲佐也不數服效愈

附子溫中湯治中寒腹痛自利米穀不化脾胃虛弱不喜飲食懶言語困倦嗜臥

乾薑炮　黑附子炮去皮臍各七錢　人參去蘆　甘草炙
白茯苓去皮　白朮各五錢　白芍藥
厚朴薑製　陳皮各三錢　草豆蔻麩裹煨去皮

右十味㕮咀每服五錢或一兩水二盞半生薑五片煎至一盞三分去粗溫服食前時不可進

中書左丞張仲謙年五十二歲至元戊辰春正月在大都患風證半身麻木一醫欲汗之未決可否命予決之予曰治風當通因通用汗之可也然此地此時雖交春令寒氣猶存汗之則虛其表必有惡風寒之證仲謙欲速瘥遂汗之身體輕快後數日再來邀予視之曰果如君言官事繁劇不敢出門當如之何予曰仲景云大法夏宜汗陽氣在外故也今時陽氣尚潛初出於地汗之則使氣亟奪衛氣失守不能肥實腠理表上無陽見風必大惡矣內經曰氣者衛外而爲固也又云陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰當汗之時猶有過汗之戒況不當汗而汗者乎遂以黃芪建中湯加白朮服之滋養脾胃生發榮衛之氣又以溫粉換其皮膚待春氣盛表氣漸實即愈矣內經曰心不可伏時不可逢此之謂也

黃芪建中湯見勞倦門於方中加白朮

衛生寶鑑卷二十三終

元暴天發謙甫著　三原李濬齋重熙校刊

論直腸證辨

鄂江府提刑李君長子年一十九歲至元壬午四月間頻傷寒九日醫者作陰證治之與附子理中丸數服其證增劇別易一醫作腸證議論差互不敢服藥李君親來邀請予爲決疑予辭以李君拜泣而告曰太醫若不一往大子無待死矣不獲已遂往觀之坐間有數人予不欲直言其證但細爲分解使自忖度之凡腸證者身須大熱而手足不厥厥則坦然起則有力不懸寒反惡熱不喜湯而飲水煩渴不欲食小便自利大便反而飲水煩渴不得眠能食而多飲其脈浮大而數者腸證也凡陰證者身不熱而手足厥冷惡寒踡臥面向壁臥惡聞人聲或自引衣蓋覆不煩渴不欲食小便自利大便反快其脈沈細而微遲者皆陰證也診其脈沈數得六七至其母云夜來叫呼不能全不得睡又喜冰水予問其言腸證悉具且三日不見大便宜急下之予遂秤酒煙大黃六錢炙甘草二錢芒硝二錢水煎服之至夕下數行燥糞二十餘塊是夜汗大出翌日又往觀之身涼脈靜矣予思來問熱論云始之各通其脈厥故仲景建傷寒論六經各異傳受不同活人書亦云凡治傷寒先須明經絡若不曉經絡傳途其行前進後墜其撰一也脈者不學經絡不同病源挨寸量尺妄意疾證不知邪氣之所在動致顛覆終不肯悔韓文公曰醫之病病在少思理到之言勉人學問教生之心重矣

解惑

省郎中張子敬六十七歲病眼目昏暗臂微黑色皮膚不潤六脈弦細而無力一日出示治眼二方問予可服否予曰此藥皆以黃連大苦之藥爲君諸眼藥爲使凡人年五十腎汁減而目始不明內經云土位之主其薄以苦諸眼藥亦皆海土人年七十腎司虛而皮膚枯皇蕩其土使腎

同之氣愈虛而不能營運營衛之氣益衰元氣胃氣不能上行膈氣吐食諸病生焉又已年高衰弱起居皆不同此藥不可服只宜慎言節飲食戒怒室慾此不治之治也子敬以爲然明年春除關西路按察使三年致仕遂精神濟勝脈遂平和此不妄服寒藥之效也內經曰誅罰無過是謂大惑解之可也

執方用藥辨

省掾曹德裕男婦三月初病傷寒八九日請予治之脈得沈細而微四肢逆冷自利腹痛自不欲開兩手常抱腹下昏昏嗜臥口舌乾燥乃曰前醫皆白虎加人參湯一服可服否予曰白虎湯云治口燥舌乾若執此一句亦未然今此證不可用白虎者有三傷寒論云立夏已前處暑已後不可妄用一也太陽證無汗而渴者不可用二也況病人陰證悉具其時春氣尚寒不可用三也仲景云下利清穀急當救裏宜四逆湯遂以四逆湯三兩加人參一兩生薑十餘片連鬚葱白九莖水五大盞同煎至三盞去柤分三服一日服之至夜得止手足溫翌日大汗而解繼以理中湯數服而愈孫真人習業篇云凡欲爲太醫必須諳甲乙素問黃帝鍼經明堂流注十二經三部九候本草藥性仲景叔和並須精熟如此方爲太醫不耐猶無目夜遊動致顛隕執方用藥者再斯可矣

過汗亡陽變證治驗

中山王知府次子薛里年十三歲六月十三日暴雨方過池水泛溢因而戲水衣服盡濕其母責之至晚發精神昏憒怠情嗜臥次日病頭痛身熱腿腳沈重一女醫用和解散發之閉戶塞牖覆以重衾以致苦熱不勝禁遂發狂言欲去其衾明日尋衣撮空又以承氣湯下之下後語言漸不出四肢不能收持有時項強手足痙攣搐急而攣目左視而白睛多口唇肌肉瞤動飲食減少形體羸瘦命予治之具說前由予詳子證傷濕而失於過汗也且人之元氣

起於腎下腎間動氣遍於身遍行百脈今盛暑之時大發其汗汗多則亡陽百脈行濇故三焦之氣不能上榮心肺心火旺而肺氣焦況因驚恐內奇內經曰恐則氣下陽主聲聲既亡而聲不出也陽氣者精則養神柔則養筋又曰奪血無汗奪汗無血今發汗過多氣血俱衰筋無所養其病爲痓則項強手足瘈瘲搐急而攣目遍於肝肝者筋之合也筋既燥而無潤故目左視而白睛多肌肉者脾也脾熱則肌肉蠕動故曰骨蠕動有時而作經云肉瘈者得之濕地也脾熱者肌肉不仁發爲肉瘈瘈者瘈瘲無力運動久而不仁陽主於動今氣欲竭熱留於脾故四肢不用此傷濕過汗而成壞證明矣當治時之熱益水之原救其逆補上升生發之氣黃帝鍼經曰上氣不足推而揚之此之謂也以人參益氣湯治之內經曰熱淫所勝治以甘寒以酸收之人參黃芪之甘溫補其不足之氣而緩其急搐故以爲君腎惡燥急食辛以潤之生甘草甘微寒黃芪苦辛寒以救腎水而生津液故以爲臣當歸辛溫和血脈橘皮苦辛白朮苦甘炙甘草甘溫益脾胃進飲食肺欲收急食酸以收之白芍藥之酸微寒以收耗散之氣而補肺金故以爲佐升麻柴胡苦平上升生發不足之氣故以爲使乃從陰引陽之謂也

人參益氣湯

黃芪五分　人參　黃柏炙　白芍藥各三分　升麻　柴胡　當歸　白朮　陳皮三分　生甘草二分　炙甘草各二分

右十一味㕮咀都爲一服水二盞半先浸兩時辰煎至一盞去粗熱服早食後午飯前各一服投之三日後證漸出少能行步四肢柔和食飲漸進至秋而愈

用熱遠熱從乎中治

鄭道寧友人劉巨源時年六十有五至元戊寅夏月因勞倦飲食不節又傷冷飲得疾醫者往往皆以爲四時證治之不愈遂十日道寧請太醫羅謙甫治之診視曰右手三部脈沈細而微太陰證也左手三部脈微浮而弦虛陽在表也大抵陰多而陽少今所苦身體沈重四肢逆冷自利濇穀引衣自覆氣難布息懶語言此脾受寒濕中氣不足故也仲景言下利濇穀急當救裏宜四逆湯溫之內經復有用熱遠熱之戒口乾但欲漱水不欲嚥早晨身涼而肌生粟午後煩躁不欲去衣昏昏睡而面赤隱隱紅斑見於皮膚此表實裏虛故也內虛則外證隨時而變詳內外之證明矣治病必察其下今適當大暑之時而得內寒之病以標本論之時爲標也病爲本也用寒則順時而違本用熱則從本而逆時此乃寒熱俱傷必當從乎中治中治者溫之是也遂以錢氏白朮散加升麻就本方加葛根甘草以解其斑少加白朮茯苓以除濕而利其小便也人參藿香木香安脾胃進飲食攻咀每服一兩煎服再服斑退而身溫利止而神出次服異功散治中湯辛溫之劑一二服五日得平止藥主人曰病雖少愈勿藥可乎羅君曰藥攻邪也內經曰治病以平爲期邪氣既去強之以藥變證隨起不若以飲食調養待其眞氣來復此不藥而藥不治而治之理存焉從之旬日頁愈噫謙甫之爲醫深究內經之旨以爲據依不爲浮議之所搖動中了然而無所滯豈驗方而用藥者比也巨源友舊朝夕往視之故得其詳不可不錄之以爲戒五月廿五日鄭道寧謹題

病宜早治

仲景傷寒論曰凡人有疾不時卽治隱忍冀瘥以成痼疾小兒女子益以滋甚時氣不和便當早言若不早治眞氣失所邪方萌動無憚劬勞不避晨夜而卽治之則藥餌鍼艾之效必易爲之不然患人忍之數日乃說邪氣極盛而病極成而後施治必難爲力內經曰其善治者治皮毛其次治肌膚其次治六腑其次治五臟治五臟者半死半生矣正以謂此昔桓侯忌以皮膚之微疾以至骨髓之病雖悔何及戊午春桃李始華雨雪厚寸許一園叟遽令舉家執梗擊樹盡墮其雪又茨束草於其下以散其寒使沖和之氣未傷而復是年他家果皆不成熟獨此園大熟噫果木之病治之尙有不損況人之有病可不早治乎故金匱玉函云生候長存形色未病未入腠理鍼藥及時服浮謝節委以良醫病無不愈者矣

衛生寶鑑卷二十四終

三原李錫齡孟熙校刊

羅謙甫先生衛生寶鑑一書分門別類纖悉俱備惟治傷寒之法雖紀述一二而不全錄蓋以其二門理趣幽深未易殫舉況其玄機妙旨已備於仲景以下歷代名醫書中先生之意欲使可醫者究心尋繹庶得其奧今猶恐遐方僻壤臨病倉卒醫者欲求全書檢閱豈可得乎故粗述仲景諸公治內傷外感經驗方并中暑方附刊卷末名曰補遺庶免鹵莽滅裂之輩妄投匕劑誤傷於人耳若欲究其極致則仲景治外感三百九十七法一百一十三方東垣治內傷初中末三法及歷代名醫方論具有全書誠能刻意推求以施治療而全人生亦仁者之用心也茲不能盡述云

外感傷寒等證

表證

頭疼發熱或鼻塞聲重四時俱用芎朮香蘇散治之（即局方香蘇散加芎朮）

川芎　香附　紫蘇（各四兩）
甘草（一兩炙）　蒼朮　陳皮（各二兩）

右剉每服三五錢水煎去粗熱服不拘時候日三服

傷風傷冷鼻塞聲重頭痛目眩目肢拘倦欬嗽多痰胸滿氣短證重者三拗湯治之輕者金沸草散治之

局方三拗湯

麻黃（不去根節）　杏仁（不去皮尖）　甘草（不炙各等分）

右剉每服五錢生薑五片水煎通口服被覆取汗

局方金沸草散（又治時行寒疫壯熱惡風）

旋覆花（去梗）　麻黃（去節）　前胡（各三兩）
荊芥穗（四兩）　甘草（炒）　半夏（湯泡薑汁炙）
赤芍藥（各一兩）

右七味每服五錢水一盞半生薑三片棗一枚煎八分去粗溫服不拘時候

局方葛根解肌湯

葛根（四兩）　麻黃（三兩去根節）　芍藥
甘草（炙）　黃芩（各二兩冬寒可去之如病人有鬱熱可倍酌用之）
桂（一兩天氣熱時可去之冬寒倍酌用之）

右六味每服五錢水一盞半棗一枚擘破煎八分去粗稍熱服不以時候汗出為度

頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼目睛痛多寒壅咳嗽鼻塞聲重春夏秋俱用敗毒散治之冬用十神湯治之春秋若寒亦用

局方敗毒散

人參　茯苓　甘草（炙）
前胡　川芎　羌活
獨活　桔梗　柴胡
枳殼

右十味各等分每服五錢水一盞半生薑薄荷各少許煎至八分去粗溫服不拘時候

局方十神湯

陳皮（去白）　麻黃（去根節）　川芎
甘草（炙）　香附　紫蘇（去粗梗）
白芷　升麻
乾葛（十四兩）　芍藥（各四兩）

右十味每服五錢水一盞半生薑五片棗一枚煎八分去粗熱服不拘時候如發熱頭痛加連鬚葱白三莖如中滿氣實加枳殼數片同煎服

傷寒發熱頭痛四時用十味芎蘇散治之

川芎（七錢）　紫蘇　乾葛（各二錢半）
柴胡　茯苓（各半兩）　甘草（三錢）
半夏（六錢）　枳殼（炒三錢）　陳皮（三錢半）
桔梗（生二錢半）

右剉每貼五錢水二盞薑三片葱白二根煎一盞去粗不拘時候服

傷寒熱毒煩悶口燥或乾嘔用黃連解毒湯治之春暖夏暑秋熱皆可用之雖冬寒若病人有鬱熱亦可用也

黃連　黃柏　黃芩
大梔子（各半兩）

右四味每服五錢水煎溫服如腹滿嘔吐或欲作利加半夏三枚厚朴二錢茯苓四錢生薑三片煎服

表證不解下證未全或燥熱佛結心煩不得眠煩渴頭昏唇焦咽燥目赤或便溺祕結證輕者用涼膈散治之夏宜用之如春秋久病人舊有鬱熱者亦宜用之

潔古涼膈散（出醫學啓源與局方分兩不同）

連翹（一兩）　山梔　大黃
黃芩　薄荷葉（各半兩）　甘草（一兩半）
朴硝（二錢半）

右七味每服五錢水一盞半竹葉七片蜜少許煎至八分去粗食後溫服○如或咽痛涎嗽加桔梗一兩荊芥穗半兩○或欬而嘔加半夏半兩生薑三片○或鼻衄嘔血加當歸芍藥各半兩生地黃一兩○或淋者加滑石四兩茯苓一兩○或風眩頭痛加川芎防風各半兩石膏三兩○或有酒毒加葛根一兩○或斑疹加葛根荊芥穗赤芍藥川芎防風桔梗各半兩○凡言加減者

皆自本方中加減也

宣明雙解散

防風　川芎　當歸　芍藥　薄荷　大黃　芒硝各半兩　桔梗各一兩　荆芥　甘草各三兩　生薑三片○已上即風邪通聖散

白朮各一錢　生薑三片○已上即防風通聖散

滑石六兩　甘草一兩○已上即益元散

右二十味每服五錢葱白五寸生薑三片水煎服

傷寒七八日邪毒不解表裏俱熱心胸大煩頭痛自汗大渴飲水煩乾脈滑數而實或長而實用啓源白虎湯治之

夏熱時用如上證脈洪大可加人參○如鼻中氣短倍上喘脈洪大而虛無力或微遲則內傷治

知母一兩半　甘草一兩炙　粳米一兩　石膏四兩亂絞名另爲末

右四味每服五錢水煎溫服如或煩渴口乾脈洪大加人參半兩名人參白虎湯此藥立夏後立秋前天氣熱時可服立夏前立秋後天氣不熱時不可服內傷氣虛血虛脈虛之人並不可服此方與仲景方分兩不同

傷寒四五六日蒸熱發作身熱或惡風或筋脈拘急身體疼痛寒熱往來或胸滿脇痛或自汗四時俱用仲景小柴胡湯治之

柴胡八兩　黃芩　人參　甘草炙各三兩　半夏三兩半

右五味每服五錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至八分去柤熱服不拘時候

裏證

傷寒四五日或十餘日邪結在裏大便秘澀腹滿或脹痛或繞臍刺痛或譫語或心下痞硬脈長脈沈實或下利心下堅硬或已經下其脈浮沈尚有力用仲景大柴胡湯治之

柴胡八兩　黃芩　赤芍藥各三兩　大黃二兩　半夏二兩半　枳實半兩麩炒

右六味每服五錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至八分去柤熱服不拘時候

惡熱不惡寒手心腋下濈濈汗出胃中乾澀燥糞結聚潮熱大便硬小便如常或腹滿而喘或譫語脈沈而滑用仲景調胃承氣湯治之

硝一斤　甘草炙二兩　大黃四兩去皮酒洗

右剉每服臨期斟酌多少先煮二味熟去柤下硝上火煮二三沸頓服之

始初發熱惡寒今汗後不惡寒但大熱發而躁始初脈浮大今脈洪實或沈細數始初惺惺今狂語用調胃承氣湯治之方見前

心胸連臍腹大鬧腹中疼坐臥不安胃鬧喘急或腹中微滿不大便用仲景小承氣湯治之

大黃四兩　厚朴二兩麩炒　枳實大者三箇麩炒

右剉碎二味大黃切如棋子大臨證斟酌多少用之

胸腹脹滿按之痛日久不大便小便赤澀表裏俱熱或煩渴譫妄或狂妄不識人或潮熱懊憹又如瘧狀或大渴反不能飲或喘急胃鬧或微喘直視脈實數而沈用大承氣湯或三一承氣湯治之

仲景大承氣湯

大黃四兩如棋子大酒洗　厚朴八兩　芒硝二合

右四味每服五錢水一盞半生薑七片烏梅一枚煎

大黃酒洗　芒硝　厚朴薑炒　枳實麩炒各半兩　甘草炙一兩

右五味每服斟酌多少用水一盞半生薑三片煎八分熱服得利則止未利再服

傷寒手足溫自利不渴腹滿時痛咽乾脈沈細用三因治中湯治之活人書同

人參　乾薑炮　白朮　甘草炙　陳皮去白　青皮炒各等分

右六味剉每服五錢水一盞半煎七分去柤食前服

半表半裏證

往來寒熱或胸滿脇痛或心煩或嘔或吐或口苦舌乾或渴或小便不利或心悸脈弦或弦緊用小柴胡湯治之方見前

寒熱往來大便秘澀腹滿脇痛或時發頻躁或已經汗後如瘧日晚發熱用大柴胡湯治之方見前

外感有內傷證

外感風寒內傷生冷稍寒壯熱頭目昏疼肢體拘急或中脘虛寒嘔逆惡心用局方人參養胃湯治之

厚朴　藿香　半夏各一兩　草果　茯苓

人參各半兩　甘草炙二錢半　橘紅七錢半

右九味剉每服五錢水一盞半生薑七片烏梅一枚煎七分去柤熱服

外感發熱頭疼內因痰飲凝滯爲熱或中脘痞滿嘔逆惡心用參蘇飲或藿香正氣散治之局方參蘇飲

陳皮去白　枳殼麩炒　桔梗　甘草炙　木香各半兩　半夏　乾葛　紫蘇葉　前胡

人參　茯苓各七錢半

右十一味剉每服五錢水一盞半生薑七片棗一枚煎七分去柤徹熱服一方不用木香

周方藿香正氣散

茯苓　白芷　大腹皮　紫蘇各一兩　陳皮　桔梗　白朮　厚朴　半夏　甘草炙各二兩　藿香三兩去皮

右十一味剉每服五錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至七分去柤熱服如欲出汗被蓋再煎服○如以上證候又未見愈用小柴胡湯治之方見前○如以上證候又未見愈腹或滿數日不大便用活人書小柴胡加芒硝湯治之

柴胡二兩七錢　黃芩　人參　甘草炙各二兩　半夏入錢　芒硝三兩

右六味剉每服五錢水一盞半生薑五片棗一枚煎八分去柤下硝再煎一兩沸稍熱服

外感傷寒極證

陽證

身動而輕言語有聲目睛了了鼻中呼吸出入能往來口中鼻中俱氣熱出此事難知用調胃承氣湯治之方見前

陰證

身靜而重語言無聲氣少難以布息目睛不了了鼻中呼吸不能出入往來口中鼻中氣俱冷水漿不入大小便不禁面土惡寒有如刀刮出此事難知用四逆湯及葱熨法治之

仲景四逆湯

甘草炙二兩　乾薑炮一兩半　附子一枚生用去皮破八片今宜炮

右三味每服斟酌多少用水二盞煮取八分去柤溫服

活人書葱熨法

葱一束以麻纏如餅大切去根葉惟存葱白長二寸許

以火炙一面令熱勿至灼火乃以熱處著病人臍連臍下其上以熨斗盛火熨之令葱餅熱氣透入腹中更作三四餅如壞不可熨都易一餅俱病人漸醒手足溫有汗乃瘥更服四逆湯以溫內

陽證似陰

手足逆冷大便溏結小便赤色或大便黑硬脈沈而滑出活人書按此手足逆冷名熱厥與陰厥不同詳見後篇厥證條下當用白虎湯重者小承氣湯治之二方並見前

陰證似陽

身微熱煩躁面赤脈沈而微內經人書按身微熱是表熱煩躁是陰盛格陽發躁面赤是下元虛陽浮上煩日常面赤先上天也與陽證面赤不同仲景少陰證面赤用四逆湯加葱白治之方見前

身冷脈細沈數煩躁不飲水出活人書此名陰盛格陽用仲景乾薑附子湯加人參治之

乾薑一兩　附子一枚炮去皮破八片　人參半兩

右三味每服斟量多少水一盞半煎至八分去柤或溫或涼服

傷寒目赤而煩渴脈七八至東垣曰此陰盛格陽於外非熱也診脈以數為熱遲為寒今脈七八至是熱極也然按之至骨則無脈是無根蒂之脈雖七八至其下無根蒂故知非熱也內經玄文治法用乾薑附子湯加人參方見前○又用仲景白通加豬膽汁湯

葱白四莖　乾薑二兩　附子一枚炮去皮破八片

人尿五合　豬膽汁二合

右剉每服斟量多少水一盞煎至五分去柤內尿膽汁和勻或溫或涼服無膽亦可

妄言雜證

煩躁

煩為煩擾躁為躁悶皆為熱證然煩有虛煩躁有陰躁古人所謂陰極發躁

五六日不大便或心下硬而煩躁者治用大柴胡湯或調胃承氣湯方並見前

大熱乾嘔呻吟語不得眠治用黃連解毒湯方見前

煩躁發熱胸中煩悶或已經汗解內耗胸中煩滿其證不虛不實治用三黃瀉心湯或用竹葉石膏湯治之

活人書三黃瀉心湯

大黃　黃連各二兩　黃芩一兩

右剉每服一兩百沸湯二大盞熱漬之停一時久絞去柤煖動分二服

仲景竹葉石膏湯

石膏一斤　半夏二兩半　甘草炙二兩

人參三兩　麥門冬五兩半

右剉每服五錢水二盞入淡竹葉生薑各五片煎至一盞半去柤入粳米百餘粒再煎候米熟去米溫服不計時

陰證此是陰極發躁

手足冷或身微熱脈皆沈細微弱而煩躁者治用四逆湯加葱白方見前○或白通加豬膽汁湯方見前○或用人參三白湯加竹茹或無憂散右四方選而用之

人參三白湯加竹茹

白朮　白芍藥　白茯苓各一兩　人參二兩　竹茹一兩

右剉每服五錢水二盞生薑三片煎八分去柤溫服

三因無憂散

以天南星為末入臘月黃牛膽中縛令緊懸於當風處日處候乾為末用人參半兩煎湯七分調末二錢乘熱服之遲少時更以熱人參湯投之或入辰砂細末亦可

舌胎

陽證

寒邪在半表半裏舌胎白滑或黃胎治用小柴胡湯方見前

熱結在裏表裏俱熱舌上或白或黑不滑而澁治用白虎湯加人參方見前

經曰藏結舌上白胎滑者難治又曰藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也

陰證

手足冷舌胎黑治用四逆湯方見前

諫語此是語言謇澀也

陽證

胃實不大便諫語治用大柴胡湯或調胃承氣湯方並見前

婦人傷寒經水適斷發熱惡寒至夜諫言此為熱入血室血室者素問所謂女子胞邪直勝也治用小柴胡湯方見前

陰證

手足冷脈細微而諫語治用四逆湯方見前

鄭聲此是語言重濁如說此一話又復再說聲氣無力句不連續也

陽證

身微熱脈微弱而鄭聲者治用人參三白湯方見前

陰證

身涼手足或冷而鄭聲者治用四逆湯方見前

呃逆仲景所謂噦也噦下氣逆衝上出口作聲素問所謂諸逆衝上皆屬於火

陽證

不虛不實而呃逆者治用小柴胡湯方見前或用橘皮竹茹湯或用丁香柿蒂湯加人參

活人書橘皮竹茹湯

橘皮一斤　青竹茹一升半　甘草炙二兩

人參半兩

石剉每服五錢水二盞生薑五片棗二枚煎八分去粗溫服

丁香柿蒂湯加人參

丁香　柿蒂　青皮

陳皮　人參各等分

右剉每服三錢水一盞半煎七分去粗溫服

身熱脈雖數而呃逆者治用人參三白湯加竹茹方見前○或用八物湯加竹茹或用丁香柿蒂湯加人參方見前八物湯加竹茹

人參　白朮　白茯苓

甘草　當歸　熱地黃

川芎　竹茹　白芍藥各等分

右剉每服五錢水一盞生薑三片煎八分去粗溫服

陰證

身冷手足或冷而呃逆者治用四逆湯加人參方見前○如病後無他證獨見呃逆者治人參三白湯加當歸

人參　白朮　茯苓

芍藥　當歸各等分

右剉每服五錢水二盞生薑三片煎八分不拘時服

發黃

陽證

身熱不大便而發黃者用仲景茵陳蒿湯

茵陳六兩　大黃二兩　山梔子十四枚

右剉每服酌量多少以水三升先煮茵陳至二升內二味煮取一升去粗服

身熱大便如常小便不利而發黃者治用茵陳五苓散

澤瀉　白朮　豬苓

赤茯苓各一兩半　官桂一兩　茵陳三兩

右剉水煎溫服

身熱大小便如常而發黃者治用仲景梔子柴皮湯加茵陳

梔子十五枚　甘草一兩　柴皮二兩

茵陳六兩

右剉水煎溫服

陰證

皮膚涼又煩熱欲臥水中嚬喘脈沈細遲無力而發黃者治用茵陳四逆湯

乾薑一兩半　甘草炙二兩　附子炮一枚去皮臍八片

茵陳六兩

右剉每服酌量多少水煎涼服

皮膚冷心下硬按之痛身體重背惡寒目不欲開懶言語自汗小便利大便了而不了脈緊細而發黃者治用茵陳四逆湯方見前

徧身冷面如桃李枝色腹滿小便澀關尺脈沈遲細而發黃者治法先用茵陳茯苓湯以利其小便次用茵陳四逆湯方見前更加當歸木通

茵陳茯苓湯

茯苓　官桂各一兩　豬苓七錢半

滑石一兩半　茵陳一兩半　當歸一兩

右剉每服五錢水煎溫服

發斑

陽證

斑斑如錦紋或面部或胸背或四肢紅赤者胃熱也紫黑者胃爛也赤者五死一生治用玄參升麻湯重者白虎加人參湯方見前

三因玄參升麻湯

玄參炒　升麻　甘草炙各半兩

右剉每服五錢水一盞半煎七分溫服

陰證

斑如蚊蟲咬痕稀少而微紅此下元陰火失守聚在胃中上熏於肺肺主皮毛故胸背皮膚發此斑也治用大建中湯

桂心　芍藥　黃芪各二錢

人參　當歸　甘草炙各一錢　附子炮一兩　半夏二錢半　生薑五錢

右九味剉每服酌量多少水二盞棗一枚煎八分去滓溫服

發狂

陽證

發狂煩躁面赤脈實治用調胃承氣湯方見前

陰證

發狂如肌表雖或熱以手按之則冷遍手或有背胸膚有斑十數點脈弦沈細治用乾薑附子湯加人參方見前

脈遲脈者地也陰脈不相應按手足遲冷冷至肘膝名曰四肢脈逆

陽證

手足雖冷有時或溫手足心必暖脈雖沈伏按之則滑其證或畏熱或渴欲飲水或揚手擲手煩躁不得眠大便祕小便赤此名熱厥古人所謂陽極發厥也治用白虎湯大承氣湯雙解散涼膈散以上四方詳證輕重選而用之方並見前

陰證

四肢冷身不熱惡心蜷足臥或引衣被自覆不渴或下利或大便如常脈沈微不數或雖沈實按之則遲弱此名冷厥治用通脈四逆湯或當歸四逆湯或白通加豬膽汁湯方並見前

若病人寒熱而脈面色不淨四肢兩手忽無脈或一手無脈此是將有好汗宜用麻黃附子甘草湯以助其汗汗出則愈不用藥助亦好汗必自出

麻黃二兩去節　甘草炙二兩　附子一箇炮

右剉每服五錢水二盞煎至八分不拘時溫服

多汗

陽證

身微熱表虛汗出不已或因醫者發汗以致表虛脈不實

治用玉海藏黃芪湯

黃芪　人參　白茯苓　白朮　白芍藥各一兩　甘草七錢半　陳皮五錢

右剉每服酌量多少用水二盞生薑三片煎八分溫服

陰證

身涼額上手背有冷汗治用四逆湯加人參方見前

結胸邪氣乘虛結於心中硬滿而痛手不可按其痛連胸膈堅硬名曰大結胸若按之心中痛此名小結胸

心胸高起大痛手不可按治用輕者枳實理中丸重者大陷胸丸治之

活人書枳實理中丸

茯苓　人參各二兩　枳實麩炒十六枚　白朮　乾薑炮　甘草炙各二兩

右為末煉蜜和勻每一兩作四丸熱湯化下一丸

仲景大陷胸丸

大黃三兩　芒硝各七錢半　芎藭炒　杏仁去皮尖

右以前二味為末研杏仁芒硝如泥和藥末丸如彈子大每服一丸別杵甘遂末一錢匕白蜜一大匙水二盞煎至七分頓服之一宿乃下如不下更服以下為度但甘遂性猛宜詳虛實斟酌用之

按之心中痛脈浮滑者治用仲景小陷胸湯

黃連二錢半　半夏六錢　栝蔞實大者一枚用四分之一

右以水三盞先煎栝蔞實至一盞半去柤入前藥二味煎至一盞分作二服利下黃涎即安

心下痞邪氣乘虛陷於心下痞而不痛曰痞

心下痞而不痛者治用半夏瀉心湯或生薑瀉心湯或枳實理中丸方見前

仲景半夏瀉心湯

半夏一兩半　黃芩　人參　甘草炙　乾薑各二兩　黃連一兩　棗子十二枚擘破

右剉用水一斗煮取六升去柤再煎取三升溫服一升日三服

仲景生薑瀉心湯

生薑四兩　甘草炙　黃芩各三兩　人參　乾薑　黃連各一兩　半夏半升　棗子十二枚

右八味以水一斗煮取六升去柤再煎取三升溫服一升日三服

心下痞滿心煩腹鳴下利治用生薑瀉心湯方見前

嘔有聲有聲名曰嘔乾嘔則無物

陽證

嘔而發熱或寒熱或潮熱者治用小柴胡湯方見前

陰證

嘔而身微熱或厥或煩小便利脈弱者治用四逆湯出此事類方見前

吐有物無聲名曰吐

陽證

吐而身熱或不熱者治用小半夏加茯苓湯或小半夏加橘皮湯或乾薑黃芩黃連人參湯

活人書小半夏加茯苓湯

半夏五兩　生薑八兩　茯苓三兩　白朮　陳皮　甘草各二兩

右剉水煎服

活人書小半夏加橘皮湯

半夏一兩　陳皮半兩　白朮　茯苓　甘草各半兩

右剉每服五錢水二盞生薑十片煎至八分去柤溫服

仲景乾薑黃芩黃連人參湯

乾薑　黃芩　黃連　人參各三兩

右剉每服五錢水二盞煎八分去粗溫服

陰證

吐而手足寒或煩躁治用四逆湯方見前

下利或下膿血

陽證

脇熱下利臍下熱大便赤黃或有腸垢者治用仲景黃芩湯

黃芩三兩　芍藥二兩　甘草二兩

右剉每服五錢水二盞煎至八分服如瘧加

半夏生薑

熱毒入胃下利膿血治用仲景黃連阿膠湯

黃連四兩　黃芩一兩　芍藥二兩

阿膠三兩　雞子黃二個

水五升先煮三物取二升去滓入膠煥盡小冷內雞黃

令相得溫服七合日三服一方無芍藥雞子黃有梔子

仁半兩

陰證

寒毒下利臍下寒腹脹滿大便或黃白或毒焉或有痞鞕

治用理中湯或四逆湯或白通湯二方見前

仲景理中湯

人參　乾薑　甘草炙　白朮各等分

右剉每服五錢水一盞半煎八分去粗稍熱服空心食

前病重者加附子

血

虛汗不汗內有瘀血故鼻衄治用活人書犀角地黃湯主之

芍藥三錢　生地黃半兩　犀角一兩如無升麻代之　牡丹皮一兩

右剉每服五錢水一盞半煎至八分有熱狂加黃芩二

兩

吐蚘

蚘寒蚘上入膈吐蚘此胃寒乃胃虛寒非實寒也治用仲

景理中丸

人參　乾薑　甘草炙　白朮各三兩

右四味細末蜜丸每服一兩作四丸以湯研一丸溫

服日三四服夜二服

仲景烏梅丸

烏梅三百個　細辛　附子炮　桂　人參　黃柏各六兩　當歸　川椒各四兩　乾薑十六兩　黃連十六兩

右用苦酒浸烏梅一宿去核蒸搗成泥餘藥為細末和

勻入熟蜜杵二千下丸如梧子大米湯送下十丸日三

服稍加至二十丸

頭痛

此厥陰經經其筋脈循陰器絡舌本厥陰經受病其筋脈

勁急故舌捲囊縮者難治治用當歸四逆湯方見前與吳

茱萸生薑湯可加當歸四逆名曰當歸一方吳茱萸生薑湯

吳茱萸二兩　生薑半斤切　人參

右用水煎不拘時服

代灸塗膏藥

附子　馬藺子　蛇床子　木香　肉桂　吳茱萸各等分

右六味粗末用麻一匙藥一匙或各半匙生薑汁和煖

成膏攤紙上圓三寸許貼臍下關元氣海自曉至晚其

之

火力可代灸百壯臍痛亦可貼之

頭大如斗熱客心胸上攻頭目頭大頭天行病

頭面腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥治用試效

方普濟消毒飲子

黃芩　黃連各半兩　人參三錢　牛蒡子　玄參　生甘草　橘紅　桔梗各二錢　柴胡　黍粘子　馬勃　板藍根各一錢　殭蠶炒　升麻各五分　連翹一錢

右十四味細末半錢湯調時時服之半用蜜丸口噙化

之或加防風薄荷川芎當歸身咬咀或大便硬加酒煨

大黃一錢或二錢以利之如腫勢盛大宜鍼刺之

差後勞復此是病愈已好或因飲食或因動作而再病者曰勞復

差後又頭重目眩治用小柴胡湯方見前

差後又自熱無汗神氣不清爽治用小柴胡湯方見前

差後又身熱無汗心下大煩骨節疼痛目眩惡寒食則嘔

用三因橘皮湯

橘皮一兩半　甘草炙半兩　人參二錢半

竹茹半兩

右剉每服五錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎七分

食前服

差後面腫或腹以下腫治用索矩三和湯

滿皮　厚朴　檳榔　白朮各三兩　甘草炙　紫蘇各二兩去粗梗

木通　海金沙各一兩

右剉每服五錢水一盞生薑三片煎至八分溫服

如鼻上有汗出必氣血和而自愈

大病差後虛煩不得眠此膽寒也治用三因溫膽湯

半夏　枳實　竹茹各二兩

橘皮三兩　甘草一兩　白茯苓一兩

右六味剉每服酌量多少水一鍾半生薑五片棗一枚煎七分去粗食前溫服

陰陽易 傷寒新愈因行房得病男如此曰陽易女如此曰陰易如陰陽易病兒舌吐出者必死

男子陽易病頭重不欲舉眼中生花腰踝間連腹痛身重少氣陰囊入裏腹內絞痛治用燒褌散溫服四逆湯當歸四逆湯

仲景燒褌散

取其婦人褌褲近腰處者燒灰細研服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈如婦人病則燒男子褌褲

仲景通脈四逆湯

甘草炙二兩　乾薑三兩炮　附子大者一枚炮去皮破八片

右剉每服酌量多少水煎去粗調服燒褌散

仲景當歸四逆湯

當歸　桂枝　芍藥　細辛各三兩　甘草炙　通草各二兩　棗子二十五枚

右剉每服酌量多少水煮去粗調服燒褌散

婦人陰易病熱氣上衝胸手足拘急搐搦如中風狀治用活人書當歸四逆湯

活人書當歸四逆湯

當歸　桂枝　芍藥　細辛各三兩　甘草炙　通草各二兩　棗子二十五枚

右剉每服酌量多少水煮去粗調服燒褌散

婦人陰易病小腹急痛腰膀四肢舉動不已身無熱治用活人書當歸白朮湯

活人書當歸白朮湯

白朮　當歸　桂枝　附子炮　甘草炙　芍藥　黃芪　人參各二錢半　生薑半兩

右剉用水三升煎至一升半分作二服過口服一錢食頃再服溫覆微汗差

○內傷似外感證

始爲熱中病似外感

頭痛大作四肢拘悶氣高而喘身熱而煩上氣鼻息不調四肢困倦不收無氣以動無氣以言或煩躁悶亂心煩不安或渴不止病久者邪氣在血脈中有溫故不渴如病渴是心火炎上刑肺金故渴或表虛不任風寒目不欲開惡食口不知味右手氣口脈大大於左手人迎三倍其氣口脈急大而數時一代而澀澀是肺之本脈代是無氣不相接乃脾胃不足之脈大是洪大洪大而數乃心脈刑肺急是弦急乃肝木挾心火刑肺金也其右關脾脈比五脈獨大而數數中時顯一代此不甚勞役是飲食不節寒溫失所則無右關胃脈振弱隱而不見惟內顯脾脈如此也治用補中益氣湯

黃芪牛蒡病者一錢　人參　當歸身　白朮各三分　升麻　柴胡各二分　橘皮　炙甘草五分

右八味剉都作一服水二盞煎至一盞去粗溫服早飯後臨病斟酌輕重加減

末傳寒中病似外感證

腹脹胃脘當心痛四肢兩脇脹咽不通或涎唾或清涕或多痰足下痛不能任身履地骨乏無力喜唾兩丸多冷陰作痛或妄見鬼狀夢亡人履背胛脹脊皆痛不渴不溲脈盛大以濇名曰寒中治用神聖復氣湯白朮附子湯草豆蔻丸

神聖復氣湯

柴胡一錢　葉本八分　防風半錢　羌活一錢　人參半錢　乾薑炮錢三分　甘草八分　升麻七分　半夏七分湯泡七次　白蒺藜五朵去心刺剪　當歸身六分酒洗　郁李仁五分另研泥　黑附子炮製去皮臍三分

右件剉用水五盞同煎至二盞入

黃蓍一錢　桂紅五分　草豆蔻仁面裹煨熟去皮一錢

右入在內再煎至一盞再入下項藥

黃柴五分酒浸　黃連酒浸　枳殼

生地黃酒洗各三分

已上四味預一日另用新水浸又次入

華潤辛根二分　川芎剉末三分　夏荊子三分

預一日用新水半大盞分作二處浸此三味并黃柴等前正藥作一大盞不去粗入此浸藥再上火煎至一大盞去粗稍熱服空心又能治咬頑咬唇咬舌根強硬等證如神忌肉湯及食肉使不助經絡中火邪也大抵腎與膀胱經中有寒元氣不足者皆宜服之於月生月滿時隔三五日一服如病急不拘時分

白朮附子湯

白朮　附子　陳皮　厚朴　澤瀉各一兩　茯苓　肉桂四錢

右十味剉每服五錢水一鍾生薑三片煎至半盞食前溫服量虛實加減

草豆蔻丸治胃脘當心而痛

草豆蔻四錢裹煨熟　生甘草三分　半夏一錢　麥芽半一錢　益智　陳皮　吳茱萸湯泡去苦　黃芪各八分　桃仁七分　當歸身各六分　青皮　麴末四分　薑黃四分　人參八分　熟甘草六分　澤瀉一分　柴胡四分洋鬱下痛多少加之

右十八味除桃仁另研如泥外爲極細末同研湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服二十丸熟湯送下旋斟酌多少服之

似外感陽明中熱證

有天氣大熱時勞役得病或路途勞役或田野中勞役或

身體怯弱食少勞役或長齋久素胃氣久虛勞役其病肌體壯熱煩悶亂大惡熱渴飲水此與陽明傷寒熱白虎湯證相似鼻口中氣短促上喘此乃脾胃久虛元氣不足之證身亦疼痛至日西作必譫語熱渴悶不止脈洪大空虛或微弱白虎湯證其脈洪大有力與此內傷中熱不同治用清暑益氣湯

人參　白朮　陳皮
神麯　澤瀉各半　黃芪一錢半酒洗
甘草炙　黃柏酒洗　葛根
青皮　當歸身　麥門冬各三分
蒼朮一錢半　升麻一錢　五味子九枚

右十五味剉作一服水二盞煎至一盞去柤稍熱服食遠

似外感惡風寒

有因勞力坐臥陰涼處後病表虛不任風寒少氣短促懶言語聲困弱無力○此因勞役辛苦腎中陰火沸騰後因脫衣或沐浴歇息於陰涼處其陰火不行遂鬱皮膚腠理極虛無陽被風與陰涼所遏以此表虛不任風寒與外感惡風相似不可同外感治宜用補中益氣湯方見前

似外感雜證

勞役形體飲食失節脾胃中州變寒走痛而發黃治用小建中湯或大建中湯方見前

小建中湯

芍藥六兩　桂枝　甘草各二兩
大棗七箇　生薑三兩　膠飴一升

右㕮以水七升煎至三升去柤入膠飴更上微火消解溫服一升日三服

長夏濕熱胃困

有長夏五六月濕熱之時人困倦四肢不收精神短少胸滿短氣肢節疼痛氣促而喘身熱而煩或大便泄利而黃或白淋色或渴或不渴或不飲食或小便頻數而黃治用清暑益氣湯方見前

五苓散治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤少或飲水即吐亦宜服之

澤瀉二十五兩　白朮十五兩　赤茯苓去皮十五兩
豬苓去皮十五兩　肉桂去粗皮十兩

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時服

縮脾飲解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥太多致煩躁者並宜服之

縮砂仁　乾葛　烏梅肉
白扁豆各二兩　草果煨去殼　甘草炙各四兩

右㕮細每服五錢水二盞煎至一盞不拘時任意代熱水飲之極妙

枇杷葉散治中暑伏熱引飲太過脾胃傷冷飲食不化胸膈痞悶嘔噦惡心頭目昏眩口乾煩渴肢體困倦全不思食或陰陽不和致成霍亂吐利轉筋煩躁引飲

枇杷葉去毛炙牛蒡三分　香薷　白茅根
麥門冬各一兩去心　丁香　甘草炙
乾木瓜各一兩　陳皮去白焙半兩　厚朴去皮薑汁炙各半兩

右為末每服二錢溫水調下煩躁用新汲水調下不拘時服小兒亦可服量歲數減少與之

桂苓甘露飲治伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂瀉利並皆治之

白朮　豬苓去皮　白茯苓去皮
滑石研各二兩　甘草炙　寒水石研
澤瀉各一兩　肉桂去皮半兩

右為末每服三錢熱湯或冷水調下不拘時服入蜜少許亦好

黃連香薷湯治伏暑引飲口燥喉乾或吐或瀉及治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度或起居不節

或臥濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃虛弱飲食變亂於腸胃之間便致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出或四肢逆冷而脈欲絕或煩悶昏塞而欲死者此藥悉能主之

黃連四兩　香薷一斤　白扁豆微炒半斤
厚朴去皮薑汁炙熟半斤

右㕮每服五錢水二盞入酒少許煎至一盞沈冷不拘時服

消暑十全飲消暑氣進飲食

人參　厚朴薑製　白朮
香薷　木瓜　白扁豆
黃芪　陳皮　白茯苓
甘草各等分

右㕮每服五錢水二盞生薑三片煎至一盞不拘時服

六和湯治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胸膈痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜臥倦惰小便赤澀并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成瘧疾中酒煩渴畏食婦人胎前產後並宜服之

半夏　杏仁　縮砂仁
人參　甘草各一兩　赤茯苓
藿香　木瓜　白扁豆各二兩
香薷　厚朴各四兩

右㕮每服五錢水二盞生薑三片棗一枚煎至一盞不拘時服

大順散治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

081·18
0022
1445964
21101000175029

甘草三斤　乾薑四斤　杏仁去皮尖麸四斤
肉桂去粗皮四斤

右爲末每服三錢白湯調下不拘時服

叅元散治中暑身熱小便不利此藥性涼除胃脘積熱

滑石六兩　甘草一兩

右爲細末每服三錢用熱湯或冷水調下如欲發汗以葱白豆豉湯下不拘時服

文科教師研究生閱覽室

重刊衛生寶鑑後序

夷幼承先子殷勤言東垣李先生醫術之精古今罕及門人羅謙甫深得其秘與二公所著脾胃論衛生寶鑑諸書皆補前人之未備分門辨惑不執於一偏以至鍼法本草無不詳盡誠醫家切要而不可缺者或乃論其用藥不施攻法而多補迂緩難用此不能深究其旨而妄爲之說也觀各方中所用麻黃葛根汗劑也瓜蔕赤豆吐劑也大黃芒硝牽牛巴豆下劑也三攻之法未嘗不用特其攻補隨宜施之先後各有攸當傳諸書皆已版行於世惜乎緻於元兵今抄本傳誤者多吾嘗正其枉誤欲壽諸梓因循未果汝他日當成吾志焉未幾先子下世夷牽牽服膺弗敢忘運年以來東垣脾胃論內外傷辨用藥珍珠囊三書刊板已就今復捐俸資令醫士錢垣繕寫羅氏衛生寶鑑二十四卷補遺一卷計四百八十一板共一十五萬五千餘字募工刊完將以廣布四方庶幾不負我先子平昔之志非惟從事於活人之術者究心於此大有所益而遐壤僻邑無醫之處倉卒遇病檢方用藥亦必得其效也

永樂十五年十二月初一日承德郎太醫院院判吳鄂韓夷公謹謹識

丹波元胤

經驗南先生衛生寶鑑一書分門別類添具備惟治傷寒之法雖紀述一二而不全錄蓋以其一門理趣幽深未易窺測況其玄機妙旨已備於仲景以下歷代名醫書中先生之意欲使學者究心尋繹庶得其奧今猶恐遇方術壞臨病倉卒學者欲求全書檢閱豈可得乎故粗述仲景諸公治內傷外感經驗方并中景方附刊卷末名曰補遺按補遺不知出于何人永樂十五年太醫院判韓公謹跋曰今醫士錢垣繕寫羅氏衛生寶鑑二十四卷并補遺一卷計四百八十一板共一十五萬五千餘字募工刊完藏此卻其成乎元孝人之手

愛日精廬藏書志

衛生寶鑑二十四卷補遺一卷

天垂受業東垣靈升其堂而入其室者是書採摭李氏精研之論益以諸家之說而以己意貫括之實爲醫家至寶之書卷一至三曰藥性次卷四至二十曰名方類集卷二十一曰藥組法象卷二十二至二十四曰醫驗紀述後附補遺一卷述外感傷寒等證疑難爽重刊時增輯者又淵聞書目無氏經籍志傳是樓書目俱著錄

[General Information]
书名=丛书集成新编　四六
作者=
页数=836
SS号=0
出版日期=

先秦史论坛
http://www.zgxqs.cn/bbs/

子居　打包上传